# *Synopsis avium*

Alphonse Joseph Charles Dubois

Digitized by Google

ALBERT R. MANN
LIBRARY

NEW YORK STATE COLLEGES
OF
AGRICULTURE AND HOME ECONOMICS

AT

CORNELL UNIVERSITY

Digitized by Google

Date Due

Library Bureau Cat. No. 1137

Cornell University Library
QL 677.D81
no.1
Synopsis avium; nouveau manuel d'ornithol

3 1924 002 876 385

O.K.

Digitized by Google

SYNOPSIS AVIUM

# NOUVEAU
# MANUEL D'ORNITHOLOGIE

PAR

**Alphonse DUBOIS**

Docteur en sciences,
Conservateur au Musée Royal d'Histoire naturelle de Belgique,
Chevalier de l'Ordre de Léopold,
Membre du Comité international et permanent d'Ornithologie,
de la Commission permanente d'étude des Collections du Musée du Congo,
Membre honoraire, correspondant ou effectif de plusieurs Sociétés savantes.

**Fascicule IX**

**FRINGILLIDÆ, TANAGRIDÆ, DICÆIDÆ**
**CERTHIIDÆ, CŒREBIDÆ** (1re part.)

**Pl. XI**

BRUXELLES
H. LAMERTIN, éditeur
20, rue du Marché-au-Bois

1901

QL
677
D81
no. 9-17
197555

# AVIS

Afin de satisfaire à la juste demande de plusieurs Ornithologistes, l'auteur a augmenté les références, ce qui facilitera à chacun les recherches pour la détermination des oiseaux. Mais cela nous oblige à dépasser le nombre des fascicules indiqué dans le prospectus, d'autant plus que celui des espèces s'accroît continuellement.

Le *Synopsis avium* sera donc divisé en deux parties : La première ira jusqu'à la fin des Passereaux; la seconde comprendra les Pigeons et tous les oiseaux Ptilopaides, ainsi que les tables alphabétiques des genres, des espèces et des variétés.

Nous ne doutons nullement que les abonnés approuveront le développement donné à notre publication, qui devient ainsi un ouvrage indispensable à tous ceux qui s'occupent d'Ornithologie.

Le prix du fascicule restera fixé à 6 francs pour tous les abonnés qui se feront inscrire avant la fin de la publication.

---

## ON SOUSCRIT à

BRUXELLES, chez l'éditeur, M. **H. Lamertin**, 20, rue du Marché-au-Bois.
AMSTERDAM, chez MM. **Feikema, Caarelsen & Cie**.
BERLIN, chez M. **R. Friedländer & Sohn**, Carlstr. 11, N. W.
LONDRES, chez MM. **William & Norgate**, 14, Henrietta street.
MADRID, chez M. **Romo y Fussel**.
MILAN, chez M. **Ulrico Hœpli**, 37, Corso Vittorio Emanuele.
OXFORD, chez M. **James Parker & Cie**, 27, Broad street.
PARIS, chez M. **P. Klincksieck**, 5, rue Corneille.
NEW-YORK, chez M. **G.-E. Stechert**, 9 East 16th street.

7981. DEBILIROSTRIS, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.*, 1894, p. 363. — Iles James (Galap.)

7982. SCANDENS (Gould), *P. Z. S.*, 1837, p. 7; Darw., *Voy. Beagle, Birds*, p. 104, pl. 42; Sharpe, *l. c.*, p. 19. — James (Galapagos).

2016. *Var.* INTERMEDIA, Ridgw., *l. c.*, 1894, p. 361; *?assimilis*, Gould. — Ile Charles.

2017. *Var.* FATIGATA, Ridgw., *l. c.*, 1895, p. 295; *barringtoni*, Ridgw., *l. c.*, 1894, p. 361. — Indéfatig., Duncan, Albem., Barringt., etc.

2018. *Var.* ABINGDONI (Scl. et Salv.), *P. Z. S.*, 1870, pp. 323, 326; *assimilis* (pt.), Sharpe, *l. c.*, p. 18. — Ile Abingdon, Bindloe (Galapagos).

2019. *Var.* SEPTENTRIONALIS, Rothsch. et Hart., *Novit. Zool.* VI, p. 165. — Wenman, Culpepper.

7983. PALLIDA (Scl. et Salv.), *P. Z. S.*, 1870, p. 323, 327; Shpe, *l. c.*, p. 20; *hypoleuca* et *productus*, Ridgw. — Indéfat., Jervis, Dunc., James, Albemarle.

7984. CRASSIROSTRIS (Gould), *P. Z. S.*, 1837, p. 6; Darw., *Voy. Beagle, B.*, p. 103, pl. 41; Sharpe, *l. c.*, pp. 15, 16; *variegatus*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 323; Salv., *Trans. Z. S.* IX, p. 489, pl. 85. — Abingdon, Bindloe, Charles.

7985. PSITTACULA (Gould), *P. Z. S.*, 1837, p. 6; Darw., *Voy. Beagle, B.*, p. 102, pl. 40; Sharpe, *l. c.*, p. 16; *rostratus* et *compressirostris*, Ridgw. — James, Indéfatigable, Jervis, Barrington, Duncan. (Galap.),

2020. *Var.* TOWNSENDI (Ridgw.), *P. U. S. Nat. Mus.*, 1889, p. 110. — Ile Charles.

2021. *Var.* AFFINIS (Ridgw.), *l. c.*, 1894, p. 363. — Albemarle, Narbor.

7986. INCERTA (Ridgw.), *l. c.*, 1895, p. 294. — Ile James (Galap.)

7987. HABELI (Scl. et Salv.), *P. Z. S.*, 1870, p. 325; Salv., *Trans. Z. S.* IX, p. 490, pl. 36; *bindloei*, Ridgw. — Abingdon, Bindloe.

7988. PAUPERA (Ridgw.), *l. c.*, 1889, p. 111. — Ile Charles.

7989. SALVINI (Ridgw.), *l. c.*, 1894, p. 364. — Chatham.

7990. PROSTHEMELAS (Scl. et Salv.), *P. Z. S.*, 1870, p. 323; Sharpe, *l. c.*, p. 17. — Indéfat., Albemarle, Charles, James, etc. (Galap.)

## 1429. COCORNIS

*Cocornis*, Towns. (1895).

7991. AGASSIZI, Towns., *Bull. Mus. Comp. Zool.* XXVII, p. 121. — Ile Cocos.

## 1430. LIGURINUS

*Chloris*, Moehr. (1752!); *Ligurinus*, Koch (1816); *Chlorospiza*, Bp. (1838).

7992. CHLORIS (Lin.); Dress., *B. Eur.* III, p. 567, pl. 174; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg., Ois.* I, p. 581, pl. 134; *pinetorum*, *viridis*, etc., Brm.; *flavigaster*, Sw.; *aurantiiventris*, Cab. — Europe, Asie S.-W., Afrique N.

2022. *Var.* CHLOROTICA, Cab., *Mus. Hein.* I, p. 158; Tristr., *Ibis*, 1868, p. 206. — Syrie, Palest., Arabie.



Digitized by Google

7993. SINICUS (Lin.); Sharpe, *l. c.*, p. 26; *kawarahiba var. minor*, Tem. et Schl., *Fauna Jap.*, pl. 49. — Sibérie E., Chine, Japon.
2023. *Var.* KAWARAHIBA, Tem. et Schl., *l. c.*, pl. 48. — Japon.
2024. *Var.* KITTLITZI (Seeb.), *Ibis*, 1890, p. 101. — Iles Parry et Baily.

## 1431. EOPHONA

*Eophona*, Gould (1851).

7994. MELANURA (Gm.); Jard. et Sel., *Ill. Orn.* II, pl. 63; Gould, *B. As.* V, pl. 19; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 347, pl. 92. — Chine, Sibérie S.-E.
7995. PERSONATA (Tem. et Schl.), *Fauna Jap.*, pl. 32; Dav. et Oust., *l. c.*, p. 346, pl. 91. — Japon, Chine.
2025. *Var.* MAGNIROSTRIS, Hart., *Bull. B. O. C.* V, p. 38. — Sibérie E.

## 1432. CHAUNOPROCTUS

*Chaunoproctus*, Bp. (1850).

7996. FERREIROSTRIS (Vig.), *Zool. Journ.*, 1828, p. 334; Sharpe, *l. c.*, p. 31; *papa*, Kittl., *Mém. Acad. I. Sc. St-Pétersb.*, 1830, p. 239, pl. 15; Bp. et Schl., *Mon. Lox.*, p. 32, pl. 37, 38. — Ile Bonin-Sima.

## 1433. HESPERIPHONA

*Hesperiphona*, Bp. (1850).

7997. VESPERTINA (Coop.), *Ann. Lyc. N. Y.*, 1825, p. 220; Audub., *B. Amer.* III, p. 217, pl. 207; *bonapartii*, Less., *Ill. Zool.*, pl. 31. — Amér. N.-W. jusqu'au lac Supérieur à l'E.
2026. *Var.* MONTANA, Baird, Br. et Ridg., *Hist. N. Am. B.* I, p. 449. — États-Unis S.-W.
2027. *Var.* MEXICANA, Chapm., *Auk*, 1897, p. 311. — Mexique.
7998. ABEILLII (Less.), *Rev. Zool.*, 1839, p. 41; *maculipennis*, Scl., *P. Z. S.*, 1860, p. 251, pl. 163; *abeillæi*, Scl. et Salv.; Sharpe, *l. c.*, p. 34. — Mexique, Guatémala.

## 1434. COCCOTHRAUSTES

*Coccothraustes*, Briss. (1760).

7999. VULGARIS, Pall., *Zoogr.* II, p. 12; Dress., *B. Eur.* III, p. 373, pl. 173; Dubois, *Fne. ill.*, *Ois.* I, p. 651, pl. 149, 150; *Lox. coccothraustes*, Lin.; *deformis*, Koch; *fagorum*, etc., Brm.; *atrigularis*, Macg.; *europæus*, Sw. — Europe jusqu'au 61° l. N.; Asie centr., Afrique N.

Digitized by Google

2028. *Var.* JAPONICA, Tem. et Schl., *Fauna Jap.*, pl. 51; *vulgaris* (pt.), auct. plur. (nec Pall.) — Sibérie E., Japon, Mongol., Thib., Chine N.

2029. *Var.* HUMEI, Sharpe, *P. Z. S.*, 1886, p. 97; id., *Cat. B.* XII, p. 40, pl. 1; *vulgaris* (pt.), Hume. — Punjab N.-W., ? Afghanistan.

## 1435. MYCEROBAS

*Mycerobas*, Cab. (1847); *Coccothraustes* (pt.), auct. plur.

8000. MELANOXANTHUS (Hodgs.), *Icon. ined.*, *Passeres*, pl. 279, ff. 1, 2; Gray, *Gen. B.*, pl. 88; Sharpe, *l. c.*, p. 41; *fortirostris*, Lafr. — Himalaya jusqu'en Chine W.

## 1436. PYCNORHAMPHUS

*Pycnorhamphus*, Hume (1873); *Hesperiphona* (pt.), auct.

8001. ICTEROIDES (Vig.), *P. Z. S.*, 1830, p. 8; Gould, *Cent. B. Him.*, pl. 45; id., *B. Asia*, V, pl. 22 (nec fem.); Sharpe, *l. c.*, p. 44. — Himalaya.

8002. AFFINIS (Blyth), *J. A. S. Beng.*, 1855, p. 179; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 345; Sharpe, *l. c.*, p. 46. — Himalaya E., Thibet, Chine W.

8003. CARNEIPES (Hodgs.), *Icon. ined.*, *Passeres*, pl. 279ᵃ, f. 2, pl. 280, ff. 1, 2; Gould, *B. Asia*, V, pl. 21; Sharpe, *l. c.*, p. 47; *speculigerus*, Brandt, *Bull. Ac. St-Pétersb.*, 1842, p. 11. — Altaï, Turkest., Afghanist., Himal. et Chine jusqu'au Kan-sou.

## 1437. PHEUCTICUS

*Pheucticus*, Rchb. (1850).

8004. CHRYSOGASTER (Less.), *Cent. Zool.*, pl. 67 (1830); Tacz., *Orn. du Pérou*, III, p. 3; *dorsigerus*, Jard. et Sel., *Ill. Orn.* IV, pl. 44. — Vénézuéla, Ecuador, Pérou.

2030. *Var.* CHRYSOPEPLA (Vig.), *P. Z. S.*, 1832, p. 4; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Amer.* I, p. 135; Sharpe, *l. c.*, p. 51. — Mexique W.

2031. *Var.* AURANTIACA (Salv. et Godm.), *Ibis*, 1891, p. 272. — Guatémala.

8005. ? MAGNIROSTRIS (Bp.), *P. Z. S.*, 1837, p. 120; *bonapartii*, Salvad. — Mexique ?

8006. TIBIALIS, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1866, p. 478; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Amer.*, *Aves*, I, p. 335; Sharpe, *l. c.*, p. 53. — Amér. centr. de Costa-Rica à Panama.

8007. AUREIVENTRIS (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1837, p. 84; d'Orb., *Voy. Am. mér.*, *Ois.*, p. 365, pl. 49, f. 2; Salv. et Godm., *l. c.* I, p. 334. — Bolivie, Matto-Grosso, Parag., Argent. N.

2032. *Var.* UROPYGIALIS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 840; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 2; Sharpe, *l. c.*, p. 55; *aureiventris* (pt.), Cab. (1850). — Colombie, Ecuador, Pérou.

Digitized by Google

8008. CRISSALIS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1877, p. 19; *aureiventris*, Scl. (1858-60); *hemichrysus*, Salv. et Godm., *l. c.*, p. 334. — Ecuador.

## 1458. HEDYMELES

*Habia*, Rchb. (1850, nec Less. 1831); *Hedymeles*, Cab. (1851); *Zamelodia*, Coues (1880).

8009. LUDOVICIANUS (Lin.); *Pl. Enl.* 153, f. 2; Audub., *B. Amer.* III, p. 209, pl. 205; *rubricollis*, Mull., Vieill., *Gal. Ois.*, pl. 58; *rosea*, Wils.; *rhodocampter*, Licht. — Canada, États-Unis à l'E. du Miss., Texas, Amér. centr., Col., Ecuad., Cuba, Jam.

8010. MELANOCEPHALUS (Sw.), *Phil. Mag.* I, p. 438; Audub., *B. Amer.* III, p. 214, pl. 206; *epopæa*, Licht.; *xanthomaschalis*, Wagl.; *guttatus*, Less. — États-Unis centr. et W., Mexique.

2033. *Var.* CAPITALIS, Baird, Br. et Rindg., *Hist. N. Am. B.* II, p. 70. — Californie.

## 1459. GUIRACA

*Guiraca*, Sw. (1827); *Coccoborus*, Sw. (1837).

8011. CÆRULEA (Lin.); Audub., *B. Amer.* III, p. 204, pl. 204; Sharpe, *l. c.*, p. 66. — États-Unis mér., Mex., Amér. centr., Cuba.

2034. *Var.* LAZULA (Less.), Ridgw., *Auk*, 1898, p. 322; *eurhyncha*, Coues, *Amer. Nat.* VIII, p. 563. — Nicaragua?

8012. PARELLINA (Licht.), in Bp., *Consp.* I, p. 502; Baird, *B. N. Amer.*, p. 502, pl. 56, f. 1; Sharpe, *l. c.*, p. 69. — Mexique, Yucatan N.

2035. *Var.* INDIGOTICA, Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 447. — Mexique W.

8013. CHIAPENSIS, Nels., *Pr. Biol. Soc. Wash.* XII, p. 61. — Chiapas (Mexique).

8014. CYANEA (Lin.); Vieill., *Ois. Chant.*, pl. 64; Scl., *Cat. Am. B.*, p. 101; *brissonii*, Licht.; *minor*, Cab., *J. f. O.*, 1861, p. 4. — Amérique mérid. trop.

2036. *Var.* ARGENTINA, Sharpe, *Cat. B.* XII, p. 73. — République Argentine.

8015. CYANOIDES (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1847, p. 74; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1864, p. 552; Sharpe, *l. c.*, p. 73. — Vénézuéla E., Guyane, Bas-Amazone.

2037. *Var.* CYANESCENS (Ridgw.), *Auk*, 1898, p. 229; *cyanoides* (pt.), auct. plur. (nec Lafr.) — De Panama à l'Ecuador et Vénézuéla W.

2038. *Var.* SANCTÆ-MARTÆ (Bangs), *Pr. Biol. Soc. Wash.* XII, p. 139. — Santa-Marta (Col.)

8016. CONCRETA (Du Bus), *Bull. Acad. Brux.* XXII, 1855, p. 150; Scl., *P. Z. S.*, 1859, p. 378; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Amer.* I, p. 343. — Amérique centr. Mexique S.

8017. GLAUCOCÆRULEA (d'Orb.), *Voy. Am. mér.*, *Ois.*, pl. 50, f. 2; Sharpe, *l. c.*, p. 75. — Brésil, Argentine.

8018. ROTHSCHILDII, Bartl., *Ann. N. H.* VI, p. 168. — Guyane anglaise.

Digitized by Google

## 1140. ORYZOBORUS

*Oryzoborus*, Cab. (1851).

8019. TORRIDUS (Scop.), *Ann.* I, p. 140; Burm., *Th. Bras.* III, p. 238; *angolensis*, Lin.; *ruficentris*, Bon. et Vieill.; *nasuta*, Spix, *Av. Bras.* II, p. 43, pl. 58, ff. 1, 2; *magnirostris*, Sw. — Brésil, Amaz., Guyane, Vénéz., Ecuador.

2039. *Var.* MAJOR, Dubois, *Mém. Soc. Zool. de France*, 1894, p. 402. — ?

8020. CRASSIROSTRIS (Gm.); Scl., *Cat. Am. B.*, p. 102; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 348; *ater*, Cab.; *melas*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1867, p. 979; *occidentalis*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1879, p. 506 (nec Scl., 1860). — Amazone, Guyane, Vénézuéla, Colombie.

8021. MAXIMILIANI, Cab., *Mus. Hein.* I, p. 151; Burm., *Th. Bras.* III, p. 238; *crassirostris*, Max., *Beitr. Nat. Bras.* III, p. 564. — Brésil S.

8022. OCCIDENTALIS, Scl., *P. Z. S.*, 1860, p. 276; Sharpe, *l. c.*, p. 80. — Colombie, Ecuador.

2040. *Var.* NUTTINGI, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1884, p. 401; ? *othello*, Bp., *Consp.* I, p. 498. — Nicaragua.

8023. FUNEREUS, Scl., *P. Z. S.*, 1859, p. 378; id., *Cat. Amer. B.*, p. 102; *æthiops*, Scl., *P. Z. S.*, 1860, pp. 88, 276; *salvini*, Ridgw. — Amér. centr., du Mex. à l'Ecuador.

8024. ATRIROSTRIS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1878, p. 136; Sharpe, *l. c.*, p. 81. — Pérou.

## 1141. LOXIGILLA

*Loxigilla*, Less. (1831); *Pyrrhulagra*, Bp. (1850); *Loxipasser*, Bryant (1866); *Scotospiza*, Sundev. (1869); *Melanospiza*, Ridgw. (1898).

8025. VIOLACEA (Lin.); Sharpe, *l. c.*, p. 83; *ruficollis*, Gm.; *superciliosa*, Vieill.; *aurantiicollis*, V., *Gal. Ois.* I, p. 62, pl. 55; *rufobarbata*, Hahn et K.; *affinis*, Ridgw. — Jamaïque, St-Domingue.

2041. *Var.* BAHAMENSIS, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1878, p. 250; Cory, *B. Bahamas*, p. 69. — Iles Bahama.

8026. NOCTIS (Lin.); *Pl. Enl.* 201, f. 1; Scl., *Cat. Am. B.*, p. 102; *rufifarbata*, Jacq.; *martinicensis*, Gm.; *haitii*, Ric.; *robinsonii*, Gosse, *B. Jam.*, p. 239. — Petites Antilles.

2042. *Var.* SCLATERI, Allen, *Bull. Nutt. Orn. Club*, 1880, p. 166; *richardsoni*, Cory. — Ste-Lucie.

2043. *Var.* GRENADENSIS, Cory, *Cat. W. Ind. B.*, p. 150. — Grenade et St-Vincent.

2044. *Var.* DOMINICANA, Ridgw., *Auk*, 1898, p. 323. — Petites Antilles.

2045. *Var.* CRISSALIS, Ridgw., *Auk*, 1898, p. 323. — St-Vincent.

Digitized by Google

2046. *Var.* Ridgwayi, Cory, *Cat. W. Ind. B.*, p. 150. Dominique et îles voisines au N.

2047. *Var.* Coryi, Ridgw., *Auk*, 1898, p. 525. St-Eustat., St-Christ.

2048. *Var.* Barbadensis, Cory, *Cat. W. Ind. B.*, p. 150. Barbade.

2049. *Var.* Propinqua, Lawr., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1878, p. 58. Guyane.

8027. chazaliei, Oust., *Bull. Soc. Zool. de Fr.*, 1895, p. 184. Barbade.

8028. anoxantha (Gosse), *B. Jamaica*, p. 247, pl. 62; Scl., *P. Z. S.*, 1861, p. 74. Jamaïque.

8029. portoricensis (Daud.), *Traité*, II, p. 411; Cory, *B. W. Ind.*, p. 12; Sharpe, *l. c.*, p. 87. Porto-Rico.

2050. *Var.* Grandis, Lawr., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1881, p. 204. Ile St-Christophe.

## 1142. NEORHYNCHUS

*Callirhynchus*, Bp. (1856, nec Less. 1842); *Neorhynchus*, Scl. (1869).

8030. nasesus (Bp.), *Compt. Rend.*, XLII, 1856, p. 822; Scl., *P. Z. S.*, 1869, p. 147, pl. 12. Pérou.

2051. *Var.* Devronis (Verr.), *Rev. et Mag. de Zool.*, 1852, p. 515; *drovoni*, Bp.; *nasesus*, Berl. et Tacz., *P. Z. S.*, 1883, p. 550. Ecuador.

## 1143. PIEZORHINA

*Piezorhina*, Lafr. (1843).

8031. cinerea, Lafr., *Mag. de Zool.*, 1843, pl. 20; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 23; Sharpe, *l. c.*, p. 89. Pérou.

## 1144. SPERMOPHILOPSIS

*Drepanorhynchus*, Dubois (1894, nec Fisch. et Rchw., 1884); *Spermophilopsis*, Rothsch. (1895).

8032. schistaceus (Dubois), *Mém. Soc. Zool. de France*, 1894, p. 400, pl. 10, f. 2. Brésil.

8033. falcirostris (Tem.), *Pl. Col.* 2, f. 2; Dubois, *l. c.*, p. 401. Brésil.

8034. superciliaris (Pelz.), *Orn. Bras.*, pp. 223, 330; Berl. et Her., *Zeitschr. Ges. Orn.*, 1885, p. 122, pl. 7; Dubois, *l. c.*, pl. 10, f. 3; *euleri*, Cab. Brésil.

8035. ?frontalis (Verr.), *N. Arch. Mus.* V, *Bull.*, p. 15, pl. 1, f. 1 (1869). ?

## 1145. SPERMOPHILA

*Spermophila*, Sw. (1827); *Sporophila*, Cab. (1844); *Gyrinorhynchus* (Rchb., 1850).

8036. albigularis (Spix), *Av. Bras.* II, p. 46, pl. 60, ff. 1, 2; Sharpe, *l. c.*, p. 95. Brésil.

Digitized by Google

8037. HYPOLEUCA (Licht.), *Verz. Doubl.*, p. 26; Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 223, 437; *cinereola*, Tem., *Pl. col.* 11, f. 1; *rufirostris*, Max. — Brésil.

8038. GRISEA (Gm.); Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Amer., Aves*, I, p. 356; *intermedia*, Cab.; *cinerea, schistacea*, Lawr.; *plumbea*, Scl. (nec Max.) — Guyane, Vénéz., Col., Trinidad, Panama.

8039. PLUMBEA (Max.), *Beitr. Naturg. Bras.* III, p. 579; Burm., *Th. Bras.* III, p. 242; *cinerea*, d'Orb. et Lafr., *Mag. de Zool.*, 1837, p. 87. — Brésil, Bolivie.

2052. *Var.* WHITELEYANA, Sharpe, *Cat. B.* XII, p. 98; *plumbea*, Salv., *Ibis*, 1885, p. 215. — Guyane anglaise.

2053. *Var.* COLUMBIANA, Sharpe, *l. c.*, p. 99; *plumbea*, Salv. et Godm., *Ibis*, 1880, p. 122. — Colombie.

8040. SIMPLEX, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, pp. 132, 519; id., *Orn. Pér.* III, p. 16. — Pérou.

8041. OBSCURA, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, p. 519; id., *Orn. Pér.* III, p. 17; *ornata* (fem.), Salv., *Ibis*, 1880, p. 353. — Du Pérou à l'Argentine W.

8042. PAUPER, Berl. et Tacz., *P. Z. S.*, 1883, p. 550; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 18; *obscura*, Tacz., *P. Z. S.*, 1880, p. 199. — Ecuador, Pérou.

8043. TELASCO (Less.), *Voy. Coq.* I, p. 665, pl. 15, f. 3; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 14; Sharpe, *l. c.*, p. 102; *alaudina*, d'Orb. et Lafr. — Pérou W., Ecuador.

8044. CASTANEIVENTRIS (Cab.), in *Schomb. Reis. Guian.* III, p. 679; Tacz., *l. c.* III, p. 12; Sharpe, *l. c.*, p. 108. — Guyane, Amazone, Colombie, Pérou.

8045. MINUTA (Lin.); *Pl. Enl.* 319, f. 3; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am., Aves*, I, p. 351; *fusciventer*, Bodd. — Panama, Col., Vénéz., Guyane, Trinidad, Tobago, Para.

8046. RICHARDSONI, Salv. et Godm., *Ibis*, 1891, p. 611. — Mexique S., Guatém.

8047. CINNAMOMEA (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1839, p. 99; Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 226, 438; Scl., *Ibis*, 1871, p. 20. — Brésil.

8048. HYPOXANTHA (Cab.), *Mus. Hein.* I, p. 150; Pelz., *l. c.*, p. 225; *minuta*, d'Orb. et Lafr. (nec Lin.) — Brésil.

8049. ?RUFICOLLIS (Licht.), in Cab., *Mus. Hein.* I, p. 150; Pelz., *l. c.*, p. 225. — Brésil.

8050. PALUSTRIS, Barr., *Bull. Nutt. Orn Club*, 1881, p. 92; Sharpe, *l. c.*, p. 112, pl. 2. — République Argentine.

8051. PLUMBEICEPS, Salvad., *Boll. Mus. Torino*, X (1895), n° 208, p. 5. — Tucuman.

8052. NIGROAURANTIA (Bodd.), *Tabl. Pl. Enl.*, p. 12; *Pl. Enl.* 204, f. 1; Scl., *Ibis*, 1871, p. 4; *bourbonensis*, P. Müll.; *aurantia*, Gm.; *pyrrhomelas*, Bon. et Vieill.; *brevirostris*, Spix, *Av. Bras.* II, p. 47, pl. 59, ff. 1, 2; *capistrata*, Vig.; *fraterculus*, Cuv. (pt.); *rubiginosa*, Sw. — Brésil S.

8053. NIGRORUFA (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1837 — Bolivie, Brésil S.

Digitized by Google

(*Syn. Av.*, p. 87); Pelz., *l. c.*, p. 226; Scl., *Ibis*, 1871, p. 6, pl. 1, ff. 1, 2.

8054. PILEATA (Natt. *MS.*); Scl., *P. Z. S.*, 1864, p. 607; Sharpe, *l. c.*, p. 115; *fraterculus* (pt.), Cuv.; *mitrata*, Licht.; *alaudina*, Burm. (nec d'Orb.) — Brésil.

8055. COLLARIA (Lin.); Scl., *Ibis*, 1871, p. 9; *cucullata*, Bodd.; Pelz., *l. c.*, pp. 225, 437; ?*americana*, Gm.; *pectoralis*, Lath.; *atricapilla*, Max. — Brésil N., Guyane.

2054. *Var.* POLIONOTA, Sharpe, *l. c.*, p. 118; *collaria*, Burm. (*nec* Lin.); *atricapilla*, Pelz. (*nec* Max.) — Brésil.

8056. MELANOCEPHALA (Vieill.), *N. Dict.* XIII, p. 542; Sharpe, *l. c.*, p. 118; *lafresnayi*, Bp., *Consp.* I, p. 496. — Brésil S., Bolivie, Paraguay, Argentine.

8057. TORQUEOLA, Bp., *Consp.* I, p. 495; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 351; *ochropyga*, Licht.; *atriceps*, Gray. — Mexique.

8058. ALBITORQUIS, Sharpe, *Cat. B.* XII, p. 120. — Mexique.

8059. OPHTHALMICA, Scl., *P. Z. S.*, 1860, pp. 276, 293; Sharpe, *l. c.*, p. 120. — Ecuador.

8060. LINEATA (Gm.); Scl., *Cat. Am. B.*, p. 104; Pelz., *l. c.*, p. 438; *leucoptera*, Vieill.; *misya*, V., *Ois. Chant.*, pl. 46; *leucopterygia*, Spix, *Av. Bras.* II, p. 45, pl. 58, f. 3. — Guyane, Amazone.

8061. ÆQUATORIALIS, Salvad. et Festa, *Boll. Mus. Zool. Torino*, n° 357, X, p. 24. — Ecuador.

8062. MORELLETI, Bp., *Consp.* I, p. 497; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 352 (pt.); Shpe, *l. c.*, p. 123. — Yucat., Guatém., Honduras, ? Costa-Rica.

2055. *Var.* PARVA, Lawr., *Ann. N. Y. Acad. Sc.*, 1883, p. 381; Sharpe, *l. c.*, p. 124; *morelleti* (pt.), auct. plur. (nec Bp.) — Texas, Mexique.

2056. *Var.* LEUCOPSIS, Cab., *J. f. O.*, 1861, p. 5; Scl., *Ibis*, 1871, p. 20. — Costa-Rica.

8063. CÆRULESCENS (Bon. et Vieill.), *Encycl. méth.* III, p. 1023; *nigricollis*, Bon. et V., *l. c.*, p. 1027; *ornata*, Licht.; Pelz., *l. c.*, pp. 224, 438; *leucopogon*, Max.; *nigrogularis*, Gould. — Brésil S., Paraguay, Argentine, Bolivie.

8064. CABOCLINHO (Natt.), in Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 224, 331; Scl., *Ibis*, 1871, p. 19. — Brés. (Rio-de-Janeiro).

8065. MELANOPS, Pelz., *l. c.*, pp. 224, 331; Scl., *Ibis*, 1871, p. 21. — Brésil.

8066. MELANOGASTER, Pelz., *l. c.*, pp. 225, 332; Scl., *Ibis*, 1871, p. 21. — Brésil.

8067. ARDESIACEA, Dubois, *Mém. Soc. Zool. de France*, 1894, p. 399, pl. 10, f. 1. — Brésil.

8068. GUTTURALIS (Licht.), *Verz. Doubl.*, p. 26; Tacz., *Orn. Pérou*, III, p. 13; ?*crispa*, Lin.; *ignobilis* et *plebeja*, Spix, *Av. Bras.*, p. 46, pl. 39, f. 3 et 60, f. 3; — Amérique mérid. trop.

Digitized by Google

*melanocephala,* Max.; *olivaceoflava,* Lafr.; *gutturalis pallida,* Berl.

8069. OCELLATA, Scl. et Salv., *P. Z. S.,* 1866, p. 181; id., *Ibis,* 1871, p. 14, pl. 2, f. 3. — Guyane, Vénézuéla, Colombie, Pérou.

8070. LINEOLA (Lin.); Pelz., *l. c.,* pp. 224, 438; *crispa,* P. Müll.; Vieill., *Ois. Ch.,* p. 76, pl. 47; *bouvronoides,* Less., *Tr. d'Orn.,* p. 450. — Guyane, Vénézuéla, Bahia.

2057. *Var.* TRINITATIS, Sharpe, *Cat. B.* XII, p. 132. — Trinidad.

2058. *Var.* AMAZONICA, Sharpe, *l. c.* — Amazone.

8071. AURITA, Bp., *Consp.* I, p. 497; Scl., *Ibis,* 1871, p. 14, pl. 2, ff. 1, 2; *hoffmanni,* Cab., *J. f. O.,* 1861, p. 6; *semicollaris, hicksi, fortipes* et *collaris,* Lawr. — Amérique centrale du Guatém. à Panama.

8072. LUCTUOSA, Lafr., *Rev. Zool.,* 1843, p. 291; Scl., *P. Z. S.,* 1855, p. 160; Tacz., *Orn. Pérou,* III, p. 10; Sharpe, *l. c.,* p. 135. — Colombie, Ecuador, Pérou, Bolivie.

8073. CORVINA, Scl., *P. Z. S.,* 1859, p. 379; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 355; *badiiventris,* Lawr.; Baird, *Trans. Chicago Acad.,* 1869, p. 319, pl. 28, f. 3. — Amérique centrale du Mex. au Costa-Rica.

8074. BICOLOR (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.,* 1837 (*Syn. Av.,* p. 86); d'Orb., *Voy. Am. mér. Ois.,* pl. 50, f. 1; Sharpe, *l. c.,* p. 138. — Bolivie.

## 1146. CATAMENIA

*Catamenia,* Bp. (1850).

8075. INORNATA (Lafr.), *Rev. Zool.,* 1847, p. 75; Sharpe, *l. c.,* p. 104; *rufirostris,* Landb., *J. f. O.,* 1865, p. 404; *homochroa,* Berl. et Tacz. (nec Scl.) — Bolivie, Pérou.

2059. *Var.* ÆQUATORIALIS, Dubois, *Mém. Soc. Zool. de France,* 1894, p. 401. — Ecuador.

8076. HOMOCHROA, Scl., *P. Z. S.,* 1858, p. 552; Sharpe, *l. c.,* p. 105. — Pérou N., Ecuador.

8077. ANALIS (d'Orb.), *Voy. Am. mér.,* p. 364, pl. 48, f. 1; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 19. — Pérou, Bolivie, Argentine.

2060. *Var.* ANALOIDES (Lafr.), *Rev. Zool.,* 1847, p. 75; Tacz., *l. c.,* p. 20; *analis,* auct. plur. (nec d'Orb.) — Colombie, Ecuador, Pérou, Bolivie.

## 1147. DOLOSPINGUS

*Dolospingus,* Elliot (1871).

8078. NUCHALIS, Elliot, *Ibis,* 1871, p. 402, pl. 11. — Orinoco.



Digitized by Google

## 1148. MELOPYRRHA

*Melopyrrha*, Bp. (1853).

8079. NIGRA (Lin.); Vieill., *Gal. Ois.* I, p. 65, pl. 57; d'Orb., in *Ram. de la Sagra, Hist. nat. Cuba*, p. 87, pl. 18; *crenirostris*, Vieill., *Ois. Chant.*, p. 77. — Cuba.

8080. TAYLORI, Hart., *Novit. Zool.* III, p. 257. — Gr. Caïman.

## 1149. CATAMBLYRHYNCHUS

*Catamblyrhynchus*, Lafr. (1842); *Bustamentia*, Bp. (1844).

8081. DIADEMA, Lafr., *Rev. Zool.*, 1842, p. 301; id., *Mag. de Zool.*, 1843, pl. 34; Gray, *Gen. B.* II, pl. 95; *capitaurea*, Bp. — Colombie, Ecuador, Pérou N.

2061. *Var.* CITRINIFRONS, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1896, p. 350. — Pérou central.

## 1150. PHONIPARA

*Phonipara*, Bp. (1850); *Euetheia*, Rchb. (1850).

8082. CANORA (Gm.); Brown, *Ill. Zool.*, pl. 24, f. 1; Sharpe, *l. c.*, p. 144. — Cuba.

8083. LEPIDA (Jacq.), *Beitr.*, p. 7, pl. 2; *olivacea*, Gm.; d'Orb., *Hist. nat. Cuba*, p. 24, pl. 15; *adoxa*, Gosse, *B. Jam.*, p. 253, pl. 65. — Grandes Antilles.

2062. *Var.* PUSILLA (Sw.), *Phil. Mag.*, 1827, p. 438; Scl., *P. Z. S.*, 1855, p. 159; *lepida*, Licht. (nec Jacq.); *intermedia*, Ridgw. — Mexique, Amér. centr., Colombie, Cozumel.

2063. *Var.* CORYI, Ridgw., *Auk*, 1898, p. 322. — Ile Caïman.

2064. *Var.* BRYANTI, Ridgw., *Auk*, 1898, p. 322. — Porto-Rico.

8084. BICOLOR (Lin.); A. et E. Newt., *Ibis*, 1859, pp. 147, 376, pl. 12, f. 2; *var. portoricensis*, Bryant; *zena*, Baird, Br. et Rid.; Mayn., *B. East. N. Am.*, p. 87, pl. 2. — Petites Antilles (? Vénéz., Colombie).

2065. *Var.* MARCHII, Baird, *Pr. Philad. Acad.*, 1865, p. 297; *bicolor*, Gosse (nec L.), *B. Jam.*, pl. 64. — Jamaïque, St-Domingue, etc.

2066. *Var.* SHARPEI (Hart.), *Bull. B. O. C.* VII, p. 37. — Arub., Curaç., Bonaire.

2067. *Var.* OMISSA (Jard.), *Ann. Nat. Hist.*, 1847, p. 322; Scl., *Cat. A. B.*, p. 106; *bicolor* (pt.), Sharpe. — Vénézuéla, Colombie ?

8085. GRANDIOR (Cory), *Auk*, 1887, IV, p. 243. — Vieille-Providence.

8086. FULIGINOSA (Max.), *Beitr. Nat. Bras.* III, 1, p. 629; Cab., *J. f. O.*, 1874, p. 85; *unicolor*, Licht.; Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 222, 329; *fumosa*, Lawr.; *phæoptila*, Salv. et Godm., *Ibis*, 1884, p. 443. — Guyane, Brésil.

Digitized by Google

## 1151. VOLATINIA

*Volatinia*, Rchb. (1850).

8087. JACARINI (Lin.); Vieill., *Ois. Chant.*, pl. 33; *jacarina*, Bp.; Burm., *Th. Bras.* III, p. 234; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 25. — Brésil, Bolivie, Pérou.

2068. *Var.* SPLENDENS (Vieill.), *N. Dict.* XII, p. 175; Bp., *Consp.* I, p. 474; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 357. — Amérique centr., Colombie, Ecuador.

## 1152. AMAUROSPIZA

*Amaurospiza*, Cab. (1861).

8088. CONCOLOR, Cab., *J. f. O.*, 1861, p. 3; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 350. — Costa-Rica, Panama.

2069. *Var.* ÆQUATORIALIS, Sharpe, *Cat. B.* XII, p. 157. — Ecuador.

8089. CÆRULATRA, Cab., *J. f. O.*, 1866, p. 306; *axillaris*, Sharpe, *l. c.*, p. 157. — Brésil.

8090. ?FRINGILLOIDES (Pelz.), *Orn. Bras.*, p. 329; ?*cærulatra*, fem. — Brésil.

## 1153. PYRRHULOXIA

*Pyrrhuloxia*, Bp. (1850).

8091. SINUATA (Bp.), *P. Z. S.*, 1837, p. 111; id., *Consp.* I, p. 500; Cass., *B. Calif.*, p. 204, pl. 33; *beckhami*, Ridgw., *Auk*, 1887, p. 347. — États-Unis S.-W., Mexique.

2070. *Var.* PENINSULA, Ridgw., *Auk*, 1887, p. 347. — Basse-Californie.

2071. *Var.* TEXANA, Ridgw., *Auk*, 1897, p. 75. — Texas.

## 1154. CARDINALIS

*Cardinalis*, Bp. (1837).

8092. RUBER (Scop.), *Ann.* I, p. 139; Stejn., *Auk*, 1884, p. 172; *cardinalis*, Lin.; Wils., *Am. Orn.* II, p. 38, pl. 11, ff. 1, 2; *virginianus*, Bp., *P. Z. S.*, 1837, p. 111. — États-Unis E.

2072. *Var.* COCCINEA, Baird, Br. et Ridgw., *Hist. N. Am. B.* II, p. 299; *virginianus* (pt.), auct. plur.; *saturatus*, Ridgw. — Mexique E., Honduras, Cozumel.

2073. *Var.* IGNEA, Baird, *Pr. Phil. Acad.*, 1859, p. 305; Ell., *New and Unfig. B. N. Am.*, pl. 4; *affinis* et *sinaloensis*, Nels. — Basse-Calif., Mexique N.-W.

2074. *Var.* SUPERBA, Ridgw., *Auk*, 1886, p. 334. — Arizona, Mexique W.

Digitized by Google

2075. *Var.* CARNEA (Less.), *Rev. Zool.*, 1842, p. 210; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 341. — Mexique W.

2076. *Var.* CANICAUDA, Chapm., *Bull. Am. Mus. N. H.* III, p. 323. — Texas.

2077. *Var.* YUCATANICA, Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 443; *littoralis*, Nels. — Yucatan.

2078. *Var.* FLORIDANA, Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 606. — Floride.

2079. *Var.* MARIÆ, Nels., *Pr. Biol. Soc. Washing.* XII, p. 10. — Iles Tres Marias.

8093. BERMUDIANUS, Bangs et Brad., *Auk*, 1901, p. 256. — Iles Bermudes.

8094. PHŒNICEUS, Bp., *P. Z. S.*, 1837, p. 111; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, pl. 63. — Vénézuéla, Trinidad, Colombie.

2080. *Var.* ROBINSONI, Richm., *Auk*, 1895, p. 370. — Ile Margarita (Vénéz.)

### 1155. GUBERNATRIX

*Gubernatrix*, Less. (1837); *Lophocoryphus*, Gray (1840).

8095. CRISTATA (Vieill.), *N. Dict.* XIII, p. 551; Sharpe, *l. c.*, p. 815; *gubernatrix*, Tem., *Pl. col.*, 63, 64; *cristatella*, Bon. et Vieill. — Paraguay, Argentine, Patagonie N.

## SUBF. IV. — EMBERIZINÆ

### 1156. UROCYNCHRAMUS

*Urocynchramus*, Prjev. (1877).

8096. PYLZOWI, Prjev., in *Rowl. Orn. Misc.* II, p. 309, pl. 7; Gould, *B. Asia*, V, pl. 52; Sharpe, *l. c.*, p. 472. — Chine W.

### 1157. EMBERIZA

*Emberiza*, Briss. (1760); *Cynchramus*, Boie (1826); *Citrinella*, *Orospina*, *Cia*, *Spina*, *Cirlus*, Kaup (1829); *Ocyris*, Hodgs. (1844); *Schœnicola*, Bp. (1850); *Glycispina*, *Polymitra*, *Hypocentor*, Cab. (1850); *Granativora*, *Onychospina*, *Buscarla*, Bp. (1857); *Hylæspiza*, Blas (1862); *Pyrrhulorhyncha*, Gigl. (1865).

8097. PALUSTRIS, Savi, *Orn. Tosc.* II, p. 91; Roux, *Orn. Prov.*, pl. 114[bis]; Gould, *B. Eur.* III, pl. 182; *intermedia* (Michah.), Bp., *Rev. crit.*, p. 164; *pyrrhuloides*, Bp. et auct. plur. (nec Pall.); *schœniclus* (pt.), Dress. — Europe mérid.

8098. PYRRHULOIDES, Pall., *Zoogr. Rosso-Asiat.* II, p. 49; Dress., *B. Eur.* IV, p. 249, pl. 222, ff. 2, 3; *caspia*, Ménétr.; *schœniclus*, *var. pyrrhuloides*, Seeb. — Astrakhan, Turkestan, Yarkand, Sibérie S.-W.

8099. PYRRHULINA (Swinh.), *Ibis*, 1876, p. 333, pl. 8, f. 2; Sharpe, *l. c.*, p. 475; *palustris*, Seeb., Blakist. (nec Savi). — Japon.

Digitized by Google

8100. SCHOENICLUS, Lin.; Dress., *B. Eur.* IV, p. 241, pl. 221, 222, f. 1; Dubois, *Fne ill. Vert. Belg., Ois.* I, p. 556, pl. 130; *arundinacea*, Gm.; *stagnatilis*, etc., Brm.; *schœnicola*, Hume; *tschusii*, Reis. et Olm. — Europe et Asie jusqu'au 70° l. N., Kamtsch., au S. jusqu'au 20° l. N.

8101. PASSERINA, Pall., *Reis. Russ. Reichs*, I, *App.*, p. 456; Seeb., *Ibis*, 1879, p. 39, pl. 1, f. 1; *pallasii*, Cab.; *polaris* et *var. minor*, Midd.; *canescens*, Swinh.; *alleonis*, Vian; *schœniclus*, *var. passerinus*, Seeb. — Sibérie E. jusqu'au Iénisseï, Turkestan, Mongolie, Chine N.

8102. YESSOENSIS (Swinh.), *Ibis*, 1874, p. 161; Seeb., *Ibis*, 1879, p. 39, pl. 1, f. 2; *minor*, Blakist. — Japon.

8103. PUSILLA, Pall., *Reis. Russ. Reichs*, III, p. 697; Dress., *B. Eur.* IV, p. 235, pl. 220; Dubois, *Fne ill., Ois.* I, p. 561, pl. 130[b]; *durazzii*, Bp., *Faun. Ital. Ucc.*, pl. 36, f. 1; *oinops*, Hodgs., *Icon ined., Passeres*, pl. 292, ff. 1, 2. — Europe N.-E., accid. centr., Asie du 70° l. N. à l'Himal. et jusqu'à l'Indo-Chine en hiver.

8104. RUSTICA, Pall., *Reis. Russ. Reichs*, III, p. 698; Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, pl. 58; Dress., *B. Eur.* IV, p. 229, pl. 219; *provincialis*, Gm.; *lesbia*, Tem. (nec Gm.); *borealis*, Zett. — Nord de l'Europe et de l'Asie jusqu'en Chine, Japon.

8105. FUCATA, Pall., *Reise*, III, p. 698; Tem. et Schl., *F. J.*, pl. 57; Gould, *B. Asia*, V, pl. 9; *lesbia*, Gm. — Sibérie E., Japon, Chine, Indo-Chine, Himalaya, Inde.

8106. ELEGANS, Tem., *Pl. col.* 583; Tem. et Schl., *F. J.*, pl. 55; *elegantula*, Swinh., *P. Z. S.*, 1870, p. 134. — Sibérie E., Japon, Chine.

8107. CHRYSOPHRYS, Pall., *Reise*, III, Anh., p. 698; id., *Zoogr.* II, p. 46, pl. 48, f. 2; Dress., *B. Eur.* IV, p. 193, pl. 212; Dav. et Oust., *Ois. Ch.*, p. 325. — Sibérie E.

8108. FLAVIVENTRIS (Bon. et Vieill.), *Enc. méth.* II, p. 929; Sharpe, *l. c.*, p. 499 (pt.); *capensis*, Sw., *B. W. Afr.* I, p. 111, pl. 18. — Afrique S. jusqu'au 10° l. S.

2081. *Var.* FLAVIGASTRA, Rüpp., *Atlas*, p. 38, pl. 23; *quinquestriata*, Licht.; *xanthogastra*, *albicollis*, Pr. Würt. — Afrique N.-E.

2082. *Var.* AFFINIS (Pr. Würt.) in Heugl., *J. f. O.*, 1867, p. 277; *flaviventris* (pt.), auct. plur. — Afrique W. et N.-E.

8109. POLIOPLEURA (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Genov.*, 1888, p. 269. — Abyss., Choa, Somali.

8110. FORBESI (Hartl.), *Orn. Centralbl.*, 1882, p. 92; id., *J. f. O.*, 1882, p. 324. — Afrique équat.

8111. MAJOR (Bocage), *Orn. Angola*, p. 559 (1881); Cab., *J. f. O.*, 1880, p. 349, pl. 2, f. 2; *cabanisi*, Boc. (nec Rchw.), *l. c.*, p. 371. — Angola.

2083. *Var.* ORIENTALIS, Shell., *P. Z. S.*, 1882, p. 308; Sharpe, *l. c.*, p. 502. — Afrique E.

2084. *Var.* CABANISI (Rchw.), *J. f. O.*, 1875, p. 233, pl. 2, ff. 2, 3; *flaviventris*, Rchw. (nec V.), *J. f. O.*, 1875, p. 42. — Caméron et Afrique équat.

Digitized by Google

8112. MELANOCEPHALA, Scop., *Ann.* I, p. 142; Naum., *Vög. Deutschl.* IV, pl. 101, f. 2; Dress., *B. Eur.* IV, p. 151, pl. 206; *melanictera*, Güld.; *crocea*, Vieill., *Ois. Ch.*, pl. 27; *caucasicus*, Pall.; *granativora*, Mén.; *simillima*, Blyth; *atricapilla*, Brm. — Europe S.-E., Allemagne S., France, Asie S.-W. jusqu'à l'Inde centr.

8113. LUTEOLA, Sparrm., *Mus. Carls.* IV, pl. 95; Jerd., *B. Ind.* II, p. 378; Sharpe, *l. c.*, p. 506; *icterica*, Eversm., *Add. Pall. Zoogr.* II, pl. 10; Gray, *Gen. B.*, pl. 91; *brunneiceps*, Brandt. — Sibérie, Asie S.-W. et centr. jusqu'à l'Inde.

8114. AUREOLA, Pall., *Reis. Russ. Reichs*, II, p. 711; id., *Zoogr.*, pl. 50; Dress., *B. Eur.* IV, p. 223, pl. 218; *collaris*, Vieill.; *flavicollis*, Mc Clel.; *dolichonia*, Bp.; *selysii*, Verany; *flavogularis*, Blyth; *flavocollaris*, Gr. — Europe N., Sibérie, Asie centr., Chine jusqu'à Malacca.

8115. RUTILA, Pall., *Reis. Russ. Reichs*, III, p. 698; Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, pl. 56[b]; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 531. — Sibérie E., Japon, Himal. S.-E., Chine, Indo-Chine.

8116. CITRINELLA, Lin.; Dress., *B. Eur.* IV, p. 171, pl. 209; Dubois, *Fne ill., Ois.* I, p. 544, pl. 126; *sylvestris, major*, etc., Brm.; *brehmii*, Hom. — Europe, Sibérie W.

2085. *Var.* MOLESSONI, Poph., *Ibis*, 1901, p. 453, pl. 10, f. 1. — Jénisséï.

2086. *Var*, CORSICA, Kg., *Orn. Monatsb.* VII, p. 120. — Corse.

8117. SULPHURATA, Tem. et Schl., *Fauna Jap.*, p. 100, pl. 60; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 530; Sharpe, *l. c.*, p. 519. — Chine, Japon.

8118. PERSONATA, Tem., *Pl. Col.* 580; Tem. et Schl., *F. J.*, pl. 59[b]; Sharpe, *l. c.*, p. 521. — Japon, Chine.

8119. SPODOCEPHALA, Pall., *Reis. Russ. Reichs*, III, p. 698; Schr., *Reis. Amurl.*, p. 142, pl. 12, ff. 5-8; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 529; *sordida vel chlorocephala*, Hodgs.; *melanops*, Blyth. — Sibérie à l'E. du Jénisséï, Japon, Chine, Himal. E., Assam, Manipour.

8120. CIRLUS, Lin.; Dress., *B. Eur.* IV, p. 177, pl. 210; Dubois, *Fne. ill., Ois.* I, p. 547, pl. 127; *elæothorax*, Bechst. — Europe mér. et centr., Asie Mineure.

8121. CINEREA, Strickl., *P. Z. S.*, 1852, p. 99; Gould, *B. Asia*, V, pl. 8; Dress., *B. Eur.* IV, p. 159, pl. 207; *cineracea*, Brm. — Asie Mineure jusqu'en Perse.

8122. HORTULANA, Lin.; Dress., *l. c.* IV, p. 185, pl. 211; Dubois, *l. c.* I, p. 555, pl. 129; *moelbyensis*, Sparrm.; *chlorocephala, badensis*, Gm.; *tunstalli*, Lath.; *pinguescens*, Brm.; *shah*, Bp. — Europe jusqu'au Cercle polaire, Asie W., Afrique N. et N.-E.

8123. BUCHANANI, Blyth, *J. A. S. Beng.* XIII, p. 957; *huttoni*, Blyth, *l. c.* XVIII, p. 811; *cerrutii*, De Fil.; Gould, *B. Asia*, V, pl. 11. — Du Caucase à la Perse, Turkestan, Afghanistan, Inde W.

8124. CAESIA, Cretz. in *Rüpp. Atlas*, p. 17, pl. 10, f. *b*; — Eur. S.-E., Caucase,

Digitized by Google

Gould, *B. Eur.* III, pl. 181; Dress., *l. c.* IV, p. 213, pl. 216; *rufibarba*, Nordm. — Afr. N.-E., Arabie.

8125. CIA, Lin.; Dress., *B. Eur.* IV, p. 205, pl. 214; Dubois, *l. c.* I, p. 550, pl. 128; *barbata*, Scop.; *lotharingica*, Gm.; *meridionalis*, Cab. — Eur. mérid., Asie Min. jusqu'en Afghanist.

2087. *Var.* STRACHEYI, Moore, *P. Z. S.*, 1855, p. 215, pl. 112; Sharpe, *l. c.*, p. 539; *cia*, auct. plur. (nec Lin.) — Beloutchistan E. et Cachemire.

8126. GODLEWSKII, Tacz., *J. f. O.*, 1874, p. 330; Sharpe, *Cat. B.* XII, p. 542, pl. 12; *gigliolii*, Dyb (nec Swinh.) — Sibérie E. jusqu'au Kan-sou, Yarkand, Turkest., Cachem.

8127 CIOIDES, Brandt, *Bull. Acad. Sc. St-Pétersb.*, 1845, p. 363; Midd., *Sib. Reise*, p. 280; Sharpe, *l. c.*, p. 542; *cia* (pt.), Pall. (nec L.) — Sibérie.

2088. *Var.* CASTANEICEPS, Moore, *P. Z. S.*, 1855, p. 215; Sharpe, *l. c.*, p. 544; *gigliolii*, Swinh., *Ibis*, 1867, p. 393; *ciopsis*, Swinh. (nec Bp.) — Chine, Mongolie, Sibérie S.-E.

8128. CIOPSIS, Bp., *Consp.* I, p. 466; *cioides*, Tem et Schl. (nec Brt.), *Fauna Jap.*, p. 59, pl. 58. — Japon.

2089. *Var.* LIHMA, Stejn, *P. U. S. Nat. Mus.* XVI, p. 637. — Tsushima (Japon).

8129. JANKOWSKII, Tacz., *Ibis*, 1888, p. 317, pl. 8. — Oussouri.

8130. TRISTRAMI, Swinh., *Pr. Z. S.*, 1870, p. 441; Dav. et Oust., *Ois. Ch.*, p. 326; *stracheyi*, Swinh. (1862-1865); *quinquelineata*, David. — Chine.

8131. STEWARTI, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1854, p. 215; *caniceps*, Gould, *B. Asia*, V, pl. 6; *buchanani*, Bp. (nec Blyth). — Inde N.-W., Afghan., Turkestan.

8132. LEUCOCEPHALA, Gm., *N. Comm. Ac. Sc. Imp. Petrov.*, 1770, p. 480, pl. 23, f. 3; Dress., *B. Eur.* IV, p. 217, pl. 217; *pityornis*, Pall.; Gould, *B. Eur.* III, pl. 180; *esclavonicus*, Degl.; *albida*, Blyth; *bonapartii*, Barth.; *himalayensis*, Tytl. — Sibérie, Asie centr. jusque vers le 28° l.N.; accid. Europe.

## 1158. MILIARIA

*Emberiza* (pt.), auct. plur.; *Miliaria*, Brm. (1828); *Crithophaga*, Cab. (1850).

8133. EUROPÆA, Sw., *Classif. B.* II, p. 290; Dubois, *Fne ill.*, *Ois.* I, p. 540, pl. 125; *Emb. miliaria*, Lin.; Dress, *B. Eur.* IV, p. 163, pl. 208; *projer*, Müll.; *septentrionalis*, *minor*, etc., Brm, — Europe jusqu'au 62° l. N., Asie S.-W., Afrique N., Canaries, Egypte.

## 1159. FRINGILLARIA

*Fringillaria*, Sw. (1837); *Emberiza* (pt.), auct. plur.

8134. TAHAPISI (Smith), *Rep. S. Afr Exp.*, 1836, *App.*, — Afrique S. et W. jus-

Digitized by Google

p. 48; Sharpe, *l. c.*, p. 558; *rufa*, Sw.; *capistrata*, Cab.; *septemstriata*, Boc. (nec Rüpp.) — qu'au Gabon.

8135. SEPTEMSTRIATA (Rüpp.), *Neue Wirb. Vög.*, p. 86, pl. 30, f. 2; Fch. et Hartl., *Vög. Ost-Afr.*, p. 460; Hartl., *Orn. W.-Afr.*, p. 152. — Afrique N.-E. et de Sénégambie au Niger.

8136. STRIOLATA (Licht.), *Verz. Doublet.*, p. 24; Rüpp., *Atlas*, p. 15, pl. 10, f. a; Dress., *B. Eur.* IV, p. 197, pl. 213. — Arabie, Palest., Asie S.-W. jusqu'à l'Inde centr.

8137. SAHARÆ (Levaill. jun.), *Expl. scient. de l'Algérie, Ois.*, pl. 9bis, f. 2 (*sahari*); Tristr., *Ibis*, 1859, p. 295. — Algérie, Maroc.

8138. IMPETUANI (Smith), *Rep. S. Afr. Exp.*, 1836, *App.*, p. 48; Hartl., *Orn. W.-Afr.*, p. 152; Sharpe, *l. c.*, p. 563; *anthoides*, Sw. — Afrique S. jusqu'au Transv. et Angola.

8139. CAPENSIS (Lin.); *Pl. Enl.* 664, f. 1; Hartl., *Orn. W.-Afr.*, p. 152; *caffrariensis*, Steph.; *erythroptera*, Tem.; *vittata*, Sw. — Afrique S. jusqu'au Transvaal.

8140. INSULARIS, Grant et Forb., *Bull. Liverp. Mus.* II, p. 2. — Sokotra.

8141. SOCOTRANA, Grant et Forb., *l. c.* II, p. 2. — Sokotra.

8142. VARIABILIS (Tem.), *Pl. col.* 583, f. 2; id. et Schl., *Faun. Jap.*, pl. 56; *musica*, Kittl. — Sibérie E., Kamtschat., Japon.

## 1160. MELOPHUS

*Melophus*, Sw. (1837).

8143. MELANICTERUS (Gm.); Bp., *Consp.* I, p. 470; *erythroptera*, Jard. et Sel., *Ill. Orn.*, pl. 152; *cristata*, Vig.; *lathami*, Gray; *subcrista*, Sik.; *nipalensis*, Hodgs., *Asiat. Research.* XIX, p. 157. — Himalaya, Inde, Chine, Indo-Chine.

## 1161. PLECTROPHANES

*Plectrophanes*, B. Mey. (1822); *Plectrophenax*, Stejn. (1882); *Rhyncophanes*, Baird (1858).

8144. NIVALIS (Lin.); Dress., *B. Eur.* IV, p. 261, pl. 225; Dubois, *Fne Ill.*, *Ois.* I, p. 536, pl. 124, 124b; *notata*, Müll.; *mustelina*, *montana*, *lotharingica* (pt.), Gm.; *glacialis*, Lath.; *borealis*, etc., Brm. — Zone boréale et centr. entre le 45° et le 80½ l. N.

2090. *Var.* TOWNSENDI, Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 403. — Alaska, Kamtschatka et îles voisines.

8145. HYPERBOREUS (Ridgw.), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1884, p. 68; Sharpe, *l. c.*, p. 577. — Alaska.

8146. MACCOWNI, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1851, p. 122; Cass., *Ill. B. Calif.*, p. 228, pl. 39; Sharpe, *l. c.*, p. 589. — Amérique sept. au Sud jusqu'au Mexique.

Digitized by Google

## 1162. CALCARIUS

*Calcarius*, Bechst. (1803); *Centrophanes*, Kp. (1829); *Plectrophanes*, auct. plur.

8147. LAPPONICUS (Lin.); Bechst., *Orn. Taschenb.*, p. 150; Dress., *l. c.*, p. 253, pl. 225; Dubois, *l. c.* I, p. 532, pl. 123 et 123b; *calcarata*, Pall.; *montanus*, Leach; *groenlandicus*, Brm. — Zone boréale entre le 48° et le 70° l. N.

2091. *Var.* ALASCENSIS, Ridgw., *Auk*, 1898, p. 320. — Alaska, Iles Aléoutes.

2092. *Var.* COLORATA, Ridgw., *l. c.* — Kamtschat., Sibérie E.

8148. PICTUS (Sw. et Rich.), *Faun. bor. Am.*, *B.*, p. 250, pl. 49; Audub., *B. Am.* III, p. 52, pl. 153; *smithii*, Audub., *l. c.* VII, p. 337, pl. 487. — Amér. sept. jusqu'au Cercle arct.

8149. ORNATUS (Towns.), *Journ. Phil. Acad.*, 1837, p. 189; Audub., *B. Am.* III, p. 53, pl. 154; *melanomus*, Baird, *B. N. Am.*, p. 456, pl. 74, f. 2. — Amérique sept. au S. jusqu'au Mexique.

## 1163. CHONDESTES

*Chondestes*, Sw. (1827).

8150. GRAMMICA (Say), in *Long's Exp.* I, p. 139; Bp., *Am. Orn.* I, p. 47, pl. 5, f. 3; Audub., *B. Am.* III, p. 65, pl. 158; *grammaca*, Say et auct. plur.; *strigata*, Sw. — États-Unis, de l'Iowa et Illinois au Pacifique, Mexique, Guatém.

## 1164. CALAMOSPIZA

*Calamospiza*, Bp. (1838); *Corydallina*, Audub. (1839).

8151. BICOLOR (Towns.), *Journ. Phil. Acad.*, 1837, p. 189; Audub., *B. Am.* III, p. 195, pl. 202; *melanocorys*, Stejn., *Auk*, 1885, p. 49. — États-Unis du Dakota et Kansas aux Mexues Roch., Mexique N., Basse-Californie.

## 1165. ZONOTRICHIA

*Zonotrichia*, Sw. (1831); *Brachyspiza*, Ridgw. (1898).

8152. QUERULA (Nutt.), *Man.*, p. 555; Baird, Br. et Rid., *Hist. N. Am. B.* I, p. 577, pl. 26, f. 4; *harrisii*, Audub., *l. c.* VII, p. 331, pl. 484; *comata*, Max. — États-Unis, Canada jusqu'au 55° l. N.

8153. ALBICOLLIS (Gm.); Wils., *Am. Orn.* III, p. 51, pl. 22, f. 2; *pennsylvanica*, Lath.; Audub., *l. c.* III, p. 153, pl. 191. — Amér. N.-E. jusqu'au 65° l. N., à l'Ouest jusqu'au Dakota.

8154. CORONATA (Pall.), *Zoogr.* II, p. 44; Baird, Br. et Rid., *H. N. Am. B.* I, p. 573, pl 26, f. 1; *atricapilla*, Gm. (pt.); Audub., *l. c.* III, p. 162, pl. 193; *aurocapilla*, Nutt.; *galapagensis*, Bp. — Amér. N.-W. de l'Alaska à la Californie, Iles Aléoutes.



Digitized by Google

8155. VULCANI, Bouc., *P. Z. S.*, 1878, p. 57, pl. 4; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 371, pl. 26, f. 2. — Costa-Rica.

8156. LEUCOPHRYS (Forst.), *Phil. Trans.*, 1772, pp. 382, 426; Audub., *l. c.* III, p. 157, pl. 192; *gambelli*, auct. plur. (nec Nutt.); *Spizella maxima*, Bp. — Groenland et Amérique sept. à l'E. des Mcnes Roch. jusqu'au Mex.

2093. *Var.* INTERMEDIA, Ridgw., *Bull. Essex Inst.*, 1873, p. 198; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 370. — Alaska, Amér. N.-W. jusqu'au Mexique.

2094. *Var.* GAMBELLI (Nutt.), *Mon. Orn.* I, p. 556; Bp., *Consp.* I, p. 478; Sharpe, *l. c.*, p. 606; *nuttalli*, Ridgw., *Auk*, 1899, p. 36. — Côtes du Pacifique jusqu'en Californie (Amérique N.-W.)

8157. STRIGICEPS, Gould, *Voy. « Beagle »*, *Birds*, p. 92; Scl., *Ibis*, 1877, p. 47, pl. 1, f. 2; Sharpe, *l. c.*, p. 608. — Brésil S.

8158. WHITEI, Sharpe, *l. c.*, pl. 13; *strigiceps*, White (nec Gould), *P. Z. S.*, 1883, p. 38. — République Argentine.

8159. PILEATA (Bodd.); Scl., *P. Z. S.*, 1858, pp. 434, 532; Tacz., *Orn. Pérou*, III, p. 45; *capensis*, Müll.; *matutina*, Licht.; *ruficollis*, Spix, *Av. Bras.* II, p. 39, pl. 53, f. 3; *subtorquata*, Sw. — Du Vénézuéla à la République Argentine.

2095. *Var.* INSULARIS, Ridgw., *Auk*, 1898, p. 321. — Ile Curaçao.

2096. *Var.* PERUVIANA (Less.), *Rev. Zool.*, 1839, p. 45; *costaricensis*, Allen, *Bull. Am. Mus. N. H.* III, p. 374; *mortoni*, Audub. — Du Mexique S. au Pérou.

2097. *Var.* CHILENSIS (Meyen), *Reise*, III, p. 212; *pileata*, auct. plur. — Chili.

2098. *Var.* CANICAPILLA, Gould, *Voy. « Beagle »*, *Birds*, p. 91; Scl., *Ibis*, 1877, p. 47, pl. 1, f. 1; Sharpe, *l. c.*, p. 609; *australis*, Gray. — Patagonie.

## 1166. CYANOSPIZA

*Passerina*, Vieill. (1816 nec Lin.); *Spiza*, Bp. (1838 nec 1824); *Cyanospiza*, Baird (1858).

8160. CIRIS (Lin.); Wils., *Am. Orn.* III, p. 68, pl. 24, ff. 1, 2; Audub., *B. Amer.* III, p. 93, pl. 169; *mariposa*, Scop. — Ét.-Un. S., Am. centr., Cuba, Bahama.

8161. CYANEA (Lin.); Wils., *l. c.* I, p. 100, pl. 6, f. 5; Audub., *l. c.* III, p. 96, pl. 170; *cyanella*, Sparrm., *Mus. Carls.* II, pl. 42, 43. — États-Unis E. jusqu'à l'Illinois au N., Am. centr., Bahama.

8162. AMOENA (Say) in *Long's Exp.* II, p. 47; Audub., *l. c.* III, p. 100, pl. 171; Baird, *B. N. Am.*, p. 504. — Amér. N.-W. de la Col. angl. au Mexique.

8163. ROSITÆ, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1874, p. 397; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 364, pl. 25. — Mexique S.

8164. LECLANCHERI (Lafr)., *Rev. Zool.*, 1840, p. 260; id., — Mexique W.

Digitized by Google

*Mag. de Zool.*, 1841, *Ois.*, pl. 22; Salv. et Godm., *l. c.* I, p. 364.

8165. VERSICOLOR (Bp.), *P. Z. S.*, 1837, p. 120; Baird, *B. N. Am.*, p. 503, pl. 56, f. 2; *luxuosus*, Less.; *lazulina*, Licht. — Texas, Mexique, Guatémala.

2099. *Var.* PULCHRA (Ridgw.), *Man. N. Am. B.*, p. 448. — Basse-Calif., Mex. W.

## 1167. PORPHYROSPIZA

*Porphyrospiza*, Scl. et Salv. (1873).

8166. PULCHRA, Sharpe (nec Ridgw.), *Cat. B.* XII, p. 625; *cyanella*, Pelz., *Orn. Bras.*, p. 227 (nec Sparrm.); Scl. et Salv., *Nomencl.*, p. 30. — Brésil.

## 1168. HAPLOSPIZA

*Haplospiza*, Cab. (1850).

8167. UNICOLOR (Licht.) in Cab., *Mus. Hein.* I, p. 147; Berl. et Her., *Zeitschr. ges. Orn.* II, p. 123, pl. 8, ff. 1, 2; *carbonaria*, Gray. — Brésil.

8168. NIVARIA, Bangs, *Pr. Biol. Soc. Wash.* XIII, p. 102. — Colombie.

8169. UNIFORMIS, Scl. et Salv., *Nomencl. Av. Neotr.*, pp. 29, 157; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 366, pl. 27, f. 1. — Mexique.

## 1169. AMPHISPIZA

*Amphispiza*, Coues (1874); *Poospiza*, auct. plur. (nec Cab.)

8170. BILINEATA (Cass.). *Pr. Philad. Acad.*, 1850, p. 104; id., *Ill. B. Calif.*, p. 150, pl. 23; Baird, *B. N. Am.*, p. 470; Coues, *B. N.-W.*, p. 234. — Texas S., Mexique N.-E.

2100. *Var.* DESERTICOLA, Ridgw., *Auk*, 1898, p. 229. — États-Unis S.-W.

2101. *Var.* GRISEA, Nels., *Pr. Biol. Soc. Wash.* XII, p. 61. — Mexique.

8171. BELLI (Cass.), *Pr. Phil. Acad.*, 1850, p. 104, pl. 4; Baird, *B. N. Am.*, p. 470; Sharpe, *l. c.*, p. 629. — Californie.

2102. *Var.* CINEREA, Towns., *P. U. S. Nat. Mus.*, 1890, p. 136. — Basse-Californie.

2103. *Var.* CLEMENTEÆ, Ridgw., *Auk*, 1898, p. 230. — Ile San Clemente (Cal.)

2104. *Var.* NEVADENSIS, Ridgw., *Bull. Essex Inst.*, 1873, p. 191; Sharpe, *l. c.*, p. 630. — Am. N.-W., de la Colomb. angl. au Mex.

8172. QUINQUESTRIATA (Scl. et Salv.), *P. Z. S.*, 1868, p. 323; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 368, pl. 27, f. 2. — Mexique.

Digitized by Google

## 1170. POOSPIZA

*Poospiza*, Cab. (1847).

8173. THORACICA (Nordm.) in *Erman's Reise*, p. 10, pl. 4, f. 1; Cab., *Arch. f. Nat.*, 1847, p. 350; Burm., *Th. Bras.* III, p. 217; *rufitorques*, Sw.; *rufigularis*, Less., *Rev. Zool.*, 1839, p. 42. — Brésil.

8174. BOLIVIANA, Sharpe, *Cat. B.* XII, p. 634, pl. 14. — Bolivie.

8175. CÆSAR, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1869, p. 152, pl. 13; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 32. — Pérou.

8176. HYPOCHONDRIACA (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1837, p. 80; d'Orb., *Voy. Am. mér.*, p. 361, pl. 45, f. 1; Sharpe, *l. c.*, p. 636. — Bolivie.

8177. ALTICOLA, Salv., *Novit. Zool.* II, p. 7. — Pérou.

8178. BONAPARTEI, Scl., *P. Z. S.*, 1867, p. 341, pl. 20; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 31; *hispaniolensis*, Bp.; *torquata*, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, p. 520. — Pérou.

8179. MELANOLEUCA (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1837, p. 82; Bp., *Consp.* I, p. 473; Burm., *Reise La-Plata*, II, p. 484. — République Argentine.

8180. CINEREA (Cuv.) in Bp., *Consp.* I, p. 473; Scl., *Cat. Am. B.*, p. 110; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 439; *schistacea*, Cab.; Burm., *Th. Bras.* III, p. 218. — Brésil, Bolivie.

8181. PERSONATA (Sw.), *An. in Menag.*, p. 311; Gould, *Voy. « Beagle » B.*, p. 98, pl. 35; *nigrorufa*, Cab., *Arch. f. Nat.*, 1847, p. 350; *mesoleuca*, Licht. — Du Brésil S. jusqu'au N. de la Patagonie.

8182. WHITHEI, Scl., *P. Z. S.*, 1885, p. 43, pl. 9; Sharpe, *l. c.*, p. 641. — République Argentine.

8183. ERYTHROPHRYS, Scl., *Ibis*, 1881, p. 399, pl. 17, f. 1; Sharpe, *l. c.*, p. 642. — République Argentine.

8184. RUBECULA, Salv., *Novit. Zool.* II, p. 8. — Pérou.

8185. ORNATA, Scl. et Salv., *Nomencl.*, p. 30; Sharpe, *l. c.*, p. 643. — Argentine W.

8186. LATERALIS (Nordm.) in *Erman's Reise*, p. 10; Bp., *Consp.* I, p. 473; *superciliosa*, Sw.; *pyrrhopyga*, Licht. — Brésil S., Paraguay, Argentine.

8187. ASSIMILIS, Cab., *Mus. Hein.* I, p. 137; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 439; *cabanisi*, Bp., *l. c.*, p. 473; Burm., *Th. Bras.* III, p. 216. — Argentine.

8188. TORQUATA (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1837, p. 82; Bp., *l. c.*, p. 473; Burm., *Reise La-Plata St.* II, p. 484; Sharpe, *l. c.*, p. 645. — Argentine, Mendoza, Bolivie.

## 1171. COMPSOSPIZA

*Compsospiza*, Berl. (1893).

8189. GARLEPPI, Berl., *Ibis*, 1893, p. 208, pl. 6. — Bolivie.

Digitized by Google

## 1172. JUNCO

*Junco*, Wagl. (1831); *Struthus*, Bp. (1838, nec Boie); *Niphœa*, Audub. (1839).

8190. HIEMALIS (Lin.); Gould, *B. Eur.* III, pl. 190; Audub., *B. Am.* III, p. 88, pl. 167; *hudsonia*, Forst.; *nivalis*, Wils., *Am. Orn.* II, p. 129, pl. 16, f. 6. — États-Unis jusqu'à la Nouv.-Angleterre au N.

2105. *Var.* MONTANA, Ridgw., *Auk*, 1898, p. 321. — De la Col. angl. au Mex.

2106. *Var.* CAROLINENSIS, Brewst., *Auk*, 1886, p. 108. — Caroline W. (Montgnes).

2107. *Var.* PINOSA, Loomis, *Auk*, 1893, p. 47, 1894, p. 265. — Baie Monterey (Calif.)

8191. AIKENI, Ridgw., *Pr. Bost. Soc. N. H.*, 1872, p. 201; Baird, Br. et Rid., *Hist. N. Am. B.* I, p. 584, pl. 26, f. 6; Sharpe, *l. c.*, p. 649. — Colorado.

8192. OREGONUS (Towns.), *Pr. Philad. Acad.*, 1837, p. 188; Audub., *l. c.* III, p. 91, pl. 168; *hudsonia*, Licht. (nec Forst.); *atrata*, Brandt, *Icon. Rosso-Asiat.*, pl. 2, f. 8; *hiemalis, var. oregonus*, Ridgw. — États-Unis W., de l'Alaska à l'Arizona et la Californie.

2108. *Var.* CONNECTENS, Coues, *Key N. Am. B.*, 2e ed., p. 378; *shufeldti*, Coal.; *thurberi*, Anth. — Nouv.-Mexique.

8193. ANNECTENS, Baird, in *Cooper's B. Calif.*, p. 564; Sharpe, *l. c.*, p. 651; *oregonus*, Merr. (nec Towns.); *oregonus, var. annectens*, Hensh.; *cinereus, var. caniceps* (pt.), Coues (1874); *hiemalis annectens*, Coues (1882); *ridgwayi*, Mearns. — Montagnes Rocheuses, de l'Idaho et Montana au Nouv.-Mexique et Arizona.

2109. *Var.* MEARNSI, Ridgw., *Auk*, 1897, p. 94. — Wyoming.

8194. TOWNSENDI, Anth., *Pr. Cal. Ac. Sc.* II, p. 76. — Basse-Californie.

8195. INSULARIS, Ridgw., *Bull. U. S. Geol. Surv.*, 1876, p. 188; Sharpe, *l. c.*, p. 652. — Ile Guadalupe (Californie).

2110. *Var.* BAIRDI, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.* VI, 1883, p. 155; Sharpe, *l. c.*, p. 653. — Basse-Californie.

8196. CINEREUS (Sw.), *Phil. Mag.*, 1827, p. 435; Hensh., *Rep. Zool. Expl. 100th Merid.*, p. 271, pl. 10; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 373. — Mexique E. (Montagnes).

2111. *Var.* PALLIATA, Ridgw., *Auk*, 1885, p. 364. — Arizona (Montagnes).

8197. CANICEPS (Woodh.), *Pr. Philad. Acad.*, 1852, p. 202; Baird, *B. N. Amer.*, p. 468, pl. 72, f. 1; id., Br. et Rid., *H. N. Am. B.* I, p. 587, pl. 26, f. 3; *cinereus, var. caniceps*, Coues; *hiemalis, var. caniceps*, Ridgw. — Mont. Roch., depuis la Colombie angl. jusqu'au Nouv.-Mexique et Arizona.

8198. DORSALIS, Henry, *Pr. Philad. Acad.*, 1858, p. 117; Baird, *B. N. Am.*, p. 467, pl. 28, f. 1; *cinereus, var. caniceps* (pt.), Coues; *hiemalis dorsalis* et *cinereus dorsalis*, Hensh. — Nouv.-Mexique, Arizona E. (Montgnes).

8199. ALTICOLA, Salv., *P. Z. S.*, 1863, p. 189; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 374, pl. 26, f. 1; *hiemalis, var. alticola* et *cinereus, var. alticola*, Ridgw. — Guatémala (Montgnes).

8200. FULVESCENS, Nels., *Auk*, 1897, p. 61. — Chiapas (Mexique).

Digitized by Google

## 1173. SPIZELLA

*Spizella*, Bp. (1832); *Spinites*, Cab. (1850).

8201. MONTICOLA (Gm.); Baird, *B. N. Am.*, p. 472; *montana*, Forst. (nec Lin.); *arborea*, Wils., *Am. Orn.* II, p. 125, pl. 16, f. 3; *canadensis*, Sw. et Rich.; Audub., *B. Am.*, p. 83, pl. 166. — Amér. sept. à l'E. des Mont. Rocheuses, entre le 37° l. N. et le cercle polaire.

2112. *Var.* OCHRACEA, Brewst., *Bull. Nutt. Orn. Club*, VII, p. 228; Sharpe, *l. c.*, p. 659; *monticola* (pt.), auct. plur. — Amérique N.-W., du cercle polaire au S. des États-Unis W.

8202. SOCIALIS (Wils.), *Am. Orn.* II, p. 127, pl. 16, f. 5; Audub., *l. c.*, III, p. 80, pl. 165; *pallida*, Lemb. (nec Sw.); *var. arizonæ*, Coues; *domestica*, Coues. — Amérique septentr. du 62° l. N. au Mexique.

2113. *Var.* MEXICANA, Nels., *Auk*, 1899, p. 30. — Mex. S., Guatémala.

8203. PINETORUM, Salv., *P. Z. S.*, 1863, p. 189; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 378, pl. 36, f. 3. — Guatémala et île Ruatan.

8204. PUSILLA (Wils.), *l. c.* II, p. 121, pl. 16, f. 2; Audub., *l. c.* III, p. 77, pl. 164; ?*Mot. juncorum*, Gm. — Canada S., États-Unis E. jusqu'au Mex.

2114. *Var.* ARENACEA, Chadb., *Auk*, 1886, p. 248; Richm., *Auk*, 1897, p. 345, pl. 3. — Texas, Montana, Dakota.

2115. *Var.* WORTHENI, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1884, p. 259. — Nouv.-Mex., Texas W.

8205. PUSIO (Licht.), *Preis Verz. Mex. Vög.*, p. 2; Sharpe, *l. c.*, p. 666; *pallida*, Sw.; Baird, Br. et Rid., *Hist. N. Am. B.* II, p. 11, pl. 27, f. 3; *shattuckii*, Audub., *l. c.* VIII, *App.*, p. 230, pl. 493. — États-Unis, de l'Illinois aux Mont. Roch. et du Saskatchéwan au Mexique, Cuba.

2116. *Var.* BREWERI, Cass., *Pr. Philad. Acad.*, 1856, p. 40; Baird, Br. et Rid., *l. c.* II, p. 13, pl. 27, f. 4; *pallida*, auct. plur. (nec Sw.); Audub., *l. c.* III, p. 71, pl. 161. — États-Unis S.-W. et Mexique.

8206. ATRIGULARIS (Cab.), *Mus. Hein.* I, p. 133; Baird, *Mex. Bound. Surv.* II, *Birds*, p. 16, pl. 17, f. 1; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 380; *evura*, Coues, *Ibis*, 1865, p. 118. — États-Unis S.-W., du Texas à la Californie, Mexique.

## 1174. POOCÆTES

*Poocætes*, Baird (1860); *Poœcetes*, Sharpe (1888).

8207. GRAMINEUS (Gm.); Audub., *l. c.* III, p. 65, pl. 159; Baird, *B. N. Am.*, p. 447; Baird, Br. et Rid., *Hist. N. Amer. B.* I, p. 545, pl. 23, f. 1. — Ontario et Nelle-Écosse jusqu'au Missouri, Kentucky et Virg.

2117. *Var.* CONFINIS, Baird, *B. N. Am.*, p. 448; Sharpe, *l. c.*, p. 672; *gramineus* (pt.), auct. plur.; *affinis*, Mill., *Auk*, 1888, p. 404. — États-Unis W., Mexique.

Digitized by Google

## 1175. PASSERCULUS

*Passerculus*, Bp. (1838); *Centronyx*, Baird (1860).

8208. SANDWICHENSIS (Gm.); Baird, *B. N. Am.*, p. 444; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 380; *arctica*, Lath.; *chrysops*, Pall., *Zoogr.* II, p. 45, pl. 48, f. 1. — Amérique septentr.

2118. *Var.* SAVANNA (Wils.), *Amer. Orn.* III, p. 55, pl. 22, f. 3; Baird, *B. N. Am.*, p. 442; Audub., *l. c.* III, p. 68, pl. 160. — Amérique N.-E. jusqu'aux plaines du Missouri.

2119. *Var.* ANTHINA, Bp., *C. R.* XXVII, p. 919; Baird, *l. c.*, p. 445; Baird, Br. et Rid., *Hist. N. Am. B.* I, p. 539, pl. 24, f. 10. — Alaska, Californie (côtes).

2120. *Var.* ALAUDINA, Bp., *C. R.* XXXVII, p. 918; Baird, *l. c.*, p. 446. — Californie, Texas, Mexique N.

2121. *Var.* BRUNNESCENS (Butl.), *Auk*, 1888, p. 264. — Mexique, Guatémala.

8209. PRINCEPS, Mayn., *Amer. Nat.*, 1872, p. 637; Baird, Br. et Rid., *l. c.* I, p. 540; Sharpe, *l. c.*, p. 679. — Amérique N.-E., de la Nouv.-Écosse jusqu'à la Virginie.

8210. ROSTRATUS (Cass.), *Proc. Philad. Acad.*, 1852, p. 184; id., *Ill. B. Calif.*, p. 226, pl. 38; *guttatus*, Lawr. — De la Californie au N.-W. du Mexique.

2122. *Var.* HALOPTILA (Mcgr.), *Auk*, 1898, p. 265. — Basse-Californie.

8211. BAIRDI, Audub., *l. c.* VII, p. 359, pl. 500; Baird, Br. et Rid., *l. c.* I, p. 531, pl. 25, f. 3; *ochrocephalus*, Aitk., *Amer. Nat.*, 1873, p. 257. — États-Unis centr. et S.-W.

8212. ?GEOSPIZOPSIS, Bp., *C. R.* XXXVII, 1853, p. 921; Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 306 (1). — Colombie.

## 1176. AMMODROMUS

*Ammodromus*, Sw. (1827); *Coturniculus*, Bp. (1838).

8213. MARITIMUS (Wils.), *Am. Orn.* IV, p. 68, pl. 34, f. 2; Audub., *B. Amer.* III, p. 103, pl. 172; *macgillivrayi*, Audub., *l. c.*, p. 106, pl. 173. — États-Unis E., du Massachusetts au Rio Grande (côtes).

2123. *Var.* PENINSULÆ, Allen, *Auk*, 1888, p. 284. — Floride S.-W., Louisiane (côtes).

2124. *Var.* FISHERI, Chapm., *Auk*, 1899, p. 10, pl. 1, f. 1; *macgillivrayi*, Ridgw. — Texas, Floride.

2125. *Var.* NIGRESCENS, Ridgw., *Bull. Essex Inst.*, 1873, p. 198; Sharpe, *l. c.*, p. 685; *melanoleucus*, Mayn., *B. East N. Am.*, p. 119, pl. 5. — Lacs salés du S. de la Floride.

2126. *Var.* SENNETTI, Allen, *Auk*, 1888, p. 286; Chapm., *Auk*, 1899, p. 3, pl. 1, f. 2. — Texas.

(1) M. Sharpe rapporte cet oiseau au *Phrygilus unicolor* (*Cat.* XII, p. 792). Au Musée de Bruxelles se trouve le type du *P. geospizopsis* de Bonaparte, en deux exemplaires, et ceux-ci ne ressemblent nullement au *P. unicolor*.

Digitized by Google

8214. AUSTRALIS, Mayn., *Auk*, 1888, p. 398. — Floride, îles Bahama.

8215. CAUDACUTUS (Gm.); Wils., *l. c.* IV, p. 70, pl. 34, f. 3; Baird, Br. et Rid., *l. c.* I, p. 557, pl. 25, f. 7; *littoralis*, Nutt. — États-Unis E.

2127. *Var.* NELSONI, Allen, *Pr. Bost. Soc. N. H.*, 1875, p. 292. — Vallée du Mississippi.

2128. *Var.* SUBVIRGATA, Dwight, *Auk*, 1887, p. 233. — Du Canada à la Nouv.-Écosse.

2129. *Var.* BECKI, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1891, p. 483. — Santa Clara (Calif.)

8216. SAVANNARUM (Gm.); Newt., *Handb. Jam.*, p. 104; *passerina*, Wils., *l. c.* III, p. 76, pl. 24, f. 5; Audub., *l. c.* III, p. 79, pl. 162; *bimaculatus*, Sw.; *tixicrus*, Gosse, *B. Jam.*, p. 242. — Canada S.-E., États-Unis E., Amérique centr. E. et Grandes Antilles.

2130. *Var.* PERPALLIDA, Coues, *Check-list N. Am. B.*, p. 52. — États-Unis W.

2131. *Var.* OBSCURA, Nels., *Auk*, 1897, p. 61. — Mex. E. (Vera Cruz).

8217. HENSLOWI (Audub.), *B. Am.*, pl. 70; id., *B. Am.* 8°, III, p. 75, pl. 143; Baird, *B. N. Am.*, p. 451; Sharpe, *l. c.*, p. 690. — États-Unis N.-E. jusqu'au S. de la Nouv.-Angleterre et l'Ontario.

2132. *Var.* OCCIDENTALIS, Brewst., *Auk*, 1885, p. 145. — Dakota.

8218. MANIMBE (Licht.), *Verz. Doubl.*, p. 25; Burm., *Th. Bras.* III, p. 228; *xanthornus*, Gould, *Voy. « Beagle » Birds*, pl. 30. — Col., Vénéz., Guyane, Bol., Argent., Brésil jusqu'au 35°1. S.

8219. PERUANUS (Bp.), *Consp.* I, p. 481; Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 455; Tacz., *Orn. Pérou*, III, p. 43. — Ecuador, Pérou, Bolivie.

8220. PETENICUS, Salv., *P. Z. S.*, 1863, p. 189; id. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 384, pl. 28, f. 2. — Guatémala.

8221. LECONTEI (Audub.), *B. Am.* VIII, p. 221, pl. 488; Baird, *B. N. Am.*, p. 452; Baird, Br. et Rid., *Hist. N. Am. B.* I, p. 552, pl. 25, f. 6. — De Manitoba au Texas, à l'E. jusqu'à l'Illinois, Carol. et Flor.

## 1177. MELOSPIZA

*Melospiza* et *Helospiza*, Baird (1860).

8222. GEORGIANA (Lath.), *Ind. Orn.* I, p. 460; Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1885, p. 555; *palustris*, Wils., *Am. Orn.* III, p. 49, pl. 22, f. 1; *caboti*, Baird, Br. et Rid., *l. c.* III, pl. 46, f. 9. — Labrad., Terre-Neuve et États-Unis E. jusqu'aux plaines.

8223. LINCOLNI (Audub.), *B. Am.*, pl. 195; id., *B. Am.* 8°, III, p. 116, pl. 117; Baird, *B. N. Am.*, p. 482; *zonarius*, Bp. — Amér. sept. du 52°1. N. jusqu'au Guatém.

2133. *Var.* STRIATA, Brew., *Auk*, 1889, p. 89. — Colombie anglaise.

8224. FASCIATA (Gm.); Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1881, — États-Unis E., de la

Digitized by Google

pp. 2, 180; *melodia*, Wils., *l. c.* II, p. 125, pl. 16, f. 4; Baird, *B. N. Am.*, p. 477. — région des lacs jusqu'en Virginie.

2134. *Var.* Montana, Hensh., *Auk*, 1884, p. 224; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 387. — Colorado, Utah, Nevada.

2135. *Var.* Fallax (Baird), *Pr. Philad. Acad.*, 1854, p. 119; id., *B. N. Am.* (1860), p. 481, pl. 6, f. 2; *melodia* (pt.), Coues. — Nouv.-Mexique et Arizona.

2136. *Var.* Juddi, Bishop., *Auk*, 1896, p. 132. — Dakota N.

2137. *Var.* Merrilli, Brewst., *Auk*, 1896, p. 46. — Idaho.

2138. *Var.* Heermanni, Baird, *B. N. Am.* (1860), p. 478, pl. 70, f. 1; *gouldi* et *fallax*, Scl. (nec Baird). — Mexique.

2139. *Var.* Cooperi, Ridgw., *Auk*, 1899, p. 95. — Cal. S. et Basse-Cal. N.

2140. *Var.* Samuelis, Baird, *Pr. Bost. Soc. N. H.*, 1858, p. 381; *gouldi*, Baird, *B. N. Am.*, p. 479, pl. 71, f. 1; *pusillula*, Ridgw., *Auk*, 1899, p. 35; *ingersolli*, Mc Greg. — Californie.

2141. *Var.* Rufina, Brandt, *Descr. Av. Ross.*, pl. 215; Baird, *B. N. Am.*, p. 480; *cinerea*, Audub. (nec Gm.), *B. Am.* III, p. 145, pl. 187; *guttata*, Gamb. — Amér. sept., côtes du Pacifique de la Californie à Sitka.

2142. *Var.* Caurina, Ridgw., *Auk*, 1899, p. 36; *kenaiensis*, Ridgw. — Alaska.

2143. *Var.* Rivularia, Bryant, *Pr. Cal. Ac. Sc.* I, p. 197. — Basse-Californie.

2144. *Var.* Graminea, Towns., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1890, p. 139. — Ile Santa Barbara.

2145. *Var.* Clementæ, Towns., *l. c.* — Ile San Clemente (Cal.)

8225. cinerea (Gm.); Bp., *Consp.* I, p. 478; Sharpe, *Cat. B.* XII, p. 707; *insignis*, Baird, *Trans. Chicago Acad.* I, p. 319, pl. 29, f. 2. — Iles Aléoutes et Prybilow, Alaska.

## 1178. HÆMOPHILA

*Aimophila*, Sw. (1837); *Peucæa*, Audub. (1839); *Hæmophila*, Cab. (1850); *Incaspiza*, *Plagiospiza* et *Rhynchospiza*, Ridgw. (1898).

8226. superciliosa, Sw., *An. in Menag.*, p. 314; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 395, pl. 30, f. 1; Sharpe, *l. c.*, p. 722. — Mexique.

8227. acuminata (Licht.), *Nomencl. Av. Neotr.*, p. 43; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 397; *melanotis*, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1866, p. 473 (nec Bp.) — Mexique.

8228. lawrencei, Salv. et Godm., *l. c.*, p. 397; *ruficauda*, Lawr. (nec Bp.) — Mexique W.

8229. ruficauda (Bp.), *C. R.*, xxxvii, p. 918; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 396, pl. 30, f. 2; ? *tolteca*, Müll., *Syst. Verz. Wirb. Mex.*, p. 50. — Guatémala, Nicaragua, Costa-Rica.



Digitized by Google

8230. RUFESCENS (Sw.), *Phil. Mag.*, 1827, p. 434; Salv. et et Godm., *l. c.*, p. 395, pl. 29, f. 2; *pyrgitoides*, Lafr.; *melanotis*, Bp. — Mexique, Guatémala.

2146. *Var.* PALLIDA, Nels. et Palm., *Auk*, 1894, p. 43. — Mexique S.-W.

2147. *Var.* SINALOA, Ridgw., *Auk*, 1899, p. 254. — Sierra Madre W. (Mex.)

2148. *Var.* MCLEODI et *cahooni*, Brewst., *Auk*, 1888, pp. 92, 93. — Mexique.

8231. SUMICHRASTI, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1871, p. 6; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 395. — Mexique.

8232. STOLZMANNI, Tacz., *P. Z. S.*, 1877, p. 322, pl. 36, f. 2; id., *Orn. Pér.* III, p. 47. — Pérou.

8233. HUMERALIS, Cab., *Mus. Hein.* I, p. 132; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 398, pl. 29, f. 1; *ferrariperazi*, Ridgw., *Auk*, 1886, p. 332. — Mexique.

8234. MYSTACALIS (Hartl.), *Rev. Zool.*, 1852, p. 3; Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 305; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 399. — Mexique.

8235. PULCHRA, Scl., *Ibis*, 1886, p. 259, pl. 8; Sharpe, *l. c.*, p. 729. — Pérou.

8236. LÆTA, Salv., *Novit. Zool.* II, p. 8. — Pérou.

8237. PERSONATA, Salv., *Novit. Zool.* II, p. 8. — Pérou.

8238. ÆSTIVALIS (Licht.), *Verz. Doubl.*, p. 25; Cab. *Mus. Hein.* I, p. 132; Baird, Br. et Rid., *Hist. N. Am. B.* II, p. 39, pl. 28, f. 4; Sharpe, *l. c.*, p. 709. — Georgie S., Floride jusqu'au Mexique.

2149. *Var.* BACHMANI (Audub.), *B. Am.*, pl. 165; id., éd. 8°, III, p. 113, pl. 176; *illinoensis*, Ridgw., *Bull. Nutt. Orn. Club*, 1879, p. 219. — Du S. de la Caroline au Texas, et au N. jusqu'au 41° l. N.

2150. *Var.* ARIZONÆ, Ridgw., *Am. Nat.*, 1873, p. 615; Sharpe, *l. c.*, p. 710. — Arizona S. et Sonora.

2151. *Var.* BOTTERII (Scl.), *P. Z. S.*, 1857, p. 124; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 389; *cassini*, Baird (nec Woodh.); *mexicanus*, Lawr. — Mexique.

2152. *Var.* SARTORII, Ridgw., *Auk*, 1898, p. 227. — De Vera-Cruz au N. du Nicaragua.

8239. CASSINI (Woodh.), *Pr. Philad. Acad.*, 1852, p. 60; Baird, Br. et Rid., *l. c.* II, p. 42, pl. 28, f. 5. — Du Kansas au Texas, Nouv.-Mex., Arizona et Mexique.

8240. RUFICEPS (Cass.), *Pr. Philad. Ac.*, 1852, p. 184; id., *Ill. Orn. Calif.*, p. 155, pl. 20; Baird, *B. N. Am.*, p. 486. — Californie.

2153. *Var.* HOMOCHLAMYS, Sharpe, *Cat. B.* XII, p. 715; *boucardi*, auct. plur. (nec Scl.) — Nouv.-Mexique S. et Arizona.

2154. *Var.* BOUCARDI (Scl.), *P. Z. S.*, 1859, p. 380; 1867, p. 1, pl. 1; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 391; *eremœca*, Brown. — Mex. jusqu'au Texas.

2155. *Var.* AUSTRALIS (Nels.), *Auk*, 1897, p. 63. — Oaxaca (Mexique).

2156. *Var.* NOTOSTICTA (Scl. et Salv.), *P. Z. S.*, 1868, — Mexique.

Digitized by Google

p. 322; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 395, pl. 28, f. 1; *fusca*, Nels.

2157. *Var.* Sororia, Ridgw., *Auk*, 1898, p. 226. — Basse-Californie S.

2158. *Var.* Scotti (Senn.), *Auk*, 1888, p. 41. — Arizona.

8241. megarhyncha (Salv. et Godm.), *Ibis*, 1889, p. 258. — Mexique.

8242. carpalis (Coues), *Amer. Nat.*, 1873, p. 522; Sharpe, *l. c.*, p. 715. — Arizona.

## 1179. PASSERELLA

*Passerella*, Sw. (1837).

8243. iliaca (Merr.), *Beitr. besond. Gesch. Vög.* II, p. 40, pl. 10; Audub., *B. Amer.* III, p. 139, pl. 185; *rufa*, Wils., *Am. Orn.* III, p. 53, pl. 22, f. 4; *obscura*, Verrill. — Amér. sept., à l'E. des Mont. Roch., jusqu'aux côtes arctiques, au S. jusqu'au 38° l. N.

2159. *Var.* Fuliginosa, Ridgw., *Auk*, 1899, p. 36. — Col. angl., Vancouver.

2160. *Var.* Insularis, Ridgw., *Auk*, 1900, p. 30. — De l'Alaska à la Calif.

2161. *Var.* Annectens, Ridgw., *Auk*, 1900, p. 30. — Côtes de l'Alaska à la Californie.

8244. unalaschensis (Gm.); Bp., *Consp.* I, p. 477; *townsendi*, Audub., *l. c.* III, p. 43, pl. 187; Baird, *B. N. Am.*, p. 489; *iliaca*, *var. townsendi*, Coues. — Amér. N.-W., de l'île Kadjack à la Calif.

2162. *Var.* Schistacea, Baird, *B. N. Am.*, p. 490, pl. 69, f. 3; *townsendi*, *var. schistacea*, Baird, Br. et Rid., *Hist. N. Am. B.* II, p. 56, pl. 27, f. 9. — Mont. Roch. des États-Unis, à l'E. jusqu'au Kansas, à l'Ouest jusqu'à la Californie.

2163. *Var.* Megarhyncha, Baird, *B. N. Am.*, p. 925; id., Br. et Rid., *l. c.* II, p. 57, pl. 28, f. 10; Sharpe, *l. c.*, p. 720; *stephensi*, Anth. — Sierra Nevada, Californie.

## 1180. CHAMÆOSPIZA

*Chamæospiza*, Scl. (1858).

8245. torquata (Du Bus), *Bull. Acad. Brux.*, 1847, II, p. 105; id., *Esq. Orn.*, pl. 36; Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 304; *ocai*, Lawr. — Mexique.

2164. *Var.* Nigrescens, Salv. et Godm., *Ibis*, 1889, p. 381. — Patzcuaro (Mexique).

2165. *Var.* Alticola, Salv. et Godm., *Ibis*, 1889, p. 381. — Sierra Nev. de Colima.

## 1181. PYRGISOMA

*Pyrgisoma*, Bp. (1850); *Melozone*, Rchb. (1850); *Kieneria*, Bp. (1855).

8246. rubricatum (Licht.), in Cab., *Mus. Hein.* I, p. 140; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 127, pl. 64, f. 1; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 402. — Mexique.

Digitized by Google

8247. KIENERI, Bp., *Consp.* I, p. 486; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 130, pl. 65, f. 2. — Mexique?

8248. BIARCUATUM (Prév. et Des M.), *Voy. Venus*, V, p. 216, pl. 6; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 401. — Guatémala.

8249. CABANISI, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, p. 324; id., *Exot. Orn.*, p. 129, pl. 65, f. 1; *biarcuatum* et *kieneri* (pt.), auct. plur. — Costa-Rica.

8250. OCCIPITALE, Salv., *Ibis*, 1878, p. 446; id. et Godm., *Biol.* I, p. 404; *torquata*, Scl. et Salv., 1860 (nec Du Bus); *leucote*, Salv. (nec Cab.); Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 128, pl. 64, f. 2. — Guatémala.

8251. LEUCOTE (Cab.), *J. f. O.*, 1860, p. 413; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, p. 326; id., *Exot. Orn.*, p. 128 (pt.); Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 403. — Nicaragua, Costa-Rica.

8252. NATIONI, Scl., *P. Z. S.*, 1881, p. 485, pl. 46; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 555; *mystacalis*, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, p. 521 (nec *Buar. mystacalis*, Tacz.) — Pérou.

## 1182. SALTATRICULA

*Saltatricula*, Burm. (1861).

8253. MULTICOLOR, Burm., *J. f. O.*, 1860, p. 254; id., *Reise La Plata-St.* II, p. 481; Sharpe, *l. c.*, p. 737. — Argentine W.

## 1183. ATLAPETES

*Atlapetes*, Wagl. (1831); *Chlorura*, Scl. (1862); *Oreospiza*, Ridgw. (1896).

8254. CHLORURUS (Towns.), in Audub., *Orn. Biogr.* V, p. 336; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 415; Sharpe, *l. c.*, p. 738; *blandingiana*, Gamb.; *rufipileus*, Lafr., *Rev. Zool.*, 1848, p. 176. — Plateau central des États-Unis, du 45° l. N. envir., jusqu'à la Calif. à l'Ouest et le Mexique au S.

8255. PILEATUS, Wagl., *Isis*, 1831, p. 526; Salv. et Godm., *l. c.* I, p. 405; Sharpe, *l. c.*, p. 740. — Mexique.

2166. *Var.* DILUTA (*dilutus*), Ridgw., *Auk*, 1898, p. 228. — Chihuahua (Mexique).

## 1184. PIPILO

*Pipilo*, Vieill. (1816).

8256. ERYTHROPHTHALMUS (Lin.); Vieill., *Gal. Ois.* I, p. 109, pl. 80; Audub., *B. Am.* III, p. 167, pl. 195; *ater*, Vieill. — États-Unis E. et centr., Canada S.

2167. *Var.* ALLENI, Coues, *Amer. Nat.*, 1871, p. 366. — Floride.

8257. MACULATUS, Sw., *Phil. Mag.*, 1827, p. 454; Jard. et Sel., *Ill. Orn.* I, pl. 31, 32; Salv. et Godm., *l. c.* I, p. 408; *oregonus*, Salv. (nec Bell). — Mexique, Guatémala.

Digitized by Google

2168. *Var.* ARCTICA, Sw. et Rich., *Faun. Bor.-Am. B.*, p. 26, pl. 51, 52; Baird, *B. N. Am.*, p. 514; Sharpe, *l. c.*, p. 748; *subarcticus*, Baird. — États-Unis centr. à l'E. des Mont. Roch., au S. jusqu'au Texas.

2169. *Var.* MEGALONYX, Baird, *B. N. Am.*, p. 515, pl. 73; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 409; Coues, *Key N. Am. B.*, p. 152. — Montagnes Rocheuses des États-Unis.

2170. *Var.* CLEMENTÆ, Grinn., *Auk*, 1897, p. 294. — Ile San Clemente (Cal.)

2171. *Var.* ATRATA, Ridgw., *Auk*, 1899, p. 254; = *magnirostris?* — Californie.

2172. *Var.* MAGNIROSTRIS, Brewst., *Auk*, 1891, p. 146. — Basse-Californie.

2173. *Var.* OREGONA, Bell., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1852, p. 6; Audub., *l. c.* III, p. 164, pl. 194; Sharpe, *l. c.*, p. 749. — Côtes occid. des États-Unis.

2174. *Var.* CONSOBRINA, Ridgw., *Bull. U.S. Geol. Surv.*, 1878, p. 189. — Ile Guadalupe (Calif.)

2175. *Var.* SUBMACULATA, Ridgw., *Auk*, 1886, p. 352. — Mexique S.

2176. *Var.* CARMANI, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1871, p. 7; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 407. — Ile Socorro (Mex. W.)

2177. *Var.* ORIZABÆ, Cox, *Auk*, 1894, p. 161. — Orizaba (Mexique).

8258. MACRONYX, Sw., *Phil. Mag.*, 1827, p. 434; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 406. — Mexique.

2178. *Var.* COMPLEXA, Ridgw., *Auk*, 1886, p. 352. — Puebla (Mexique).

8259. VIRESCENS, Hartl., *J. f. O.*, 1863, p. 228; Sharpe, *l. c.*, p. 752; *chlorosoma*, Baird, Br. et Rid., *Hist. N. Am. B.* II, p. 105. — Mexique.

8260. FUSCUS, Sw., *Phil. Mag.*, 1827, p. 434; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 409. — Mexique.

2179. *Var.* POTOSINA, Ridgw., *Auk*, 1899, p. 254. — Mexique centr.

2180. *Var.* SENICULA, Anth., *Auk*, 1895, p. 111. — Basse-Californie.

2181. *Var.* CRISSALIS (Vig.), in *Beech. Voy.* « *Blossom* », p. 19; Baird, Br. et Ridgw., *l. c.* II, p. 122, pl. 31, f. 8; *fuscus*, Cass., *Ill. B. Calif.*, p. 124, pl. 17; = ?*carolæ*, Mc Greg., *Bull. Coop. Orn. Cl.* I, p. 11. — Californie.

2182. *Var.* INTERMEDIA, Nels., *Pr. Biol. Soc. Washington*, XIII, p. 27. — Mexique N.-W.

2183. *Var.* MESOLEUCA, Baird, *Pr. Philad. Acad.*, 1854, p. 119; id., Br. et Ridgw., *l. c.* II, p. 125, pl. 31, f. 10. — États-Unis S.-W.

2184. *Var.* ALBIGULA, Baird, *Pr. Philad. Acad.*, 1859, p. 305; id., Br. et Rid., *l. c.* II, p. 127, pl. 31, f. 11. — Basse-Californie.

8261. RUTILUS (Licht.), *Preis Verz. Mex. Vög.*, p. 2; Cab., *J. f. O.*, 1863, p. 57; Salv. et Godm., *l. c.* I, p. 410; *albicollis*, Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 304. — Mexique.

8262 ABERTI, Baird, in *Stansb. Rep. Exped. Gt. Salt Lake*, — Nouv.-Mex., Arizona,

Digitized by Google

p. 325; id., Br. et Rid., *l. c.* II, p. 128, pl. 31, f. 7; Sharpe, *l. c.*, p. 756. — Colorado, Utah.

## 1185. EMBERNAGRA

*Embernagra*, Less. (1831); *Limnospiza*, Cab. (1850); *Arremonops*, Ridgw. (1896).

8263. PLATENSIS (Gm.); d'Orb., *Voy. Am. mér. Ois.*, p. 284; Burm., *Th. Bras.* III, p. 224; *decumana*, Licht.; *dumetorum*, Less.; ?*fabialatu*, Less.; *poliocephalus*, Gray; *viridis*, Bp.; *minor*, Cab. — Brésil S., Uruguay, Argentine jusqu'à La Plata.

8264. OLIVASCENS (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1837, p. 75; Sharpe, *l. c.*, p. 759; *longicauda*, Strickl.; *viridis*, Burm., *J. f. O.*, 1860, p. 256. — Bolivie, Argentine W.

8265. RUFIVIRGATA, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1851, p. 112, pl. 5, f. 2; Baird, *Mex. Bound. Surv.* II, *Birds*, p. 16, pl. 17, f. 2. — Texas et Mexique N.

2185. *Var.* CRASSIROSTRIS, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1878, p. 249; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 412. — Mexique S.

8266. SUPERCILIOSA, Salv., *P. Z. S.*, 1864, p. 582; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 412; *rufivirgata* (pt.), Lawr. — Mex. S., Costa-Rica.

2186. *Var.* SINALOÆ, Nels., *Pr. Biol. Soc. Washington*, 1899, p. 28. — Mexique N.-W.

8267. STRIATICEPS, Lafr., *Rev. Zool.*, 1852, p. 61; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 414; *conirostris*, Scl. (1856, nec Bp.) — Amér. centr. du Nicaragua à Panama.

2187. *Var.* RICHMONDI Ridgw.), *Auk*, 1898, p. 228; *striaticeps*, auct. plur. (nec Lafr.) — De l'Honduras au Véragua.

2188. *Var.* CONIROSTRIS (Bp.), *Consp.* I, p. 488; Scl., *P. Z. S.*, 1855, p. 154. — Colombie.

2189. *Var.* CANENS, Bangs., *Pr. Biol. Soc. Washingt.* XII, p. 140. — Santa Marta (Colomb.)

2190. *Var.* VENEZUELENSIS (Ridgw.), *Auk*, 1898, p. 228. — Vénézuéla.

2191. *Var.* CHRYSOMA, Scl., *P. Z. S.*, 1860, p. 275; id., *Cat. Amer. B.*, p. 117, pl. 11; *striaticeps*, Berl. et Tacz. — Ecuador.

2192. *Var.* CHLORONOTA, Salv., *P. Z. S.*, 1861, p. 202; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 413. — Yucatan, Guatémala, Honduras anglais.

2193. *Var.* VERTICALIS, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1878, p. 249; Salv. et Godm., *Biol.*, p. 414; *rufivirgata* (pt.), Lawr. (1868). — Yucatan.

## 1186. CORYPHOSPIZA

*Leptonyx*, Sw. (1837, nec 1852); *Coryphospiza*, Gray (1840); *Donacospiza*, Cab. (1850).

8268. ALBIFRONS (Vieill.), *N. Dict.* XI, p. 276; Sharpe, *l. c.*, — Brésil S., Uruguay,

Digitized by Google

p. 766; *longicaudatus*, Gould, *Voy. « Beagle »* *Birds*, p. 90, pl. 29; *oxyrhyncha*, Natt.; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 229. — Argentine E.

8269. MELANOTIS (Tem.), *Pl. col.* 114, f. 1; Burm., *Thiere Bras.*, III, p. 226. — Brésil S.

## 1187. TARDIVOLA

*Emberizoides* (!) Tem. (1824); *Tardivola*, Sw. (1837).

8270. MACRURA (Gm.); Scl., *Cat. Am. B.*, p. 118; Cab., *Mus. Hein.* I, p. 133; *sphenura*, Vieill. — Colombie, Vénézuéla, Guyane.

2194. *Var.* HERBICOLA (Vieill.), *N. Dict.* XI, p. 192; *marginalis*, Tem., *Pl. col.* 114, f. 2; *fringillaris*, Licht.; *macrurus* et *sphenurus* (pt.), auct. plur. — Brésil, Bolivie.

## 1188. SPIZA

*Spiza*, Bp. (1824); *Euspiza*, Bp. (1852); *Euspina*, Cab. (1850).

8271. AMERICANA (Gm.); Baird, Br. et Rid., *H. N. Am. B.* II, p. 65, pl. 28, f. 11; Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1881, pp. 3, 182; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 416; *flavicollis*, Gm.; *nigricollis*, Nordm. — États-Unis à l'E. des Mont. Roch., Amér. centr., Colombie, Vénézuéla, Guyane.

8272. ?TOWNSENDI (Audub.), *B. N. Am.*, pl. 400, f. 4 (1). — Pennsylvanie.

## 1189. PSEUDOCHLORIS

*Orospina*, Cab. (1883, nec Kaup, 1829); *Sycalis* (pt.), auct.; *Pseudochloris*, Sharpe (1888).

8273. LUTEA (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1837, p. 74; Scl., *Ibis*, 1872, p. 46, pl. 2, f. 2; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 56; *chloris*, Cab.; *chloropsis*, Bp. — Pérou, Bolivie, Argentine W.

8274. LUTEOCEPHALA (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1837, p. 74; d'Orb., *Voy. Am. mér.*, *Ois.*, p. 360, pl. 44, f. 2; Sharpe, *l. c.*, p. 776. — Bolivie.

8275. UROPYGIALIS (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1837, p. 75; Scl., *Ibis*, 1872, p. 47; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 58; *pentlandi*, Bp. — Bolivie.

8276. SHARPEI, Berl. et Stolzm., *Ibis*, 1894, p. 386. — Pérou.

8277. AUREIVENTRIS (Philip. et Landb.), *Arch. f. Naturg.*, 1864, p. 49; Scl., *Ibis*, 1867, p. 323, 1872, p. 47; Sharpe, *l. c.*, p. 777. — Chili, Bolivie, Argentine W.

8278. MENDOZÆ, Sharpe, *Cat. B.* XII, p. 778. — Mendoza (Argentine).

8279. CITRINA (Pelz.), *Orn. Bras.*, pp. 232, 333; Scl., *Ibis*, 1872, p. 48; ?*xanthorrhoa*, Bp. — Brésil, Guyane, Colombie.

(1) On ne connaît qu'un unique exemplaire, qui n'est probablement qu'une aberration ou un hybride. Le Dr Coues pense que c'est un hybride du *S. americana* et du *Guiraca cærulea*.

Digitized by Google

8280. PRATENSIS (Cab.), *J. f. O.*, 1883, p. 108, pl. 1, f. 1. Tucuman (Argentine).
8281. LEBRUNI, Oust., *Miss. sc. Cap Horn, Ois.*, p. 98. Patagonie.

## 1190. NESOSPIZA

*Nesospiza*, Cab. (1873).

8282. ACUNHÆ, Cab., *J. f. O.*, 1873, p. 154; Scl., *Rep. Zool. Coll. Voy. « Challenger »*, II, *Birds*, p. 112, pl. 24; *brasiliensis*, Carm. (nec Gm.) Ile Tristan d'Acunha.

## 1191. PHRYGILUS

*Phrygilus*, Cab. (1844); *Rhopospina*, Cab. (1850); *Melanodera*, Bp. (1850); *Geospizopsis*, Bp. (1856); *Corydospiza*, Sund. (1872).

8283. GAYI (Eyd. et Gerv.), *Mag. de Zool.*, 1834, *Ois.*, pl. 23; Bp., *Consp.* I, p. 477; *formosa*, Gould, *Voy. « Beagle » B.* III, p. 95; Bp., *l. c.* Chili, Patagonie.
8284. ALDUNATEI (Gay), *Faun. Chilen.* I, p. 356; Scl., *Ibis*, 1869, p. 285; *gayi*, auct. plur. (nec Eyd. et Gerv.) Chili, Argentine W., Patagonie.
2195. *Var.* CANICEPS, Burm., *J. f. O.*, 1861, p. 158; id., *Reise La Plata-St.* II, p. 487; Sharpe, *l.c.*, p. 784. Argentine, Patagonie.
2196. *Var.* PUNENSIS, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 434; *gayi*, auct. plur. (nec E. et G.); Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 32. Pérou.
2197. *Var.* SATURATA, Sharpe, *Cat. B.* XII, p. 785; *gayi*, d'Orb. et Lafr.; *atriceps*, Scl. et Salv. (nec d'Orb.); Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 34. Bolivie, Pérou W.
8285. CHLOLONOTUS, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1896, p. 550. Pérou centr.
8286. ATRICEPS (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1837, p. 76; d'Orb., *Voy. Am. mér., Ois.*, p. 363, pl. 47, f. 2; Scl., *Cat. Am. B.*, p. 110. Bolivie, Pérou.
8287. MELANODERUS (Quoy et Gaim.), *Voy. « Uranie », Zool.* I, p. 100; Gould, *Voy. « Beagle », B.*, p. 95, pl. 32; Scl., *P. Z. S.*, 1860, p. 385; *typica*, Bp. Patagonie, Iles Malouines.
8288. PRINCETONIANUS, Scott, *Ibis*, 1900, p. 540. Patagonie.
8289. XANTHOGRAMMUS (Gray), *Voy. « Beagle »*, *B.*, p. 196, pl. 23; Scl., *P. Z. S.*, 1860, p. 385; Sharpe, *l. c.*, p. 789. Chili, Patagonie, Malouines.
8290. FRUTICETI (Kittl.), *Kupfert. Vög.*, p. 18, pl. 23, f. 1; Burm., *La Plata Reis.* II, p. 487; Scl., *Cat. Am. B.*, p. 111; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 37; *erythrorhyncha*, Less.; *luctuosa*, Eyd. et Gerv. Pérou, Chili, Bolivie, Argentine, Patagonie (Andes).
8291. CORACINUS, Scl., *P. Z. S.*, 1891, p. 153, pl. 13. Chili.
8292. CARBONARIUS (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1837, p. 79; d'Orb., *Voy., Zool.*, p. 361, pl. 15, f. 2; Burm., *La Plata Reis.* II, p. 487. Bolivie, Argentine W.

Digitized by Google

8293. UNICOLOR (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1837, p. 79; Cab., *Arch. f. Naturg.*, 1844, p. 290; Jard., *Contr. Orn.*, 1849, p. 44, pl. 20; *rusticus*, Cab., *l. c.*; *plumbea*, Philip. — Vénézuéla, Colombie, Ecuador jusqu'à Magellan (Andes).

8294. ALAUDINUS (Kittl.), *Kupfert. Vög.*, p. 18, pl. 23, f. 2; Bp., *Consp.* I, p. 476; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 35; *guttata*, Meyen. — Ecuador, Pérou, Chili (Andes).

8295. PLEBEIUS, Cab., *Arch. f. Naturg.*, 1844, p. 290; id., in *Tsch. Fauna Per., Aves*, p. 219, pl. 19, f. 1; Tacz., *l. c.*, p. 39. — Ecuador, Pérou, Bolivie, Argentine W.

8296. OCULARIS, Scl., *P. Z. S.*, 1858, pp. 454, 552, pl. 45; Tacz., *l. c.*, p. 40. — Ecuador, Pérou.

8297. ERYTHRONOTUS (Philip. et Landb.), *Arch. f. Naturg.*, 1865, p. 121; Scl., *Ibis*, 1872, p. 48; Tacz., *l. c.*, p. 62; *dorsalis*, Cab. — Tucuman jusqu'aux Andes du S. du Pérou.

## 1192. IDIOPSAR

*Idiopsar*, Cass. (1866).

8298. BRACHYURUS, Cass., *Pr. Philad. Acad.*, 1866, p. 414; Sclat., *Ibis*, 1884, p. 240, pl. 7. — La Paz (Bolivie).

## 1193. SPODIORNIS

*Spodiornis*, Sclat. (1866).

8299. JARDINEI, Scl., *P. Z. S.*, 1866, p. 323; Sharpe, *l. c.*, p. 798. — Colombie, Ecuador.

8300. JELSKII, Tacz., *Ornith. Pérou*, III, p. 42; Sharpe, *l. c.* — Pérou.

## 1194. XENOSPINGUS

*Xenospingus*, Cab. (1867).

8301. CONCOLOR (d'Ord. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1837, p. 20; d'Orb., *Voy. Zool.*, p. 216, pl. 18, f. 1; Cab., *J. f. O.*, 1867, p. 349; Tacz., *l. c.*, p. 26. — Pérou, Bolivie.

## 1195. DIUCA

*Diuca*, Rchb. (1850); *Hedyglossa*, Cab. (1850).

8302. GRISEA (Less.), *L'Inst.*, 1834, p. 316; Scl., *Cat. Am. B.*, p. 111; *diuca*, Mol., *Sagg. Hist. Nat. Chili*, p. 249; Eyd. et Gerv., *Mag. de Zool.*, 1836, p. 18, pl. 69; *cinereus*, Peale; *vera*, Burm. — Chili.

2198. *Var.* MINOR, Bp., *Consp.* I, p. 476; Sharpe, *l. c.*, p. 801. — Patagonie.



Digitized by Google

8303. SPECULIFERA (d'Orb. et Lafr.), *l. c.*, p. 78; d'Orb., *Voy.*, *Zool.*, p. 362, pl. 46, f. 1; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 41. — Pérou, Bolivie.

### 1196. CORYPHOSPINGUS

*Lophospiza*, Bp. (1850, nec Kp.); *Coryphospingus*, Cab. (1850); *Lophospingus*, Cab. (1878); *Schistospiza*, Sharpe (1888).

8304. CUCULLATUS (P. L. S. Müll.), *Syst. Nat.*, *Anh.*, p. 166 (1776); *cristata* (Gm.); Cab., *Mus. Hein.* I, p. 145; *araguira*, Vieill., *Ois. Chant.*, pl. 28; *rubescens*, Sw. — Guyane, Brésil, Bolivie, Pérou.

8305. CRISTATELLUS (Spix), *Av. Bras.* II, p. 40, pl. 55, f. 1; *pileata*, Max., *Beitr. Naturg. Bras.* III, p. 605; Burm., *Thiere Bras.* III, p. 214; *ornata*, Less.; *ruficapilla*, Gray. — Brésil, Vénézuéla, Colombie.

8306. GRISEOCRISTATUS (d'Orb. et Lafr.), *l. c.*, p. 79; d'Orb., *Voy.*, *Zool.*, p. 365, pl. 67, f. 1; Scl., *Cat. Am. B.*, p. 162; Sharpe, *l. c.*, p. 806. — Bolivie.

8307. PUSILLUS (Burm.), *J. f. O.*, 1863, p. 254; Salv., *Ibis*, 1880, p. 354, pl. 9, f. 1; Cab., *J. f. O.*, 1878, p. 195. — République Argentine.

### 1197. TIARIS

*Tiaris*, Sw. (1827).

8308. ORNATA (Max.), *Reis. Bras.* II, p. 191; Tem., *Pl. col.* 208; Sw., *Zool. Journ.*, 1827, p. 351; Burm., *Thiere Bras.* III, p. 257. — Brésil.

### 1198. RHODOSPINGUS

*Coryphospingus* (pt.), auct.; *Rhodospingus*, Sharpe (1888).

8309. CRUENTUS (Less.), *Rev. Zool.*, 1844, p. 435; Sharpe, *Cat. B.* XII, p. 808, pl. 15, f. 1. — Ecuador, Pérou.

2199. *Var.* MENTALIS, Sharpe, *l. c.*, p. 809, pl. 15, f. 2. — Ile Puna (Golfe de Guayaquil).

### 1199. PAROARIA

*Paroaria*, Bp. (1832); *Calyptrophorus*, Cab. (1847); *Coccopsis*, Rchb. (1850).

8310. CUCULLATA (Lath.), *Ind. Orn.* I, p. 378; Vieill., *Ois. Chant.*, p. 102, pl. 70; Sharpe, *l. c.*, p. 809, pl. 16, f. 1. — Bolivie, Argentine, Brésil S.

8311. DOMINICANA (Lin.); Burm., *Th. Bras.* III, p. 211; *larvata*, Bodd.; Sharpe, *l. c.*, p. 811, pl. 16, f. 2. — Brésil.

8312. NIGROGENYS (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1846, p. 273; Sharpe, *l. c.*, p. 814, pl. 16, f. 3; *nigroaurita*, Cass., *Journ. Phil. Ac.* I, p. 296, pl. 41, f. 3. — Guyane, Vénézuéla, Trinidad.

Digitized by Google

8313. GULARIS (Lin.); d'Orb., *Voy.*, *Ois.*, p. 279; Sharpe, *l. c.*, p. 813, pl. 16, f. 4. — Guyane, Amazone, Pérou.

8314. CAPITATA (d'Orb. et Lafr.), *l. c.*, p. 29; d'Orb., *Voy.*, *Ois.*, p. 278, pl. 19, f. 2; Sharpe, *l. c.*, p. 812, pl. 16, f. 5. — Brésil, Paraguay, Argentine.

2200. *Var.* CERVICALIS, Scl., *Cat. Am. B.*, p. 108; Sharpe, *l. c.*, p. 814, pl. 16, f. 6. — Brésil, Bolivie.

## FAM. XLV. — TANAGRIDÆ (1)

### SUBF. I. — PITYLINÆ

#### 1200. PITYLUS

*Pitylus*, Cuv. (1829); *Cissurus*, *Periporphyrus*, *Caryothraustes*, Rchb. (1850).

8315. GROSSUS (Lin.); *Pl. Enl.* 154; Cab., in *Schomb. Guiana*, III, p. 677; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 548; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 331. — Du Nicarag. à la Col. et jusqu'au Pérou, Vénéz., Guyane, Amaz.

8316. FULIGINOSUS (Daud.), *Orn.* II, p. 372; Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 64; *cærulescens*, Vieill.; *gnatho*, Licht.; *atrochalibeus*, Jard. et Sel., *Ill. Orn.* I, pl. 3; *psittacina*, Spix, *Av. Bras.* II, p. 44, pl. 57, f. 2; *erythrorhynchus*, Sw. — Brésil S. et E.

8317. ERYTHROMELAS (Gm.); Vieill., *Gal. Ois.* I, p. 70, pl. 59; Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 65. — Guyane, Bas-Amazone.

8318. CELÆNO (Licht.), *Preis-Verz.*, p. 2; Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 65; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 332, pl. 24; *atro-purpuratus* (mas.), *atro-olivaceus* (fem.), Lafr.; *mexicana*, Less. — Mexique.

8319. VIRIDIS (Vieill.), *Enc. méth.*, p. 1017; Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 65; *canadensis!* Lin.; *cayanensis*, Bp.; *personatus*, Less. — Guyane, Bas-Amazone.

8320. BRASILIENSIS (Cab.), *Mus. Hein.* I, p. 144; Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 66; *viridis*, Max. (nec V.); *cayanensis*, Licht. (nec Bp.) — Brésil S. et E.

8321. POLIOGASTER, Du Bus, *Bull. Acad. Brux.* XIV, 2, p. 105; id., *Esq. Orn.*, pl. 22; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 333; *flavocinereus*, Cass.; *episcopus*, Bp. — Mexique S. et Guatémala.

2201. *Var.* SCAPULARIS, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 586. — De l'Honduras à Panama.

8322. HUMERALIS, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* VIII, p. 467; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 167, pl. 84; Scl., *Cat.*, p. 307. — Colombie, Ecuador.

(1) Voy. : Sclater, *Cat. Birds Brit. Mus.* XI, pp. 50-307 (1886).

Digitized by Google

### 1201. SCHISTOCHLAMYS

*Schistochlamys*, Rchb. (1850); *Orchesticus* (pt.), auct. plur.

8323. CAPISTRATA (Max.), *Reise Bras.* II, p. 500; Spix, *Av. Bras.* II, p. 41, pl. 54, f. 1; Scl., *l. c.*, p. 501; *leucophæa*, Licht. — Brésil E. et S.

8324. ATRA (Gm.); *Pl. Enl.* 714, f. 2; Cab., *Mus. Hein.* I, p. 141; *melanopis*, Lath.; *olivina*, Scl., *P. Z. S.*, 1864, p. 307, 1873, p. 186, pl. 21 (juv.) — Amérique mérid. trop. jusqu'au 23° l. S. environ.

### 1202. CISSOPIS

*Cissopis*, Vieill. (1816); *Bethylus*, Cuv. (1817).

8325. LEVERIANA (Gm.); Scl., *Cat. B.* XI, p. 299; *picatus*, Lath.; *collurio*, Daud.; *medius*, Bp.; Scl., *P.Z.S.*, 1856, p. 79; *bicolor*, Lafr. et d'Orb.; *minor*, Tsch.; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 556. — Amérique mérid. trop. jusque vers le 20° l. S. (excl. Brésil).

2202. *Var.* MAJOR, Cab., *Mus. Hein.* I, p. 144; Scl., *l. c.*, p. 300; *picatus*, Max.; *leverianus* (pt.), auct. plur. — Brésil E. et S.

### 1203. OREOTHRAUPIS

*Oreothraupis*, Scl. (1856).

8326. ARREMONOPS (Jard.), *Edinb. N. Phil. Journ.*, 1855, p. 119; Scl., *P. Z. S.*, 1855, p. 84, pl. 92, 1856, p. 80. — Ecuador.

### 1204. ORCHESTICUS

*Orchesticus*, Cab. (1851).

8327. ABEILLEI (Less.), *Rev. Zool.*, 1839, p. 40; Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 66; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 220; *occipitalis*, Natt. — Brésil S. et E.

### 1205. LAMPROSPIZA

*Lamprospiza*, Cab. (1847).

8328. MELANOLEUCA (Vieill.), *N. Dict.* XIV, p. 105; Scl., *Tan. Cat. Sp.*, p. 4; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 218; *duplicata*, Lath; *habia*, Less., *Cent. Zool.*, p. 186, pl. 59. — Guyane franç., Bas-Amazone.

### 1206. SALTATOR

*Saltator*, Vieill. (1816); *Stelgidostomus*, Ridgw. (1898).

8329. ATRICEPS, Less., *Cent. Zool.*, p. 208, pl. 69; Bp., — Mexique S., Amérique

Digitized by Google

*Consp.* I, p 488; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 325; *giganteus*, Bp.; *raptor*, Cabot, *Bost. Journ.* V, p. 90, pl. 12; *gnatho*, Licht. — centrale jusqu'à Panama.

8330. MAGNOIDES, Lafr., *Rev. Zool.*, 1844, p. 41; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 327; *gigantodes*, Cab.; *magnus*, Lawr. (nec Gm.); *intermedius*, Lawr. — Mexique S., Amérique centrale jusqu'à Panama.

8331. MAGNUS (Gm.); *Pl. Enl.* 205; Bp., *Consp.* I, p. 489; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 539; *cayanus*, Bodd. — Amér. mérid. jusqu'au S. du Brésil.

8332. ATRIPENNIS, Scl., *Pr. Ac. Sc. Philad.*, 1856, p. 261; id., *Cat.*, p. 286. — Ecuador, Colombie.

8333. SIMILIS, Lafr. et d'Orb., *Mag. de Zool.*, 1837, p. 36; d'Orb., *Voy.*, *Ois.*, p. 290, pl. 28, f. 2; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 218; *superciliaris*, Max. (nec Spix); *gutturalis*, Licht. — Brésil E. et S., Argentine N.-E.

8334. MAXILLOSUS, Cab., *Mus. Hein.* I, p. 142; Scl., *Cat.*, p. 287; *superciliaris*, Licht. (nec Spix); *gularis*, Lafr. — Brésil, Uruguay.

8335. GRANDIS (Licht.), *Preis-Verz.*, p. 2; Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 72; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 328; *rufiventris*, Vig.; *vigorsi*, Gray; *icterophrys*, Lafr., *Rev. Zool.*, 1844, p. 41. — Mexique S., Yucatan, Amér. centr. jusqu'au Costa-Rica.

2203. *Var.* PLUMBEICEPS, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* VIII, p. 477. — Mexique W.

8336. OLIVASCENS, Cab., in *Schomb. Guian.* III, p. 676; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 218; *icterophrys*, Léot; *plumbeus*, Bp. — Guyane, Vénézuéla, Trinid., Colomb. N.

8337. CÆRULESCENS, Vieill., *N. Dict.* XIV, p. 105; Burm., *La Plata Reise*, II, p. 480; Scl., *Cat.*, p. 290. — Paraguay, Uruguay, Argentine, Bolivie.

8338. SUPERCILIARIS (Spix), *Av. Bras.* II, p. 44, pl. 57; Cab., *Mus. Hein.* I, p. 142; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 541; *cærulescens*, Tsch.; *muta*, Licht.; *azaræ*, d'Orb.; *albicollis*, Tacz. — Amazone, Pérou, Ecuador.

8339. ORENOCENSIS, Lafr., *Rev. Zool.*, 1846, p. 274; Scl., *Cat.*, p. 291; *genalis*, Licht. — Vénézuéla.

8340. AURANTIROSTRIS, Vieill., *N. Dict.* XIV, p. 183; Burm., *La Plata Reise*, II, p. 481; Scl., *Cat.*, p. 292. — Parag., Urug., Argent. au N. des Pampas.

8341. ALBOCILIARIS (Phil. et Landb.), *Arch. f. Nat.*, 1863, p. 122; *laticlavius*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1869, p. 151; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 545. — Bolivie, Pérou.

8342. ICTEROPYGUS, Du Bus, *Esq. Orn.*, pl. 15 (*icteropyga*). — Mexique.

8343. ATRICOLLIS, Vieill., *N. Dict.* XIV, p. 104; Spix, *Av. Bras.* II, p. 43, pl. 56, f. 2; *validus*, Vieill.; *jugularis*, Licht.; *sordidus*, Less. — Brésil S. et E., Paraguay, Bolivie.

8344. RUFIVENTRIS, Lafr. et d'Orb., *Mag. de Zool.*, 1837, p. 35; d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 289, pl. 28, f. 1; Scl., *Cat.*, p. 293. — Bolivie.

Digitized by Google

8345. FLAVIDICOLLIS, Scl., *P. Z. S.*, 1860, p. 274; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 543; *olivascens* (pt.), Scl. (juv.) — Ecuador W.

8346. ALBICOLLIS, Vieill., *N. Dict.* XIV, p. 107; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 330; *maculipectus* et *striatipectus*, Lafr., *R. Z.*, 1847, p. 73; *isthmicus*, Scl., *P. Z. S.*, 1861, p. 130. — Véragua, Panama, Col., Vénéz., Trin., Ecuador, Pérou.

8347. IMMACULATUS, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1892, p. 375; *similis*, Tsch. (nec Lafr.); *albicollis*, Tacz. (nec V.); *superciliaris*, Tacz. (nec Spix). — Pérou centr.

8348. GUADALUPENSIS, Lafr., *Rev. Zool.*, 1844, p. 167; Scl., *Cat.*, p. 295; *martinicensis*, Bp., *Consp.* I, p. 489. — Guadeloupe, Martinique, Ste-Lucie (Antil.

## 1207. PSITTOSPIZA

*Psittospiza*, Bp. (1850); *Chlorornis*, Rchb. (1850).

8349. RIEFFERI (Boiss.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 4; Gray, *Gen. B.* II, pl. 89; Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 78; *prasina*, Less. — Colombie, Ecuador.

2204. *Var.* ELEGANS (Tsch.), *Arch. f. Naturg.*, 1844, 1, p. 288; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1879, p. 603; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 538. — Pérou, Bolivie.

## 1208. CONOTHRAUPIS

*Conothraupis*, Tacz. (1880).

8350. SPECULIGERA (Gould), *P. Z. S.*, 1855, p. 69; Tacz., *P. Z. S.*, 1880, p. 198, pl. 21; id., *Orn. Pér.* II, p. 546. — Pérou E.

## 1209. DIUCOPIS

*Diucopis*, Bp. (1850).

8351. FASCIATA (Licht.), *Doubl.*, p. 32; Bp., *Consp.* I, p. 491; *axillaris*, Spix, *Av. Bras.* II, p. 41, pl. 54, f. 2. — Brésil E. et S.

## 1210. ARREMON

*Arremon*, Vieill. (1816).

8352. SILENS (Bodd.), *Tabl. d. Pl. enl.*, p. 46; *Pl. enl.* 742; Bp., *Consp.* I, p. 487; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 216; *torquatus*, Vieill.; id., *Gal. Ois.*, p. 105, pl. 78. — Trinidad, Guyane, Bas-Amazone, Brésil.

2205. *Var.* ORBIGNII, Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 81; Scl., *Cat.*, p 274; *silens* (pt.), auct. plur. (nec Bodd.) — Bolivie, Argentine.

8353. FLAVIROSTRIS, Sw., *An. in Menag.*, p. 347; Bp., *Consp.* I, p. 488; Scl., *Cat.*, p. 274. — Cametá (Brésil).

8354. DEVILLEI, Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 81; Des M., in *Casteln. Voy. Ois.*, p. 69, pl. 20, f. 2. — Goyas (Brésil).

Digitized by Google

8355. SPECTABILIS, Scl., *P. Z. S.*, 1854, p. 114, pl. 67; Berl. et Tacz., *P. Z. S.*, 1883, p. 548; *erythrorhynchus*, Scl., *P. Z. S.*, 1855, p. 85, pl. 89. — Colombie, Ecuador, Pérou.

8356. AURANTIIROSTRIS, Lafr., *Rev. Zool.*, 1847, p. 72; Des M., *Icon. Orn.*, pl. 55; *rufi-dorsalis*, Cass., *Pr. Ac. Sc. Philad.*, 1865, p. 170. — Mexique S., Amérique centr.

2206. *Var.* SATURATA, Cherr., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1891, pp. 343-45. — Costa-Rica.

8357. NIGRIROSTRIS, Scl., *Cat. B.* XI, p. 276. — Pérou S.

8358. SEMITORQUATUS, Sw., *An. in Menag.*, p. 337; Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 82; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 217; *interrupta*, Natt., *MS.* — Brésil S.

8359. AXILLARIS, Scl., *P. Z. S.*, 1854, p. 97; id., *Cat.*, p. 277. — Colombie.

8360. NIGRICEPS, Tacz., *P. Z. S.*, 1880, p. 196; id., *Orn. Pér.* II, p. 335. — Callacate (Pérou).

8361. WUCHERERI, Scl. et Salv., *Nomencl.*, pp. 25, 157; Scl., *Cat. B.* XI, pl. 17. — Bahia (Brésil).

8362. POLIONOTUS, Bp., *Consp.* I, p. 488; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 217. — Cuyaba (Brésil).

8363. ABEILLEI, Less., *Rev. Zool.*, 1844, p. 433; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 334; Scl., *Cat.*, p. 278. — Ecuador W.

8364. SCHLEGELI, Bp., *Consp.* I, p. 488; Scl., *Cat.*, p. 279. — Col. et Vénéz. (côtes).

## 1211. NESOSPINGUS

*Nesospingus*, Scl. (1885).

8365. SPECULIFERUS (Lawr.), *Ibis*, 1875, p. 383, pl. 9, f. 1; Scl., *Ibis*, 1885, p. 273; id., *Cat.*, p. 272. — Porto-Rico.

## 1212. BUARREMON

*Buarremon*, *Chrysopoga*, Bp. (1850); *Lysurus*, *Pselliophorus*, Ridgw. (1898).

8366. TORQUATUS (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1837, p. 34; Bp., *Consp.* I, p. 483; *affinis*, d'Orb., *Voy.*, *Ois.*, p. 282, pl. 27, f. 1. — Bolivie.

8367. POLIOPHRYS, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1896, p. 347; *torquatus*, Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 330 (nec d'Orb.) — Pérou centr.

8368. BASILICUS, Bangs, *Pr. Biol. Soc. Washington*, 1898, p. 159. — Colombie.

8369. PHÆOPLEURUS, Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 85; id., *Cat.*, p. 256. — Vénézuéla.

8370. ASSIMILIS (Boiss.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 67; Bp., *Consp.* I, p. 484; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 331; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 318. — Du Costa-Rica au Pérou et Vénézuéla.

Digitized by Google

8371. VIRENTICEPS, Bp., *Compt.-Rend.* XLI, p. 657; Scl., *P.Z.S.*, 1856, p. 85; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 319. Mexique.

8372. BORELLI, Salvad., *Boll. Mus. Torino*, XII, 1897, p. 6. San-Lorenzo.

8373. BRUNNEINUCHA (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1839, p. 97; Bp., *Consp.* I, p. 484; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 529; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 319; *frontalis*, Tsch., *Arch. f. Nat.*, 1844, p. 289; id., *F. P.*, p. 212; *xanthogenys*, Cab. Mexique S., Amérique centr., Colombie, Ecuador, Pérou, Vénézuéla.

8374. INORNATUS, Scl. et Salv., *Ibis*, 1879, p. 427; Scl., *Cat.*, p. 259; *brunneinuchus*, Scl., *P. Z. S.*, 1859, p. 138 (nec Lafr.). Ecuador.

8375. ATRICAPILLUS, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1874, p. 396; Scl., *Cat.*, p. 259. Colombie.

8376. GUTTURALIS (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1843, p. 98; Bp., *Consp.* I, p. 484; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 320; *Chr. typica*, Bp.; *chrysopogon*, Scl.; *albinucha* (pt.), Scl. et Salv. (1860). Guatémala, Amérique centr., Colombie.

8377. ALBINUCHA (d'Orb. et Lafr.), *Rev. Zool.*, 1838, p. 165; Bp., *Consp.* I, p. 484; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 321; *vitellinus*, Licht.; *mexicana*, Less. Mexique S., Colombie (pas observé dans l'Amérique centr.)

8378. MELANOCEPHALUS, Salv. et Godm., *Ibis*, 1880, p. 121; Scl., *Cat.*, p. 261. Sierra-Nevada (Santa-Marta).

8379. LEUCOPIS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1878, p. 459; Scl., *Cat.*, p. 261, pl. 14. Ecuador.

8380. CASTANEICEPS, Scl., *P. Z. S.*, 1859, p. 441; id., *Cat.*, p. 261. Colombie, Ecuador.

8381. CRASSIROSTRIS, Cass., *Pr. Ac. Sc. Phil.*, 1865, p. 170; Salv., *P. Z. S.*, 1867, p. 140, pl. 14; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 323. Costa-Rica, Véragua.

8382. TIBIALIS (Lawr.), *Ann. Lyc. N. Y.* VIII, p. 41; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 322, pl. 23, f. 2. Costa-Rica, Véragua.

## 1213. PIPILOPSIS

*Pipilopsis*, Bp. (1850); *Carenochrous*, Scl. (1856).

8383. MELANOLÆMUS (Scl. et Salv.), *Ibis*, 1879, p. 425, pl. 10, f. 2; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 526. Pérou S.

8384. RUFINUCHA (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1837, p. 35; d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 283, pl. 27, f. 2; Scl., *Cat.*, p. 263. Bolivie.

8385. MELANOPS (Scl. et Salv.), *P. Z. S.*, 1876, p. 253; Scl., *Cat.*, p. 263; *rufinuchus*, Scl., *Cat. Am. B.*, p. 91. Bolivie.

8386. LATINUCHA (Du Bus), *Bull. Acad. Brux.* XXII, 1, p. 154; Scl. et Salv., *Ibis*, 1879, p. 427, pl. 10, f. 1; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 524; *specularis*, Tacz., *P. Z. S.*, 1879, p. 228. Pérou, Ecuador E.

Digitized by Google

8387. SPODIONOTUS (Scl. et Salv.), *Ibis*, 1879, p. 425; Scl., *Cat.*, p. 264; *latinuchus* (pt.), Scl. (1856-60). Ecuador W.

8388. COMPTUS (Scl. et Salv.), *Ibis*, 1879, p. 426; Scl., *Cat.*, pl. 15. Ecuador E.

8389. ELÆOPRORUS (Scl. et Salv.), *P. Z. S.*, 1879, p. 504; id., *Ibis*, 1879, p. 427. Antioquia (Colombie).

8390. SIMPLEX (Berl.), *Ibis*, 1888, p. 128. Colombie.

8391. ALBIFRENATUS (Boiss.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 68; Bp., *Consp.* I, p. 484; *mystacalis*, Scl., *Rev. Mag. de Zool.*, 1852, p. 8; id., *Contr. Orn.*, 1852, p. 131, pl. 99. Colombie.

8392. MERIDÆ (Scl. et Salv.), *P. Z. S.*, 1870, p. 785; Scl., *Cat.*, p. 266. Mérida (Vénézuéla).

8393. LEUCOPTERUS (Jard.), *Edinb. N. Phil. Journ.* n. s. III, p. 92; Scl., *P. Z. S.*, 1855, p. 214, pl. 109. Ecuador.

8394. DRESSERI (Tacz.), *P. Z. S.*, 1883, p. 70; id., *Orn. Pér.* II, p. 528. Naucho (Pérou).

8395 SEEBOHMI (Tacz.), *P. Z. S.*, 1883, p. 70; id., *Orn. Pér.* II, p. 527. Cajatambo (Pérou).

8396. SCHISTACEUS (Boiss.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 69; Scl., *P. Z. S.*, 1855, p. 155; id., *Cat.*, p. 267. Colombie, Ecuador E.

8397. TACZANOWSKII (Scl. et Salv.), *P. Z. S.*, 1875, p. 236, pl. 35, f. 2; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 526; *mystacalis*, Tacz. (nec Scl.) Pérou.

8398. CASTANEIFRONS (Scl. et Salv.), *P. Z. S.*, 1875, p. 235, pl. 35, f. 1; *schistaceus*, Scl. et Salv. (1870, nec Boiss.) Andes de Mérida (Vénézuéla).

8399. PALLIDINUCHA (Boiss.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 68; Scl., *Cat.*, p. 268; *sordidus*, Lawr. (juv.) Colombie, Ecuador.

8400. TRICOLOR (Tacz.), *P. Z. S.*, 1874, p. 516, pl. 65; id., *Orn. Pér.* II, p. 525; Scl., *Cat.*, pl. 16; *rufinucha*, Tsch. (nec d'Orb. et Lafr.) Pérou centr.

8401. BARONI (Salv.), *Novit. Zool.* II, p. 5, pl. 1, f. 1. Pérou.

8402. SEMIRUFUS (Boiss.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 69; Scl., *P. Z. S.*, 1855, p. 155; id., *Cat.*, p. 269. Colombie, Vénézuéla.

8403. RUFIGENIS (Salv.), *Novit. Zool.* II, p. 5, pl. 1, f. 2. Pérou.

8404. PERSONATUS (Cab.), *Schomb. Reis. Guian.* III, p. 678; Bp., *Consp.* I, p. 485; Scl., *Cat.*, p. 270. Guyane anglaise.

8405. FULVICEPS (Lafr. et d'Orb.), *Mag. de Zool.*, 1837, p. 77; d'Orb., *Voy., Ois.*, p. 362, pl. 46, f. 2; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 532. Bolivie, Pérou.

8406. CITRINELLUS (Cab.), *J. f. O.*, 1883, p. 109, pl. 1, f. 2. Tucuman (Argentine).

## 1214. PEZOPETES

*Pezopetes*, Cab. (1860).

8407. CAPITALIS, Cab., *J. f. O.*, 1860, p. 415; Salv. et Godm., *Biol. Cent.-Am.*, I, p. 322, pl. 23, f. 1. Costa-Rica, Chiriqui.



Digitized by Google

## 1215. MICROSPINGUS

*Microspingus*, Tacz. (1874).

8408. TRIFASCIATUS, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, p. 132, pl. 19, f. 1; id., *Orn. Pér.* II, p. 525; Scl., *Cat.*, p. 252. — Pérou, Bolivie.

## 1216. UROTHRAUPIS

*Urothraupis*, Berl. et Tacz. (1885).

8409. STOLZMANNI, Berl. et Tacz., *P. Z. S.*, 1885, p. 83, pl. 8. — Ecuador E. (Andes).

## 1217. CHLOROSPINGUS

*Chlorospingus* et *Hemispingus*, Cab. (1851); *Dacnidea*, Tacz. (1874); *Pseudospingus*, Berl. et Stolzm. (1896).

8410. OPHTHALMICUS (Du Bus), *Bull. Acad. Brux.*, 1847, pt. 2, p. 106; Scl., *P. Z. S.*, 1856, pp. 89, 302; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 314; *leucophrys*, Cab., *Mus. Hein.* I, p. 139. — Mexique S.

8411. ALBIFRONS, Salv. et Godm., *Ibis*, 1889, p. 237. — Sierra Madre (Mex.)

8412. ALBITEMPORALIS (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1848, p. 12; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 513; Scl., *Cat.*, p. 259; *flaviventris*, Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 91. — Costa-Rica, Véragua, Col., Bolivie, Pérou.

2207. *Var.* VENEZUELANA, Berl., *Orn. Monatsb.* I, p. 11. — Mérida (Vénézuéla).

8413. OLIVACEUS (Bp.), *Consp.* I, p. 473; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 315; Scl., *Cat.*, p. 240. — Vera-Paz, Guatémala.

8414. POSTOCULARIS, Cab., *J. f. O.*, 1866, p. 163; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 314. — Guatémala (Volcans).

8415. SIGNATUS, Tacz. et Berl., *P. Z. S.*, 1885, p. 82; Scl., *Cat.*, p. 241. — Ecuador.

8416. PUNCTULATUS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1869, p. 440; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 316, pl. 22, f. 1. — Véragua.

8417. PILEATUS, Salv., *P. Z. S.*, 1864, p. 581; Salv. et Godm., *l. c.*, pl. 22, f. 2. — Costa-Rica, Chiriqui.

2208. *Var.* ATRICEPS, Nels., *Auk*, 1897, p. 65. — Mexique S.

8418. FLAVIPECTUS (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 227; Scl., *Cat.*, p. 242. — Colombie, Ecuador.

8419. CANIGULARIS (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1848, p. 11; Scl., *l. c.*; *veneris*, Bp. — Colombie, Ecuador.

8420. OLIVACEICEPS, Underw., *Ibis*, 1898, p. 612. — Costa-Rica.

8421. PHÆOCEPHALUS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1877, p. 521, pl. 52, f. 2. — Ecuador W.

8422. FLAVIGULARIS (Scl.), *Rev. Zool.*, 1852, p. 8; id., *Contr. Orn.*, 1852, p. 131, pl. 98; id., *P. Z. S.*, 1855, p. 155; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 514. — Colombie, Ecuador, Pérou, Bolivie.

Digitized by Google

2209. *Var.* PARVIROSTRIS, Chapm., *Bull. Amer. Mus. N. H.*, 1901, p. 227. — Inca Mine (Pérou).

8423. HYPOPHÆUS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, p. 389; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 317, pl. 22, f. 3. — Véragua.

8424. FLAVOVIRENS (Lawr.), *Ann. Lyc. N. Y.*, 1867, p. 467; Scl., *Ibis*, 1885, p. 274. — Ecuador.

8425. SEMIFUSCUS, Scl. et Salv., *Nomencl.*, pp. 24, 157; Scl., *Cat.*, p. 244. — Ecuador.

8426. CINEREOCEPHALUS, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, pp. 132, 516; Scl., *l. c.* — Pérou centr.

8427. ATRIPILEUS (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1842, p. 335; Scl., *P. Z. S.*, 1855, p. 155; id., *Cat.*, p. 245. — Colombie, Ecuador.

8428. AURICULARIS, Cab., *J. f. O.*, 1873, p. 318; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 519. — Pérou.

8429. FRONTALIS (Tsch.), *Arch. f. Naturg.*, 1844, p. 284; id., *Faun. Per.*, pp. 28, 194, pl. 13, f. 1; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 517. — Pérou.

8430. CALOPHRYS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1876, p. 354; Scl., *Cat.*, p. 245. — Bolivie.

8431. RUBRIROSTRIS (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 227; Scl., *P. Z. S.*, 1855, p. 155; id., *Cat.*, p. 246. — Colombie, Ecuador.

8432. CHRYSOGASTER, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, p. 517; id., *Orn. Pér.* II, p. 515. — Pérou.

8433. LEOTAUDI, Chapm., *Auk*, 1893, p. 342. — Trinidad.

8434. SUPERCILIARIS (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 227; Scl., *P. Z. S.*, 1855, p. 155; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 517; *leucophrys*, Lafr. — Colombie, Ecuador, Pérou.

2210. *Var.* NIGRIFRONS, Lawr., *Ibis*, 1875, p. 384. — Ecuador W.

2211. *Var.* CANIPILEUS, Chapm., *Bull. Am. Mus. N. H.*, 1899, p. 153. — Vénézuéla.

2212. *Var.* REYI, Berl., *Ibis*, 1885, p. 288. — Mérida (Vénézuéla).

8435. CHRYSOPHRYS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1875, p. 235; Scl., *Cat.*, p. 247; *xanthophrys*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 780 (nec Scl.) — Mérida (Vénézuéla).

8436. IGNOBILIS (Scl.), *P. Z. S.*, 1861, p. 379; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 784; *oleagineus*, Scl., *P. Z. S.*, 1862, p. 110; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 516. — Vénézuéla, Colombie, Ecuador, Pérou.

8437. VERTICALIS (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 227; Scl., *P. Z. S.*, 1855, p. 155; *lichtensteini*, Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 30 (juv.) — Colombie, Ecuador.

8438. XANTHOPHTHALMUS, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, p. 510; id., *Orn. Pér.* II, p. 522. — Pérou N. et centr.

8439. LEUCOGASTER, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, p. 131, pl. 19, f. 2; id., *Orn. Pér.* II, p. 518; *albiventris*, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, p. 510. — Pérou.

8440. CASTANEICOLLIS, Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 293; id., *Cat.* — Pérou, Bolivie.

Digitized by Google

*Am. B.*, p. 90, pl. 10; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 520.

8441. GOERINGI, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 784, pl. 46, f. 1; Scl., *Cat.*, p. 250. — Mérida (Vénézuéla).

8442. MELANOTIS, Scl, *P. Z. S.*, 1854, p. 157, pl. 68; id., *Cat.*, p. 250. — Colombie.

8443. OCHRACEUS, Berl. et Tacz., *P. Z. S.*, 1884, p. 291, pl. 24, f. 1. — Ecuador W.

8444. BERLEPSCHI, Tacz., *P. Z. S.*, 1880, p. 195; id., *Orn. Pér.* II, p. 521. — Pérou centr.

## SUBF. II. — PHŒNICOPHILINÆ

### 1218. PHOENICOPHILUS

*Phœnicophilus*, Strickl. (1851).

8445. PALMARUM (Lin.); Vieill., *Ois. Am. mérid.* II, p. 16, pl. 69, 70; Strickl., *Contr. Orn.*, 1851, p. 104; Scl., *Cat.*, p. 254. — St-Domingue.

8446. POLIOCEPHALUS (Bp.), *Rev. Mag. de Zool.*, 1851, p. 78; Strickl, *l. c.*, p. 104; *palmarum* (fem.), Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 84; *dominicensis*, Cory; id., *B. San Dom.*, p. 58, pl. 8. — St-Domingue W.

### 1219. CALYPTOPHILUS

*Calyptophilus*, Cory (1884).

8447. FRUGIVORUS, Cory, *Journ. Bost. Zool. Soc.* II, p. 45; id., *Auk*, 1884, p. 3; id., *B. San Dom.*, p. 59, pl. 9; Scl., *Cat.*, p. 255. — St-Domingue.

## SUBF. III. — LAMPROTINÆ

### 1220. LAMPROTES

*Lamprotes*, Sw. (1837); *Tanagra* (pt.), auct. plur.

8448. LORICATUS (Licht.), *Doubl.*, p. 31; Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 121; *rubricollis* et *rubrigularis*, Spix, *Av. Bras.* II, p. 43, pl. 56, f. 1; *bonariensis*, Max., *Beitr.* III, p. 530. — Brésil S. et E.

### 1221. SERICOSSYPHA

*Sericossypha*, Less. (1844).

8449. ALBOCRISTATA (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1843, p. 152; id., *Mag. de Zool.*, 1844, pl. 50; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 587; *sumptuosa*, Less., *Echo M. S.*, 1844, p. 382. — Colombie, Ecuador, Pérou.

Digitized by Google

## SUBF. IV. — TANAGRINÆ

### 1222. THLYPOPSIS

*Thlypopsis*, Cab. (1851); *Nemosia* (pt.), auct. plur.

8450. SORDIDA (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1837, p. 28; d'Orb., *Voy., Ois.*, p. 261, pl. 18, f. 2; Scl., *Cat.*, p. 228; *fulvescens*, Strickl.; *blanda*, Licht.; *fulviceps*, Burm., *Th. Bras.* III, p. 159. — Brésil S. et Bolivie.

2213. *Var.* AMAZONUM, Scl., *Cat. B.* XI, p. 229; *sordida* et *fulvescens* (pt.), auct. plur. — Pérou, Bolivie et Brésil W.

8451. CHRYSOPIS (Scl. et Salv.), *P. Z. S.*, 1880, p. 155; Scl., *Cat.*, p. 229. — Ecuador E. et Pérou.

8452. FULVICEPS, Cab., *Mus. Hein.* I, p. 158; id., *J. f. O.*, 1866, p. 232; *ruficeps*, Lafr., *Rev. Zool.*, 1848, p. 173 (nec 1837). — Vénézuéla.

8453. INORNATA (Tacz.), *P. Z S.*, 1879, p. 228; id., *Orn. Pér.* II, p. 509; Scl., *Cat.*, p. 230, pl. 13, f. 2. — Pérou.

8454. ORNATA (Scl.), *P. Z. S.*, 1859, p. 158; id., *Cat.*, pl. 13, f. 1. — Ecuador, Pérou N.

2214. *Var.* MACROPTERYX, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1896, p. 345. — Pérou centr.

8455. PECTORALIS (Tacz.), *Orn. Pér.* II, p. 508. — Pérou centr.

8456. RUFICEPS (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1837, p. 29; d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 216, pl. 13, f. 1; Scl., *l. c.*, p. 231. — Bolivie, Tucuman (Argentine).

### 1223. NEMOSIA

*Nemosia*, Vieill. (1816); *Hemithraupis*, Cab. (1851).

8457. PILEATA (Bodd.), *Tabl. d. Pl. Enl.*, p. 45; *Pl. Enl.* 720, f. 2; Vieill., *N. Dict.* XXII, p. 490; Desm., *Tang.*, pl. 41; Burm., *Th. Bras.* III, p. 158; *cyanoleucus* et *cæruleus*, Max. — Colombie, Vénézuéla, Guyane, Brésil, Paraguay, Bolivie.

8458. ROUREI, Cab., *J. f. O.*, 1870, p. 459, 1872, pl. 1, f. 1; Scl., *Cat.*, p. 224. — Brésil S., E.

8459. GUIRA (Lin.); *Pl. Enl.* 720, f. 1; Bp., *Consp.* I, p. 256; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 215; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 510; *nigrigula*, Bodd.; *nigricollis*, Gm.; *guirina*, *nigrigularis*, Scl. — Amérique mérid. jusque vers le 25° l. S.

8460. RUFICAPILLA, Vieill., *N. Dict.* XXII, p. 495; id., *Gal. Ois.*, *Suppl.*, pl. 3; Burm., *Th. Bras.* III, p. 161; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 215; *ruficeps*, Max. — Brésil S., E.

8461. FUSCICAPILLA, Dubois, *Mém. Soc. Zool. de France*, VII, p. 403. — Brésil.

Digitized by Google

8462. FLAVICOLLIS, Vieill., *N. Dict.* XXII, p. 491 ; id., *Gal. Ois.*, p. 99, pl. 75 ; Burm., *l. c.*, p. 160 ; *speculifera*, Tem., *Pl. col.* 36 ; *melanoxantha*, Licht. ; *auricollis*, Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 111. — Guyane, Brésil, Bolivie.

2215. *Var.* INSIGNIS, Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 110 ; Pelz., *l. c.*, p. 215. — Brésil S.

8463. PERUANA (Bp.), *Rev. Mag. de Zool.*, 1851, p. 173 ; Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 111 ; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 512. — Colombie, Hᵗ-Amaz., Pérou, Bolivie.

8464. ALBIGULARIS, Scl., *P. Z. S.*, 1855, p. 109, pl. 99 ; id., *Cat. B.*, p. 227, pl. 12. — Colombie.

8465. ROSENBERGI, Rotsch., *Ibis*, 1898, p. 146 ; id., *Novit. Zool.* V, pl. 2, f. 1. — Ecuador N.

## 1224. PYRRHOCOMA

*Pyrrhocoma*, Cab. (1851).

8466. RUFICEPS (Strickl.), *Ann. N. H.*, 1844, p. 419 ; Des M., *Voy. Casteln. Ois.*, p. 69, pl. 20, f. 2 ; Cab., *Mus. H.* I, p. 138 ; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 216. — Brésil S., E.

## 1225. CYPSNAGRA

*Cypsnagra*, Less. (1831) ; *Leucopygia*, Sw. (1837).

8467. RUFICOLLIS (Licht.), *Doubl.*, p. 30 ; Burm., *Th. Bras.* III, p. 162 ; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 214 ; *hirundinacea*, Less. ; *fumigata*, Tem. — Brésil S., Bolivie E.

## 1226. TRICHOTHRAUPIS

*Trichothraupis*, Cab. (1851).

8468. QUADRICOLOR (Vieill.), *N. Dict.* XXXII, p. 359 ; Cab., *Mus. H.* I, p. 25 ; Burm., *Th. Bras.* III, p. 164 ; *melanops*, Vieill. ; *auricapilla*, Spix, *Av. Bras.* II, p. 39, pl. 52 ; *galeata*, Licht. ; *suchii*, Sw. — Brésil S., Paraguay, Argentine.

## 1227. EUCOMETIS

*Eucometis*, Scl. (1856).

8469. PENICILLATA (Spix), *Av. Bras.* II, p. 36, pl. 49, f. 1 ; Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 117 ; Pelz., *Orn. Bras.* p. 212 ; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 500. — Guyane fr., Amazone, Colombie, Ecuador W., Pérou E.

8470. ALBICOLLIS (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1837, p. 33 ; d'Orb., *Voy.*, p. 265, pl. 26, f. 2 ; Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 117 ; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 212. — Bolivie, Brésil W.

Digitized by Google

8471. CRISTATA (Du Bus), *Bull. Acad. Brux.* XXXII, 1855, p. 154; Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 118; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 306. — Panama, Colombie.

2216. *Var.* AFFINIS, Berl., *Auk*, 1888, p. 453. — Vénézuéla.

8472. SPODOCEPHALA (Bp.), *Compt.-Rend.* XXXIX, p. 922; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 307, pl. 20, f. 2. — Mexique.

2217. *Var.* PALLIDA, Berl., *Auk*, 1888, p. 451. — Yucatan, Guatémala.

2218. *Var.* STICTOTHORAX, Berl., *Auk*, 1888, p. 451. — Amérique centr.

8473. CASSINI (Lawr.), *Ann. Lyc. N. Y.* VII, p. 297; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1864, p. 351, pl. 30; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 307. — De Costa-Rica à la Colombie.

8474. OLEAGINEA, Salv., *Ibis*, 1886, p. 500. — Guyane anglaise.

## 1228. MALACOTHRAUPIS

*Malacothraupis*, Scl. et Salv. (1876).

8475. DENTATA, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1876, p. 353, pl. 31; Scl., *Cat.*, p. 216. — Bolivie.

8476. CASTANEICEPS, Chapm., *Bull. Amer. Mus. N. H.*, 1901, p. 225. — Inca Mine (Pérou).

## 1229. CREURGOPS

*Creurgops*, Scl. (1858).

8477. VERTICALIS, Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 73, pl. 132; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 501; Scl., *Cat.*, p. 215. — Colombie, Ecuador, Pérou.

## 1230. TACHYPHONUS

*Tachyphonus* et *Pyrrota*, Vieill. (1816); *Camarophagus*, Boie (1826); *Heterospingus*, Ridgw. (1898).

8478. MELALEUCUS (Sparrm.), *Mus. Carls.*, n° XXXI; Salv. et Godm., *l. c.* I, p. 309; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 504; *rufa*, Bodd.; *leucopterus*, Gm.; Vieill., *Gal. Ois.*, p. 113, pl. 82; *nigerrima*, Gm.; Desm., *Tang.*, pl. 43, 46; *valerii*, Verr.; *beauperthuyi*, Bp. — Costa Rica, Panama et Amérique mérid. jusqu'au S. du Brésil et du Pérou.

8479. LUCTUOSUS, d'Orb. et Lafr., *Mag. de Zool.*, 1837, p. 29; d'Orb., *Voy., Ois.*, p. 263, pl. 20, ff. 1, 2; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 310; *tenuirostris*, Bp.; *albispecularis*, Léot., *Ois. Trin.*, p. 300. — Nicarag., Costa Rica et Amér. mér. jusqu'au Pérou, la Bolivie et Brésil W.

8480. PHOENICEUS, Sw., *An. in Menag.*, p. 311; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 65, pl. 33; *saucius*, Strickl.; *leucocampter*, Licht. — Guyane, Vénézuéla, Amazone, Pérou E.

8481. XANTHOPYGIUS, Scl., *P. Z. S.*, 1854, p. 158, pl. 69 (fem.), 1855, p. 83, pl. 90 (mas.); id., *Cat.*, p. 209; *auritus*, Du Bus; *rubrifrons*, *propinquus*, Lawr. — Costa Rica, Panama, Colombie.

Digitized by Google

8482. CHRYSOMELAS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1869, p. 440, pl. 32; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 311, pl. 21, f. 1. — Véragua.

8483. CRISTATUS (Gm.); Desm., *Tang.*, pl. 47, 48; Scl., *Cat.*, p. 210; *vieilloti*, Lafr.; *gubernatrix*, Tem.; *cristatellus*, Scl. — Guyane française, Colombie, Amazone.

2219. *Var.* INTERCEDENS, Berl., *Ibis*, 1880, p. 113. — Guyane anglaise.

2220. *Var.* BRASILIENSIS, Scl., *Cat. B.* XI, p. 211; *cristatus*, Burm., *Th. Bras.* III, p. 165; *brunnea*, Spix (fem.) — Brésil.

8484. SURINAMUS (Lin.); *Pl. Enl.* 301, f. 2; Pelz., *Orn.* p. 213; *martialis*, Tem.; *desmaresti*, Sw.; *ochropygos*, Cab.; *cristatus* (pt.), Bp. — Guyane, Bas-Amazone.

2221. *Var.* NAPENSIS, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* VIII, p. 42; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 503. — Colombie, Rio Négro, Haut-Amazone.

8485. NATTERERI, Pelz., *Orn. Bras.*, p. 214; Scl., *Ibis*, 1885, p. 272, pl. 6, f. 1. — Matto-Grosso (Brésil).

8486. RUFIVENTER (Spix), *Av. Bras.* II, p. 37, pl. 50, f. 1; Strickl., *Contr. Orn.*, 1850, p. 49, pl. 50; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 503. — Haut-Amazone, Pérou, Bolivie.

8487. CORONATUS (Vieill.), *N. Dict.* XXXIV, p. 535; Cab., *Mus. H.* I, p. 22; Burm., *Th. Bras.* III, p. 166; *coryphæus*, Licht.; *vigorsi*, Sw.; Jard. et Sel., *Ill. Orn.*, pl. 36, f. 1. — Brésil S., E.

8488 NITIDISSIMUS, Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 188; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 312, pl. 21, ff. 2, 3; *axillaris*, Lawr.; *luctuosus*, Cass. — Costa Rica, Véragua.

8489. DELATTREI, Lafr., *Rev. Zool.*, 1847, p. 72; Scl. et Salv., *Exot. Orn.* 67, pl. 34; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 312; *brunneus*, Lawr. — Costa Rica, Véragua, Colombie, Ecuador N.

## 1231. LANIO

*Lanio*, Vieill. (1816); *Pogonothraupis*, Cab.

8490. AURANTIUS, Lafr., *Rev. Zool.*, 1846, p. 402; Du Bus, *Esq. Orn.*, pl. 21; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 61, pl. 31. — Mexique S., Belize, Guatémala, Honduras.

8491. LEUCOTHORAX, Salv., *P. Z. S.*, 1864, p. 581; Scl. et Salv., *Exot. Orn*, p. 63 (pt.), pl. 32 (fem.); Scl., *Cat.*, p. 203. — Nicaragua, Costa Rica.

2222. *Var.* MELANOPYGIA, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1883, p. 412; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 305; *leucothorax*, Salv. (pt.); Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 63 (pt.), pl. 32 (mas.) — Costa Rica, Véragua.

8492. ATRICAPILLUS (Gm.); Vieill., *N. Dict.* XVII, p. 305; id., *Gal. Ois.*, p. 225, pl. 138; Sclat., *Cat.*, p. 204. — Guyane, Colombie Ecuador.

8493. VERSICOLOR (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1837, — Bolivie, Pérou S.

Digitized by Google

p. 28; d'Orb., *Voy.*, p. 262, pl. 19, f. 1; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 500.

8494. LAWRENCEI, Scl., *Ibis*, 1885, p. 272, pl. 6, f. 2; id., *Cat.*, p. 205; *atricapillus* (pt.), Lawr. — Trinidad.

## 1232. PHOENICOTHRAUPIS

*Phœnicothraupis*, Cab. (1850).

8495. RUBICA (Vieill.), *N. Dict.* XIV, p. 107; Cab., *Mus. H.* I, p. 24; *flammiceps*, Tem., *Pl. col.* 177; *porphyrio*, Licht.; C. Dub., *Orn. Gal.*, p. 66, pl. 41. — Bolivie, Brésil, Paraguay, Argentine.

2223. *Var.* VINACEA, Lawr., *Pr. Ac. Phil.*, 1867, p. 94; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 301; *rubica* (pt.), Scl., *P. Z. S.*, 1867, p. 139. — Costa Rica, Véragua, Panama.

8496. RUBICOIDES (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1844, p. 41; Cab., *Mus. H.* I, p. 24; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 300; *ignicapilla* et *quajacina*, Licht. — Mexique S., Guatémala, Honduras.

2224. *Var.* AFFINIS, Nels., *Auk*, 1897, p. 66. — Oaxaca (Mexique).

2225. *Var.* ROSEA, Nels., *Pr. Biol. Soc. Washington*, 1898, p. 60. — Mexique W.

8497. RUBRA (Vieill.), *N. Dict.* XXXII, p. 559; Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 120; id., *Cat.*, p. 198; *rubica*, Scl. (pt. ex Trinid.) — Vénézuéla, Trinidad.

8498. RHODINOLÆMA, Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 300; *rubica* (pt.), auct. plur.; *peruvianus*, Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 498. — Ecuador W., Pérou.

8499. FUSCICAUDA, Cab., *J. f. O.*, 1861, p. 86; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 302; *erythrolæma*, Scl., *Cat. Am. B.*, p. 83; *rubicoides* (pt.), Lawr. — Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombie N.

2226. *Var.* SALVINI, Berl., *Ibis*, 1883, p. 487; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 303; *rubicoides*, Bonc. — Mexique S., Yucatan, Hondur., Guatém.

2227. *Var.* LITTORALIS, Nels., *Auk*, 1901, p. 48. — Tabasco (Mexique).

2228. *Var.* INSULARIS, Salv., *Ibis*, 1888, p. 259. — Iles Meco et Mugeres (Yucatan).

8500. CRISTATA, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* XI, p. 70; Scl., *Cat.*, p. 201. — Colombie.

8501. GUTTURALIS, Scl., *Ann. N. H.*, 1854, p. 25; id., *Cat.*, p. 201, pl. 11. — Colombie.

## 1233. CHLOROTHRAUPIS

*Chlorothraupis*, Ridgw. (1885); *Phœnicothraupis* (pt.), auct. plur.

8502. CARMIOLI (Lawr.), *Ann. Lyc. N. Y.* IX, p. 100; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 499; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 299, pl. 20, f. 1. — Nicaragua, Costa Rica, Pérou.



Digitized by Google

8503. STOLZMANNI (Berl. et Tacz.), *P. Z. S.*, 1883, p. 546. Ecuador W.
8504. OLIVACEA (Cass.), *Pr. Ac. Sc. Philad.*, 1860, p. 140, 1864, p. 287, pl. 2; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 298. Panama, Colombie, Ecuador.

## 1234. ORTHOGONYS

*Orthogonys*, Strickl. (1844); *Cyanicterus*, Bp. (1850); *Callithraupis*, Berl. (1879).

8505. CYANICTERUS (Vieill.), *N. Dict.* XXVIII, p. 290; id., *Gal. Ois.*, p. 112, pl. 81; *icteropus*, *chloricterus*, Vieill.; Puch., *Arch. Mus. Par.* VII, p. 378, pl. 22; *venustus*, Bp.; Scl., *Cat.*, p. 193. Guyane.
8506. VIRIDIS (Spix), *Av. Bras.* II, p. 36, pl. 48, f. 2; Strickl., *Ann. N. H.*, 1844, p. 421; Scl., *Cat.*, p. 194; *vegeta*, Licht. Brésil S. et E.

## 1235. PYRANGA

*Piranga*, Vieill. (1807); *Pyranga*, Vieill. (1816); *Phœnisoma*, Sw. (1837); *Phœnicosoma*, Cab. (1850).

8507. ÆSTIVA (Gm.); Desm., *Tang.*, pl. 32, 33; Vieill., *N. Dict.* XXVIII, p. 291; Wils., *Am. Orn.* I, p. 95, pl. 6, ff. 3, 4; *Musc. rubra*, Lin.; *mississipensis*, Gm.; *coccinea*, Bodd.; *variegata*, Lath. États-Unis, Amérique centr., Antilles, Colombie, Ecuador, Pérou.
2229. *Var.* COOPERI, Ridgw., *Pr. Ac. Sc. Philad.*, 1869, p. 130; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 290. Colorado, Rio Grande, Mexique W.
8508. TESTACEA, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, p. 388; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 292, pl. 19, ff. 1, 2; *hepatica*, Salv. (1867); *azaræ*, Tsch. Du Nicaragua à la Colombie et jusqu'en Bolivie.
2230. *Var.* HÆMALEA, Salv. et Godm., *Ibis*, 1883, p. 205; *azaræ*, Cab.; *hepatica*, Léot., *Ois. Trin.*, p. 291. Guyane, Vénézuéla et Trinidad.
2231. *Var.* FIGLINA, Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 293; *saira var. testacea*, Baird, Br. et Rid., *N. A. B.* I, p. 434. Guatémala et Belize.
2232. *Var.* TSCHUDII, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1892, p. 375; *azaræ*, Tacz. (nec d'Orb.) Pérou.
8509. FACETA, Bangs, *Pr. Biol. Soc. Washington*, XII, 1898, p. 141. Sta Marta (Colombie).
8510. SAIRA (Spix), *Av. Bras.* II, pl. 48, f. 1 (fem.); Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 124; *mississipensis*, Licht. (nec Gm.); *coccinea*, Burm., *Th. Bras.* III, p. 171 (nec Bodd.); *azaræ*, Cab. (nec d'Orb.) Brésil E. et S.
8511. AZARÆ, d'Orb., *Voy.*, *Ois.*, p. 264; Scl., *Cat. B.* XI, p. 186; *ruber* et *flavus*, Vieill.; *coccynea*, Burm., *La Plata Reise* II, p. 479. Bolivie, Paraguay, Uruguay, Argentine.

Digitized by Google

8512. HEPATICA, Sw., *Phil. Mag.*, 1827, p. 438; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 291; Scl., *Cat.*, p. 186. — Arizona, Mexique, Guatémala.

8513. FLAMMEA, Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 457. — Iles Tres Marias.

8514. ROSEICULARIS, Cabot, *Bost. Journ. N. H.* V, p. 416; Scl., *Ibis*, 1873, p. 125, pl. 3; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 293. — Yucatan, Cozumel.

8515. RUBRA (Lin., nec *Musc. rubra*, L.); Desm., *Tang.*, pl. 34; Vieill., *Ois. Am. sept.* I, p. 4, pl. 1, f. 12; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 287. — États-Unis E., Antilles, Am. centr. jusqu'au Pérou et Bolivie.

8516. ERYTHROMELÆNA, Scl. (ex Licht.), *P. Z. S.*, 1856, pp. 126, 303; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 295; *erythromelas*, Licht., *Preis-Verz.* (1831), n° 69; *leucoptera*, Trud.; *bicittata*, Lafr. — Mexique S., Amérique centr. jusqu'à Panama.

8517. ARDENS (Tsch.), *Arch. f. Naturg.*, 1844, 1, p. 287; Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 126; *bicittata*, Tsch., *F. P.*, p. 207; *erythromelas*, Scl. (1855). — Guyane anglaise, Vénézuéla, Colombie, Ecuador, Pérou.

2253. *Var.* LATIFASCIATA, Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 457. — Costa Rica, Véragua.

8518. BIDENTATA, Sw., *Phil. Mag.*, 1827, p. 428; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 296; Scl. *Cat.*, p. 190. — Mexique S., W., Tres Marias.

2254. *Var.* SANGUINOLENTA, Lafr., *Rev. Zool.*, 1859, p. 97; Nels., *Auk*, 1898, pp. 157-59; *bidendata* (pt.), auct. plur. (nec Sw.) — Vera Cruz, Amérique centr. jusqu'à Chiriqui.

8519. LUDOVICIANA (Wils.), *Am. Orn.* III, p. 27, pl. 20, f. 1; Bp., *P. Z. S.*, 1857, p. 117; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 297; *columbiana*, Jard.; *erythropis*, Vieill. — Amérique N.-W., Mexique, Guatémala.

8520. RUBRICEPS, Gray, *Gen. B.* II, p. 364, pl. 89; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 496; Scl., *Cat.*, p. 192; *pyrrhocephala*, Mass. — Colombie, Ecuador, Pérou.

8521. ERYTHROCEPHALA (Sw.), *Phil. Mag.*, 1827, p. 437; Bp., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1851, p. 178; *cucullata*, Du Bus. — Mexique.

## 1236. CALOCHÆTES

*Euchætes*, Scl. (1858, nec Dejean, 1834); *Calochætes*, Scl. (1879).

8522. COCCINEUS, Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 73, pl. 152, f. 1; id., *Ibis*, 1879, p. 388; id., *Cat.*, p. 180. — Ecuador E.

## 1237. PHILOGOTHRAUPIS

*Phlogothraupis*, Scl. et Salv. (1873).

8523. SANGUINOLENTA (Less.), *Cent. Zool.*, p. 107, pl. 39; Scl. et Salv., *Nomencl.*, p. 21; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 285. — Amér. centr., du S. du Mex. au Costa-Rica.

Digitized by Google

## 1258. RHAMPHOCOELUS

*Ramphocelus*, Desm. (1805); *Ramphopis*, Vieill. (1816); *Jacapa*, Bp. (1851); *Rhamphocœlus*, Scl. (1886).

8524. BRASILIUS (Lin.); Desm., *Tang.*, pl. 28, 29; C. Dubois, *Orn. Gal.*, pl. 124; Bp., *Consp.* I, p. 242; *coccineus*, Vieill.; id., *Gal. Ois.* I, pl. 79. — Brésil S., E.

8525. DORSALIS, Scl., *P. Z. S.*, 1854, p. 97; id., *Cat. B.*, p. 171; *ephippialis*, Scl., *P. Z. S.*, 1861, p. 130. — Parana (Brésil S.)

8526. NIGROGULARIS (Spix), *Av. Bras.* II, p. 35, pl. 47; Sw., *Orn. Dr.*, pl. 17; Bp., *P. Z. S.*, 1857, p. 121; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 494; *ignescens*, Less., *Cent. Zool.*, pl. 24. — Haut-Amazone, Ecuador W.

8527. DIMIDIATUS, Lafr., *Mag. de Zool.*, 1837, pl. 81; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 283; Scl., *Cat.*, p. 172. — Véragua, Colombie, Vénézuéla.

8528. LUCIANI, Lafr., *Rev. Zool.*, 1858, p. 54; id., *Mag. de Zool.*, 1859, pl. 2; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 494; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 284; *melanogaster*, Sw. — Pérou, Colombie, Panama.

8529. UROPYGIALIS, Bp., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1851, p. 178; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 284, pl. 18, f. 2; Scl., *Cat.*, p. 173; *affinis*, Less. — Guatémala.

8530. FESTÆ, Salvad., *Boll. Mus. Torino* XI, n° 249. — Chiriqui.

8531. JACAPA (Lin.); Desm., *Tang.*, pl. 30, 31; *albirostris*, Bodd.; *purpureus*, Vieill.; *atro-coccineus*, Sw., *Orn. Dr.*, pl. 20; *unicolor*, Scl. — Colombie, Ecuador, Pérou N., Brésil, Guyane.

2235. *Var.* MAGNIROSTRIS, Lafr., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1853, p. 243; *venezuelensis*, Lafr., *l. c.* — Vénézuéla, Trinidad.

2236. *Var.* CONNECTENS, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1896, p. 344. — Pérou centr. et S.

8532. ATROSERICEUS, d'Orb. et Lafr., *Mag. de Zool.*, 1837, p. 34; d'Orb., *Voy.*, p. 280, pl. 26, f. 1; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 493; *aterrimus*, Lafr. (juv.) — Bolivie, Pérou S.

2237. *Var.* CAPITALIS, Allen, *Bull. Am. Mus. N. H.* IV, p. 51. — Vénézuéla.

8533. COSTARICENSIS, Cherr., *Auk*, 1891, p. 62. — Costa-Rica.

8534. PASSERINII, Bp., *Antologia*, 1851, n° 130, p. 3; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 281; Scl., *Cat.*, p. 176. — Mexique S. et Amérique centr.

8535. FLAMMIGERUS (Jard. et Scl.), *Ill. Orn.* III, 1855, pl. 151; Scl., *P. Z. S.*, 1855, p. 157; id., *Cat.*, p. 177; *varians*, *var.* 3, Lafr. — Colombie.

8536. DUNSTALLI, Rothsch., *Novit. Zool.* II, p. 481. — Amérique centr.

8537. CHRYSONOTUS, Lafr., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1853, p. 246; Scl., *Cat.*, p. 177; *varians*, *var.* 2, Lafr. — Colombie.

8538. ICTERONOTUS, Bp., *P. Z. S.*, 1837, p. 121; Du Bus, *Esq. Orn.*, pl. 15; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 282; *varians*, *var.* 1, Lafr. — Véragua, Colombie W., Ecuador W.

Digitized by Google

8539. INEXPECTATUS, Rothsch., *Ibis*, 1897, p. 266. Panama.
8540. CHRYSOPTERUS, Bouc., *Humm. Birds*, I, p. 53. Panama.

## 1239. SPINDALIS

*Spindalis*, Jard. et Selb. (1836); *Spizampelis*, Bryant (1866).

8541. NIGRICEPHALA (Jam.), *Ed. N. Phil. Journ.*, 1855, p. 213; Gosse, *Ill. B. Jam.*, pl. 56; Bp., *Consp.* I, p. 240; *bilineatus*, Jard. et Sel., *Ill. Orn.*, 1836, pl. 9; *zena*, Gosse; *zenoides*, Des M., *Ic. Orn.*, pl. 40. Jamaïque.
8542. PORTORICENSIS, Bryant, *Bost. Soc. N. H.*, 1866, p. 252; Gundl., *J. f. O.*, 1874, p. 311; Scl., *Cat.*, p. 167. Porto-Rico.
8543. MULTICOLOR (Vieill.), *Enc. méth.*, p. 775; id., *Gal. Ois.* I, p. 100, pl. 76; Bp., *Consp.* I, p. 240; Scl., *Cat.*, p. 167; *dominicensis*, Bryant. Sᵗ-Domingue.
8544. PRETREI (Less.), *Rev. Zool.*, 1839, p. 105; id., *Cent. Zool.*, p. 122, pl. 45; *zena*, d'Orb., in *La Sagra, Cuba, Zool.*, p. 74, pl. 11 (nec Lin.) Cuba.
8545. SALVINI, Cory, *Auk*, 1886, p. 499. Grand-Cayman.
8546. BENEDICTI, Ridgw., *Pr. Biol. Soc. Washington*, 1875; Scl., *Cat.*, p. 168; *exsul*, Salv., *Ibis*, 1885, p. 189, pl. 5. Ile Cozumel (Yucatan).
8547. ZENA (Lin.); Cory, *B. of Bahamas*, p. 92, pl.; Scl., *l. c.*, p. 169; *bahamensis*, Briss.; Catesby, *Car.* I, pl. 42. Iles Bahama.
2238. *Var.* TOWNSENDI, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 3. Abaco (Bahama).
2239. *Var.* STEJNEGERI, Cory, *Auk*, 1891, p. 348. Ile Eleuthera (Baham.

## 1240. TANAGRA

*Tanagra*, Lin. (1766); *Thraupis*, Boie (1826); *Sporathraupis* et *Hemithraupis*, Ridgw. (1898).

8548. EPISCOPUS, Lin.; Desm., *Tang.*, pl. 15; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 208; *glauca*, Gray; *serioptera*, Sw., *An. in Men.*, p. 315. Guyane, Brésil N.
2240. *Var.* LEUCOPTERA, Gray, in Scl., *Cat Am. B.*, p. 74. Colombie.
8549. COELESTIS, Spix, *Av. Bras.* II, p. 42, pl. 55, f. 2; Tacz., *Orn. Pérou*, II, p. 485; *episcopus* (pt.), Scl. et Salv. Pérou, Ecuador.
2241. *Var.* MAJOR, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1896, p. 343. Pérou centr. et N.
8550. SCLATERI, Berl., *Ibis*, 1880, p. 112; Scl., *Cat.*, p. 155; *glauca*, Léot., *Ois. Trin.*, p. 295; *glaucocolpa*, Scl. (err.); *cana*, Finsch (nec Sw.) Trinidad.
8551. BERLEPSCHI, de Dalm., *Mém. Soc. Zool. de France*, 1900, p. 136. Ile Tobago.

Digitized by Google

8552. CANA, Sw., *Orn. Dr.*, pl. 37; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 277; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 486; *sayaca*, Bp.; *cyanoptera*, Tacz. (nec V.); *diaconus*, Less. et auct. plur. — Mex. S., Amér. centr., Colombie, Vénéz., Ecuador, Pérou N.

8553. CYANOPTERA (Vieill.), *N. Dict.* XIV, p. 104; Bp., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1851, p. 170; *sayaca*, Max. Wied (nec Lin.), *Beitr.* III, p. 484; *virens*, Strickl.; *episcopus*, d'Orb.; Sw., *Orn. Dr.*, pl. 39; *inornata*, Sw., *l. c.*, pl. 40 (juv.); *argentata*, Gray; *prælatus*, Less. — Brésil S., Paraguay, Bolivie, Argentine N., Uruguay.

8554. SAYACA, Lin.; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 208; Cab., *J. f. O.*, 1866, p. 305; *cœlestis*, Sw. (nec Spix), *Orn. Dr.*, pl. 41; *swainsoni*, Gray. — Brésil E.

8555. GLAUCOCOLPA (Cab.), *Mus. Hein.* I, p. 28; Finsch, *P. Z. S.*, 1870, p. 580; Scl., *Cat. B.*, p. 159; *cyanilia*, Bp., *C. R.* XXXVIII, p. 383. — Vénézuéla.

8556. PALMARUM, Max. Wied, *Reise*, II, p. 76; Desm., *Tang.*, pl. 16 (fem.); *olivascens*, Licht.; Sw., *Orn. Dr.*, pl. 38; *violilavata*, Berl. et Tacz. — Brésil E.

2242. *Var.* MELANOPTERA, Hartl., *MS.*, Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 235; Berl., *J. f. O.*, 1873, p. 243. — Costa-Rica, Colombie, Vénézuéla, Guyane, Ecuad., Pérou, Bol.

8557. ORNATA, Sparrm., *Mus. Carls.*, pl. 95; Sw., *Orn. Dr.*, pl. 42; Burm., *Th. Bras.* III, p. 174; *archiepiscopus*, Desm., *Tang.*, pl. 17, 18. — Brésil S., E.

8558. ABBAS, Licht., *Preis-Verz.*, p. 2, n° 70; Scl., *P. Z. S.*, 1856, pp. 235, 303; *vicarius*, Less., *Cent. Zool.*, pl. 68. — Mex. S., Guatémala, Belize, Honduras.

8559. CYANOCEPHALA (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1837, p. 32; Gray, *Gen. B.* II, p. 364; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 490; *maximiliani*, d'Orb., *Voy.*, pl. 23, f. 2. — Ecuador, Bolivie, Pérou (Andes).

2243. *Var.* AURICRISSA, Scl., *P. Z. S.*, 1855, p. 227, 1856, p. 236. — Colombie (Andes).

2244. *Var.* SUBCINEREA, Scl., *P. Z. S.*, 1861, p. 129; id., *Cat.*, p. 165. — Vénézuéla, Trinidad.

8560. OLIVICYANEA, Lafr., *Rev. Zool.*, 1843, p. 69; Scl., *Cat. B.*, p. 165. — Vénézuéla, Colombie (Andes).

8561. STRIATA, Gm.; d'Orb., *Voy.*, p. 273; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 489; *bonariensis*, Gm.; *chrysogaster*, Cuv.; *darwini*, Gr., *Voy. « Beagle »* III, pl. 34. — Brésil S., Bolivie, Paraguay, Uruguay, Argentine.

8562. DARWINI, Bp., *P. Z. S.*, 1837, p. 121; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 488; *frugilegus*, Tsch.; id., *Faun. Per.*, p. 204, pl. 17, f. 1; *striata*, Darw. (pt.) — Bolivie, Pérou, Ecuador W.

Digitized by Google

## 1241. DUBUSIA

*Dubusia*, Bp. (1850).

8563. TÆNIATA (Boiss.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 67; Scl., *P. Z. S.*, 1855, p. 157; *selysia*, Bp. (juv.) — Colombie, Ecuador

8564. STICTOCEPHALA, Berl. et Stolzm., *Ibis*, 1894, p. 586; *P. Z. S.*, 1896, pl. 13. — Pérou centr.

## 1242. COMPSOCOMA

*Compsocoma*, Cab. (1850).

8565. VICTORINI (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1842, p. 336; Cab., *Mus. Hein.* I, p. 140; Sclat, *Cat.*, p. 150. — Colombie, Ecuador E.

8566. SUMPTUOSA (Less.), *Tr. d'Orn.*, p. 463; Pucheran, *Arch. Mus. Par.* VII, p. 379, pl. 25; Scl., *Cat.*, p. 151; *elegans*, Less.; *flavinucha*, Tsch. — Vénézuéla, Colombie, Ecuador E., Pérou.

2245. *Var.* CYANOPTERA, Cab., *J. f. O.*, 1866, p. 255. — Ecuador W.

8567. FLAVINUCHA (Lafr. et d'Orb.), *Mag. de Zool.*, 1837, p. 29; d'Orb., *Voy.*, p. 279, pl. 21; Scl., *Cat.*, p. 152. — Bolivie.

8568. NOTABILIS (Jard.), *Edinb. N. Phil. Journ.* n. s. II, p. 119; Scl., *P. Z. S.*, 1855, p. 84, pl. 91; id., *Cat.*, p. 152. — Ecuador W.

## 1243. BUTHRAUPIS

*Buthraupis*, Cab. (1850).

8569. MONTANA (Lafr. et d'Orb.), *Mag. de Zool.*, 1837, p. 32; d'Orb., *Voy.*, p. 273, pl. 23, f. 1; Scl., *Cat.*, p. 148. — Bolivie (Andes).

8570. CUCULLATA (Jard.), *Ill. Orn.*, 1841, pl. 43; Scl., *Cat.*, p. 148; *montana*, Less. (nec Lafr.); *gigas*, Bp., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1851, p. 171. — Colombie.

2246. *Var.* INTERMEDIA, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1896, p. 342. — Ecuador.

2247. *Var.* CYANONOTA, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1896, p. 342. — Pérou centr.

8571. CHLORONOTA, Scl., *P. Z. S.*, 1854, p. 97, pl. 64; id., *Cat.*, p. 148. — Ecuador W.

8572. EXIMIA (Boiss.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 66; Scl., *Cat.*, p. 149. — Colombie.

8573. ARCÆI, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1869, p. 439, pl. 31; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 276. — Véragua.

2248. *Var.* CÆRULEICULARIS, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1893, p. 609. — Costa-Rica.

8574. EDWARDSI, Elliot, *N. Arch. Mus.* I, *Bull.*, p. 77, pl. 4, f. 2. — Ecuador W.

8575. ROTHSCHILDI, Berl., *Ibis*, 1898, p. 143; Hart., *Novit. Zool.* V, pl. 2, f. 2. — Ecuador N.-W.

Digitized by Google

### 1244. POECILOTHRAUPIS

*Pœcilothraupis*, Cab. (1850); *Anisognathus*, Rchb. (1850).

8576. LUNULATA (Du Bus), *Bull. Ac. Brux.*, 1859, 1, p. 439; id., *Esq. Orn.*, pl. 4; Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 241; *constantii*, Boiss.; *erythrotis*, Jard. et Sel., *Ill. Orn.*, 1840, pl. 56; *igniventris*, Tsch. — Colombie.

2249. *Var.* ATRICRISSA, Cab., *J. f. O.*, 1866, p. 165. — Ecuador.

2250. *Var.* IGNICRISSA, Cab., *J. f. O.*, 1873, p. 517; Tacz., *l. c.*, p. 482. — Pérou N.

8577. IGNIVENTRIS (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1837, p. 32; d'Orb., *Voy.*, p. 275, pl. 25, f. 2; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 482. — Bolivie, Pérou S.

8578. LACRYMOSA (Du Bus), *Esq. Orn.*, pl. 10; Cab., *J. f. O.*, 1873, p. 517; Tacz., *l.c.*, p. 481; Sclat., *Cat.*, p. 147. — Pérou centr. et S.

8579. PALPEBROSA (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1847, p. 71; Cab., *J. f. O.*, 1893, p. 517; Scl., *Cat.*, p. 146; *lacrymosa* (pt.), auct. plur. — Colombie, Ecuador, Pérou N.

2251. *Var.* MELANOPS, Berl., *Orn. Monatsb.* I, p. 11; *lacrymosa* (pt.). Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 780; *palpebrosa* (pt.), Scl., *Cat.*, p. 146. — Vénézuéla W.

8580. MELANOGENYS, Salv. et Godm., *Ibis*, 1880, p. 120, pl. 3. — Sierra Nevada (Col.)

### 1245. STEPHANOPHORUS

*Stephanophorus*, Strickl. (1844).

8581. LEUCOCEPHALUS (Vieill.), *N. Dict.* XXXII, p. 408; *diademata*, Mikan; Tem., *Pl. Col.* 245; *cærulea*, Vieill., *Gal. Ois.* I, p. 61, pl. 54; Strickl., *P. Z. S.*, 1841, p. 31. — Brésil S., Paraguay, Uruguay, Argentine N.

### 1246. DELOTHRAUPIS

*Pipridea* (pt.), Scl. (1855); *Delothraupis*, Scl. (1886).

8582. CASTANEIVENTRIS (Scl.), *Contr. Orn.*, 1851, p. 61; id., *Cat.* XI, p. 142; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 451. — Bolivie, Pérou.

### 1247. IRIDORNIS

*Iridosornis*, Less. (1844); *Pœcilornis*, Hartl. (1844); *Euthraupis*, Cab. (1850); *Iridornis*, Scl. (1855).

8583. DUBUSIA (Bp.), *Consp.* I, p. 259; Strickl., *Contr. Orn.*, 1852, p. 127, pl. 94; Scl., *P. Z. S.*, 1855, p. 157; *rufivertex*, Lafr., *Rev. Zool.*, 1842, p. 335. — Colombie, Ecuador.

Digitized by Google

8584. REINHARDTI, Scl., *Ibis*, 1865, p. 495, pl. 11; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 477. — Pérou centr.

8585. JELSKII, Cab., *J. f. O.*, 1873, p. 516, pl. 5, f. 1; Tacz., *l. c.*, p. 478. — Pérou, Bolivie.

8586. PORPHYROCEPHALA, Scl., *P. Z. S.*, 1855, p. 227, pl. 110; id., *Cat.*, p. 141. — Ecuador, Colombie.

8587. ANALIS (Tsch.), *Arch. f. Naturg.*, 1844, 1, p. 287; id., *Faun. Per.*, p. 205, pl. 18, f. 1; Scl., *P. Z. S.*, 1855, p. 227; Tacz., *l. c.*, p. 479. — Pérou.

## 1248. PSEUDODACNIS

*Pseudodacnis*, Scl. (1886).

8588. HARTLAUBI (Scl.), *P. Z. S.*, 1854, p. 251; Cab., *J. f. O.*, 1861, p. 88; Scl., *Ibis*, 1865, p. 512; id., *Cat.*, p. 158. — Colombie.

## 1249. CALLISTE (1)

*Calliste*, Boie (1826); *Aglaia*, Sw. (1827); *Calospiza*, Gray (1840); *Gyrola*, Rchb. (1850); *Tatao*, *Chrysothraupis*, *Ixothraupis*, *Chalcothraupis*, Bp. (1851); *Euschemon*, *Eupreptiste*, Scl. (1851).

8589. TATAO (Lin.); Burm., *Th. Bras.* III, p. 187; Scl., *Mon. Tan. Call.*, p. 1, pl. 1, f. 1; *paradisea*, Sw. — Guyane, Bas-Amazone, Rio-Négro.

2252. *Var.* COELICOLOR, Scl., *Contr. Orn.*, 1851, p. 51; id., *Mon.*, pl. 1, f. 2. — Colombie, Pérou N.-E.

8590. YENI (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1837, p. 51; *Voy.*, p. 270, pl. 24, f. 2; Scl., *l. c.*, pl. 2; *chilensis*, Vig. — Bolivie, Pérou, Haut-Amazone, Ecuador.

8591. FASTUOSA (Less.), *Cent. Zool.*, p. 184, pl. 58; Scl., *Mon.*, p. 9, pl. 4. — Pr. Pernambouc (Brés.)

8592. TRICOLOR (Gm.); Tem., *Pl. Col.* 215, f. 1 (fem.); Scl., *l. c.*, p. 7, pl. 3; *tatao*, Neuw. — Brésil E.

8593. FESTIVA (Shaw), *Nat. Misc.*, pl. 537; Scl., *l. c.*, p. 11, pl. 5; *cyanocephala*, Vieill.; Tem., *Pl. Col.* 215, f. 2 (fem.); *trichroa*, Licht.; *rubricollis*, Neuw. — Brésil E.

8594. CYANEIVENTRIS (Vieill.), *N. Dict.* XXXII, p. 426; Scl., *l. c.*, p. 13, pl. 6; *elegans*, Neuw.; *citrinella*, Tem., *Pl. Col.* 42, f. 2. — Brésil E.

8595. THORACICA (Tem.), *Pl. Col.* 42, f. 1; Scl., *l. c.*, p. 15, pl. 7. — Brésil S., E.

8596. GOULDI, Scl., *P. Z. S.*, 1885, p. 849; id., *Cat. B.* XI, p. 102. — Brésil S., E.

8597. SCHRANKI (Spix), *Av. Bras.* II, p. 58, pl. 51; d'Orb., *Voy.*, p. 270, pl. 24, f. 1; Scl., *l. c.*, p. 17, pl. 8; *melanotis*, Sw. (fem.) — Hl-Amazone, Bolivie, Pérou, Ecuador E.

(1) Voy. aussi : P.-L. Sclater, *A Monograph of the Tanagrine genus Calliste*, London, 1857.



Digitized by Google

8598. FLORIDA, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1869, p. 416, pl. 28; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 267, pl. 17, f. 1; Scl., *Cat.*, p. 103. — Costa-Rica, Véragua.

8599. PUNCTATA (Lin.); Bp., *Consp.* I, p. 234; Scl., *l. c.*, p. 19, pl. 9; id., *Cat.*, p. 104; Tacz., *Orn. Pérou*, II, p. 460. — Guyane, Rio-Négro.

2253. *Var.* PUNCTULATA, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1876, p. 353. — Bolivie, Ecuador.

8600. GUTTATA (Cab.), *Mus. Hein.* I, p. 26; Scl., *l. c.*, p. 21, pl. 10; *punctata*, Cab., *Schomb. G.* III, p. 669 (nec L.); *guttulata*, Bp.; *chrysophrys*, Scl., *Contr. Orn.*, 1851, p. 24, pl. 69, f. 2. — Guyane angl., Vénézuéla, Trinidad, Colombie N., Panama, Costa-Rica.

8601. XANTHOGASTRA, Scl., *Contr. Orn.*, 1851, pp. 23, 55; id., *l. c.*, p. 23, pl. 11; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 461; *chrysogaster*, Bp. — Guyane, Col., Ecuador E., Hᵗ-Amazone.

2254. *Var.* ROSTRATA, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1896, p. 339. — Pérou centr.

8602. GRAMINEA (Spix), *Av. Bras.* II, p. 40, pl. 53, f. 2 (fem.); Scl., *Mon.*, p. 25, pl. 12; *virescens*, Scl., *Contr. Orn.*, 1851, pl. 69, f. 1; *pusilla*, Bp. — Guyane française, Bas-Amazone.

8603. RUFIGULARIS (Bp.), *C. R.* XXXII, p. 77 (*rufigula*); Scl., *l. c.*, p. 27, pl. 13. — Ecuador.

8604. AURULENTA (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1843, p. 290; Scl., *l. c.*, p. 30, pl. 14, f. 2. — Colombie, Ecuador.

2255. *Var.* SCLATERI, Lafr., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1854, p. 207; Scl., *l. c.*, pl. 14, f. 1. — Colombie centr.

8605. PULCHRA (Tsch.), *Arch. f. Nat.*, 1844, I, p. 285; id., *F. P.*, p. 200, pl. 18, f. 2; Scl., *l. c.*, p. 33, pl. 15. — Pérou, Bolivie.

2256. *Var.* ÆQUATORIALIS, Tacz. et Berl., *P. Z. S.*, 1885, p. 77. — Ecuador.

8606. ARTHUSI (Less.), *Ill. Zool.*, pl. 9 (*arthus*); Scl., *l. c.*, p. 35, pl. 16; id., *Cat.*, p. 109. — Vénézuéla, Ecuador E.

8607. ICTEROCEPHALA, Bp., *C. R.* XXXII, p. 76; Scl., *Contr. Orn.*, 1851, p. 53, pl. 70, f. 1; id., *Mon.*, p. 37, pl. 17; *frantzii*, Cab., *J. f. O.*, 1861, p. 87. — Ecuador, Colombie, Vérag., Costa-Rica.

8608. VITRIOLINA (Cab.), *Mus. Hein.* I, p. 28; Scl., *l. c.*, p. 39, pl. 18; *ruficapilla*, Scl., *Contr. Orn.*, 1851, p. 61. — Colombie, Ecuador.

8609. CAYANA (Lin.); Bp., *Consp.* I, p. 234; Scl., *l. c.*, p. 41, pl. 19; ? *autumnalis*, Lin.; *chrysonota*, Scl., *Contr. Orn.*, 1850, pl. 51; *cyanolaima*, Bp. — Guyane, Vénézuéla, Colombie, Pérou E.

8610. CUCULLATA (Sw.), *Orn. Dr.*, pl. 7; Scl., *l. c.*, p. 43, pl. 20. — Vénézuéla.

2257. *Var.* VERSICOLOR, Lawr., *Ann. N. Y. Ac. Sc.*, 1878, p. 152; id., *P. U. S. Nat. Mus.* I, pp. 190, 269; Scl., *Cat.*, p. 113. — Iles Sᵗ-Vincent et Grenada (Pᵗᵉˢ Antilles).

8611. FLAVA (Gm.); Bp., *Consp.* I, p. 234; Scl., *Mon.*, p. 47, pl. 21; *formosa* et *chloroptera*, Vieill. — Brésil E. et S.

Digitized by Google

8612. MARGARITÆ, Allen, *Bull. Am. Mus. Nat. Hist.* III, p. 351. — Matto-Gros. (Brés. W.)

8613. PRETIOSA (Cab.), *Mus. Hein.* I, p. 27; Scl., *l. c.*, p. 50, pl. 22; *cayana*, Lafr. et d'Orb. (nec L.); *gyrola*, Neuw. (nec L.); Dubois, *Orn. Gal.*, p. 134, pl. 87, f. A.; *castanonota*, Scl. (nec Sw.) — Brésil S. et Paraguay.

8614. MELANONOTA (Sw.), *Orn. Dr.*, pl. 51, 43; Scl., *Mon.*, p. 51, pl. 23; *peruviana*, Desm., *Tang.*, pl. 11; *gyrola*, C. Dub., *Orn. Gal.*, pl. 87, f. B. — Brésil S.

8615. GYROLA (Lin.); Bp., *Consp.* I, p. 234; Scl., *l. c.*, p. 55, pl. 25; *chrysoptera*, Sw. — Guyane.

8616. LAVINIA, Cass., *Pr. Ac. Sc. Phil.*, 1858, p. 178, 1860, p. 142, pl. 1, f. 1; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 271; Scl., *Cat.*, p. 116. — Du Nicaragua à l'isth. de Darien.

8617. GYROLOIDES (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1847, p. 277; Scl., *Mon.*, p. 57, pl. 26; *gyrola* (pt.), auct. ant.; *peruviana*, Sw.; *cyanoventris*, Gray. — Du Costa-Rica jusqu'au Pérou, Bolivie et Rio-Négro.

8618. ALBERTINÆ, Pelz., *Ibis*, 1877, p. 337. — Vallée de la Madeira.

8619. DESMARESTI, Gray, *Gen. B.* II, p. 366; Scl., *Mon.*, p. 59, pl. 27; *gyrola*, Sw. (nec L.), *Zool. Ill.*, pl. 28; *viridissima*, Lafr., *Rev. Zool.*, 1847, p. 277. — Vénézuéla, Trinidad, Colombie N.

8620. BRASILIENSIS (Lin.); Burm., *Th. Bras.* III, p. 180; Scl., *Mon. Call.*, p. 61, pl. 28; *barbadensis*, Kuhl; *albiventris*, Gray. — Brésil S. et E.

8621. FLAVIVENTRIS (Vieill.), *N. Dict.* XXXII, p. 410; Scl., *Mon.*, p. 63, pl. 29; id., *Cat.*, p. 120; *mexicana*, Lin.; *cayanensis*, Bp. — Guyane, Bas-Amazone, Rio-Négro.

2258. *Var.* VIEILLOTI, Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 257; id., *Mon.*, p. 65; *mexicana*, Bp. — Trinidad, Vénézuéla.

2259. *Var.* BOLIVIANA (Bp.), *C. R.* XXXII, p. 80; Scl., *Mon. Call.*, p. 67, pl. 30; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 464; *flaviventris* (pt.), auct. plur. — Colombie, Ecuador E., Pérou, Bolivie.

8622. INORNATA, Gould, *P. Z. S.*, 1855, p. 158; Scl., *Mon.*, p. 103, pl. 45. — Véragua, Panama et Colombie.

8623. NIGROVIRIDIS (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1843, p. 69; id., *Mag. de Zool.*, 1843, pl. 43; Scl., *Mon.*, p. 77. — Colombie, Ecuador.

2260. *Var.* CYANESCENS, Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 260; id., *l. c.*, p. 79, pl. 35. — Vénézuéla.

2261. *Var.* BERLEPSCHI, Tacz., *Orn. Pérou*, II, p. 469. — Pérou.

8624. CABANISI, Scl., *Ibis*, 1868, p. 71, pl. 3; id., *Cat.*, p. 123; *sclateri*, Cab. (nec Lafr.), *J. f. O.*, 1866, p. 165. — Costa-Cucu (Guatém.)

8625. DOWI, Salv., *P. Z. S.*, 1863, p. 168; Scl., *Ibis*, 1863, p. 451, pl. 12; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 272. — Costa-Rica, Véragua.

8626. LARVATA, Du Bus, *Esq. Orn.*, pl. 9; Scl., *Mon.*, p. 81, pl. 36. — Mexique S., Guatémala, Honduras.

Digitized by Google

2262. *Var.* Franciscæ, Scl., *P. Z. S.*, 1856, pp. 142, 261; *fanny*, Lafr., *Rev. Zool.*, 1847, p. 72; Des M., *Icon. Orn.*, pl. 56, f. 4. — Amérique centr. du Nicarag. à Panama.

8627. nigrocincta (Bp.), *P. Z. S.*, 1857, p. 121; Scl., *Mon.*, p. 85, pl. 37; *thalassina*, Strickl.; *wilsoni*, Lafr.; Des M., *Ic. Orn.*, pl. 56, f. 2; *larvata*, Cass. (nec Du Bus). — De la Col. au Pérou et Bol., Hᵗ-Amaz., Rio-Négro, Guyane angl.

8628. cyaneicollis (Lafr. et d'Orb.), *Mag. de Zool.*, 1837, p. 55; d'Orb., *Voy.*, *Ois.*, p. 271, pl. 25, f. 1; Scl., *Mon.*, p. 87, pl. 38. — Bolivie, Pérou centr., Ecuador W.

2263. *Var.* Cæruleocephala (Sw.), *An. in Menag.*, p. 356; Bp., *Consp.* I, p. 255; Tacz. et Berl., *P. Z. S.*, 1885, p. 79. — Pérou E., Ecuador E.

2264. *Var.* Granadensis, Berl., *J. f. O.*, 1884, p. 290. — Colombie.

2265. *Var.* Hannahiæ, Cass., *Pr. Ac. Sc. Philad.*, 1864, p. 287, pl. 1, f. 2; Berl., *J. f. O.*, 1884, p. 290. — Vénézuéla.

8629. cyanopygia, Scl., *P. Z. S.*, 1883, p. 653; *cyaneicollis* (pt.), Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 452, 1860, p. 292. — Ecuador W.

8630. ruficervix (Prév. et Des M.), *Voy.* « *Venus* » *Ois.*, p. 212, pl. 5, f. 1; Scl., *Mon.*, p. 71, pl. 32; *rufivertex*, Pr. et Des M.; *leucotis*, Scl. — Colombie, Ecuad. W., Pérou N.

2266. *Var.* Taylori, Tacz. et Berl., *P. Z. S.*, 1885, p. 78. — Ecuador E.

8631. fulvicervix, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1876, p. 554, pl. 30, f. 1; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 465; *ruficervix*, Tacz. (1874). — Bolivie.

8632. labradorides (Boiss.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 67; Pr. et Des M., *Voy.* « *Venus* », p. 213, *Ois.*, pl. V, f. 2; Scl., *Mon.*, p. 89, pl. 39. — Colombie, Ecuador.

8633. cyanotis, Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 294; id., *Ibis*, 1876, p. 408, pl. 12, f. 2; id., *Cat. B.*, p. 151. — Bolivie, Pérou S.

8634. melanotis, Scl., *Ibis*, 1876, p. 408, pl. 12, f. 1; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 475. — Ecuador E., Pérou N., E.

8635. rufigenis, Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 511; id., *Mon.*, p. 91, pl. 40. — Vénézuéla.

8636. parzudakii (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1843, p. 97; id., *Mag. de Zool.*, 1843, pl. 41; Scl., *Mon.*, p. 95, pl. 41. — Colombie, Ecuador E., Pérou.

8637. lunigera, Scl., *Contr. Orn.*, 1851, p. 65, pl. 70, f. 2; id., *Mon.*, p. 95, pl. 42. — Ecuador W.

8638. xanthocephala (Tsch.), *Arch. f. Naturg.*, 1844, I, p. 285; id., *Faun. Pér.*, p. 200, pl. 17, f. 2; Scl., *Mon.*, p. 99, pl. 44, f. 1; *lamprotis*, Scl. — Pérou, Bolivie.

2267. *Var.* Venusta, Scl., *P. Z. S.*, 1854, p. 248; id., *Mon.*, p. 101, pl. 44, f. 2; *xanthocephala* (pt.), Scl. (1851), Tacz. (1879). — Colombie, Ecuad. W., Pérou N.

8639. chrysotis, Du Bus, *Esq. Orn.*, pl. 7; Scl., *Mon.*, p. 97, pl. 43; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 475. — Ecuador E., Pérou N.

Digitized by Google

8640. CYANOPTERA (Sw.), *Orn. Dr.*, pl. 8; Scl., *Mon.*, p. 53, pl. 24; *argentea*, Lafr., *Rev. Zool.*, 1843, p. 69 (nec Tsch.) — Vénéz., Colombie N.

2268. *Var.* WHITELYI, Salv. et Godm., *Ibis*, 1884, p. 445, pl. 13. — Guyane anglaise.

8641. ATRICAPILLA (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1843, p. 290; Scl., *Mon.*, p. 73, pl. 33; *heinei*, Cab. (juv.) — Colombie, Vénézuéla.

8642. ARGENTEA (Tsch.), *Arch. f. Naturg.*, 1844, p. 285; id., *Faun. Per.*, p. 199, pl. 14, f. 2; Scl., *Mon.*, p. 75, pl. 34. — Pérou, Ecuador.

2269. *Var.* VIRIDICOLLIS, Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 468. — Pérou S.

8643. ARGYROPHENGES, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1876, p. 354, pl. 30, f. 2; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 468; Scl., *Cat.*, p. 157. — Pérou, Bolivie.

## 1250. PROCNOPIS

*Procnopis*, Cab. (1844); *Diva*, Scl. (1854).

8644. VASSORI (Boiss.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 4; id., *Mag. de Zool.*, 1841, pl. 25; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 454; *diva*, Less. — Vénézuéla, Colombie, Ecuador, Pérou.

8645. BRANICKII (Tacz.), *P. Z. S.*, 1882, p. 10, pl. 1, f. 2; id., *Orn. Pér.* II, p. 453; Scl., *Cat.*, p. 94. — Pérou N.-E.

8646. ATROCERULEA, Tsch., *Arch. f. Naturg.*, 1844, I, p. 285; id., *Faun. Per.*, p. 199, pl. 13, f. 2; Scl., *Monogr. Tan. Call.*, pl. 31. — Pérou, Bolivie.

## 1251. PIPRIDEA

*Pipræidea*, Sw. (1827); *Procnopis*, Bp. (1851, nec Cab., 1844); *Pipridea*, Scl. (1886).

8647. MELANONOTA (Vieill.), *N. Dict.* XXXII, p. 407; *vittata*, Tem., *Pl. Col.* 48; *cyanea*, Sw. — Bolivie, Brésil S., E., Paraguay.

2270. *Var.* VENEZUELENSIS, Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 265; Tacz. et Berl., *P. Z. S.*, 1884, p. 289. — Vénézuéla, Ecuador, Pérou.

## 1252. CHLOROCHRYSA

*Chlorochrysa* et *Calliparæa*, Bp. (1851).

8648. CALLIPARÆA (Tsch.), *Arch. f. Naturg.*, 1844, I, p. 286; Scl., *Contr. Orn.* 1851, p. 99, pl. 73, f. 1; *callinia*, Scl., *Cat.*, p. 90. — Pérou.

2271. *Var.* FULGENTISSIMA, Chapm., *Bull. Amer. Mus. N. H.*, 1901, p. 225. — Inca Mine (Pérou).

2272. *Var.* BOURCIERI, Bp., *C. R.* XXXII, p. 76; Berl. et Tacz., *P. Z. S.*, 1885, p. 77; *dubusii*, C. Dubois, *Arch. Cosm.*, 1867, p. 118, pl. 7. — Colombie, Ecuador.

Digitized by Google

8649. HEDWIGÆ, Berl. et Solzm., *Ibis*, 1901, p. 716, pl. 15. Pérou S.-E.

8650. PHOENICOTIS (Bp.), *C. R.* XXXII, p. 76; Scl., *Contr. Orn.*, 1851, p. 100, pl. 73, f. 2; *sodiroi*, Pelz., *Verh. Z.-B. Ges. Wien*, 1878, p. 19. Ecuador W.

8651. NITIDISSIMA, Scl., *P. Z. S.*, 1873, p. 728; id., *Ibis*, 1875, p. 466, pl. 10. Antioquia (Colombie).

### 1253. TANAGRELLA

*Tanagrella*, Sw. (1837); *Hypothlypis*, Cab. (1848).

8652. VELIA (Lin.); *Pl. Enl.* 669, f. 3; Bp., *Consp.* I, p. 236; Scl., *Contr. Orn.*, 1851, p. 97; id., *Cat.*, p. 87; *varia*, Steph.; *iridina*, Cab. (nec Hartl.) Guyane.

8653. IRIDINA (Hartl.), *Rev. Zool.*, 1841, p. 305; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 453; *elegantissima*, Verr., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1853, p. 195. Colombie, Ecuador, Pérou, Rio-Négro.

8654. CYANOMELAS (Neuw.), *Beitr.* III, p. 453; Scl., *Contr. Orn.*, 1851, p. 97; *velia* (pt.), Gm.; *multicolor* et *tenuirostris*, Sw.; *cyanomelæna*, Scl. Brésil S., E.

8655. CALLOPHRYS (Cab.), *Schomb. Guin.* III, p. 668; Bp., *C. R.*, XXXII, p. 77; Scl., *Contr. Orn.*, 1851, p. 98, pl. 74; id., *Cat.*, p. 89. Ecuador, Pérou.

## SUBF. V. — PROCNIATINÆ

### 1254. PROCNIAS

*Procnias*, Illig. (1811); *Tersa*, Vieill. (1816); *Tersina*, Vieill. (1819).

8656. TERSA (Lin.); Bp., *Consp.* I, p. 252; *ventralis*, Ill.; Tem., *Pl. col.* 5; *cærulea*, Vieill., *Gal. Ois.* II, pl. 119; *hirundinacea*, Sw., *Zool. Ill.*, ser. I, pl. 21. Brésil.

2273. *Var.* OCCIDENTALIS, Scl., *P. Z. S.*, 1854, p. 240; Tacz., *Orn. Pérou*, II, p. 437; *cærulea occidentalis*, Berl. Guyane, Vénéz., Col., Ecuad., Pérou, Bol.

## SUBF. VI. — EUPHONIINÆ

### 1255. CHLOROPHONIA

*Chlorophonia*, Bp. (1851); *Triglyphidia*, Rchb. (1851); *Acrocompsa*, Cab. (1861).

8657. VIRIDIS (Vieill.), *N. Dict.* XXXII, p. 426; Tem., *Pl. col.* 36, f. 3; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 81; *chlorocapilla*, Shaw. Brésil S., E.

Digitized by Google

8658. LONGIPENNIS (Du Bus), *Bull. Acad. Brux.*, 1855, I, p. 156; Scl. et Salv., *Exot. Orn*, p. 82, pl. 41, f. 2. — Colombie, Ecuador.

8659. TORREJONI, Tacz., *P. Z. S.*, 1882, p. 9, pl. 1, f. 1; *viridis*, Tacz. (1879). — Colombie, Pérou, Bolivie.

8660. FRONTALIS, Scl., *Contr. Orn.*, 1851, p. 89; id., *P. Z. S.*, 1856, p. 270; Scl. et Salv., *Exot. Orn.* p. 81, pl. 41, f. 1. — Vénézuéla, Sierra-Névada (Colombie).

8661. RORAIMÆ, Salv. et Godm., *Ibis*, 1884, p. 444; Sclat., *Cat. B.* XI, p. 56, pl. 6, f. 1. — Guyane anglaise.

8662. FLAVIROSTRIS, Scl., *P. Z. S.*, 1861, p. 129; id., *Cat. B.*, p. 56, pl. 6, f. 2. — Ecuador.

8663. PRETREI (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1843, p. 97; id., *Mag. de Zool.*, 1843, *Ois.*, pl. 42 (mas.); *pyrrhophrys*, Scl., *Contr. Orn.*, 1851, p. 89, pl. 75, f. 2 (fem.) — Colombie et Andes de Mérida (Vénézuéla).

8664. OCCIPITALIS (Du Bus), *Esq. Orn.*, pl. 14 (fem.); Bp., *Rev. Zool.*, 1851, p. 138; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 83, pl. 42 (1). — Mexique S., Guatémala.

8665. CALLOPHRYS (Cab.), *J. f. O.*, 1860, p. 331, 1861, p. 88; Salv. et Godm., *Biol. C.-A., Aves*, I, p. 254. — Costa-Rica, Véragua.

## 1256. HYPOPHÆA

*Ypophæa*, Bp. (1854); *Hypophæa*, Cab. (1861).

8666. CHALYBEA (Mik.), *Faun. et Fl. Bras.*, pl. 3, ff. 1, 2; Scl., *Contr. Orn.*, 1851, p. 85; *ænea*, Sund., *Vet.-Akad. Handl.*, 1854, p. 309, pl. 11, f. 4; *pardalotes*, Less. — Brésil S., E.

## 1257. PYRRHUPHONIA

*Pyrrhuphonia*, Bp. (1850).

8667. JAMAICA (Lin.); Gosse, *B. Jam.*, p. 238; id., *Ill. Orn. Jam.*, pl. 59; *cinerea*, Lafr.; *jamaicensis*, Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 280. — Jamaïque.

## 1258. EUPHONIA

*Euphonia*, Desm. (1805); *Cyanophonia*, Bp. (1851); *Acroleptes* et *Iliolopha*, Bp. (1854); *Phonasca*, Cab. (1860).

8668. MUSICA (Gm.); *Pl. Enl.* 809, f. 1; Scl., *Contr. Orn.*, 1851, p. 82; id., *Cat.*, p. 59; *cœruleocephala*, Sw. — St-Domingue.

(1) J'ai lieu de croire que l'*E. cyanodorsalis*, décrit et figuré par mon père (*Rev. et Mag. de Zool*, 1859, p. 49, pl. 2) est une simple variété accidentelle ou aberration du *Chlor. occipitalis*. Je ne sais ce que le type est devenu.

Digitized by Google

8669. INSIGNIS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1877, p. 521, pl. 52, f. 1; Scl., *Cat.*, p. 60. — Jima (Ecuador).

8670. SCLATERI, Bp., *M.S.*; Sundev., *OEfv. Vet.-Ak. Förh.*, 1869, p. 596; Desm., *Tang.*, pl. 19, 20; *musica*, Bp., *Rev. Zool.*, 1851, p. 158; *flavifrons*, Scl. (nec Sparrm.); *bryanti*, Baird. — Porto-Rico.

8671. NIGRICOLLIS (Vieill.), *N. Dict.* XXXII, p. 412; Scl., *Contr. Orn.*, 1851, p. 83, pl. 75, f. 1; *musica*, Neuw.; *cyanocephala*, *aureata*, Vieill.; *chrysogastra*, Cuv. — Amér. mérid., de Col., Vénéz. et Guyane jusqu'au 25° l. S.

8672. ELEGANTISSIMA (Bp.), *P. Z. S.*, 1837, p. 112; id., *Consp.* I, p. 232; Du Bus, *Esq. Orn.*, pl. 8; *cœlestis*, Less.; *galericulata*, Gir., *B. Tex.*, pl. 5, f. 2; *tibicen*, Licht. — Du S. du Mexique à Panama.

8673. FLAVIFRONS (Sparrm.), *Mus. Carls.* IV, n° 92; Sundev., *OEfv. Vet.-Ak.*, 1869, p. 585; Scl., *Cat.*, p. 63. — Petites Antilles.

8674. CHLOROTICA (Lin.); Licht., *Verz. Doubl.*, p. 29; Sundev., *Vet.-Ak. Handl.*, 1833, pl. 10, ff. 2, 3; Scl., *Cat. B.*, p. 64; *violacea*, Gm. — Guyane.

2274. *Var.* VIOLACEICOLLIS, Cab., *J. f. O.*, 1865, p. 409, 1878, p. 195. — Brésil, Paraguay.

2275. *Var.* SERRIROSTRIS, d'Orb. et Lafr., *Mag. de Zool.*, 1837, p. 30; d'Orb., *Voy.*, p. 267, pl. 21, f. 2. — Bolivie.

2276. *Var.* TACZANOWSKII, Scl., *Cat.*, p. 65; *serrirostris*, Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 440 (nec d'Orb.) — Pérou.

8675. AFFINIS (Less.), *Rev. Zool.*, 1842, p. 175; Scl., *P. Z. S.*, 1856, pp. 274, 303; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.*, *Aves*, I, p. 257. — Amér. centr. du S. du Mex. au Costa-Rica.

8676. TRINITATIS, Strickl., *Contr. Orn.*, 1851, p. 72; Scl., *Cat.*, p. 66. — Colombie N., Vénézuéla, Trinidad.

8677. XANTHOGASTRA, Sundev., *Vet.-Akad. Handl.* 1833, p. 310, pl. 10, f. 1; Scl., *Cat.*, p. 67; *brevirostris*, Bp.; *ochrascens*, Pelz., *Orn. Bras.*, p. 328. — Brés., Guyane, Vénéz., Col., Ecuad., Pérou.

2277. *Var.* BRUNNEIFRONS, Chapm., *Bull. Amer. Mus. N. H.*, 1901, p. 226. — Inca Mine (Pérou).

8678. RUFICEPS, Lafr. et d'Orb., *Mag. de Zool.*, 1837, p. 30; d'Orb., *Voy.*, p. 268, pl. 22, f. 2; Scl., *l. c.*, p. 68. — Bolivie, Vénézuéla.

8679. LUTEICAPILLA (Cab.), *J. f. O.*, 1860, p. 332; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.*, *Aves*, p. 260, pl. 16, f. 1. — Costa-Rica, Véragua.

8680. GRACILIS (Cab.), *J. f. O.*, 1860, p. 333; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 259, pl. 16, f. 3. — Costa-Rica, Véragua.

8681. CONCINNA, Scl., *P. Z. S.*, 1854, p. 98, pl. 65, f. 2; id., *Cat.*, p. 69, pl. 7. — Colombie.

8682. FINSCHI, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1877, p. 19; Scl., *Cat.*, p. 70, pl. 8, f. 1; *concinna*, Pelz. (nec Scl.), *Orn. Bras.*, p. 203. — Guyane, Rio-Branco.

Digitized by Google

8683. SATURATA (Cab.), *J. f. O.*, 1860, p. 336; Scl., *l. c.*, pl. 8, f. 2; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 445. — Ecuador W., Pérou.

8684. MINUTA, Cab. in *Schomb. Guian.* III, p. 671; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 258; ?*olivacea*, Desm., *Tang.*, pl. 27; *strictifrons*, Strickl.; *pumila*, Bp.; *humilis*, Cab.; *leucopyga*, Natt. — Guyane, Bas-Amaz., Ecuad., Colombie et Amér. centr. jusqu'au Guatémala.

8685. GODMANI, Brewst., *Auk*, 1889, p. 90. — Mexique W.

8686. ANNÆ, Cass., *Pr. Ac. Sc. Philad.*, 1865, p. 172; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 265; *rufivertex*, Salv., *P. Z. S.*, 1866, p. 71, pl. 7. — Costa-Rica, Véragua.

8687. FULVICRISSA, Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 276; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 264, pl. 16, f. 2; *gouldi*, Lawr. (nec Scl.) — Colombie N., Panama.

8688. VIOLACEA (Lin.); Cab., *Schomb. Guian.* III, p. 671; Scl., *l. c.*, p. 74; ?*brachyptera*, Cab.; *purpurea*, Lawr. — Guyane, Trinidad, Bas-Amazone.

2278. *Var.* MINOR, Licht., *Doubl.*, p. 29; *lichtensteini*, Cab., *J. f. O.*, 1860, p. 331. — Brésil S., E.

8689. HIRUNDINACEA, Bp., *P. Z. S.*, 1837, p. 117; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 261; Scl., *l. c.*, p. 75. — Du S. du Mexique au Costa-Rica.

2279. *Var.* GNATHO (Cab.), *J. f. O.*, 1860, p. 335, 1861, p. 90. — Costa-Rica.

8690. LANIIROSTRIS, Lafr. et d'Orb., *Mag. de Zool.*, 1837, p. 30; d'Orb., *Voy.*, p. 266, pl. 23, f. 1; *crassirostris*, Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 277. — Du Véragua au Pérou, Hᵗ-Amazone, Bolivie, Vénézuéla.

8691. HYPOXANTHA, Berl. et Tacz., *P. Z. S.*, 1883, p. 554; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 445; *crassirostris* (pt.), Scl. — Ecuador W., Pérou N.-W.

8692. MELANURA, Scl., *Contr. Orn.*, 1851, p. 86; id., *Cat.*, p. 78, pl. 9. — Hᵗ-Amazone, Colomb.

8693. RUFIVENTRIS (Vieill.), *N. Dict.* XXXII, p. 426; Bp., *Consp.*, p. 233; *bicolor*, Strickl., *Contr. Orn.*, 1850, p. 48, pl. 49, f. 2; *chrysogaster*, Cuv. — Hᵗ-Amazone, Rio-Négro.

8694. VITTATA, Scl., *P. Z. S.*, 1861, p. 129; id., *Cat.*, p. 80, pl. 10. — Brésil.

8695. PECTORALIS (Lath.), *Ind. Orn. Suppl.*, p. 57; Bp., *Consp.*, p. 233; *rufiventris*, Licht.; *chlorocyanea*, Vieill.; *umbilicalis*, Less. — Brésil S., E.

8696. CAYANA (Lin.); Bp., *l. c.*; Scl., *Contr. Orn.*, 1851, p. 88; *cayennensis*, Gm.; Cab., *Schomb. Guian.* III, p. 671. — Guyane, Bas-Amazone.

8697. GOULDI, Scl., *P. Z. S.*, 1857, p. 66, pl. 124; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 263. — Du S. du Mexique au Costa-Rica.

8698. MESOCHRYSA, Salvad., *Atti R. Accad. Sc. Tor.*, 1873, p. 193; *chalcopasta*, Scl. et Salv., *Nomencl.*, pp. 18, 157; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 449. — Colombie, Ecuador, Pérou.

8699. CHRYSOPASTA, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1869, p. 438, pl. 30, ff. 1, 2; Tacz., *l. c.*, p. 448. — Amazone, Bolivie, Pérou, Colombie.



Digitized by Google

8700. PLUMBEA, Du Bus, *Bull. Acad. Brux.*, 1855, I, p. 156; Scl., *Cat.*, p. 83; *poliocephala*, Natt. — Bas-Amazone, Guyane anglaise.

## FAM. XLVI. — DICÆIDÆ (1)

### SUBF. I. — PARDALOTINÆ

#### 1259. OREOCHARIS

*Oreocharis*, Salvad. (1875); *Chloromyias*, Oust. (1880.)

8701. ARFAKI (Mey.), *Sitz. Isis Dresd.*, 1875, April; Gould, *B. New Guin.* IV, pl. 13; *stictoptera*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 939; id., *Orn. Pap.* II, p. 289; *laglaizei*, Oust. — Nouv.-Guinée.

#### 1260. PARDALOTUS

*Pardalotus*, Vieill. (1816).

8702. ORNATUS, Tem., *Pl. col.* 394, f. 1; Sharpe, *Cat.* X, p. 55; *striatus*, auct. plur. (nec Gm.); Gould, *B. Austr.* II, pl. 38. — Australie, au S. du 20° l. S.

2280. *Var.* ASSIMILIS, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1878, p. 180. — Australie E. et centr. au S. du 20° l. S.

8703. AFFINIS, Gould, *P. Z. S.*, 1837, p. 25; id., *B. Austr.* II, pl. 39; ? *striata*, Gm. — Australie S., S.-E. et Tasmanie.

8704. PUNCTATUS (Shaw et Nod.), *Nat. Misc.* IV, pl. 111; Tem., *Pl. Col.* 78; Gould, *Op. cit.* II, pl. 35. — Australie, sauf le N.

8705. XANTHOPYGIUS, M'Coy, *Ann. Mag. N. H.*, 1867, p. 184; Gould, *Op. cit.*, *Suppl.*, pl. 8; Sharpe, *Cat.*, p. 59. — Australie W., S. et S.-E.

8706. RUBRICATUS, Gould, *P. Z. S.*, 1837, p. 149; id., *Op. cit.* II, pl. 36; Sharpe, *l. c.*, p. 60. — Austr. centr., Nouv.-Galles du S., etc.

8707. MELANOCEPHALUS, Gould, *P. Z. S.*, 1837, p. 149; Diggles, *Orn. Austr.*, pl. 30, f. 4; *uropygialis*, Gr. (nec Gd.) — Australie E. et centr.

8708. UROPYGIALIS, Gould, *P. Z. S.*, 1839, p. 145; id., *Op. cit.* II, pl. 41; Diggles, *Op. cit.*, pl. 30, f. 5; *uropygiale*, H. et Jacq. — Australie N.

8709. QUADRAGINTUS, Gould, *P. Z. S.*, 1837, p. 148; id., *Op. cit.* II, pl. 37. — Tasmanie.

#### 1261. PRIONOCHILUS

*Prionochilus*, Strickl. (1841); *Pachyglossa*, Hodgs. (1843); *Piprisoma*, Blyth (1844); *Anaimos*, Rchb. (1853); *Acmonorhynchus*, Oates (1855).

8710. PERCUSSUS (Tem.), *Pl. Col.* 394, f. 2; Sharpe, *Cat.* X, p. 65. — Java.

(1) Voy. : Sharpe, *Cat. Birds Brit. Mus.* X, pp. 10-84 (part., 1885).

Digitized by Google

2281. *Var.* IGNICAPILLA (Eyton), *P. Z. S.*, 1839, p. 105; *percussus*, auct. plur.; Oates, *B. Brit. Burm.* I, p. 339. — Malacca, Sumatra, Bornéo.

8711. XANTHOPYGIUS, Salvad., *Atti R. Accad. Torin.*, 1868, p. 416; id., *Ucc. Borneo*, p. 162; Sharpe, *l. c.*, p. 66. — Bornéo.

8712. JOHANNÆ, Sharpe, *Ibis*, 1888, p. 201, pl. 4, f. 1; *plateni*, W. Blas., *Ornis*, 1888, p. 313. — Palawan, Paragua.

8713. THORACICUS (Tem.), *Pl. Col.* 600, ff. 1, 2; Strickl., *P. Z. S.*, 1841, p. 29; Sharpe, *l. c.*, p. 67. — Malacca, Bornéo.

8714. MACULATUS (Tem.), *Pl. Col.* 600, f. 3; Strickl, *P. Z. S.*, 1841, p. 29; Oates, *B. Brit. Burma*, I, p. 340. — Ténassér. S., Malacca, Sumatra, Bornéo.

8715. QUADRICOLOR, Tweedd., *P. Z. S.*, 1877, p. 762, pl. 77, f. 2. — Panaon (Philippines).

8716. AUREOLIMBATUS, Wall., *P. Z. S.*, 1865, p. 477, pl. 29, f. 1; Mey. et Wg., *B. Cel.* II, p. 449. — Célèbes.

8717. SANGHIRENSIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1876, p. 59; Mey. et Wg., *B. Cel.* II, p. 451, pl. 27, f. 1. — Sanghir.

8718. MELANOXANTHUS (Hodgs.), *Icon. ined.*, *Passeres*, pl. 38; Sclat., *Ibis*, 1874, p. 3, pl. 1, f. 3. — Népaul, Sikkim.

8719. VINCENS, Sclat., *P. Z. S.*, 1872, p. 729; id., *Ibis*, 1874, p. 2, pl. 1, ff. 1, 2; Legge, *B. Ceyl.*, p. 577, pl. 26, ff. 1, 2. — Ceylan.

8720. SQUALIDUS (Burt.), *P. Z. S.*, 1836, p. 113; Sharpe, *Cat.*, p. 73; *agilis*, Tick.; Beav., *Ibis*, 1867, p. 430, pl. 10; *vireoides*, Jerd. — Inde, Ceylan, Birmanie, Ténassérim.

8721. MODESTUS, Hume, *Str. F.*, 1875, p. 298; Oat., *B. Br. Burm.* I, p. 340; Sharpe, *l. c.*, p. 74. — Ténassérim, Pégou.

8722. OBSOLETUS (Müll. et Schl.), *Verh. Nat. Gesch. Land- en Volk.*, 1839-44, p. 174; Sharpe, *P. Z. S.*, 1879, p. 343, pl. 30, f. 2. — Timor, Flores.

8723. ANNÆ (Büttik.), *Web. Reise Ned. O.-Indie*, p. 301, pl. 18, f. 4. — Flores, Sumbawa.

8724. OLIVACEUS, Tweed., *Ann. and Mag. N. H.*, 1877, p. 536; id., *P. Z. S.*, 1878, p. 111, pl. 8, f. 3. — Dinagat (Philippines).

8725. SAMARENSIS, Steere, *List of B. and Mam. Philipp.*, p. 22. — Samar, Leyte.

8726. ÆRUGINOSUS, Bourns et Worc., *Occ. Pap. Minnes. Ac.* I, pp. 18-20. — Cebu (Philippines).

8727. BICOLOR, Bourns et Worc., *Op. cit.* — Mindanao (Philipp.)

8728. INEXPECTATUS, Hart., *Novit. Zool.* II, p. 64. — Luçon, Mindoro.

8729. EVERETTI, Sharpe, *Ibis*, 1877, p. 16, 1879, p. 343, pl. 30, f. 1. — Bornéo W., Labuan.

## 1262. UROCHARIS

*Urocharis*, Salvad. (1880).

8730. LONGICAUDA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 942, 1880, p. 69; id., *Orn. Pap. Mol.* II, p. 286. — Monts Arfak (Nouv.-Guinée).

Digitized by Google

### 1263. MELANOCHARIS

*Melanocharis*, Sclat. (1858).

8731. NIGRA (Less.), *Voy. Coq.*, *Zool.* I, p. 673; id., *Cent. Zool.*, p. 83, pl. 27; Scl., *Pr. Linn. Soc.*, 1858, p. 157; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 283. — Nouv.-Guinée, Waigiou, Mysol.

8732. CHLOROPTERA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 987; id., *Orn. Pap.* II, p. 284; *niger*, Gr. — Nouv.-Guinée S.-E., Arou.

8733. BICOLOR, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.* III, 1879, p. 277; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 285; *unicolor*, Rams., *l. c.*, IV, p. 98. — Nouv.-Guinée S.-E.

8734. UNICOLOR, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1878, p. 333; id., *Orn. Pap.* II, p. 282; *major* (pt.), Mey. — Iles Jobi et Miosnom.

8735. STRIATIVENTRIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* XIV, p. 150. — Moroka (Nouv.-Guin. S.-E.)

### 1264. PRISTORHAMPHUS

*Pristorhamphus*, Finsch (1875).

8736. VERSTERI, Finsch, *P. Z. S.*, 1875, p. 642; Salvad., *l. c.* II, p. 286. — Monts Arfak (Nouv.-Guinée).

### 1265. RHAMPHOCHARIS

*Rhamphocharis*, Salvad. (1875).

8737. CRASSIROSTRIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 943; id., *Orn. Pap.* II, p. 288; Sharpe, *Cat.*, p. 84. — Nouv.-Guinée N.-W.

## SUBF. II. — DICÆINÆ

### 1266. DICÆUM

*Dicæum*, Cuv. (1817); *Myazanthe*, Hodgs. (1843); *Microchelidon*, Rchb. (1853).

8738. FLAMMEUM (Sparrm.), *Mus. Carls.*, pl. 98; Levail., *Ois. d'Afr.* III, pl. 136; *rubescens*, Vieill.; *rubrocana*, Tem., *Pl. Col.* 108, ff. 2, 3; *rubricosum*, Cuv. — Java, Madura, Bornéo.

8739. CRUENTATUM (Lin.); Strickl., *Ann. Mag. N. H.*, 1844, p. 38; *coccinea*, Scop.; *erythronotus*, Lath.; Audeb. et Vieill., *Ois. dorés*, II, p. 57, pl. 33; *ignita*, Begb.; *coccineum*, Gray. — Himalaya S.-E., Chine S., Indo-Chine, Malacca, Sumatra, Java.

2282. *Var.* NIGRIMENTUM, Salvad., *Ucc. Borneo*, p. 165; Sharpe, *Cat.*, p. 17; *coccineum* et *cruentatum* (pt.), auct. plur. — Malacca, Bornéo.

2283. *Var.* HOSEI, Sharpe, *Ibis*, 1897, p. 449. — Célèbes N.

Digitized by Google

2284. *Var.* PRYERI, Sharpe, *P. Z. S.*, 1881, p. 795; id., *Cat.*, p. 18. — Bornéo N.-E.

8740. SUMATRANUM, Cab., *J. f. O.*, 1878, p. 101; Sharpe, *l. c.* — Sumatra.

8741. IGNIFERUM, Wall., *P. Z. S.*, 1863, p. 494; Finsch, *Neu-Guin.*, p. 163. — Flores.

8742. HIRUNDINACEUM (Shaw et Nod.), *Nat. Misc.* IV, pl. 114; Gould, *B. Austr.* II, pl. 34; *desmaresti*, Leach; *atrogaster*, Less.; *pardalotus*, Lafr., *Mag. de Zool.*, 1833, pl. 14. — Australie, Tasmanie.

8743. IGNICOLLE, Gray, *P. Z. S.*, 1858, p. 173; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 278. — Iles Arou.

8744. KEIENSE, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1874, p. 314; id., *Orn. Pap.* II, p. 279. — Iles Kei (Moluques).

8745. FULGIDUM, Sclat., *P. Z. S.*, 1883, p. 56; Sharpe, *l. c.*, p. 22. — Iles Ténimber.

8746. CELEBICUM, Müll. et Schl., *Verh. Nat. Gesch. Land- en Volk.*, p. 182; Mey. et Wg., *B. Cel.*, pl. 25, ff. 1, 2; *leclancheri*, Lafr., *Rev. Zool.*, 1845, p. 94. — Célèbes.

8747. NEHRKORNI, W. Blas.; Schal., *J. f. O.*, 1886, p. 399; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 447, pl. 25, f. 4. — Célèbes N.

8748. SANGHIRENSE, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* IX, 1876, p. 58; Mey. et Wg., *B. Cel.*, pl. 25, f. 3. — Sanghir.

8749. TALAUTENSE, Mey. et Wg., *Abh. Mus. Dresd.*, 1894-95, n° 9, p. 5; id., *B. Cel.*, p. 445. — Ile Talaut.

8750. SULAENSE, Sharpe, *P. Z. S.*, 1883, p. 579; id., *Cat.*, p. 24; *celebicum*, Wall. (nec M. et Schl.) — Iles Soula.

8751. MONTICOLUM, Sharpe, *Ibis*, 1887, p. 452, 1890, pl. 8, ff. 2, 3. — Bornéo N.

8752. SANGUINOLENTUM, Tem., *Pl. Col.* 478, f. 2; Sharpe, *l. c.*, p. 25. — Java.

8753. MACKLOTI, Müll. et Schl., *Verh. Nat. Gesch. Land- en Volk.*, p. 162; Finsch, *Neu-Guin.*, p. 163; Sharpe, *l. c.*, p. 25. — Timor, Savu.

2285. *Var.* NEGLECTA (*neglectum*), Hart., *Novit. Zool.* IV, p. 264. — Lombock.

8754. WILHELMINÆ, Büttik., *Notes Leyd. Mus.* XIV, p. 199. — Sumba.

8755. SPLENDIDUM, Büttik., *Notes Leyd. Mus.* XV, p. 180. — Macassar (Célèbes).

8756. SALVADORII, Mey., *Vög. etc. Ostind. Arch.*, p. 83 (1884); Sharpe, *l. c.*, p. 26. — Babbar (Moluques).

8757. RUBROCORONATUM, Sharpe, *Nature*, 1876, p. 539; id., *Cat.* X, p. 26, pl. 1, f. 1. — Nouv.-Guinée S.-E.

2286. *Var.* PULCHRIA, Sharpe, *P. Z. S.*, 1883, p. 579; id., *l. c.*, pl. 1, f. 2. — Monts Astrolabes (Nouv.-Guinée).

8758. NITIDUM, Tristr., *Ibis*, 1889, p. 555. — Ile Sudest.

8759. RUBRIGULARE, D'Alb. et Salv., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1879, p. 74; Salvad., *Orn. Pap.* etc. II, p. 277. — Nouv.-Guinée S.-E.

Digitized by Google

8760. ALBO-PUNCTATUM, D'Alb. et Salvad., *l. c.*, 1879, p. 75; Salvad., *l. c.* II, p. 278. — Nouv.-Guinée S.-E.

8761. SCHISTACEICEPS, Gray, *P. Z. S.*, 1860, p. 349; Finsch, *Neu-Guin.*, p. 163; Salvad., *l. c.* II, p. 272. — Halmahera, Batjan, Morty (Moluques).

8762. VULNERATUM, Wall., *P. Z. S.*, 1863, p. 32; Finsch, *Neu-Guin.*, p. 163; Salvad., *l. c.* II, p. 271. — Céram, Amboine, Manuvolka.

8763. PECTORALE, Müll. et Schl., *Verh. Nat. Gesch. Land- en Volk.*, p. 162; Finsch, *Neu-Guin.*, p. 163; Salvad., *l. c.* II, p. 273. — Nouv.-Guinée, Salwati, Mysol, Waigiou, Batanta.

8764. ÆNEUM, Jacq. et Puch., *Voy. Pôle Sud, Zool.* II, p. 97, pl. 22, f. 4; Salvad., *l. c.* II, p. 280; Gould, *B. New-Guin.* XVII, pl.; *erythrothorax*, Rams. (1879, nec Less.) — Iles Salomon.

8765. ERYTHROTHORAX, Less., *Voy. Coq., Zool.*, p. 672, pl. 30, ff. 1, 2; Finsch, *Neu-Guin.*, p. 163; Salvad., *l. c.* II, p. 272. — Ile Bourou.

8766. LAYARDORUM, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1880, p. 67; id., *Orn. Pap.* II, p. 272; *erythrothorax*, Rams. (1876, nec Less.) — Nouv.-Bretagne.

8767. EXIMIUM, Scl., *P. Z. S.*, 1877, p. 102, pl. 14, f. 2; Salvad., *l. c.*, p. 280. — Nouv.-Irlande.

8768. GEELVINKIANUM, Mey., *Sitz. K. Akad. Wien*, 1874, p. 120; Gould, *B. New Guin.* IX, pl.; *jobiensis*, Salvad. — Ile Jobi (baie de Geelvink).

2287. *Var.* MYSORIENSIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 945; id., *l. c.*, p. 275; *geelvinkianum* (pt.), Mey. — Ile Mysori (baie de Geelvink).

2288. *Var.* MAFORENSIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 944; id., *l. c.*, p. 275; *geelvinkianum* (pt.), Mey. — Ile Mafoor (baie de Geelvink).

8769. TRISTRAMI, Sharpe, *P. Z. S.*, 1885, p. 579; id., *Cat.*, p. 34. — San Cristoval (Salomon).

8770. RETROCINCTUM, Gould, *Ann. and Mag. N. H.*, 1872, p. 114; id., *B. As.*, part. XXVII, pl.; Sharpe, *l. c.*, p. 35. — Ile Luçon.

8771. HÆMATOSTICTUM, Sharpe, *Nature*, 1876, p. 297; id., *Cat.*, p. 35. — Guimaras, Panay, Negros (Philippines).

8772. PALLIDIOR, Bourns et Worc., *Occ. Pap. Minnes. Ac.* I, pp. 18-20. — Cebu.

8773. SIBUYANICUM, Bourns et Worc., *Op. cit.* — Sibuyan.

8774. INTERMEDIUM, Bourns et Worc., *Op. cit.* — Tablas.

8775. ASSIMILE, Bourns et Worc., *Op. cit.* — Soulou.

8776. RUBRIVENTER, Less., *Traité*, p. 305; *Pl. Enl.* 707, f. 2; *papuensis!* (Gm.); *schistaceum*, Tweed.; *retrocinctum*, Gould (fem.); id., *B. Asia*, part. XXVII (fig. infér.) — Luçon, Dinagat, Mindanao, Cebu, Marinduque, Basilan.

Digitized by Google

8777. FLAVIVENTER, Mey., *J. f. O.*, 1894, p. 91. — Cebu.

8778. HYPOLEUCUM, Sharpe, *Nature*, 1876, p. 298; id., *Ibis*, 1894, pl. 7, f. 3. — Malamaui, Basilan, Soulou.

8779. MINDANENSE, Tweedd., *P. Z. S.*, 1877, p. 547; id., *Rep. Voy. « Challenger »*, *Birds*, p. 20, pl. 5, f. 1. — Mindanao.

8780. TRIGONOSTIGMA (Scop.); Gray, *Gen. B.* I, p. 100; Sharpe, *l. c.*, p. 38; *cantillans*, Lath.; Tem., *Pl. Col.* 478, f. 3; *croceoventre*, Vig. — Bengal N.-E., Indo-Chine W., Malacca, Sum., Bornéo, Java.

8781. SIBUTUENSE, Sharpe, *Ibis*, 1894, pp. 122, 251, pl. 7, ff. 1, 2. — Ile Sibutu.

8782. DORSALE, Sharpe, *Nature*, 1876, p. 298; Gould, *B. Asia*, pl.; Sharpe, *Cat.*, p. 40. — Cebu, Panay, Negros, Masbate.

8783. XANTHOPYGIUM, Tweed., *Ann. and Mag. N. H.*, 1877, p. 96; id., *P. Z. S.*, 1877, p. 698, pl. 73, f. 1. — Luçon, Mindoro.

8784. CINEREIGULARE, Tweed., *P. Z. S.*, 1877, p. 829; Sharpe, *Cat.*, p. 40. — Mindanao, Samar, Leyte.

8785. BESTI, Steere, *List. Philipp. B.*, p. 22 (1890). — Siquijor.

8786. LUZONIENSE, Grant, *Ibis*, 1894, p. 515. — Luçon N.

8787. IGNIPECTUS (Hodgs.), *Icon. ined.*, *Passeres*, pl. 56, n° 395; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 84; Oat., *B. Brit. Burm.* I, p. 337. — Himalaya, Bengal N.-E., Chine S., Indo-Chine W.

8788. CYANONOTUM, Styan, *Ibis*, 1893, p. 470. — Formose.

8789. PYGMÆUM (Kittl.), *Mém. prés. Acad. St-Pétersbourg*, II, 1833, pp. 1, 2, pl. 2; Gray, *Gen. B.* I, p. 100; Sharpe, *Cat.*, p. 43. — Philippines.

8790. CHRYSORRHOEUM, Tem., *Pl. Col.* 478, f. 1; Jerd., *B. Ind.* I, p. 374; *chrysochlore*, Blyth. — Himal. E., Indo-Chine, Malacca, Sumatra, Bornéo, Java.

8791. CONCOLOR, Jerd., *Madr. Journ.*, 1840, p. 227; id., *Ill. Ind. Orn.*, pl. 39; Sharpe, *l. c.*, p. 45. — Inde S. (Montagnes).

8792. OBSCURUM, Grant, *Ibis*, 1894, pp. 515, 551. — Luçon N.

8793. INORNATUM (Hodgs.), *Icon. ined.*, *Passeres*, pl. 57, n° 395; Sharpe, *l. c.*, p. 45; *olivaceum*, Wald., *Ann. and Mag. N. H.*, 1875, p. 401. — Himalaya E., Indo-Chine, Sumatra.

8794. VIRESCENS, Hume, *Str. F.*, 1875, p. 482; Sharpe, *l. c.*, p. 46. — Iles Andaman.

8795. MINULLUM, Swinh., *Ibis*, 1870, p. 240; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 85. — Ile Haïnan.

8796. EVERETTI, Tweed., *Ann. and Mag. N. H.*, 1877, p. 557; id., *P. Z. S.*, 1878, p. 111; *modestum*, Tweed., *P. Z. S.*, 1878, p. 380. — Dinagat, Panaon, Samar (Philippines).

8797. ERYTHRORHYNCHUM (Lath.); Bl. et Wald., *B. Burm.*, p. 143; *minima*, Tick.; *minimum*, auct. plur.; *tickelliæ*, Blyth. — Ceylan, Inde centr., Beng., Himal. E., Indo-Chine W.

Digitized by Google

## FAM. XLVII. — CERTHIIDÆ (1)

### SUBF. I. — SITTINÆ

#### 1267. SITTA

*Sitta*, Briss. (1760); *Sittella*, Rafin. (1815).

8798. EUROPÆA, Lin.; Dress., *B. Eur.* III, p. 169, pl. 118; *advena* et *septentrionalis*, Brm.; *uralensis*, Licht.; *asiatica*, Gould, *B. Eur.* III, pl. 256; *sericea*, Tem.; *suecica* et *sibirica*, Brm. — Nord de l'Europe et de l'Asie.

2289. *Var.* ALBIFRONS, Tacz., *Bull. Soc. Zool. de France*, 1882, p. 383. — Kamtschatka.

2290. *Var.* ROSEILIA, Bp., *Consp. Av.* I, p. 227; Blak., *Ibis*, 1862, p. 322; *clara*, Stejn., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1886, p. 392. — Japon N.

2291. *Var.* NAGAENSIS, Godw.-Aust., *P. Z. S.*, 1874, p. 44. — Bengal N.-E.

8799. CÆSIA, Mey. et W., *Deutsch. Vogelk.* I, p. 128; Dubois, *Fne. ill., Ois.* I, p. 666, pl. 155; *europæa*, auct. plur. (nec Lin.); *pinetorum*, *foliorum*, Brm.; *affinis*, Blyth. — Europe centr. et S., Asie Mineure, Afrique N., Canaries.

2292. *Var.* CAUCASICA, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 55. — Caucase.

2293. *Var.* SINENSIS, Verr., *N. Arch. Mus., Bull.* VI, p. 54, VII, p. 28, IX, pl. 4; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 90. — Chine.

2294. *Var.* MONTIUM, La Touche, *Ibis*, 1899, p. 404. — Fokien (Chine).

2295. *Var.* AMURENSIS, Swinh., *P. Z. S.*, 1871, p. 550; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 90. — Amourland.

8800. ECKLONI, Przew., *Reis. in Tibet*, p. 207. — Thibet.

8801. YUNNANENSIS, Grant, *Ibis*, 1900, p. 371. — Yunnan S.

8802. HIMALAYENSIS, Jard. et Sel., *Ill. Orn.* III, pl. 144; Gad., *Cat. B.*, p. 349; *himalayana*, Blyth; *nipalensis*, Hodgs. — Himalaya.

8803. NEGLECTA, Wald., *Ann. and Mag. N. H.*, 1870, p. 218; Oat., *B. Brit. Burm.*, p. 151. — Birmanie, Ténassérim.

8804. NEUMAYERI, Michah., *Isis*, 1850, p. 814; Dress., *B. Eur.* III, p. 183, pl. 120; *rupestris*, Cantr.; *saxatilis*, Schinz; *rufescens*, Gould, *B. Eur.* III, pl. 255. — Espagne, Europe S.-E., Asie Mineure, Caucase.

2296. *Var.* SYRIACA, Ehr. in Tem., *Man. d'Orn.* III, p. 286; Hellm., *J. f. O.*, 1901, p. 185; *neumayeri* (pt.), Gad. — Syrie, Palestine.

(1) Voy. : H. Gadow, *Cat. B. Brit. Mus.*, VIII, pp. 323-366 (1883).

Digitized by Google

2297. *Var.* Tephronota, Sharpe, *Ann. and Mag. N. H.*, 1872, p. 450; Hellm., *J. f. O.*, 1901, p. 186; *rupicola*, Blanf.; id., *East. Pers.* II, p. 225, pl. 15, f. 2 (juv.) — Perse, Turkestan, Béloutchistan, Afghanistan.

8805. magna, W. Rams., *P. Z. S.*, 1876, p. 677, pl. 63; Rip., *Ibis*, 1897, p. 3, pl. 1. — Birmanie.

8806. krueperi, Pelz., *Sitz. K. Ak. Wiss. Wien*, 1863, I, p. 149; Scl., *Ibis*, 1865, p. 310, pl. 7; Dress., *B. Eur.* III, p. 189, pl. 121. — Asie Mineure, Syrie.

8807. whiteheadi, Sharpe, *P. Z. S.*, 1884, p. 233, pl. 36. — Corse.

8808. castaneoventris, Frankl., *P. Z. S.*, 1851, p. 121; Jard. et Sel., *Ill. Orn.* III, pl. 145; Gould, *B. Asia*, I, pl. 9; *castanea*, Less.; *ferrugineoventris*, Gould. — Inde, Afghanistan.

8809. cinnamomeoventris, Blyth, *J. A. S. Beng.* XI, p. 459; Cab., *Mus. H.* I, p. 95; Gould, *B. Asia*, I, pl. 8. — Himalaya, Birmanie.

2298. ? *Var.* Cashmirensis, Brooks, *Pr. A. S. B.*, 1871, p. 209; W. Rams., *Ibis*, 1880, p. 51; *cinnamomeiventris*, Rams., *Ibis*, 1879, p. 447. — Cachemire, Afghanistan.

8810. leucopsis, Gould, *P. Z. S.*, 1849, p. 113; id., *B. Asia*, I, pl. 10; Gad., *Cat.*, p. 352. — Himalaya N.-W.

8811. przewalskii, Berez. et Bianchi, *Aves Exped. Potanini*, 1891, p. 119; id., *J. f. O.*, 1897, p. 74 (trad.) — Kan-sou.

8812. carolinensis, Wils., *Am. Orn.*, pl. 2, f. 3; Audub., *B. Amer.* IV, p. 175, pl. 114; *melanocephala*, Vieill., *Gal. Ois.*, p. 280, pl. 171. — États-Unis et Canada S. (parties orientales).

2299. *Var.* Atkinsi, Scott, *Auk*, 1890, p. 118. — Floride.

2300. *Var.* Aculeata, Cass., *Pr. Phil. Acad.*, 1856, p. 254; Baird, *B. N. Amer.*, p. 375; *carolinensis* (pt.), auct. plur. — États-Unis W. et Colombie anglaise.

2301. *Var.* Lagunæ, Brewst., *Auk*, 1891, p. 149. — Basse-Californie.

2302. *Var.* Mexicana, Nels. et Palm., *Auk*, 1894, p. 45. — Mexique.

8813. canadensis, Briss.; Audub., *B Amer.* IV, p. 179, pl. 248; *varia*, Wils., *Am. Orn.*, pl. 2, f. 4; *stulta*, Vieill. — Amérique du Nord.

8814. villosa, Verr., *Nouv. Arch. Mus. Bull.* I, p. 78, pl. 5, f. 1; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 91, pl. 13. — Chine N.

8815. pygmæa, Vig., *Zool. Beech. Voy.*, p. 25, pl. 4; Audub., *B. Amer.* IV, p. 184, pl. 250. — États-Unis W. et centr., Mexique.

2303. *Var.* Leuconucha, Anth., *Pr. Cal. Ac. Sc.* II, p. 77. — Basse-Californie.

8816. pusilla, Lath., *Ind. Orn.* I, p. 263; Audub., *B. Amer.* IV, p. 181, pl. 249; Baird, *B. N. Am.*, p. 377. — États-Unis du S.

2304. *Var.* Caniceps, Bangs, *Auk*, 1898, p. 180. — Floride.

## 1268. DENDROPHILA

*Dendrophila*, Sw. (1837); *Calisitta*, Rchb. (1851).

8817. azurea (Less.), *Tr. d'Orn.*, p. 316; Gad., *Cat.*, p. 357; — Java, Timor.



Digitized by Google

*flavipes*, Sw., *An. in Menag.* III, p. 323; Gray, *Gen. B.* I, pl. 45; *gymnophrys*, Kuhl.; *gymnopsis*, Schl.

8818. FORMOSA (Blyth), *J. A. S. Beng.*, 1843, p. 958; Jerd., *B. Ind.* I, p. 387; Gad., *Cat.*, p. 357. — Sikkim.

8819. FRONTALIS (Sw.), *Zool. Ill.* I, pl. 2; id., *Class. B.* II, p. 318; Legge, *B. Ceyl.*, p. 560; *velata*, Tem., *Pl. Col.* 72; *corallina*, Hodgs. — Himal., Inde, Ceylan, Indo-Chine, Java, Palawan, Balabac, Paragua.

8820. CORALLIPES, Sharpe, *Ibis*, 1888, p. 479. — Bornéo N.

8821. OENOCHLAMYS, Sharpe, *Tr. Linn. Soc., Zool.*, 1876, I, p. 338, pl. 53, f. 3; Gad., *Cat.*, p. 359. — Guimaras, Panay (Philippines).

8822. MESOLEUCA, Grant, *Ibis*, 1894, pp. 512, 550. — Luçon N.

8823. LILACEA, Whiteh., *Ibis*, 1897, p. 451. — Samar, Leyte, Basilan.

## 1269. NEOSITTA

*Sittella*, Sw. (1837 nec Rafin. 1815); *Neops*, Vieill. (1819 nec 1816); *Neositta*, Hellm. (1901).

8824. CHRYSOPTERA (Lath.), *Ind. Orn., Suppl.*, p. 32; Sw., *Class. B.* II, p. 317; Gould, *B. Austr.* IV, pl. 101; Gad., *Cat.*, p. 360. — Australie E., S.-E. et S.

8825. LEUCOCEPHALA (Gould), *P. Z. S.*, 1837, p. 152; id., *B. Austr.* IV, pl. 102. — Australie N.-E. et Nouv.-Galles du S.

8826. ALBATA (Rams.), *P. Z. S.*, 1877, p. 351; Gould, *B. N. Guin.* pl. XI; *leucocephala*, Rams. (1875). — Port Denison et baie de Rockingham.

8827. PILEATA (Gould), *P. Z. S.*, 1837, p. 139; id., *B. Austr.* IV, pl. 104; *melanocephala*, Gould (fem.) — Australie W. et S.

2505. *Var.* TENUIROSTRIS (Gould), *Handb. B. Austr.*, p. 610. — Australie S. centr.

8828. LEUCOPTERA (Gould), *P. Z. S.*, 1839, p. 144; id., *B. Austr.* IV, pl. 103. — Australie N.

8829. STRIATA (Gould), *Ann. and Mag. N. H.*, ser. 4, IV, p. 110; id., *Suppl.*, *B. Austr.*, pl. 54; *leucoptera* (juv.), Rams. — Australie N. et N.-E.

8830. PAPUENSIS (Schl.), *N. T. D.* IV, p. 47; Sharpe, *Zool. Rec.* VIII, p. 63; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 242. — Nouv.-Guinée N., W.

8831. ALBIFRONS (Rams.), *Pr. Linn. Soc. N. S. W.* VIII, p. 24. — Nouv.-Guinée S.-E.

8832. GRISEICEPS (De Vis), *Rep. Orn. Coll.*, 1894, p. 4. — Nouv.-Guinée S.-E.

## 1270. DAPHOENOSITTA

*Daphœnositta*, De Vis (1897).

8833. MIRANDA, De Vis, *Ibis*, 1897, p. 380; Salvad., *Ibis*, 1898, p. 208, pl. 4. — Monts Scratchley (Nouv.-Guinée).

Digitized by Google

### 1271. HYPOSITTA

*Hypherpes*, A. Newt. (1863 nec Chaud.); *Hypositta*, A. Newt. (1881).

8834. CORALLIROSTRIS, A. Newt., *P. Z. S.*, 1863, p. 85, pl. 13, 1881, p. 438; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag.*, pl. 121 — Madagascar.

## SUBF. II. — CERTHIINÆ

### 1272. CERTHIA

*Certhia*, Lin. (1758).

8835. FAMILIARIS (Lin.); Naum., *Vög. Deutschl.*, pl. 140, ff. 1-4; *septentrionalis*, Brm.; *scolopacina*, Ström.; *costæ*, Bail. — Europe jusqu'au 62° l. Nord., Afrique N.

2306. *Var.* BRACHYDACTYLA, Brm., *Vög. Deutschl.*, p. 209; *familiaris*, auct. plur.; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg., Ois.* I, p. 656, pl. 151; *major* et *minor*, Frisch. — Europe centr. W. (1).

2307. *Var.* HARTERTI, Hellm., *J. f. O.*, 1901, p. 189. — Asie Mineure.

2308. *Var.* SCANDULACA, Pall., *Zoogr. Rosso-As.* I, p. 432; *nattereri*, Bp.; *familiaris* (pt.), auct. plur.; *fasciata*, Dav. — Europe E., Asie centr. jusqu'au 55° l. N., Japon N.

2309. *Var.* BRITANNICA, Ridgw., in Gad., *Cat. B.*, p. 324; *familiaris* (pt.), auct.; Dress., *B. Eur.*, pl. 122. — Iles Britanniques.

2310. *Var.* JAPONICA, Hart., *Nov. Zool.* IV, p. 139. — Nippon (Japon).

2311. *Var.* AMERICANA, Bp., *Comp. List.*, p. 11; Baird, *B. N. Am.*, p. 372; *fusca*, Barton (nec Gm.); *familiaris*, Wils., *Am. Orn.* I, p. 122, pl. 8, f. 1. — Amérique N.-E.

2312. *Var.* OCCIDENTALIS, Ridgw., *Man. N. Amer. B.*, p. 538. — De l'Alaska à la Californie.

2313. *Var.* MONTANA, Ridgw., *l. c.*; Hart., *Nov. Zool.* IV, p. 139. — Montagnes Rocheuses.

2314. *Var.* ALBESCENS, Berl., *Auk*, 1888, p. 430; *mexicana* (pt.), Glog. et auct. plur. — Mexique N.-W., Arizona.

2315. *Var.* ALTICOLA, Mill., *Auk*, 1895, p. 186; *mexicana* (pt.), auct. plur. — Mexique centr. et S., Guatémala.

8836. HIMALAYANA, Vig., *P. Z. S.*, 1831, p. 174; Gould, *B. Asia*, II, pl. 17; *vittacauda*, James; *asiatica*, Sw. — Himalaya jusqu'au S.-W. de la Chine.

2316. *Var.* TÆNIURA, Severtz., *Turk. Jevotn.*, p. 66; Dress., *Ibis*, 1875, p. 176; Gadow, *Cat.*, p. 327. — Turkestan, Afghanistan et Himalaya jusqu'à l'Assam.

(1) Les auteurs ayant généralement confondu les différentes formes de Grimpereaux européens, il est fort difficile d'établir exactement la synonymie et la distribution géographique de celles-ci. (Voy. aussi : Hartert, *Novit. Zool.* IV, p. 138.)

Digitized by Google

8837. DISCOLOR, Blyth, *Journ. A. S. Beng.*, 1845, p. 580; Jerd., *B. Ind.* I, p. 381; *nipalensis* (pt.), Gould, *B. Asia*, II, pl. 16 (fig. inf.). — Sikkim, Népaul.

2317. *Var.* STOLICZKÆ, Brooks, *J. A. S. Beng.*, 1875, p. 256; *Str. F.*, 1877, pp. 75-79. — Sikkim, Boutan.

8838. NIPALENSIS, Hodgs., *Icon. ined.*, *Passeres*, u^es 289, 598; Gould, *B. Asia*, II, pl. 16 (fig. sup.); *mandellii*, Brooks, *l. c.* — Himalaya du Népaul au Boutan et Assam.

2318. *Var.* HODGSONI, Brooks, *J. A. S. B.*, 1872, p. 74. — Cachemire.

## 1273. SALPORNIS

*Salpornis*, Gray (1847); *Hylypsornis*, Boc. (1878).

8839. SPILONOTA, Frankl., *P. Z. S.*, 1831, p. 121; Gray, *P. Z. S.*, 1847, p. 7; Jerd., *B. Ind.* I, p. 382; Gad., *Cat.*, p. 330. — Inde centr.

8840. SALVADORII (Boc.), *Jorn. Acad. Lisb.*, 1878, pp. 198, 211; id., *Orn. Ang.*, p. 289, pl. 10, f. 2. — Afrique S.-W. et S.-E.

2319. *Var.* EMINI, Hartl., *P. Z. S.*, 1884, p. 415, pl. 37. — Afrique équatoriale E.

## 1274. TICHODROMA

*Tichodroma*, Illig. (1811); *Petrodroma* (pt.), Vieill. (1816).

8841. MURARIA (Lin.); Illig., *Prodr.*, p. 211; Dress., *B. Eur.* III, p. 207, pl. 123; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg., Ois.* I, p. 660, pl. 152; *alpina*, Koch; *phœnicoptera*, Tem.; *europæa*, Steph.; *subhimalayana* et *nepalensis*, Hodgs.; *hoffmeisteri*, Rchb. — Région alpine de l'Europe centr. et mér., du N. de l'Afrique, de l'Abyssinie et de l'Asie centr.

## 1275. CLIMACTERIS

*Climacteris*, Tem. (1820).

8842. MELANURA, Gould, *P. Z. S.*, 1842, p. 138; id., *B. Austr.*, pl. 97; Gad., *Cat. B.* VIII, p. 334. — Australie N.

8843. MELANONOTA, Gould, *P. Z. S.*, 1846, p. 107; id., *B. Austr.*, pl. 96; Gad., *l. c.*, p. 334. — Golfe Carpentarie, Port Darling et Port Essington.

8844. PLACENS, Sclat., *P. Z. S.*, 1873, p. 695; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 241. — Nouv.-Guinée N. W.

8845. RUFA, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 149; id., *B. Austr.*, pl. 94. — Australie W.

8846. LEUCOPHÆA (Lath.); Strickl., *Ann. and Mag. N. H.*, 1843, p. 336; *picumnus*, Illig.; Tem., *Pl. Col.* 281, f. 1; Gould, *B. Austr.*, pl. 98; *ocularis*, Gould. — Australie E. et S.

8847. SCANDENS, Tem., *Pl. Col.* 281, f. 2; Gould, *B. Austr.*, pl. 93; ?*bailloni*, Vieill. — Queensland, Nouv.-Galles du S., Australie S., Tasmanie.

Digitized by Google

8848. ERYTHROPS, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 148; id., *B. Austr.*, pl. 95; *affinis*, Blyth. — Nouv.-Galles du S. jusqu'à la Wide-Bay.

8849. SUPERCILIOSA, North, *Ibis*, 1895, p. 341; id., *Horn Exp. Centr. Austr.* II, *Zool. Aves*, p. 96, pl. 7, f. 2. — Australie centr. et S.-W.

8850. PYRRHONOTA, Gould, *P. Z. S.*, 1867, p. 976. — Austr. S.-E., S., Tasm.

2320. *Var.* WEISKEI, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 187. — Queensland N.

### 1276. RHABDORNIS

*Rhabdornis*, Rchb. (1851).

8851. MYSTACALIS (Tem.), *Pl. Col.* 335, f. 2; Rchb., *Handb. spec. Orn. Scans.*, n° 640, pl. 566; *striolata*, Kittl., *Kupf. Vög.*, pl. 6, f. 2. — Luçon, Dinagat, Mindanao (Philippines).

8852. MINOR, Grant, *Ibis*, 1897, pp. 234, 254. — Samar.

8853. INORNATUS, Grant, *Ibis*, 1897, pp. 235, 254, pl. 6, f. 2. — Samar.

## FAM. XLVIII. — CŒREBIDÆ (1)

### SUBF. I. — DIGLOSSINÆ

### 1277. DIGLOSSA

*Diglossa*, Wagl. (1832); *Serrirostrum*, d'Orb. et Lafr. (1837); *Agrilorhinus*, Bp. (1838); *Uncirostrum*, Lafr. (1839); *Campylops*, Licht. (1854); *Tephrodiglossa*, *Pyrrhodiglossa*, *Cyanodiglossa* et *Melanodiglossa*, Cass. (1864).

8854. BARITULA, Wagl., *Isis*, 1832, p. 281; Gray, *Gen. B.* I, pl. 42; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 242; *hamulus*, Licht.; *sittaceus*, Bp.; *brelayi*, Lafr.; *olivaceus*, Fras. — Mexique S., Guatémala.

8855. SITTOIDES (d'Orb. et Lafr.), *Mag. Zool.*, 1837, p. 25; d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 374, pl. 58, f. 3; Tacz., *Orn. Pér.* I, p. 417; *similis*, Lafr.; *hyperythra*, Cab.; *d'orbignii*, Boiss. — Vénézuéla, Colombie, Ecuador, Pérou, Bolivie.

8856. GLORIOSA, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 784, pl. 46, f. 1. — Andes de Mérida (Vén.)

8857. BRUNNEIVENTRIS, Lafr., *Rev. Zool.*, 1846, p. 318; Des M., *Icon. Orn.*, pl. 43; Tacz., *Orn. Pér.* I, p. 420. — Andes de Boliv., Pérou, Ecuad. et Colombie.

8858. PECTORALIS, Cab., *J. f. O.*, 1873, p. 318; Scl., *Ibis*, 1875, p. 212, pl. 4. — Pérou (Andes).

8859. MYSTACALIS, Lafr., *Rev. Zool.*, 1846, p. 318; Scl., *Cat. B.* XI, p. 6, pl. 1; *mystacea*, Gray, *Gen. B.* I, pl. 42, f. 1. — Bolivie (Andes).

8860. CARBONARIA (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1837, p. 25; d'Orb., *Voy., Ois.*, p. 373, pl. 58, f. 1; Bridg., *P. Z. S.*, 1847, p. 29. — Bolivie (Andes).

(1) Voy. : Sclater, *Cat. Birds Brit. Mus.* XI, pp. 1-48 (1886).

Digitized by Google

8861. MAJOR, Cab., in *Schomb. Guian.* III, p. 676; Scl., *l. c.*, p. 7. — Guyane anglaise.

8862. LAFRESNAYI (Boiss.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 4; Scl., *P. Z. S.*, 1853, p. 138; *bonapartii*, Fras.; *intermedia*, Cab. — Colombie, Ecuador (Andes).

2321. ? *Var.* HUMERALIS, Fras., *P. Z. S.*, 1840, p. 22; Cab., *Mus. H.* I, p. 27. — Colombie, Ecuador.

8863. ATERRIMA, Lafr., *Rev. Zool.*, 1846, p. 319; Tacz., *Orn. Pér.* I, p. 419. — Pérou, Ecuador, Colombie.

8864. NOCTICOLOR, Bangs, *Pr. Biol. Soc. Wash.* XII, p. 180. — Macotama (Colombie).

8865. ALBILATERALIS, Lafr., *Rev. Zool.*, 1843, p. 99; Scl., *Ibis*, 1875, p. 216, pl 5; Tacz., *Orn. Pér.* I, p. 418. — Vénéz., Col., Ecuad., Pérou (Andes).

8866. PLUMBEA, Cab., *J. f. O.*, 1860, p. 411; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 245, pl. 15*a*, ff. 1, 2. — Costa-Rica, Véragua.

8867. PERSONATA (Fras.), *P. Z. S.*, 1840, p. 23; Hartl., *Syst. Verz.*, p. 19; Tacz., *Orn. Pér.* I, p. 421; *cyaneum*, Lafr.; *melanops*, Tsch. — Colombie, Ecuad., Pérou, Bolivie (Andes).

8868. INDIGOTICA, Scl., *Ann. and Mag. N. H.*, 1856, p. 467. — Ecuador (Andes).

8869. GLAUCA, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1876, p. 253. — Bolivie (Andes).

### 1278. DIGLOSSOPIS

*Diglossopis*, Scl. (1856).

8870. CÆRULESCENS, Scl., *Ann. and Mag. N. H.*, 1856, p. 467; Tacz., *Orn. Pér.* I, p. 422. — Vénézuéla, Colombie, Ecuador (Andes).

2322. *Var.* PALLIDA, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1896, p. 334. — Pérou.

## SUBF. II. — DACNIDINÆ

### 1279. OREOMANES

*Oreomanes*, Scl. (1860).

8871. FRASERI, Scl., *P. Z. S.*, 1860, p. 75, pl. 159; id., *Cat.*, p. 12. — Ecuador (Andes).

### 1280. CONIROSTRUM

*Conirostrum*, d'Orb. et Lafr. (1837).

8872. SITTICOLOR, Lafr., *Rev. Zool.*, 1840, p. 102; Gray, *Gen. B.* I, pl. 34; Tacz., *Orn. Pér.* I, p. 425; *bicolor*, Less. — Colombie, Ecuador, Pérou N.

2323. *Var.* INTERMEDIA, Berl., *Ornith. Monatsb.* I, p. 11. — Mérida (Vénézuéla).

8873. CYANEUM, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, p. 512; id., *Orn. Pér.* I, p. 423. — Pérou centr. et Bolivie.

Digitized by Google

8874. RUFUM, Lafr., *Mag. de Zool.*, 1843, pl. 35; Sclat., *Cat.*, p. 14; *rufo-cinerea*, Bp. — Colombie (Andes).

8875. FERRUGINEIVENTRE, Scl., *P. Z. S.*, 1855, p. 74, pl. 85. — Bol., Pérou S. (Andes).

8876. FRASERI, Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 452; id., *Cat.*, p. 15, pl. 2, f. 1. — Ecuador W.

8877. CINEREUM, d'Orb. et Lafr., *Mag. de Zool.*, 1837, p. 25; d'Orb., *Voy.*, *Ois.*, p. 374, pl. 49, f. 1; Tacz., *Orn. Pér.* I, p. 425. — Bolivie, Pérou (Andes).

2324. *Var.* LITTORALIS, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1896, p. 336. — Littoral du Pérou.

8878. ALBIFRONS, Lafr., *Rev. Zool.*, 1842, p. 301; id., *Mag. de Zool.*, 1843, pl. 35; Scl., *l. c.*, p. 16; *cæruleifrons*, Lafr. (fem.) — Colombie, Ecuador (Andes).

8879. ATROCYANEUM, Lafr., *Rev. Zool.*, 1848, p. 9; Tacz., *Orn. Pér.* I, p. 426. — Ecuador, Bolivie, Pérou.

## 1281. XENODACNIS

*Xenodacnis*, Cab. (1873).

8880. PARINA, Cab., *J. f. O.*, 1873, p. 312, pl. 4, ff. 1, 2; Tacz., *l. c.*, p. 434. — Pérou central.

## 1282. HEMIDACNIS

*Hemidacnis*, Scl. (1862).

8881. ALBIVENTRIS (Scl.), *Rev. et Mag. de Zool.*, 1852, p. 8; id., *Contr. Orn.*, 1852, p. 131, pl. 100, f. 1; id., *Cat. Am. B.*, p. 50. — Colombie, Ecuador, Pérou E.

## 1283. DACNIS

*Dacnis*, Cuv. (1817); *Cyanodacnis*, *Polidacnis*, *Eudacnis* et *Ateleodacnis*, Cass. (1864).

8882. CAYANA (Lin.); *Pl. Enl.* 578, f. 1, 669, f. 1; Strickl., *Contr. Orn.*, 1851, p. 15; *cyanomelas* et *cyanocephala*, Gm.; *bicolor*, Beckl., *N. Mém. Soc. Mosc.* I, p. 378, pl. 23; *cærulea*, Max.; *cyanater*, Less.; *nigripes*, Cass. — Amérique mérid. E. jusqu'au S. du Brésil et la Bolivie.

2325. *Var.* GLAUCOGULARIS, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1896, p. 336. — Col., Ecuad., Pérou.

2326. *Var.* ULTRAMARINA, Lawr., *Pr. Ac. Sc. Philad.*, 1864, p. 106; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 244. — Amér. centr. du Nicaragua à Panama.

8883. COERIBICOLOR, Scl., *Contr. Orn.*, 1851, p. 106; id., *Cat.*, p. 21, pl. 3. — Colombie (Andes).

Digitized by Google

2327. *Var.* NAPÆA, Bangs, *Pr. Biol. Soc. Washingt.* XII, p. 143. — Sta-Marta (Colombie).

8884. NIGRIPES, Pelz., *Sitz. Acad. Wien.*, 1856, p. 154, pl. 1, ff. 1, 2; id., *Orn. Bras.*, p. 25; Scl., *Cat.*, p. 21. — Brésil S., E.

8885. ANGELICA, De Fil., *Atti sesta Riun. Sc. It.*, 1845, p. 404; Tacz., *Orn. Pér.* I, p. 429; *cayana* (pt.), auct. plur.; Vieill., *Gal. Ois.*, pl. 165; *melanotis*, Strickl.; *archangelica*, Bp. — Amérique mérid. au N. de l'Amazone, Pérou E. et Bolivie.

8888. EGREGIA, Scl., *P. Z. S.*, 1854, p. 252; id., *Cat. Am. B.*, p. 51, pl. 7. — Colombie.

2328. *Var.* ÆQUATORIALIS, Berl., *J. f. O.*, 1873, p. 69. — Ecuador W.

8887. VIGUIERI, Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 246, pl. 15*a*, f. 3. — Isthme Darien.

8888. FLAVIVENTRIS, d'Orb. et Lafr., *Mag. de Zool.*, 1837, p. 21; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 25; Tacz., *Orn. Pér.* I, p. 431. — Ecuador, Pérou E., Bolivie.

8889. BERLEPSCHI, Hart., *B. O. C.* XI, p. 37; id., *Nov. Zool.* VIII, p. 371, pl. 5, ff. 1, 2. — Ecuador N.-W.

8890. VENUSTA, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* VII, p. 464; Scl., *Ibis*, 1863, p. 315, pl. 7. — De Costa-Rica à la Colombie centr.

8891. PULCHERRIMA, Sclat., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1853, p. 480; id., *Cat. Am. B.*, p. 51, pl. 8. — Colombie.

2329. *Var.* AUREINUCHA, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1878, p. 484. — Ecuador.

2330. *Var.* STIGMATURA (Berl. et Stolzm.), *P. Z. S.*, 1896, p. 338; *pulcherrima*, Tacz., *Orn. Pér.* I, p. 432. — Pérou centr.

8892. LEUCOGENYS, Lafr., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1852, p. 470; Scl., *Ibis*, 1863, p. 317; id., *Cat. B.*, p. 25. — Colombie centr.

8893. ANALIS, d'Orb. et Lafr., *Mag. de Zool.*, 1837, p. 21; Tacz., *Orn. Pér.* I, p. 432; *brevipennis*, Gir. (fem.); *modesta*, Cab. (fem.) — Guyane, Amazone, Pérou, Bolivie.

8894. SPECIOSA (Max.), *Beitr.* III, p. 708; Scl., *Contr. Orn.*, 1852, p. 101; Burm., *Th. Bras.* III, p. 117; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 26. — Brésil S. et E.

8895. PLUMBEA (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 553; Tsch., *Faun. Per.*, p. 236; *bicolor*, Vieill., *Ois. Am. sept.* II, p. 32, pl. 90. — Vénézuéla, Trinidad, Brésil, Pérou E.

8896. SALMONI, Scl., *Cat. B. Br. Mus.* XI, p. 27, pl. 2, f. 2 (fem.) — Antioquia.

## 1284. CERTHIDEA

*Certhidea*, Gould (1837).

8897. OLIVACEA, Gould, *P. Z. S.*, 1837, p. 7; id., *Zool. Voy. Beagle*, III, p. 106, pl. 44; Scl., *Cat.*, p. 28; — Iles James, Jervis, Indéfat., Albemarle

Digitized by Google

Cornell University Library

J. E. Gowen, Chromolith

Digitized by Google

# SYNOPSIS AVIUM

# NOUVEAU
# MANUEL D'ORNITHOLOGIE

PAR

**Alphonse DUBOIS**

Docteur en sciences naturelles,
Conservateur au Musée Royal d'Histoire naturelle de Belgique,
Chevalier de l'Ordre de Léopold,
Membre du Comité international et permanent d'Ornithologie,
de la Commission permanente d'étude des collections du Musée de l'État Indépendant du Congo,
Membre honoraire, correspondant ou effectif de plusieurs Sociétés savantes.

## PREMIÈRE PARTIE

(1899-1902)

BRUXELLES
H. LAMERTIN, éditeur
20, rue du Marché-au-Bois

1902

Digitized by Google

# INTRODUCTION

Chargé de l'étude des collections mammalogiques et ornithologiques du *Musée Royal d'histoire naturelle de Belgique* et de celui de l'*État Indépendant du Congo*, j'ai pu constater mainte fois combien l'absence d'un nouveau manuel d'Ornithologie était regrettable.

Depuis le *Conspectus avium* du prince Bonaparte (1850-54) et le *Hand-list of genera and species of Birds* de G. R. Gray (1869-71), la Science a fait d'immenses progrès et le nombre des espèces s'est considérablement accru, grâce surtout à l'exploration de l'Afrique centrale et des îles de l'Océanie. J'ai donc pensé que le moment était venu de publier mon *Synopsis avium*, auquel je travaille depuis plus de quatorze ans, et que certaines circonstances m'ont empêché de faire paraître plus tôt.

Certes, la tâche n'était pas facile, mais j'espère que mes efforts auront abouti à produire une œuvre utile, qui facilitera beaucoup les recherches indispensables à l'étude des Oiseaux. Je sais bien que je ne contenterai pas tout le monde ; mais quel est celui qui aurait la prétention de faire en ce genre un travail parfait ? — Ce n'est pas avec les ressources et les documents dont nous disposons aujourd'hui que cela est possible, aussi me contenterai-je d'apporter ma part à un grand travail, que d'autres pourront compléter et rectifier quand le moment sera venu.

Il importe aussi de faire remarquer que mon *Synopsis avium* est un simple manuel se bornant à indiquer, pour chaque espèce ou variété, la synonymie et les principaux auteurs à consulter. Je ne



Digitized by Google

pouvais entrer dans d'autres détails sans donner trop d'extension à l'ouvrage, ce qui aurait dépassé le but que je voulais atteindre. J'ai cependant ajouté l'habitat, chose indispensable pour la détermination exacte de certaines formes. Pour chaque famille j'ai aussi renvoyé, en note, aux travaux monographiques, quand il en existe, et au Catalogue du Musée Britannique (1), dans lequel on trouve de bonnes descriptions anglaises. Mais je n'ai pu m'astreindre à adopter la manière de voir de certains auteurs de ce Catalogue et à en suivre la classification. Du reste, on n'est pas encore parvenu à se mettre d'accord sur une classification naturelle et internationale; presque chaque auteur a la sienne, mais aucune n'a le don de plaire aux autres.

Le Prof. Huxley a été le promoteur d'une classification basée principalement sur les formes et les relations des os du palais et de la base du crâne. Le résultat de ses savantes recherches n'a pas toujours été heureux, car nous trouvons les familles les plus disparates réunies dans un même ordre, et les groupes qui se rapprochent par leur forme générale et leurs mœurs sont souvent disloqués et placés dans des ordres différents. C'est ce qui a empêché son adoption.

Quelques années plus tard M. P.-L. Sclater, et plus récemment M. R.-B. Sharpe, tout en admettant le groupement général du Prof. Huxley, y apportèrent cependant des modifications fort rationnelles. Dans un autre ordre d'idées nous avons les classifications du Prof. Sundevall, de M. Max Fürbringer, ainsi que celle que j'ai proposée en 1891 (2) et que je modifie légèrement aujourd'hui.

Une classification linéaire parfaite est impossible, et quoi que l'on fasse pour obtenir un groupement naturel, il y aura toujours des groupes qui font exception à la règle; si l'on veut mettre ceux-ci dans la section qui leur conviendrait d'après certaines considérations anatomiques, on aura toujours ces assemblages disparates dont certains systèmes nous donnent l'exemple.

(1) *Catalogue of the Birds in the British Museum*. 27 vol. in-8° avec pl° col. (1874-1898).

(2) Dubois, *Revue des derniers systèmes ornithologiques et nouvelle classification proposée pour les Oiseaux* (*Mémoires de la Soc. Zool. de France*, t. IV, 1891).

Digitized by Google

Dans la classification adoptée pour le *Synopsis avium* j'ai conservé les deux sous-classes admises par le Prof. Sundevall : les *Gymnopædes* et les *Ptilopædes*. Il est, en effet, rationnel de réunir dans une même division les Oiseaux qui naissent nus et très faibles, et de mettre dans une autre, ceux qui naissent couverts de duvet et dans un état déjà assez avancé pour pouvoir souvent prendre leurs ébats dès leur sortie de l'œuf (1). Il en est des Oiseaux comme des Mammifères : plus ils sont faibles en venant au monde, plus ils sont supérieurs par leur organisation.

Ce sont donc les *Gymnopædes* qui doivent venir en tête de la classe. Au point de vue géologique, il serait plus juste de les placer à la fin, la Nature procédant toujours de l'imparfait au parfait, mais cela n'a pas d'importance ici.

Parmi les *Gymnopædes*, quels sont les Oiseaux les plus parfaits? — Ici encore les ornithologistes ne sont pas d'accord. Les uns veulent que ce soient les Turdidés, les autres, les Préhenseurs ou Perroquets. Je n'ai jamais pu constater en quoi l'organisation d'une Grive pouvait être plus parfaite que celle d'un Perroquet; aussi, ai-je admis la manière de voir de Bonaparte, Altum, Brehm, A. Milne-Edwards et autres, qui placent les Préhenseurs en tête de la classe. Ce sont, en effet, de tous les Oiseaux ceux dont l'organisation est la plus élevée. Les Perroquets se distinguent des autres animaux de leur classe, par le développement uniforme de leur sens : aucun chez eux n'est atrophié, et aucun non plus n'est extraordinairement développé aux dépens des autres. Au point de vue intellectuel, leur supériorité est incontestable : ils ont toutes les qualités et tous les défauts des Singes. « Leur naturel, dit Brehm, est un mélange des qualités et des défauts les plus opposés, or un pareil assemblage de facultés ne peut indiquer qu'un grand développement de l'intelligence. » Il est aussi à remarquer que les Préhenseurs ont des pieds plus charnus et à plante plus épaisse

(1) Les Engoulevents, certains du moins, font cependant exception : ils naissent couverts de duvet comme de vrais *Ptilopædes*. Mais avant de les placer dans la seconde sous-classe, il faudrait savoir si tous les Caprimulgidés naissent dans cet état. Les Stéatornithidés et les Podargidés se trouvent peut-être dans le même cas.

Digitized by Google

que les autres Oiseaux, ce qui leur permet de s'en servir comme d'une main pour porter au bec certains aliments, faculté que les autres Oiseaux n'ont pas et qui dénote encore une supériorité. Leur langue charnue donne aussi plus de développement au sens du goût.

La disposition des doigts m'a engagé à faire suivre les Préhenseurs par les autres zygodactyles, comme cela est admis par la plupart des auteurs. Du reste, une classification a pour but de faciliter la connaissance des êtres, et de rendre possible l'étude des groupes composés d'animaux ayant certains caractères en commun; toutes les classifications récentes atteignent ce but.

Si l'on est assez généralement d'accord sur la composition des familles, on ne parvient pas à s'entendre sur la place que chacune d'elles doit occuper dans la série des Oiseaux. Je pense être parvenu à les grouper d'une manière satisfaisante dans un ordre assez naturel.

J'ai admis l'espèce et la variété ou sous-espèce conformément à la description que j'en ai donnée dans le temps : « *L'Espèce est la réunion des individus descendant l'un de l'autre ou de parents communs, et de ceux qui leur ressemblent ou n'en diffèrent que par des caractères d'un ordre très secondaire, ce qui porte à les considérer comme descendant d'une même souche. Les Variétés se comportent de la même manière que les espèces proprement dites, mais elles sont soumises au retournement dès que les causes qui les ont fait naître ont disparu* (1). »

On sait que des espèces différentes peuvent s'unir, même à l'état sauvage, et produire des hybrides féconds, qui tiennent du père et de la mère, sans toutefois ressembler complètement ni à l'un, ni à l'autre. D'autre part le climat, le régime et autres causes peut-être encore, occasionnent souvent des changements assez sensibles dans le système de coloration ou dans la taille pour produire des variétés ou sous-espèces. Les hybrides féconds, au contraire, différant plus fortement de leurs ascendants, semblent parfois s'ériger directement en espèce. En voici un cas que j'ai

(1) A. Dubois, *Manuel de zoologie*, p. 106 (1882).

Digitized by Google

signalé il y a quelques années (1). Le Musée de Bruxelles possède un Faisan qui ressemble en tous points au *Phasianus formosanus* de Formose; et cependant notre individu n'est qu'un simple hybride, né dans l'ancien Jardin Zoologique de notre ville, qui a eu pour père un *Ph. torquatus* et pour mère, la poule d'un *Ph. versicolor*. Il y a donc lieu de supposer qu'à l'île Formose, située non loin de la Corée et du Japon, on a introduit primitivement des *Ph. torquatus* et des *Ph. versicolor*, propres à ces pays. Les hybrides nés du croisement de ces deux espèces, ont fini par remplacer dans cette île les types dont ils dérivent et à produire une forme nouvelle, connue aujourd'hui sous le nom de *Ph. formosanus*. Sans aller si loin, un fait semblable paraît se produire dans notre pays où l'on a introduit, outre le Faisan de Colchide, des Faisans à collier et des Faisans de Mongolie; ces trois espèces se croisent entre elles et les individus pur sang deviennent presque partout de plus en plus rares.

Il résulte des nombreuses observations qui ont été faites :

1° Que des espèces voisines peuvent s'unir et produire de nouvelles variétés ou même des espèces distinctes, au bout d'un nombre plus ou moins considérable de générations;

2° Que les variétés peuvent se perpétuer en conservant leurs caractères propres et se comporter comme de véritables espèces, ou bien retourner à l'une des espèces souches, si les conditions qui les ont fait naître ont disparu;

3° Qu'une variété peut à la longue se modifier assez profondément pour rendre impossible un croisement fécond avec l'espèce ou avec la variété dont elle dérive (2).

L'observation vient donc confirmer la loi émise par Wallace et qui est ainsi formulée : « *Chaque espèce a pris naissance en coïncidence géographique et chronologique, avec une autre espèce très voisine et préexistante.* »

Parmi les espèces et variétés décrites comme nouvelles dans

(1) Voir ma *Faune ill. des Vert. de la Belg., série des Oiseaux*, II, p. 58.

(2) Voy. à ce sujet : Darwin, *De l'origine des espèces*; du même, *De la Variation des animaux et des plantes*; Wallace, *La sélection naturelle*.

Digitized by Google

ces dernières années, plus d'une seront à supprimer quand elles seront mieux connues, soit qu'elles ne reposent que sur un sujet unique reconnu comme aberration, soit parce que leurs caractères distinctifs soient insuffisants. Mais j'ai tenu à indiquer autant que possible tout ce qui a été décrit, afin d'attirer l'attention des ornithologistes sur certaines nouveautés douteuses.

Pour la nomenclature, j'ai suivi les règles généralement admises. Cependant je n'ai pu me décider à conserver un nom spécifique devenu générique; ainsi je ne dirai pas avec certains auteurs : *Regulus regulus* (Lin.), *Petronia petronia* (Lin.), mais je prendrai pour dénomination spécifique la plus ancienne après celle de Linné, et j'écrirai : *Regulus cristatus*, Koch., *Petronia stulta* (Gm.).

J'ai adopté pour les sous-espèces le terme de *Variété*, admis avec raison par beaucoup d'ornithologistes et d'une manière plus générale en Entomologie. Quelques auteurs confondent l'*aberration* avec la *variété :* l'albinisme ou le mélanisme total ou partiel est une *aberration* ou monstruosité, et c'est naturellement un phénomène accidentel; tandis que la *Variété* est une légère déviation du type spécifique, mais qui se perpétue en conservant ses caractères. On peut aussi employer le terme de *sous-espèce,* mais il n'indique pas aussi bien, me semble-t-il, les rapports qui existent entre l'espèce type et les formes qui en dérivent. Mais, à quoi reconnait-on un type spécifique? — C'est là une question à laquelle il n'est pas possible de répondre, aussi est-on obligé de considérer comme type la forme la plus anciennement connue, ce qui ne veut donc pas dire qu'elle soit l'ancêtre des variétés qui se groupent autour d'elle, mais bien que toutes ont une même origine. Quant au terme de *Race,* il doit être uniquement réservé aux animaux domestiques.

J'ai bien regretté de ne pas toujours trouver au Musée de Bruxelles des sujets de comparaison; cette insuffisance m'a empêché de résoudre bien des questions spécifiques. Pendant la première période des trente-trois années de mes fonctions de Conservateur de la section des Vertébrés supérieurs (Mammifères et Oiseaux), j'ai pu augmenter considérablement ces collections, soit par des achats, soit par des échanges, sans compter les nombreux dons faits à

Digitized by Google

l'Établissement. Malheureusement, la collection primitive contient un grand nombre d'Oiseaux dont le pays d'origine n'est pas connu, qui perdent par conséquent toute leur valeur scientifique, et qu'il ne m'est pas permis de remplacer.

Le Directeur de notre Musée Royal d'histoire naturelle, M. Ed. Dupont, peut être un savant géologue, mais les animaux de notre époque paraissent l'intéresser fort peu. Il en résulte que, depuis 1893, il m'est interdit d'acquérir des peaux de Mammifères ou d'Oiseaux, à moins que ce ne soient des types de genres non encore représentés dans nos collections. Mais, avec nos formalités administratives, il est fort difficile de compléter le généra sans augmenter en même temps le nombre des espèces en général. Et pourquoi cette restriction? — Notre budget est assez élevé pour pouvoir consacrer annuellement trois à quatre mille francs aux collections des Vertébrés supérieurs. Sur les 11,898 espèces et variétés d'Oiseaux mentionnées dans la première partie de mon *Synopsis*, 4,153 seulement sont représentées au Musée de Bruxelles, et parfois même d'une manière incomplète. On reconnaîtra que cette proportion est bien faible pour un Établissement fondé sous Marie-Thérèse en 1772, mais qui ne prit de l'extension qu'à partir de 1842, époque où la Ville de Bruxelles le céda à l'État.

J'ai tenu à faire connaître cette situation décourageante, afin que mes successeurs et mes honorables Confrères ne puissent un jour me reprocher un manque de zèle à la fin de ma carrière scientifique.

Bruxelles, Mars 1902.

Digitized by Google

# TABLE SYSTÉMATIQUE

# DES ORDRES ET DES FAMILLES


| | PAGES |
|---|---|
| SUBCL. I. — GYMNOPÆDES | 1 |
| ORD. I. — PSITTACI | 1 |
| *Fam. I. — Stringopidæ* | 1 |
| *Fam. II. — Cacatuidæ* | 1 |
| Subf. 1. — Cacatuinæ | 1 |
| Subf. 2. — Calopsittacinæ | 3 |
| *Fam. III. — Psittacidæ* | 3 |
| Subf. 1. — Psittacinæ | 3 |
| Subf. 2. — Pioninæ | 4 |
| Subf. 3. — Conurinæ | 9 |
| Subf. 4. — Palæornithinæ | 16 |
| Subf. 5. — Nasiterninæ | 23 |
| Subf. 6. — Platycercinæ | 24 |
| *Fam. IV. — Nestoridæ* | 27 |
| *Fam. V. — Trichoglossidæ* | 28 |
| *Fam. VI. — Cyclopsittacidæ* | 33 |
| ORD. II. — SCANSORES | 34 |
| SUBORD. I. — ZYGODACTYLÆ | 34 |
| *Fam. I. — Indicatoridæ* | 34 |
| *Fam. II. — Capitonidæ* | 35 |
| Subf. 1. — Megalæminæ | 35 |
| Subf. 2. — Capitoninæ | 41 |
| *Fam. III. — Rhamphastidæ* | 42 |
| *Fam. IV. — Galbulidæ* | 45 |
| Subf. 1. — Galbulinæ | 45 |
| Subf. 2. — Jacameropinæ | 46 |
| *Fam. V. — Bucconidæ* | 46 |
| *Fam. VI. — Cuculidæ* | 49 |
| Subf. 1. — Cuculinæ | 49 |
| Subf. 2. — Centropodinæ | 55 |
| Subf. 3. — Phœnicophainæ | 57 |
| Subf. 4. — Neomorphinæ | 61 |
| Subf. 5. — Diplopterinæ | 61 |
| Subf. 6. — Crotophaginæ | 62 |
| *Fam. VII. — Picidæ* | 62 |
| Subf. 1. — Picinæ | 62 |
| Subf. 2. — Picumninæ | 83 |
| Subf. 3. — Yunginæ | 85 |
| SUBORD. II. — HETERODACTYLÆ | 85 |
| *Fam. VIII. — Trogonidæ* | 85 |
| SUBORD. III. — AMPHIBOLÆ | 88 |
| *Fam. IX. — Musophagidæ* | 88 |
| *Fam. X. — Coliidæ* | 90 |
| ORD. III. — ANISODACTYLÆ | 91 |
| *Fam. I. — Coraciidæ* | 91 |
| Subf. 1. — Leptosomatinæ | 91 |
| Subf. 2. — Brachypteraciinæ | 92 |
| Subf. 3. — Coraciinæ | 92 |
| *Fam. II. — Momotidæ* | 93 |
| *Fam. III. — Todidæ* | 95 |
| *Fam. IV. — Meropidæ* | 95 |
| *Fam. V. — Irrisoridæ* | 98 |
| *Fam. VI. — Upupidæ* | 99 |
| *Fam. VII. — Bucerotidæ* | 99 |
| *Fam. VIII. — Alcedinidæ* | 104 |
| Subf. 1. — Daceloninæ | 104 |
| Subf. 2. — Alcedininæ | 112 |
| ORD. IV. — MACROCHIRES | 115 |
| *Fam. I. — Steatornithidæ* | 115 |
| *Fam. II. — Podargidæ* | 116 |
| Subf. 1. — Ægothelinæ | 116 |
| Subf. 2. — Podarginæ | 116 |




Digitized by Google

PAGES

*Fam. III. — Caprimulgidæ* . . 117
Subf. 1. — Nyctibiinæ . . . . 117
Subf. 2. — Caprimulginæ . . . 118
*Fam. IV. — Cypselidæ* . . . . 125
Subf. 1. — Cypselinæ . . . . 125
Subf. 2. — Chæturinæ . . . . 127
Subf. 3. — Macropteryginæ . . 130
*Fam. V. — Trochilidæ* . . . . 130
Ord. V. — Passeres. . . . . 166
Subord. I. — Tracheophonæ . . 166
*Fam. I. — Pteroptochidæ* . . . 166
*Fam. II. — Conopophagidæ* . . 168
*Fam. III. — Formicariidæ* . . 169
Subf. 1. — Grallariinæ. . . . 169
Subf. 2. — Formicariinæ . . . 171
Subf. 3. — Thamnophilinæ . . 180
*Fam. IV. — Dendrocolaptidæ*. . 185
Subf. 1. — Dendrocolaptinæ . . 185
Subf. 2. — Sclerurinæ . . . . 191
Subf. 3. — Philydorinæ . . . 192
Subf. 4. — Synallaxinæ . . . 197
Subf. 5. — Furnariinæ. . . . 202
Subord. II. — Oligomyodæ. . . 204
*Fam. V. — Eurylæmidæ* . . . 204
Subf. 1. — Calyptomeninæ . . 204
Subf. 2. — Eurylæminæ . . . 205
*Fam. VI. — Xenicidæ* . . . . 206
*Fam. VII. — Pittidæ* . . . . 206
*Fam. VIII. — Philepittidæ* . . 210
*Fam. IX. — Phytotomidæ*. . . 210
*Fam. X. — Cotingidæ* . . . . 210
Subf. 1. — Tityrinæ. . . . . 210
Subf. 2. — Lipauginæ . . . . 213
Subf. 3. — Attilinæ. . . . . 214
Subf. 4. — Rupicolinæ. . . . 215
Subf. 5. — Cotinginæ . . . . 215
Subf. 6. — Gymnoderinæ . . . 218
*Fam. XI. — Pipridæ* . . . . 219
Subf. 1. — Piprinæ. . . . . 219
Subf. 2. — Ptilochlorinæ . . . 223
*Fam. XII. — Oxyrhamphidæ*. . 224
*Fam. XIII. — Tyrannidæ*. . . 224
Subf. 1. — Tæniopterinæ . . . 224
Subf. 2. — Platyrhynchinæ . . 231
Subf. 3. — Elaineinæ . . . . 236
Subf. 4. — Tyranninæ . . . . 244

PAGES

Subord. III. — Oscines. . . . 253
*Fam. XIV. — Hirundinidæ* . . 253
Subf. 1. — Hirundininæ . . . 253
Subf. 2. — Psalidoprocninæ . . 259
*Fam. XV. — Ampelidæ* . . . 260
*Fam. XVI. — Paramythiidæ*. . 261
*Fam. XVII. — Muscicapidæ* . . 262
*Fam. XVIII. — Campophagidæ* . 295
*Fam. XIX. — Pycnonotidæ* . . 304
Subf. 1. — Brachypodiinæ . . 304
Subf. 2. — Ireninæ . . . . . 317
*Fam. XX. — Phyllornithidæ* . . 317
*Fam. XXI. — Crateropidæ* . . 318
*Fam. XXII. — Timeliidæ*. . . 331
Subf. 1. — Timeliinæ . . . . 331
Subf. 2. — Liotrichinæ. . . . 342
Subf. 3. — Bradypterinæ . . . 348
Subf. 4. — Eremomelinæ . . . 352
Subf. 5. — Cisticolinæ . . . . 358
Subf. 6. — Malurinæ . . . . 367
*Fam. XXIII. — Sylviidæ*. . . 368
Subf. 1. — Sylviinæ. . . . . 368
Subf. 2. — Regulinæ . . . . 379
Subf. 3. — Polioptilinæ . . . 380
Subf. 4. — Accentorinæ . . . 381
*Fam. XXIV. — Turdidæ* . . . 382
Subf. 1. — Lusciniinæ . . . . 382
Subf. 2. — Saxicolinæ . . . . 387
Subf. 3. — Turdinæ. . . . . 392
Subf. 4. — Myiadectinæ . . . 406
Subf. 5. — Myiophoninæ . . . 407
*Fam. XXV. — Mimidæ* . . . 414
*Fam. XXVI. — Cinclidæ* . . . 418
*Fam. XXVII. — Troglodytidæ* . 419
*Fam. XXVIII. — Mniotiltidæ* . 430
*Fam. XXIX. — Motacillidæ* . . 442
Subf. 1. — Motacillinæ. . . . 442
Subf. 2. — Henicurinæ. . . . 449
*Fam. XXX. — Alaudidæ* . . . 450
*Fam. XXXI. — Paridæ* . . . 460
Subf. 1. — Parinæ . . . . . 460
Subf. 2. — Chamæinæ . . . . 469
Subf. 3. — Paradoxornithinæ . 470
*Fam. XXXII. — Vireonidæ* . . 471
*Fam. XXXIII. — Laniidæ* . . 476
Subf. 1. — Pachycephalinæ . . 476

Digitized by Google

PAGES

Subf. 2. — Laniinæ . . . . . 482
Subf. 3. — Malaconotinæ . . . 489
*Fam. XXXIV. — Prionopidæ.* . 493
Subf. 1. — Prionopinæ. . . . 493
Subf. 2. — Eurycerotinæ . . . 498
*Fam. XXXV. — Vangidæ.* . . 498
*Fam. XXXVI. — Corvidæ.* . . 500
Subf. 1. — Gymnorhininæ. . . 500
Subf. 2. — Corvinæ. . . . . 501
Subf. 3. — Nucifraginæ . . . 506
Subf. 4. — Garrulinæ . . . . 506
Subf. 5. — Fregilinæ . . . . 516
*Fam. XXXVII. — Paradiseidæ* . 517
Subf. 1. — Paradiseinæ . . . 517
Subf. 2. — Ptilonorhynchinæ. . 522
*Fam. XXXVIII. — Oriolidæ.* . 525
*Fam. XXXIX. — Dicruridæ* . . 529
*Fam. XL. — Artamidæ* . . . 533
Subf. 1. — Artaminæ . . . . 533
Subf. 2. — Pseudochelidoninæ . 534
*Fam. XLI. — Sturnidæ* . . . 534
Subf. 1. — Sturninæ . . . . 534
Subf. 2. — Buphaginæ. . . . 549
*Fam. XLII. — Icteridæ* . . . 549
Subf. 1. — Cassicinæ . . . . 549
Subf. 2. — Agelæininæ. . . . 552
Subf. 3. — Sturnellinæ. . . . 555
Subf. 4. — Icterinæ. . . . . 556
Subf. 5. — Quiscalinæ . . . . 559
*Fam. XLIII. — Ploceidæ* . . . 561
Subf. 1. — Ploceinæ . . . . 561
Subf. 2. — Viduinæ. . . . . 571
Subf. 3. — Estrildinæ . . . . 573
*Fam. XLIV. — Fringillidæ* . . 589

PAGES

Subf. 1. — Fringillinæ. . . . 589
Subf. 2. — Loxiinæ. . . . . 604
Subf. 3. — Coccothraustinæ . . 608
Subf. 4. — Emberizinæ . . . 620
*Fam. XLV. — Tanagridæ.* . . 643
Subf. 1. — Pitylinæ. . . . . 643
Subf. 2. — Phœnicophilinæ . . 652
Subf. 3. — Lamprotinæ . . . 652
Subf. 4. — Tanagrinæ . . . . 653
Subf. 5. — Procniatinæ . . . 670
Subf. 6. — Euphoniinæ. . . . 670
*Fam. XLVI. — Dicæidæ* . . . 674
Subf. 1. — Pardalotinæ . . . 674
Subf. 2. — Dicæinæ. . . . . 676
*Fam. XLVII. — Certhiidæ* . . 680
Subf. 1. — Sittinæ . . . . . 680
Subf. 2. — Certhiinæ . . . . 683
*Fam. XLVIII. — Cœrebidæ* . . 685
Subf. 1. — Diglossinæ . . . . 685
Subf. 2. — Dacnidinæ . . . . 686
Subf. 3. — Glossiptilinæ . . . 689
Subf. 4. — Cœrebinæ . . . . 689
*Fam. XLIX. — Drepanidæ* . . 691
*Fam. L. — Nectariniidæ* . . . 694
*Fam. LI. — Zosteropidæ* . . . 705
*Fam. LII. — Meliphagidæ.* . . 714
Subf. 1. — Melithreptinæ . . . 714
Subf. 2. — Myzomelinæ . . . 714
Subf. 3. — Meliphaginæ . . . 717
*Fam. LIII. — Falculidæ* . . . 728
Subord. IV. — Pseudoscines . . 729
*Fam. I. — Atrichiidæ* . . . . 729
*Fam. II. — Orthonyxidæ* . . . 729
*Fam. III. — Menuridæ.* . . . 729

Digitized by Google

# TABLE DES PLANCHES


| | | |
|---|---|---|
| Planche | I. | Tiga borneonensis. |
| » | II. | 1. Melanerpes cruentatus (tête). |
| | | 2. — hargitti (tête). |
| | | 3. Hapaloderma rufiventre. |
| » | III. | 1. Rhinopomastus cabanisi. |
| | | 2. Scytalopus analis. |
| | | 3. Hypocnemis nævioides. |
| » | IV. | 1. Grallaria gigantea. |
| | | 2, 3. Myrmotherula brevicauda |
| » | V. | 1, 2. Thamnophilus torquatus. |
| | | 3. Dendrocolaptes sancti-thomæ. |
| » | VI. | 1. Picolaptes albolineatus. |
| | | 2. Dendrornis guttata. |
| » | VII. | 1. Geositta rufipennis. |
| | | 2. Geositta isabellina. |
| » | VIII. | 1. Lipaugus holerythrus. |
| | | 2. Attila citreopygius. |
| » | IX. | Cyanolyca yucatanica. |
| » | X. | 1. Xanthoura cyanodorsalis. |
| | | 2. Xanthoura cæruleocephala. |
| » | XI. | 1. Gracula sinensis. |
| | | 2. Pendulinus virescens. |
| » | XII. | 1. Pendulinus dubusi. |
| | | 2. Oreocharis arfaki. |


Digitized by Google

*salvini* et *albemarlei*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1894, pp. 358, 360. (Galapagos).

2331. *Var.* LUTEOLA, Ridgw., *Pr. U.S. Nat. Mus.*, 1894, p. 360. Ile Chatham (Galap.)

2332. *Var.* RIDGWAYI, Rothsch. et Hart., *Novit. Zool.* VI, p. 149. Ile Charles (Galap.)

2333. *Var.* BECKI, Rothsch., *Ibis*, 1898, p. 437. Ile Wenman (Galap.)

2334. *Var.* DROWNEI, Rothsch., *Ibis*, 1898, p. 438. Ile Culpepper (Galap.)

2335. *Var.* MENTALIS, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1894, p. 359. Ile Tower (Galap.)

8898. FUSCA, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 324; Scl., *Cat. B.*, p. 28. Iles Abingdon, Bindloe (Galapagos).

8899. CINERASCENS, Ridgw., *Pr. U.S. Nat. Mus.*, 1889, p. 105. Ile Hood (Galapagos).

2336. *Var.* BIFASCIATA, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1894, p. 359. Ile Barrington (Galap.)

## SUBF. III. — GLOSSIPTILINÆ

### 1285. GLOSSIPTILA

*Neornis*, Hartl. (1846, nec Hodgs., 1844); *Glossiptila*, Scl. (1856).

8900. RUFICOLLIS (Gm.); Gosse, *B. Jam.*, p. 236, *Ill.*, pl. 58; Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 269; ?*campestris*, Lin.; *rufigularis*, Lafr.; *cærulea*, Hartl. Jamaïque.

## SUBF. IV. — CŒREBINÆ

### 1286. CHLOROPHANES

*Chlorophanes*, Rchb. (1853).

8901. SPIZA (Lin.); *Pl. Enl.* 578, f. 2, 682, f. 1; Dubois, *Orn. Gal.*, pl. 117; Cass., *Pr. Ac. Sc. Phil.*, 1864, p. 267; *atricapilla*, Vieill.; Tacz., *Orn. Pér.* I, p. 435; *mitrata*, Licht.; *melanopus*, Cass. Amér. mérid. jusqu'au S. du Brésil, la Bolivie et le Pérou.

2337. *Var.* EXSUL, Berl. et Tacz., *P. Z. S.*, 1883, p. 543. Ecuad. W., Pér. N.-W.

2338. *Var.* GUATEMALENSIS, Scl., *P. Z. S.*, 1861, p. 129. Du Guatém. à Panama.

2339. *Var.* CÆRULESCENS, Cass., *Pr. Ac. Sc. Philad.*, 1864, p. 267; Scl., *Cat.*, p. 30. Colombie, Ecuador E., Pérou N.-E.

8902. PURPURASCENS, Scl. et Salv., *Nomencl.*, pp. 16, 167; Scl., *Cat.* XI, p. 31, pl. 4. Vénézuéla.

### 1287. ARBELORHINA

*Cœreba*, auct. (nec Vieill., 1807); *Arbelorhina*, Cab. (1847); *Cyanerpes*, Oberh. (1899).

8903. CYANEA (Lin.); Aud. et Vieill., *Ois. dorés*, II, p. 87, Amér. mérid. jusqu'au



Digitized by Google

| | |
|---|---|
| pl. 41, 42, 43; Vieill., *Gal. Ois.*, pl. 176; ?*flavipes*, Gm.; ? *cyanogastra*, Lath. | S. du Brésil et Bolivie. |
| 2340. *Var.* CARNEIPES (Scl.), *P. Z. S.*, 1859, p. 376. | Amérique centr. |
| 2341. *Var.* BREVIPES, Cab., *Mus. Hein.* I, p. 96; *eximia*, Cab., *l. c.*; Oberh., *Auk*, 1899, p. 33. | Colombie N.-E., Vénéz., Cuba, Tobago. |
| 8904. CÆRULEA (Lin.); Aud. et Vieill., *Ois. dorés*, II, p. 93, pl. 44, 45, 46; *ochrochlora*, Gm.; *surinamensis*, Lath.; *brevirostris*, Cab.; *microrhyncha*, Berl. | Amérique mérid. trop. |
| 2342. *Var.* LONGIROSTRIS, Cab., *Mus. Hein.* I, p. 96; Finsch, *P. Z. S.*, 1870, p. 561; Oberh., *Auk*, 1899, p. 34. | Vénézuéla E., Trinidad. |
| 8905. LUCIDA (Scl. et Salv.), *Ibis*, 1859, p. 14; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 249. | Amérique centr. |
| 8906. NITIDA (Hartl.), *Rev. Zool.*, 1847, p. 84; Strickl., *Contr. Orn.*, 1850, p. 147, pl. 66, f. 1; Tacz., *Orn. Pér.* I, p. 439. | Colombie et Haut-Amazone. |

## 1288. COEREBA (1)

*Cœreba*, Vieill. (1807); *Certhiola*, Sundev. (1835) et auct. plur.

| | |
|---|---|
| 8907. BAHAMENSIS (Briss.); Rchb., *Handb.*, p. 253; Scl., *Cat.*, p. 37; *flaveola*, Baird, *B. N. Am.*, p. 924, pl. 85, f. 3; *bairdi*, Cab., *J. f. O.*, 1865, p. 412. | Iles Bahama. |
| 8908. CAROTI (Baird), *Am. Nat.* VII, p. 612; id., *B. N. Am.*, p. 427; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 251. | Ile Cozumel (Yucatan). |
| 8909. TRICOLOR (Ridgw.), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1884, p. 178. | Ile Vieille-Providence. |
| 8910. MEXICANA (Scl.), *P. Z. S.*, 1856, p. 286; id., *Cat.*, p. 38; *luteola* (pt.), auct. plur.; *peruviana*, Cab., *J. f. O.*, 1865, p. 413. | Mex. S., Amér. centr. |
| 2343. *Var.* COLUMBIANA (Cab.), *J. f. O.*, 1865, p. 412; *mexicana* (pt.), Scl. | Colombie centr. |
| 2344. *Var.* INTERMEDIA (Salvad. et Festa), *Boll. Mus. Zool. Torino*, 1899, n° 357, p. 13. | Ecuador. |
| 2345. *Var.* MAGNIROSTRIS (Tacz.), *P. Z. S.*, 1880, p. 195; id., *Orn. Pér.* I, p. 441. | Pérou. |
| 8911. FLAVEOLA (Lin.); Gosse, *B. Jam.*, p. 84, *Ill.*, pl. 16; Baird, *B. N. Am.*, p. 427; Scl., *Cat.*, p. 43. | Jamaïque. |
| 2346. *Var.* NEWTONI (Baird), *B. N. Am.*, p. 427; *sanctithomæ*, Newt.; *bartholemica*, Finsch. | Ile Ste-Croix (Antilles). |
| 2347. *Var.* SACCHARINA (Lawr.), *Ann. N. Y. Ac. Sc.* I, p. 150; Scl., *Cat.*, p. 42. | Ile St-Vincent (Antill.) |

(1) M. Oberholser fait remarquer avec raison, que M. Ridgway a reconnu que le type du genre *Cœreba*, de Vieillot, est le *Certhia flaveola*, Lin. (Vieill., *Ois. Am. sept.* II, p. 70, 1807). C'est donc à tort que les auteurs ont appliqué ce terme aux oiseaux du genre précédent. Dès 1892, le Comte von Berlepsch a cependant désigné les Certhioles sous le nom de *Cœreba*.

Digitized by Google

2348. *Var.* Godmani (Cory), *Auk*, 1889, p. 219. — Ile Grenada (Antilles).
2349. *Var.* Bartholemica (Sparrm.), *Mus. Carls.*, pl. 57; Rch., *Handb.*, p. 253; Baird, *N. Am. B.* I, p. 428. — Ile St-Bartholemi.
2350. *Var.* Portoricensis (Bryant), *Pr. Bost. Soc. N. H.*, 1866, p. 252; Baird, *l. c.*, p. 427; *flaveola*, Tayl. (nec Lin.) — Porto-Rico.
2351. *Var.* Sancti-thomæ (Ridgw.), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1885, p. 29; *portoricensis* (pt.), Finsch. — Ile St-Thomas (Antill.)
2352. *Var.* Luteola (Cab.), *Mus. Hein.* I, p. 96; Scl., *Cat.*, p. 40; *flaveola*, Léot., *Ois. Trin.*, p. 126. — Trinidad, Vénézuéla, Colombie N.
2353. *Var.* Bananivora (Gm.); Baird, *N. Am. B.*, p. 427; *clusiæ*, Hartl., *Naum.*, 1852, p. 56. — St-Domingue.
8912. dominicana (Taylor), *Ibis*, 1864, p. 167; Scl., *Cat.*, p. 44, pl. 5, f. 2; *frontalis*, Baird, *Am. Nat.* VII, p. 612. — Dominica, Montserrat, Antigoa, Barbuda.
2354. ? *Var.* Sundevalli (Ridgw.), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1885, p. 26. — Dominica, Guadeloupe.
8913. chloropyga (Cab.), *Mus. Hein.* I, p. 97; Scl., *l. c.*, p. 44; *flavicola*, Licht.; *flaveola* (pt.), auct. plur.; *guianensis*, Cab., *l. c.*; *majuscula*, Cab., *J. f. O.*, 1865, p. 415. — Guyane, Bas-Amazone, Brésil, Bolivie.
8914. barbadensis (Baird), *Am. Nat.* VII, p. 612; id., *N. Am. B.*, p. 428; *martinicana*, Scl. (nec Rchb.) — Barbades.
8915. uropygialis, Berl., *J. f. O.*, 1892, p. 77. — Ile Curaçao (Antilles).
8916. martinicana (Briss.); Rchb., *Handb.*, p. 252; Baird, *N. Am. B.*, p. 428; Scl., *Cat.*, p. 46, pl. 5, f. 1; *albigula*, Bp.; *finschi*, Ridgw. — Martinique, Ste-Lucie, Dominica (Antilles).
8917. atrata (Lawr.), *Ann. N. Y. Acad. Sc.* I, p. 150; Scl., *Cat.*, p. 47; ? *aterrimum*, Less., Tr., p. 303. — Ile St-Vincent (Antill.)
2355. *Var.* Wellsi (Cory), *Auk*, 1889, p. 219. — Ile Grenada (Antilles).

## FAM. XLIX. — DREPANIDÆ (1)

### 1289. DREPANIS

*Drepanis*, Tem. (1820); *Falcator*, Tem. (1822); *Drepanorhamphus*, Rothsch. (1900).

8918. pacifica (Gm.); Andeb. et Vieill., *Ois. dorés*, pl. 63; Sharpe, *Cat. B.*, p. 5; *Vestiaria hoho*, Less. — Hawaï (Sandw.)
8919. funerea, A. Newt., *P. Z. S.*, 1893, p. 690. — Molokai (Sandw.)

(1) Voy. : Sharpe, *Cat. Birds Brit. Mus.* X, pp. 3-10 (1885); W. Rothschild, *The Avifauna of Laysan and the neighbouring Islands*; R. Perkins, *An Introduction to the Study of the Drepanidæ* (*Ibis*, 1901, pp. 562-585).

Digitized by Google

## 1290. VESTIARIA

*Vestiaria*, Flem. (1822).

8920. COCCINEA (Merr.); Audeb. et Vieill., *Ois. dorés*, pl. 52; Sharpe, *l. c.*, p. 6; *Certhia vestiaria*, Lath; Vieill., *Gal. Ois.*, pl. 181; *evi*, Less. — Iles Sandwich.

## 1291. PALMERIA

*Palmeria*, Rothsch. (1893).

8921. DOLEI (Wils.), *P. Z. S.*, 1891, p. 166; *mirabilis*, Rothsch., *Ibis*, 1893, p. 113. — Maui, Molokai (Sandwich).

## 1292. HIMATIONE

*Himatione*, Cab. (1850).

8922. SANGUINEA (Gm.); Aud. et Vieill., *Ois. dorés*, II, pl. 66; Cab., *Mus. Hein.* I, p. 99; Sharpe, *l. c.*, p. 8; *byronensis*, Blox. — Iles Sandwich.

8923. FRAITHII, Rothsch., *Ann. and Mag. N. H.*, 1892, p. 109. — Laysan (Sandwich.)

## 1293. CHLORODREPANIS

*Chlorodrepanis*, Perk. (1899).

8924. VIRENS (Gm.); Audeb. et Vieill., *Ois. dorés*, II, pl. 67, 68; Sharpe, *l. c.*, p. 9; *flava*, Blox. — Hawaï (Sandwich).

2356. *Var.* PARVA (Stejn.), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 94. — Kauai (Sandwich).

2357. *Var.* STEJNEGERI (Wils.), *P. Z. S.*, 1889, p. 446; *chloris*, Stejn. (nec Cab.) — Kauai, Molokai.

8925. CHLORIS (Cab.), *Mus. Hein.* I, p. 99; Wils., *P. Z. S.*, 1889, p. 446; id., *Ibis*, 1890, p. 185. — Oahu, Lanai, Molokai.

## 1294. OREOMYZA

*Oreomyza*, Stejn. (1887).

8926. BAIRDI, Stejn., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 99. — Kauai (Sandwich).

2358. *Var.* WILSONI, Stejn., *Op. cit.*, 1889, p. 386. — Kauai.

8927. MACULATA (Cab.), *Mus. Hein.* I, p. 100; Wils., *Ibis*, 1890, p. 186. — Oahu (Sandwich).

8928. MONTANA (Wils.), *P. Z. S.*, 1889, p. 446; id., *Ibis*, 1890, p. 186. — Lanai (Sandwich).

8929. NEWTONI (Rothsch.), *Ibis*, 1893, p. 443. — Maui (Sandwich).

8930. PERKINSI, Rothsch., *Avif. of Laysan*, pl. III, 1900. — Hawaï (Sandwich).

8931. NANA (Wils.), *Ann. and Mag. N. H.*, 1891, p. 460. — Hawaï.

Digitized by Google

## 1295. CIRIDOPS (1)

*Ciridops*, Wils. et Evan. (1893).

8932. ANNA (Dole); *Fringilla anna*, Dole, *Hawai Alman.*, 1879, p. 49; id., *Ibis*, 1880, p. 241; S. Wils. et Evan, *Aves Haw.*, pt. IV, pl.; Rothsch., *Avif. Lays.*, p. 183. — Hawaï.

## 1296. HEMIGNATHUS

*Hemignathus*, Licht. (1838); *Heterorhynchus*, Lafr. (1839).

8933. OBSCURUS (Gm.); Audeb. et Vieill., *Ois. dorés*, II, pl. 53; Sharpe, *Cat.*, p. 4 (pt.); Wils., *Ibis*, 1890, p. 189. — Hawaï (Sandwich).

8934. LICHTENSTEINI, S. Wils., *Ann. and Mag. N. H.*, 1889, p. 401; id., *Ibis*, 1890, p. 190; *obscurus*, Licht., *Abh. K. Akad. Berlin*, 1838, p. 449, pl. 5, f. 1 (nec Gm.) — Oahu (Sandwich).

8935. LANAIENSIS, Rothsch., *Avif. Laysan*, pl. — Lanai (Sandwich).

8936. ELLISIANUS, Gray, *Cat. B. Trop. Isl. Pacif. Oc.*, p. 9; *obscurus* (pt.), Sharpe, *Cat.*, p. 4. — Oahu (Sandwich).

8937. PROCERUS, Cab., *J. f. O.*, 1889, p. 331; *obscurus*, Stejn. (nec Gm., nec Licht.); *stejnegeri*, S. Wils., *Ann. and Mag. N. H.*, 1889, p. 400; *Ibis*, 1890, p. 190, pl. 6, f. 2. — Kauai (Sandwich).

8938. WILSONI (Rothsch.), *Ibis*, 1893, p. 443. — Mauai (Sandwich).

8939. OLIVACEUS (Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1839, pl. 10; Prev. et Des M., *Voy. Venus*, pl. 1; *lucida*, Gray (nec Licht.); *V. heterorhynchus*, Less., *Rev. Zool.*, 1842, p. 209. — Hawaï.

8940. LUCIDUS, Licht., *Abh. Akad. Berlin*, 1838, p. 451, pl. 5, ff. 2, 3; Sharpe, *l. c.*, p. 5. — Oahu (Sandwich)

8941. HANAPEPE, Wils., *Ann. and Mag. N. H.*, 1889, p. 401; id., *Ibis*, 1890, p. 192, pl. 6, f. 1. — Kauai.

8942. AFFINIS, Rothsch., *Ibis*, 1893, p. 112. — Mauai.

## 1297. VIRIDONIA

*Viridonia*, Rothsch. (1892).

8943. SAGITTIROSTRIS, Rothsch., *Ann. and Mag. N. H.*, 1892, p. 112. — Hawaï.

(1) Quelques auteurs récents ont réuni, dans la famille des Drépanidés, des conirostres et des ténuirostres se rapprochant par d'autres caractères que celui fourni par le bec. Je n'ai pas admis cette manière de voir et j'ai placé les conirostres (*Chrysomitridops*, *Loxops*, *Psittirostra*, *Loxioides*, *Rhodocanthis*, *Chloridops*, *Telespyza* et *Pseudonestor*) dans la famille des Fringillidés. (Voy. pp. 594, 605 et 606). La véritable place du *Ciridops anna* est près des *Loxops*.

Digitized by Google

## FAM. L. — NECTARINIIDÆ (1)

### 1298. NEODREPANIS

*Neodrepanis*, Sharpe (1875).

8944. CORUSCANS, Sharpe, *P. Z. S.*, 1875, p. 76; Shell., *Mon. Nect.*, p. 1, pl. 1; id., *B. Afr.* II, p. 12. — Madagascar.

### 1299. HEDYDIPNA

*Hedydipna, Platydipna*, Cab. (1850); *Nectarinia* (pt.), auct. plur.

8945. METALLICA (Licht.), *Verz. Doubl.*, p. 15; Shell., *Mon. Nect.*, p. 3, pl. 2; id., *B. Afr.* II, p. 15. — Afrique N.-E.

8946. MUELLERI (Lor. et Hellm.), *Orn. Mon.*, 1901, p. 38. — Arabie S.

8947. PLATYURA (Vieill.), *N. Dict.* XXXI, p. 501 (*platura*); Shell., *Mon.*, p. 7, pl. 3; *cyanopygos*, Licht.; *sylviella*, Tem.; *platyura*, Cab. — De Sénégambie jusqu'au Nil et le Nyam-Nyam au S.

### 1300. NECTARINIA

*Nectarinia*, Illig. (1811); *Panæola*, Cab. (1850); *Drepanorhynchus*, Fisch. et Rchw. (1884, nec Dubois).

8948. FAMOSA (Lin.); Shell., *Mon.*, p. 13, pl. 5; *pella* (pt.) et *capensis*, Müll.; *tabacina*, Lath.; *formosa*, Bp. — Afrique S. jusqu'au Namaqua et Limpopo.

2359. *Var.* CUPREONITENS, Shell., *Mon.*, p. 17, pl. 6, f. 1; Gad., *Cat. B.* IX, p. 6; *famosa* (pt.), auct. plur. (nec Lin.); *subfamosa*, Salvad; *æneigularis*, Sharpe. — De l'Abyssinie au Zambèze et Sénégambie.

8949. JOHNSTONI, Shell., *P. Z. S.*, 1885, p. 227, pl. 14; Rchw., *Vög. Deutsch. O. Afr.*, p. 213; *deckeni*, v. Höhn. — Kilima Ndjaro, Kenia (Montagnes).

8950. THOMENSIS, Boc., *Journ. Sc. Lisb.*, 1889, p. 143. — Ile St-Thomas (Afr. W.)

8951. PULCHELLA (Lin.); Aud. et Vieill., *Ois. dorés*, II, p. 62, pl. 40; Shell., *Mon.*, p. 9, pl. 4; *caudatus*, Vieill.; *melampogon*, Licht., *Verz. Doubl.*, p. 15. — Afr. trop. de l'Équateur au 16° l. N.

8952. MELANOGASTRA, Fisch. et Rchw., *J. f. O.*, 1884, p. 181; Rchw., *Vög. Deutsch. O. Afr.*, p. 212; Shell., *B. Afr.* II, p. 25, pl. 1, f. 2. — Victoria Nyanza et contrées voisines au S. de l'Équateur.

8953. TACAZZE (Stanl.) in *Salt's Trav. Abyss.*, *App.*, p. 58; Rüpp., *Neue Wirb.*, p. 89, pl. 31, f. 3; Shell., *Mon.*, p. 19, pl. 7; *tacazziana*, Finsch.; *jacksoni*, Neum., *Orn. Mon.*, 1899, p. 24. — Massaïland, Uganda, Choa, Abyssinie.

(1) Voy. : Shelley, *A Monograph of the Nectariniidæ* (1876 80); Gadow, *Cat. Birds Brit. Mus.* IX, p. 1-126 (1884).

Digitized by Google

2360. *Var.* BOCAGEI, Shell., *Mon.*, p. 21, pl. 6, f. 2; *tacazze*, Boc., *Journ. Sc. Lisb.*, 1878, pp. 196, 269. — Benguela, Angola.

8954. KILIMENSIS, Shell., *P. Z. S.*, 1884, p. 555; id., *Birds Afr.* II, p. 28, pl. 1, f. 1; *filiola*, Hartl.; *gadowi*, Bocage. — Afr. centr. E., de la Zambézie jusqu'au delà de l'Équateur.

8955. REICHENOWI (Fisch.), *J. f. O.*, 1884, p. 56; Shell., *P. Z. S.*, 1884, p. 556, pl. 51. — Kilima Ndjaro, Massaïland.

## 1301. ANTHOBAPHES

*Anthobaphes*, Cab. (1850); *Anthrobaphes*, Bp. (1854).

8956. VIOLACEUS (Lin.); Shell., *Mon. Nect.*, p. 23, pl. 8; ?*cinerea*, Müll.; ?*aurantia*, Gm.; *crocata*, Shaw. — Colonie du Cap au S. de l'Orange.

## 1302. CHALCOSTETHA

*Chalcostetha*, Cab. (1850).

8957. INSIGNIS (Jard.), *Mon. Sun-Birds*, p. 274; Shell., *Mon. Nect.*, p. 87, pl. 30; *pectoralis*, Tem., *Pl. Col.* 158, f. 3 (nec Horsf.); *calcostetha*, Jard.; *macklotii*, Bp.; *insperata*, Hume; *porphyrolæma*, Brügg. — Cochin-Chine, Siam, Ténassér., Malacca, îles de la Sonde, Célèbes.

## 1303. ÆTHOPYGA

*Æthopyga*, Cab. (1850); *Urodrepanis*, Shell. (1876); *Eudrepanis*, Sharpe (1877).

8958. SATURATA (Hodgs.), *Ind. Rev.*, 1837, p. 273; Shell., *Mon. Nect.*, p. 35, pl. 11; *assamensis*, Mc Clel.; *hodgsoni*, Jard., *Mon. Sun-Birds*, p. 240, pl. 28. — Himalaya, Assam.

8959. ANOMALA, Richm., *P. U. S. Nat. Mus.*, 1900, p. 319. — Bas-Siam.

8960. TEMMINCKI (S. Müll.), *Nat. Gesch. Land- en Volkenk.*, 1843, p. 173; Shell., *Mon. Nect.*, p. 47, pl. 16, f. 1; Gad., *Cat.*, p. 16. — Malacca, Sumatra, Bornéo.

8961. EXIMIA (Horsf.), *Trans. Linn. Soc.*, 1820, p. 168; Shell., *l. c.*, p. 27, pl. 9; *kuhli*, Tem., *Pl. col.* 376, ff. 1, 2. — Java.

8962. VIGORSI (Syk.), *P. Z. S.*, 1832, p. 98; Shell., *l. c.*, p. 71, pl. 25; *concolor*, Syk. — Inde (Montagnes).

8963. SEHERIÆ (Tick.), *J. A. S. Beng.*, 1833, p. 577; Shell., *l. c.*, pl. 22; *miles*, Hodgs.; *goalpariensis*, Royle, *Ill. Him. Bot.* II, p. 78, pl. 7, f. 1; *labecula*, Mc Clel.; *mystacalis* (pt.), Blyth. — Himalaya.

2361. *Var.* CABA, Hume, *Str. F.*, 1874, p. 473 (note); Shell., *l. c.*, p. 63, pl. 21; *mystacalis* (pt.), Bl.; *lathami*, Hume, *l. c.* — Assam, Ténassérim, Birmanie.

Digitized by Google

8964. SIPARAJA (Raffl.), *Tr. Linn. Soc.*, 1820, p. 299; Shell., *l. c.*, pl. 19; *mystacalis* (pl.), Bl. et auct. plur. (nec Tem.); *lathami*, Jard.; *eupogon*, Cab.; *chalcopogon*, Rchb. — Malacca, Sumatra, Java, Bornéo.

2362. *Var.* NICOBARICA, Hume, *Str. F.*, 1873, p. 412; Shell., *l. c.*, p. 61, pl. 20. — Iles Nicobar.

2363. *Var.* NIASENSIS, Hart., *Orn. Monatsb.* VI, p. 92. — Ile Nias.

8965. MYSTACALIS (Tem.), *Pl. Col.* 126, f. 3; Shell., *l. c.*, pl. 16, f. 2; *lodoisiæ*, Salvad., *Ibis*, 1865, p. 548. — Java.

8966. FLAVOSTRIATA (Wall.), *P. Z. S.*, 1865, p. 478, pl. 19, f. 2; Shell., *l. c.*, pl. 18; *beccarii*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 659. — Célèbes.

8967. MAGNIFICA, Sharpe, *Nature*, 1876, p. 297; Shell., *l. c.*, pl. 17. — Ile Negros (Philipp.)

8968. IGNICAUDA (Hodgs.), *Ind. Rev.*, 1837, p. 273; Shell., *l. c.*, pl. 15; *rubricaudata*, Blyth; *phœnicura*, Jard.; *epimacurus*, Hodgs. — Népaul, Assam.

8969. NIPALENSIS (Hodgs.), *Ind. Rev.*, 1837, p. 273; Jard., *Mon. Sun-Birds*, pl. 27; Shell., *l. c.*, pl. 10, f. 1. — Népaul, Sikkim et Boutan jusqu'aux monts Kasia.

2364. *Var.* HORSFIELDI (Blyth), *J. A. S. Beng.*, 1842, p. 107; Shell., *l. c.*, pl. 10, f. 2. — Himalaya centr. W.

8970. SANGUINIPECTUS, Wald., *Ann. and Mag. N. H.*, 1875, p. 400; Shell., *l. c.*, pl. 12; *waldeni*, Hume, *Str. F.*, 1877, p. 51. — Birmanie, Ténassérim.

8971. WRAYI, Sharpe, *P. Z. S.*, 1887, p. 440, pl. 38, f. 2. — Pérak (Malacca).

8972. GOULDIÆ (Vig.), *P. Z. S.*, 1831, p. 44; Gould, *Cent. Him. B.*, pl. 56; Shell., *l. c.*, pl. 14; *?subflavus*, Vieill. — Himalaya centr. et E.

8973. DABRYI (Verr.), *Rev. et Mag. de Zool.*, 1867, p. 173, pl. 15; Shell., *l. c.*, pl. 13; *debrii*, Wald. — Birmanie, Chine W.

8974. SHELLEYI, Sharpe, *Nature*, 1876, p. 297; Shell., *l. c.*, pl. 24 et 29, f. 1. — Palawan (Philippines).

8975. BELLA, Tweed., *Ann. and Mag. N. H.*, 1877, p. 337; Shell., *l. c.*, pl. 25. — Surigao (Mindanao N.)

8976. FLAVIPECTUS, Grant, *Ibis*, 1894, pp. 513, 530; *minuta*, B. et Worc. — Luçon N., Mindoro.

8977. LATOUCHEI, Slat., *Ibis*, 1891, p. 43, pl. 1. — Chine S.-E.

8978. CHRISTINÆ, Swinh., *Ann. and Mag. N. H.*, 1869, p. 436; Wald., *Ibis*, 1870, p. 36, pl. 1, f. 1; Shell., *l. c.*, pl. 25. — Haïnan.

8979. AROLASI, Bourns et Worc., *Occ. Pap. Minnes. Ac.* I, p. 17. — Tawi-Tawi (Soulou).

8980. BONITA, Bourns et Worc., *Occ. Pap. Minnes. Ac.* I, p. 18. — Negr., Cébu, Masbate

8981. DUYVENBODEI (Schl.), *Ned. Tijdschr. Dierk.* IV, p. 14; Shell., *l. c.*, pl. 27; Salvad., *Atti R. Acc. Torino*, 1877, p. 316. — Ile Sanghir.

Digitized by Google

8982. PULCHERRIMA, Sharpe, *Nature*, 1876, p. 297; Shell., *l. c.*, pl. 28; *dubia*, Tweed., *P. Z. S.*, 1878, p. 112; Shell., *l. c.*, pl. 29, f. 2. — Dinagat, Basilan (Philippines).

8983. JEFFERYI, Grant, *Ibis*, 1894, pp. 513, 550. — Luçon N.

## 1304. CINNYRIS

*Cinnyris*, Cuv. (1817); *Arachnechthra*, Cab. (1850); *Chromatophora*, *Aidemonia*, *Angaladiana*, Rchb. (1854).

8984. CUPREUS (Shaw), *Gen. Zool.* VIII, p. 201; Shell., *Monogr. Nect.*, pl. 58; *rubrofusca*, Shaw; *aurata*, Bechst.; *nibarus*, *tricolor*, Vieill.; *nigrogaster*, Bon. et V.; *erythronotus*, Sw., *B. W. Afr.* II, p. 130, pl. 15; *porphyroloma*, Heugl.; *chalcea*, Hartl.; *fulgens*, Würt. — Afrique tropicale du 16° l. N. au 18° l. S.

8985. PURPUREIVENTRIS, Rchw., *Orn. Monatsb.* I, p. 61; id., *J. f. O.*, 1894, p. 102, pl. 1, f. 2. — Afrique centr.

8986. NOTATUS (P. L. S. Müll.), *S. N. Anh.*, p. 99; Shell., *l. c.*, pl. 59; *angaladiana*, Shaw; M.-Edw. et Grand., *Madag.*, *Ois.* II, pl. 106, 107; *lotenius*, Vieill.; *madagascariensis*, Quoy et Gaim. — Madagascar.

2365. *Var.* NESOPHILA, Shell., *B. B. O. C.*, 1892, p. 5; id., *Ibis*, 1893, p. 118; id., *B. Afr.* II, p. 41, pl. 2, f. 2. — Grande-Comore.

8987. SUPERBUS (Shaw), *Gen. Zool.* VIII, p. 195; Shell., *Mon. Nect.*, pl. 60; *sugnimbindu*, Bechst.; *sanguineus*, Less. — Afr. W., de la Côte-d'Or à l'Angola.

8988. JOHANNÆ, Verr., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1851, p. 314; Shell., *l. c.*, pl. 61; *fasciata*, Jard. et Fras., *Contr. Orn.*, 1852, p. 59. — Afrique W., de Sierra-Leone au Congo.

8989. SPLENDIDUS (Shaw), *Gen. Zool.* VIII, p. 191, pl. 26; Shell., *l. c.*, pl. 62; ?*coccinigastra*, Lath.; *nitida*, *sericea*, Bechst.; *bombicinus*, *splendens*, Vieill.; *lucidus*, Less. — Sénégal, Gabon jusqu'au Nyam-Nyam.

8990. ABESSINICUS (Hempr. et Ehr.), *Symb. Phys.* I, *Aves*, pl. 4; Shell., *l. c.*, pl. 63; *purpurata*, Kittl.; *gularis*, Rüpp., *Neue Wirb.*, p. 88, pl. 31, f. 2; *lucida*, Licht. — Somaliland, Abyssinie, Kordofan (Afrique N.-E.)

8991. NECTARINIOIDES, Richm., *Auk*, 1897, p. 158; Shell., *B. Afr.* II, p. 48. — Kilima Ndjaro (Afr. E.)

8992. BIFASCIATUS (Shaw), *Gen. Zool.* VIII, p. 198; Shell., *l. c.*, pl. 66; *nitens*, Vieill.; *jardinei*, Verr. in Hartl., *Orn. W. Afr.*, p. 47. — Afrique W. du Gabon au fleuve Cunéné.

2366. *Var.* MICRORHYNCHA, Shell., *Mon. Nect.*, p. 219, pl. 67; *jardinei*, auct. plur. (nec Verr.) — Afrique E., du Zambèze à l'Équateur.



Digitized by Google

2367. *Var.* MARIQUENSIS, Smith, *App. Rep. Exped. S. Afr.*, p. 53 (1836); Shell., *l. c.*, pl. 65; *bifasciata*, auct. plur. (nec Shaw). — Afr., au S. du Cunéné et du Zambèze jusqu'au 29° l. S.

2368. *Var.* OSIRIS (Finsch), *Tr. Z. S.* VII, p. 30; Shell., *l. c.*, pl. 64, f. 1; *jardinei* (pl.), Blanf.; *suahelica*, Rchw.; *hawkeri*, Neum. — Abyssinie et Bogosland du 5° l. S. au 16° l. N.

2369. *Var.* ERYTHROCERCA, Heugl., *J. f. O.*, 1864, p. 261; Shell., *l. c.*, pl. 64, f. 2; *erythrocerca*, Heugl.; *gonzenbachii*, Ant., *Cat. descr. Ucc.*, p. 55. — Région du Nil Blanc, Victoria Nyanza.

8993. COMORENSIS, Peters, *J. f. O.*, 1864, p. 161; Shell., *l. c.*, p. 221, pl. 68. — Anjouan (Comores).

8994. SHELLEYI, Alex., *Ibis*, 1899, p. 556, pl. 11. — Zambézie N.

8995. BOUVIERI, Shell., *Mon. Nect.*, p. 227, pl. 70. — Congo W.

8996. OSEA, Bp., *C. R.* XLII, pt. 2, p. 765 (1856); Shell., *l. c.*, p. 223, pl. 69. — Palestine.

8997. LEUCOGASTER, Vieill., *N. Dict.* XXXI, p. 515; *thoracicus*, Less.; *talatala*, Smith; Shell., *l. c.*, pl. 71; *anderssoni*, Str. et Sel. — Du Zambèze au Damara à l'Ouest et au Natal au S.

2370. *Var.* ALBIVENTRIS (Strickl.), *Contr. Orn.*, 1852, p. 42, pl. 86; Shell., *l. c.*, pl. 73. — Ile Manda, Somaliland (Afrique E.)

8998. OUSTALETI (Bocage), *Jorn. Lisboa*, 1878, p. 254; Shell., *l. c.*, p. 231, pl. 72, f. 1. — Benguéla, Mossamedes.

8999. VENUSTUS (Shaw), *Nat. Misc.* X, pl. 369; Shell., *l. c.*, pl. 74, ff. 1, 3; *quinticolor*, Bechst.; *pusillus*, Sw.; *parvula*, Jard. — De Sénégambie au Gabon.

9000. AFFINIS, Rüpp., *Neue Wirb.*, p. 87, pl. 31, f. 1; Shell., *l. c.*, pl. 74, f. 2; *fazoglensis*, Finsch; *heuglini*, Shell. — Choa, Abyssinie, Kordofan.

2371. *Var.* STIERLINGI, Rchw., *Orn. Mon.*, 1899, p. 171. — Uhehe.

2372. *Var.* NIASSÆ, Rchw., *l. c.* — Nyassaland.

2373. *Var.* KUANZÆ, Rchw., *l. c.*, p. 192; *angolensis*, Rchw., *l. c.*, p. 171 (nec Less.) — Angola.

9001. CYANESCENS, Rchw., *l. c.*, p. 171. — Zanzibar, Mpapua.

9002. FALKENSTEINI, Fisch. et Rchw., *J. f. O.*, 1884, p. 56; Shell., *B. Afr.* II, p. 66, pl. 3, f. 1. — Lac Naiwascha, Loita, Kil. Ndjaro, Sotik.

2374. *Var.* IGNEIVENTRIS, Rchw., *Orn. Mon.*, 1899, p. 171. — Karagwe (Afr. trop. E.)

9003. COQUERELI (Verr.), *J. f. O.*, 1860, p. 90; Shell., *l. c.*, pl. 73. — Mayotte (Comores).

9004. SOUIMANGA (Gm.); Bp., *Consp.* I, p. 407; Shell., *l. c.*, pl. 76; *madagascariensis*, Lath. — Madagascar.

9005. ALDABRENSIS, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1894, p. 372. — Ile Aldabra (Afr. E.)

9006. ABBOTTI, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1894, p. 372; Shell., *B. Afr.* II, p. 72. — Ile de l'Assomption (Afrique E.)

9007. AFER (Lin.); Shell., *l. c.*, p. 249, pl. 77; *viridis* et *canora*, Scop.; *scarlatina*, Sparrm.; *pectoralis* et *smaragdinus*, Vieill.; *erythrogastra*, Shaw. — Afrique S., du Natal au Zambèze.

Digitized by Google

2375. *Var.* LUDOVICENSIS (Bocage), *Jorn. Lisb.*, 1868, p. 41; *intermedia*, Bocage, *l. c.*, 1880, p. 256; *erikssoni*, Trim., *P. Z. S.*, 1882, p. 451, pl. 32. — De l'Angola au Damara et Zambézie N.

2376. *Var.* STUHLMANI, Rchw., *Orn. Mon.*, 1895, p. 61. — Afrique centr.

9008. CHALIBEUS (Lin.); Aud. et Vieill., *Ois. dorés*, II, pl. 26; Shell., *Op. cit.*, pl. 78; *capensis*, Less. — Afrique S. jusqu'au Transvaal.

9009. SUBALARIS, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1899, p. 170. — Pondoland.

9010. MEDIOCRIS, Shell., *P. Z. S.*, 1885, p. 228; id., *B. Afr.* II, p. 79, pl. 3, f. 2. — Du Kilima Ndjaro à Sotik.

9011. FULLEBORNI, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1899, p. 7. — Afrique E. allem.

9012. PREUSSI, Rchw., *J. f. O.*, 1892, p. 190; Shell., *B. Afr.* II, p. 81. — Caméron.

9013. REICHENOWI, Sharpe, *Ibis*, 1891, pp. 444, 595, pl. 12, f. 1; *ansorgii*, Hart., in *Ansorge's « Under the Afr. Sun »*, *App.*, p. 350, pl. 2, f. 1. — Région du Victoria-Nyanza.

9014. CHLOROPYGIUS (Jard.), *Ann. N. H.*, 1842, p. 188; Bp., *Consp. Av.* I, p. 407; Shell., *Mon. Nect.*, p. 257, pl. 79. — Côte-d'Or, Niger.

2377. *Var.* ORPHOGASTRA, Rchw., *Orn. Mon.*, 1899, p. 169. — Bukoba, îles Soweh et Sesse, Sotik.

2378. *Var.* LUERDERI, Rchw., *l. c.* — Camér., Gabon, Loang.

9015. MINULLUS, Rchw., *l. c.*, p. 170. — Caméron.

9016. REGIUS, Rchw., *Orn. Mon.*, 1895, p. 32 (*regia*); id., *J. f. O.*, 1894, pl. 1, f. 1; Shell., *B. Afr.* II, p. 86. — Afrique centr. E.

9017. ASIATICUS (Lath.), *Ind. Orn.* I, p. 288; Shell., *Mon. Nect.*, p. 181, pl. 57; ? *currucaria*, Lin.; *chrysoptera*, *mahrattensis*, Lath.; *nitens*, Herm.; *saccharina*, Shaw; *cincta*, Bechst.; *virescens*, Vieill.; *cyaneus*, *indicus*, Bon. et V.; *iodeus*, Less.; *orientalis*, Fr.; *epauletta*, *strigula*, Hodgs.; *intermedia*, Hume; *edeni*, Anders. — Inde, Ceylan, Indo-Chine W.

2379. *Var.* BREVIROSTRIS (Blanf.), *Ibis*, 1875, p. 86; id., *Eastern Persia*, II, p. 220, pl. 14. — Beloutchistan, Perse S.

9018. LOTENIUS (Lin.); Shell., *l. c.*, p. 177, pl. 56; *polita*, Sparrm.; ? *falcata*, Gm.; *omnicolor*, Gm.; *purpurata*, Shaw; ? *falcatus*, Vieill.; ? *macassariensis*, Aud. et V. — Inde S. et Ceylan.

## 1505. LEPTOCOMA

*Leptocoma*, Cab. (1850); *Nectarophila*, Rchb. (1854).

9019. HASSELTI (Tem.), *Pl. Col.* 576, f. 3; Shell., *l. c.*, pl. 42; *brasiliana!* Gm.; *ruber*, Less.; *phayrei*, Blyth. — Indo-Chine W., Malac., îles de la Sonde.

9020 HENKEI (Mey.), *Zeitschr. f. Ges. Orn.*, 1884, p. 207, pl. 7; *whiteheadi*, Grant, *B. O. C.*, 1894, p. 1; id., *Ibis*, 1894, p. 514, pl. 14, f. 1. — Luçon N.

Digitized by Google

9021. GRAYI (Wall.), *P. Z. S.*, 1865, p. 479; Wald., *Ibis*, 1870, p. 42, pl. 1, f. 2; Shell., *l. c.*, pl. 31. — Célèbes.

9022. ZEYLONICA (Lin.); Cab., *Mus. H.* I, p. 104; Shell., *l. c.*, pl. 45; *lepida*, Sparrm.; *flaviventris*, Herm.; *dubia*, Shaw; *sola*, Vieill.; *nigroalbus*, *solaris*, Less. — Inde et Ceylan.

9023. JULIÆ (Tweed.), *P. Z. S.*, 1877, pp. 535, 547; Shell., *l. c.*, pl. 44. — Basilan, Malanipa, Mindanao (Philipp.)

9024. GUIMARENSIS (Steere), *List Philip. Birds*, p. 22. — Guimaras (Philipp.)

9025. SPERATA (Lin.); Shell., *l. c.*, pl. 43; *jugularis*, Müll.; *chalibea*, Scop.; *affinis*, Shaw; *pusilla*, Bechst.; *coccinigastra*, Tem., *Pl. Col.* 388, f. 3; *expectata*, Licht. — Philippines.

9026. MINIMA (Syk.), *P. Z. S.*, 1832, p. 99; Shell., *l. c.*, pl. 46; *minuta*, Jard., *Sun-birds*, pp. 224, 265. — Inde S.-W. et Ceylan.

## 1306. HERMOTIMIA

*Hermotimia*, Rchb. (1854).

9027. ASPASIÆ (Less.), *Voy. Coq., Zool.* I, p. 676, pl. 30, f. 4; Shell., *l. c.*, pl. 37, f. 1; *sericeus*, Less.; *amasia*, Müll.; *chlorocephala*, Salvad.; *mysorensis*, Mey.; Shell., *l. c.*, pl. 40, f. 2; *jobiensis*, Mey.; *cornelia*, Salvad.; Shell., *l. c.*, pl. 38. — Nouv.-Guinée, îles Arou, Salwatti, Jobi, Mysol, Amboine.

2380. *Var.* MAFORENSIS (Mey.), *Sitz. k. Ak. Wien.*, 1874, p. 419; Shell., *l. c.*, pl. 40, f. 1. — Ile Mafoor.

2381. *Var.* ASPASIOIDES (Gray), *P. Z. S.*, 1860, p. 348; Shell., *l. c.*, pl. 37, f. 2; *amasia*, Fch.; *goramensis*, Salvad. — Nouv.-Guinée S.-E., Nouv.-Bretagne.

2382. *Var.* CORINNÆ, Salvad., *Atti R. Acc. Torino*, 1878, p. 532; Shell., *l. c.*, p. 117, pl. 39; *aspasia* (pt.), auct. plur. — Ile Duc-York.

2383. *Var.* CHRISTIANÆ (Tristr.), *Ibis*, 1889, p. 555. — Ile St-Aignan.

2384. *Var.* AURICEPS (Gray), *P. Z. S.*, 1860, p. 348; Shell., *l. c.*, pl. 34; *porphyrolæma*, Brügg.; *morotensis*, Shell. — Ternate, Batjan, Morty, Soula.

2385. *Var.* PORPHYROLÆMA (Wall.), *P. Z. S.*, 1865, p. 479; Shell., *l. c.*, pl. 32, f. 1. — Célèbes.

2386. *Var.* SCAPULATA, Mey. et Wg., *Abh. Mus. Dresd.*, 1896, n° 2, p. 16; id., *B. Cel.*, p. 466. — Célèbes E.

2387. *Var.* PROSERPINÆ (Wall.), *P. Z. S.*, 1865, p. 32; Shell., *l. c.*, pl. 36. — Bourou.

2388. *Var.* NIGRISCAPULARIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 957 (pt.); Shell., *l. c.*, pl. 35, f. 1. — Ile Miosnom.

2389. *Var.* SALVADORII (Shell.), *l. c.*, p. 105, pl. 35, f. 2; *nigriscapularis* (pt.), Salvad. — Ile Jobi.

9028. SANGHIRENSIS (Mey.), *Sitz. k. Ak. Wiss. Wien.*, 1874, — Ile Sanghir.

Digitized by Google

p. 124; Salvad., *Atti R. Acc. Tor.*, 1874, p. 233, pl. 1, f. 2; Shell., *l. c.*, pl. 32, f. 2 et pl. 33.

9029. TALAUTENSIS, Mey., *J. f. O.*, 1894, p. 244; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 470, pl. 27. — Ile Talaut.

9030. THERESÆ, Salvad., *Atti R. Acc. Tor.*, 1874, pp. 208, 214, pl. 1, f. 1; Shell., *l. c.*, pl. 41. — Ile Key.

## 1307. CHALCOMITRA

*Chalcomitra, Carmelita,* Rchb. (1854).

9031. SENEGALENSIS (Lin.); Shell., *l. c.*, p. 267, pl. 83; *discolor*, Vieill. — Afrique N.-W.

2390. *Var.* ACIK (Antin.), *J. f. O.*, 1866, p. 205; Shell., *l. c.*, pl. 82; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 230; *lamperti*, Rchw. — Afrique centr. E. du 10° l. N. au 6° l. S.

2391. *Var.* ÆQUATORIALIS (Rchw.), *Orn. Monatsb.*, 1899, p. 171. — Victoria Nyanza.

9032. GUTTURALIS (Lin.); Shell., *l. c.*, pl. 81; *natalensis*, Jard., *Mon. Sun-B.*, pp. 195, 236, pl. 12; *discolor*, Bianc.; *bianconii*, Hartl.; *inostimata*, Hart. — Afrique E. du Natal au S. du Somaliland.

2392. *Var.* SATURATIOR (Rchw.), *Orn. Mon.*, 1899, p. 171. — Angola.

2393. *Var.* DAMARENSIS (Rchw.), *Orn. Mon.*, 1899, p. 171. — Damaras.

9033. CRUENTATA (Rüpp.), *Syst. Uebers.*, pp. 26, 28, pl. 9; Shell., *l. c.*, pl. 80; *proteus*, Rüpp.; *scioana*, Salvad. — Abyssinie, Choa.

9034. HUNTERI (Shell.), *P. Z. S.*, 1889, p. 365, pl. 41, f. 2; id., *B. Afr.* II, p. 102. — Teita (Somaliland).

9035. AMETHYSTINA (Shaw), *Gen. Zool.* VIII, p. 195; Shell., *l. c.*, pl. 84; *aurifrontalis*, Bechst.; *auratifrons*, Vieill.; *aurifrons*, Licht. — Afrique S.-E. du Limpopo au Zambèze.

2394. *Var.* DEMINUTA, Cab., *J. f. O.*, 1880, p. 419; *ametystina* (pt.), auct. plur.; *bradshawi*, Sharpe. — Afrique S.-E. du 2° au 20° l. S., Angola.

9036. KIRKII (Shell.), *Mon. Nect.*, p. 273, pl. 25; id., *B. Afr.* II, p. 107. — Afr. E. au S. du Pangani jusqu'au Zamb.

2395. *Var.* KALCKREUTHI, Cab., *J. f. O.*, 1878, pp. 205, 227; Rchw., *Orn. Mon.*, 1899, p. 172; *kirkii* (pt.), Gad., Shell. — Mombas, Ukamba (au N. du Pangani).

9037. FULIGINOSA (Shaw), *Gen. Zool.* VIII, p. 222; Shell., *l. c.*, pl. 86; *maculata*, Shaw; *aureus*, Less.; *scapulatus*, Rochebr. — Afrique W. de Sénégambie au Congo.

9038. ANGOLENSIS (Less.), *Tr. d'Orn.*, p. 295; Shell., *l. c.*, pl. 87; ?*rubescens*, Vieill.; *strangeri*, Jard. — Afrique centr. et W. du Caméron à Fernando-Po et Angola.

9039. ADELBERTI (Gerv.), *Mag. de Zool.*, 1834, pl. 19; Shell., *l. c.*, pl. 88; *eboensis*, Jard.; *angolensis*, Sharpe (nec Less.) — Afr. N.-W. de la Sénégamb. à la Côte-d'Or.

Digitized by Google

2396. *Var.* CASTANEIVENTRIS (Madar.), *Ornis*, 1889, p. 149, pl. 3. — Région du Niger.

## 1508. ELÆOCERTHIA

*Elæocerthia*, Rchb. (1854); *Adelinus*, Bp. (1854).

9040. FUSCA (Vieill.), *N. Dict.* XXXI, p. 506; Shell., *l. c.*, pl. 89. — Afrique S.-W. au S. du 20° l. S.

9041. VERREAUXI (Smith), *S. Afr. Quart. Journ.*, 1854, p. 13; id., *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 57; Shell., *l. c.*, pl. 90. — Afrique S.-E., du Natal au Zambèze.

2397. *Var.* FISCHERI (Rchw.), *J. f. O.*, 1880, p. 142; id., *Vög. Deutsch-O.-Afr.*, p. 210. — Afrique E., du Mozambique à l'Equateur.

9042. THOMENSIS (Bocage), *Jorn. Lisb.*, 1889, p. 143; Shell., *B. Afr.* II, p. 119, pl. 5, f. 2. — Ile St-Thomas (Afr. W.)

## 1509. CYANOMITRA

*Cyanomitra*, *Leucochloridia*, Rchb. (1854).

9043. BALFOURI (Scl. et Hartl.), *P. Z. S.*, 1881, p. 169, pl. 15, f. 2; Shell., *B. Afr.* II, p. 122. — Ile Socotra (Afr. N.-E.)

9044. OLIVACEA (Smith), *Ill. S. Afr. Zool.*, dans le texte de la pl. 57; Shell., *Mon. Nect.*, pl. 91; *olivacina*, Pet., *J. f. O.*, 1881, p. 50. — Afrique E. du Natal au Zanzibar.

9045. OBSCURA (Jard.), *Mon. Sun-B.*, p. 255; Shell., *l. c.*, pl. 92; *fraseri*, Dobrn. — Afrique W. de Sierra-Leone à l'Angola.

2398. *Var.* RAGAZZII, Salvad., *Ann. Mus. Gen.*, 1888, p. 247. — Choa.

2399. *Var.* NEGLECTA, Neum., *J. f. O.*, 1900, p. 297. — Kibuesi (Afr. E.)

9046. VERTICALIS (Lath.); Shell., *l. c.*, pl. 97; *cyanocephala*, Shaw; *dubia*, Bechst; *chloronotus*, Sw., *B. W. Afr.* II, pl. 16; *bohndorffi*, Rchw., *J. f. O.*, 1887, p. 214; *viridisplendens*, Rchw, *J. f. O.*, 1892, p. 54. — Afrique W. du Sénégal à l'Angola, et Afr. équator. jusqu'au Massaïland.

9047. CYANOLÆMA (Jard.), *Contr. Orn.*, 1851, p. 154; Shell., *l. c.*, pl. 95; id., *B. Afr.* II, p. 130. — De Sierra-Leone à l'Angola.

9048. DUSSUMIERI (Hartl.), *J. f. O.*, 1860, p. 340; Shell., *l. c.*, pl. 93; *seychellensis*, Hartl., *Orn. Mad.*, p. 35. — Iles Seychelles.

9049. HUMBLOTI (M.-Edw. et Oust.), *Comptes-Rend.* CI (1885), p. 220; id., *N. Arch. Mus.* X, 1888, p. 245, pl. 4; Shell., *B. Afr.* II, p. 133. — Grande-Comore.

9050. NEWTONI (Bocage), *Jorn. Lisb.*, 1887, p. 250; Shell., *B. Afr.* II, p. 134, pl. 5, f. 1. — Ile St Thomas (Afr. W.)

9051. HARTLAUBI (Verr.), in Hartl., *Orn. W. Afr.*, p. 50; Shell, *Mon. Nect.*, pl. 94; id., *B. Afr.* II, p. 135. — Ile Principe (Afr. W.)

9052. REICHENBACHI (Hartl.), *Orn. W. Afr.*, p. 50; Shell., *Mon.*, pl. 96. — Afrique équat. W.

2400. *Var.* ORITIS (Rchw.), *J. f. O.*, 1892, pp. 190, 225. — Caméron.

Digitized by Google

## 1310. CYRTOSTOMUS

*Cyrtostomus*, Cab. (1850).

9053. SOLARIS (Tem.), *Pl. Col.* 347, f. 3; Shell., *l. c.*, pl. 54. — Timor, Flores.

9054. FLAMMAXILLARIS (Blyth), *J. A. S. Beng.*, 1845, p. 557; Shell., *l. c.*, pl. 51. — Indo-Chine, Malacca.

2401. *Var.* ANDAMANICA (Hume), *Str. F.*, 1873, p. 404; Shell., *l. c.*, pl. 50; *frenata*, Ball (nec Müll.) — Iles Andaman et Nicobar.

9055. JUGULARIS (Lin.); Shell., *l. c.*, pl. 48; ?*philippina*, Lin.; *tricollaris* (P. Müll.); *quadricolor*, Scop.; *gularis*, Sparrm.; *currucaria*, Lath.; *zeilonicus*, Cuv.; *sperata*, Meyen. — Philippines.

2402. *Var.* OBSCURIOR, Grant., *Ibis*, 1894, p. 514. — Luçon N.

9056. FRENATA (S. Müll.), *Nat. Gesch. Land- en Volkenk.*, 1843, p. 173; Shell., *l. c.*, pl. 49; *flavigastra*, *australis*, Gould; *eximia*, Gray. — Moluques, Iles Papous, Australie N.-E.

2403. *Var.* SALEYERENSIS (Hart.), *Nov. Zool.* IV, p. 156. — Ile Saleyer.

2404. *Var.* PLATENI, Blas., *Zeit. Ges. Orn.*, 1885, p. 289, pl. 12; *meyeri*, Hartl., *l. c.* — Célèbes.

2405. *Var.* DISSENTIENS (Hart.), *Nov. Zool.* III, p. 152. — Monts Bonthain.

9057. MELANOCEPHALUS (Rams.), *Nature*, 1879, p. 125; *dubia*, Rams., *Pr. Lin. Soc. N. S. W.* IV, p. 83 (nec auct. plur.) — Iles Salomon.

9058. AURORA, Tweed., *P. Z. S.*, 1878, p. 620; Shell., *l. c.*, pl. 47, f. 1. — Palawan, Paragua (Philippines).

9059. FLAGRANS (Oust.), *l'Institut*, 1876, p. 108; Shell., *l. c.*, pl. 47, f. 2; *excellens*, Grant, *Ibis*, 1895, p. 255. — Luçon (Philippines).

9060. PECTORALIS (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.*, 1820, p. 167; Shell., *l. c.*, pl. 53; *eximia*, Tem., *Pl. col.* 138, ff. 1, 2; *ornatus*, *luteoventris*, Less. — Malac., Sumatra, Java, Lombock, Flores, Labuan, Nicob., etc.

9061. BUTTIKOFERI (Hart.), *Nov. Zool.* III, p. 581. — Sumba.

9062. RHIZOPHORÆ (Swinh.), *Ann. and Mag. N. H.*, 1869, p. 456; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 82; Shell., *l. c.*, pl. 52. — Haïnan.

9063. ZENOBIA, Less., *Voy. Coq.*, *Zool.* I, p. 670, pl. 30; Shell., *l. c.*, pl. 53; ?*cirrhata*, Lath.; *clementiæ*, Less. — Iles Key, Céram, Amboine, Bourou.

9064. TEYSMANNI (Büttik.), *Notes Leyd. Mus.* XV, 1893, p. 179; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 462, pl. 26, ff. 1, 2. — Macassar (Célèbes).

## 1311. ANTHREPTES

*Anthreptes*, Sw. (1837); *Cinnyricinclus*, Less. (1840); *Anthodiæta*, *Chalcoparia*, *Anthothreptes*, Cab. (1850); *Mangusia*, Bp. (1850); *Euchloridia*, *Hypogramma*, Rchb. (1854); *Tephrolæma*, Heine (1860); *Arachnophila*, Salvad. (1874).

9065. HYPOGRAMMICA (S. Müll.), *Nat. Gesch. Land- en Volk.*, — Ténassérim, Malacca,

Digitized by Google

p. 173; Shell., *l. c.*, pl. 98; *macularia* et *nuchalis*, Blyth. — Sumatra, Bornéo.

9066. FRASERI, Jard. et Sel., *Ill. Orn.*, 1842, pl. 52; Shell., *l. c.*, pl. 99; id., *B. Afr.* II, p. 141. — Caméron, Gabon, Fernando-Po.

2406. *Var.* INDIA, Oberh., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1900, p. 33. — Libéria.

9067. SIMPLEX (S. Müll.), *Nat. Gesch. Land- en Volk.*, p. 173 (1843); Shell., *l. c.*, pl. 100; *frontalis*, Blyth; *xanthochlora*, Hume. — Bornéo.

9068. LONGUEMARII (Less.), *Ill. Zool.*, pl. 23; Shell., *l. c.*, pl. 108; *leucosoma*, Sw., *B. W. Afr.* II, p. 146, pl. 17. — Afr. W. (de Sénégamb. au Beng.) et centr.

9069. ORIENTALIS, Hartl., *Abh. Nat. Ver. Bremen*, 1881, p. 109; Shell., *B. Afr.* II, p. 145, pl. 4, f. 2. — Afrique équator. E.

9070. ANCHIETÆ (Bocage), *Jorn. Lisb.*, 1878, p. 1; Shell., *Mon.*, pl. 106. — Benguéla au lac Nyassa.

9071. AURANTIA, Verr., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1851, p. 417; Shell., *l. c.*, pl. 109. — Caméron, Gabon, Congo.

9072. COLLARIS (Vieill.), *N. Dict.* XXXI, p. 502; Shell., *l. c.*, pl. 110; *metallicus*, Less.; *gamtocensis*, Verr. — Afrique S. jusqu'au Zambèze.

2407. *Var.* HYPODILA (Jard.), *Contr. Orn.*, 1851, p. 153; Shell., *l. c.*, pl. 111; *subcollaris*, Rchb.; *zambeziana*, Sharpe; Shell., *l. c.*, p. 343, pl. 111, f. 3; *collaris* (pt.), auct. plur. — Afrique équator.

9073. RECTIROSTRIS (Shaw), *Gen. Zool.* VIII, p. 246; Shell., *l. c.*, pl. 107, ff. 2, 3; *elegans*, Vieill.; *phæothorax*, Hartl; *fantensis*, Sharpe. — Afrique W. de la Gambie au fleuve Volta.

9074. TEPHROLÆMA (Jard. et Fras.), *Contr. Orn.*, 1851, p. 154; Shell., *l. c.*, pl. 72, f. 2; *resplendens*, Heine, *J. f. O.*, 1860, p. 137. — Afrique W. du Niger à l'Angola.

9075. GABONICA (Hartl.), *J. f. O.*, 1861, pp. 43, 109; Shell., *B. Afr.* II, p. 158; *alboterminata*, Rchw., *J. f. O.*, 1874, p. 105; *rectirostris*, Shell. (pt.), *l. c.*, pl. 107, f. 1 (la supér.); *tephrolæma* (pt.), Gad. — Afrique W. de la Gambie au Congo.

9076. SINGALENSIS (Gm.); *phænicotis*, Tem., *Pl. Col.* 108, f. 1, 388, f. 2; Shell., *l. c.*, pl. 105. — Du Boutan à Malacca, îles de la Sonde.

9077. MALACCENSIS (Scop.); Shell., *l. c.*, pl. 101, f. 2; *lepida*, Lath.; Tem., *Pl. Col.* 126, ff. 1, 2; *javanica*, Horsf.; *ruficollis*, Vieill.; *celebensis*, Shell., *l. c.*, pl. 103, ff. 2, 3; *rhodolæma*, Shell., *l. c.*, pl. 104, f. 1. — Malacca, îles de la Sonde, Paragua, Mindanao, Basilan.

2408. *Var.* CHLOROGASTRA, Sharpe, *Trans. Linn. Soc.*, 1877, *Zool.*, p. 342; Shell., *l. c.*, pl. 103, f. 1. — Négros, Masbate, Célèbes, Flores.

9078. GRISEIGULARIS, Tweed., *P. Z. S.*, 1877, p. 817; Shell., *l. c.*, pl. 104. — Philippines.

9079. MEEKI, Hart., *Novit. Zool.* III, p. 239. — Ile Fergusson.

Digitized by Google

### 1312. ARACHNOTHERA

*Arachnothera*, Tem. (1826); *Arachnoraphis*, *Arachnocestra*, Rchb. (1854).

| | |
|---|---|
| 9080. MAGNA (Hodgs.), *Ind. Rev.*, 1837, p. 272; Shell., *Monogr. Nect.*, pl. 112, f. 1; *inornata*, Horsf. (nec Tem.); *chrysopus*, Hodgs. | Du Népaul à la Birmanie et l'Assam. |
| 2409. *Var.* AURATA, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1855, p. 478; Shell., *l. c.*, pl. 112, f. 2; *magna* (pt.), Wald. | Birmanie, Pégou, Ténassérim N. |
| 9081. AFFINIS (Horsf.), *Trans. Lin. Soc.*, 1820, p. 166; Shell., *l. c.*, pl. 113, f. 2; *inornata*, Tem., *Pl. Col.* 84, f. 2; ?*literata*, Licht. | Java, Sumatra. |
| 2410. *Var.* MODESTA (Eyt.), *P. Z. S.*, 1839, p. 105; Shell., *l. c.*, pl. 113, f. 1; *latirostris*, Blyth. | Malacca, Bornéo, Sumatra W. |
| 2411. *Var.* EVERETTI (Sharpe), *Ibis*, 1893, p. 561. | Bornéo N. |
| 9082. JULIÆ, Sharpe, *Ibis*, 1887, p. 451, pl. 14, 1889, p. 424. | Bornéo N. |
| 9083. LONGIROSTRIS (Lath.); Tem., *Pl. Col.* 84, f. 1; Shell., *l. c.*, pl. 114; *cinereicollis*, Vieill.; *longirostratus*, Less.; *affinis*, auct. plur. (nec Horsf.); *pusilla*, Bl. | Inde, du Bengale à Malacca, îles de la Sonde, Célèbes. |
| 2412. *Var.* FLAMMIFERA, Tweed., *P. Z. S.*, 1878, p. 343; Shell., *l. c.*, pl. 115. | Basilan, Samar, Leyte (Philippines). |
| 9084. DILUTIOR, Sharpe, *Nature*, 1876, p. 296; Shell., *l. c.*, pl. 116. | Palawan (Philippines). |
| 9085. CHRYSOGENYS, Tem., *Pl. Col.* 388, f. 1; Shell., *l. c.*, pl. 117; *longirostra*, Horsf. (nec Lath.); *flavigenis*, Sw. | Malacca, îles de la Sonde. |
| 2413. *Var.* CLARÆ, W. Blas., *J. f. O.*, 1890, p. 148. | Mindanao. |
| 9086. ROBUSTA, Müll. et Schl., *Verh. Nat. Gesch.*, 1846, p. 68, pl. 11, f. 1; Shell., *l. c.*, pl. 118; *armata*, Müll. et Schl., *l. c.*, pl. 11, f. 2; *uropygialis*, Gray. | Malacca, Java, Bornéo. |
| 9087. CRASSIROSTRIS (Rchb.), *Handb.*, *Scansoriæ*, p. 314, pl. 392, f. 4016; Shell., *l. c.*, pl. 119; *temmincki*, Horsf. | Malacca, Sumatra, Bornéo. |
| 9088. FLAVIGASTRA (Eyt.), *P. Z. S.*, 1839, p. 105; Shell., *l. c.*, pl. 120; *latirostris*, Rchb.; *eytonii*, Salvad.; *simillima*, Hume; *flaviventris*, Gad., *Cat. B.* IX, p. 109. | Malacca, Sumatra, Bornéo. |
| 9089. CONCOLOR, Snellem., *Mid.-Sumatra*, *Aves*, pl. 1. | Sumatra. |

## FAM. LI. — ZOSTEROPIDÆ (1)

### 1313. ZOSTEROPS (2)

*Zosterops*, Vig. et Horsf. (1827); *Speirops*, Rchb. (1852); *Malacirops*, *Cyclopterops*, *Oreosterops*, Bp. (1854); *Parinia*, Hartl. (1857); *Zosteropisylvia*, Pr. Würt. (1867); *Tephras*, Hartl. (1868); *Chlorocharis*, Sharpe (1888).

(1) Voy.: Sharpe, *Cat. Birds Brit. Mus.* IX, pp. 146-203 (1881); O. Finsch, *Zosteropidæ*, in: *Das Thierreich* (1901).

(2) Le *Zost. glaucura*, Rchb., *Handb. Orn. Merop.*, p. 95, pl 462, f. 3304; Audeb. et V., *Ois.*



Digitized by Google

9090. JAPONICA, Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 57, pl. 22; Sharpe, *Cat. B.* IX, p. 160; Finsch, *Zoster.*, p. 11. — Japon.

9091. MONTANA, Bp., *Consp.* I, p. 398; Fsch., *l. c.*; *chlorates*, Hartl., *J. f. O.*, 1865, p. 23; Sharpe, *l. c.*, p. 191. — Sumatra.

9092. GOULDI, Bp., *Consp.* I, p. 398; *chloronotus*, Gould (nec Vieill.), *P. Z. S.*, 1840, p. 165; id., *B. Austr.* IV, pl. 82. — Australie W.

9093. PALLIDA, Sw., *An. in Menag.*, p. 294; Sharpe, *l. c.*, p. 160; Shell., *B. Afr.* II, p. 187, pl. 7, f. 2; *lateralis*, Sund. (nec Lath.); *sundevalli*, Hartl., *J. f. O.*, 1865, p. 8. — Afrique S. du Cap jusqu'à l'Orange.

9094. ERYTHROPLEURA, Swinh., *Ibis*, 1863, pp. 204, 298; Gould, *B. Asia*, II, pl. 35; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 85, pl. 12; *chloronotus*, Schr. (nec Vieill.); *japonicus*, Swinh. (1861, nec T. et S.) — Chine.

9095. EXPLORATOR, Layard, *P. Z. S.*, 1875, p. 29; Finsch, *Rep. Voy. Chall.* II, p. 48, pl. 14, f. 2; id., *Zost.*, p. 15. — Iles Fidji.

9096. XANTHOCHROA, Gray, *P. Z. S.*, 1859, p. 161; id., in *Brenchl., Cruise Curaçoa*, p. 366, pl. 7, f. 2; Sharpe, *l. c.*, p. 174. — Nouv.-Calédonie.

9097. CEYLONENSIS, Holdsw., *P. Z. S.*, 1872, p. 459, pl. 20, f. 2; Shpe, *l. c.*, p. 173; *annulosus*, Kel. (nec Sw.) — Ceylan.

9098. ANNULOSA, Sw., *Zool. Ill.* III, pl. 164; Finsch., *l. c.*, p. 14; *flavigula*, Sw.; *capensis*, Sundev.; Shpe, *l. c.*, p. 171; *madagascariensis*, Cab. (nec Gm.); *levaillanti*, Rchb. — Afrique S.

2414. *Var.* ATMOREI, Sharpe, *Lay. B. S. Afr.*, p. 326; *poliogaster*, Sharpe, *Cat. B.*, p. 169 (pt.); *capensis*, Shell., *B. Afr.* II, p. 188 (pt.) — Afrique S.

9099. ABYSSINICA, Guér., *Rev. Zool.*, 1843, p. 162; id. et Lafr., in *Fer. et Gal. Voy. Abyss.* III, p. 222, pl. 9, f. 2; Sharpe, *l. c.*, p. 168; *madagascariensis*, Prév. et Des M. (nec Gm.) — Afrique N.-E. du Bogosland au Somaliland, Ile Socotra.

9100. POLIOGASTRA, Heugl., *Ibis*, 1861, p. 357, pl. 13; Sharpe, *l. c.*, p. 169 (pt.); *euryophthalma*, Heugl. (*descr. nulla*); *flavigula*, Blanf. (nec Sw.) — Abyssinie.

9101. ANJUANENSIS, E. Newt., *P. Z. S.*, 1877, p. 297, pl. 33, f. 1; *prætermissa*, Tristr., *Ibis*, 1887, p. 370, pl. 11, f. 1. — Anjouan (Comores).

2415. *Var.* COMORENSIS, Shell., *B. Afr.* II, p. 196, pl. 9, f. 1. — Grande Comore.

*dorés*, II, p. 121, pl. 83; et le *Zost. obscura*, Rchb., *l. c.*, p. 92, pl. 461, f. 3299; Hombr. et Jacq., *Voy. Pôle Sud, Ois.*, pl. 20, f. 6, sont des oiseaux dont il n'est pas possible de reconnaître l'espèce, mais qui n'appartiennent pas au genre *Zosterops*.

Digitized by Google

9102. MADERASPATANA (Lin.); Fch., *l. c.*, p. 15; *madagascariensis*, Gm.; M.-Edw. et Grand., *Hist. Madag. Ois.*, pl. 113, f. 2; *leucops*, Vieill.; *tristis*, Hart.; *madag. gloriosæ*, Ridgw. — Madagascar, îles Nossi-Bé et Glorioso.

9103. NOVÆGUINEÆ, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.*, 1878, p. 341; id., *Orn. Pap.* II, p. 567. — Nouv.-Guin., îles Arou, Céram, Amboine.

9104. CITRINELLA, Bp., *Consp.* I, p. 398; Shpe, *l. c.*, p. 168. — Timor.

9105. NEGLECTA, Scob., *B. B. O. C.*, 1893, p. XXVI; id., *Ibis*, 1893, p. 219; Finsch, *l. c.*, p. 16; *citrinella* (pt.), Hart. — Java, Tim., Rotti, Allor, Savu, Flores, Sumba, Sumbawa, Lombok.

9106. PALPEBROSA (Tem.), *Pl. Col.* 295, f. 3; Sharpe, *l. c.*, p. 165 (pt.); *maderaspatenus*, Jerd. — Inde, Indo-Chine W., Ceylan.

2416. *Var.* NICOBARICA, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1845, p. 565; Finsch., *l. c.*, p. 17; *nicobariensis*, Hume; *palpebrosa* (pt.), Shpe. — Iles Andaman et Nicobar.

2417. *Var.* MESOXANTHA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.*, 1889, p. 596. — Pégou N.-E.

9107. AURIVENTER, Hume, *Str. Feath.*, 1878, p. 519; Rob., *Bull. Liverp. Mus.* II, p. 47, pl. 1, f. 2; Fch., *l. c.*, p. 17; *lateralis*, Hartl. (nec Lath.); *buxtoni*, Nichols. — Iles de la Sonde, Malacca, Ténassérim.

9108. SALVADORII, Mey. et Wg., *J. f. O.*, 1894, p. 115; Finsch., *l. c.*, p. 18; *incerta*, Salvad. (nec Mey.) — Ile Engano (Sumatra S.-W.)

9109. ALDABRENSIS, Ridgw., *Pr. U.S. Nat. Mus.*, 1894, p. 571. — Ile Aldabra (Afr. E.)

9110. SARASINORUM, Mey. et Wg., *J. f. O.*, 1894, p. 114; id., *B. Cel.* II, p. 491, pl. 51; Fch., *l. c.*, p. 18. — Célèbes N.

9111. EVERETTI, Tweed., *P. Z. S.*, 1877, p. 762; Fch., *l. c.*, p. 19. — Cébu (Philippines).

2418. *Var.* BASILANICA, Steere, *List Philip. B.*, p. 21 (1890); Fch., *l. c.*, p. 19; *everetti* (pt.), auct. plur. — Basil., Leyte, Dinagat, Mindanao, Samar, Tawi-Tawi.

9112. SIQUIJORENSIS, Bourns et Worc., *Pap. Minnes. Ac.*, 1894, p. 21; Grant, *Ibis*, 1896, p. 551; Fch., *l. c.*, p. 19. — Siquijor, Négros (Philippines).

9113. BABELO, Mey. et Wg., *Abh. Mus. Dresd.*, 1894-95, n° 9, p. 6; id., *B. Cel.*, p. 495, pl. 50; Fch., *l. c.*, p. 20. — Célèbes N.

9114. SIMPLEX, Swinh., *Ibis*, 1861, p. 331; Gould, *B. Asia* II, pl. 34; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 85; *palpebrosa* (pt.), Sharpe; *var. loochooensis*, Tristr. — Chine, Hainan, Formose.

2419. *Var.* MUSSOTI, Oust., *Ann. Sc. nat.*, 1891, p. 288. — Setchuan (Chine).

9115. STEJNEGERI, Scob., *Ibis*, 1891, p. 275; Fch., *l. c.*, p. 20. — Iles du S. du Japon.

9116. SUBROSEA, Swinh., *P. Z. S.*, 1870, p. 152; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 21. — Chine.

9117. GRISEIVENTRIS, Sel., *P. Z. S.*, 1885, p. 199; Robins., *Bull. Liverp. Mus.* II, p. 48, pl. 1, f. 3; *lettiensis*, Fch., *Not. Leyd. Mus.* XX, p. 156. — Iles Ténimber, Kisser Wetter, Babber, Letti.

9118. ANOMALA, Mey. et Wg., *Abh. Mus. Dresd.*, 1896-97, — Célèbes S.

Digitized by Google

n° 1, p. 12; id., *B. Cel.*, p. 494, pl. 30; Fch., *l. c.*, p. 21.

9119. METCALFEI, Tristr., *Ibis*, 1894, p. 29, pl. 3, f. 1. — Bugotu (îles Salomon).

9120. ALBIVENTRIS, Rchb., *Handb. Orn. Merop.*, p. 92, pl. 461, f. 3298; Homb. et Jacq., *Voy. Pôle Sud, Ois*, pl. 19, f. 3; Shpe, *Cat.* IX, p. 164; *flavogularis*, Mast.; *luteus*, Forb. (nec Gould). — Australie N. et îles voisines.

9121. MINOR, Mey.; *Z. albiventer minor*, Mey., *Sitz. K. Akad. Wien*, 1874, p. 115; *aureigula*, Salvad., *Ann. Mus. Genov.*, 1878, p. 340; id., *Orn. Pap.* II, p. 368. — Ile Jobi.

9122. CRISSALIS, Sharpe, *Cat. B.* IX, p. 165; Fch., *l. c.*, p. 22. — Nouv.-Guinée S.-E.

9123. BASSETTI, Sharpe, *Ann. and Mag. N. H.*, 1894, p. 57. — Ile Dammer.

9124. GRAYI, Wall., *P. Z. S.*, 1863, p. 494; Sharpe, *l. c.*, p. 162; *citrinella*, Wall. (1857), et auct. plur. (nec Müll.) — Iles Key et Arou.

9125. WALLACEI, Finsch, *Zost.*, p. 23 (1901); *aureifrons*, Wall., *P. Z. S.*, 1863, p. 493 (nec Heuglin, 1862); Sharpe, *l. c.*, p. 159. — Sumbawa, Flores, Sumba, Lomblem.

9126. NATALIS, List., *P. Z. S.*, 1888, p. 518, pl. 27; Shpe, in *Andrews, Monogr. Christm. Isl.*, p. 49, pl. 6. — Ile Christmas (Java W.)

9127. MYSORENSIS, Mey., *Sitz. K. Ak. Wien*, 1874, p. 116; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 363; Shpe, *l. c.*, p. 201. — Ile Mysory (Nouv.-Guinée).

9128. HYPOLAIS, Hartl. et Fch., *P. Z. S.*, 1872, p. 95; Shpe, *l. c.*, p. 186. — Ile Uap (Carolines).

9129. OLEAGINEA, Hartl. et Fch., *P. Z. S.*, 1872, p. 95; Shpe, *l. c.*, p. 187. — Ile Uap (Carolines).

9130. FLAVA (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 170; Hartl., *Verz. Samml. Bremen*, p. 37; Shpe, *l. c.*, p. 179 (pt.) — Java, Bornéo.

9131. MEYENI, Bp., *Consp.* I, p. 398; *Dic. flavum*, Kittl., *Kupfert. Vög.*, p. 15, pl. 19, f. 2 (nec Horsf.); *flava*, Meyen. — Luçon (Philippines).

9132. SIAMENSIS, Blyth, *Ibis*, 1867, p. 34; Wald., *Ibis*, 1876, p. 350, pl. 10, f. 1; Sharpe, *l. c.*, p. 180. — Siam, Birmanie, Pégou, Ténassérim.

9133. AUSTENI, Wald., in *Blyth B. Burm.*, p. 111. — Birmanie (Karenée).

9134. SENEGALENSIS, Bp., *Consp.* I, p. 399; Sharpe, *l. c.*, p. 181; *flava*, Sw., *B. W. Afr.* II, p. 45, pl. 3 (nec Horsf.); *citrina*, Hartl.; *aurifrons*, Heugl. (nec Tem.); *icterovirens*, Pr. Würt.; *pallescens*, Heugl.; *tenella* et *heuglini*, Hartl.; *demeryi* et *obsoleta*, Büttik., *Not. Leyd. Mus.* XII, pp. 202-3. — Afrique W. et N.-E.

2420. *Var.* FLAVILATERALIS, Rchw., *J. f. O.*, 1892, p. 192; id., *Vög. D. O.-Afr.*, p. 208, f. 95; *kirki*, Shell. (1888, nec 1879); *senegalensis*, Neum. (nec Bp.); Shell., *B. Afr.* II, p. 173. — Afrique E. allem.

2421. *Var.* JUBAENSIS, Erl., *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 182. — Vallée du Juba (Afr. N.-E.)

Digitized by Google

2422. *Var.* SUPERCILIOSA, Rchw., *J. f. O.*, 1892, p. 193; Fch., *l. c.*, p. 25; *senegalensis* (pt.), Shell., *B. Afr.* II, p. 173. — Afr. équat. (Wadelai).

2423. *Var.* ANDERSSONI, Shell., *B. B. O. C.*, 1892, p. v; id., *Ibis*, 1893, p. 118; id., *B. Afr.* II, p. 177, pl. 7, f. 1; *senegalensis* (pt.), auct. plur. (nec Bp.) — Benguéla, Damaras, Nyassal., Mashonal.

9135. LUTEA, Gould, *B. Austr.* IV, pl. 83; Shpe, *l. c.*, p. 183. — Australie N.

9136. RENDOVÆ, Tristr., *Ibis*, 1882, p. 135; *ugiensis*, Rams. — Rendova, Ugi (Salom.)

9137. PARVULA, Rchb., *Hand. Orn. Merop.*, p. 92, pl. 461, f. 3297; Hombr. et Jac., *Voy. Pôle Sud*, pl. 19, f. 4; *melanura*, Tem., *MS.*; *flava* (pt.), Sharpe, *l. c.*, p. 179; *gallio*, Sharpe, *l. c.*, p. 183; *unica*, Hart., *Nov. Zool.* IV, p. 520. — Bornéo, Java, Flores.

9138. KIRKI, Shell., *P. Z. S.*, 1879, p. 676; Sharpe, *l. c.*, p. 182; *angasizæ*, M.-Edw. et Oust., *C. R. Ac. Sc.* CI, p. 221. — Grande Comore.

9139. MOURONIENSIS, M.-Edw. et Oust., *C. R. Ac. Sc.* CI, p. 221; id., *N. Arch. Mus.*, sér. 2, X, p. 247, pl. 5, f. 2. — Grande Comore.

9140. MAYOTTENSIS, Poll., *P. Z. S.*, 1866, p. 422; Schl. et Poll., *Faun. Madag.*, *Ois.*, p. 73, pl. 19, f. 2; *flavifrons*, Schl. (nec Gm.) — Ile Mayotte (Comores).

9141. SEMIFLAVA, E. Newt., *Ibis*, 1867, pp. 354, 359; Sharpe, *l. c.*, p. 190. — Seychelles.

9142. CHLORIS, Bp., *Consp.* I, p. 398; *rufifrons* et *brunneicauda*, Salvad.; Sharpe, *l. c.*, pp. 184, 190; id., *B. New Guin.* III, pl. 59. — Banda, Céram-Laut, Gisser, Key, Arou (Moluques).

9143. SUMBAWENSIS, Guill., *P. Z. S.*, 1885, p. 508. — Ile Sumbawa.

9144. INTERMEDIA, Wall., *P. Z. S.*, 1863, p. 493; Wald., *Tr. Z. S.* VIII, p. 72, pl. 9, f. 2. — Célèbes, Lombok, Sumbawa, Flores N.

9145. BURUENSIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.*, 1878, p. 341; id., *Orn. Pap.* II, p. 371; Shpe, *l. c.*, p. 184. — Ile Bourou (Mol.)

2424. *Var.* OBSTINATA, Hart., *Nov. Zool.* VII, p. 258; Fch., *Zost.*, p. 28; *intermedia* (pt.), Salvad., Sharpe. — Batjan, Ternate.

9146. CUICUI, De Vis, *Ibis*, 1897, p. 384. — Nouv.-Guinée angl.

9147. LÆTA, De Vis, *Ibis*, 1897, p. 385. — Nouv.-Guinée angl.

9148. GRISEOTINCTA, Gray, *P. Z. S.*, 1858, p. 175; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 371; Sharpe, *l. c.*, p. 189. — Louisiades.

9149. LONGIROSTRIS, Rams, *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1879, p. 288; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 372; Sharpe, *l. c.*, p. 189. — Ile Rogia (arch. Moresby), île Nissan (Salomon).

9150. PALLIDIPES, De Vis, *Rep. Brit. New. Guin.*, 1888-89, p. 60; id., *Ibis*, 1891, p. 35; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 233. — Ile Rossel (Louisiades).

Digitized by Google

9151. AIGNANI, Hart., *Novit. Zool.* VI, 1899, p. 210. — Ile S'-Aignan.

9152. FLAVIFRONS (Gm.), *S. N.* II, p. 944; Gray, in *Brenchl. Cruise of Curaçoa*, p. 366, pl. 7, f. 1; Sharpe, *l. c.*, p. 187; *heteroclita*, Forst. — Nouv.-Hébrides.

9153. MACGILLIVRAYI, Sharpe, *Ibis*, 1900, p. 345; Finsch, *Zost.*, p. 30. — Mallikollo, Epi (Nouv.-Hébrides).

9154. MINUTA, Layard, *Ibis*, 1878, p. 259; Tristr., *Ibis*, 1879, p. 186, pl. 4, f. 1; Sharpe, *l. c.*, p. 192. — Iles Lifu, Maré (Loyalty).

9155. SEMPERI, Hartl. et Fch., *P. Z. S.*, 1868, p. 117; Finsch, *Journ. Mus. Godeffr.* VIII, p. 16, pl. 4, f. 1; Sharpe, *l. c.*, p. 183. — Palau, Ponapé (Carol.), Rota (Marian.)

2425. *Var.* OWSTONI, Hart., *Novit. Zool.* VII, p. 2. — Carolines (Ruk).

9156. LUZONICA, Grant, *Ibis*, 1895, pp. 257, 455. — Luçon S. (Philipp.)

9157. AUREILORIS, Grant, *Ibis*, 1895, p. 455. — Luçon N., Mindoro.

9158. INNOMINATA, Finsch, *Zost.*, p. 31 (1901). — Luçon.

9159. NIGRORUM, Tweed., *P. Z. S.*, 1878, p. 286; Sharpe, *l. c.*, p. 186. — Négros, Panay (Philippines).

9160. VIRENS, Sund., *Öfv. Ak. Förh.*, 1850, p. 104; Sharpe, *l. c.*, p. 182; Shell., *B. Afr.* II, p. 179, pl. 7, f. 3. — Afr. S. et S.-E. jusqu'au lac Nyassa.

9161. STENOCRICOTA, Rchw., *J. f. O.*, 1892, p. 191. — Caméron (Afr. W).

9162. STIERLINGI, Rchw., *J. f. O.*, 1899, p. 418. — Uhehe (Afr. E. all.)

9163. KIKUYUENSIS, Shpe, *Ibis*, 1891, pp. 444, 594, pl. 12, f. 1. — Kikuyu (Afr. E.)

2426. *Var.* JACKSONI, Neum., *Orn. Monatsb.*, 1899, p. 25; *kikuyuensis* (pt.), Sharpe. — Elgon, Nandi, Guasso Massaï (Afr. E.)

2427. *Var.* SCOTTI, Neum., *Orn. Monatsb.*, 1899, p. 24. — Ruwenzori (Afr. E.)

9164. EURYCRICOTA, Fisch. et Rchw., *J. f. O.*, 1884, p. 55; *perspicillata*, Shell., *P. Z. S.*, 1889, p. 566, pl. 41, f. 1. — Massailand, Kilima Ndjaro (Afr. E.)

2428. *Var.* STUHLMANNI, Rchw., *J. f. O.*, 1892, pp. 54, 192; *senegalensis* (pt.), Shell., *B. Afr.* II, pp. 173, 176. — Victoria-Nyanza (Afr. E.)

9165. KAFFENSIS, Neum., *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 10. — Kaffa (Afr. S.)

9166. SUPERCILIARIS, Hart., *Novit. Zool.* IV, pp. 172, 520, pl. 5, f. 1. — Flores.

9167. ATRIFRONS, Wall., *P. Z. S.*, 1865, p. 493; Wald., *Tr. Z. S.* VIII, p. 72, pl. 9, f. 5; *nigrifrons*, Hartl.; *subatrifrons*, Mey. et Wg. — Célèbes N., Peling, Iles Soula et Arou.

9168. NEHRKORNI, W. Blas., *Ornis*, 1888, p. 593, pl. 4, f. 1; Mey. et Wg., *B. Celebes*, p. 490, pl. 51. — Iles Sangir.

9169. CHRYSOLÆMA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 934; id., *Orn. Pap.* II, p. 368; Shpe, *Cat.*, p. 177. — Monts Arfak (Nouv.-Guinée).

9170. SHARPEI, Finsch, *Zost.*, p. 34 (1901); *frontalis*, Salvad. (nec Rchb.) — Iles Arou.

9171. DELICATULA, Sharpe, *Journ. Linn. Soc. Zool.* XVI, p. 318; id., *B. New Guin.* III, pl. 62. — Monts Astrolabes (Nouv.-Guinée).

9172. ATRICAPILLA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1879, — Sumatra (monts Singa-

Digitized by Google

p. 215; Fch., *Zost.*, p. 35; *clara*, Sharpe, *Ibis*, 1888, p. 479, 1890, p. 287, pl. 8, f. 3. — lang), Bornéo (Kina-Balu).

9175. HYPOXANTHA, Salvad., *Atti R. Accad. Torino*, 1881, p. 625; Sharpe, *Cat.*, p. 178; Fch., *l. c.*, p. 35. — Iles Bismarck.

9174. FUSCICAPILLA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 953; id., *Orn. Pap.* II, p. 372; Shpe, *l. c.*, p. 178. — Monts Arfak (Nouv.-Guinée).

9175. UROPYGIALIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1874, p. 78; id., *Orn. Pap.* II, p. 373; Sharpe, *B. New Guin.*, pt. III, pl. 58. — Iles Kei.

9176. OLIVACEA (Lin.); Sharpe, *Cat.*, p. 192; *hasitata*, Hartl., *Orn. Beitr. Madag.*, p. 41; Schl. et Pol., *Faune Madag.* II, p. 73, pl. 19, f. 3. — Ile de la Réunion.

9177. LUGUBRIS, Hartl., *Rev. Zool.*, 1848, p. 109; id., *Abh. Ver. Hamb.* II, p. 49, pl. 2; Shell., *B. Afr.* II, p. 201. — Ile St-Thomé (Afr. W.)

9178. ATRICEPS, Gray, *P. Z. S.*, 1860, p. 350; Shpe, *l. c.*, p. 200. — Ile Batjan (Moluques).

9179. FUSCIFRONS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1878, p. 359; Sharpe, *Cat.*, pp. 201-202; id., *B. New Guin.*, pt. II, pl. 60; *hypoleuca*, Salvad. — Batjan, Nouv.-Guinée.

9180. MEEKI, Hart., *Novit. Zool.* V, 1898, p. 528. — Ile Sudest.

9181. FICEDULINA, Hartl., *P. Z. S.*, 1866, p. 527; Sharpe, *l. c.*, p. 203; Shell., *B. Afr.* II, p. 185, pl. 8, f. 1. — Ile. Principe (Afr. W.)

9182. CONSPICILLATA (Kittl.), *Kupfert. Väg.*, p. 15, pl. 19, f. 1; id., *Mém. Acad. St-Pétersb.* II, pl. 4; Sharpe, *l. c.*, p. 187. — Gouam (Mariannes).

2429. *Var.* SAYPANI, *var.* nov. (1); *conspicillata*, Finsch, *Zost.*, p. 37 (pt.) — Saypan (Mariannes).

9183. JAVANICA (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 156; Sharpe, *l. c.*, p. 196. — Java.

9184. FRONTALIS, Rchb., *Handb. Orn. Merop.*, p. 94, pl. 465, f. 3507 (1852, nec Salvad., 1878); Fch., *l. c.*, p. 38; *javanica*, auct. plur. (nec Horsf.); *fallax*, Sharpe, *Cat.*, p. 197. — Java.

9185. INCERTA, Mey., *Zeitschr. Ges. Orn.*, 1884, p. 209. — ?

9186. ARABS, Lor. et Hellm., *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 31. — Arabie S.

9187. CHLORONOTA (Vieill.); *chloronothos*, Vieill., *N. Dict.* IX, p. 408; Aud. et Vieill., *Ois. dorés*, II, pl. 28; Sharpe, *l. c.*, p. 193; *borbonica* (pt.), Rchb.; *curvirostris*, Sw.; *mauritanica*, Schl. et Pol. (nec Gm.), *Faune Madag.* II, p. 74, pl. 19, f. 4; *chlorophœa*, Hartl. — Ile Maurice.

9188. MELANOPS, Gray, *Cat. B. Trop. Isl. Pacif. Oc.*, p. 15; Sharpe, *l. c.*, p. 198. — Ile Lifu (Loyalty).

9189. GRISEOVIRESCENS, Boc., *Journ. Ac. Lisboa*, 1895, p. 18; Shell., *B. Afr.* II, p. 186; Finsch, *l. c.*, p. 39. — Ile Anno-Bom (Afr. W.)

(1) Diffère des sujets de Gouam par le devant de la tête d'une teinte plus jaune, la tête et les côtés du cou plus gris.

Digitized by Google

9190. LATERALIS (Lath.), *Ind. Orn. Suppl.*, p. LV; Finsch, *Zost.*, p. 39; *S. annulosa, var.* β, Sw., *Zool. Ill.* III, pl. 165; *dorsalis*, Vig. et Horsf.; Gould, *B. Austr.* IV, pl. 81; *westernensis*, Quoy et G., *Voy. Astrol.* I, p. 213, pl. 11, f. 4; *cærulescens*, auct. plur. (nec Lath.); Shpe, *l. c.*, pp. 152, 155 (1). — Australie, Tasmanie, Nouv.-Zélande, Ile Chatham.

2430. *Var.* TEPHROPLEURA, Gould, *P. Z. S.*, 1855, p. 166; id., *B. Austr. Suppl.*, pl. 49; *westernensis* (pt.), Sharpe, *l. c.*, p. 155-58. — Ile du Lord-Howe (Australie E.)

2431. *Var.* VEGETA, Hart., *Novit. Zool.* VI, p 425. — Cap York (Austr. N.)

9191. FLAVICEPS, Peale, *U. S. Expl. Exp.*, p. 95, pl. 25, f. 5 (1848); Fch. et Hartl., *Fauna Centralpolyn.*, p. 52, pl. 6; *westernensis* (pt.), Shpe, *l. c.*, p. 156; *griseonota*, Gray; *cærulescens, var. kandavensis*, Rams.; *vatensis*, Tristr.; *?ambigua*, Sw. — Iles Fidji, Nouv.-Hébrides, Nouv.-Calédonie.

9192. RAMSAYI, Mast., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1877, p. 56; Sharpe, *l. c.*, pp. 156, 158; Finsch, *Zost.*, p. 41. — Iles des Palmes (Queensland).

9193. STRENUA, Gould, *P. Z. S.*, 1855, p. 166; id., *B. Austr. Suppl.*, pl. 48; Sharpe, *l. c.*, p. 155. — Ile Lord-Howe (Austr. E.)

9194. INORNATA, Layard, *Ibis*, 1878, p. 259; Tristr., *Ibis*, 1879, p. 186, pl. 4, f. 2. — Iles Loyalty.

9195. ALBOGULARIS, Gould, *P. Z. S.*, 1836, p. 75; id., *B. Austr. Suppl.*, pl. 46. — Ile Norfolk.

9196. TENUIROSTRIS, Gould, *P. Z. S.*, 1836, p. 76; id., *B. Austr. Suppl.*, pl. 47; Fsch., *l. c.*, p. 42. — Ile Norfolk.

9197. SALOMONENSIS, Finsch, *Zost.*, p. 42 (1901); *Teph. olivaceus*, Rams. (nec Lin.); *Z. ramsayi*, Salvad. (nec Mast.) — Iles Salomon.

9198. SANCTÆ-CRUCIS, Tristr., *Ibis*, 1894, p. 31; Fch., *l. c.*, p. 42. — Ile Ste-Cruz (Nouv.-Hébrides).

9199. GULLIVERI, Casteln. et Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1877, p. 383; Sharpe, *Cat.*, p. 188; Finsch., *l. c.*, p. 43. — Australie N.

9200. SQUAMIFRONS, Shpe, *Ibis*, 1892, p. 325; Fch., *l. c.*, p. 43. — Bornéo (Mont.)

9201. MELANOCEPHALA, Gray, *Ann. Mag. N. H.*, 1862, p. 444; Sharpe, *l. c.*, p. 200; Shell., *P. Z. S.*, 1887, p. 125, pl. 14, f. 1. — Caméron (Afr. W.)

9202. LEUCOPHÆA (Hartl.), *Orn. W.-Afr.*, p. 71; Sharpe, *l. c.*, p. 200; Shell., *B. Afr.* II, p. 203, pl. 8, f. 2. — Ile Principe et Gabon.

9203. BORBONICA (Gm.); Schl. et Pol., *Faune Madag.*, *Ois.*, p. 74, pl. 19, f. 6; Sharpe, *l. c.*, p. 195. — Ile Réunion ou Bourbon.

(1) Les *Z. lateralis, dorsalis* et *cærulescens* représentent l'oiseau en plumage d'automne et d'hiver, tandis que les *Z annulosa* et *westernensis* le représentent en plumage du printemps et d'été (North). — Notez que le *Certhia cærulescens*, Lath., n'est pas un *Zosterops*. (Voy. : Lath., *Ind. Orn. Suppl.*, p. XXXVIII, n° 15.)

Digitized by Google

9204. NEWTONI, Hartl., *Vög. Madag.*, p. 97; Shell., *B. Afr.* II, p. 206, pl. 9, f. 2; *borbonica* (pt.), Sharpe. — Ile Réunion.

9205. MAURITIANA (Gm.); *Pl. Enl.* 705, f. 1; Shpe, *l. c.*, p. 194; *cinerea*, Sw. (nec Kittl.); *borbonica* (pt.), Rchb.; Schl. et Pol., *Faune Madag.*, p. 74, pl. 19, f. 5. — Ile Maurice.

9206. MODESTA, E. Newt., *Ibis*, 1867, pp. 345, 359; Sharpe, *l. c.*, p. 194; Shell., *B. Afr.* II, p. 199, pl. 6, f. 1. — Ile Mahé (Seychelles).

9207. HOVARUM, Tristr., *Ibis*, 1887, pp. 235, 371, pl. 11, f. 2. — Madagascar.

9208. CINEREA (Kittl.), *Kupfert. Vög.*, pl. 8, f. 2; id., *Mém. Ac. St-Pétersb.* II, p. 4, pl. 5; Sharpe, *Cat.*, p. 198: *kittlitzi*, Finsch, *J. f. O.*, 1880, p. 300. — Ile Kusaie ou Ualan (Carolines).

9209. FINSCHI (Hartl.), *P. Z. S.*, 1868, pp. 6, 117, pl. 3; Sharpe, *l. c.*, p. 197. — Ile Pelew (Carolines).

9210. PONAPENSIS, Finsch, *P. Z. S.*, 1875, p. 643; id., *Journ. Mus. Godeffr.*, Heft XII, p. 27, pl. 2, f. 1; Sharpe, *l. c.*, p. 198. — Ile Ponapé (Carolines).

9211. RUKI (Hart.), *B. B. O. C.*, 1897, p. 5; id., *Ibis*, 1898, p. 144. — Ile Ruk (Carolines).

9212. EMILIÆ (Sharpe), *Ibis*, 1888, p. 392, pl. 11, f. 1; Fch., *l. c.*, p. 46. — Bornéo N.

9213. ? RUFILATA, Hartl., *J. f. O.*, 1865, p. 29. — ?

## 1314. PSEUDOZOSTEROPS

*Heleia*, Hartl. (1865, nec Hübn., 1816); *Helaia*, Gray (1869); *Hylophila*, Müll. (1835, nec Hübn., 1816); *Pseudozosterops*, Finsch (1901).

9214. MULLERI (Hartl.), *J. f. O.*, 1865, p. 26; Sharpe, *l. c.*, p. 202; Fch., *l. c.*, p. 47; *frontalis*, Müll. (nec Rchb.) — Timor.

9215. SQUAMICEPS (Hart.), *Novit. Zool.* III, 1896, p. 70; Mey. et Wig., *B. Celebes*, p. 485, pl. 29; Fch., *l. c.*, p. 47. — Célèbes S.

9216. CRASSIROSTRIS (Hart.), *Novit. Zool.* IV, 1897, pp. 172, 519, pl. 3, f. 2; Fch., *l. c.*, p. 48. — Flores.

## 1315. LOPHOZOSTEROPS

*Lophozosterops*, Hart. (1896).

9217. DOHERTYI, Hart., *Novit. Zool.* III, pp. 568, 575; Rothsch., *Novit. Zool.* IV, p. 169, pl. 2, f. 1; Fch., *l. c.*, p. 48. — Sumbawa, Satonda.

9218. SUBCRISTA, Hart., *Novit. Zool.* IV, pp. 171, 521; Fch., *l. c.* — Flores S.



Digitized by Google

## FAM. LII. — MELIPHAGIDÆ (1)

### SUBF. I. — MELITHREPTINÆ

#### 1316. MELITHREPTUS

*Melithreptus*, Vieill. (1816); *Hæmatops*, Gould (1836); *Gymnophrys*, *Eidopsarus*, Sw. (1837); *Idopsarus*, Agas. (1846).

9219. LUNULATUS (Shaw), *Gen. Zool.* VIII, p. 224; Gould, *B. Austr.* IV, pl. 72; *atricapilla*, Tem., *Pl. Col.* 535, f. 1; *torquata*, Sw.; *chloropsis*, Gould, *l. c.*, pl. 73. — Australie.

2432. *Var.* ALBIGULARIS, Gould, *P. Z. S.*, 1847, p. 220; id., *B. Austr.* IV, pl. 74. — Australie N., Nouv.-Guinée S.

9220. GULARIS, Gould, *P. Z. S.*, 1836, p. 144; id., *B. Austr.* IV, pl. 71. — Australie S.-E.

2433. *Var.* LÆTIOR, Gould, *Ann. Mag. N. H.*, 1875, p. 287. — Australie centr.

9221. VALIDIROSTRIS, Gould, *P. Z. S.*, 1836, p. 144; id., *B. Austr.*, pl. 70; ? *virescens*, Wagl.; *bicinctus*, Sw. — Tasmanie.

9222. BREVIROSTRIS, Vig. et Horsf., *Linn. Trans.* XV, p. 315; Gad., *Cat.* IX, p. 207. — Australie.

9223. MELANOCEPHALUS, Gould, *P. Z. S.*, 1845, p. 62; id., *B. Austr.* IV, pl. 75; *atricapilla*, Jard. et Sel., *Ill. Orn.*, pl. 134, f. 1 (nec Tem.); *affinis*, Less. — Tasmanie.

#### 1317. PLECTRORHYNCHUS

*Plectorhyncha*, Gould (1837, nec Lacép.); *Plectrorhynchus*, Wiegm. (1838); *Plectorhamphus*, Gray (1840); *Plectrorhamphus*, Strickl. (1841).

9224. LANCEOLATUS (Gould), *P. Z. S.*, 1837, p. 133; id., *B. Austr.* IV, pl. 47. — Australie.

### SUBF. II. — MYZOMELINÆ

#### 1318. MYZOMELA

*Myzomela*, Vig. et Horsf. (1826); *Phylidonyris*, Less. (1831, pt.); *Cosmeteira*, Rchb. (1852); *Cissomela*, Bp. (1854).

9225. ERYTHROMELAS, Salvad., *Atti R. Ac. Sc. Tor.*, 1881, p. 624; id., *Orn. Pap.* III, p. 541; *guentheri*, Gad., *Cat. B.* IX, p. 129, pl. 3. — Nouv.-Bretagne.

9226. RUBRATRA (Less.), *rubrater*, Less., *Voy. Coq. Zool.*, p. 678; Kittl., *Kupfert. Vög.*, pl. 8, f. 1; *major*, Bp.; *sanguinolenta*, Gray (pt., nec Lath.) — Iles Carolines.

(1) Voy.: Gadow, *Cat. Birds Brit. Mus.* IX, pp. 204-290 (1884).

Digitized by Google

9227. CARDINALIS (Gm.); Lath., *Gen. Syn.* I, 2, p. 733, pl. 33, f. 2; Gad., *l. c.*, p. 130; ?*pusilla*, Gray. — Nouv.-Hébrides.

2434. *Var.* SPLENDIDA, Tristr., *Ibis*, 1879, p. 191. — Tanna (Nouv.-Hébr.)

2435. *Var.* NIGRIVENTRIS, Peale, *U. S. Expl. Exp.*, 1848, p. 150, pl. 41, f. 2; Hartl. et Feh., *Orn Centralpolyn.*, p. 56, pl. 7, ff. 3, 4; *arnouxi*, Verr. in Bp., *C. R.* XXXVIII, p. 263. — Iles Samoa.

9228. PULCHERRIMA, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1881, p. 179; Gad., *l. c.*, p. 131. — Ugi (îles Salomon).

9229. SANGUINOLENTA (Lath.); Gould, *B. Austr.* IV, pl. 65; *dibapha, erythropygia*, Lath.; *australasiæ*, Leach. — Australie.

2436. *Var.* CALEDONICA, Forb., *P. Z. S.*, 1879, p. 260; Gad., *l. c.*, p. 132. — Nouv.-Calédonie.

9230. CHLOROPTERA, Wald., *Ann. and Mag. N. H.*, 1872, p. 399; Forb., *P. Z. S.*, 1879, p. 260, pl. 24, f. 1. — Célèbes.

9231. BOIEI, S. Müll., Verh., *Land- en Volk.*, p. 172; id. et Schl., *Verh. Zool., Aves*, p. 66, pl. 10, ff. 1, 2; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 299. — Ile Banda (Moluques).

9232. LIFUENSIS, Layard, *Ibis*, 1878, p. 258; Gad., *l. c.*, p. 133. — Iles Loyalty.

9233. RUBROCUCULLATA, Tristr., *Ibis*, 1889, p. 228. — St-Aignan (Louisiad.)

9234. ERYTHROCEPHALA, Gould, *P. Z. S.*, 1839, p. 144; id., *B. Austr.* IV, pl. 64; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 300. — Australie N., Nouv.-Guinée S.

2437. *Var.* INFUSCATA, Salvad., *MS.*; Forbes, *P. Z. S.*, 1879, p. 263; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 301; *erythrocephala* (pt.), auct. plur. — Iles Arou.

9235. ADOLPHIINÆ, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 976; Forb., *P. Z. S.*, 1879, p. 261, pl. 24, f. 5. — Mts Arfak (Nouv.-Guinée).

9236. ANNABELLÆ, Sclat., *P. Z. S.*, 1883, p. 56; Gad., *l. c.*, p. 134. — Timorlaut, Babber.

9237. FORBESI, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1880, p. 469; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 293; Gad., *l. c.*, p. 135. — Ile Woodlark (Papous).

9238. VULNERATA (S. Müll.), *Nat. Gesch. Land- en Volk.*, p. 172; id., *Verh. Zool., Aves*, pl. 10, ff. 3, 4; Gad., *l. c.*, p. 135. — Timor.

9239. LAFARGEI, Hombr. et Jacq., *Voy. Pôle Sud*, III, p. 98, pl. 22, f. 5; Forb., *P. Z. S.*, 1879, p. 264; Hart., *Ibis*, 1898, p. 287. — Bougainville ou Guadalcanar (Salomon).

9240. JUGULARIS, Peale, *U. S. Expl. Exp.*, p. 151, pl. 41, f. 2 (1848); Cass., *U. S. Expl. Exp.* (1858), p. 176, pl. 12, f. 2; Gad., *l. c.*, p. 136; *solitaria*, Hombr. et Jacq., *l. c.*, p. 99, pl. 22, f. 6. — Iles Fidji.

241. ROSENBERGI, Schl., *Ned. Tijdschr. Dierk.* IV, p. 58; Rosenb., *Reist. Geelvink Baai*, p. 138, pl. 16, f. 2; Gould, *B. N.-Guin.*, pt. X, pl. 8. — Nouv.-Guinée.

Digitized by Google

9242. CHERMESINA, Gray, *Gen. B.* I, pl. 38; Forb., *P. Z. S.*, 1879, p. 273, pl. 25, f. 1; Gad., *l. c.*, p. 137. — Carol., Nouv.-Hébr. et Rotumah (Fidji).

9243. NIGRA, Gould, *B. Austr.* IV, pl. 66; Forb., *l. c.*, p. 275. — Australie.

9244. PECTORALIS, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 170; id., *B. Austr.* IV, pl. 65. — Australie N.

9245. NIGRITA, Gray, *P. Z. S.*, 1858, p. 173; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 291; *nigri*, Fch.; *erythrocephala*, Mey. (1874, nec Gould); *meyeri*, *pluto*, Salvad. — Nouv.-Guin. W., Arou, Dorei, Jobi, Miosnon.

2458. *Var.* RAMSAYI, Finsch, *Zeitschr. f. Ges. Orn.*, 1886, p. 21. — Nouv.-Irlande.

2459. *Var.* LOUISIADENSIS, Hart., *Novit. Zool.* V, p. 527. — Louisiades.

2440. *Var.* PAMMELÆNA, Scl., *P. Z. S.*, 1877, p. 555; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 293. — Iles de l'Amirauté.

2441. *Var.* TRISTRAMI, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1882, p. 27. — Iles Salomon.

9246. SHARPEI, Grant, *P. Z. S.*, 1888, p. 197, pl. 10, f. 3. — Guadalcanar (Salom.)

9247. ALBIGULA, Hart., *Ibis*, 1899, p. 301; id., *Nov. Zool.* VII, pl. 4, f. 1. — Ile Rossel (Louisiades).

9248. PALLIDIOR, Hart., *Ibis*, 1899, p. 302. — St-Aignan (Louisiad[es]).

9249. CRUENTATA, Mey., *Sitz. K. Ak. Wiss. Wien*, 1874, pp. 202, 206; Gould, *B. N.-Guin.*, pl. V, pl. 13; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 296. — Monts Arfak (Nouv.-Guinée).

2442. *Var.* COCCINEA, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1877, p. 106; Salvad., *l. c.*, p. 296. — Ile du Duc York.

2443. *Var.* ERYTHRINA, Rams., *l. c.*, 1877, p. 107; Salvad., *l. c.*, p. 297; *cruentata* (pt.), Gad. — Nouv.-Irlande, Nouv.-Bretagne.

9250. WAKOLOENSIS, Forb., *P. Z. S.*, 1883, p. 116; Gad., *l. c.*, p. 141. — Wakolo (Bourou).

9251. SCLATERI, Forb., *P. Z. S.*, 1879, p. 265, pl. 25, f. 2; Salvad., *l. c.*, p. 298. — Nouv.-Bretagne.

9252. EQUES (Less.), *Voy. Coq.*, p. 679, pl. 31, f. 1; Forb., *P. Z. S.*, 1879, p. 267; Salvad., *l. c.*, p. 301; *minima*, Wald. (fem.) — Nouv.-Guinée, Dorey, Mysol.

9253. SIMPLEX, Gray, *P. Z. S.*, 1860, p. 349; Salvad., *l. c.*, p. 304. — Moluques.

2444. *Var.* RUBROTINCTA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1878, p. 344; Forb., *l. c.*, p. 269. — Ile Obi.

2445. *Var.* RUBROBRUNNEA, Mey., *Sitzb. K. Ak. Wien*, 1874, p. 203; Forb., *l. c.*, p. 269, pl. 24, f. 2. — Ile Misori.

9254. CINERACEA, Scl., *P. Z. S.*, 1879, p. 448, pl. 37, f. 1. — Nouv.-Bretagne.

9255. OBSCURA, Gould, *P. Z. S.*, 1842, p. 136; id., *B. Austr.*, pl. 67; *fumata*, S. Müll.; *concolor*, Tem. — Australie N., Nouv.-Guinée, Arou.

## 1319. ACANTHORHYNCHUS

*Acanthorhynchus*, Gould (1837); *Leptoglossus*, Sw. (1837).

9256. TENUIROSTRIS (Lath.); Gould, *B. Austr.* IV, pl. 61; — Australie E. et Tasma-

Digitized by Google

Gad., *l. c.*, p. 144; ? *dubius*, Gd.; *cucullatus*, Sw. — nie.

9257. SUPERCILIOSUS, Gould, *P. Z. S.*, 1837, p. 24; id., *B. Austr.* IV, pl. 62. — Australie W. et S.-W.

## SUBF. III. — MELIPHAGINÆ

### 1320. GLYCYPHILA

*Gliciphila*, Sw. (1837); *Glycyphila*, Agass. (1846).

9258. FULVIFRONS (Lewin), *B. New S. W.*, pl. 22; Gould, *B. Austr.* IV, pl. 28; ? *melanops*, Lath.; *melivora*, Shaw; *albiventris*, Steph.; *rubrifrons*, Less. — Australie et Tasmanie.

9259. ALBIFRONS, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 160; id., *B. Austr.* IV, pl. 29. — Australie.

9260. FASCIATA, Gould, *P. Z. S.*, 1842, p. 137; id., *B. Austr.* IV, pl. 30; *pectoralis*, Gray. — Australie.

9261. NOTABILIS, Sharpe, *Ibis*, 1900, pp. 344, 365. — Vanua Lava (N.-Hébr.)

9262. UNDULATA (Sparrm.), *Mus. Carls.* I, pl. 34; Gad., *Cat. B.* IX, 212; *fasciata*, auct. plur. (nec Gould). — Nouv.-Calédonie.

9263. ? FUSCA (Gm.); Vieill., *N. Dict.* XIV, p. 304, XXVI, p. 107; Aud. et Vieill., *Ois. dorés*, II, pl. 65. — ?

9264. MODESTA (Gray), *P. Z. S.*, 1858, pp. 174, 190; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 307; *subfasciata*, Rams.; Gould, *B. New Guin.*, pt. III, pl. 15. — Nouv.-Guinée, Arou, Cap York.

9265. NISORIA (S. Müll.), in Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1878, p. 335; id., *Orn. Pap.* II, p. 309. — Nouv.-Guinée.

9266. INCANA (Lath.), *Ind. Orn.* I, p. 296; Gad., *l. c.*, p. 216; *chlorophæa*, Forst.; *modesta*, Gray (1859, non 1858); id., *Cruise of the « Curaçoa »*, pl. 4, f. 1; *caledonica*, Gray. — Nouv.-Calédonie.

2446. *Var.* FLAVOTINCTA, Gray, *Ann. Mag. N. H.*, 1870, p. 331; Lay., *Ibis*, 1878, pp. 270, 280. — Nouv.-Hébrides.

2447. *Var.* SATELLES, Tristr., *Ibis*, 1879, p. 185. — Ile Lifu (Loyalty).

9267. POLIOTIS, Gray, *P. Z. S.*, 1859, p. 160; Gad., *l. c.*, p. 217. — Iles Loyalty.

### 1321. GLYCYCHÆRA

*Glycichæra*, Salvad. (1878); *Glycychæra*, Salvad. (1881).

9268. FALLAX, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1878, p. 335; id., *Orn. Pap.* II, p. 310; Gad., *l. c.*, p. 213; *whitei*, Rams., *P. Z. S.*, 1882, p. 357. — Nouv.-Guinée, Arou.

2448. *Var.* POLIOCEPHALA, Salvad., *Op. cit.*, 1878, p. 335; id., *l. c.*, p. 311. — Nouv.-Guinée, Andai.

Digitized by Google

### 1322. OEDISTOMA

*OEdistoma*, Salvad. (1875).

9269. PYGMÆUM, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 592; id., *Orn. Pap.* II, p. 312; Gad., *l. c.*, p. 295. — Nouv.-Guinée N.-W.

### 1323. MELILESTES

*Melilestes*, Salvad. (1875); *Melidipnus*, Cab. et Rchw. (1876).

9270. MEGARHYNCHUS (Gray), *P. Z. S.*, 1858, pp. 174, 190; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 313; *vagans*, Bernst.; *rostrata*, Wal.; *megalorhynchus*, Gad., *Cat. B.* IX, p. 248, pl. 5. — Arou, Nouv.-Guinée, Salwati, Waigiou, Mysol.

9271. NOVÆ-GUINEÆ (Less.), *Voy. Coq. Zool.* I, p. 677; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 315; Müll. et Schl., *Nat. Gesch. Zool.*, p. 70, pl. 9, f. 3. — Arou, Nouv.-Guinée, Waigiou, Salwati, Mysol.

9272. ILIOLOPHUS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 591; id., *Orn. Pap.* II, p. 316; Gad., *l. c.*, p. 111, pl. 1, f. 2. — Miosnom, Jobi.

2449. *Var.* AFFINIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 952; id., *Orn. Pap.* II, p. 317; *iliolophus* (pt.), Gad. — Nouv.-Guinée, Waigiou.

2450. *Var.* FERGUSSONIS, Hart., *Novit. Zool.* III, p. 237. — Ile Fergusson.

9273. POLIOPTERUS, Sharpe, *Journ. Linn. Soc. Zool.*, 1882, p. 318; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 543; Gad., *l. c.*, p. 111, pl. 1, f. 1. — Nouv.-Guinée S.-E.

9274. CELEBENSIS, Mey. et Wg., *Abh. Mus. Dresd.*, 1894-95, n° 4, p. 2, n° 8, p. 12; id., *B. Cel.*, p. 481, pl. 28, f. 2. — Célèbes N.

2451. *Var.* MERIDIONALIS, Mey. et Wg., *Abh. Mus. Dresd.*, 1896, n° 1, p. 11; id., *B. Cel.*, p. 482. — Célèbes S.

### 1324. STIGMATOPS

*Stigmatops*, Gould (1865).

9275. OCULARIS (Gould), *P. Z. S.*, 1837, p. 154; id., *B. Austr.* IV, pl. 31; *Ptilotis limbata*, S. Müll.; Gad., *l. c.*, pp. 213, 236, pl. 7, f. 2 (fem.) — Australie, Nouv.-Guinée, Arou, Timor, Lombock, Bali.

2452. *Var.* SUBOCULARIS (Gould), *P. Z. S.*, 1837, p. 154; Gad., *l. c.*, p. 214. — Australie N.-W.

9276. ALBO-AURICULARIS, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1878, pp. 75, 285; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 324. — Nouv.-Guinée S.-E.

9277. ARGENTAURIS (Finsch), *Abh. Naturw. Ver. Brem.*, 1870, p. 364; Salvad., *l. c.*, p. 324. — Waigiou, ? Nouv.-Guinée.

9278. CHLORIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1878, p. 337; id., *Orn. Pap.* II, p. 325. — Guebeh, Mysol, Dammar.

Digitized by Google

9279. SQUAMATA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1878, p. 337; id., *l. c.*, p. 326; *kebirensis*, Mey., *Zeit. Ges. Orn.*, 1884, p. 218. — Koor, Babber, Damma, Dammer.

2453. *Var.* SALVADORII, Mey., *Zeitschr. Ges. Orn.*, 1884, p. 217. — Timorlaut.

9280. NOTABILIS, Finsch, *Notes Leyd. Mus.*, 1898, p. 130, 1900, p. 271, pl. 4, f. 4. — Ile Wetter.

9281. BLASII, Salvad., *Orn. Pap.* III, pp. 543, 566; *boiei*, Blas. et Nehrk. (nec S. Müll.), *Verh. Z. B. Ges. Wien*, 1881, p. 425. — Amboine.

## 1325. ENTOMOPHILA

*Entomophila*, Gould (1837); *Conopophila*, Rchb. (1852).

9282. PICTA, Gould, *P. Z. S.*, 1838, p. 134; id., *B. Austr.* IV, pl. 50; Gad., *l. c.*, p. 219. — Nouv.-Galles du Sud.

9283. RUFIGULARIS, Gould, *P. Z. S.*, 1842, p. 137; id., *l. c.*, pl. 52; Gad., *l. c.* — Australie N.

9284. ALBIGULARIS, Gould, *P. Z. S.*, 1842, p. 137; id., *l. c.*, pl. 51; Gad., *l. c.* — Nouv.-Guinée, Arou, Australie N.

## 1326. CERTHIONYX

*Certhionyx*, Less. (1831); *Melicophila*, Gould (1848); *Lithotentha*, Cab. (1851).

9285. LEUCOMELAS (Cuv.) in Less., *Tr. Orn.*, p. 306; *variegatus*, Less., *l. c.*; *picata*, Gray; Gould, *B. Austr.* IV, pl. 49. — Australie S. et W.

## 1327. NENEBA

*Neneba*, De Vis (1897).

9286. PRASINA, De Vis, *Ibis*, 1897, p. 384. — Nouv.-Guinée angl.

## 1328. MELIPHAGA

*Meliphaga*, Lewin (1808); *Zanthomiza*, Sw. (1837); *Xanthomyza*, Rchb. (1852).

9287. PHRYGIA (Lath.); Gould, *B. Austr.* IV, pl. 48; Gad., *l. c.*, p. 221. — Australie S. et S.-E.

## 1329. PTILOTIS

*Ptilotis*, Sw. (1837); *Lichenostomus*, Cab. (1851); *Stomioptera*, *Foulehaio*, *Xanthotis*, Rchb. (1851).

9288. CARUNCULATA (Gm.); Audeb. et Vieill., *Ois. dorés*, II, p. 131, pl. 69, 70; Peale, *U. S. Expl.*, 1844, p. 144, pl. 42, f. 2; *musicus*, Vieill.; *tabuensis*, Steph; *analoga*, Godeffr. — Iles Samoa, Tonga, et Fidji.

Digitized by Google

9289. PROCERIOR, Fch. et Hartl., *Faun. Centralpolyn.*, p. 62, pl. 5, f. 3; Fch., *Voy. H. M. S. « Challenger »*, *Zool.* II, p. 46, pl. 12, f. 2. — Ovalau, Viti Levu, Kandavu, Vatu Lele (Fidji).

2454. *Var.* FLAVO-AURITA, Lay., *Ibis*, 1876, p. 148; *carunculata* (pt.), Gad. — Ile Fortuna.

2455. *Var.* TAVIUNENSIS, Wiglesw., *Abh. Mus. Dresd.*, 1890-91, n° 6, p. 34; *similis*, Lay. (nec Jacq. et Puch.); *carunculata* (pt.), Gad. — Taviuni (Fidji).

2456. *Var.* BUAENSIS, Wiglesw., *l. c.* — Vanua Levu, Mathuata.

9290. ANALOGA, Rchb., *Handb. Merop.*, p. 103, f. 3332; Hombr. et Jacq., *Voy. Pôle Sud*, III, pl. 17, f. 2; *similis*, Jacq. et Puch. — Iles Arou, Nouv.-Guinée.

2457. *Var.* NOTATA, Gould, *Ann. Mag. N. H.*, 1867, p. 269; id., *B. Austr. Suppl.*, pl. 41. — Queensland N.

2458. *Var.* AURICULATA, S. Müll., *Mus. Lugd.*; Scl., *Pr. Linn. Soc.*, 1858, p. 157. — Mysol, Dorey, Waigiou.

2459. *Var.* FLAVIRICTA, Salvad, *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1880, p. 76; id., *Orn. Pap.* II, p. 332. — Nouv.-Guinée S.-E.

9291. GRACILIS, Gould, *P. Z. S.*, 1866, p. 227; Le Souëf, *Ibis*, 1898, p. 56, pl. 1. — Australie N.

9292. ALBONOTATA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1876, p. 33; *montana*, id., *l. c.*, 1880, p. 77; id., *Orn. Pap.* II, p. 333. — Nouv.-Guinée.

9293. CARTERI, Campb., *Rep. Austral. Ass.* VII, p. 3. — Australie N.-W.

9294. LEILAVALENSIS, North, *Rec. Austr. Mus.* III, 1899, p. 106. — Queensland N.

9295. FUSCA, Gould, *Syn. B. Austr.*, pt. II; id., *B. Austr.* IV, pl. 44. — Australie E.

9296. LEWINI, Sw., *Classif. B.* II, p. 326; Gad., *Cat. B.*, p. 229; ? *xanthotis*, Shaw; *chrysotis*, Lew. (nec Lath.); Gould, *B. Austr.* IV, pl. 32. — Australie E.

9297. PROVOCATOR, Lay., *P. Z. S.*, 1875, p. 28; Fch., *Rep. Voy. Chall.* II, p. 47, pl. 13; *xanthophrys*, Fch. — Kandavu (Fidji).

9298. FRENATA, Rams., *P. Z. S.*, 1874, p. 603; Gould, *B. New Guin.*, pt. II, pl. — Australie N.-E.

9299. SUBFRENATA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 77; id., *Orn. Pap.* II, p. 337; Gad., *l. c.*, p. 231. — Nouv.-Guinée N.-W.

9300. SALVADORII, Hart., *Novit. Zool.* III, p. 531; *lacrimans*, De V. — Mte Stanley (N.-Guin).

9301. PERSTRIATA, De Vis, *Rep. Brit. New Guin.*, 1898, *App.*, p. 86. — Nouv.-Guinée S.-E.

9302. PIPERATA, De Vis, *Op. cit.* — Nouv.-Guinée S.-E.

9303. FLAVOSTRIATA, Gould, *P. Z. S.*, 1875, p. 316; Gad., *l. c.*, p. 232. — Australie N.-E.

9304. MACLEAYANA, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1876, p. 9; Rob. et Lav., *Ibis*, 1900, p. 633. — Queensland N.

9305. MACULATA (Tem.), *Pl. Col.* 29, f. 1; Gad., *l. c.*, p. 232. — Timor.

Digitized by Google

9306. POLYGRAMMA, Gray, *P. Z. S.*, 1861, p. 429; Gad., *l. c.*, p. 233, pl. 6; *poikilosternus*, Mey.; *pœcilosternus*, Salvad. — Nouv.-Guin., Salwati, Waigiou, Mysol.

9307. RETICULATA (Tem.), *Pl. Col.* 29, f. 2; Gad., *l. c.*, p. 233. — Timor.

9308. SONORA, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 160; id., *B. Austr.* IV, pl. 33. — Australie.

9309. VERSICOLOR, Gould, *P. Z. S.*, 1842, p. 136; id., *B. Austr.* IV, pl. 34. — Austr. N.-E., Nouv.-Guinée S.-E.

2460. *Var.* STRIOLATA, Müll., *Mus. Leyd.* et auct. plur.; *sonoroides*, Gray, *P. Z. S.*, 1861, p. 428; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 335; *melanophrys*, Scl., *P. Z. S.*, 1873, p. 693. — Nouv.-Guin., Salwati, Waigiou, Mysol, Batanta.

9310. CHRYSOPS (Lath.); Gould, *B. Austr.* IV, pl. 45; *gilvicapillus*, Vieill.; *trivirgata*, Verr. — Australie S. et E.

9311. CHRYSOTIS (Less.), *Voy. Coq. Zool.* I, p. 645, pl. 21; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 347; *flaviventer*, Less.; *flaviventris*, Rchb. — Nouv.-Guin., Salwati, Mysol.

2461. *Var.* VISI, Hart., *Novit. Zool.* III, p. 15. — Nouv.-Guinée S.

2462. *Var.* FILIGERA, Gould, *P. Z. S.*, 1850, p. 278, pl. 34; id., *B. Austr.*, *Suppl.*, pl. 42. — Australie N. et N.-E., Arou, N.-Guinée S.

2463. *Var.* RUBIENSIS, Mey., *Zeitschr. f. Ges. Orn.*, 1884, p. 289. — Ile Rubi.

2464. *Var.* SPILOGASTRA, Grant, *Ibis*, 1896, p. 251. — Nouv.-Guinée W.

2465. *Var.* FUSCIVENTRIS (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 947; id., *Orn. Pap.* II, p. 348. — Batanta, Waigiou.

9312. MEYERI (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 947; id., *Orn. Pap.* II, p. 349; *pyrrhotis*, Mey. (nec Less.) — Ile Jobi.

9313. SIBISIBINA, De Vis, *Ibis*, 1897, p. 381. — Nouv.-Guinée S.-E.

9314. FLAVIGULA et *flavicollis* (Vieill.), *N. Dict.* XIV, p. 325; Gould, *B. Austr.* IV, pl. 35; *flavigularis*, Gad. — Australie S., S.-E. et Tasmanie.

9315. FASCIOGULARIS, Gould, *P. Z. S.*, 1851, p. 285; id., *B. Austr.* IV, pl. 40. — Australie E.

9316. DIOPS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* XIX, 1899, p. 581. — Nouv.-Guinée S.-E.

9317. KEARTLANDI, North, *Ibis*, 1895, p. 340; id., *Horn Exp. centr.*, *Austr.* II, *Aves*, pl. 6, f. 1. — Australie centr. et W.

9318. LEUCOTIS (Lath.); Tem., *Pl. Col.* 435; Gould, *l. c.* IV, pl. 36; Jard. et Sel., *Ill. Orn.*, pl. 35, f. 2. — Austr. W., S. et S.-E.

9319. COCKERELLI, Gould, *Ann. Mag. N. H.*, 1869, p. 109; id., *l. c.*, *Suppl.*, pl. 43. — Australie N.

9320. AURICOMIS (Lath.); Sw., *Zool. Ill.* III, pl. 43; Gould, *l. c.*, IV, pl. 37; *mystacea*, *novæ-hollandiæ*, Lath.; *auriculata*, Shaw; *erythrotis*, Vieill. — Australie E., du 20° l. S. à Victoria.

9321. CASSIDIX, Jard., *P. Z. S.*, 1866, p. 558; Gould, *l. c.*, *Suppl.*, pl. 39; *leadheateri*, M'Coy. — Victoria et Australie centr. et S.

9322. CRATITIA, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 160; id., *l. c.* IV, pl. 38; *occidentalis*, Cab., *Mus. H.* I, p. 119. — Australie S. et W.



Digitized by Google

9323. PENICILLATA, Gould, *P. Z. S.*, 1836, p. 143; id., *l. c.*, IV, pl. 43. — Australie S. et E.
9324. ORNATA, Gould, *P. Z. S.*, 1838, p. 24; id., *l. c.*, pl. 39. — Austr. W., S. et Victor.
9325. PLUMULA, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 150; id., *l. c.*, pl. 40. — Australie W. et S.
9326. FLAVESCENS, Gould, *P. Z. S.*, 1859, p. 144; id., *l. c.*, pl. 41. — Australie N., Nouv.-Guinée S.-E.
2466. *Var.* GERMANA, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1878, pp. 2, 39, 285; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 336; Gad., *l. c.*, p. 246. — Nouv.-Guinée S.
9327. FLAVA, Gould, *P. Z. S.*, 1842, p. 136; id., *l. c.*, pl. 42. — Australie N. et N.-E.
9328. CINEREA, Scl., *P. Z. S.*, 1873, p. 693; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 338. — Nouv.-Guinée N.-W.
9329. OBSCURA, De Vis, *Ibis*, 1897, p. 383. — Nouv.-Guinée S.-E.
9330. MARMORATA, Sharpe, *Journ. Linn. Soc., Zool.*, 1882, p. 438; Gad., *Cat. B.* IX, p. 247, pl. 4. — Nouv.-Guinée S.-E.
9331. GUISEI, De Vis, *Rep. Orn. Coll.*, 1894, p. 5. — Nouv.-Guinée S.-E.
9332. VIRESCENS, Wall., *P. Z. S.*, 1863, p. 494; Gad., *l. c.*, p. 248, pl. 7, f. 1; *Arachn. simplex*, Gray (nec Müll.) — Lombock.
9333. UNICOLOR, Gould, *P. Z. S.*, 1842, p. 136; id., *l. c.*, pl. 46. — Australie N.
9334. FULVOCINEREA, Fch. et Mey., *Zeitschr. Ges. Orn.*, 1886, p. 24, pl. 5, f. 1. — Nouv.-Guinée S.-E.
9335. PROXIMA, Madar., *Ornith. Monatsb.*, 1900, p. 3. — Nouv.-Guinée N.-E.
9336. PLUMBEA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1894, p. 151. — Moroka (Nouv.-Guin.)
9337. ERYTHROPLEURA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 949; id., *Orn. Pap.* II, p. 337. — Nouv.-Guinée N.-W.
9338. IXOIDES, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1878, p. 338; id., *Orn. Pap.* II, p. 339. — Nouv.-Guinée.
9339. ARUENSIS, Sharpe, *Rep. Voy. Alert. B.*, p. 19. — Iles Arou.
9340. PRÆCIPUA, Hart., *Novit. Zool.* IV, p. 376. — Mts Musgrave et Scratchley (N.-Guin.)

## 1330. CLEPTORNIS

*Cleptornis*, Oust. (1889).

9341. MARCHEI, Oust., *Le Natural.*, 1889, p. 260; id., *N. Arch. Mus. Paris.* VII, p. 202, pl. 7. — Iles Marianne.

## 1331. SARGANURA

*Sarganura*, De Vis (1898).

9342. MACULICEPS, De Vis, *Rep. Brit. New Guin.*, 1898, *App.*, p. 87. — Nouv.-Guinée S.-E.

## 1332. POGONORNIS

*Pogonornis*, Gray (1846).

9343. CINCTA (Du Bus), *Bull. Ac. Sc. Brux.*, 1839, p. 295; — Nouv.-Zélande.

Digitized by Google

Gray, *Gen. B.* I, p. 123, pl. 39, f. 4; Gad., *l. c.*, p. 251; *auritus*, Lafr., *Rev. Zool.*, 1839, p. 257.

### 1333. MELIORNIS

*Phylidonyris* (pt.), Less. (1831); *Meliornis*, Gray (1840); *Lichmera*, Cab. (1850); *Melisympotes*, Rchb. (1852).

9344. AUSTRALASIANA (Shaw), *Gen. Zool.* VIII, p. 226; Gould, *B. Austr.* IV, pl. 27; *pyrrhoptera*, Lath.; *melanoleucus*, Vieill.; *inornata*, Gould. — Australie S., Tasmanie.

9345. NOVÆ-HOLLANDIÆ (Lath.), *Ind. Orn.*, p. 296; Gould, *B. Austr.* IV, pl. 23; *balgonera*, Steph.; *barbata*, Sw. — Australie E., S. et Tasmanie.

2467. *Var.* LONGIROSTRIS (Gould), *P. Z. S.*, 1846, p. 83; id., *B. Austr.* IV, pl. 24. — Australie W.

9346. SERICEA (Gould), *P. Z. S.*, 1837, p. 144; id., *B. Austr.* IV, pl. 25; *sericeola*, Gould (fem.) — Australie S.-E.

9347. MYSTACALIS (Gould), *P. Z. S.*, 1840, p. 161; id., *B. Austr.* IV, pl. 26. — Australie W.

9348. SCHISTACEA, De Vis, *Ibis*, 1897, p. 381. — Nouv.-Guinée S.-E.

### 1334. ANTHORNIS

*Anthomiza*, Sw. (1837); *Anthornis*, Gray (1841).

9349. MELANURA (Sparm.), *Mus. Carls.*, pl. 5; *sannio*, Gm.; *dumerilii*, Less., *Voy. Coq. Zool.* I, p. 644, pl. 21, f. 2; *cæruleocephala*, Sw.; *olivacea*, Forst.; *ruficeps*, Pelz., *Verh. Z. B. Gesel. Wien*, 1867, p. 316. — Nouv.-Zélande.

9350. MELANOCEPHALA, Gray, in *Dieff. Trav.* II, *App.*, p. 188; Rchb., *Handb. Mer.*, pl. 465, f. 3409; Gad., *l. c.*, p. 256; *auriocula*, Bull. — Ile Chatham.

### 1335. PROSTHEMADERA

*Prosthemadera*, Gray (1840).

9351. NOVÆ-ZEELANDIÆ (Gm.); Bull., *B. New Zeal.*, p. 87, pl. 11; Levaill., *Ois. d'Afr.* II, pl. 92; *circinnatus*, Lath.; *crispicollis*, Daud.; *concinnata*, Gray. — Nouv.-Zélande et îles Auckland.

### 1336. MANORHINA

*Manorhina*, Vieill. (1818); *Myzantha*, Vig. et Horsf. (1826).

9352. MELANOPHRYS (Lath.), *Ind. Orn.*, *Suppl.*, p. 42; Gould, *B. Austr.* IV, pl. 80; *viridis*, Vieill.; id., *Gal. Ois.*, pl. 149; *flavirostris*, Vig. et Horsf. — Queensl., Nouv.-Galles du S., Victoria.

Digitized by Google

9353. GARRULA (Lath.), *l. c.*, p. 24; Gould, *l. c.*, pl. 76; *melanocephala*, Lath. — Austr. E., S., Tasman.
9354. OBSCURA (Gould), *P. Z. S.*, 1840, p. 159; id., *l. c.*, pl. 77. — Australie W.
9355. FLAVIGULA (Gould), *P. Z. S.*, 1839, p. 143; id., *l. c.*, pl. 79. — Australie S. et S.-E.
2468. *Var.* LUTEA (Gould), *P. Z. S.*, 1839, p. 144; id., *l. c.*, pl. 78. — Australie W.

## 1337. ANTHOCHÆRA

*Creadion* (pt.), Boie. et Vieill. (1823); *Anthochæra*, Vig. et Horsf. (1826); *Acanthochæra*, Gad. (1884).

9356. CARUNCULATA (Lath.), *Ind. Orn.* I, p. 276; Gould, *l. c.*, pl. 55; *paradoxus*, Lath.; *lewini*, Vig. et Horsf. — Australie E., S. et Tasmanie.
9357. INAURIS, Gould, *B. Austr.* IV, pl. 54; *carunculata*, V. et H. (nec Lath.); Vieill., *Gal. Ois.*, pl. 94. — Tasmanie.

## 1338. ANELLOBIA

*Anellobia*, Cab. (1850); *Melichæra*, Rchb. (1852).

9358. MELLIVORA (Lath.), *Ind. Orn.*, *Suppl.*, p. 37; Gould, *l. c.*, pl. 56; Cab., *Mus. Hein.* I, p. 120; *chrysopterus*, Lath. — Australie E., S. et Tasmanie.
9359. LUNULATA (Gould), *P. Z. S.*, 1837, p. 153; id., *l. c.*, pl. 57; Gad., *l. c.*, p. 265. — Australie W.

## 1339. ACANTHOGENYS

*Acanthogenys*, Gould (1837).

9360. RUFIGULARIS, Gould, *P. Z. S.*, 1837, p. 153; id., *l. c.*, pl. 53. — Austr. W., S. et S.-E.
9361. FLAVICANTHUS, Campb., *Victorian Natural.* XVI, p. 3. — Australie N.-W.

## 1340. MYZA

*Myza*, Mey. et Wig. (1895.)

9362. SARASINORUM, Mey. et Wg., *Abh. Mus. Dresd.*, 1895, n° 8, p. 11; id., *B. Cel.*, p. 483, pl. 28, f. 1. — Célèbes N.

## 1341. LEPTORNIS

*Leptornis*, Hombr. et Jacq. (1853); *Philedon* (pt.), Rchb. (1852).

9363. SAMOENSIS (Hombr. et Jacq.), *Ann. Sc. Nat. Paris*, 1841, p. 314; Cass., *U. S. Expl. Exp.*, 1858, p. 172, pl. 11, f. 2; *olivacea*, Peale; *sylvestris*, Hombr. et Jacq., *Voy. Pôle S.*, *Ois.*, pl. 17, f. 1. — Iles Samoa.

Digitized by Google

9364. AUBRYANUS, Verr. et Des M., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1860, p. 432; Gray, in *Brenchl. Cruise*, p. 364, pl. 4. — Nouv.-Calédonie.
9365. VIRIDIS (Lay.), *P. Z. S.*, 1875, pp. 150, 432; Salvad., *Ibis*, 1876, p. 507; Gad., *l. c.*, p. 268. — Iles Fidji.

## 1342. CHÆTOPTILA

*Chætoptila*, Sclat. (1868).

9366. ANGUSTIPLUMA (Peale), *U. S. Expl. Exped.*, pl. 11, f. 1; Rothsch., *Avif. Laysan*, pl. 71. — Hawaï (éteint).

## 1343. ENTOMYZA

*Entomyza*, Sw. (1837).

9367. CYANOTIS (Lath.), *Ind. Orn., Suppl.*, p. 29; Gould, *l. c.* IV, pl. 68; *cyaneus*, Lath.; *cyanops*, Lew. — Australie N.-E.
2469. *Var.* HARTERTI, Rob. et Lav., *Ibis*, 1900, p. 635. — Queensland N.
9368. ALBIPENNIS, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 169; id., *l. c.* IV, pl. 69. — Australie N.

## 1344. TROPIDORHYNCHUS

*Tropidorhynchus*, Vig. et Horsf. (1826).

9369. CORNICULATUS (Lath.), *Ind. Orn.* I, p. 276; Vig. et Horsf., *Tr. Lin. Soc.* XV, p. 324; Gould, *B. Austr.* IV, pl. 58; *monachus*, Lath. — Australie E.
9370. ARGENTICEPS, Gould, *P. Z. S.*, 1839, p. 144; id., *B. Austr.* IV, pl. 59; *monachus*, V. et H. — Australie N.
9371. BUCEROIDES (Sw.), *An. in Meng.*, p. 325; Gray, *Gen. B.* I, p. 125; Gould, *B. Austr., Suppl.*, pl. 44. — Australie N. et N.-E.
9372. TIMORIENSIS, S. Müll., *Verh. Land- en Volk.*, p. 153; Gad., *l. c.*, p. 273. — Iles Timor et Wetter.
9373. NEGLECTUS, Bütt., *Notes Leyd. Mus.*, 1891, p. 213; *timoriensis* (pt.), auct. plur. — Lombock, Flores, Sumbawa.
9374. NOVÆ-GUINEÆ, S. Müll., *Op. cit.*, p. 153; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 357; *monachus*, Q. et G. (nec Lath.); *mitratus*, S. Müll.; *corniculatus*, auct. plur. (nec Lath.); *marginatus*, Gray. — Nouv.-Guinée, Waigiou, Batanta, Salwati, Mysol.
2470. *Var.* ARUENSIS, Mey., *Zeitschr. Ges. Orn.*, 1884, p. 216. — Iles Arou.
2471. *Var.* SUBTUBEROSA, Hart., *Novit. Zool.* III, p. 238 (*subtuberosus*). — Ile Fergusson.
9375. JOBIENSIS, Mey., *Sitz. Ak. Wiss. Wien*, 1874, p. 113; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 356. — Ile Jobi.

Digitized by Google

## 1345. PHILEMON

*Philemon*, Vieill. (1816); *Philedon*, Cuv. (1817); *Philemonopsis*, *Meliarchus*, Salvad. (1880).

9376. INORNATUS (Gray), *Gen. B.* I, p. 125; Gad., *l. c.*, p. 275; *vulturinus*, Jacq. et Puch., *Voy. Pôle S.* III, p. 88, pl. 18, f. 1; *cineraceus*, Müll. — Timor.

9377. KISSERENSIS, Mey., *S. B. Ges. Isis*, 1884, p. 41. — Ile Kisser.

9378. MOLUCCENSIS (Gm.); Tem., *Pl. Col.* I, p. 72; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 352; *cinereus*, Vieill.; *bouruensis*, Wall. (nec Gray). — Iles Bourou et Key.

9379. LESSONI (Gray), *P. Z. S.*, 1859, p. 161; *diemenensis*, Less.; Pucher., *Arch. du Mus.*, 1855, pl. 21; *vulturinus*, Scl. — Nouv.-Calédonie, Iles Loyalty.

9380. CITREOGULARIS (Gould), *P. Z. S.*, 1856, p. 145; id., *B. Austr.* IV, pl. 60. — Australie.

2472. *Var.* OCCIDENTALIS, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.* II, p. 676. — Australie N.-W.

2473. *Var.* SORDIDA (Gould), *B. Austr.* I, *Introd.*, p. 58; Gad., *l. c.*, p. 277. — Presqu'île Cobourg.

9381. COCKERELLI, Sclat., *P. Z. S.*, 1877, p. 104; Gad., *l. c.*, p. 278, pl. 2. — Nouv.-Bretagne.

9382. ALBITORQUES, Sclat., *P. Z. S.*, 1877, p. 555; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 354. — Iles de l'Amirauté.

9383. SCLATERI, Gray, *Ann. and Mag. N. H.*, 1870, p. 327; id., in *Brenchley's Cruise, Birds*, p. 362, pl. 5; Salvad., *l. c.*, p. 322. — Iles Salomon.

9384. FUSCICAPILLUS (Wall.), *Ibis*, 1862, p. 351; Salvad., *l. c.*, p. 354. — Morty, Halmahera, Batjan.

9385. PLUMIGENIS (Gray), *P. Z. S.*, 1858, pp. 174, 191; Salvad., *l. c.*, p. 355. — Iles Key.

2474. *Var.* TIMORLAOENSIS, Mey., *S. B. Ges. Isis*, 1884, p. 41; *plumigenis* (pt.), Gad., *l. c.*, p. 279. — Timorlaut.

9386. SUBCORNICULATUS (Hombr. et Jacq.), *Ann. Sc. Nat.*, 1841, p. 314; id., *Voy. Pôle S.* III, p. 87, pl. 16, f. 1; Salvad., *l. c.*, p. 355; *subcornutus*, Tem. — Céram.

9387. MEYERI, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1878, p. 339; id., *Orn. Pap.* II, p. 350; *inornatus*, Mey. (nec Gray.) — Nouv.-Guinée.

9388. PHILIPPINENSIS, Steere, *List of Philipp. B.*, p. 21. — Samar (Philippines).

## 1346. MELITOGRAIS

*Melitograis*, Sundev. (1872).

9289. GILOLENSIS (Bp.), *Consp. Av.* I, p. 390; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 349; *senex*, Gray; *striata*, Sundev. — Halmahera, Batjan.

Digitized by Google

## 1347. PROMEROPS

*Promerops*, Briss. (1760); *Ptiloturus*, Sw. (1837, nec Boie); *Ptilurus*, Strickl. (1841).

9390. CAFER (Lin.); *Pl. Enl.* 516, 637; Audeb. et Vieill., *Ois. dorés*, I, p. 13, pl. 4; *caffra*, Gm.; *longicaudatus*, Vieill.; *griseus*, Bon. et Vieill.; *capensis*, Less. — Afrique S.

9391. GURNEYI, J. Verr., *P. Z. S.*, 1871, p. 135, pl. 8; Gad., *l. c.*, p. 284; *cafer*, Gurn. (nec Lin.) — Natal, Transvaal.

## 1348. MOHO

*Gracula*, Merr. (1786, nec Lin.); *Moho*, Less. (1831); *Acrulocercus*, Cab. (1847); *Mohoa*, Rchb. (1850).

9392. NOBILIS (Merr.), *Av. Icon.*, p. 8, pl. 2; Gad., *Cat. B.* IX, p. 284; *niger*, Gm.; *fasciculatus*, Lath.; Tem., *Pl. Col.* 471; *pacificus*, Licht. — Iles Sandwich.

9393. APICALIS, Gould, *P. Z. S.*, 1860, p. 381; Gad., *l. c.*, p. 285; Rothsch., *Avif. Laysan*, pt. III, pl. 73. — Iles Sandwich.

9394. BISHOPI (Rothsch.), *Ibis*, 1893, p. 442; id., *l. c.*, pt. III, pl. 74. — Molokai (Sandwich).

9395. BRACCATUS, Cass., *Pr. Ac. Philad.*, 1855, p. 440; Scl., *Ibis*, 1879, p. 92; Rothsch., *l. c.*, pt. III, pl. 75; *nobilis* (pt.), Gad., *l. c.* — Iles Sandwich.

## 1349. MELIDECTES

*Melidectes*, Sclat. (1873).

9396. TORQUATUS, Scl., *P. Z. S.*, 1873, p. 694, pl. 55; Gould, *B. New Guin.*, pt. IV, pl. 7; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 319. — Nouv.-Guinée.

2475. *Var.* EMILII, Fch. et Mey., *Zeitschr. f. Ges. Orn.* III, p. 22, pl. 4, f. 2; *Melirr. ornatus*, De Vis. — Nouv.-Guinée S.-E.

## 1350. TIMELIOPSIS

*Euthyrhynchus*, Schleg. (1871, nec Dallas, 1851); *Timeliopsis*, Salvad. (1875).

9397. GRISEIGULA (Schl.), *Ned. Tijdschr. Dierk.* IV, p. 59; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 341; *trachycoma*, Salvad. — Nouv.-Guinée.

9398. FLAVIGULA (Schl.), *l. c.*, p. 40; Salvad., *l. c.*, p. 341. — Nouv.-Guinée N.-W.

9399. FULVIGULA (Schl.), *l. c.*, p. 40; Salvad., *l. c.*, p. 342. — Mte Arfak (Nouv.-Guin.)

2476. *Var.* MEYERI (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1896, p. 97; *fulvigula* (pt.), Mey. — Nouv.-Guinée S.-E.

9400. FULVIVENTRIS (Rams.), *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1882, p. 718; Salvad., *l. c.* III, p. 343; Gad., *l. c.*, p. 288. — Nouv.-Guinée S.-E.

Digitized by Google

### 1351. MELIPOTES

*Melipotes*, Sclat. (1873).

9401. GYMNOPS, Scl., *P. Z. S.*, 1873, p. 695, pl. 56; Salvad., *l. c.* II, p. 317. — Nouv.-Guinée N.-W.

9402. FUMIGATUS, Fch. et Mey., *Zeitschr. Ges. Orn.*, 1886, p. 22; *atriceps*, Grant, *Ibis*, 1896, p. 258. — Nouv.-Guinée S.-E.

9403. MACULATA, De Vis, *Ann. Rep. Brit. New Guin.*, 1890-91, *App.* CC, p. 94. — Nouv.-Guinée S.-E.

### 1352. MELIRRHOPHETES

*Melirrhophetes*, Mey. (1874).

9404. LEUCOSTEPHES, Mey., *Sitzber. Ak. Wiss. Wien*, 1874, p. 110; Salvad., *l. c.* II, p. 320; Gould, *B. New Guin.*, pt. IV, pl. 5. — Nouv.-Guinée.

9405. BELFORDI, De Vis, *Rep. Brit. New Guin., App.*, p. 111. — Nouv.-Guinée S.-E.

9406. FUSCUS (De Vis), *Ibis*, 1897, p. 383; Hart., *Novit. Zool.* IV, p. 369. — Nouv.-Guinée S.-E.

9407. OCHROMELAS, Mey., *Sitzb. Ak. Wiss. Wien*, 1874, p. 111; Gould, *B. New Guin.*, pt. IV, pl. 4; Salvad., *l. c.* II, p. 321. — Monts Arfak (Nouv.-Guinée).

9408. BATESI, Sharpe, *Gould's B. New Guin.*, pt. XXII, pl.; *ochromelas* (pt.), Salvad.; *collaris*, De Vis. — Nouv.-Guinée S.-E.

### 1353. PYCNOPYGIUS

*Pycnopygius*, Salvad. (1880).

9409. STICTOCEPHALUS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1876, p. 34; id., *Orn. Pap.* II, p. 340; *bernsteinii*, Fch., *MS.* — Nouv.-Guinée, Salwatti.

## FAM. LIII. — FALCULIDÆ

### 1354. FALCULIA

*Falculia*, Is. Géoff. St-Hil. (1836).

9410. PALLIATA, Is. Géoff. St-Hil., *Mag. de Zool.*, 1836, pl. 49, 50; Sharpe, *Cat. B.* III, p. 145; Miln.-Edw. et Grand., *Hist. Madag. Ois.*, p. 303, pl. 117. — Madagascar.

Digitized by Google

## SUBORD. IV. — PSEUDOSCINES (1)

## FAM. I. — ATRICHIIDÆ

### 1355. ATRICHIA

*Atrichia*, Gould (1844).

9411. CLAMOSA, Gould, *P. Z. S.*, 1844, p. 2; id., *B. Austr.* pl. 34; Sharpe, *Cat. B.* XIII, p. 659. — Australie W. et S.-W.

9412. RUFESCENS, Rams., *P. Z. S.*, 1866, p. 458; Gould, *B. Austr.*, *Suppl.*, pl. 26; Sharpe, *l. c.*, p. 660. — Australie E.

## FAM. II. — ORTHONYXIDÆ

### 1356. ORTHONYX

*Orthonyx*, Temm. (1820).

9413. SPINICAUDA, Tem., *Pl. Col.* 428, 429; Gould, *B. Austr.* IV, pl. 99; Sharpe, *Cat.* VII, p. 329; *temminckii*, Vig. et Horsf.; *maculatus*, Steph. — Australie S.-E.

9414. SPALDINGI, Rams., *P. Z. S.*, 1868, p. 386; Gould, *B. Austr.*, *Suppl.*, pl. 53; Sharpe, *l. c.*, p. 329. — Australie N.-E.

9415. NOVÆ-GUINEÆ, Mey., *Sitz. k. Ak. Wiss. Wien*, LXIX, pp. 74, 85; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 240; Sharpe, *l. c.*, p. 672; *spinicauda* (pt.), Schl. — Nouv.-Guinée N.-W.

## FAM. III. — MENURIDÆ

### 1357. MENURA

*Menura*, Davies (1800); *Parkinsonius*, Bechst. (1811).

9416. SUPERBA, Davies, *Tr. Linn. Soc.*, 1800, p. 207, pl. 22; Gould, *B. Austr.* III, pl. 14; *novæ-hollandiæ*, Lath.; *parkinsoniana*, Shaw et Nod.; *lyra*, Shaw; *mirabilis*, Bechst.; *vulgaris*, Flem.; *paradisea*, Sw. — Nouv.-Galles du S. (Australie.)

2477. *Var.* VICTORIÆ, Gould, *P. Z. S.*, 1862, p. 23. — Victoria, Australie S.

9417. ALBERTI, Gould, *Pr. Linn. Soc.*, 1850, p. 67; id., *B. Austr.*, *Suppl.*, pl. 19. — Australie E.

(1) Voy. : Sharpe, *Cat. Birds Brit. Mus.* VII, p. 329, XIII, pp. 659-663 (1890).



Digitized by Google

Cornell University Library

J. Gutens ad nat. del. et lith.

J. E. Gibbons Chromolith.

1. PENDULINUS DUBUSI. 2. GRECCHARIS ARFAKI.

Digitized by Google

# Publications de M. Alph. DUBOIS

en vente à la librairie de Henri **LAMERTIN**,
**20, rue du Marché-au-Bois, à Bruxelles.**

**Faune illustrée des Vertébrés de la Belgique.** *Oiseaux.* — 4 vol. in-4° avec 427 pl. coloriées à la main et cartes (1876-1892). — *Il ne reste plus qu'un exemplaire, dont les 5 planches manquantes sont remplacées par des aquarelles peintes par l'auteur* . . . . . fr. 400
**Le même ouvrage**, avec cartes mais sans atlas, 2 vol. in-4 . . . . . 7[illegible]
**Les Lépidoptères de la Belgique**, leurs chenilles et leurs chrysalides, décrits et figurés d'après nature sur l'une des plantes nourricières. 3 vol. in-4 avec 451 pl. coloriées à la main (1864-1884) . . . . 275
**Revue des derniers systèmes ornithologiques et nouvelle Classification proposée pour les Oiseaux.** Broch. in-8°. Paris, 1894 . . . . . 1 25
**Histoire populaire des animaux utiles de la Belgique.** Nouvelle édition illustrée, revue et augmentée. — 1 vol. in-12. Bruxelles, 1889 . . . . . 1 75
**Les Animaux nuisibles de la Belgique** (*Vertébrés*). — 1 vol. in-12, illustré. (*Avec la liste de tous les Vertébrés observés en Belgique*). Bruxelles 1895 . . . . . 1
**Tableau synoptique des oiseaux insectivores** qu'il est défendu de prendre en tout temps. — Nouveau tirage en chromo . . . . . 2 50
**Revue critique des oiseaux de la famille des Bucérotidés**, broch. in-8°, avec 2 pl. col., Bruxelles, 1884 . . . . . [illegible]
**Manuel de zoologie**, *conforme aux progrès de la science*. 1 vol. in-12, avec 177 gravures intercalées dans le texte. Bruxelles 1882 . . . . 6
**Aperçu du Règne animal** ou premières notions de zoologie. 1 vol. in-12, avec 166 gravures. (Ouvrage adopté pour l'Enseignement moyen). — Bruxelles 1882 . . . . . [illegible]
**Conspectus systematicus et geographicus avium Europæarum** broch. in-8°. Bruxelles 1871 . . . . . [illegible]
**Archives cosmologiques.** *Revue des sciences naturelles*. 1 vol. in-8° avec 15 pl. — Bruxelles 1867 . . . . . [illegible]
**Traité d'Entomologie horticole, agricole et forestière**. 1 vol. in-8°, avec 4 pl. col. (*Ouvrage couronné*). — Gand, 1865 (*Épuisé*).

---

Alph. Dubois. **Manuel de la Faune de Belgique**. Mammifères, Oiseaux, Insectes. Tome I, in-18 avec figures dans le texte. Bruxelles, 1896 . . . . [illegible]
Tome II (Insectes inférieurs), in-18, 858 pages et 721 figures dans le texte. Bruxelles 1901. Cart., reliés anglaise . . . . . [illegible]

Imprimerie — Lithographie A. Vanderauwera, rue [illegible] Bruxelles.

SYNOPSIS AVIUM

# NOUVEAU
# MANUEL D'ORNITHOLOGIE

PAR

**Alphonse DUBOIS**

Docteur en sciences naturelles,
Conservateur au Musée Royal d'Histoire naturelle de Belgique,
Chevalier de l'Ordre de Léopold,
Membre du Comité international et permanent d'Ornithologie,
de la Commission permanente d'étude des collections du Musée de l'État Indépendant du Congo,
Membre honoraire, correspondant ou effectif de plusieurs Sociétés savantes.

**Fascicule XI**

**COLUMBÆ, HETEROCLITÆ, CRYPTURI,**
**GALLINÆ, ACCIPITRES (1re partie).**

**Pl. XIII**

BRUXELLES
H. LAMERTIN, éditeur
20, RUE DU MARCHÉ-AU-BOIS

1902

# AVIS

Nous donnons dans ce fascicule XI les 24 pages qui manquaient au précédent, pour la raison indiquée.

Nous rappellerons que les tables alphabétiques des genres, des espèces et des variétés paraîtront dans le dernier fascicule.

Le prix du fascicule restera fixé à 6 francs pour tous les abonnés qui se feront inscrire avant la fin de la publication.

## ON SOUSCRIT à

BRUXELLES, chez l'éditeur, M. **H. Lamertin**, 20, rue du Marché-au-Bois.
AMSTERDAM, chez MM. **Feikema, Caarelsen & Cie**.
BERLIN, chez M. **R. Friedländer & Sohn**, Carlstr. 11, N. W.
LONDRES, chez MM. **William & Norgate**, 14, Henrietta street.
MADRID, chez M. **Romo y Fussel**.
MILAN, chez M. **Ulrico Hœpli**, 37, Corso Vittorio Emanuele.
OXFORD, chez M. **James Parker & Cie**, 27, Broad street.
PARIS, chez M. **P. Klincksieck**, 5, rue Corneille.
NEW-YORK, chez M. **G.-E. Stechert**, 9 East 16th street.

# SYNOPSIS AVIUM

## ORD. VI. — COLUMBÆ [1]

### FAM. I. — TRERONIDÆ

### SUBF. I. — TRERONINÆ

#### 1358. SPHENOCERCUS

*Sphenurus*, Sw. (1837, nec *Sphenura*, Licht., 1823); *Sphenocercus*, Gray (1840); *Rhombura*, Glog. (1842); *Sphenœna*, *Sphenotreron*, Bp. (1854).

9418. APICICAUDA (Hodgs. = *apicauda*) *MS*; Gray, *List Gall. B. M.*, p. 4; Bp., *Icon. Pig.*, pl. 4; Rchb., *Tauben*, I, p. 111; *phasianellus*, Licht. — Himalaya, de Kumaon à l'Assam, Birmanie, Ténassérim.

9419. OXYURUS (Reinw.), *MS.*; Tem., *Pl. Col.* 240; Prév. et Knip, *Pig.* II, pl. 30; *semitorquatus*, Sw. — Java, Sumatra, Bornéo.

9420. SPHENURUS (Vig.), *P. Z. S.*, 1831, p. 173; Gould, *Cent. Him. B.*, pl. 57; *cantillans*, Blyth; *turturoides*, *macronotus*, Hodgs.; *minor*, Brooks, *Str. Feath.*, 1875, p. 255. — Himalaya, du Cachemire à l'Assam, Birmanie, Ténassérim.

9421. KORTHALSI (Tem. *ubi?*) in Gray, *List Gall. B. M.*, p. 4 (1844); Bp., *Consp. Av.* II, p. 9; Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 60; *sphenura*, Prév. et Knip, *Pig.* II, pl. 49; *etorques*, Salvad. — Java, Sumatra.

9422. SIEBOLDI (Tem.), *Pl. Col.* 549; Prév. et Knip, *Pig.* II, pl. 10; Tem. et Schl., *Fauna Jap.*, p. 102, pl. 60[a]. — Japon.

9423. SORORIUS, Swinh., *Ibis*, 1866, pp. 311, 406; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 380; *chœroboatis*, Swinh., *l. c.*, pp. 313, 406. — Formose.

9424. FORMOSÆ, Swinh., *Ibis*, 1863, p. 396, 1866, p. 312; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 379; Salvad., *Cat. B. B. M.* XXI, p. 13, pl. 1. — Formose (Montagnes).

9425. PERMAGNUS (Stejn.), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1886, p. 637; Salvad., *Cat.*, p. 14. — Iles Loo-Choo ou Liou-Kiou.

#### 1359. VINAGO

*Vinago*, Cuv. (1817); *Phalacrotreron*, Bp. (1854).

9426. WAALIA (Gm.), *Bruce's Reis.* V, 2, *Zusät.*, p. 31 (1791); — Afrique N.-E. et équa-

(1) Voy.: Salvadori, *Cat. Birds Brit. Mus.* XXI (1893).



Digitized by Google

Fch. et Hartl., *Vög. O.-Afr.*, p. 553; *abyssinica*, Lath.; Tem. et Knip, *Pig.* I, p. 131, pl. 9; Vieill., *Gal. Ois.* I, p. 332, pl. 195; *humeralis*, Wagl. (nec Tem.) — tor., île Socotra.

9427. CRASSIROSTRIS (Fras.), *P. Z. S.*, 1843, p. 35; id., *Zool. Typ.*, pl. 60; Bp., *Icon. Pig.*, pl. 2; ? *sanctæthomæ*, Gm.; *abyssinica*, Hartl. (nec Lath.); *nudirostris* (pt.), Schlég.; *calva* (pt.), Schl. et Pol.; *mocrorhyncha*, Scl. — Iles St-Thomas et Rollas (Afrique W.)

9428. AUSTRALIS (Lin.), *Mant.*, p. 526; *Pl. Enl.* 111; M.-Edw. et Grand., *Hist. Mad. Ois.*, p. 470, pl. 190; *madagascariensis*, Gm.; *abyssinica* (pt.), auct. plur.; *waalia*, Vieill. (fem.) — Madagascar.

9429. CALVA (Tem. et Knip), *Pig.* I, p. 35, pl. 7; Bp., *Icon. Pig.*, pl. 3; *australis* (pt.), auct. plur.; *pytiriopsis*, Bp.; *nudifrons*, Heugl. — Afr. W. de Sierra-Leone au Benguela, à l'E. jusq. Vict. Nyanza.

2478. *Var.* NUDIROSTRIS, Sw., *B.-W. Afr.* II, p. 205; Hartl., *Orn. W.-Afr.*, p. 192; Rchw., *Vög. Deutsch-O.-Afr.*, p. 72; *calva* (pt.), Salvad.; *salvadorii*, Dubois, *P. Z. S.*, 1897, p. 784. — Sénégambie, Afrique N.-E., E. et centr.

9430. WAKEFIELDI (Sharpe), *P. Z. S.*, 1873, p. 715, pl. 58, f. 2. — Afrique E.

2479. *Var.* SCHALOWI, Rchw., *Orn. Centralbl.*, 1880, p. 108; id., *J. f. O.*, 1880, p. 208; *calva*, *wakefieldi* (pt.), auct. plur. — Du Matabeleland au Ovampoland.

9431. DELALANDEI (Bp.), *Consp. Av.* II, p. 6; id., *Icon. Pig.*, pl. 1; Salvad., *Cat.*, p. 24; *australis* et *calva* (pt.), auct. plur. — Afrique E. et S., Nyassaland.

## 1360. CROCOPUS

*Crocopus*, Bp. (1854).

9432. PHŒNICOPTERUS (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 597; Bp., *Consp.* II, p. 11; *militaris*, Tem. (pt.), *Pig.*, pl. 1 (nec pl. 2); *st-thomæ* (pt.), auct. plur. (nec Gm.); *hardwickii*, Gray. — Inde N. et centr.

9433. VIRIDIFRONS (Blyth), *J. A. S. Beng.*, 1845, p. 849; Bp., *Icon. Pig.*, pl. 9; Salvad., *Cat.*, p. 28; *phœnicoptera* (pt.), auct. plur. — Indo-Ch., de la Cochinchine à Cachar.

9434. CHLOROGASTER (Blyth), *J. A. S. Beng.* XII, 1, p. 167; Salvad., *l. c.*, p. 30; *militaris* (pt.), Tem., *Pig.*, pl. 2; *phœnicoptera* et *st-thomæ* (pt.), Vieill.; *jerdoni*, Strickl. — Inde, Ceylan.

## 1361. BUTRERON

*Butreron*, Bonap. (1854).

9435. CAPELLEI (Tem.), *Pl. Col.* 143; Steph., *Gen. Zool.* XIV, 1, p. 275, pl. 32; *gigantea*, Vig.; *magnirostris*, Strickl. — Malac., Sum., Bornéo, Java, îles Mergui.

Digitized by Google

## 1362. TRERON

*Treron*, Vieill. (1816); *Thoria*, Hodgs. (1836); *Romeris* Hodgs. (1841); *Rhamphotreron*, Heine (1890).

9436. NIPALENSIS (Hodgs.), *As. Res.* XIX, p. 164, pl. 9; Jerd., *B. Ind.* III, p. 445; ?*curvirostra*, Gm.; *aromatica*, auct. plur. (nec Gm.); *nasica*, auct. plur. (nec Schleg.) — Bengal E., Him. S.-E., Indo-Chine, Malac., Sum., Born., Palaw.

9437. NASICA, Schleg., *Ned. Tijdschr. Dierk.* I, p. 67; id., *Mus. P.-B. Col.*, p. 53; *curvirostra*, Wall. — Sumatra, Engano, Bangka, ? Bornéo S.

## 1363. OSMOTRERON

? *Dendrophassa*, Glog. (1842); *Osmotreron*, Bp. (1854).

9438. GRISEICAUDA (Gray), *List B. B. Mus., Col.*, p. 10; Salvad., *Cat. B.* XXI, p. 40, pl. 2, f. 1; *aromatica*, Tem. et Knip, *Pig.* I, p. 29, pl. 5, et auct. plur. (nec Lin.); *pulverulenta*, Wall., *Ibis*, 1863, p. 319; *javanica*, Schl. — Java.

2480. *Var.* WALLACEI, Salvad., *Cat., l. c.*, p. 42, pl. 2, f. 2; *griseicauda*, Wall., *P. Z. S.*, 1862, p. 235 et auct. plur.; *sulaensis*, Schl. — Célèbes, Iles Soula.

2481. *Var.* PALLIDIOR, Hart., *Novit. Zool.* III, p. 178. — Iles Djampea et Kalas.

2482. *Var.* SANGHIRENSIS (Brügg.), *Abh. nat. Ver. Brem.*, 1876, p. 79; *griseicauda* (pt.), Schleg. — Iles Sanghir.

9439. VORDERMANI (Finch), *Notes Leyd. Mus.* XXII, p. 162; *griseicauda*, Vorderm. — Iles Kangean.

9440. PHAYREI, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1862, p. 344; Salvad., *l. c.*, p. 43; *malabarica* (pt.), Blyth (1845); Bp., *Icon. Pig.*, pl. 11, f. 2 (fem.); *nepalensis*, Bp. (nec Hodgs.), *l. c.*, pl. 8 (mas.) — Bengal E., Indo-Chine W.

9441. MALABARICA (Jerd.), *Ill. Orn.*, pl. 21; Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 52; Bp., *Icon. Pig.*, pl. 12; *affinis*, Jerd. (fem.) — Inde.

9442. AROMATICA (Gm.); Salvad., *Cat., l. c.*, p. 47, pl. 3; ?*amboinensis*, Müll. (nec Lin.) — Bourou, ? Amboine, ? Céram.

2483. *Var.* AXILLARIS (Bp.), *Compt. Rend.* XXXIX, p. 875; Salvad., *l. c.*, p. 48, pl. 4; *aromatica* (pt.), auct. plur. — Philippines.

2484. *Var.* EVERETTI, Rothsch., *Novit. Zool.* I, p. 41; *axillaris* (pt.), Salvad. — Iles Soulou.

9443. CHLOROPTERA (Blyth), *J. A. S. Beng.* XIV, 2, p. 852; Legge, *B. Ceyl.*, p. 729; Salvad., *l. c.*, p. 49. — Iles Nicobar et Andaman.

9444. POMPADORA (Gm.); Bp., *Icon. Pig.*, pl. 11, f. 1 (fem.); Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 52; *aromatica* et *malabarica* (pt.), auct. plur.; *flavogularis*, Blyth. — Ceylan.

Digitized by Google

9445. FULVICOLLIS (Wagl.), *Syst. Av., Col.*, sp. 8; Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 57; *aromatica, var.*, Tem. et Knip, *Pig.* I, p. 30, pl. 6; *ferruginea*, Wagl. (nec Forst.); *cinnamomea*, Tem. (nec Sw.); *tenuirostre*, Eyt. — Ténass. S., Cochinch., Malacca, Sumatra, Nias, Bangka, Billiton, Bornéo.

2485. *Var.* BARAMENSIS (Mey.), *J. f. O.*, 1891, p. 73; *fulvicollis* (pt.), Sharpe. — Bornéo N.

9446. TEYSMANNI (Schl.), *Notes Leyd. Mus.* I, p. 105. — Ile Sumba.

9447. PSITTACEA (Tem. et Knip), *Pig.* I, p. 28, pl. 4; Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 59; Salvad., *l. c.*, p. 55. — Timor, Semao.

9448. FLORIS (Wall.), *P. Z. S.*, 1863, pp. 486, 496; Schl., *l. c.*, p. 59. — Flores, Solor, Sumbawa.

9449. BICINCTA (Jerd.), *Madr. Journ.*, 1840, p. 13; Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1843, p. 851; Schl., *l. c.*, p. 51; *vernans*, Tem. et Knip (nec Lin.), *Pig.*, pl. 10 et 11; *unicolor*, Jerd. (fem.); *multicolor*, Rchb.; *domvilii*, Swinh., *Ibis*, 1870, p. 334. — Indo E., Ceylan, Indo-Chine, Malacca, Haïnan.

9450. VERNANS (Lin.); *Pl. Enl.* 158; Bp., *Icon. Pig.*, pl. 13; Schl., *l. c.*, p. 49; *viridis*, Müll. (nec Lin.); *purpurea*, Gm.; *griseicapilla*, Schl.; *chlorops*, Salvad. — Indo-Chine, Malacca, archip. Indo-malais, Célèbes.

9451. OLAX (Tem.), *Pl. Col.* 241; Schl., *l. c.*, p. 56. — Malacca, Sumatra, Bornéo.

## 1364. PHABOTRERON

*Phapitreron*, Bp. (1854); *Phapiscus*, Sundev. (1872); *Phabotreron*, Wald. (1875); *Phabisca*, Salv. (1879); ?*Dendrophaps*, Blyth (ubi), Bp., *C. A.* II, p. 28.

9452. AMETHYSTINA, Bp., *Consp. Av.* II, p. 28; Schl., *l. c.*, p. 80; Wald., *Tr. Z. S.* IX, p. 214, pl. 34, f. 2. — Luçon, Samar, Leyte, Dinagat, Panaon, Mindanao (Philipp.)

9453. CINEREICEPS, Bourns et Worc., *Occ. Pap. Minnes. Acad.* I, p. 8. — Ile Tawi-Tawi (Soul.)

9454. BRUNNEICEPS, Bourns et Worc., *l. c.*, p. 9. — Basilan (Philippines).

9455. FRONTALIS, Bourns et Worc., *l. c.*, p. 10. — Cébu (Philippines).

9456. LEUCOTIS (Tem.), *Pl. Col.* 189; Schl., *l. c.*, p. 79; Salvad., *Cat.*, *l. c.*, p. 67. — Luçon, Mindoro.

2486. *Var.* OCCIPITALIS, Salvad., *Cat. B.* XXI, p. 68; *brevirostris*, Tweed. (1879, nec 1877). — Basilan.

2487. *Var.* NIGRORUM, Sharpe, *Tr. Linn. Soc., Zool.* I, pp. 346, 353; Salvad., *l. c.*, p. 68. — Négros, Cébu, Guimaras, Panay.

2488. *Var.* BREVIROSTRIS, Tweed., *P. Z. S.*, 1877, p. 549, 852; id. *Voy. Chall., B.*, p. 22, pl. 6; *leucotis* (pt.), Gray. — Mindanao, Dinagat, Bohol, Leyte, Samar, Soulou.

9457. MACULIPECTUS, Bourns et Worc., *Occ. Pap. Minnes. Acad.* I, p. 10. — Négros (Montagnes).

Digitized by Google

## SUBF. II. — PTILOPODINÆ

### 1363. PTILOPUS (1)

*Ptilinopus*, Sw. (1825); *Ptilopus*, Strickl. (1841); *Leucotreron, Ramphiculus, Omeotreron, Jambotreron, Thouarsitreron, Kurutreron, Ptilotreron, Lamprotreron, Cyanotreron, Sylphitreron, Iotreron*, Bonap. (1854); *Kurukuru*, Des M. et Prév. (1853); *Trerolæma*, Bonap. (1853); *Silphidæna*, Gray (1855); *Laryngogramma*, Rchb. (1862); *Œdirhinus*, Cab. et Rchw. (1876); *Kranocera*, Rams. (1876); *Xenotreron*, Tweed. (1877); *Eutreron, Ptilopodiscus, Chlorotreron, Thoracotreron, Spilotreron*, Salvad. (1882); *Terenotreron, Curotreron, Phassa, Poecilotreron*, Heine (1890); *Mezotreron*, Sharpe (1899).

*α. Leucotreron.*

9458. OCCIPITALIS, Gray, *List B. B. Mus. Gal.*, p. 1 (1841); id., *Gen. B.* II, pl. 118; Bp., *Icon. Pig.*, pl. 14; *batilda*, Bp. (juv.); *porphyrea*, Bp., *Icon. Pig.*, pl. 15 (juv.); *incognita*, Tweed. — Luçon, Cébu, Leyte, Mindanao, Basilan (Philippines).

9459. FISCHERI, Brügg., *Abh. naturw. Ver. Bremen*, V, p. 82, pl. 4; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 602. — Célèbes N.

2489. *Var.* MERIDIONALIS, Mey. et Wg., *Orn. Monatsb.*, 1893, p. 12; id., *B. Cel.*, p. 604; *fischeri*, Mey. (1879-81 nec Brügg.); Gould, *B. New Guin.*, pt. XI, pl. 4. — Célèbes S.

9466. MARCHEI, Oust., *Le Natural.*, 1880, p. 324; id., *Nouv. Arch. du Mus.* VIII, 1884, p. 305, pl. 13. — Luçon (Philippines).

9461. ROSEICOLLIS (Wagl.), *Syst. Av.*, *Col.*, n° 27; Gray, *Gen. B.* II, p. 467; *porphyrea*, Reinw. et auct. plur. (nec *porphyracea*, Forst.); Prév. et Knip, *Pig.* II, pl. 4; Steph., *Gen. Zool.* XIV, p. 277, pl. 33; *erythrocephalus*, Sw. — Sumatra, Java.

9462. ALBOCINCTUS, Wall., *P. Z. S.*, 1863, p. 496, pl. 39; *florensis*, Schl., *N. T. D.* IV, p. 20; id., *Mus. P.-B.*, *Col.*, p. 34. — Flores.

2490. *Var.* BALIENSIS, Hart., *Nov. Zool.* III, p. 553. — Bali.

9463. CINCTUS (Tem. et Knip), *Pig.* I, p. 58, pl. 25; Schl., *Mus. P.-B.*, *Col.*, p. 34. — Timor, Wetter.

9464. ALLIGATOR, Coll., *P. Z. S.*, 1898, p. 334, pl. 29. — Australie N.

9465. EVERETTI, Rothsch., *Ibis*, 1898, p. 295. — Ile Alor.

9466. LETTIENSIS, Schl., *N. T. D.* IV, p. 20; id., *Mus. P.-B.*, *Col.*, p. 35; Ell., *P. Z. S.*, 1878, p. 572. — Lettie, îles Ténimber.

(1) Je ne puis admettre les nombreux genres admis en dernier lieu par M. Sharpe, et qui n'offrent pas de caractères bien sérieux. Afin que chacun puisse reconnaître les espèces qui en font partie, j'indiquerai en tête de chaque groupe la dénomination sous-générique en italique.

Digitized by Google

9467. GULARIS (Quoy et Gaim.), *Voy. Astrol., Zool.* I, p. 247, pl. 29; Prév. et Knip, *Pig.*, pl. 11; Schleg., *l. c.*, p. 37; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 605. — Célèbes N.

2491. *Var.* SUBGULARIS, Mey. et Wg., *Abh. Mus. Dresd.*, 1896, n° 2, pp. 4, 6, 19; id., *B. Cel.*, p. 606. — Iles Peling et Banggai (Célèbes E.)

9468. MANGOLIENSIS, Rothsch., *Ibis*, 1898, p. 295. — Soula Mangoli.

9469. LECLANCHERI (Bp.), *Compt. Rend.* XLI, p. 247; id., *Icon. Pig.*, pl. 16; *gironieri*, Verr. et Des M., *Ibis*, 1862, p. 342, pl. 12; *hugoniana*, Schl. (juv.) — Luçon, Guimaras, Négros, Cébu, Palawan (Philippines).

9470. JAMBU (Gm.); Tem. et Knip, *Pig.*, p. 65, pl. 27, 28; Schl., *l. c.*, p. 36; *jambos*, Lath. — Malac., Sum., Bangka, Billiton, Bornéo.

β. *Mezotreron.*

9471. DOHERTYI, Rothsch., *Ibis*, 1896, p. 566; Hart., *Nov. Zool.* III, p. 589, pl. 12. — Ile Sumba.

γ. *Ptilopus.*

9472. GREYI, Gray, *List B. B. Mus., Col.*, p. 4; Bp., *Icon. Pig.*, pl. 20; Schl., *l. c.*, p. 7; *purpuratus*, Bp. (nec Gm.); *apicalis*, Rams.; ?*fasciatus*, Schal. (juv.?) — Nouv.-Calédonie, Iles Loyalty, Nouv.-Hébrides.

9473. PELEWENSIS, Hartl. et Fch., *P. Z. S.*, 1868, pp. 7, 118; Gräffe, *Journ. Mus. Godeffr.*, Heft I, pl. 7, f. 5; Salvad., *Cat. B.*, p. 86. — Iles Pelew.

9474. PEROUSEI, Peale, *U. S. Expl. Exp.*, p. 195, pl. 54 (1848); Hombr. et Jacq., *Voy. Pôle Sud*, pl. 29, f. 2; Schleg., *l. c.*, p. 10; *mariæ*, Jacq. et Puch.; *samoensis*, Des M. et Prév.; *cæsarinus*, Hartl. — Iles Samoa, Tonga, Fidji.

9475. DUPETIT-THOUARSI (Neboux), *Rev. Zool.*, 1840, p. 289; Hombr. et Jacq., *Voy. Pôle Sud*, pl. 29, f. 1; Schl., *l. c.*, p. 13; *purpuroleucocephalus* et *leucocephalus*, Gray; *emiliæ*, Less. — Iles Marquises.

9476. XANTHOGASTER (Wagl.), *Syst. Av., Col.*, p. 29; Salvad., *Orn. Pap.* III, pp. 4, 554; *purpurata*, Tem. (nec Gm.); *diademata*, Tem., *Pl. Col.* 254; *flavigaster*, Sw.; *aurantiiventris*, Rosenb.; *flavovirescens*, Mey. — Iles Banda, Khoor, Key, Ténimber, Timorlaut, Lettie.

9477. RICHARDSI, Rams., *Pr. Linn. S. N. S. W.*, 1881, p. 722; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 554; Gould, *B. New-Guin.*, pt. XVIII, pl. 3; *rhodostictus*, Tristr., *Ibis*, 1882, pp. 139, 144, pl. 5. — Ugi (îles Salomon).

9478. PONAPENSIS, Finsch, *P. Z. S.*, 1877, p. 779; Salvad., *Cat.*, p. 93; *fasciatus* (pt.), auct. plur. (nec Peale). — Ile Ruck (Carolines E.), île Ponapé.

9479. HERNSHEIMI, Finsch, *J. f. O.*, 1880, p. 303; Salvad., *Cat.*, p. 94. — Ile Kushai (Carol. E.)

9480. SWAINSONI, Gould, *P. Z. S.*, 1842, p. 18; id., *B. Austr.* — Austr., du Cap York à la

Digitized by Google

V, pl. 55; *purpurata*, *var. regina*, Sw.; *purpurata*, Jard. et Sel. (nec auct.), *Ill. Orn.* II, pl. 70; *regina*, Ell., *P. Z. S.*, 1878, p. 531. — Nouv.-Galles du S., îles du détr. de Torres, N.-Guin. S.-E.

9481. EWINGI, Gould, *P. Z. S.*, 1842, p. 19; id., *B. Austr.* V, pl. 36; *roseicapillus* (pt.), Des M.; *swainsoni*, Els. (nec Gd.) — Australie N. et N.-W.

2492. *Var.* FLAVICOLLIS, Bonap., *Consp. Av.* II, p. 20; id., *Icon. Pig.*, pl. 20[a]; Salvad., *Cat.*, p. 97; *purpurata*, auct. plur. (nec Gm.); *flavipectus*, Rchb.; *ewingi* (pt.), auct. plur. (nec Gd.) — Timor, Flores.

9482. FASCIATUS, Peale, *U. S. Expl. Exp.*, 1848, p. 193, pl. 53; Schleg., *Mus. P.-B.*, *Col.*, p. 6; *clementinæ*, Des M. et Prév.; *apicalis*, Bp.; *pictiventris*, Ell., *P. Z. S.*, 1878, p. 550, pl. 33. — Iles Samoa.

9483. PORPHYRACEUS (Tem.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, 1821, p. 130; Bp., *Consp. Av.* II, p. 21; Schl., *Mus. P.-B.*, *Col.*, p. 8; *purpurata* (pt.), auct. plur.; *kurucuru*, *var.*, Tem. et Knip, *Pig.*, pl. 35; *tabuensis*, Lath.; *viridissima*, Tem.; *forsteri*, Desm.; *clementinæ*, Jacq. et Puch.; *fasciatus* (pt.), auct. plur. (nec Peale); *bonapartei*, Gray; *porphyracrus*, Fch. et Hartl.; *whitmeei*, Rams. (1). — Iles Tonga, Fortuna, Savage, Fidji.

9484. RAROTONGENSIS, Hartl. et Fch., *P. Z. S.*, 1871, p. 30; Gräffe, *Journ. Mus. Godeffr.*, Heft. I, p. 49, pl. 2, f. 1; *neglectus*, Schl., *Mus. P.-B.*, *Col.*, p. 7. — Ile Rarotonga (îles Cook).

9485. CORALENSIS, Peale, *U. S. Expl. Exp.*, 1848, p. 190, pl. 51; Cass., *U. S. Expl. Exp.*, 1858, p. 278, pl. 32; Salvad., *Cat.*, p. 104; ?*chalcurus*, Gray; Fch. et Hartl., *Orn. Centralpol.*, p. 131. — Hervey (îles Cook).

9486. SMITHSONIANUS, Salvad., *Cat. B. B. Mus.* XXI, p. 105; *coralensis* (pt.), Cass. — Iles Paumotu.

9487. PURPURATUS (Gm.); Schl., *l. c.*, p. 15; *taitensis*, Less.; *oopa*, Wagl.; *porphyracra* (pt.), Forst.; *furcatus*, Peale, *U. S. Expl. Exp.*, *B.*, p. 191, pl. 52; *nebouxii*, Des M., et Prév., *Voy. Vénus*, *Zool.*, p. 253, pl. 7. — Tahiti (îles Société).

9488. CHRYSOGASTER, Gray, *P. Z. S.*, 1853, p. 48, pl. 54; Bp., *Icon. Pig.*, pl. 29, f. 2; *taitensis*, Rchb. (nec Less.); *coralensis* (pt.), Schleg.; ? *purpurata* (jeune), Tem., *H. N. Pig.* I, p. 284; ?*oopa*, juv., Bp. — Huachine et Raiatea (îles Société).

9489. ROSEICAPILLUS (Less.), *Traité d'Orn.*, p. 472; Bp., *Icon. Pig.*, pl. 23; Schl., *l. c.*, p. 8; *purpurata*, Kittl. (nec Gm.); *purpureocinctus*, Gr., *P. Z. S.*, 1853, p. 48, pl. 55. — Iles Mariannes.

(1) *Quid? Columba porphyracea*, Wagl., *Isis*, 1829, p. 742; Colombe de Tafti, Neboux, *Rev. Zool.*, 1840, p. 289; *porphyracra* (pt.), Forst., *Deser. an.*, p. 167 (ex Ulietea).

Digitized by Google

9490. MERCIERI (Des M. et Prév.), *Voy. Vénus, Orn.*, p. 266; Bp., *Icon. Pig.*, pl. 22, f. 2. — Nouka Hiva (îles Marquises).

2493. *Var.* TRISTRAMI, Salvad., *Bull. Mus. Zool. Tor.* VII, n. 135; id., *Cat.*, p. 110; *mercieri* (pt.), auct. plur. (nec Des M.) — Ouavoa (îles Marquises).

9491. HUTTONI, Finsch, *P. Z. S.*, 1874, p. 92; Salvad., *Cat.*, p. 111. — Iles Oparo.

δ. *Lamprotreron.*

9492. SUPERBUS (Tem. et Knip), *Pig.*, p. 75, pl. 33; Gould, *B. Austr.* V, pl. 57; *cyanovirens*, Less.; *leucogaster*, Sw.; *porphyrostictus*, Gould (fem.); *swainsoni* (pt.), Sharpe (1884). — Moluques, îles Papous, Australie N.

2494. *Var.* TEMMINCKI (Des M. et Prév.), *Voy. Vénus, Zool.*, pp. 236, 268 (fem.); Blas., *Zeitschr. f. ges. Orn.*, 1885, p. 302, pl. 14; *superba* (pt.), auct. plur.; *formosus*, Gray, *P. Z. S.*, 1860, p. 360; *celebensis*, Wall. — Célèbes, ? Soulou.

ε. *Eutreron.*

9493. PULCHELLUS (Tem.), *Pl. Col.* 564; Knip et Prév., *Pig.* II, pl. 14; Schl., *l. c.*, p. 2; Salvad., *l. c.*, p. 117. — Nouv.-Guinée, Waigiou, Batanta, Salawatti, Mysol.

ζ. *Ptilopodiscus.*

9494. CORONULATUS, Gray, *P. Z. S.*, 1858, pp. 158, 195, pl. 138; Schl., *l. c.*, p. 9 (pt.); Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 15; id., *Cat.*, p. 119. — Iles Arou, Nouv.-Guinée S.-E.

2495. *Var.* HUONENSIS, Mey., *J. f. O.*, 1892, p. 265. — Golfe Huon (Nouv.-Guinée E.)

2496. *Var.* TRIGEMINA (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, pp. 787, 833; *coronulatus* (pt.), auct. plur.; *marginalis*, Brügg.; ? *pulchelloides* et *flavigaster*, Bernst. — Nouv.-Guinée N.-W., Salawatti.

2497. *Var.* GEMINA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, pp. 786, 971; id., *Orn. Pap.* III, p. 19; *coronulatus* (pt.), Schl.; *senex*, Brügg. — Nouv.-Guinée N., îles Jobi et Krudu.

2498. *Var.* QUADRIGEMINA, Mey., *Ibis*, 1890, p. 421. — Nouv.-Guinée N.-E.

η. *Cyanotreron.*

9495. MONACHUS (Reinw.), in Tem., *Pl. Col.* 253; Schl., *l. c.*, p. 12; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 20; id., *Cat.*, p. 121. — Halmahera, Batjan, Ternate, Kaisa.

Digitized by Google

θ. *Chlorotreron.*

9496. HUMERALIS, Wall., *P. Z. S.*, 1862, p. 166, pl. 21; Schl., *l. c.*, p. 16; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 25. — Nouv.-Guin. N.-W. et centr., Salaw., Waig.

2499. *Var.* JOBIENSIS, Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 16; Becc., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 715. — Nouv.-Guinée N., île Jobi.

9497. BIROI, Madar., *Termes. Füzetek*, XX, p. 47, pl. 1 (1897). — Nouv.-Guinée.

9498. IOZONUS, Gray, *P. Z. S.*, 1858, pp. 186, 195; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 25; id., *Cat.*, p. 124; *jozonus*, Schl., *l. c.*, p. 17. — Nouv.-Guinée S.-E., îles Arou.

ι. *OEdirhinus.*

9499. INSOLITUS, Schleg., *Ned. Tijdschr. D.* I, p. 61, pl. 3, f. 3; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 26; Gould, *B. New-Guin.*, pt. VIII, pl. 2; *globifer*, Cab. et Rchw. — Nouv.-Irlande, Nouv.-Bret., île Duc York.

κ. *Sylphitreron.*

9500. TANNENSIS (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 600; Salvad., *Cat.*, p. 127; *xanthura*, Forst., *Icon. ined.*, pl. 138; *aromatica* et *vernans* (pt.), Gray; *curvirostra* (pt.), Rchb.; *corriei*, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.* I, p. 133. — Nouv.-Hébrides.

9501. AURANTIFRONS, Gray, *P. Z. S.*, 1858, pp. 185, 195, pl. 137; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 28; *aurantiicollis*, Gr.; Schl., *l. c.*, p. 18; *novæ-guineæ*, Mey. — Iles Arou, Nouv.-Guinée, Jobi, Batanta, Salawatti, Mysol.

9502. WALLACEI, Gray, *P. Z. S.*, 1858, pp. 185, 195, pl. 136; Salvad., *l. c.*, p. 30; id., *Cat.*, p. 129. — Arou, Key, Timorlaut, Babbar.

9503. ORNATUS, Schl. (ex Rosenb.), *Ned. Tijdschr. Dierk.* IV, p. 52; id., *Mus. P.-B., Col.*, p. 19; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 32. — Nouv.-Guinée N.-W.

9504. GESTROI, D'Alb. et Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 854; Ell., *P. Z. S.*, 1878, p. 557, pl. 34. — Nouv.-Guinée S.-E.

9505. PERLATUS (Tem.), *Pl. Col.* 559; Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 17 (pt.); Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 35; id., *Cat.*, p. 132. — Nouv.-Guinée W., Jobi, Salawatti.

2500. *Var.* ZONURA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1876, p. 197; id., *Orn. Pap.* III, p. 36; *perlatus* (pt.), auct. plur. — Nouv.-Guinée S., S.-E. et centr., îles Arou.

9506. PLUMBEICOLLIS, Mey., *Ibis*, 1890, p. 422; Salvad., *Cat.*, p. 133. — Nouv.-Guinée E.

λ. *Thoracotreron.*

9507. STROPHIUM, Jard. (ex Gould), *Contr. Orn.*, 1850, p. 105; Schl., *l. c.*, p. 27; Salvad., *Cat.*, p. 135; *rivolii* (pt.), auct. plur. — Louisiades, Nouv.-Guinée S.-E.



Digitized by Google

9508. RIVOLII (Prév. et Knip), *Pig.* II, pl. 57; Des M., *Icon. Orn.*, pl. 4; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 40. — Archipel Bismarck.

9509. MIQUELI, Schleg. (ex Rosenb.), *Ned. Tijdschr. D.* IV, p. 22; id., *Mus. P.-B., Col.*, p. 26; Rowl., *Orn. Misc.* III, p. 60, pl. 88. — Iles Jobi et Miosnom.

9510. PRASINORRHOUS, Gray, *P. Z. S.*, 1858, pp. 185, 195; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 41; id., *Cat.*, p. 137; *rivolii* (pt.), auct. plur. — Iles Papous W., Moluques.

9511. BELLUS, Sclat., *P. Z. S.*, 1875, pp. 696, 698, pl. 57; Salvad., *Cat.*, p. 138; *patruelis*, Mey., *Zeitschr. Ges. Orn.*, 1886, p. 27, pl. 6. — Nouv.-Guinée.

2501. *Var.* ORIENTALIS, De Vis, *Rep. Orn. Coll.*, 1894, p. 6. — Nouv.-Guinée S.-E.

9512. SPECIOSUS, Schleg. (ex Rosenb.), *Ned. Tijdschr. D.* IV, p. 23; id., *Mus. P.-B., Col.*, p. 27; Rowl., *Orn. Misc.* III, p. 171, pl. 104. — Iles de la baie de Geelvink (Nouv.-Guinée N.-W.)

9513. SALOMONENSIS, Gray, *Ann. and Mag. N. H.*, 1870, p. 328; Gould, *B. New-Guin.*, pt. XIX, pl. 8; *ceraseipectus*, Tristr., *Ibis*, 1879, p. 442; *johannis*, Rams. (nec Scl.) — Iles Salomon.

2502. *Var.* JOHANNIS, Sclat., *P. Z. S.*, 1877, p. 556; id., *Voy. Challenger, B.*, p. 32, pl. 10. — Iles de l'Amirauté.

μ. *Spilotreron.*

9514. MELANOCEPHALUS (Forst.), *Zool. Ind.*, p. 16, pl. 7; Salvad., *Cat.*, p. 142; Mey. et Wg., *B. Cel.*, pl. 38, f. 1; *indica*, Müll. (nec Lin.); *melanauchen*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 671. — Java, Flores, Sumbawa, Sumba, Lombock.

2503. *Var.* BANGUEYENSIS, Mey., *J. f. O.*, 1891, p. 70; Salvad., *Cat.*, p. 143; *melanocephalus* (pt.), auct. plur.; *purpureinucha*, Mey., *J. f. O.*, 1891, p. 71. — Iles Philippines et Soulou.

2504. *Var.* MELANOSPILA (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 671; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 608; *melanocephalus* (pt.), auct. plur.; *celebensis*, Brügg., *Abh. Naturw. Ver. Brem.*, 1876, p. 80. — Célèbes, Togian.

2505. *Var.* CHRYSORRHOA (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 671; Mey. et Wg., *B. Cel.*, pl. 38, f. 2; *melanocephalus* (pt.), auct. plur.; *sulaensis*, Brügg., *l. c.*, p. 81. — Iles Soula et Céram.

2506. *Var.* PELINGENSIS, Hart., *Novit. Zool.* V, p. 135 (1898). — Iles Peling, Banggai.

2507. *Var.* XANTHORRHOA (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 671; Mey. et Wg., *B. Cel.*, pl. 38, f. 3; *melanocephalus* (pt.). auct. plur.; *nuchalis*, Brügg., *l. c.*, p. 80. — Iles Sanghir.

Digitized by Google

v. *Ionotreron.*

9515. NANUS (Tem.), *Pl. Col.* 564 (*naina* pro *nana*); Schleg., *l. c.*, p. 21; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 53. — Nouv.-Guinée centr. et S., Salawat., Mysol.

9516. IONOGASTER (Tem. ex Reinw.), *Pl. Col.* 252 (*hyogastra*); Hart., *Nov. Zool.* VI, pl. 4, f. 8; *ionogaster*, Rchb.; Salvad., *Cat.*, p. 148. — Halmahera, Batjan.

9517. GRANULIFRONS, Hart., *Ibis*, 1898, p. 296; id., *Nov. Zool.* VI, pl. 4, f. 9. — Ile Obi.

9518. PECTORALIS (Wagl.), *Isis*, 1829, p. 740; Schleg., *l. c.*, p. 23; *cyanovirens*, Less., *Voy. Coq.* I, 2, p. 713, pl. 42, f. 2 (nec f. 1); *virens*, Less.; *viridis, juv.*, Müll.; *roseipectus*, Gray. — Nouv.-Guin. W., Waigiou, Gagie, Guebeh, Mysol, Koffiao.

9519. SALVADORII, Rothsch., *Bull. Brit. Orn. Cl.*, 1892, p. x; Salvad., *Cat.*, p. 150. — Ile Jobi.

9520. VIRIDIS (Lin.); Tem. et Knip, *Pig.* I, pl. 17; Eyd. et Gerv., *Mag. de Zool.*, 1836, pl. 76; Schl., *l. c.*, p. 22; *asiatica*, Müll. — Amboine, Céram, Bourou.

9521. MUSSCHENBROEKI, Schleg. (ex Rosenb.), *Ned. Tijdschr. Dierk.* IV, p. 23; Rowl., *Orn. Misc.* III, p. 113, pl. 95; *viridis geelvinkianus*, Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 23. — Iles de la baie de Geelvink (Nouv.-Guinée N.-W.)

2508. *Var.* LEWISII, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1881, p. 724; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 556; *viridis* (pt.), auct. plur.; *geelvinkianus*, Lay. (nec Schl.); *eugeniæ* (fem.), Rams. — Iles Salomon.

2509. *Var.* VICINA, Hart., *Nov. Zool.* II, p. 62 (*vicinus*). — Ile Fergusson.

9522. EUGENIÆ (Gould), *P. Z. S.*, 1856, p. 137; Salvad., *Cat. B.*, p. 153, pl. 5. — Ugi (îles Salomon).

## 1366. CHRYSOENAS

*Chrysæna*, *Chrysotreron* et *Chrysænas*, Bp. (1854).

9523. LUTEOVIRENS (Hombr. et Jacq.), *Ann. Sc. Nat.* XVI, 1841, p. 315; id., *Voy. Pôle Sud*, pl. 12, ff. 1, 2; Schl., *l. c.*, p. 41; *feliciæ*, Hombr. et Jacq., *l. c.*, p. 316 (juv.); *flava*, Gr.; *gouldiæ*, Rchb. (nec Gr.) — Ovalau, Viti-Levu (Fidji).

9524. VICTOR, Gould, *P. Z. S.*, 1871, p. 642; Rowl., *Orn. Misc.* I, p. 23, pl. 39; Feh., *Voy. Challenger, B.*, pl. 13; Salvad., *Cat.*, p. 157. — Iles Fidji.

9525. VIRIDIS, Layard, *P. Z. S.*, 1875, p. 131; Feh., *Voy. Challenger, B.*, p. 5, pl. 16; *luteovirens* (pt.), Lay. — Kandavu (Fidji).

## 1367. DREPANOPTILA

*Drepanoptila*, Bp. (1855); *Drepanoptera*, Bp. (1856; err.?); *Calyptomenænas*, Verr. et Des M. (1862).

9526. HOLOSERICEA (Tem. et Knip), *Pig.* I, p. 73, pl. 32; — Nouv.-Calédonie et

Digitized by Google

Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 41; Salvad., *Cat.*, p. 158; *oceanica*, Jouan. — ile des Pins.

## 1368. ALECTROENAS

*Alectrœnas*, Gray (1840); *Alectorœnas*, Agass. (1846); *Columbigallus*, *Furningus*, Des M. (1854); *Chlamydœna*, *Funingus*, *Erythrœna*, *Erythrotreron*, *Erythrolæma*, Bp. (1854).

9527. PULCHERRIMA (Scop.), *Del. Flor. et Faun. Ins.* II, p. 94; Schl., *l. c.*, p. 44; Salvad., *Cat.*, p. 161; *rubricapilla*, Gm.; Tem. et Knip, *Pig.* I, pl. 20. — Iles Seychelles.

9528. SGANZINI (Des M.), *Enc. H. N. Ois.* VI, p. 32; Schl. et Pol., *Rech. Faun. Madag.*, p. 115, pl. 37; Salvad., *Cat.*, p. 162. — Iles Comores.

2510. *Var.* MINOR, Berl., *Abh. Senckenb. naturf. Ges.* XXI, p. 495. — Ile Aldabra.

9529. NITIDISSIMA (Scop.); Salvad., *Cat.*, p. 165; *franciæ*, Gm.; Tem. et Knip, *Pig.* I, p. 50, pl. 19; Levaill., *Ois. d'Afr.*, pl. 267; *batavica*, Bon.; *jubata*, Wagl. — Ile Maurice (éteint).

9530. MADAGASCARIENSIS (Lin.); *Pl. Enl.* 11; Tem. et Knip, *l. c.*, pl. 17; Levaill., *Ois. d'Afr.*, pl. 266; Schl., *l. c.*, p. 43; *phœnicura*, Wagl. — Madagascar, ile Nossibé.

## 1369. MEGALOPREPIA

*Megaloprepia*, Rchb. (1852).

9531. FORMOSA, Gray, *P. Z. S.*, 1860, p. 360; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 64; *bernsteinii*, Schl., *Ned. Tijdschr. Dierk.* I, p. 39, pl. 3, f. 1 (fem.); *ochrogaster*, Bernst. — Halmahera, Ternate, Batjan, Obi.

9532. MAGNIFICA (Tem.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 125; id., *Pl. Col.* 163; Gould, *B. Austr.* V, pl. 58. — Australie E.

9533. ASSIMILIS (Gould), *P. Z. S.*, 1850, p. 201; id., *B. Austr.*, *Suppl.*, pl. 67; Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 38; *puella* (pt.), Bp. — Du Cap York à la baie de Rockingham.

2511. *Var.* POLIURA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1878, p. 426; id., *Orn. Pap.* III, pp. 68, 557; *puella* et *assimilis* (pt.), auct. plur. — Nouv.-Guinée centr. (vallée du Fly).

2512. *Var.* SEPTENTRIONALIS, Mey., *Abh. K. Zool. Mus. Dresd.*, 1892-93, n° 5, p. 25; *poliura* (pt.), Salvad. — Nouv.-Guinée N., E. et ile de Jobi.

9534 PUELLA (Less.), *Bull. Univ. Sc. Nat.*, 1827, p. 400; Prév. et Knip, *Pig.* II, pl. 1; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 66; Schl., *l. c.*, p. 38. — Nouv.-Guinée W., Salawati, Batanta, Waigiou, Ghemien.

Digitized by Google

## SUBF. III. — CARPOPHAGINÆ

### 1370. SERRESIUS

*Serresius*, Bonap. (1855).

9535. GALEATUS, Bp., *Compt. Rend.* XLI, p. 1110 (1855); id., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1855, p. 392, 1856, pl. 18; id., *Icon. Pig.*, pl. 55. — Iles Marquises.

### 1371. CARPOPHAGA

*Carpophaga*, Selby (1835); *Ducula*, Hodgs. (1836); *Rhinopus*, Hodgs. (1841); *Zonœnas*, Rchb. (1852); *Globicera*, *Ptilocolpa*, Bp. (1854); *Muscadivora*, Schl. (1864); *Zonophaps*, *Cryptophaps*, Salvad. (1895).

α. *Globicera*.

9536. PACIFICA (Gm.); Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 87; *globicera*, Reinh.; *ænea* (pt.), Wagl.; *oceanica*, Selb., *Nat. Libr., Pig.*, p. 117, pl. 7; *microcera*, Cass., *U. S. Expl. Exp., Orn.*, p. 265, pl. 29; *tarrali*, Bp.; *sundevalli* (pt.), Bp.; *samoensis*, Brm.; *frauenfeldi*, Pelz. — Iles Samoa, Tonga, Fidji, Nouv.-Hébrides, Louisiades, Nouv. Guinée S.-E.

9537. FARQUHARI (Sharpe), *Ibis*, 1900, p. 349. — Erromanga (Nouv.-Hébrides).

9538. OCEANICA (Less.), *Voy. Coq., Zool.* I, p. 452, pl. 41; Prév. et Knip, *Pig.* II, pl. 24; Bp., *Consp.* II, p. 31; *pacifica* (pt.), Hartl. et Feh. — Iles Carolines et Pelew.

9539. MYRISTICIVORA (Scop.); Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 74; *ænea*, Gm.; Quoy et Gaim., *Voy. Uran., Zool.*, p. 119, pl. 29 (nec Lin.); *pacifica* (pt.), Bp.; id., *Icon. Pig.*, pl. 55; *globicera*, Gr.; *sundevalli* (pt.), Gr.; *tumida*, Wall.; *roseinucha* (pt.), Schl.; *temmincki*, Tristr. (1). — Nouv.-Guinée W. et iles Papous occid.

9540. RUBRICERA, Gray, *List B. Br. Mus.*, p. 18 (1856); Bp., *Consp.* II, p. 31; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 79; Sh. in *Gould's B. New-Guin.*, pt. XIX, pl. 7; *lepida*, Cass.; *pinon*, Less. (nec Q. et G.) — Nouv.-Irlande, Nouv.-Bretagne, Nouv.-Hanovre, île Duc York.

9541. RUFIGULA, Salvad., *Atti R. Ac. Sc. Tor.*, 1878, p. 556; id., *Orn. Pap.* III, p. 80; *rubricera* (pt.), Gr.; *richardsi*, Tristr., *Ibis*, 1879, p. 443. — Iles Salomon.

9542. AURORÆ, Peale, *U. S. Expl. Exp.*, 1848, p. 201, pl. 56; Cass., *U. S. Expl. Exp.*, 1858, p. 256, pl. 24; Salvad., *Cat. B.*, p. 180. — Iles Aurora et Maitea (iles Société).

(1) A cette espèce se rapporte probablement la *Columba australis*, Chamisso (nec Lin.), *Kotzeb. Reise*, III, p. 113.

Digitized by Google

9543. WILKESI, Peale, *U. S. Expl. Exp.*, 1848, p. 203, pl. 58; Salvad., *Cat. B.*, p. 181; *forsteri* (pt.), Bp., Rchb., Gieb., Gr. — Tahiti (îles Société).

9544. ?FORSTERI (Wagl.), *Isis*, 1829, p. 739; Salvad., *Cat. B.*, p. 172 (en note); *globicera* (pt.), Forst. — Tahiti.

β. *Carpophaga.*

9545. WHARTONI, Sharpe, *P. Z. S.*, 1887, p. 515, pl. 43; Salvad., *Cat.*, p. 184. — Ile Christmas.

9546. OENOTHORAX, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1892, p. 139; id., *Cat.*, p. 184, pl. 6. — Ile Engano (Sumatra W.)

9547. INSULARIS, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1858, p. 270; Salvad., *Cat.*, p. 185; *sylvatica, var.*, Blyth (1846); *ænea* (pt.), Bp.; *ænea, var. nicobarica*, Pelz. — Iles Nicobar.

9548. CONSOBRINA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1887, p. 558; Modigl., *Viag. a Nias*, p. 441, pl. 15; *ænea*, Rosenb. (nec Lin.) — Ile Nias.

9549. CONCINNA, Wall., *Ibis*, 1865, p. 383; Mey. et Wg., *B. Cel.*, pl. 39, f. 1; *ænea*, Wall. (1857 nec Lin.); *chalybura*, Gr. (nec Bp.); *chalybea*, Rosenb.; *roseinucha* (pt.), Schl. — Iles Arou, Moluques, petites îles de la Sonde, îles Ténimb., Sanghir, Célèbes S.

2513. *Var.* SEPARATA, Hart., *Nov. Zool.* III, p. 180. — Iles Key.

9550. INTERMEDIA, Mey. et Wg., *J. f. O.*, 1894, p. 249; id., *B. Cel.*, pl. 39, f. 2. — Ile Talaut.

9551. GEELVINKIANA, Schleg., *Mus. P.-B., Columbæ*, p. 86; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 84; id., *Cat.*, p. 188; *roseinucha*, Rosenb. (nec Schl.) — Iles Miosnon, Mafoor, Misori.

9552. VANDEPOLLI, Büttik., *Notes Leyd. Mus.* XVIII, p. 190. — Ile Nias.

9553. PAULINA (Bp. ex Tem.), *Consp. Av.* II, p. 35; Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 84; *ænea* (fem.), Tem. et Knip, *Pig.*, pl. 4 et auct. plur.; *rufinuchalis*, Cass.; *sylvatica*, Scl. (nec Tick.); *rufinucha*, Bp. — Iles Célèbes et Soula.

2514. *Var.* PULCHELLA, Wald., *Ann. and Mag. N. H.*, 1874, p. 157; Salvad., *Cat.*, p. 189. — Iles Togian (Célèbes E.).

2515. *Var.* NUCHALIS, Cab., *J. f. O.*, 1882, p. 126; Salvad., *l. c.*, p. 190; *paulina* (pt.), auct. plur. — Ile Luçon.

9554. ÆNEA (Lin.); Tem. et Knip, *Pig.* I, pl. 3; Salvad., *Cat.*, p. 190; Schl., *l. c.*, p. 85; *moluccensis*, Briss.; *pusilla*, Blyth. — Inde, Indo-Ch., Andaman, Haïnan, îles de la Sonde et Soula.

2516. *Var.* SYLVATICA, Tick., *J. A. S. Beng.*, 1833, p. 581; Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 86; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 381. — Inde S., Ceylan.

2517. *Var.* CHALYBURA, Bp., *Consp. Av.* II, p. 32; id., *Icon. Pig.*, pl. 42. — Philippines.

2518. *Var.* PALAWANENSIS, Blas., *Ornis*, IV, p. 316. — Palawan.

Digitized by Google

9555. RHODINOLÆMA, Sclat., *P. Z. S.*, 1877, p. 555; id., *Voy. Challeng. Birds*, p. 31, pl. 9; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 85. — Iles de l'Amirauté.

9556. VANWYCKI, Cass., *Pr. Ac. Nat. Sc. Philad.*, 1862, p. 320; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 87; *Gould's B. New-Guin.*, pt. XXV, pl. 8. — Nouv.-Irlande, île Duc York, Nouv.-Bretagne.

9557. PISTRINARIA, Bp., *Consp. Av.* II, p. 36; Salvad., *Orn. Pap.* III, pp. 86, 558; id., *Cat.*, p. 197. — Iles Salomon.

9558. ROSACEA (Tem.), *Pl. Col.* 578; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 89; *cineracea*, Rosenb. (nec Tem.) — Célèbes, Halmahera, îles Key, Ténimber, Timor, Flores, etc.

9559. PERSPICILLATA (Tem.), *Pl. Col.* 246; Bp., *Icon. Pig.*, pl. 45; Schl., *Mus. P.-B.*, *Col.*, p. 89; *temmincki*, Wall., *Ibis*, 1865, p. 384. — Halmahera, Batjan, Bourou.

9560. NEGLECTA, Schl., *Ned. Tijdschr. Dierk.* III, pp. 195, 344; id., *Mus. P.-B.*, p. 90; *perspicillata* (pt.), Gray, Wall. — Céram, Amboine.

9561. PICKERINGI, Cass., *Pr. Ac. Nat. Sc. Philad.*, 1854, p. 228; id., *U. S. Expl. Exp.*, 1858, p. 267, pl. 27; *ænea*, Peale (nec Lin.), *chalybura* (pt.), Gray; *everetti*, Grant. — Iles Soulou, Mantanani et la côte N.-W. de Bornéo.

9562. CINERACEA (Tem.), *Pl. Col.* 565; Schl., *Mus. P.-B.*, *Col.*, p. 91. — Timor.

9563. LATRANS, Peale, *U. S. Expl. Exp.*, 1848, p. 200, pl. 55; Cass., *ibidem*, 1858, pl. 26; *ocropygia*, Bp. — Iles Fidji.

9564. ZOEÆ (Less.), *Voy. Coq.*, *Zool.* I, p. 205, pl. 39; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 94; id., *Cat. B.*, p. 204. — Nouv.-Guinée, Jobi, Salawatti, Arou.

2519. ? *Var.* ORIENTALIS, Mey., *Abh. u. Ber. Kgl. Zool. Anthrop. Mus. Dresd.*, n° 2-4, p. 13 (1891). — Nouv.-Guinée N.-E.

γ. *Ptilocolpa.*

9565. GRISEIPECTUS, Bp. (ex Gray), *Consp. Av.* II, p. 34; id., *Icon. Pig.*, pl. 51; Schleg., *Mus. P.-B.*, *Col.*, p. 88; *pectoralis*, Gray. — Luçon, Mindoro, Mindanao (Philipp.)

9566. NIGRORUM, Whiteh., *Ibis*, 1897, p. 439; *carola*, Grant. — Negros (Philippines).

9567. CAROLA, Bp., *Consp. Av.* II, p. 34; Salvad., *Cat.*, p. 206; *griseipectus* (pt.), auct. plur. — Luçon.

δ. *Zonophaps.*

9568. FORSTENI (Bp.), *Consp. Av.* II, p. 39; Schleg., *Mus. P.-B.*, *Col.*, p. 93; *forsteri* (err.), Tem. et Knip, *Pig.* II, pl. 47. — Célèbes N.

9569. POLIOCEPHALA, Gray, *List B. Br. Mus.* III, *Gallinæ*, p. 6; id., *Gen. B.* II, pl. 119; Schleg., *l. c.*, p. 92. — Negros, Dinagat, Mindanao, Basilan.

Digitized by Google

9570. MINDORENSIS, Whiteh., *Ann. and Mag. N. H.*, 1896, p. 189; Grant, *Ibis*, 1896, p. 476, pl. 11. — Mindoro (Philippines).

9571. RADIATA (Quoy et Gaim.), *Voy. Astr., Zool.* I, p. 244, pl. 26; Knip et Prév., *Pig.* II, pl. 29; Schl., *l.c.*, p. 53. — Célèbes, Sanghir.

9572. FINSCHI, Rams., *Journ. Linn. Soc., Zool.*, 1881, p. 129; *Gould's B. New-Guin.*, pl. XVII, pl. 2. — Nouv.-Irlande.

9573. BASILICA, Bp. (ex Sundev.), *Consp. Av.* II, p. 55; Schl., *l. c.*, p. 96; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 96; *basalis*, Gray; *basilis*, Rchb., *basileus*, Finsch. — Halmahera, Ternate, Morotai, Batjan.

2520. *Var.* OBIENSIS, Hart., *Ibis*, 1898, p. 296. — Ile Obi.

9574. RUFIGASTRA (Quoy et Gaim.), *Voy. Astrol.*, p. 245, pl. 27; Prév. et Knip, *Pig.*, pl. 9; Schl., *l. c.*, p. 97; *rufiventris*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 790. — Nouv.-Guinée, Waigiou, Salawatti, Mysol, Jobi.

9575. CHALCONOTA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1874, p. 87, 1875, p. 790; id., *Orn. Pap.* III, p. 100; id., *Cat. B.*, p. 215. — Nouv.-Guinée N.-W.

ε. *Ducula.*

9576. LACERNULATA (Tem.), *Pl. Col.* 194; Schl., *l. c.*, p. 95; Salvad., *Cat. B.*, p. 215; ?*concolor*, Bp. — Java.

9577. WILLIAMI, Hart., *Nov. Zool.* III, p. 552. — Bali.

9578. SASAKENSIS, Hart., *Nov. Zool.* III, p. 564. — Lombock.

9579. CUPREA (Jerd.), *Madr. Journ.*, 1840, p. 12; Hume, *Str. F.*, 1875, p. 528; Salvad., *Cat. B.*, p. 215; *insignis* (pt.), auct. plur. — Inde S.

9580. INSIGNIS (Hodgs.), *As. Res.* XIX, p. 162, pl. 9; Salvad., *Cat. B.*, p. 216; *badia* (pt.), Schl., *l.c.*, p. 96. — Himalaya E., du Népaul à l'Assam.

9581. GRISEICAPILLA (Wald.), *Ann. and Mag. N. H.*, 1875, p. 228; Davis., *Str. F.*, 1877, p. 460; Salvad., *Cat. B.*, p. 217; *insignis* (pt.), Blyth. — Du Manipour au Ténassérim.

9582. BADIA (Raffl.), *Tr. Linn. Soc.* XIII (1822), p. 317; Salvad., *Cat. B.*, p. 218; *capistrata*, Tem., *Pl. Col.* 165; Prév. et Knip, *Pig.*, pl. 37. — Malacca, Sumatra, Bornéo et Java (Mus. Brux.)

ζ. *Cryptophaps.*

9583. POECILORRHOA, Brügg., *Abh. Naturw. Ver. Brem.* V, p. 84; Gould, *B. New-Guin.*, pt. XI, pl. 3. — Célèbes N.

η. *Zonœnas.*

9584. MULLERI (Tem.), *Pl. Col.* 566; Schl., *l. c.*, p. 93; Salvad., *Orn. Pap. e Mol.* III, p. 101; id., *Cat. B.*, p. 221; *muelleri*, Wall. — Nouv.-Guinée S., îles Arou.

2521. *Var.* AURANTIA, A. B. Mey., *Abh. Mus. Dresd.*, 1892-93, n° 3, p. 23. — Nouv.-Guinée N.

Digitized by Google

9585. PINON (Quoy et Gaim.), *Voy. de l'Uran., Zool.*, p. 118, pl. 28; Schl., *l. c.*, p. 94; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 105; *pinonæ*, Brügg. — Nouv.-Guinée, Rawak, Waigiou, Salawatti, Arou, etc.

2522. *Var.* RUBIENSIS, Mey., *Sitzb. u. Abh. d. Ges. Isis*, 1884, I, p. 51; Salvad., *Cat. B.*, p. 223. — Ile Rubi et Nouv.-Guinée S.-E.

9586. SALVADORII, Tristr., *P. Z. S.*, 1881, p. 996; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 559; id., *Cat. B.*, p. 223. — Louisiades.

9587. WESTERMANI, Schl. (ex Rosenb.), *Ned. Tijdschr. D.* IV, p. 27; Salvad., *Cat. B.*, p. 224; *C. pinon jobiensis*, Schl., *N. T. D.* IV, p. 26; *astrolabiensis*, Mey. — Jobi, Nouv.-Guinée N.-E.

9588. MELANOCHROA, Sclat., *P. Z. S.*, 1878, p. 672, pl. 42; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 106; id., *Cat. B.*, p. 225. — Archipel Bismarck.

9589. BRENCHLEYI, G. R. Gray, *Ann. and Mag. N. H.*, 1870, p. 328; id., *Cruise of the Curaçoa, B.*, p. 388, pl. 18; Salvad., *Cat.*, p. 225. — Iles Salomon.

## 1372. PHÆNORHINA

*Phænorhina*, Gray (1859).

9590. GOLIATH, G. R. Gray, *P. Z. S.*, 1859, p. 165, pl. 155; Schl., *l. c.*, p. 95; Salvad., *Cat. B.*, p. 226. — Nouv.-Calédonie, île des Pins.

## 1373. MYRISTICIVORA

*Myristicivora*, Rchb. (1852).

9591. BICOLOR (Scop.); Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 98 (pt.); Salvad., *l. c.*, p. 227; *alba*, Gm.; *littoralis*, Tem. et Knip, *Pig.* I, pl. 7; *myristicivora*, Gr.; *casta*, Peale; *luctuosa* (pt.), auct. plur. (nec Reinw.); *melanura* (pt.), auct. plur. (nec Wall.) — Indo-Ch. centr. et S., iles Andamans, Nicobars, Malacca, iles Indo-Malaises, Moluques, Ténimber.

2523. *Var.* SPILORRHOA (Gray), *P. Z. S.*, 1858, pp. 186, 196; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 111; id., *Cat.*, p. 231; *bicolor* et *luctuosa* (pt.), auct. plur.; Gould, *B. Austr.* V, pl. 60. — Nouv.-Guinée, îles Arou, Australie N.

2524. *Var.* SUBFLAVESCENS (Finsch), *Ibis*, 1886, p. 2; *Gould's B. New-Guin.*, pt. XXV, pl. 7; *luctuosa* (pt.), auct. plur. — Nouv.-Irlande.

2525. *Var.* MELANURA, Gray, *P. Z. S.*, 1860, p. 361; Finsch, *Neu-Guin.*, p. 178; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 116; *bicolor* (pt.), auct. plur. — Halmahera, Batjan, Bourou, Céram, Amboine, Goram.

9592. LUCTUOSA (Tem., ex Reinw.), *Pl. Col.* 247; Schl., *l. c.*, p. 102; Salvad., *Cat.*, p. 233. — Célèbes, îles Soula.



Digitized by Google

### 1374. LOPHOLÆMUS

*Lophorhynchus*, Sw. (1837, nec Vieill., 1816); *Lopholaimus*, G. R. Gray (1841); *Lopholœmus*, Agass. (1846).

9593. ANTARCTICUS (Shaw), *Zool. of New-Holl.*, p. 15, pl. 5; Gould, *B. Austr.* V, pl. 61; *dilopha*, Tem.; id., *Pl. Col.* 162. — Australie E., Tasmanie.

### 1375. HEMIPHAGA

*Hemiphaga*, Bonap. (1854).

9594. NOVÆ-ZELANDIÆ (Gm.); Schl., *l. c.*, p. 98; Bull., *Hist. B. of New-Zeal.*, p. 157, pl. 18; id. *B. New-Zeal.*, p. 229, pl. 24 (1888); *zealandica*, Lath.; ?*brunnea*, Lath.; *spadicea*, Less. (nec Lath.); *leucophæa*, H. et Jacq.; *argetræa*, Forst.; *novæ zealandiæ*, Gray. — Nouv.-Zélande.

9595. SPADICEA (Lath.), *Ind. Orn.*, *Suppl.*, p. LX; Selb., *Nat. Libr.*, *Pig.*, p. 127, pl. 9; Salvad., *Cat.*, p. 238; *gigas*, Ranz.; *leucogaster*, Wagl.; *princeps*, Vig. — Ile Norfolk (éteint?)

9596. CHATHAMENSIS (Rothsch.), *P. Z. S.*, 1891, p. 312, pl. 28; Salvad., *Cat.*, p. 239; *novæ-zealandiæ* (pt.), auct. plur.; *chathamica*, Forb. — Iles Chatham.

## FAM. II. — COLUMBIDÆ

### SUBF. I. — COLUMBINÆ

### 1376. GYMNOPHAPS

*Gymnophaps*, Salvad. (1874).

9597. ALBERTISII, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1874, p. 86; id., *Orn. Pap.* III, pp. 178, 560. — Nouv.-Guinée S.-E.

### 1377. COLUMBA

*Columba*, Lin. (1766); *Palumbus*, Kp. (1829); *Alsocomus*, Tick. (1842); *Dendrotreron*, Hodgs. (1844); *Patagiœnas*, *Lepidœnas*, *Lithœnas*, *Tænipœnas*, *Chlorœnas*, *Stictœnas*, *Janthœnas*, Rchb. (1852); *Picazurus*, Ch. et Des M. (1853); *Leucomelœna*, *Trocaza*, *Palumbœnas*, *Crossophthalmus*, Bp. (1854); *Leucotœnia*, Rchb. (1862); *Rupicola*, *Sylvicola*, Bogd. (1884); *Cœlotreron*, Heine (1890).

9598. GRISEA (Gray), *List of Gal. B. M.*, p. 5 (nec Bonn.); Schl., *Mus. P.-B.*, *Col.*, p. 105; Salvad., *Cat. B.*, p. 248, pl. 7. — Bornéo, Sumatra.

Digitized by Google

9599. UNICINCTA, Cass., *Pr. Ac. Philad.*, 1859, p. 143; Büttik., *Notes Leyd. Mus.* VII, p. 226, pl. 6. — Gabon, Congo Indépendant, Libéria.

9600. LEUCONOTA, Vig., *P. Z. S.*, 1831, p. 23; Gould, *Cent. Him. B.*, pl. 59; Knip et Prév., *Pig.* II, pl. 50; Schl., *l. c.*, p. 69; *leucomæna*, Bp. — Yarkand, Thibet, Himalaya, du Cachemire au Boutan.

9601. RUPESTRIS, Pall., *Zoogr.* I, p. 560; Bp., *Consp. Av.* II, p. 48; id., *Icon. Pig.*, pl. 75; Gould, *B. Asia*, VI, pl. 54; *leucozonura*, Swinh.; *livia, var. rupicola daurica*, Radde; *rupicola*, Hend. et Hume. — Himalaya, du Cachemire au Sikkim, Turkestan, Thibet, Chine N.

2526. *Var.* PALLIDA, Rothsch. et Hart., *Orn. Monatsb.*, 1893, p. 41. — Sibérie E.

2527. *Var.* TACZANOWSKII, Stejn., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1893, p. 624. — Corée, Ussuri.

9602. LIVIA, Briss.; Dress., *B. of Eur.* VII, p. 11 (pt.), pl. 457 (fig. sup.); Dubois, *Fne ill., Ois.* II, p. 13, pl. 169; *saxatilis*, Briss.; *ænas*, Lin. (pt.); *domestica*, Gm.; *amaliæ*, Brm.; *affinis*, Blyth; *elegans, glauconotus, unicolor, dubia*, Brm.; *plumipes*, Gray. — Europe S., Afrique N., Asie centr., Turkestan, Chine N.

2528. *Var.* NEGLECTA, Hume, *Str. F.* I, p. 218; *livia* (pt.), Salvad. — De la Perse au N.-W. de l'Inde.

2529. ? *Var.* TURRICOLA, Bp., *Consp. Av.* II, p. 47; Selys, *Ibis*, 1870, p. 453. (Aberr.?) — Italie, Palestine, Perse.

2530. *Var.* GYMNOCYCLA, Gray, *List B. Br. Mus. Columbæ*, p. 28; Salvad., *Cat.*, p. 257; *livia* (pt.), Licht.; *senegalensis*, Bp. — Afrique W.

2531. *Var.* SCHIMPERI, Bp., *Consp. Av.* II, p. 48; Shell., *B. of Egypte*, p. 212; *ænas*, Savig. (nec Lin.), *Descr. de l'Égypte*, p. 290, pl. 13, f. 7; *livia* (pt.), auct. plur.; *turricola*, Tristr. — Égypte, Nubie, Palestine.

2532. *Var.* INTERMEDIA, Strickl., *Ann. and Mag. N. H.*, 1844, p. 39; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 384; *livia* et *ænas* (pt.), auct. plur.; *cyanotus*, Severtz. — Du S. de la Perse jusqu'à l'Inde, Ceylan, Chine et Japon.

9603. ÆNAS, Lin.; Naum., *Vög. Deutschl.* VI, p. 215, pl. 151; Dubois, *Fne. ill. Ois.* II, p. 9, pl. 168; *cavorum, arborea*, Brm.; *columbella*, Bp. — Europe jusqu'au Turkestan à l'E.

9604. EVERSMANNI, Bp., *C.-R.* XLIII, 1856, p. 858; Jerd., *B. Ind.* III, p. 467; *ænicapilla*, Blyth; *fusca*, Severtz.; ? *var. brachyura*, Severtz.; *intermedia*, Dress. (nec Strickl.) — Sibérie W., Turkestan, Afghanistan, Inde N.-W.

9605. ALBITORQUES, Rüpp., *Neue Wirb.*, p. 63, pl. 22, f. 1; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 826; Schleg., *Mus. P.-B., Col.*, p. 72. — Abyssinie, Choa.

9606. GUINEA, Lin.; Edw., *Birds* I, pl. 75; Schl., *l. c.*, p. 72; *guineensis*, Briss.; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 822; *trigonigera* (pt.), Wagl.; *dilloni*, Bp. — Afrique du 16° l. N. au 6° l. S.

2533. *Var.* UHEHENSIS, Rchw., *Orn. Monatsb.* VI, p. 82. — Afrique E. allemande.

Digitized by Google

2554. *Var.* PHŒONOTA, Gray, *List B. Br. Mus., Col.*, p. 52; Bp., *C.-R.* XLIII, p. 858; *guinea* (pt.), auct. plur. (nec Lin.); *trigonogera* (pt.), Wagl. — Afrique S. du Cap au Transvaal.

9607. MADA, Hart., *Ibis*, 1899, p. 311. — Mt Mada, île Bourou.

9608. GYMNOPHTHALMA, Tem. et Knip, *Pig.* I, p. 48, pl. 18; Salvad., *Cat.*, p. 269; ?*corensis*, Jacq.; *loricata* (pt.), Wagl. — Iles Curaçoa, Aruba et Bonaire.

9609. PICAZURO, Tem., *Pig. et Gallin.* I, pp. 411, 449; Salvad., *Cat.*, p. 271; *leucoptera*, Max. (nec Lin.); *loricata*, Licht.; *pœciloptera*, Max. (nec Vieill.); *gymnophthalmus* (pt.), auct. plur.; *maculosa*, Burm. (nec Tem.) — Brésil, Paraguay, Uruguay, Argentine, ?Bolivie E.

9610. ALBIPENNIS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1876, p. 18; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 252; Salvad., *Cat.*, p. 272, pl. 8; *maculosa*, auct. plur. (nec Tem.) — Pérou S. et Bolivie.

9611. MACULOSA, Tem., *Pig. et Gallin.* I, pp. 113, 450; Salvad., *l. c.*, p. 273; *pœciloptera*, Vieill.; *maculipennis*, Licht; *gymnophthalmus*, Rchb.; *reichenbachi*, Bp.; Rchb., *Tauben*, I, p. 67, pl. 226, f. 1268; *fallax*, Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 80. — Uruguay, Argentine, Patagonie N.

9612. HODGSONI, Vig., *P. Z. S.*, 1832, p. 16; Bp., *Icon. Pig.*, pl. 61; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 381; *nipalensis*, Hodgs. — Himalaya, du Cachemire au Boutan et Setchuan W.

9613. ARQUATRIX, Tem. et Knip, *Pig.* I, p. 11, pl. 5; Levaill., *Ois. d'Afr.* VI, p. 67, pl. 264; *arquatricula*, Bp., *Consp.* II, p. 50. — Afrique S., S.-W. et E. jusqu'au Kilima Ndjaro.

2555. *Var.* THOMENSIS, Boc., *Jorn. Sc. Lisb.*, 1888, p. 230. — I. St-Thomas (Afr. W.)

9614. SJOESTEDTI, Rchw., *Journ. f. Orn.*, 1898, p. 138 (*sjöstedti*); *arquatrix*, Sjöst. — Caméron.

9615. LEUCOCEPHALA, Lin.; Tem. et Knip, *Pig.* I, pl. 13; Vieill., *Gal. Ois.* I, p. 331, pl. 194; Audub., *B. Amer.* IV, p. 315, pl. 280. — Antilles, Bahama, Florida Keys, Honduras, Cozumel.

9616. SQUAMOSA, Bonn., *Tabl. Enc. méth.* I, p. 234; Salvad., *Cat.*, p. 280; *corensis*, Tem. (nec Jacq.), *Pig. et Gallin.* I, pp. 211, 461; Schleg., *Mus. P.-B., Col.*, p. 68; *portoricensis*, Tem. et Knip, *Pig.* I, p. 41, pl. 15; Sagra, *H. N. Cuba, Ois.*, p. 172, pl. 27; *monticola*, Vieill.; *imbricata*, Wagl. — Antilles.

9617. SPECIOSA, Gm.; *Pl. Enl.* 213; Tem. et Knip, *l. c.*, p. 39, pl. 14; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 231; *spilodera*, Bp. — Mexique, Amér. centr. et mér. jusque vers le 12° l. S.

9618. INORNATA, Vig., *Zool. Journ.*, 1828, p. 446; d'Orb. in *Sagra, Hist. N. Cuba, Ois.*, p. 173, pl. 28; Salvad., *Cat.*, p. 284; *rufina*, Gosse (nec Tem.) — Grandes Antilles.

9619. FLAVIROSTRIS, Wagl., *Isis*, 1831, p. 519; Baird, *B. N. Am.*, p. 598, pl. 61; id., *Mex. Bound.* II, — États-Unis du S. jusqu'au Costa-Rica.

Digitized by Google

*B.*, p. 21, pl. 23; *erythrina*, Licht.; *dorsalis*, Gray; *solitaria*, Mc Call.

2536. *Var.* MADRENSIS, Nels., *Pr. Biol. Soc. Washingt.* XII, p. 6. — Iles Tres-Marias.

9620. VINA, Godm., *Ibis*, 1900, p. 363. — Pérou N.

9621. OENOPS, Salv., *Nov. Zool.* II, p. 20. — Pérou.

9622. RUFINA, Tem. et Knip, *Pig.* I, p. 59, pl. 24; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 236; *sylvestris*, Vieill.; *melanoptera*, Tem. (nec Mol.); *plumbescens*, Lawr. (juv.) — Du Guatémala à la Colombie, Ecuador, Pér., Guyane, Brés.

9623. CARIBÆA, Jacq., *Beytr.*, p. 30, n° 24; Tem. et Knip, *l. c.*, p. 22, pl. 10; Salvad., *Cat.*, p. 290; *lampprauchen*, Wagl.; *caribbæa*, Den. — Jamaïque, ? Porto-Rico.

9624. FASCIATA, Say, *Long's Exp. R. Mts.* II, p. 10; Bp., *Am. Orn.* I, p. 77, pl. 8; Audub., *B. Am.* IV, p. 312, pl. 279; *monilis*, Vig. — États-Unis W. jusqu'au Guatémala et Nicaragua.

2537. *Var.* VIOSCÆ, Brewst., *Auk*, 1888, p. 86. — Basse-Californie.

9625. ALBILINEA, Gray, in Bp., *Consp. Av.* II, p. 51; Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 67; *albilineata*, Gr.; *denisea*, Tacz.; *guayaquilensis*, Ridgw. — Colombie, Ecuador, Pérou, Bolivie, Guyane anglaise.

2538. *Var.* CRISSALIS, Salvad., *Cat. B.* XXI, p. 294; *albilinea* (pt.), auct. plur. — Costa-Rica, Veragua.

9626. TUCUMANA, Salvad., *Boll. Mus. Torino*, X, n° 208, p. 22 (1895). — Tucuman.

9627. ARAUCANA, Less., *Voy. Coq.* I, 2, p. 706, pl. 40; *denisea*, Tem., *Pl. Col.* 502; *fitzroyii*, King; ?*meridionalis*, Peale. — Pérou centr. et du Chili à Magellan.

9628. LAURIVORA, Webb et Berth. (pt.), *Orn. Can.*, p. 26, pl. 3 (fig. infér.); Knip et Prév., *Pig.* II, pl. 43; Dress., *B. Eur.* VII, p. 31, pl. 460; *trocaz* (pt.), Gray. — Iles Canaries (Gomera et Palma).

9629. BOLLEI, Godm., *Ibis*, 1872, p. 217; Dress., *B. Eur.* VII, p. 29, pl. 459; *bollii*, auct. plur. — Canaries (Gomera, Ténériffe, Palma).

9630. TROCAZ, Heinck., *Brewst. Journ. of Sc.*, 1829, p. 228; Jard. et Sel., *Ill. Orn.* II, pl. 98; Dress., *l. c.*, p. 33, pl. 461; *laurivora*, Webb et Bert. (pt.), *Orn. Can.*, pl. 3 (fig. supér.); *bouvryi*, Bp. — Madeire.

9631. PALUMBUS, Lin.; Naum., *Vög. Deutschl.* VI, p. 168, pl. 149; Dress., *l. c.*, p. 3, pl. 436; Dubois, *Fne ill. Vert. Belg., Ois.* II, p. 4, pl. 167; *arborea*, Pall.; *torquata*, Leach; *pinetorum*, Brm.; *palumbaria*, Körn.; *excelsus*, Bp. — Europe, Asie W. jusqu'en Perse, Palestine, Afrique N.-W., Açores, Baléares, Madeire.

2539. *Var.* CASIOTIS (Bp.), *Consp.* II, p. 42; id., *Icon. Pig.*, pl. 58; *palumbus* et *torquatus* (pt.), auct. plur.; *himalayana*, Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 66; *pulchricollis*, Severtz. — Turkestan jusqu'au N.-W. de l'Himalaya, Cachemire, Punjab, Perse S.-E.

9632. TORRINGTONIÆ (Kelaart), *Pr. Faun. Ceyl.*, p. 107; Legge, *B. Ceyl.*, p. 693, pl. 30; *torringtonii*, Kel.; Schl., *Mus. P.-B.*, p. 71. — Ceylan.

Digitized by Google

| | |
|---|---|
| 9633. ELPHINSTONEI (Syk.), *P. Z. S.*, 1832, p. 149; Jerd., *Ill. Ind. Orn.*, pl. 48; Fras., *Zool. Typ.*, pl. 59; Schl., *l. c.*, p. 70. | Inde S. (montagnes). |
| 9634. PULCHRICOLLIS, Hodgs., in *Gray's Zool. Misc.*, p. 85; Gould, *B. of Asia*, VI, pl. 58; Schleg., *l. c.*, p. 71. | Himalaya E., ? Chine S., Formose. |
| 9635. PUNICEA (Blyth), *J. A. S. Beng.*, 1842, p. 461; Legge, *B. of Ceyl.*, p. 696; Salvad., *Cat.*, p. 306. | Inde centr. E., Indo-Ch. W., Malac., Ceyl. |
| 9636. PALUMBOIDES (Hume), *Str. Feath.*, 1873, p. 502; Wald., *Ibis*, 1875, p. 315, pl. 13; *nicobarica*, Wald. | Iles Andamans et Nicobars. |
| 9637. VERSICOLOR, Kittl., *Kupfert.* I, p. 5, pl. 5, f. 2; *kittlitzii*, Tem., *Pl. Col.*; id., *Tabl. méth.*, p. 80; *metallica*, Vig.; *iris*, Kittl.; *janthina*, Schl. (pt.); *splendida*, Stejn. | Iles Bonin. |
| 9638. JOUYI (Stejn.), *Amer. Natural.*, 1887, p. 583; Salvad., *Cat.*, p. 310; *janthina*, Seeb. (pt.) | Iles Loo-Choo. |
| 9639. JANTHINA, Tem., *Pl. Col.* 503; Knip et Prév., *Pig.* II, pl. 16; Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 161, pl. 60, 100. | Japon, Corée. |
| 2540. *Var.* NITENS (Stejn.), *Pr. U. S. Nat. Mus*, 1887, p. 421; Salvad., *Cat.*, p. 311; *janthina*, Kittl. (nec Tem.); *Kupfert.* I, p. 5, pl. 5, f. 1. | Iles Bonin. |
| 9640. METALLICA, Tem., *Pl. Col.* 562; Schl., *l. c.*, p. 75; Salvad., *Cat.*, p. 312. | Timor et petites îles voisines. |
| 9641. GRISEIGULARIS (Wald. et Lay.), *Ibis*, 1872, p. 104, pl. 6; Salvad., *Cat.*, p. 313; *luzoniensis*, Schleg., *l. c.*, p. 75. | Philippines, îles Soulou, Bornéo N. |
| 9642. ALBIGULARIS (Bp.), *C.-R.* XXXIX, p. 1105; Salvad., *Orn. Pap.* III, pp. 120, 360; Sharpe, in *Gould's B. New-Guin.*, pl. XXV, pl. 6; *halmaheira, leucolæma*, Bp.; *rawlinsonii*, Sharpe. | Moluques, Nouv.-Guinée et îles voisines, Louisiades. |
| 9643. HYPOŒNOCHROA (Gould), *P. Z. S.*, 1856, p. 136; Schleg., *l. c.*, p. 77; *hypoinochroa*, Gr.; *vitiensis*, Verr. et Des M., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1862, p. 130 (nec Q. et G.) | Nouv.-Calédonie, île des Pins, îles Loyalty. |
| 9644. VITIENSIS, Quoy et Gaim., *Voy. Astrol., Zool.* I, p. 246, pl. 28; Fch. et Hartl., *Faun. Centralpolyn.*, pp. 157, 279, pl. 11, f. 2; Schl., *l. c.*, p. 77. | Iles Fidji. |
| 9645. LEOPOLDI (Tristr.), *Ibis*, 1879, p. 193; Salvad., *Cat.*, p. 317; *hypœnochroa*, Lay. (nec Gould), *Ibis*, 1878, p. 276. | Nouv.-Hébrides. |
| 9646. CASTANEICEPS, Peale, *U. S. Expl. Exp.*, 1848, p. 187, pl. 50; Cass., *U. S. Expl. Exp.*, 1858, p. 252, pl. 23; Schl., *l. c.*, p. 77; *vitiensis* (pt.), Cass. (juv.) | Iles Samoa. |
| 9647. PALLIDICEPS (Rams.), *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1877, p. 248; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 125; id., *Cat.*, p. 319. | Ile du Duc York. |
| 9648. PHILIPPANA (Rams.), *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1881, | Ile Ugi (Salomon). |

Digitized by Google

p. 721 *(philippanæ)*; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 560; id., *Cat.*, p. 319.

9649. LEUCOMELA, Temm., *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 126; id., *Pl. Col.* 186; Gould, *B. Austr.* V, pl. 59; *norfolciensis*, Lath. — Australie E.

9650. POLLENI, Schl., *Ned. Tijdschr. Dierk.* III, p. 87; id. et Poll., *Faun. Madag.*, p. 112, pl. 37; Salvad., *Cat.*, p. 321. — Iles Comores.

9651. VINACEA, Tem. et Knip (nec Gm.), *Pig.* I, p. 87, pl. 41 (1808-11); *bicolor* et *plumbea*, Vieill., *N. Dict.* XXVI, pp. 345, 358 (1818); Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 234; Salvad., *Cat.*, p. 324; *locutrix*, Max.; Tem., *Pl. Col.* 166; *infuscata*, Licht.; *purpureotincta*, Ridgw.; *subsp. bogotensis*, Berl. et Leverk., *Ornis*, 1890, p. 32. — Guyane, Vénézuéla, Colombie, Ecuador, Pérou, Bolivie, Brésil.

9652. NIGRIROSTRIS, Sclat., *P. Z. S.*, 1859, p. 390; Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 78; Salvad., *Cat.*, p. 322. — Mexique S., Amérique centr.

9653. SUBVINACEA, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1868, p. 135; Rowl., *Orn. Misc.* III, p. 75, pl. 91; Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 217. — Costa-Rica, Veragua, Colombie, Ecuador.

2541. *Var.* BERLEPSCHI, Hart., *Nov. Zool.* V, p. 504. — Ecuador N.-W.

## 1378. NESOENAS

*Nesœnas*, Salvad. (1893); *Trocaza*, Shell. (1883, nec Bp.)

9654. MAYERI (March.), *Mus. March.*; Prév. et Knip, *Pig.* II, pl. 60; *meyeri*, Schl. et Pol., *Faun. Madag.*, p. 111, pl. 36; Salvad., *l. c.*, p. 327. — Ile Maurice.

## 1379. TURTUROENA

*Tuturœna*, Bp. (1854); *Peleiœnas*, Rchb. (1862); *Trizusa*, Heine (1890).

9655. DELEGORGUEI (Deleg.), *Voy. Afr. Austr.* II, p. 615; Salvad., *Cat.*, p. 328, pl. 9, ff. 1, 2; *johannæ*, Bp., *Consp. Av.* II, p. 45; *lunigera*, Gray. — Afrique S.-E.

9656. SHARPEI, Salvad., *Cat.*, p. 329, pl. 11, f. 3; Rothsch., *Novit. Zool.* I, p. 41, pl. 3; *delegorguei*, Hartl. (nec Deleg.), *Abh. Naturw. Ver. Brem.*, 1891, p. 37. — Nguru (Afr. équat. E.).

9657. HARTERTI, Neum., *J. f. O.*, 1898, p. 287, pl. 2. — Kilima-Ndjaro.

9658. INCERTA, Salvad., *Cat. B.* XXI, p. 330. — ?

9659. MALHERBEI (Verr.), *Rev. et Mag. de Zool.*, 1851, p. 514; Salvad., *l. c.*, p. 331; *chlorophœa*, Hartl., *P. Z. S.*, 1866, p. 329. — Iles Principe et St-Thomas (Afrique W.)

9660. IRIDITORQUES (Cass.), *Pr. Ac. Nat. Sc. Philad.*, 1856, — Du Gabon à Libéria

Digitized by Google

p. 254; Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 69; Forb. et Rob., *Bull. Liverp. Mus.* II, pl. 2 et 3; *chalcauchia*, Gray; *malherbei* (pt.), auct. plur. (nec Verr.); *büttikoferi*, Rchw., *J. f. O.*, 1891, p. 373. (Afrique W.)

## SUBF. II. — MACROPYGIINÆ

### 1380. TURACŒNA

*Turacœna*, Bp. (1854); *Haplœnas*, Heine (1890).

9661. MENADENSIS (Quoy et Gaim.), *Voy. de l'Astrol.* I, p. 248, pl. 30; Schleg., *l. c.*, p. 166; ? *var. major*, W. Blas., *Zeitschr. Ges. Orn.* II, p. 309. Célèbes, îles Togian.

2542. *Var.* SULAENSIS, Forb. et Rob., *Bull. Liverp. Mus.* II, p. 135. Iles Soula.

9662. MODESTA (Tem.), *Pl. Col.* 552; Prév. et Knip, *Pig.* II, pl. 31; Schl., *l. c.*, p. 107. Timor et îles voisines.

### 1381. MACROPYGIA

*Macropygia*, Sw. (1837); *Coccyzura*, Hodgs. (1843).

9663. LEPTOGRAMMICA (Tem.), *Pl. Col.* 560 (1835); Schl., *l. c.*, p. 107; *walik-mehra*, Rchb., *Tauben, Suppl.*, pl. 3, f. 29; *walichœhra*, Gray; *tusalia*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1887, p. 443. Java, Sumatra, Malac.

2543. *Var.* TUSALIA (Blyth), *J. A. S. Beng.*, 1843, p. 957; Salvad., *l. c.*, p. 338; *leptogrammica* (pt.), auct. plur. Himal. E., du Népaul au Ténass., Moupin.

2544. *Var.* MINOR, Swinh., *Ibis*, 1870, p. 355; Grant, *P. Z. S.*, 1900, p. 502; *tusalia* (pt.), Gray; *swinhoei*, Rams., *Ibis*, 1890, p. 218. Haïnan.

9664. MAGNA, Wall., *P. Z. S.*, 1863, p. 497; Schl., *l. c.*, p. 108; Salvad., *Cat.*, p. 342. Timor et îles voisines.

9665. TIMORLAOENSIS, Mey., *Zeitschr. Ges. Orn.*, 1884, p. 214; Salvad., *l. c.*, p. 342; *keiensis*, Mey. (nec Salvad.) Timor-Laut.

9666. MACASSARIENSIS, Wall., *Ibis*, 1863, p. 389; Wald., *Tr. Zool. Soc.* VIII, p. 85; *amboinensis, var. albicapilla*, Brüggm. Célèbes S.

9667. CINNAMOMEA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1892, p. 140; id., *Cat. B.*, p. 344. Engano.

9668. RUFIPENNIS, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1846, p. 371; Salvad., *Cat.*, p. 344. Iles Andaman et Nicobar.

9669. TENUIROSTRIS, Bp., *Consp. Av.* II, p. 57; Salvad., *l. c.*, p. 346; *phasianella*, Tem., *Pl. Col.* 100; Knip et Prév., *Pig.* II, pl. 52; *amboinensis* (pt.), auct. plur.; *eurycerca*, Tweedd. Iles Philippines et Soulou.

Digitized by Google

2545. *Var.* Modiglianii, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1887, p. 559, pl. 8, f. 2; id., *Cat.*, p. 549. — Ile Nias.

2546. *Var.* Emiliana, Bp., *Consp. Av.* II, p. 58; Salvad., *l. c.*, p. 547; *unchall*, Gr. (nec Wagl.); *tenuirostris* (pt.), Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 109. — Java, Bornéo N., Lombock.

9670. phasianella (Tem.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, 1821, p. 129 (nec 1824, *Pl. Col.*); Gould, *B. Austr.* V, pl. 75; *amboinensis* (pt.), auct. plur.; *Turtur phasianellus*, Schl. — Australie E. et S.

9671. amboinensis (Lin. ex Briss.); Rchb., *Tauben*, I, p. 86, pl. 251, f. 1365; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 152; ? *macroura*, Gm.; *albiceps*, Tem., in Bp., *Consp. Av.* II, p. 56; *turtur* (pt.), Schl.; *buruensis*, Salvad. — Amboine, Céram, Bourou.

2547. *Var.* Kevensis, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1876, p. 204; id., *Orn. Pap.* III, p. 146; *phasianella* (pt.), auct. plur. (nec Tem.); *turtur* (pt.), Schl. — Iles Kei.

2548. *Var.* Albicapilla, Bp., *Consp. Av.* II, p. 57; Mey. et Wg., *B. Cel.*, pl. 40; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 154; *turtur* (pt.), Schl., *Mus. P.-B., Col.*, pp. 111, 112. — Iles Célèbes, Soula et Togian.

2549. *Var.* Sanghirensis, Salvad., *Atti R. Ac. Sc. Tor.*, 1878, p. 1185; Blas., *Ornis*, 1888, p. 619, pl. 3; *turtur* (pt.), Schl. — Sanghir.

2550. *Var.* Maforensis, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1878, p. 429; id., *Orn. Pap.* III, p. 148; *turtur* (pt.), Schl.; *doreya*, Rosenb. (nec Bp.); *griseinucha* (pt.), Salvad. (1876). — Ile Mafoor (baie de Geelwink).

2551. *Var.* Doreya, Bp., *Consp. Av.* II, p. 57; Salvad., *Orn. Pap.* III, pp. 141, 561; *amboinensis* (pt.), Less.; *phasianella*, auct. plur. (nec Tem.); *turtur* (pt.), Schl.; *griseinucha* (pt.), Salvad.; ? *batchianensis*, Hein. et Rchw. (nec Wall.) — Nouv.-Guin., Waigiou, Guebeh, Batanta, Salawatti, Mysol, Mysori, Jobi, Arou.

2552. *Var.* Cunctata, Hart., *Novit. Zool.* VI, p. 214. — St-Aignan (Louisiades).

2553. *Var.* Cinereiceps, Tristr., *Ibis*, 1889, p. 558; Salvad., *Cat.*, p. 557; *amboinensis* et *doreya* (pt.), auct. plur. — Nouv.-Guin. S.-E., îles D'Entrecasteaux.

2554. *Var.* Griseinucha, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1876, p. 204 (pt.); id., *Cat.*, p. 557. — Ile Miosnom (baie de Geelwink).

2555. *Var.* Batchianensis, Wall., *Ibis*, 1865, p. 389; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 156; *amboinensis* (pt.), auct. plur.; *albicapilla, var.*, Gr.; *turtur* (pt.), Schl. — Batjan, Halmahera, Ternate, Morty, Kajoa.

2556. *Var.* Kerstingi, Rchw., *Orn. Mon.*, 1897, p. 25. — Nouv.-Guinée N.-E.

2557. *Var.* Goldiei, Salvad., *Cat. B.*, p. 558; *doreya* (pt.), Sharpe. — Nouv.-Guinée S.-E.



Digitized by Google

2558. *Var.* CARTERETIA, Bp., *Consp. Av.* II, p. 57; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 138; *turtur* (pt.), Cab. et Rchw.; *amboinensis* (pt.), Rams.; *nigrirostris*, De Vis (nec Salvad.) — Nouv.-Bret., Nouv.-Irl., Ile Duc York, Nouv.-Hanovre, Nouv.-Guin. S.-E.

9672. RUFICEPS (Tem.), *Pl. Col.* 561; Schl., *Mus. P.-B.*, p. 110; *assimilis*, Hume, *Str. Feath.* II, p. 441. — Iles de la Sonde, Malac., Birm., Ténass.

2559. *Var.* ORIENTALIS, Hart., *Nov. Zool.* III, p. 573. — Tambora, Sambawa.

9673. NIGRIROSTRIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 972; id., *Orn. Pap.* III, pp. 149, 561. — Nouv.-Guinée, archip. Bismarck.

9674. RUFOCASTANEA, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1879, p. 514; Salvad., *l. c.*, pp. 149, 561; *arossi*, Tristr.; *castanea*, Salvad.; *arossiana*, Tristr. — Iles Salomon.

9675. RUFA, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1878, p. 287; Salvad., *Cat.*, p. 363. — Nouv.-Hébrides.

9676. MACKINLAYI, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1878, p. 286; Salvad., *Cat.*, p. 364. — Ile Tanna (Nouv.-Hébrides).

### 1382. REINWARDTOENAS

*Reinwardtœnas*, Bp. (1854); *Reinwardtœna*, G. R. Gr. (1856); *Coccyzœnas*, Heine (1890).

9677. REINWARDTI (Tem.), *Pl. Col.* 248 (*reinwardtsi*); Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 104; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 125; *typica*, Bp. — Célèbes, Moluques, Céram, Amboine, Waigiou.

2560. *Var.* GRISEITINCTA, Hart., *Novit. Zool.* III, p. 18. — Nouv.-Guinée.

2561. *Var.* OBIENSIS, Hart., *Ibis*, 1898, p. 296. — Iles Obi.

2562. *Var.* MINOR (Schl.), *Mus. P.-B., Col.*, p. 106; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 129. — Ile Mysori (baie de Geelwink).

9678. BROWNI (Sclat.), *P. Z. S.*, 1877, p. 110; Salvad., *Orn. Pap.* III, pp. 130, 561. — Ile Duc York, Nouv.-Bretagne.

### 1383. CORYPHOENAS

*Coryphœnas*, Wardl. Rams. (1890).

9679. CRASSIROSTRIS (Gould), *P. Z. S.*, 1836, p. 136; Gray, *Cruise of the Curaçoa*, p. 390, pl. 19; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 131. — Iles Salomon.

## SUBF. III. — ECTOPISTINÆ

### 1384. ECTOPISTES

*Ectopistes*, Sw. (1827); *Trygon*, Brm. (1831, nec Adans.)

9680. MIGRATORIUS (Catesb.), *Car.* I, p. 23, pl. 23; Wils., *Am. Orn.* I, p. 102, pl. 44, f. 1; Gould, *B. Eur.*, pl. 247; *americana*, Kalm.; *canadensis*, Briss.; *histrio, ventralis*, Müll.; *gregoria*, Brm. (hybride). — Amérique du Nord, régions or. et centr.

Digitized by Google

## FAM. III. — PERISTERIDÆ

### SUBF. I. — ZENAIDINÆ

#### 1385. ZENAIDURA

*Zenaidura*, Bp. (1854); *Perissura*, Cab. (1856); *Zenædura*, Coues (1874).

9681. CAROLINENSIS (Lin. ex Catesb.), *Car.* I, p. 24, pl. 24; Audub., *B. Am.* V, p. 36, pl. 286; *macroura*, Edw.; *marginata*, Lin.; *fusca*, Müll.; *hoilotl*, *nævia*, Gm.; *marginellus*, Woodh.; *macroura*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1885, p. 355. — Amér. du N. et centr. (du S. du Canada à Panama, Antilles).

9682. CLARIONENSIS, Towns., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1890, p. 133; Salvad., *Cat. B.*, p. 378. — Ile Clarion (Mex. W.)

9683. YUCATANENSIS, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1869, p. 208; Salvad., *l. c.*, p. 373 (en note). — Yucatan.

9684. GRAYSONI, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1871, p. 17; B., B. et R., *N. Am. B.* III, p. 382; Salvad., *l. c.*, p. 378. — Iles Socorro.

#### 1386. ZENAIDA

*Zenaida*, Bp. (1838); *Stenuræna*, *Platypteræna*, Rchb. (1862).

9685. MARTINICANA (Briss.); Bp., *Consp. Av.* II, p. 82; *martinica*, *var.* β, Gm.; *aurita*, Tem. et Knip, *Pig.* I, p. 60, pl. 25; Salvad., *Cat.*, p. 380; *castanea*, Wagl.; *bimaculata*, Gray. — Petites Antilles et Ile St-Croix.

9686. MERIDIONALIS (Lath.), *Ind. Orn. Suppl.*, p. 60, n° 4; Bp., *Consp. Av.* II, p. 97; Forb. et Rob., *Bull. Liverp. Mus.* I, p. 36; *zenaida*, Bp.; Audub., *B. Am.* V, p. 1, pl. 281; *amabilis*, Bp.; Salvad., *Cat.*, p. 382; *richardsoni*, Cory. — Iles Bahama, Florida Keys, Antilles, Yucatan.

2563. *Var.* SPADICEA, Cory, *Auk*, 1886, pp. 498, 502; id., *B. W. Ind.*, p. 215; Salvad., *l. c.*, p. 383. — Grand Cayman.

2564. *Var.* YUCATANENSIS, Salvad., *Cat. B.* XXI, p. 384; *amabilis*, Boucard (nec Bp.) — Côtes du Yucat. et les îles du golfe de Hond.

9687. MACULATA (Vieill., nec Gm.), *Enc. méth.* I, p. 376; Bp., *Consp.* II, p. 82; *meridionalis*, King (nec Lath.); *aurita* (pt.), Tem.; *auriculata*, Des M., in *Gay*, *Hist. de Chile*, I, p. 381, pl. 6; Salvad., *l. c.*, p. 384; *chrysauchenia* et *chilensis*, Rchb.; *hypoleuca* et *noronha*, Gr. — Amér. mér. occid. de l'Ecuad. à la Patag., Brésil, Paraguay, Urug., Argentine

9688. RUFICAUDA, Bp., *Consp. Av.* II, p. 83; Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 141; Salvad., *l. c.*, p. 387; *mexicana*, *pentheria*, *castanea*, Bp.; *bogotensis*, Lawr. — Colombie, Vénézuela, ? Rio-Branco.

Digitized by Google

9689. VINACEO-RUFA, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1884, p. 176, Salvad., *l. c.*, p. 389; *rubripes*, Lawr., *Auk*, 1885, p. 357; *wellsi*, Lawr. — Guyane angl., Vénéz., Curaçao, Grenada, Grenadines.

9690. JESSIÆ, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 527; Salvad., *l. c.*, p. 389. — Bas-Amazone (Diamantina).

9691. ?STENURA, Bp., *Consp. Av.* II, p. 84; Hein. et Rchw., *Nomencl. Mus. Hein. Orn.*, p. 284. — Colombie.

### 1387. NESOPELIA

*Nesopelia*, Sundev. (1872).

9692. GALAPAGOENSIS (Gould), *Voy. Beagl., Zool.*, p. 115, pl. 46; Des M. et Prév., *Voy. Vénus, Ois.*, p. 270, pl. 8; Schl., *l. c.*, p. 140. — Iles Galapagos.

2565. *Var.* EXSUL, Rothsch. et Hart., *Novit. Zool.* VI, p. 184. — Culpepper et Wenman (Galapagos).

### 1388. MELOPELIA

*Melopelia*, Bp. (1854); *Melopeleia*, Rchb. (1862).

9693. LEUCOPTERA (Lin.); Bp., *Consp.* II, p. 81; Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 152; *aurita* (pt.), Tem.; *trudeaui*, Aud., *B. Am.* VII, p. 352, pl. 496. — Ét.-Unis du S., Amér. centr. jusqu. Costa-Rica, Gr. Antilles.

2566. *Var.* MELODA (Tsch.), *Arch. f. Naturg.*, 1843, 1, p. 385; id., *Faun. Per.*, pp. 44, 276, pl. 29; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 241; *souleyetiana*, Des M., in *Gay, Hist. de Chile*, I, p. 380, pl. 7; *leucoptera* (pt.), Schl. — Pérou, Chili N.

## SUBF. II. — TURTURINÆ

### 1389. TURTUR

*Peristera*, Boie (1828, nec Sw., 1827); *Turtur*, Selby (1835); *Streptopelia*, Bp. (1854); *Spilopelia* et *Stigmatopelia*, Sundev. (1872); *Homopelia*, Salvad. (1893); *Onopopelia*, Blanf. (1898).

α. *Turtur.*

9694. COMMUNIS, Selb., *Nat. Libr., Pig.*, pp. 153, 171 (1835); *Col. turtur*, Lin.; Gould, *B. Eur.* IV, pl. 246; *tenera* (aberr.) et *dubia*, Brm.; *lugubris* et *maxima*, Landb. (aberr.); *vulgaris*, Eyt. (1836); Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg., Ois.* II, p. 20, pl. 170; *migratorius*, Sw.; *auritus*, Gr. (1840, ex Ray, 1713); *afra*, Webb et Berth. (nec Lin.); *sylvestris*, *cyanotus*, Rchb.; *glauconotus*, Brm. — Europe, Afrique N. et N.-E., Sénégambie, Ténériffe.

Digitized by Google

2567. *Var.* ARENICOLA, Hart., *Novit. Zool.* I, p. 42. — Golfe Persique, Asie W., Tunisie.

9695. ISABELLINUS, Bp., *C. R.* XLIII, p. 942; id., *Icon. Pig.*, pl. 102; Schl., *l. c.*, p. 117; *auritus* (pt.), auct. plur.; *turturoides*, *leoninus*, Würt.; *sharpii*, Shell.; id., *B. Egypt.*, p. 215, pl. 10, f. 2. — Afrique N.-E.

9696. ORIENTALIS (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 606; Schl., *l. c.*, p. 118; Dress., *B. Eur.*, pl. 463; *rupicola*, Pall.; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 385; *meena*, Syk.; *agricola*, Tick.; *gelastis*, Tem., *Pl. Col.* 550; *erythrocephalus*, Gray; *stimpsoni*, Stejn. — Himalaya E., Indo-Chine, Mandchourie, Corée, Japon, Formose.

2568. *Var.* FERRAGO (Eversm.), *Add. ad Zoogr. Rosso-As.*, fasc. III, p. 17; id., *J. f. O.*, 1853, p. 292; *pulchrata*, Hodgs.; *vitticollis*, Hume; *rupicolus* (pt.), auct. plur. (nec Pall.); *gelastes*, Severtz. (nec Tem.) — Sibérie S.-W., Asie centr., Inde, Ceylan.

9697. LUGENS (Rüpp.), *Neue Wirb.*, p. 64, pl. 22, f. 2; Schl., *l. c.*, p. 119; Salvad., *Cat.*, p. 408. — Afrique E., de l'Abyssinie au 7° l. S.

β. *Homopelia.*

9698. PICTURATUS (Tem.), *Pig. et Gal.* I, pp. 315, 480; id., *Pl. Col.* 242; *dufresnii*, Leach; *picta* (pt.), Less.; *versicolor*, Kittl.; *prevostianus*, Bp.; ?*cinerea*, Scop.; ?*phœnicorhyncha*, Wagl. — Madagascar, Réunion, Maurice.

2569. *Var.* ABBOTTI, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1895, p. 513. — Seychelles.

9699. CHUNI (Rchw.), *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 140. — Ile Chagos.

9700. ALDABRANUS, Sclat., *P. Z. S.*, 1871, pp. 623, 692, pl. 73; Salvad., *Cat.*, p. 411. — Ile Aldabra.

2570. *Var.* COMORENSIS, E. Newt., *P. Z. S.*, 1877, p. 300; Salvad., *l. c.*, p. 412; *picturatus* (pt.), auct. plur. — Iles Comores.

2571. *Var.* COPPINGERI, Sharpe, *Rep. Voy. Alert.*, p. 484; Salvad., *l. c.* — Ile Glorioso.

2572. *Var.* SATURATA, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1895, p. 600. — Ile Poivre.

9701. ROSTRATUS, Bp., *Consp. Av.* II, p. 62; Hartl., *Faun. Madag.*, p. 67; Schl., *l. c.*, p. 130; *picturata*, *var.* Prév., *Pig.* II, texte de la pl. 55; *picturatus* (pt.), Schl. et Pol.; ?*miniata*, Tem., *Pig. et Gal.* I, pp. 369, 460; ?*cinereus* (pt.), Bp. — Iles Seychelles.

γ. *Streptopelia.*

9702. RISORIUS (Lin.); *Pl. Enl.* 244; Selby, *Nat. Libr., Pig.*, p. 170, pl. 17; *alba*, Tem. et Knip (aberr.); *var. cicurata*, Wagl. — Plus ou moins domestique (descend du suivant).

Digitized by Google

9703. ROSEOGRISEUS (Sundev.), *Krit. om Levaill.*, p. 54; Shell., *Ibis*, 1883, p. 309; *risoria*, Rüpp. (nec Lin.); *albiventris*, auct. plur. (nec Gr.); *fallax*, Schl., *l. c.*, p. 124. — Afrique N.-E., Arabie.

9704. SEMITORQUATUS (Rüpp.), *Neue Wirbelth., Vög.*, p. 66, pl. 23, f. 2; Salvad., *Cat.*, p. 416; *levaillanti*, Tem. *(ubi)*, Less., *Tr. Orn.*, p. 473; *erythrophrys* (pt.), auct. plur. (nec Sw.); *vinaceus* (pt.), Gr.; *gumri*, Rchb. — Presque toute l'Afrique jusqu'au 14° l. N.

2573. *Var.* ERYTHROPHRYS, Sw., *B. W. Afr.* II, p. 207, pl. 22; Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 121. — Côte-d'Or.

2574. *Var.* SHELLEYI, Salvad., *Cat. B. Br. Mus.* XXI, p. 419; *erythrophrys*, Antin. (nec Sw.); *semitorquatus, var.*, Shell. — Du Niger au Haut-Nil Blanc.

9705. DECIPIENS, Fch. et Hartl., *Vög. Ostafr.*, p. 544; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* I, 2, p. 833; *risoria* (pt.), auct. plur.; *collaris*, Hempr. — Dongola.

2575. *Var.* AMBIGUA, Boc., *Orn. Ang.*, p. 386 (*ambiguus*); Rchw., *J. f. O.*, 1892, p. 13; *semitorquatus*, Kirk (nec Rüpp.); *decipiens* (pt.), auct. plur. — Afrique austr. et N.-E., du 20° l. S. au 9° l. N.

9706. PERSPICILLATUS, Fisch. et Rchw., *J. f. O.*, 1884, p. 179; Fisch., *Zeitschr. Ges. Orn.*, 1884, p. 377; *albiventris*, Böhm (nec Gr.); *capicola* (pt.), Schal. — Massaïland (Afrique centr. E.)

9707. BITORQUATUS (Tem. et Knip), *Pig.* I, p. 86, pl. 40; Schl., *l. c.*, p. 121; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 153; id., *Cat.*, p. 421. — Java, Lombock, Sumbawa, Flores, Solor, Timor.

9708. DUSSUMIERI (Tem.), *Pl. Col.* 188; Prév. et Knip, *Pig.* II, pl. 20; Schl., *l. c.*, p. 120; Salvad., *Cat.*, p. 425; *gaimardi*, Bp., *Consp.* II, p. 66. — Bornéo N.-E., Philippines, îles Soulou et Marianne.

9709. CAPICOLA (Sundev.), *Krit. om Levaill.*, p. 54 (*C. vinacea, var. capicola*); Fch. et Hartl., *Vög. Ostafr.*, p. 548; Salvad., *Cat.*, p. 424; *risoria* (pt.), auct. plur.; *humilis* (fem.), Tem., *Pl. Col.* 258; *vinaceus* (pt.) et *semitorquatus* (pt.), auct. plur.; *albiventris* (pt.), Gray; *delalandii*, Scl. — Colonie du Cap, Natal, Transvaal.

2576. *Var.* DAMARENSIS, Fch. et Hartl., *Vög. Ostafr.*, p. 550; Rchw., *J. f. O.*, 1892, p. 14; Salvad., *l. c.*, p. 426; *risoria, vinaceus, albiventris, semitorquatus* et *capicola* (pt.), auct. plur. — Angola, Damaras, Afrique E., Madag. et îles Comores.

2577. *Var.* REICHENOWI, Erl., *Orn. Mon.*, 1901, p. 182. — Afrique N.-E.

9710. VINACEUS (Gm.); *Pl. Enl.* 161; Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 123; Salvad., *Cat.*, p. 428; *senegalensis*, Müll. (nec Lin.); *risoria* (pt.), Tem.; *semitorquatus*, Sw. (nec Rüpp.); *albiventris*, Gray; *barbara*, Antin. — Afrique W. (de Sénégambie au Loango) et N.-E.

Digitized by Google

9711. DOURACA, Hodgs., in *Gr. Zool. Misc.*, p. 85; Schleg., *l. c.*, p. 123; Stejn., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 427; *risoria*, Pall. et auct. plur. (nec Lin.); Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 387; Dress., *B. Eur.* VII, p. 51, pl. 464, f. 2; *ridens*, *intercedens*, Brm.; *vitticollis*, Prjew. (nec Tem.); *chinensis*, Severtz.; *torquata*, Bogd. (1). — Europe S.-E., Palestine, Perse, Inde, Birmanie, Chine et Japon.

2578. *Var.* STOLICZKÆ, Hume, *Str. Feath.* II, p. 519; *douraca* (pt.), Salvad. — Asie centr.

δ. *Onopopelia.*

9712. HUMILIS (Tem.), *Pl. Col.* 259 (nec pl. 258); Salvad., *Cat.*, p. 434; *terrestris*, Rchb.; *humilior*, Hume, *Pr. As. Soc. Beng.*, 1874, p. 241. — Andamans, Bengale E., Indo-Ch., Malacca, Chine, Jap., Philipp.

2579. *Var.* TRANQUEBARICA (Herm.), *Obs. Zool.*, p. 200 (1804); Wald., *Tr. Z. S.* IX, p. 219; Salvad., *l. c.*, p. 437; *humilis*, auct. plur. (nec Tem.); *murwensis*, Hodgs. — Inde.

ε. *Spilopelia.*

9713. CHINENSIS (Scop.); Gr., *Gen. B.* II, p. 472; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 386; Rchb., *Taub. Novit.*, *Suppl.*, pl. 3, f. 26; *tigrina* (pt.), Tem.; *sinensis*, Blyth. — Chine E., Formose, Haïnan.

9714. TIGRINUS (Tem. et Knip), *Pig.* I, pl. 45; Schl., *Mus. P.-B.*, *Col.*, p. 127; Salvad., *l. c.*, p. 440; *suratensis*, Boie (nec Gm.); *inornata* (juv.), Gr. et auct. plur.; *chinensis* (pt.), auct. plur. — Indo-Chine, Malacca, îles de la Sonde, Célèbes, Moluques.

9715. SURATENSIS (Gm.); Schl., *l. c.*, p. 129; Salvad., *l. c.*, p. 444; *tigrina* (pt.), auct. plur.; *vitticollis*, Hodgs.; *chinensis* (pt.), Gray; *ceylonensis*, Rchb.; ?*malabarica*, Gm. — Afghanistan, Inde, Ceylan.

ζ. *Stigmatopelia.*

9716. SENEGALENSIS (Lin.); Levaill., *Ois. d'Afr.* VI, p. 82, pl. 270; Bp., *Ucc. Eur.*, p. 52; Dress., *B. Eur.* VII, pl. 465; *testaceo-incarnata*, Forsk.; *ægyptiaca*, Lath.; *cambayensis*, Tem. et Knip, *Pig.* I, p. 100 (pt.), pl. 45; ?*afra*, Webb et Berth.; *rufescens*, *pygmæa*, Brm.; *savignii*, Rchb. — Afrique, Palestine, Socotra, Canaries.

2580. *Var.* CAMBAYENSIS (Gm.); Bp., *Consp.* II, p. 62; — Europe S.-E., Asie

(1) Plusieurs auteurs ont pensé que le *T. douraca* était l'ancêtre de la Tourterelle domestique (*T. risorius*, Lin.); mais d'après M. Shelley, cette dernière descendrait plutôt du *T. roseogriseus*.

Digitized by Google

Schl., *l. c.*, p. 120; *senegalensis* (pt.), auct. plur. (nec Lin.) — centr., Inde.

2581. ? *Var.* Ermanni, Bp., *Compt. Rend.* XLIII, pp. 942, 949; ?*ægyptiaca*, Severtz.; ?*senegalensis*, Dress., *Ibis*, 1876, p. 322. — Boukara.

## SUBF. III. — GEOPELIINÆ

### 1390. GEOPELIA

*Geopelia*, Sw. (1837); *Tomopeleia*, *Geopeleia*, *Stictopeleia*, Rchb. (1852); *Erythrauchæna*, *Tomopelia*, *Stictopelia*, Bp. (1854); *Chrysauchæna*, Bp. (1855).

9717. humeralis (Tem.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 128; id., *Pl. Col.* 192; Gould, *B. Austr.* V, pl. 72; *erythrauchen*, Wagl. — Australie, Nouv.-Guinée S.

9718. placida, Gould, *P. Z. S.*, 1844, p. 55; id., *Handb. B. Austr.* II, p. 145; *tranquilla*, Gould; id., *B. Austr.* V, pl. 73; Salvad., *Cat.*, p. 456. — Australie.

9719. striata (Lin.); Edw., *Birds*, I, pl. 16; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 155; id., *Cat.*, p. 458; *sinica*, Lin.; *malaccensis*, Gm.; *bantamensis*, Sparrm., *Mus. Carls.*, pl. 57; *lunulata*, *fowat*, Bonn.; *lineata*, Sw. — Siam, Ténassérim S., Malacca, îles de la Sonde, Philippines, Cél., Amboine (1).

9720. maugei (Tem.), *Pig. Index*, p. 49; Schl., *l. c.*, p. 132; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 157; id., *Cat.*, p. 461; *maugeus*, Tem. et Knip, *Pig.* I, p. 115, pl. 52; *albiventris*, Blyth; *multicincta*, Bp. — Timor, Flores, Sumbawa, Wetter, Lettie, Ténimber, Kei, Koobr.

9721. cuneata (Lath.), *Ind. Orn.*, *Suppl.*, p. 61; Gould, *B. Austr.* V, pl. 74; *macquarie*, Q. et G., *Voy. Uran.*, *Ois.*, p. 122, pl. 31; *spiloptera*, Vig. — Australie.

### 1391. SCARDAFELLA

*Scardafella*, Bp. (1854); *Micropelia*, Heine (1890).

9722. squamosa (Tem. et Knip), *Pig.* I, p. 127, pl. 59; Bp., *Consp.* II, p. 85; B., Br. et Rid., *Hist. N. Am. B.* III, p. 387; ?*fusca*, Gm., *squammata*, Less. — Brésil, Guyane fr., Vénézuéla, Colomb.

2582. *Var.* Ridgwayi, Richm., *Pr. U. S. Nat. Mus.* XVIII (1895), p. 660. — Ile Margarita, Vénéz.

2583. *Var.* Inca (Less.), *Descr. Mam. et Ois.*, p. 211; Bp., *Consp.* II, p. 85; Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 216; Coues, *Check-list*, n° 375; *squamosa* (pt.), auct. plur. (nec Tem.) — Ét.-Unis S.-W., Basse-Californie, Mexique jusqu'au Nicaragua.

(1) Introduit à Madagascar, aux îles Seychelles, Maurice, Réunion et St-Hélène.

Digitized by Google

### 1392. GYMNOPELIA

*Gymnopelia*, Scl. et Salv. (1873).

9723. ERYTHROTHORAX (Meyen), *Nov. Act. Ac. Leop.* XVI, *Suppl.*, p. 98, pl. 16; Scl. et Salv., *Nomencl. Av. Neotr.*, pp. 133, 156; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 249; *monticola*, Tsch.; *anais*, Less.; *gymnops*, Gray. — Pérou, Bolivie, Chili N.

## SUBF. IV. — CHAMEPELIINÆ

### 1393. COLUMBULA

*Columbina*, Spix (1825); *Columbula*, Bp. (1854).

9724. PICUI (Tem.), *Pig. et Gall.* I, pp. 435, 498; Knip et Prév., *Pig.* II, p. 71, pl. 39; Bp., *Consp.* II, p. 80; *strepitans*, Spix, *Av. Bras.* II, p. 57, pl. 73, f. 1; Burm., *Th. Bras.* III, p. 299. — Brésil S., Paraguay, Bolivie, Argentine, Chili.

### 1394. COLUMBIGALLINA

*Columbigallina*, Boie (1826); *Chæmepelia*, Sw. (1827); *Columbina*, Gr. (1840, nec Spix); *Chamepelia*, Gray (1841); *Chamæpeleia*, Rchb. (1852); *Talpacotia*, Bp. (1854); *Pyrgitænas*, Rchb. (1862); *Leptopelia*, Heine (1890).

9725. PASSERINA (Lin.); Tem. et Knip, *Pig.* I, pl. 13, 14; Vieill., *Gal. Ois.* I, p. 333, pl. 196; Audub., *Orn. Biogr.* V, p. 558, pl. 182; *hortulana*, Württ.; *trochila*, Bp., *Consp.* II, p. 77; *insularis*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 574 (1). — Antilles.

2584. *Var.* GRANATINA (Bp.), *Consp. Av.* II, p. 77; Burm., *Th. Bras.* III, p. 296; Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 556, *albivittata*, Bp., *l. c.* — Amér. mér. de Panama et des Guyanes jusqu'au 27° l. S.

2585. *Var.* PURPUREA (Mayn.), *Am. Exch. and Mart*, III, 1887, p. 33; Chapm., *Bull. Am. Mus. N. H.*, 1892, p. 293; *terrestris*, Chapm., *l. c.* — États-Unis S.-E.

2586. *Var.* PALLESCENS (Baird), *Pr. Philad. Acad.*, 1859, p. 303; Coop., *Orn. Calif.*, p. 517; *pusilla*, Licht. (*descr. nulla*). — Ét.-Unis S.-W., Basse-Californie, Mexique et Amérique centr.

(1) Les auteurs américains divisent cette espèce en plusieurs variétés et je veux bien les suivre. Mais le Comte Salvadori, qui a eu à sa disposition les nombreux spécimens des Musées de Londres et de Turin, n'admet pas ces divisions, et il les rapporte toutes à un type unique, offrant cependant de nombreuses variations individuelles. M. Sharpe, au contraire, fait de toutes ces variétés des espèces distinctes, mais il oublie de nous dire à laquelle de ces espèces appartiennent les sujets de l'Amérique méridionale; je pense qu'on peut les rapporter au type *granatina*, de Bonaparte. Quoi qu'il en soit, le *C. passerina* et ses variétés demandent à être réétudiés avec soin.



Digitized by Google

2587. *Var.* Socorroensis, Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 586. — Ile Socorro.

2588. *Var.* Bahamensis (Mayn.), *Am. Exch. and Mart*, III, 1887, p. 33. — Iles Bahama.

2589. *Var.* Bermudiana, Bangs et Brad., *Auk.*, 1901, p. 250. — Iles Bermudes.

2590. *Var.* Perpallida, Hart., *Ibis*, 1893, p. 304. — Aruba, Bonaire, Cur.

9726. minuta (Lin.); Tem. et Knip, *Pig.* I, p. 28, pl. 16; *grisea*, Bonn.; *griseola*, Spix, *Av. Bras.* II, p. 58, pl. 75ᵃ, f. 2 (juv.); Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 244; *chalcostigma*, Rchb.; *rachidialis*, Schiff; *amazilia*, Bp. — Mexique S., Amérique centr. et Amérique mér. jusqu'au 24° l. S. environ.

9727. cruziana (Prév. et Knip), *Pig.* II, p. 89, pl. 48; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 248; *gracilis*, Tsch.; id., *Faun. Per.*, pp. 45, 277, pl. 30. — Ecuador, Bolivie, Pérou, Chili N.

9728. buckleyi (Scl. et Salv.), *P. Z. S.*, 1877, p. 21; Salvad., *Cat.*, p. 484, pl. 10, f. 2. — Ecuador, Pérou.

9729. talpacoti (Tem. et Knip), *Pig.* I, p. 22, pl. 12 (*minuta*, err.); Selby, *Nat. Libr.*, *Pig.*, p. 200, pl. 22; *cabocola*, Spix; *cinnamomina*, Sw.; *cinnamomea* et *godina*, Bp., *Consp.* II, p. 79. — Guyane, Vénézuéla, Pérou, Bolivie, Brésil, Paraguay.

9730. rufipennis (Bp.), *Consp.* II, p. 79; id., *Icon. Pig.*, pl. 121; Schl., *Mus. P.-B.*, *Col.*, p. 156. — Du Mexique à Panama, Col., Vénéz., Guyane.

## 1395. UROPELIA

*Uropelia*, Bp. (1854); *Uropeleia*, Rchb. (1862).

9731. campestris (Spix), *Av. Bras.* II, p. 57, pl. 75, f. 2; Bp., *Consp.* II, p. 85; Schl., *l. c.*, p. 138; *venusta*, Tem., *Pl. Col.* 341, f. 1; *turturina*, Desm.; *flavipes*, Natt. — Brésil, Bolivie.

## 1396. OXYPELIA

*Oxypelia*, Salvad. (1893).

9732. cyanopis (Pelz.), *Orn. Bras.*, pp. 277, 336; Salvad., *Cat.*, p. 490, pl. 10, f. 1. — Cujaba (Brésil centr.)

## 1397. CLARAVIS

*Peristera*, Sw. (1827, nec Rafin., 1815); *Claravis*, Oberh. (1899).

9733. cinerea (Tem. et Knip), *Pig.* I, p. 126, pl. 58 (nec Scop.); Tem., *Pl. Col.* 266 (fem.); Bp., *Icon.*, pl. 125, f. 1 (fem.); Salvad., *Cat.*, p. 491; ?*ustulata*, Licht.; *pretiosa*, F.-Perez, *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1886, p. 175; Oberh., *Pr. Ac. N. S. Philad.*, 1899, p. 203. — Mexique S., Amérique centr. et Amérique mér. jusqu'au Paraguay et Pérou.

Digitized by Google

9734. GEOFFROYI (Tem. et Knip), *Pig.* I, pl. 57 (mas.); Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 139; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 250; *godefrida*, Tem. et Knip, *l. c.*, p. 125; *trifasciata*, Rchb. (fem.) — Brésil S., E.

9735. MONDETOURA (Bp.), *Compt.-Rend.* XLII, pp. 765, 957; id., *Icon. Pig.*, pl. 126, ff. 1, 2; Tacz., *l. c.*, p. 251; Oberh., *Pr. Ac. N. S. Philad.*, 1899, p. 205; *lansbergii*, Schl., *l. c.*, p. 139; ? *melancholica*, Tsch., *Arch. f. Naturg.*, 1844, 1, p. 506; id., *Fna. Per.*, pp. 45, 277. — Du S. du Mexique au Pérou, Vénézuéla.

### 1398. METRIOPELIA

*Metriopelia*, Bp. (1854); *Metriopeleia*, Rchb. (1862).

9736. MELANOPTERA (Mol.), *Hist. Nat. Chili*, p. 308; Bp., *Consp.* II, p. 75; Schl., *l. c.*, p. 153; *boliviana*, Eyd. et Gerv., *Mag. de Zool.*, 1836, p. 33, pl. 75; d'Orb. et Lafr., *Voy. Favor.* II, p. 59, pl. 23; *innotata*, Hartl.; *melanura*, Rchb. — De l'Ecuador au Chili, Mendoza.

9737. AYMARA (Knip et Prév.), *Pig.* II, p. 62, pl. 32; Bp., *l. c.*, p. 76; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 240; *aurisquamata*, Leyb. — Bolivie, Pérou, Chili N., Argentine.

## SUBF. V. — PHABINÆ

### 1399. OENA

*OEna*, Selby (1837); *Æna*, Layard (1867).

9738. CAPENSIS (Lin.); Tem. et Knip, *Pig.* I, pl. 53, 54; Tem., *Pl. Col.* 341, f. 2 (juv.); Schl., *l. c.*, p. 145; Salvad., *Cat.*, p. 501; *atricollis*, Müll.; *atrogularis*, Wagl.; *ocellata*, Württ. — Afrique trop. et S., Arabie, Madagasc.

### 1400. TYMPANISTRIA

*Tympanistria*, Rchb. (1852).

9739. BICOLOR, Rchb., *Av. Syst. Nat.*, p. XXV (1852); Bp., *l. c.*, p. 67; *Col. tympanistria*, Tem. et Knip, *l. c.*, p. 80, pl. 36; Schl., *l. c.*, p. 143; Hartl., *Vög. Madag.*, p. 271; *fraseri*, Bp., *l. c.*, p. 67. — Afrique austr., Madagascar, Comores, Fernando-Po.

9740. VIRGO, Hartl., *Ibis*, 1886, p. 2; id., *Zool. Jahrb.* II, p. 331. — Djanda (Afr. équat. E.)

### 1401. CHALCOPELIA

*Chalcopelia*, Bp. (1854); *Chalcopeleia*, Rchb. (1862); *Calopelia*, Salvad. (1893).

9741. AFRA (Lin.); Tem. et Knip, *l. c.*, p. 85, pl. 58, 59; — Toute l'Afrique au S.

Digitized by Google

Levaill., *Ois. d'Afr.* VI, p. 84, pl. 271; Schl., *l. c.*, p. 144; Bp., *Consp.* II, p. 67; Fch. et Hartl., *Vög. Ostafr.*, p. 554; *senegalensis*, Rüpp.; *cruziana*, Rchb.; *parallinostigma*, Württ. — du 17° l. N. (parties boisées).

2591. *Var.* CHALCOSPILOS (Wagl.), *Syst. Av. Col.*, sp. 85; Sw., *B. W. Afr.* II, p. 210; Schl., *l. c.*, p. 144; Rchb., *Tauben*, I, p. 79, pl. 257, ff. 1427-28; v. Erl., *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 183. — Afrique au S. du 17° l. N. (régions des steppes).

9742. PUELLA (Schl.), *Bijdr. tot de Dierk.*, 1848, p. 17, pl.; id., *Mus. P.-B., Col.*, p. 134; Salvad., *Cat.*, p. 523. — De la Côte-d'Or au Gabon (Afr. W.)

2592. *Var.* BREHMERI, Hartl., *Ibis*, 1865, p. 256; id., *J. f. O.*, 1865, p. 97. — Du Gabon au Loango.

## 1402. CHALCOPHAPS

*Chalcophaps*, Gould (1845); *Monornis*, Hodgs. (1844).

9743. CHRYSOCHLORA (Wagl.), *Syst. Av. Col.*, sp. 79; Gould, *B. Austr.* V, pl. 62; *javanica*, Tem. et Knip, *l. c.*, pl. 26; *javanicoides*, *timorensis*, Bp.; *moluccensis* (pl.), Finsch.; *indica* (pl.), Schl.; ?*sandwichensis*, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1878, p. 288. — Petites îles de la Sonde, Mol., Nouv.-Guinée S.-E., Nouv.-Hébr., N.-Calédon., Austr.

2593. *Var.* LONGIROSTRIS, Gould, *B. Austr.*, *Introd.*, p. 69; Bp., *l. c.*, p. 92. — Port Essington.

9744. INDICA (Lin.); *Pl. Enl.* 177; Bp., *l. c.*, p. 91; Rowl., *Orn. Misc.* I, p. 119, pl. 51; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 384; *javanensis*, Müll.; *pileata*, Scop.; *albicapilla*, *javanica*, Gm.; *cæruleocephala*, Lath.; *cyaneopileata*, *griseocapillata*, Bonn.; *superciliaris*, Wagl.; *perpulchra*, Hodgs.; *augusta*, Bp.; *bornensis*, S. Müll.; *moluccensis*, Gr.; *formosana*, Swinh. — Inde, Ceylan, Chine, Formose, Indo-Ch., Malac., îles Andam., Nicobar, de la Sonde, Célèbes, Moluques, Nouv.-Guinée.

2594. *Var.* SANGHIRENSIS, W. Blas., *Russ' Isis*, 1888, p. 78; id., *Ornis*, 1888, p. 625; Salvad., *Cat.*, p. 513. — Grande Sanghir.

2595. *Var.* NATALIS, List., *P. Z. S.*, 1888, p. 522. — Ile Christmas.

9745. STEPHANI, Rchb., *Syn. Av. Columb.*, *Novit.*, pl. 259, f. 2595; Pach. et Jacq., *Voy. Pôle S.*, *Zool.* III, p. 119, *Atl.*, pl. 28; Schl., *l. c.*, p. 151; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 653; *albifrons*, *etiennei*, Bp.; *hombroni*, Wall. (fem.); *wallacei*, Brügg., *Abh. Nat. Ver. Brem.* V, p. 464. — Célèbes, îles Papous, arch. Bismarck, île du Duc York.

9746. MORTONI, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1881, p. 725; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 562; id., *Cat.*, p. 522; *chrysochlora*, Rams. (1879, nec Gould); *stephani*, Grant (nec Rchb.) — Iles Salomon (Guadalcanar).

Digitized by Google

## 1403. HENICOPHAPS

*Henicophaps*, G. R. Gray (1861); *Rynchænas*, Rosenb. (1862).

9747. ALBIFRONS, G. R. Gray, *P. Z. S.*, 1861, pp. 452, 457, pl. 44; Schl., *l. c.*, p. 156; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 183; *schlegeli*, Rosenb. — Nouv.-Guin., Waigiou, Ghemien, Salawatti, Arou.

## 1404. PHAPS

*Phaps*, Selby (1835); *Peristera*, Sw. (1837, nec Rafin.); *Cosmopelia*, Sund. (1872); *Histriophaps*, Salvad. (1895).

9748. CHALCOPTERA (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 604; Tem. et Knip, *Pig.* I, p. 17, pl. 8; Selb., *Nat. Libr.*, *Pig.*, p. 195, pl. 21; Gould, *B. Austr.* V, pl. 64. — Australie et Tasmanie.

9749. ELEGANS (Tem. et Knip), *Pig.* I, p. 56, pl. 22; Selb., *l. c.*, p. 194; Gould, *B. Austr.* V, pl. 65; *lawsonii*, Sieber. — Australie S. et Tasmanie.

9750. HISTRIONICA (Gould), *P. Z. S.*, 1840, p. 114; id., *B. Austr.* V, pl. 66; Schl., *l. c.*, p. 154; ?*Col. meridionalis*, Lath. — Australie centr. jusqu'au Port Darwin, Australie N.-W.

## 1405. PETROPHASSA

*Petrophassa*, Gould (1840).

9751. ALBIPENNIS, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 173; id., *B. Austr.* V, pl. 71; Salvad., *Cat.*, p. 530. — Australie N.-W.

9752. RUFIPENNIS, Coll., *P. Z. S*, 1898, p. 354, pl. 28. — Australie N.

## 1406. GEOPHAPS

*Geophaps*, Gould (1842).

9753. SCRIPTA (Tem.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 127; id., *Pl. Col.* 187; Gould, *B. Austr.* V, pl. 67; Schl., *Mus. P.-B.*, *Col.*, p. 155; *inscripta*, Wagl. — Australie N.-W. et E.

9754. SMITHI (Jard. et Sel.), *Ill. Orn.* II, pl. 104; Gould, *B. Austr.* V, pl. 68; Schl., *Mus. P.-B.*, *Col.*, p. 155. — Australie N. et N.-W.

## 1407. LOPHOPHAPS

*Lophophaps*, Rchb. (1852); *Geophaps* (pt.), auct. plur.

9755. PLUMIFERA (Gould), *P. Z. S.*, 1842, p. 19; id., *B. Austr.* V, pl. 69; Schl., *l. c.*, p. 155. — Australie N.-W.

Digitized by Google

2596. *Var.* FERRUGINEA, Gould, *Handb. B. Austr.* II, p. 137; id., *B. Austr., Suppl.*, pl. 69; *plumifera* (pt.), Schl. — Australie W.

9756. LEUCOGASTER, Gould, *B. Austr., Suppl.*, pl. 69; Salvad., *Cat.*, p. 535. — Australie N.-W.

### 1408. OCYPHAPS

*Ocyphaps*, Gould (1842).

9757. LOPHOTES (Tem.), *Pl. Col.* 142; Gould, *B. Austr.* V, pl. 70; Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 156. — Australie N., E. et S.

## SUBF. VI. — GEOTRYGONINÆ

### 1409. HAPLOPELIA

*Aplopelia*, Bp. (1854); *Haplopeleia*, *Sericopeleia*, Rchb. (1862); *Haplopelia*, Sundev. (1872).

9758. LARVATA (Tem. et Knip), *Pig.* I, p. 71, pl. 31; Levaill., *Ois. d'Afr.* VI, p. 80, pl. 269; Bp., *Consp.* II, p. 66; ?*erythrothorax*, Tem. et Knip, *l. c.*, p. 15, pl. 7; ? *angustipennis*, Bp.; *sylvestris*, Forst.; *erythrogastra*, Rchb.; ? *rufaxilla*, Hart. — Afrique S., de la colonie du Cap au Transvaal.

2597. *Var.* KILIMENSIS, Neum., *J. f. O.*, 1898, p. 289. — Kilima Ndjaro.

9759. BRONZINA (Rüpp.), *Neue Wirbelth.*, p. 65, pl. 23, f. 1; Bp., *l. c.*, p. 66; Salvad., *Cat.*, p. 540; *larvata* (pt.), Shell., 1883, Salvad., 1884-88, Hart., 1891. — Abyssinie, Choa.

9760. JOHNSTONI, Shell., *Ibis*, 1893, p. 28, pl. 3. — Nyassaland.

9761. INORNATA, Rchw., *Allg. deutsch. Orn. Ges., Bericht*, 1892, p. 6; id., *J. f. O.*, 1892, p. 179. — Caméron.

9762. PRINCIPALIS (Hartl.), *P. Z. S.*, 1866, p. 330; Gray, *Hand-list*, n° 9405; Shell., *Ibis*, 1883, p. 295. — Ile Principe (Afr. W.)

9763. SIMPLEX (Hartl.), *Rev. et Mag. de Zool.*, 1849, p. 497; id., *Beitr. Orn. Westafr.*, p. 55, pl. 10; Bp., *l. c.*, p. 67; Salvad., *Cat.*, p. 542. — Ile St-Thomas (Afr. W.)

### 1410. LEPTOPTILA

*Leptotila*, Sw. (1837); *Leptoptila*, Gray (1841); *Homoptila*, Salvad. (1871); *Engyptila*, Sundev. (1872); *Æchmoptila*, Coues (1878).

9764. FULVIVENTRIS, Lawr., *Ann. N. Y. Ac.* II, 1882, p. 287; *brachyptera*, Gray (*descr. nulla*); Salvad., *Cat.*, p. 545; *albifrons*, Scl. (nec Bp.), *P. Z. S.*, 1857, — Texas, Mexique jusqu'au Nicaragua.

Digitized by Google

p. 214; Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 214, pl. 62, f. 3; ?*verreauxi*, Nutt. (nec Bp.); *vinaceifulva*, Lawr. (aberr.)

2598. *Var.* CAPITALIS, Nels., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1898, p. 6; *brachyptera* (pt.), Salvad. — Iles Tres Marias.

9765. VERREAUXI, Bp., *Consp. Av.* II, p. 73; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 256; Salvad., *Cat.*, p. 548; *jamaicensis*, Jard. (nec Lin.); *brevipennis*, Gray; *rufaxilla* (pt.), Gr., Tacz. (1874); *albifrons*, Scl. (1860); Berl. (1885, nec Bp.); *riottei*, Lawr.; *ochroptera*, Salv. et Scl. — Du Costa-Rica à la Colombie, Ecuador, Pérou, Vénézuéla, Guyane.

2599. *Var.* INSULARIS, Richm., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1895, p. 659. — Ile Margarita (Vénéz.)

9766. RUFAXILLA (Rich. et Bern.), *Act. Soc. H. N. Paris*, I, p. 118 (1792); Selby, *Nat. Libr., Pig.*, pl. 24; *frontalis*, Tem. et Knip, *Pig.* I, p. 18, pl. 10; *jamaicensis*, auct. plur. (nec Lin.); *dubusi*, Bp. — Guyane, Amazone, Pérou, Ecuador, Colombie.

9767. PLUMBEICEPS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, p. 59; Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 160; *rufaxilla*, Bp. (nec Rich. et Bern.); *bonapartii*, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1871, p. 15. — Mexique E., Guatémala.

9768. REICHENBACHI, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 279, 337, 451; Salvad., *Cat.*, p. 553; *rufaxilla*, Max (nec auct.); *macrodactylus*, Gray (*descr. nulla*); *frontalis*, Burm. (nec Tem.); *erythrothorax*, auct. plur. (nec Tem.); *rufescens*, Berl., *J. f. O.*, 1874, p. 246. — Brésil S., Uruguay.

2600. *Var.* BAHIÆ, Salvad., *Cat. B.* XXI, p. 553; *reichenbachi*, Berl. (nec Pelz.) — Bahia (Brésil).

9769. CHLOROAUCHENIA, Gigl. et Salvad., *Atti R. Ac. Sc. Tor.*, 1870, p. 274; Salv. et Scl., *Ibis*, 1871, p. 435; *jamaicensis* (pt.), auct. plur. (nec Lin.); *frontalis* (fem.), Burm. (nec Tem.); *chalcauchenia*, Scl. et Salv.; Scl., *Arg. Orn.* II, p. 144; *rufaxilla*, Reinh. (nec R. et B.); ?*megalura*, White. — Brésil S., Paraguay, Uruguay, Argentine, Bolivie.

9770. CALLAUCHEN, Salvad., *Boll. Mus. Zool. Torino*, 1897, n° 292, p. 33. — San-Lorenzo (Argentine).

9771. OCHROPTERA, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 278, 451; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 255; Salvad., *Cat.*, p. 555; *brasiliensis*, Gray (*descr. nulla*); *brevipennis* (pt.), Gr.; *decipiens*, Salvad. — Brésil.

9772. MEGALURA, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1879, p. 640; Salvad., *Cat.*, p. 556, pl. 13. — Bolivie.

9773. SATURATA, Salvad., *Boll. Mus. Zool. Torino*, 1897, n° 292, p. 33. — San-Lorenzo (Argentine).

9774. DECOLOR, Salv., *Novit. Zool.* II, p. 21. — Pérou N.

9775. JAMAICENSIS (Lin.); Gosse, *B. Jam.*, p. 313; Bp., *Icon.* — Jamaïque.

Digitized by Google

*Pig.*, pl. 119; Salvad., *Cat.*, p. 557; *albifrons*, Bp., *Consp.* II, p. 74.

9776. GAUMERI (Lawr.), *Ann. N. Y. Ac.*, 1884, p. 157; Salvad., *Cat.*, p. 557; *jamaicensis* (pt.), Salv. — Yucatan N., îles Cozumel, Jolbox et Mug.

2601. *Var.* COLLARIS (Cory), *Auk*, 1886, p. 498; Salvad., *l. c.*, p. 559. — Grand Cayman.

2602. *Var.* NEOXENA (Cory), *Auk*, 1887, p. 179; Salvad., *l. c.* — Ile St-Andrew.

9777. WELLSI (Lawr.), *Auk*, 1884, p. 180; Cory, *B. W. Ind.*, p. 212. — Ile Grenada (Antilles).

9778. PALLIDA, Berl. et Tacz., *P. Z. S.*, 1883, p. 575, 1885, pp. 111, 117, 121; Salvad., *l. c.*, p. 560. — Ecuador W.

9779. CASSINI, Lawr., *Pr. Ac. N. S. Philad.*, 1867, p. 94; id., *Ibis*, 1868, p. 230; Rowl., *Orn. Misc.* III, p. 8, pl. 92; *verreauxi*, Cass. (nec Bp.) — Costa-Rica, Véragua, Panama.

2603. *Var.* VINACEIVENTRIS (Ridgw.), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 583; Salvad., *l. c.*, p. 561. — Honduras, Nicaragua.

2604. *Var.* CERVINIVENTRIS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, p. 60; *cassini*, Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 159 (nec Lawr.) — Honduras angl., Guatémala.

9780. RUFINUCHA, Scl. et Salv., *Nomencl. Av. Neotrop.*, pp. 133, 162; Salvad., *l. c.*, p. 562. — Véragua.

## 1411. OSCULATIA

*Osculatia*, Bonap. (1854).

9781. SAPPHIRINA, Bp., *Consp. Av.* II, p. 73; id., *Icon. Pig.*, pl. 116; Salvad., *l. c.*, p. 563. — Ecuador E.

9782. PURPUREA, Salv., *Ibis*, 1878, p. 448; Salvad., *l. c.*, p. 563, pl. 14. — Ecuador.

## 1412. GEOTRYGON

*Geotrygon*, Gosse (1847); *Oreopeleia*, Rchb. (1852); *Oropeleia*, Bp. (1854).

9783. VIOLACEA (Tem. et Knip), *Pig.* I, p. 67, pl. 29; Bp., *Consp.* II, p. 72; Schl., *l. c.*, p. 165; *cayanensis*, Burm.; *albiventer*, Lawr.; *albiventris*, Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 78. — Brésil, Guyane, Amérique centr.

9784. MONTANA (Lin.); *Pl. Enl.* 141; Levaill., *Ois. d'Afr.* VI, p. 114, pl. 282; Schl., *l. c.*, p. 165; Salvad., *l. c.*, p. 567; *martinica*, Tem. et Knip (nec Lin.) — Amérique centr. et mérid. jusqu'au Paraguay, Antilles.

9785. MARTINICA (Lin.); Selby, *Nat. Libr., Pig.*, p. 209, pl. 25; Salvad., *l. c.*, p. 570; *cuprea*, Wagl.; *montana* (pt.), auct. plur. (nec Lin.); *mystacea*, Lemb. (nec Tem.); ?*martinicana*, Rchb. — Petites Antilles.

Digitized by Google

9786. CHRYSIA, Bp., *Consp.* II, p. 72; Burm., *Thier. Bras.* III, p. 307; *montana*, Tem. et Knip, *l. c.*, p. 10, pl. 4 et auct. plur. (nec Lin.); *martinica* (pt.), auct. plur. — Haïti, Cuba, Bahamas et Florida Keys.

9787. MYSTACEA (Tem. et Knip), *Pig.* I, p. 124, pl. 56; Burm., *Th. Bras.* III, p. 307; Bp., *l. c.*, p. 71; Schl., *l. c.*, p. 164. — Petites Antilles.

9788. CRISTATA (Tem. et Knip, nec Gm.), *Pig.* I, p. 20, pl. 9 (1); Cory, *B. W. Ind.*, p. 218; Schl., *l. c.*, p. 164; *pacifica*, Vieill.; *versicolor*, Lafr., *Rev. Zool.*, 1846, p. 321; Des M., *Icon. Orn.*, pl. 47; *sylvatica*, Gosse, *B. Jam.*, p. 316. — Jamaïque.

9789. CANICEPS, Gurdl., *Journ. Bost. Soc. N. H.*, 1852, p. 315; id., *J. f. O.*, 1856, p. 110, 1861, p. 336, 1870, p. 282; Rchb., *Taub.* I, p. 52, *Novit.*, pl. 1, f. 7. — Cuba.

9790. VERAGUENSIS, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1866, p. 549; Salv., *Ibis*, 1874, p. 328, pl. 12; *rufiventris*, Lawr., *l. c.*, 1874, p. 90; Rowl., *Orn. Misc.* III, p. 77, pl. 93. — Du Costa-Rica à Panama.

2605. *Var.* CACHAVIENSIS, Hart., *Novit. Zool.* V, p. 504. — Ecuador N.-W.

9791. LAWRENCEI, Salv., *Ibis*, 1874, p. 329; *veraguensis* (pt.), Salv., *P. Z. S.*, 1867, p. 159. — Véragua W.

9792. COSTARICENSIS, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1868, p. 136; Salv., *Ibis*, 1869, p. 317; Rowl., *Orn. Misc.* III, p. 45, pl. 87. — Costa-Rica.

9793. FRENATA (Tschudi), *Arch. f. Naturg.*, 1843, I, p. 386; id., *Faun. Per.*, pp. 45, 278, pl. 28; Bp., *Consp.* II, p. 71; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 257. — Pérou, Bolivie.

2606. *Var.* ERYTHROPAREIA (Bp.), *Compt.-Rend.* XLIII, 1856, p. 944; Salvad., *Cat.*, p. 578; *bourcieri*, Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 79 (pt.), pl. 40 (nec Bp.) — Ecuador.

2607. *Var.* BOURCIERI, Bp., *Consp.* II, p. 71; Salvad., *Cat.*, p. 577; ? *frenata*, Tacz., *P. Z. S.*, 1880, p. 213 (nec Tsch.) — Ecuador, Pérou N.

9794. CHIRIQUENSIS, Sclat., *P. Z. S.*, 1856, p. 143; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 123, pl. 62; *cæruleiceps*, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1868, p. 136. — Véragua, Costa-Rica.

9795. LINEARIS (Prév. et Knip), *Pig.* II, p. 104, pl. 55; Bp., *Consp.* II, p. 71; Schl., *Mus. P.-B., Col.*, p. 164; Salvad., *Cat.*, p. 580. — Colombie.

2608. *Var.* VENEZUELENSIS, Salvad., *Cat.*, p. 581; *frenata*, Jard. (nec Tsch.); *linearis*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 782 (nec Prév.) — Vénézuéla.

9796. ALBIFACIES, Sclat. (ex Gr.), *P. Z. S.*, 1858, p. 98; Schl., — Mexique S., Guaté-

(1) Il n'y a pas lieu d'abandonner le nom de *cristata*, car l'oiseau désigné par Gmelin sous le nom de *Columba cristata* n'est pas un Pigeon, c'est le *Rollulus roulroul* (Scop.)



Digitized by Google

*l. c.*, p. 164; *mexicana* et *albifacies*, Gray (*descr. nulla*); *chiriquensis*, Bp. (nec Scl.); Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 77, pl. 39. — mala, Nicaragua.

## 1413. PHLOGOENAS

*Phlegœnas*, Rchb. (1851); *Pampusana*, Puch. (1853); *Pampusan*, Bp. (1856); *Phlogœnas*, Scl. (1861).

9797. LUZONICA (Scop.); Rchb., *Syn. Av. Columb., Novit.*, pl. 227, f. 2479; Schl., *l. c.*, p. 157; *cruenta*, Gm.; Tem. et Knip, *Pig.* I, p. 16, pl. 8; *cruentata*, Tem.; Garr., *P. Z. S.*, 1873, p. 468; *aberr.* : *nivea*, Scop.; *sanguinea*, Gm. — Ile Luçon (Philippines).

9798. CRINIGERA (Puch. et Jacq.), *Voy. Pôle S.* III, p. 118, pl. 27, f. 2; Bp., *Consp.* II, p. 88; Gould, *B. of As.* VI, pl. 52; *bartletti*, Scl., *P. Z. S.*, 1863, p. 377, pl. 34. — Mindanao, Basilan (Philippines).

9799. MENAGEI, Bourns et Worc., *Occ. Pap. Min. Ac.* I, p. 10. — Tawi-Tawi (Soulou).

9800. PLATENÆ, Salvad. (ex W. Blas. *in litt.*), *Cat. B. Br. Mus.* XXI, p. 588. — Mindoro (Philippines).

9801. KEAYI, Clarke, *Ibis*, 1900, p. 359, pl. 8. — Négros (Philippines).

9802. RUFIGULA (Jacq. et Puch.), *Voy. Pôle S.* III, p. 118, pl. 27, f. 1; Hartl., *J. f. O.*, 1854, p. 166; Bp., *Consp.* II, p. 89; Schl., *l. c.*, p. 157; Salvad., *Orn. Pap.* III, pp. 161, 561 (pt.) — Nouv.-Guinée, Waigiou, Salawatti, Mysol, Jobi.

2609. *Var.* HELVIVENTRIS (Rosenb.), *Nat. Tydschr. Ned. Ind.*, 1867, p. 144; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 164; id., *Cat.*, p. 590; *rufigula* (pt.), auct. plur. — Nouv.-Guinée S.-E., iles Arou.

9803. TRISTIGMATA, Bp., *Consp.* II, p. 88; Wall., *Ibis*, 1865, pp. 393, 400, pl. 9; Schl., *l. c.*, p. 158; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 654; *tristigma*, Fch., *Neu-Guin.*, p. 178; Salvad., *Cat.*, p. 590. — Célèbes N.

2610. *Var.* BIMACULATA, Salvad., *Bull. Br. Orn. Cl.* III, p. 10; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 656; *tristigmata* (pt.), auct. plur. (nec Bp.); Gould, *B. Asia*, VI, pl. 59. — Célèbes S.

9804. CANIFRONS, Hartl. et Fch., *P. Z. S.*, 1872, p. 101; Finsch, *Journ. Mus. Godeffr.* IV, Heft VIII, p. 27, pl. 5, f. 1; Salvad., *Cat.*, p. 592. — Iles Pelew.

9805. ?YAPENSIS, Hartl. et Fch., *P. Z. S.*, 1872, p. 102 (juv.); Salvad., *Cat.*, p. 595 (note). — Ile Uap (Mackenzie).

9806. BECCARII, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 974; id., *Orn. Pap.* III, p. 168; id., *Cat.*, p. 595, pl. 11, f. 1. — Ile Jobi?

Digitized by Google

9807. JOHANNÆ, Sclat., *P. Z. S.*, 1877, p. 112, pl. 16; Gould, *B. New-Guin.*, pt. VII, pl. 9; *stairii*, Rams (nec Gray). — Ile du Duc York.

9808. GRANTI, Salvad., *Cat.*, p. 594, pl. 11, f. 2; *johannæ*, Tristr. (nec Scl.); *solomonensis*, Grant, *P. Z. S.*, 1888, p. 186. — Guadalcanar (îles Salomon).

9809. STAIRI, Gray, *P. Z. S.*, 1856, p. 7, pl. 115; Hartl. et Feh., *Orn. Centralpol.*, p. 147; *erythroptera* (pt.), Bp.; *vitiensis*, Finsch, *J. f. O.*, 1872, p. 50. — Iles Fidji et Tonga.

2611. *Var.* SAMOENSIS, Finsch, *J. f. O.*, 1872, p. 50; Salvad., *Cat.*, p. 596; *stairii* (pt.), auct. plur. — Iles Samoa.

9810. SALOMONIS, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1882, p. 299; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 562; id., *Cat.*, p. 597 (note). — San Christoval? (îles Salomon).

9811. JOBIENSIS, Mey., *Mitth. Zool. Mus. Dresd.* I, p. 10 (aug. 1875); Gould, *B. New-Guin.*, pt. VII, pl. 8; *margaritæ*, D'Alb. et Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 836 (21 nov.); Salvad., *Cat.*, p. 597. — Nouv.-Guinée, Jobi, archipel Bismarck.

9812. KUBARYI, Finsch, *J. f. O.*, 1880, p. 292; Salvad., *l. c.*, p. 599; *erythroptera* (pt.), auct. plur. (nec Gm.) — Iles Carolines.

9813. ERYTHROPTERA (Gm.); Tem. et Knip, *Pig.* I, p. 123, pl. 55; Salvad., *Cat.*, p. 600, pl. 12, f. 2; *leucophrys*, Forst. — Ile Eiméo (Société)? Ile Bow,? îles Paumotu.

9814. ALBICOLLIS, Salvad., *Cat.*, p. 601, pl. 12, f. 1; *erythroptera* (pt.), auct. plur. (nec Gm.) — Ile Bow, îles Paumotu.

9815. XANTHONURA (Tem.), *Pl. Col.* 190; Hart., *Nov. Zool.* V, p. 60; *pampusan*, Quoy et G., *Voy. Uran. Zool.*, pl. 30; *xanthura*, auct. plur. (nec Forst.); *erythroptera* (pt.), auct. plur. (nec Gm.); *virgo*, Rchw., *J. f. O.*, 1885, p. 110. — Iles Mariannes.

9816. ?PECTORALIS (Peale), *U. S. Expl. Exp.*, *B.*, p. 205, pl. 59; *erythroptera* (pt.), auct. plur. — Ile Carlshoff (Paumotu).

9817. ?FERRUGINEA (Forst.), *Icon. ined.*, 142; *curvirostra*, Licht. (nec Gm.); *fulvicollis* (pt.), Gr., Bp. — Ile Tanna (Nouv.-Hébrides).

9818. ?RUBESCENS (Vieill.), *N. Dict.* XXVI, p. 346; Krusenst., *Voy.*, pl. 17, f. 1. — Ile Nukahiva (Marquises).

9819. ?EIMEENSIS (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 784, n° 60. — Ile Eiméo (Société).

## 1414. ALOPECOENAS

*Alopecœnas*, Finsch (1899).

9820. HOEDTI (Schl.), *Ned. Tijdschr. Dierk.* IV, p. 50; id., *Mus. P.-B.*, *Col.*, p. 165; Salvad., *Cat.*, p. 592; Finsch, *Not. Leyd. Mus.* XXII, p. 300, pl. 5. — Ile Wetter (au N.-E. de Timor).

Digitized by Google

### 1415. LEUCOSARCIA

*Leucosarcia*, Gould (1843).

9821. PICATA (Lath.), *Ind. Orn. Suppl.*, p. 59; Gould, *B. Austr.* V, pl. 63; *melanoleuca*, Lath.; *armillaris*, Tem. et Knip, *Pig.* I, p. 15, pl. 6; *jamiesoni*, Desm. — Australie E. et centr.

### 1416. EUTRYGON

*Trugon* (1) Gray (1849); *Trygon*, Rchb. (nec Andans.); *Eutrygon*, Sclat. (1858).

9822. TERRESTRIS (Jacq. et Pucher.), *Voy. Pôle S.*, *Zool.* III, p. 125, *Atlas*, *Ois.*, pl. 28, f. 1; Sclat., *Journ. Pr. Linn. Soc.*, 1858, p. 168; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 186; Schl., *l. c.*, p. 166. — Nouv.-Guinée W., Salawatti.

2612. *Var.* LEUCOPAREIA, Mey., *Zeitschr. Ges. Orn.*, 1886, p. 29; Salvad., *Cat.*, p. 610; *terrestris* (pt.), Sharpe. — Nouv.-Guinée S.-E.

### 1417. OTIDIPHAPS

*Otidiphaps*, Gould (1870).

9823. NOBILIS, Gould, *Ann. and Mag. N. H.*, 1870, p. 62; id., *B. Asia*, pt. XXIII, pl. 7; Schl., *l. c.*, p. 170; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 188. — Nouv.-Guinée W. et Batanta.

9824. CERVICALIS, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1879, p. 470 (*nobilis, var. cervicalis*); Sel. et Salv., *Ibis*, 1881, p. 179; Sharpe, *Gould's B. New-Guin.*, pt. XIII, pl. 1; *regalis*, Salv. et Godm., *Ibis*, 1880, p. 364, pl. 11. — Nouv.-Guinée S.-E.

9825. INSULARIS, Salv. et Godm., *P. Z. S.*, 1883, p. 33; Salvad., *Cat.*, p. 612, pl. 15. — Ile Fergusson.

### 1418. STARNOENAS

*Starnœnas*, Bp. (1858); *Sternœnas*, Rchb. (1847); *Perdicopelia*, Van der H. (1855).

9826. CYANOCEPHALA (Lin.); Tem. et Knip, *Pig.* I, p. 8, pl. 3; Bp., *Comp. List.*, p. 41; Audub., *B. Am.* V, p. 23, pl. 284; *tetraoides*, Scop. — Cuba, Florida Keys.

## SUBF. VII. — CALŒNADINÆ

### 1419. CALOENAS

*Geophilus*, Selby (1835, nec Leach, 1812); *Calœnas*, Gray (1840); *Phabalectryo*, Glog. (1842); *Calœna*, *Calliœnas*, Agass. (1846); *Callœnas*, Rchb. (1852).

9827. NICOBARICA (Lin.); *Pl. Enl.* 491; Tem. et Knip, *l. c.*, — Iles Nicobar, archipel

(1) *Trugon* est le nom français.

Digitized by Google

p. 5, pl. 2; *gallus*, Wagl.; *gouldiæ*, Gray et Hardw., *Ill. Ind. Zool.* II, pl. 57 (juv.) — Mergui, gr. Iles de la Sonde, Moluques, Nouv.-Guinée, archipel Bismarck.

2615. *Var.* PELEWENSIS, Finsch, *Journ. Mus. Godeff.* IV, p. 159; Salvad., *Cat.*, p. 618. — Iles Pelew.

9828. ?MACULATA (Gm.), *S. N.* I, p. 780, n° 52; Forbes, *Bull. Liverp. Mus.* I, p. 85, *Columbæ*, pl. 1. — ?

## FAM. IV. — GOURIDÆ

### 1420. GOURA

*Lophyrus*, Vieill. (1816, nec Latr., 1802); *Goura*, Steph. (1819); *Megapelia*, Kp. (1856); *Ptilophyrus*, Sw. (1837).

9829. CORONATA (Lin.); Tem. et Knip, *l. c.*, p. 1, pl. 1; Levaill., *Ois. d'Afr.* VI, p. 107, pl. 280; Vieill., *Gal. Ois.* I, p. 333, pl. 197; *mugiens*, Scop.; *indicus*, Steph.; *cristata*, Bp.; *minor*, Schl. — Nouv.-Guinée W., Waigiou, Batanta, Salawatti, Mysol.

9830. SCLATERI, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1876, pp. 45, 207; id., *Orn. Pap.* III, p. 199; id., *Cat.*, p. 622. — Nouv.-Guinée S. et centr.

9831. ALBERTISII, Salvad., *Atti R. Ac. Sc. Tor.*, 1876, pp. 628, 680, pl. 7; id., *Orn. Pap.* III, p. 202; id., *Cat.*, p. 623; *scheepmakeri*, Salvad. et d'Alb. (1875, nec Finsch.) — Nouv.-Guinée S.-E.

9832. SCHEEPMAKERI, Finsch, *P. Z. S.*, 1875, p. 631, pl. 68. — Nouv.-Guinée S.-W.?

9833. VICTORIA (Fras.), *P. Z. S.*, 1844, p. 136; Schl., *l. c.*, p. 169; *steursii*, Tem.; Gray, *Gen. B.* II, p. 479, pl. 120. — Iles Jobi et Mysori.

9834. BECCARII, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* VIII, p. 406 (1876); id., *Orn. Pap.* III, p. 268; *victoriæ, var. comata*, Oust. — Nouv.-Guinée N.

2614. *Var.* HUONENSIS, Mey., *Orn. Jahresb.* I, 1895, n° 4. — Nouv.-Guinée E.

9835. CINEREA, Hart., *Nov. Zool.* II, p. 67. — Nouv.-Guinée N.-W. (Arfak).

## FAM. V. — DIDUNCULIDÆ

### 1421. DIDUNCULUS

*Didunculus*, Peale (1844); *Gnathodon*, Jard. (1845); *Pleiodus*, Rchb. (1847); *Knathodon*, Peale (1848).

9836. STRIGIROSTRIS (Jard.), *Ann. and Mag. N. H.*, 1845, p. 175, pl. 9; Gould, *B. Austr.* V, pl. 76; Peale, *U. S. Expl. Exp. B.*, 1848, p. 209, pl. 60. — Iles Samoa.

Digitized by Google

# SUBCL. II. — PTILOPÆDES

## ORD. VII. — HETEROCLITÆ

### FAM. I. — PTEROCLIDÆ (1)

#### 1422. SYRRHAPTES

*Syrrhaptes*, Illig. (1811); *Nematura*, Fisch. (1812); *Heteroclitus*, Vieill. (1816).

9837. PARADOXUS (Pall.), *Russ. Reichs*, II, p. 712, pl. F.; Illig., *Prodr.*, p. 243; Dress., *B. Eur.* VII, p. 75, pl. 468; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg., Ois.* II, p. 27, pl. 171; *arenaria*, Pall., *Zoogr.* II, pl. 55; *tartaricus*, Vieill.; *pallasii*, Tem.; *heteroclita*, Vieill., *Gal. Ois.* III, p. 64, pl. 222; *fischeri*, Karel. — Asie centr. de la mer Caspienne au N.-E. de la Chine; accid. Europe, Belgique.

9838. TIBETANUS, Gould, *P. Z. S.*, 1850, p. 92; id., *B. Asia*, VI, pl. 61; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* I, p. 43, pl. — Thibet.

#### 1423. PTEROCLURUS

*OEnas*, Vieill. (1816, nec Latr., 1802); *Pteroclurus*, Bonap. (1856); *Pterygocius*, Heine (1890).

9839. ALCHATUS (Lin.); Jerd., *B. Ind.* II, p. 500; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* I, p. 77, pl.; *caudacutus*, Gm.; *chata*, Pall.; *arenarius*, Guér.-Men. (nec Pall.); *caspius*, Ménétr.; *sewerzowi*, Bogd.; *severtzovi*, Zar. — Asie S.-W., de Palestine et la Perse au N.-W. de l'Inde.

2615. *Var.* PYRENAICA (Briss.); Sech., *Ibis*, 1883, p. 26; *setarius*, Tem.; *cata*, Vieill.; *alchata*, Bp. (nec Lin.); Dress., *B. Eur.* VII, p. 67, pl. 467. — Afrique N., Europe S., à l'E. jusqu'à Chypre.

9840. NAMAQUA (Gm.); Bocage, *Orn. Angola*, p. 596; *tachypetes*, Tem., *Pig. et Gal.* III, pp. 274, 715; *simplex*, Roux. — Afrique S. jusqu'au Transv. et l'Angola.

(1) Voy. : Ogilvie-Grant, *Cat. Birds Brit. Mus.* XXII, pp. 2-32 (1893).

Digitized by Google

9841. EXUSTUS (Tem.), *Pl. Col.* 28, 29; Gould, *B. Asia*, VI, pl. 64; *senegalensis*, Licht. (nec Lin.); *elliotí*, Bogd. — Afrique N., E. et W., Asie S.-W.

2616. *Var.* SOMALICA, Hart., *Novit. Zool.* VII, p. 28. — Somaliland.

2617. *Var.* ORIENTALIS, Hart., *Novit. Zool.* VII, p. 28. — Inde.

9842. SENEGALLUS (Lin.), *Mantis.*, p. 526; Shell., *B. Egypt.*, p. 220; *senegalensis*, Rüpp.; *guttatus*, Licht.; Tem., *Pl. Col.* 345; Gould, *B. Asia*, VI, pl. 62. — Afr. N., N.-E. et N.-W., Asie S.-W. jusqu'au N.-W. de l'Inde.

## 1424. PTEROCLES

*Pterocles*, Tem. (1815); *Pteroclis*, Sharpe (1899).

9843. ARENARIUS (Pall.), *Nov. Com. Petrop.* XIX, p. 418, pl. 8; Tem., *Pl. Col.* 52, 53; Dub., *Ois. Eur.* II, p. et pl. 122; Dress., *B. Eur.* VII, p. 61, pl. 466, *var. magna*, Zaroudn.; *fasciatus*, Desf. (nec Scop.); *aragonica*, Lath. — Afrique N., Europe S., Asie S.-W. et centr.

9844. DECORATUS, Cab., *J. f. O.*, 1868, p. 413, 1870, pl. 3; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* III, p. 870. — Afr. E. (Kilima Ndjaro et pays voisins.)

9845. VARIEGATUS, Burch., *Trav. S. Afr.* II, p. 345; Smith, *Zool. S. Afr.*, pl. 10. — Afr. S. jusqu'au Transvaal et le Damara.

9846. CORONATUS, Licht., *Verz. Doubl.*, p. 65; Tem., *Pl. Col.* 339, 340; Gould, *B. Asia*, VI, pl. 63. — Afr. N.-E. et Asie S.-W. jusqu'à l'Inde N.-W.

2618. *Var.* ATRATA, Hart., *Bull. Br. Orn. Club*, fév. 1902. — Perse E.

9847. GUTTURALIS, Smith, *Rep. Exped. Afr.*, p. 56; id., *Zool. S. Afr.*, pl. 3 et 31; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* III, p. 862. — Afr. N.-E., E. et S. (du Transv. à l'Abyss.)

2619. *Var.* SATURATIOR, Hart., *Novit. Zool.* VII, p. 29. — Athi (Afrique E. angl.)

9848. PERSONATUS, Gould, *P. Z. S.*, 1843, p. 15; id., *Voy. Sulph. Zool.*, p. 49, pl. 30; Miln.-Edw. et Grand., *Hist. Madag. Ois.*, p. 48, pl. 196-98. — Madagascar.

9849. FASCIATUS (Scop.), *Del. Fl. et Faun.* II, p. 92; Gould, *B. Asia*, VI, pl. 65; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* I, p. 59; *indicus*, Gm.; *bicinctus*, Wagl.; *pictus*, Hodgs.; *quadricinctus*, Jerd. (nec Tem.), *Ind. Orn.*, pl. 10 et 36. — Inde.

9850. BICINCTUS, Tem., *Pig. et Gal.* III, pp. 247, 715; Str. et Scl., *Contr. Orn.*, 1852, p. 157; Grant, *Cat. B.*, p. 30. — Afrique centr. S. jusqu'au Mossamedes.

9851. QUADRICINCTUS, Tem., *Pig. et Gal.* III, pp. 252, 715; *bicinctus*, Licht.; Vieill., *Gal. Ois.* III, p. 60, pl. 220; *tricinctus*, Sw., *Orn.-W. Afr.*, p. 222, pl. 23 (fem.) — De Sénégambie à l'Abyssinie.

9852. LICHTENSTEINI, Tem., *Pl. Col.* 355, 361; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* III, p. 865; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* I, p. 66. — Afrique N.-E., Asie S.-W.

Digitized by Google

## FAM. II. — HEMIPODIIDÆ (1)

### 1425. TURNIX

*Turnix*, Bonn. (1790); *Tridactylus*, Lacép. (1801); *Ortygis*, Ill. (1811); *Hemipodius*, Tem. (1815); *Ortyx*, Oken (1816); *Ortygodes*, Vieill. (1816); *Areoturnix*, Bp. (1856); *Areortyx*, Heine (1887).

9853. PUGNAX (Tem.), *Pig. et Gal.* III, p. 612, 754; Schinz, *Nat. Vög.*, p. 165, pl. 80; ? *suscitator*, Gm.; *luzoniensis*, Horsf.; *taigoor* (pt.), Holdsw., Legge; *plumbipes*, Vorderm. (nec Hodgs.) — Billiton, Java, Sumatra, Ceylan S.-W.

2620. *Var.* TAIGOOR (Syk.), *P. Z. S.*, 1852, p. 155; Hume et Marsh., *Game B.* II, p. 169, pl.; *nigricollis*, Jard. (nec Gm.), *Nat. Lib.*, *Orn.* IV, p. 191, pl. 28; *plumbipes*, Hodgs.; *atrogularis*, Eyt.; *ocellatus*, Blyth (nec Scop.); *pugnax* (pt.), auct. plur.; *rostrata*, *blakistoni*, Swinh. — Inde, Ceylan N., Chine, Indo-Chine, Malacca, Formose et îles Loo-choo.

9854. FASCIATA (Tem.), *Pig. et Gal.* III, pp. 654, 757; *nigrescens*, Tweed., *P. Z. S.*, 1877, p. 765; *haynaldi*, Blas., *Ornis*, 1888, p. 317. — Philippines.

9855. RUFILATA, Wall., *P. Z. S.*, 1865, p. 480; Mey. et Wg., *B. Cel.* II, p. 686; *fasciatus*, Gould (nec Tem.); *B. Asia*, VII, pl. 11; *rufilateralis*, Rosenb. — Célèbes.

9856. POWELLI, Guillem., *P. Z. S.*, 1885, p. 510, pl. 29. — Sumbawa.

9857. SYLVATICA (Desf.), *Mém. Ac. R. Sc. Paris*, 1787, p. 500, pl. 13; Dress., *B. Eur.* VII, p. 249, pl. 494; *andalusicus* et *gibraltaricus*, Gm.; *africanus*, Bonn.; *tachydromus* et *lunatus*, Tem.; *albigularis*, Malh. — Europe S., Afrique N.

2621. *Var.* LEPURANA (Smith), *Rep. Exp.*, *App.*, p. 55; id., *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 16. — Afrique austr. jusqu'au 13° l. N.

9858. DUSSUMIERI (Tem.), *Pl. Col.* 454, f. 2; Gould, *B. Asia*, VII, pl. 10; *variabilis*, Hodgs.; *sykesi*, Sm.; *joudera*, Swinh., *Ibis*, 1861, p. 50 (nec Hodgs.) — Inde, Indo-Ch. N.-W., Pégou, Haïnan, Formose.

9859. HOTTENTOTTA (Tem.), *Pig. et Gal.* III, pp. 636, 757; Sharpe, *Lay. B. S. Afr.*, p. 607 (pt.) — Colonie du Cap.

2622. *Var.* NANA (Sundev.), *OEfv. Vet.-Akad. Förhandl.*, 1850, p. 110; Grant, *Ibis*, 1889, pp. 450, 463; *hottentotta* (pt.), Sharpe, Shell. — Afrique S., du 10° au 30° l. S.

9860. WHITEHEADI, Grant, *Handb. to the Game Birds*, II, p. 276. — Luçon.

9861. BLANFORDI, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1865, p. 80; *maculatus*, Vieill. (pt., nec Tem.); Dav. et Oust., — Du Bengal E. au Ténassérim, Siam,

(1) Voy. Ogilvie-Grant, *Cat. Birds Brit. Mus.* XXII, pp. 526-55 (1893).

Digitized by Google

*Ois. Chine*, p. 398; *maculosa*, Gray; Hume et Marsh., *Game B.* II, p. 183, pl.; *viciarius, chrysostomus* et *cathareus*, Swinh.; *variabilis*, Prjev. — Chine, Mandchourie.

9862. TANKI, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1843, p. 180; *joudera*, Hodgs.; Hume et Marsh., *Game B.* II, p. 187, pl.; *dussumieri*, Jerd. (nec Tem.), *B. Ind.* II, p. 599. — Inde, Himalaya.

9863. ALBIVENTRIS, Hume, *Str. Feath.* I, p. 310; Hume et Marsh., *l. c.*, p. 199, pl. — Iles Andamans et Nicobars.

9864. MACULOSA (Tem.), *Pig. et Gal.* III, pp. 651, 757; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 687; *maculatus*, Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 51, pl. 217 (fem.); *melanotus*, Gould; id., *B. Austr.* V, pl. 84; *beccarii*, Salvad. — Australie N. et E., Nouv.-Guinée S., Célèbes S.-E.

2623. *Var.* SATURATA, Forb., *Ibis*, 1882, p. 428, pl. 12; *melanotus* (pt.), auct. plur. — Nouv.-Bretagne, île Duc York.

2624. *Var.* RUFESCENS, Wall., *P. Z. S.*, 1865, p. 497. — Iles Sémao et Timor.

9865. OCELLATA (Scop.), *Del Fl. Faun. Insubr.* II, p. 88; Mey., *Nov. Act. Acad. C. L.-C. Nat. Cur.*, 1854, *Suppl.*, p. 101, pl. 17; *luzoniensis*, Gm.; *thoracicus*, Tem.; *rufus*, Vieill. — Luçon (Philippines).

9866. NIGRICOLLIS (Gm.); Vieill., *N. Dict.* XXXV, p. 45; M.-Edw. et Grand., *Madag., Ois.*, p. 494, pl. 202. — Madagascar.

9867. MELANOGASTER, Gould, *P. Z. S.*, 1837, p. 7; id., *B. Austr.* V, pl. 81. — Australie E.

9868. VARIA (Lath.); Gould, *Syn. B. Austr.*, pl., f. 1; id., *B. Austr.* V, pl. 82; *scintillans*, Gould; id., *B. Austr.* V, pl. 83. — Australie.

2625. *Var.* NOVÆ-CALEDONIÆ, Grant, *Cat. B.* XXII, p. 552 (en note); *varia* (pt.), Grant, *Ibis*, 1889, p. 474. — Nouv.-Calédonie.

9869. CASTANONOTA (Gould), *P. Z. S.*, 1839, p. 145; id., *B. Austr.* V, pl. 85; Grant, *Ibis*, 1889, pp. 453, 474. — Australie N.

9870. PYRRHOTHORAX, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 150; id., *B. Austr.* V, pl. 86; id., *Handb. B. Austr.* II, p. 186. — Australie N.-E., E., S. et centr.

9871. EVERETTI, Hart., *Nov. Zool.* V, p. 476. — Ile Sumba.

9872. LEUCOGASTER, North, *Ibis*, 1895, p. 342. — Australie centr.

9873. OLIVEI, Rob., *Bull. Br. Orn. Cl.*, 1900, p. 43. — Queensland N.

9874. VELOX, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 150; id., *B. Austr.* V, pl. 87; id., *Handb. B. Austr.* II, p. 184. — Australie.

## 1426. PEDIONOMUS

*Pedionomus*, Gould (1840); *Turnicigralla*, Des M. (1843).

9875. TORQUATUS, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 114; id., *B. Austr.* V, pl. 80; *microurus*, Gould; *gouldiana*, Bp. — Australie E., S. et centr.



Digitized by Google

## FAM. III. — THINOCORIDÆ (1)

### 1427. ATTAGIS

*Attagis*, Géoffr. St-Hil. et Less. (1830).

9876. GAYI, Géoffr. St-Hil. et Less., *Cent. Zool.*, p. 135, pl. 47; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 158; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 284; *latreillii*, Less., *Ill. Zool.*, pl. 11. — Pérou, Chili.

9877. CHIMBORAZENSIS, Scl., *P. Z. S.*, 1860, pp. 73, 82; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 157, pl. 79. — Ecuador.

9878. MALOUINUS (Bodd.), *Tabl. Pl. Enl.*, p. 13; *Pl. Enl.* 322; Gray, *List Grall. Br. Mus.*, p. 51; *falklandicus*, Gm. — Iles Malouines, Magellan.

### 1428. THINOCORUS

*Thinocorus*, Eschs. (1829); *Ocypetes*, Wagl. (1829); *Thinocorys*, Sharpe (1899).

9879. ORBIGNYANUS, Géoffr. et Less., *Cent. Zool.*, p. 137, pl. 48; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 281; *ingæ*, Tschudi; *cuneicauda*, Peal. — Chili, Bolivie, Pérou.

9880. RUMICIVORUS, Eschs., *Zool. Atl.*, p. 2, pl. 2; Burm., *Reise La Plata-St.* II, p. 501; *torquatus*, Wagl.; *swainsoni*, Less., *Ill. Zool.*, pl. 16; *eschscholtzii*, Géoff. et Less., *Cent. Zool.*, p. 140, pl. 50. — Pérou, Bolivie, Chili, Argent., Patagonie.

## FAM. IV. — CHIONIDÆ (2)

### 1429. CHIONIS

*Chionis*, Forst. (1788); *Vaginalis*, Gm. (1788); *Coleorhamphus*, Dumt. (1818).

9881. ALBA (Gm.); Quoy et Gaim., *Voy. Uranie*, p. 131, pl. 35; *chionis*, Lath.; *nivalis*, Dum.; *vaginalis*, Tem., *Pl. Col.* 509; *forsteri*, Steph.; *necrophaga*, Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 146, pl. 258; *lactea*, Forst. — Amérique au S. du 51° l. S., îles Malouines.

### 1430. CHIONARCHUS

*Chionis* (pt.), auct. plur.; *Chionarchus*, Kidd. et Coues (1876).

9882. MINOR (Hartl.), *Rev. Zool.*, 1841, p. 5, 1842, pl. 2, ff. 2, 2*a*; Gray, *Gen. B.* III, pl. 136; Kidd. et Coues, *Bull. U. S. Nat. Mus.*, 1876, pp. 85, 116. — Iles Kerguelen et Marion.

9883. CROZETTENSIS, Sharpe, *Bull. B. O. Club* V, n° XXXVI, p. 44; *minor* (pt.), auct. plur. (nec Hartl.) — Ile Crozette.

(1) Voy.: Sharpe, *Cat. Birds Brit. Mus.* XXIV, pp. 714-720 (1896).
(2) Voy.: Sharpe, *Cat. Birds Brit. Mus.* XXIV, pp. 710-713 (1896).

Digitized by Google

# ORD. VIII. — CRYPTURI (1)

## FAM. I. — TINAMIDÆ

### SUBF. 1. — TINAMINÆ

#### 1431. TINAMUS (2)

*Tinamus*, Lath. (1790); *Cryptura*, Vieill. (1816); *Pezus*, Spix (1825); *Trachypelmus*, Cab. (1848).

9884. TAO, Tem., *Pig. et Gal.* III, pp. 569, 749; Schl., *Mus. P.-B., Tinami*, p. 8; *solitaria* (pt.), Vieill.; *brasiliensis* (pt.), Tem.; *canus*, Wagl.; *kleei*, Tsch., *Arch. f. Naturg.*, 1843, 1, p. 387; id., *Faun. Per.*, pp. 47, 284, pl. 32; *weddelii*, Bp., *C. R.* XLIII, p. 881; *blasii*, Bp., *l. c.*, p. 573; *plumbeus*, Natt.; *blasiusi*, Dub., *Mém. Soc. Zool. de Fr.*, 1994, p. 404 (= *kleei*). — Guyane, Vénézuéla, Amazone, Colombie, Pérou, Bolivie, ? Chili N.

9885. ROBUSTUS, Sclat., *P. Z. S.*, 1860, p. 253; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 87 (pt.), pl. 44; ?*major*, Moore (nec Gm.) — Mexique, Guatémala.

2626. *Var.* FUSCIPENNIS, Salvad., *Cat. B. Br. Mus.* XXVII, p. 500; *robustus* (pt.), auct. plur. — Du Nicaragua à Panama.

2627. *Var.* SALVINI, Underw., *Ibis*, 1898, p. 612. — Costa-Rica.

9886. SOLITARIUS (Vieill.), *Nouv. Dict.* XXXIV, p. 105; id., *Enc. méth.* I, p. 373; Salvad., *Cat.*, p. 501, pl. 7; *tao* (pt.), auct. plur.; *serratus*, Spix, *Av. Bras.* II, p. 61, pl. 76; *brasiliensis* (pt.), auct. plur. (nec Lath.); *major*, Rchb. (nec Gm.); *guttulatus*, Gray. — Brésil S., Paraguay.

9887. MAJOR (Gm.); *Pl. Enl.* 476; Gray, *Gen. B.* III, p. 524; *brasiliensis*, Lath.; Tem., *Pig. et Gal.* III, pp. 562, 748; Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 291, 453; *magoua*, Vieill.; *subcristatus*, Pelz. (nec Cab.), *l. c.*, p. 291; *cristatellus*, Natt. — Brésil N. et centr.

9888. SUBCRISTATUS (Cab.), *Schomb. Reis. Br. Guian.* III, p. 749; Bp., *C. R.* XLIII, p. 881; Schl., *Mus. P.-B., Tinami*, p. 13; *major* (pt.), Gray. — Guyane.

9889. LATIFRONS, Salvad., *Cat. B. Br. Mus.* XXVII, p. 506. — Ecuador W.

9890. PERUVIANUS, Bp., *C. R.* XLIII, p. 573 (1856); Dubois, *Mém. Soc. Zool. Fr.*, 1894, p. 404; *ruficeps*, Scl. et Salv. (pt.), *Nomencl. Av. Neotrop.*, pp. 152, 162; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 292. — Colombie, Ecuador, Pérou, Haut-Amazone.

(1) Voy.: Salvadori, *Cat. Birds Brit. Mus.* XXVII, pp. 494-569 (1895).

(2) Quid? *Trachypelmus intermedius* (Cab.), Heine et Rchw., *Nomencl. Mus. Hein. Orn.*, p. 303 (*descr. nulla*), ex Bogota.

Digitized by Google

2628. *Var.* CASTANEICEPS, Salvad., *Cat. B.*, p. 507, pl. 6; *robustus* (pt.), Lawr., Scl. et Salv.; *ruficeps* (pt.), Scl. et Salv. — Véragua, Panama.

9891. GUTTATUS (Thien. ex Natt.), *Fortpflanz.*, p. 24; Pelz., *Verh. z.-b. Ges. Wien*, 1865, pp. 1126; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 295. — Ecuador, Pérou, Amazone.

## 1432. NOTHOCERCUS

*Nothocercus*, Bonap. (1856).

9892. JULIUS, Bp., *C. R.* XXXVII, p. 663, XLII, p. 881; Schl., *Mus. P.-B.*, *Tinami*, p. 18; Salvad., *Cat.*, p. 509; *bourcieri*, Bp. — Colombie, Ecuador.

9893. NIGRICAPILLUS (Gray), *List Gall. Br. Mus.*, p. 98; Scl. et Salv., *Nomencl.*, p. 152; Salvad., *Cat.*, p. 511, pl. 8. — Chili?

9894. BONAPARTEI (Gray), *List. Gall. Br. Mus.*, p. 97; Scl. et Salv., *Nomencl.*, p. 152. — Vénézuéla, Colombie, Ecuador.

2629. *Var.* FRANTZII (Lawr.), *Ann. Lyc. N. Y.*, 1868, p. 140; *bonapartii*, auct. plur. (nec Gray); *nigricapillus* (pt.), Schl. — De Costa-Rica à Panama.

2630. *Var.* INTERCEDENS, Salvad., *Cat. B. Br. Mus.*, p. 513; *banapartii* (pt.), Scl. et Salv. — Antioquia (Colombie).

## 1433. CRYPTURUS

*Crypturus*, Illig. (1811); *Tinamus* (pt.), auct. plur.

9895. CINEREUS (Gm.); Tem., *Pig. et Gal.* III, pp. 574, 750; Burm., *Th. Bras.* III, p. 317; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 300; ? *cæruleus*, Less.; *megapodius*, Bp.; *assimilis*, Schl. (aberr.) — De la Guyane au Rio-Madeira, Pérou E., Haut-Amazone.

9896. BERLEPSCHI, Rothsch., *Bull. Br. Orn. Club*, 1897, p. v; id., *Nov. Zool.* V, pl. 3. — Ecuador N.

9897. OBSOLETUS (Tem.), *Pig. et Gal.* III, pp. 588, 751; id., *Pl. Col.* 196; Burm., *Th. Bras.* III, p. 316; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 296; *cærulescens*, Vieill.; *rufus*, Less.; *obscurus*, Licht. — Brésil, Bolivie, Pérou.

9898. CERVINIVENTRIS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1875, p. 512. — Vénézuéla.

9899. GRISEIVENTRIS, Salvad., *Cat. B. Br. Mus.* XXVII, p. 521. — Amazone (Brésil).

9900. CASTANEUS (Scl.), *P. Z. S.*, 1857, p. 277; Salvad., *Cat.*, p. 521, pl. 9; *obsoletus* (pt.), Gray. — Colombie.

9901. SOUI (Herm.), *Tabula Affin. Anim.* (1783), pp. 164, 235; Tem., *Pig. et Gal.* III, pp. 597, 752; Richm., *Auk*, 1900, p. 179; *pileatus*, Bodd.; *Pl. Enl.* 829; Schl., *Mus. P.-B.*, *Tinami*, p. 24; Salvad., *Cat.*, — Amérique centr. et mérid., du 20° l. N. au 20° l. S. environ.

Digitized by Google

p. 522; *sovi*, Gm.; *parvirostris*, Gr. (nec Wagl.); *meserythrus*, Scl., *P. Z. S.*, 1859, p. 592; id., *Exot. Orn.*, p. 95, pl. 47; *modestus*, Cab.

9902. TATAUPA (Tem.), *Pig. et Gal.* III, pp. 590, 752; id., *Pl. Col.* 415; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 297; *niambu*, Spix; *plumbeus*, Less.; *lepidotus*, Sw. — Brésil, Paraguay, Bolivie, Pérou.

9903. PARVIROSTRIS, Wagl., *Syst. Av.*, *Crypturus*, sp. 13; Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 294, 434; Tacz., *l. c.*, p. 298; ?*pallescens*, Licht.; *exiguus*, Olb.; ?*cervinus*, Bp. — Amérique mérid., du 10° au 20° l. S. environ.

9904. KERBERTI, Büttik., *Notes Leyd. Mus.* XVIII, p. 1. — Argentine.

9905. UNDULATUS (Tem.), *Pig. et Gal.* III, pp. 582, 751; Salvad., *Cat.*, p. 527; *sylvicola*, Vieill. — Paraguay, Argentine N.-E.

9906. SCOLOPAX (Bonap.), *Tabl. Parall. Ord. Gal.*, p. 12, n° 335, p. 18, n° 13; Salvad., *Cat.*, p. 528, pl. 12; *radiatus*, Gray; *undulatus*, Pelz. (nec Tem.) — Bolivie et Brésil centr.

9907. ADSPERSUS (Tem.), *Pig. et Gal.* III, pp. 585, 751; Burm., *Th. Bras.* III, p. 319; *vermiculatus*, Tem., *Pl. Col.* 369. — Brésil, ? Colombie.

2631. *Var.* SIMPLEX, Salvad., *Cat. B. Br. Mus.*, p. 531. — Guyane angl.

2632. *Var.* BALSTONI, Bartl., *P. Z. S.*, 1882, p. 374; Salvad., *Cat.*, p. 531, pl. 13; *adspersus*, Tsch. (nec Tem.); Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1873, p. 311. — Pérou E.

9908. ATRICAPILLUS, Tschudi, *Arch. f. Naturg.*, 1844, 1, p. 307; id., *Faun. Per.*, pp. 47, 284; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 294; *erythropus* (pt.), Schl. — Pérou.

2633. *Var.* GARLEPPI, Berl., *Ber. Allg. Deutschl. Orn. Ges.*, 1892, p. 13; id., *J. f. O.*, 1892, p. 454. — Bolivie.

9909. RUBRIPES, Tacz., *Orn. du Pérou*, III, p. 303 (1886). — Pérou.

9910. STRIGULOSUS (Tem.), *Pig. et Gal.* III, pp. 594, 752; Burm., *Th. Bras.* III, p. 322; Schl., *Mus. P.-B.*, *Tinami*, p. 27; *strigulatus*, Less. — Bas-Amazone.

9911. ERYTHROPUS (Pelz., ex Natt.), *Verh. z.-b. Ges. Wien*, 1865, p. 1127; id., *Orn. Bras.*, pp. 293, 453; Schl., *l. c.*, p. 34; Salvad., *Cat.*, p. 534, pl. 10; *longirostris*, Gray. — Brésil dans la vallée de l'Amazone.

9912. VARIEGATUS (Gm.); *Pl. Enl.* 828; Burm., *Th. Bras.* III, p. 321; Schl., *l. c.*, p. 32; *sylvicola*, Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 49, pl. 216 (nec *Dict.*); *bimaculatus*, Gr. (juv.) — Guyane, Bas-Amazone.

2634. *Var.* SALVINI, Salvad., *Cat. B. Br. Mus.*, p. 537. — Ecuador E.

9913. BREVIROSTRIS (Pelz., ex Natt.), *Verh. z.-b. Ver. Wien*, 1865, p. 1128; id., *Orn. Bras.*, pp. 294, 453; *variegatus* (pt.), Schl., *l. c.*, p. 32. — Brésil centr. (Rio-Négro, Amazone).

9914. BARTLETTI, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1873, p. 311; Tacz., — Haut-Amazone.

Digitized by Google

*Orn. Pér.* III, p. 301; Salvad., *Cat.*, p. 558, pl. 11.

9915. NOCTIVAGUS (Max.), *Reise nach Bras.* I, pp. 160, 173; id., *Beitr.* IV, p. 504; Spix, *Av. Bras.* II, p. 62, pl. 77; Burm., *Th. Bras.* III, p. 320; Tacz., *l. c.*, p. 302. — Brésil E., ? Pérou, ? Montevideo.

2635. *Var.* DISSIMILIS, Salvad., *Cat. B. Br. Mus.*, p. 541; *noctivagus* (pt.), Cab.; Salv., *Ibis*, 1886, p. 181. — Guyane angl.

9916. CINNAMOMEUS (Less.), *Rev. Zool.*, 1842, p. 210; *dellattrii* et *sallæi*, Bp., *C. R.* XLII, p. 881; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 89, pl. 45. — Du S. du Mexique à la Colombie et Vénézuéla.

2635bis. *Var.* GOLDMANI, Nels., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1901, p. 169. — Yucatan.

9917. BOUCARDI (Scl., ex Sallé), *P. Z. S.*, 1859, p. 391; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 91, pl. 46; Schl., *l. c.*, p. 26. — Du S. du Mexique au Costa-Rica.

9918. COLUMBIANUS, Salvad., *Cat. B. Br. Mus.*, p. 545. — Colombie.

9919. MEXICANUS, Salvad., *Cat. B. Br. Mus.*, p. 545. — Mexique N.-E.

2636. *Var.* INORNATA, Nels., *Auk*, 1900, p. 253. — Véra-Cruz N.

2637. *Var.* OCCIDENTALIS, Salvad., *Cat. B. Br. Mus.*, p. 546. — Mexique N.-W.

9920. TRANSFASCIATUS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1878, p. 141, pl. 13; Salvad., *Cat.*, p. 546. — Ecuador W.

## 1434. RHYNCHOTUS

*Rhynchotus*, Spix (1825); *Nothurus*, Sw. (1837); *Rhynchotis*, Rchb. (1848).

9921. RUFESCENS (Tem.), *Pig. et Gal.* III, pp. 552, 747; id., *Pl. Col.* 412; *guazu*, Vieill.; *fasciatus*, Spix, *Av. Bras.* II, p. 60, pl. 76*a*. — Argentine, Uruguay, Paraguay et Brésil jusqu'à Bahia.

9922. MACULICOLLIS, Gray, *List Gall. Br. Mus.*, p. 102; Schl., *l. c.*, p. 38; Salvad., *Cat.*, p. 550, pl. 14. — Bolivie.

## 1435. NOTHOPROCTA

*Nocthura*, Fras. (1843); *Nothoprocta*, Scl. et Salv. (1875).

9923. TACZANOWSKII, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1874, pp. 564, 679, pl. 84; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 304; *godmani*, Tacz., *l. c.*, p. 305 (juv.) — Pérou centr. et S.

9924. CINERASCENS (Burm.), *J. f. O.*, 1860, p. 259; id., *La Plata Reise*, II, p. 498; Schl., *l. c.*, p. 40. — Argentine W.

9925. PERDICARIA (Kittl.), *Mém. des Sav. étrang.* I, p. 192, pl. 12; Schl., *l. c.*, p. 40; Scl. et Salv., *Nomencl.*, p. 155; *perdix*, Mol. (nec Lin.); ?*punctulata*, Des M. — Chili N. et centr.

2638. *Var.* COQUIMBICA, Salvad., *Cat. B. Br. Mus.*, p. 554, pl. 15; *perdicaria* et *cinerascens* (pt.), auct. plur. — Chili S.

Digitized by Google

9926. PENTLANDI (Gray), *List Gall. Br. Mus.*, p. 105; Scl. et Salv., *Nomencl.*, p. 153; Salvad., *Cat.*, p. 555; pl. 16; ?*punctulata*, Bp. (nec Des M.); ?*curvirostris*, Bp.; *doeringi*, Cab., *J. f. O.*, 1878, p. 138; *moebiusi*, Berl. (juv.) — Bolivie, Argentine N.-W.

9927. CURVIROSTRIS, Scl. et Salv. (nec Bp.), *Nomencl.*, pp. 153, 163; id., *P. Z. S.*, 1874, p. 680; Schl., *l. c.*, p. 41. — Ecuador.

2639. *Var.* PERUVIANA, Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 307. — Pérou.

9928. ORNATA (Gray), *List Gall. Br. Mus.*, p. 102; Scl. et Salv., *Nomencl.*, p. 153; id., *P. Z. S.*, 1874, p. 680; Salvad., *Cat.*, p. 557, pl. 17. — Bolivie.

9929. BRANICKII, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, p. 563; id., *Orn. Pér.* III, p. 308. — Pérou centr.

## 1436. NOTHURA

*Nothura*, Wagl. (1827); *Nothera*, Gray (1840).

9930. MACULOSA (Tem.), *Pig. et Gal.* III, pp. 557, 748; Gray, *Gen. B.* III, p. 525; Scl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 211; *fasciata*, Vieill.; *major*, Spix, *Av. Bras.* II, p. 64, pl. 80 (nec auct.); *maculatus*, Less. — Argentine, Paraguay, Uruguay, Brésil S.

2640. *Var.* NIGROGUTTATA, Salvad., *Cat.*, p. 560. — Argentine centr.

2641. *Var.* BOLIVIANA, Salvad., *Cat.*, p. 561; *media*, Gray (nec Spix). — Bolivie.

9931. MARMORATA, Gray, *List Gall. Br. Mus.*, p. 104; Schl., *l. c.*, p. 44; Salvad., *Cat.*, p. 561, pl. 18; *maculosa*, Blas. — Bolivie.

9932. BORAQUIRA (Spix), *Av. Bras.* II, p. 65, pl. 79; Wagl., *Syst. Av.*, *Nothura*, sp. 1; Burm., *Th. Bras.* III, p. 329; Schl., *l. c.*, p. 44. — Brésil, Argentine W.

9933. DARWINI, Gray, *List Gall. Br. Mus.*, p. 104; Scl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 213, pl. 20; Salvad., *Cat.*, p. 562, pl. 19; *minor*, Darw. (nec Spix); *maculosa* (pt.), auct. plur. — Patagonie et Argentine jusqu'à Cordova.

9934. MEDIA (Spix), *Av. Bras.* II, p. 65, pl. 81, 82; Salvad., *Cat.*, p. 563; *minor*, Spix; Burm., *Th. Bras.* III, p. 331; Schl., *l. c.*, p. 45; *maculosa* (pt.), auct. plur.; *assimilis*, Gray; *brevipes*, Natt.; ?*nana*, Hart. — Brésil S.

## 1437. TAONISCUS

*Taoniscus*, Glog. (1842; *Pavuncula*, Bp. (1856).

9935. NANUS (Tem.), *Pig. et Gal.* III, pp. 600, 733; id., *Pl. Col.* 316; *pavoninus*, Glog. — Brésil E., Paraguay.

Digitized by Google

## SUBF. II. — TINAMOTIDINÆ

### 1438. CALOPEZUS

*Eudromia*, I. Géoff. (1832, nec *Eudromias*, Boie); *Calodromas*, Scl. et Salv. (1873, nec *Calodromus*, Guér., 1832); *Calopezus*, Ridgw. (1884).

9936. ELEGANS (d'Orb. et Géoff. St-Hil.), *Mag. de Zool.*, 1832, pl. 1; Scl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 214; Ridgw., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1884, p. 97. — Argentine, Patagonie.

### 1439. TINAMOTIS

*Tinamotis*, Vig. (1836).

9937. PENTLANDI, Vig., *P. Z. S.*, 1836, p. 79; Gray, *Gen. B.* III, p. 525, pl. 137; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 310; *andecola*, d'Orb., *Voy.* II, p. 68 (note 2), p. 302. — Bolivie, Chili N., Pérou, Ecuador.

9938. INGOUFI, Oust., *Ann. Sc. Nat., Zool.*, 1890, p. 18; id., *Miss. Sc. Cap Horn., Ois.*, p. 105, pl. 1; Salvad., *Cat.*, p. 569. — Patagonie E.

# ORD. IX. — GALLINÆ

## FAM. I. — MEGAPODIIDÆ (1)

### 1440. MEGAPODIUS

*Megapodius*, Quoy et Gaim. (1824); *Alecthelia*, Less. (1826); *Amelous*, Glog. (1842); *Eulipoa*, Grant (1895).

9939. NICOBARIENSIS, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1846, pp. 52, 372; Pelz., *Reise Novara*, *Vög.*, p. 110, pl. 4; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* I, p. 119, pl.; *trinkutensis*, Sh., *Ann. Mag. N. H.*, 1874, p. 448. — Iles Nicobars.

9940. TENIMBERENSIS, Sclat., *P. Z. S.*, 1885, p. 57. — Iles Ténimber.

9941. CUMINGI, Dillwyn, *P. Z. S.*, 1851, p. 118, pl. 39; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 671, pl. 41, f. 1; *rubripes*, Wagl. (pt.); *rufipes*, Gr.; *gilbertii*, Gray, *P. Z. S.*, 1861, p. 289; *lowi*, Sharpe; *pusillus*, Tweed., *P. Z. S.*, 1877, p. 765, pl. 78; *dillwyni*, Tweed., *l. c.* — Philippines, îles Soulou, Célèbes et Tojian.

9942. SANGHIRENSIS, Schl., *Notes Leyd. Mus.* II, p. 91; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 675, pl. 41, f. 2. — Sanghir, Talaut.

(1) Voy. : Ogilvie-Grant, *Cat. Birds Brit. Mus.* XXII, pp. 445-472 (1893); id., *Handb. Game Birds.*

Digitized by Google

9943. BERNSTEINI, Schl., *Ned. Tijdschr. Dierk.* III, p. 261; Grant, *Cat.*, p. 450. — Iles Soula.

9944. FORSTENI, Gray, *Gen. B.* III, p. 491, pl. 124; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 235; *duperreyi*, Schl. (part.) — Moluques.

2642. *Var.* AFFINIS, Mey., *S. B. Ak. Wien*, 1874, p. 215; Oust., *Ann. Sc. Nat.*, 1881, p. 95; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 237; *jobiensis*, Schl.; *decollatus*, Oust., *Bull. Ass. Sc. Fr.*, 1878, p. 248. — Nouv.-Guinée N.-W., îles Jobi et d'Urville.

9945. BRUNNEIVENTRIS, Mey., *Abh. Zool. Mus. Dresd.*, 1890-91, n° 4, p. 15; Grant, *Cat.*, p. 452. — Nouv.-Guinée S.-E.

9946. EREMITA, Hartl., *P. Z. S.*, 1867, p. 830; Scl., *Voy. Challenger*, p. 32, pl. 11; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 238; *hueskeri*, Cab. et Rchw., *J. f. O.*, 1876, p. 326; *rubrifrons*, Scl., *P. Z. S.*, 1877, p. 556. — Iles de l'Amir., Nouv.-Hanov., Nouv.-Irl., Duc York, Nouv.-Bretagne.

2643. *Var.* BRENCHLEYI, Gray, *Ann. Mag. N. H.*, 1870, p. 328; id., *Cruise Curaçoa*, p. 392, pl. 20; Sharpe in *Gould's B. New-Guin.*, pt. XXII, pl. 11. — Iles Salomon.

9947. MACGILLIVRAYI, Gray, *P. Z. S.*, 1861, p. 289; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 225; Scl., *P. Z. S.*, 1876, p. 460, pl. 43; *duperreyi*, Macg. — Nouv.-Guinée S.-E., Louisiades.

9948. DUPERREYI, Less. et Garn., *Bull. Sc. Nat.*, 1826, p. 113; Less., *Voy. Coq.* I, 2, p. 700, pl. 36; id., *Traité d'Orn.*, p. 478, pl. 87, f. 1; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 220; *rubripes*, Tem., *Pl. Col.* 411; *reinwardtii*, Wagl.; *rufipes*, Müll.; *urvillei*, Wall. (nec Less.); *gouldii*, *amboinensis*, Gray. — Iles Kangean, Lombock, Flores, Sumba, Banda, Key, Arou, Salawatti, Nouv.-Guinée S. et W.

2644. *Var.* TUMULUS, Gould, *P. Z. S.*, 1842, p. 20; id., *B. Austr.* V, pl. 79; Gray, *P. Z. S.*, 1861, p. 290, pl. 34; *assimilis*, Mast. — Australie N.

9949. FREYCINETI, Quoy et Gaim., *Voy. Uranie*, p. 125, pl. 32; Tem., *Pl. Col.* 220; ?*novæ-guineæ*, Gm.; *urvillii*, Less.; id., *Voy. Coq.* I, 2, p. 703, pl. 37; *quoyi*, Gray, *P. Z. S.*, 1861, p. 289, pl. 32; *alecthelia*, Q. et G. — Moluques, Nouv.-Guinée W.

9950. GEELVINKIANUS, Mey., *S. B. Ak. Wien*, 1874, p. 88; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 227; ?*rubripes*, Rosenb.; *affinis*, Salvad. — Iles de la baie de Geelvink (Nouv.-Guinée N.-W.)

9951. LAYARDI, Tristr., *Ibis*, 1879, p. 194; Grant, *Handb. Game B.* II, pl. 35; *brazieri*, Scl.; *brenchleyi*, Salv., *Ibis*, 1874, p. 457 (nec Gr.) — Nouv.-Hébrides.

9952. LAPEROUSII, Tem., *Pl. Col.*, (texte); Quoy et Gaim, *Voy. Uranie*, p. 127, pl. 33; Schl., *Mus. P.-B.* VIII, p. 65. — Iles Mariannes.

2645. *Var.* SENEX, Hartl., *P. Z. S.*, 1867, p. 830; Finsch, *J. Mus. Godef.* IV, pt. VIII, p. 29, pl. 5, ff. 2, 3; Hart., *Novit. Zool.* V, p. 62. — Iles Pelew.



Digitized by Google

9953. PRITCHARDI, Gray, *Ann. Mag. N. H.*, 1864, p. 378; Feh. et Hartl., *Orn. Centralpol.*, p. 155; Schl., *l. c.*, p. 64; *stairi* et *burnabyi*, Gray; *huttoni*, Bull. — Ile Ninafou.

9954. WALLACEI, Gray, *P. Z. S.*, 1860, p. 362, pl. 171; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 241; Grant, *Cat.*, p. 462. — Moluques.

## 1441. LIPOA

*Leipoa*, Gould (1840); *Lipoa*, Sundev. (1872).

9955. OCELLATA, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 126; id., *B. Austr.* V, pl. 78. — Australie S. et W.

## 1442. TALEGALLUS

*Talegallus* et *Talegalla*, Less. (1828).

9956. CUVIERI, Less., *Voy. Coq., Zool.* I, 2, p. 716, pl. 38; Quoy et Gaim., *Voy. Astrol., Ois.*, pl. 25, ff. 5, 6; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 245. — Nouv.-Guinée W., Salawatti, Mysol, Gilolo.

2646. *Var.* FUSCIROSTRIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1877, pp. 332, 334; id., *Orn. Pap.* III, p. 248; *cuvieri* (pt.), auct. plur. (nec Less.) — Nouv.-Guinée, îles Arou.

9957. JOBIENSIS, Mey., *S. B. Ak. Wien*, 1874, *Abth.* I, pp. 74, 87; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 244. — Ile Jobi, Nouv.-Guinée.

2647. *Var.* LONGICAUDA, Mey., *Abh. Mus. Dresd.*, 1890-91, n° 4, p. 15 (*longicaudus*). — Nouv.-Guinée S.-E.

## 1443. CATHETURUS

*Alectura*, Lath. (1824); *Catheturus*, Swains. (1837); *Alectrorura*, Agass.

9958. LATHAMI (Lath.), *Gen. Hist. B.* X, p. 455; Jard. et Sel., *Ill. Orn.* III, pl. 140; Gould, *B. Austr.* V, pl. 77; *lindesayii*, James.; *australis*, Sw.; *novæ-hollandiæ*, Bp. — Australie E.

2648. *Var.* PURPUREICOLLIS (Le Souëf), *Ibis*, 1898, p. 51. — Cap York.

## 1444. ÆPYPODIUS

*Æpypodius*, Oustal. (1880).

9959. BRUIJNII, Oust., *C. R.* XC (1880), p. 906; id., *Le Nat.*, 1880, p. 323; id., *Ann. Sc. Nat.*, 1881, p. 38, ff. 33, 34; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 253. — Waigiou.

9960. ARFAKIANUS (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1877, p. 333; id., *Orn. Pap.* III, pp. 251, 564; *pyrrhopygius*, Schl., *Notes Leyd. Mus.* I, p. 139; *arfaki*, Schl., *l. c.*, p. 160. — Nouv.-Guinée.

Digitized by Google

### 1445. MEGACEPHALON

*Megacephalon*, Tem. (1846); *Macrocephalon*, Müll. (1846); *Megacephala*, Heine (1887).

9961. MALEO, Tem., *Pl. Col.* (texte); Hartl., *Verz.*, p. 101; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 678; *rubripes*, Quoy et Gaim., *Voy. Astrol. Zool.* I, p. 239, pl. 25. — Célèbes, Sanghir.

## FAM. II. — CRACIDÆ

### 1446. CRAX

*Crax*, Lin. (1766); *Mituporanga*, *Crossolaryngus*, *Sphærolaryngus*, Rchb. (1862).

9962. ALECTOR, Lin.; Tem., *Pig. et Gal.* III, pp. 27, 689; Burm., *Th. Bras.* III, p. 344; Scl., *Trans. Z. S.* IX, p. 277, pl. 43; *mitu*, Vieill., *Gal. Ois.* II, pl. 199; *sloanei*, Rchb. — Guyane angl., Brésil au N. de l'Amazone.

2649. *Var.* ERYTHROGNATHA, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1877, p. 22; id., *Trans. Z. S.* X, p. 543, pl. 90. — Colombie.

9963. FASCIOLATA, Spix, *Av. Bras.* II, p. 48, pl. 62[a]; *alector*, Hartl. (1847, nec Lin.); *sclateri*, Gray; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 515; Scl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 145; *circinatus*, Licht.; *discors* et *azaræ*, Natt. — Brésil, Bolivie, Paraguay, Argentine N.

9964. ?SULCIROSTRIS, Goeldi, *Boll. Mus. Paraense*, III (1899), p. 409; Grant, *Ibis*, 1902, p. 244; ?*pinima* (fem.) — Brésil S.-E.

9965. PINIMA, Pelz. (ex Natt.), *Orn. Bras.*, pp. 287, 341; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 518; *incommoda*, Scl., *P. Z. S.*, 1872, p. 690; id., *Trans. Z. S.* IX, p. 281, pl. 49, X, pl. 93. — Amazone.

9966. GLOBICERA, Lin.; *Pl. Enl.* 125; Scl., *Trans. Z. S.* IX, p. 274, pl. 40; *rubra*, Lin.; *alector*, Lath. (fem.); *blumenbachi*, Spix; *temminckii*, Tsch.; *edwardsii* et *pseudalector*, Rchb. — Mexique, Honduras, Guatémala et île Cozumel.

2650. *Var.* PANAMENSIS, Grant, *Cat. B. Br. Mus.* XXII, p. 479; *globicera* (pt.), auct. plur.; Scl., *Trans. Z. S.* X, p. 543, pl. 89; *rubra*, Steph. (nec Lin.); *alberti*, Fras., *P. Z. S.*, 1850, p. 246, pl[e] 27, 28 (pt. fem.) — Nicaragua, Costa-Rica, Panama.

9966[bis]. CHAPMANI, Nels., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1901, p. 170. — Yucatan, ? Bélize, ? Guatémala.

9967. GRAYI, Grant, *Cat. B. Br. Mus.*, p. 480; id., *Handb. Game Birds*, II, pl. 57. — ?

9968. CARUNCULATA, Tem., *Pig. et Gal.* III, pp. 44, 690; Scl., *Trans. Z. S.* IX, p. 279; *rubrirostris*, Spix, *Av. Bras.* II, p. 51, pl. 67; *yarrellii*, Benn.; *blumenbachii*, Burm., *Th. Bras.* III, p. 345. — Brésil.

Digitized by Google

2651. ? *Var.* GLOBULOSA, Spix, *Av. Bras.* II, p. 50, pl. 65, 66; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 515; Scl., *Trans. Z. S.* IX, p. 279, pl. 46, X, p. 544, pl. 91; *globicera*, Bat. (nec Lin.) — Haut-Amazone.

9969. DAUBENTONI, Gray, *List Gall. Br. Mus.*, p. 15; Scl., *Trans. Z. S.* IX, p. 276, pl. 41, 42; *globicera*, Tem. (nec Lin.); ?*aldrovandi*, Rchb.; *mikani*, Pelz. (mas., nec fem.) — Vénézuéla.

9970. ALBERTI, Fras., *P. Z. S.*, 1850, p. 246, pl. 27, 28 (nec fem.); Scl., *Trans. Z. S.* IX, p. 280, pl. 48; ?*mikani*, Pelz. (fem., nec mas.); *viridirostris*, Scl., *Trans. Z. S.* IX, p. 282, X, p. 544, pl. 92. — Colombie.

9971. HECKI, Rchw., *J. f. O.*, 1894, p. 231, pl. 2 (fem.) — ?

## 1447. NOTHOCRAX

*Nothocrax*, Burm. (1856).

9972. URUMUTUM (Spix), *Av. Bras.* II, p. 49, pl. 62; Burm., *Th. Bras.* III, p. 347; Scl., *Trans. Z. S.* IX, p. 282, pl. 50, X, p. 545, pl. 94; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 265. — Guyane, Amazone, Ecuador, Pérou.

## 1448. MITUA

*Mitu*, Less. (1831); *Mitua*, Strickl. (1841).

9973. TUBEROSA (Spix), *Av. Bras.* II, p. 51, pl. 67*; Scl., *Trans. Z. S.* IX, p. 283, pl. 51; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 266; *mitu*, Lin.; Grant, *Cat. B.*, p. 485; Tem., *Pl. Col.* 155; *erythrorhynchus*, Sw.; *brasiliensis*, Rchb. — Guyane, Amazone, Bolivie, Pérou.

9974. TOMENTOSA (Spix), *Av. Bras.* II, p. 49, pl. 68; Burm., *Th. Bras.* III, p. 349; Scl., *Trans. Z. S.* IX, p. 280, pl. 52. — Guyane, Amazone.

9975. SALVINI, Reinhardt, *Vid. Medd. N. F. Kjöbenh.*, 1879, pp. 1-6; id., *P. Z. S.*, 1879, p. 108; Scl., *Trans. Z. S.* X, p. 545, pl. 95. — Ecuador.

## 1449. PAUXIS

*Pauxi*, Tem. (1813); *Ourax*, Cuv. (1829); *Lophocerus*, Sw. (1837); *Urax*, Rchb. (1852); *Pauxis*, Scl. (1875).

9976. GALEATA (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 624; Tem., *Pig. et Gal.* III, pp. 1, 683; Scl., *Trans. Z. S.* IX, p. 285, pl. 53, f. 1; *pauxi*, Lin.; Grant, *Cat.*, p. 488; *var.* RUBRA, Scl., *l. c.*, pl. 53, f. 2. — Guyane, Vénézuéla, Colombie, Pérou, ?Ecuador.

Digitized by Google

## 1450. OREOPHASIS

*Oreophasis*, Gray (1844).

9977. DERBIANUS, Gray, *Gen. B.* III, p. 485, pl. 121; Scl. et Salv., *Ibis*, 1859, p. 224; *fronticornis*, v. d. Hoev. — Guatémala, Mexique S.

## 1451. PENELOPE

*Penelope*, Merr. (1786); *Salpiza*, Wagl. (1832); *Stegnolæma*, Scl. et Salv. (1870); *Salpizusa*, Heine (1887).

9978. SUPERCILIARIS, Ill., Tem., *Pig. et Gal.* III, pp. 72, 693; Burm., *Th. Bras.* III, p. 557; *jacupemba*, Spix, *Av. Bras.* II, p. 55, pl. 72. — Brésil.

9979. MONTAGNII (Bp.), *C. R.* XLII, p. 875; Scl., *P. Z. S.*, 1857, p. 19; Gray, *List Gall.*, p. 8; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 521. — Vénézuéla, Colombie, Ecuador.

9980. SCLATERI, Gray, *P. Z. S.*, 1860, p. 270; Grant, *Cat.*, p. 493. — Pérou, Bolivie.

9981. JACUPEBA, Spix, *Av. Bras.* II, p. 54, pl. 71; *jacucaca*, Gray; *cristata*, Cab.; *greeyi*, Gray, *P. Z. S.*, 1866, p. 206, pl. 22. — Colombie, Guyane, Amazone.

9982. MARAIL, Gm., *S. N.* I, 2, p. 734; Bonn., *Tabl. Enc. méth.* I, p. 171, pl. 84, f. 4; Tem., *Pig. et Gal.* III, pp. 56, 692; ?*jacupema*, Merr.; *jacucaca*, Gr. (pt.); *purpurascens*, Gray (nec Wagl.), *Knowsl. Menag.* II, pl. 11. — Guyane.

9983. ORTONI, Salv., *Ibis*, 1874, p. 325; Berl. et Tacz., *P. Z. S.*, 1885, pp. 557, 576. — Ecuador W.

9984. PURPURASCENS, Wagl., *Isis*, 1830, p. 1110; Scl., *P. Z. S.*, 1859, pp. 569, 591; *cristata*, Bonn. (nec Lin.), *Tabl. Enc. méth.* I, p. 171, pl. 84, f. 2. — Mexique, Yucatan, Guatémala, Honduras.

9985. OBSCURA, Ill., Tem., *Pig. et Gal.* III, pp. 68, 693; Scl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 146; *bridgesi*, Gr., *P. Z. S.*, 1860, p. 270; *nigricapilla*, Gr., *l. c.*, p. 269; *jacucaca* (pt.), Gr.; *jacupeba*, Scl. et Salv. (nec Spix), *P. Z. S.*, 1870, p. 524. — Bolivie, Brésil S., Uruguay, Paraguay, Argentine N.

9986. CRISTATA (Lin.); Tem., *Pig. et Gal.* III, pp. 46, 691; Burm., *Th. Bras.* III, p. 559; *brasiliensis*, Bp.; *jacuaca*, Gr.; *purpurascens*, Lawr. (nec Wagl.) — Du Nicaragua à la Colombie, Ecuador.

9987. BOLIVIANA, Bonap., *C. R.* XLII, p. 877; Grant, *Cat.*, p. 499; ?*jacuacu*, Spix, *l. c.* II, p. 52, pl. 68; *rufescens* (Natt.), Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 282, 559. — Amazone, Pérou, Bolivie.

9988. PILEATA, Wagl., *Isis*, 1830, p. 1109; Des M., *Icon. Orn.*, pl. 23; *leucothrix* (Natt.), Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 282, 340. — Amazone.

Digitized by Google

9989. OCHROGASTER, Pelz. (ex Natt.), *Orn. Bras.*, pp. 282, 337; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 527; Grant, *Game B.* II, pl. 38. — Matto Grosso (Brés. N.)

9990. JACUCACA, Spix, *Av. Bras.* II, p. 53, pl. 69; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 523; *superciliaris*, Gray (nec Illig.), *Knowsl. Menag.* II, pl. 8. — Brésil.

9991. ARGYROTIS (Bonap.), *C. R.* XLII, p. 875; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 528; *montana*, Licht.; *lichtensteini*, Gray, *P. Z. S.*, 1860, p. 269. — Vénézuéla, Colombie, Ecuador.

9992. ALBIPENNIS, Tacz., *P. Z. S.*, 1877, p. 746. — Pérou W.

## 1452. PENELOPINA

*Penelopina*, Rchb. (1862).

9993. NIGRA (Fraser), *P. Z. S.*, 1850, p. 246, pl. 29; Rchb., *Tauben*, p. 152; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 528. — Guatémala, Nicaragua.

## 1455. ORTALIDA

*Ortalida*, Merr. (1786); *Ganix*, Raf. (1815); *Ortalidia*, Flem. (1822); *Ortalis*, Glog. (1842, nec Fall., 1810); *Penelops*, Rchb. (1853).

9994. MOTMOT (Lin.); *Pl. Enl.* 146; Wagl., *Isis*, 1832, p. 1227; *katraca*, Bodd.; *parraka*, Gm.; *parraqua*, Lath.; *parrakoua*, Tem., *Pig. et Gal.* III, pp. 85, 695; Burm., *Th. Bras.* III, p. 341. — Guyane, Amazone.

9995. ARAUCUAN (Spix), *Av. Bras.* II, p. 56, pl. 74; Wagl.; *Isis*, 1832, p. 1227; Grant, *Cat.*, p. 506; *superciliaris*, Pelz. (nec Gr.) — Brésil.

9996. RUFICEPS (Wagl.), *Isis*, 1830, p. 1111, 1832, p. 1227; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 533. — Brésil.

9997. WAGLERI, Gray, *List Gall. Br. Mus.*, p. 12; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 534; Grant, *Handb. Game B.* II, pl. 39. — Mexique W.

9998. RUFICAUDA, Jard., *Ann. Mag. N. H.*, 1847, p. 374; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 534; *bronzina*, Gray. — Vénézuéla, île Tobago.

9999. CANICOLLIS (Wagl.), *Isis*, 1830, 1112, 1832, p. 1227; Burm., *Reise La Plata*, II, p. 499; *caraguata*, Natt.; *guttata*, White, *P. Z. S.*, 1882, p. 627. — Paraguay, Argentine.

10.000. ALBIVENTRIS (Wagl.), *Isis*, 1850, p. 1111, 1832, p. 1227; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 535; *aracuan*, Max. (nec Spix.) — Brésil.

10.001. SQUAMATA, Less., *Dict. Sc. Nat.* LIX (1829), p. 195; id., *Tr. Orn.*, p. 481; Scl. et Salv., *l. c.*, p. 535. — Brésil S.

10.002. CARACCO, Wagl., *Isis*, 1832, p. 1227; Scl. et Salv., *l. c.*, p. 536; *adspersa*, Gray. — Colombie, Haut-Amazone.

Digitized by Google

10.003. GUTTATA (Spix), *Av. Bras.* II, p. 55, pl. 73; Burm., *Th. Bras.* III, p. 341; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 278; *adspersa*, Tsch.; *maculata*, Natt.; *albiventris*, Pelz. (nec Wagl.) — Colombie, Ecuador, Pérou, Bolivie, Amazone.

10.004. SUPERCILIARIS, Gray, *List Gall. Br. Mus.*, p. 10; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 537. — ?

10.005. POLIOCEPHALA, Wagl., *Isis*, 1830, p. 1112, 1832, p. 1227; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1869, p. 364, 1870, p. 537. — Mexique.

10.006. VETULA, Wagl., *Isis*, 1830, p. 1112, 1832, p. 1227; *poliocephala*, Scl. (1856, nec Wagl.); Cass., *Illustr.*, pl. 44; *plumbiceps*, Gr.; *ruficrissa*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 538. — Du S. du Mexique à la Colombie.

2652. *Var.* MACCALLI, Baird, *B. N. Am.*, p. 611; Coues, *Key to N. Am. B.*, p. 573; Bendire, *N. Am. B.*, p. 119, pl. 3, f. 16. — Texas S. à Tamaulipas.

2653. *Var.* PALLIDIVENTRIS, Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 209. — Yucatan.

10.007. LEUCOGASTRA (Gould), *P. Z. S.*, 1843, p. 105; Scl. et Salv., *Ibis*, 1859, p. 224; *albiventer*, auct. plur. (nec Wagl.); Gould, *Voy. Sulph. Zool.*, p. 48, pl. 31. — Guatémala W., et de San Salvador au Nicaragua.

10.008. GARRULA (Humb.), *Obs. de Zool.* I, p. 4; Wagl., *Isis*, 1830, p. 1111, 1832, p. 1227; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 539. — Colombie, Vénézuéla.

10.009. CINEREICEPS, Gray, *List Gall. Br. Mus.*, p. 12; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 540; *poliocephala* (pt.), auct. plur. (nec Wagl.); *frantzii*, Cab., *J. f. O.*, 1869, p. 211. — Du Costa-Rica à Panama.

2654. *Var.* STRUTHOPUS, Bangs, *Pr. New Engl. Zool. Club*, III, p. 61; Grant, *Ibis*, 1902, p. 245. — Iles de la baie de Panama.

10.010. ERYTHROPTERA, Licht. (ex Natt.), *Nomencl.*, p. 87; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 540; *ruficeps*, Scl. (1860, nec Wagl.) — Ecuador W.

## 1454. CUMANA

*Pipile*, Bp. (1856, nec *Pipilo*, Vieill., 1816); *Cumana*, Coues, *Auk*, 1900, p. 65 (1).

10.011. PIPILE (Jacq.), *Beytr.*, p. 26, pl. 11; Tem., *Pig. et Gal.* III, pp. 76, 694; Gray, *Knowsl. Menag.* II, pl. 10; *cumanensis*, Jacq., *l. c.*, p. 25, pl. 10; Léot., *Ois. de Trin.*, p. 383; Bonn., *Tabl. Enc. méth.* I, p. 174, pl. 86, f. 2; *leucolophos*, Merr.; — Guyane, Vénézuéla, Colombie, Ecuador, Bolivie, Pérou, Amazone.

(1) Je partage l'avis de M. E. Coues : *Pipile* est incorrect et ressemble trop à *Pipilo* pour être maintenu.

Digitized by Google

*nattereri*, Rchb.; *jacquinii*, Gray; *grayi*, Pelz., *Orn. Bras.*, p. 284.

10.012. JACUTINGA (Spix), *Av. Bras.* II, p. 53, pl. 70; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 530; *pipile*, Burm., *Th. Bras.* III, p. 336 (nec Jacq.); *nigrifrons*, Tem.; *leucoptera*, Max. — Brésil S., E. et Paraguay.

10.013. CUJUBI (Pelz., ex Natt.), *S. B. Ak. Wien*, 1858, p. 328; id., *Orn. Bras.*, p. 284; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 530. — Bas-Amazone.

### 1455. ABURRIA

*Aburria*, Rchb. (1852); *Opetioptila*, Sundev. (1872).

10.014. CARUNCULATA, Rchb., *Syst. Av.*, p. XXVI; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 531; *aburri*, Less. — Colombie, Ecuador.

### 1456. CHAMÆPETES

*Chamæpetes*, Wagl. (1832).

10.015. GOUDOTI (Less.), *Man. d'Orn.* II, p. 217; id., *Traité*, p. 481; Wagl., *Isis*, 1832, p. 1227; Scl. et Salv., *l. c.*; *rufiventris*, Tsch.; id., *Faun. Per.*, p. 291, pl. 31; *tschudii*, Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 275. — Colombie, Ecuador, Pérou.

10.016. UNICOLOR, Salv., *P. Z. S.*, 1867, p. 159, 1870, p. 531. — De Costa-Rica à Panama.

## FAM. III. — OPISTHOCOMIDÆ

### 1457. OPISTHOCOMUS

*Opisthocomus*, Illig. (1811); *Orthocorys*, Vieill. (1816); *Sasa*, Vieill. (1819).

10.017. HOAZIN (Müll.), *S. N. Suppl.*, p. 125; *Pl. Enl.* 337; *cristatus*, Gm.; Vieill., *Gal. Ois.* I, 2, p. 325, pl. 193; Gray, *Gen. B.*, pl. 98. — Guyane, Amazone, Colombie, Ecuador, Pérou, Bolivie.

## FAM. IV. — PHASIANIDÆ (1)

### SUBF. I. — PAVONINÆ

### 1458. PAVO

*Pavo*, Lin. (1766); *Pavianus*, Raf. (1815); *Spiciferus*, Bp. (1856).

10.018. CRISTATUS, Lin.; *Pl. Enl.* 433, 434; Elliot, *Monogr. Phasianidæ*, pl. 3; ?*assamensis*, Mc Clell., *Ind. Rev.*, 1838, p. 515. — Inde, Ceylan.

(1) Voy. aussi : Elliot, *Monogr. Phasianidæ* (1872).

Digitized by Google

2655. *Var.* NIGRIPENNIS, Sclat., *P. Z. S.*, 1860, p. 221; id., *Ibis*, 1897, p. 117; Ell., *l. c.*, pl. 4. ? (Race domestique ?)

10.019. MUTICUS, Lin.; Elliot, *l. c.*, pl. 5; *japonensis*, Bonn.; *spiciferus*, Shaw et Nod.; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 14, pl. 202; *javanicus*, Horsf.; *aldrovandi*, Wils.; *spicifer*, Schinz. Indo-Chine, Malacca, Java.

## 1459. RHEINARDTIUS

*Rheinardius*, Oust. (1882); *Rheinhardius*, Scl. et Saund. (1883); *Rheinartius*, Oust. (1885); *Rheinardtius*, Grant (1893).

10.020. OCELLATUS (Bp. ex Verr.), *C. R.* XLII, p. 878; Ell., *l. c.*, pl. 13; Oust., *N. Arch. Mus.*, 1885, VIII, p. 236, pl. 2; *rheinardti*, Maing. Tonkin (Montagnes).

## 1460. ARGUSIANUS

*Argus*, Tem. (1813, nec Scop., 1777); *Argusianus*, Raf. (1815); *Argusanus*, Bp. (1856); *Argusa*, Kelh. (1881); *Argusinius*, Oust. (1882).

10.021. ARGUS (Lin.); Gould, *B. Asia*, VII, pl. 52; *giganteus*, Tem.; Ell., *l. c.*, pl. 11; *pavonius*, Vieill.; *pavoninus*, Gray. Siam, Ténassérim S., Malacca, Sumatra.

2656. *Var.* GRAYI (Elliot), *Ibis*, 1865, p. 423; id., *Mon.*, pl. 12; *giganteus* (pt.), Müll. Bornéo.

2657. *Var.* BIPUNCTATA (Wood), *An. Mag. N. H.*, 1871, p. 67; Ell., *Mon.*, pl. 13. ?

## 1461. CHALCURUS

*Chalcurus*, Bonap. (1854).

10.022. INOCELLATUS (Less. ex Cuv.), *Traité d'Orn.*, p. 487; Bp., *C. R.* XLII, p. 878; *chalcurum*, Less.; Tem., *Pl. Col.* 519; Ell., *l. c.*, pl. 10; *chalcurus*, Grant, *Cat.*, p. 361. Sumatra.

## 1462. POLYPLECTRON

*Polyplectron*, Tem. (1813); *Diplectron*, Vieill. (1816); *Polyplectrum*, Less. (1831); *Diplectropus*, Glog. (1842); *Diplectrum*, Agass. (1846); *Emphania*, Rchb. (1852).

10.023. CHINQUIS (Müll.), *S. N. Suppl.*, p. 121; Tem., *Pig. et Gal.* II, p. 363; Scl., *P. Z. S.*, 1879, pl. 8, f. 2; *tibetanus*, Gm.; Ell., *l. c.*, pl. 6; *bicalcaratus*, Lath. (nec Lin.); *iris*, Bonn.; *albocellatum*, Cuv.; *atelospilum*, *cyclospilum* et *enicospilum*, Gray; *helenæ*, Oat. (juv.) Himalaya E., Indo-Chine.



Digitized by Google

10.024. GERMAINI, Elliot, *Ibis*, 1866, p. 56; id., *Mon.*, pl. 8; *intermedius*, Hume, *Str. F.*, 1873, p. 36; Ell., *Ibis*, 1878, p. 124. — Cochin-Chine, Lushai.

10.025. BICALCARATUM (Lin.); Ell., *l. c.*, pl. 7; *malaccensis*, Scop.; *hardwickii*, Gray, *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 37; *lineatum*, Gray, *l. c.*, pl. 38. — Ténassérim S., Malacca, Sumatra.

10.026. SCHLEIERMACHERI, Brügg., *Abh. Ver. Brem.* V, p. 461, pl. 9; Pelz., *Verh. Z.-B. Wien*, 1881, p. 27. — Bornéo (Montagnes).

10.027. NAPOLEONIS, Less., *Traité d'Orn.*, p. 487; *emphanum*, Tem., *Pl. Col.* 540; Ell., *l. c.*, pl. 9; *emphanes*, Scl.; *nehrkornæ*, Blas., *Mitth. Orn. Ver. Wien*, 1891, p. 1. — Palawan (Philippines).

## SUBF. II. — MELEAGRINÆ

### 1463. MELEAGRIS

*Meleagris*, Lin. (1766); *Gallopavo*, Brünn. (1772); *Cenchramus*, Gray (1841); *Agriocharis*, Chapm. (1896).

10.028. GALLOPAVO, Lin.; Grant, *Cat.*, p. 387; *mexicana*, Gould, *P. Z. S.*, 1856, p. 61; Ell., *l. c.*, pl. 32. — Mexique N.-E., Nouv.-Mexique, Texas W.

2658. *Var.* INTERMEDIA, Senn., *Bull. U. S. Geol. Surv.*, 1879, p. 428; *gallopavo* et *mexicanus* (pt.), auct. plur.; *ellioti*, Senn., *Auk*, 1892, p. 167, pl. 3. — Texas S.-E., Mex. E.

2659. *Var.* MERRIAMI, Nels., *Auk*, 1900, p. 120-23. — Ariz., Nouv.-Mex. W.

2660. *Var.* AMERICANA, Bartr., *Trav.*, p. 290; *gallopavo* (pt.), auct. plur. (nec Lin.); *palawa*, Barton; *sylvestris* et *fera*, Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 10, pl. 201; *var. occidentalis*, Allen. — États-Unis E. jusqu'au Dakota à l'Ouest.

2661. *Var.* OSCEOLA, Scott, *Auk*, 1890, p. 376; *gallopavo* (pt.), auct. plur. — Floride.

10.029. OCELLATA, Cuv., *Mém. Mus. d'H. N.* VI, p. 1, pl. 1; Tem., *Pl. Col.* 112; Ell., *l. c.*, pl. 33; *aureus*, Vieill. — Guatémala, Honduras, Yucatan.

## SUBF. III. — PHASIANINÆ

### 1464. ITHAGENES

*Ithaginis*, Wagl. (1832); *Plectropus*, Less. (1836); *Plectrophorus*, Gray (1840); *Ithagenes*, Sund. (1872).

10.030. CRUENTUS (Hardw.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 237; Tem., *Pl. Col.* 332; Ell., *l. c.* II, pl. 30; *gardneri*, Hardw. — Himalaya, Thibet.

Digitized by Google

10.031. GEOFFROYI, Verr., *Bull. Soc. d'Acclim.*, 1867, p. 706; Gould, *B. As.* VII, pl. 42; Ell., *l. c.*, pl. 31; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 401, pl. 113. — Thibet E., Setchuan.

10.032. SINENSIS, David, *Ann. Sc. Nat.*, 1875, art. 5, p. 1; id. et Oust., *Ois. Chine*, p. 402, pl. 114. — Chensi mérid. (Chine W.)

## 1465. TRAGOPAN

*Satyra*, Less. (1828, nec Meig., 1803); *Tragopan*, Cuv. (1829); *Ceriornis*, Sw. (1837); *Ceratornis*, Cab. (1846).

10.033. SATYRA (Lin.); Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 23, pl. 206; Cuv., *Rég. an.* I, p. 479; Gould, *Cent. B. Him.*, pl. 62; Ell., *l. c.*, pl. 22; *cornutus*, Müll.; *nepaulensis*, *pennanti* et *lathami*, Gray, *Ill. Ind. Zool.*, pl. 40, 49, 51. — Himalaya.

10.034. MELANOCEPHALUS (Gray), in *Griff. ed. Cuv.* III, p. 29; id., *Ill. Ind. Zool.*, pl. 46, 48; Gould, *B. As.* VII, pl. 43; Ell., *l. c.*, pl. 23; *hastingsi*, Vig. — Himalaya W.

10.035. TEMMINCKI, Gray, *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 50; Gould, *B. As.* VII, pl. 46; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 118, pl. 112. — Chine S.-W. et centr.

10.036. BLYTHI (Jerd.), *Pr. As. Soc. Beng.*, 1870, p. 60; Scl., *P. Z. S.*, 1870, pp. 163, 219, pl. 15; Ell., *l. c.*, pl. 26. — Assam N.-E., Manipour.

10.037. CABOTI (Gould), *P. Z. S.*, 1857, p. 161; id., *B. As.*, pl. 48; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 119, pl. 111; *modestus*, Dav. — Chine S.-E.

## 1466. LOPHOPHORUS

*Lophophorus*, Tem. (1813); *Monaulus*, Vieill. (1816); *Lophofera*, Flem. (1822); *Impeyanus*, Less. (1831); *Chalcophasis*, Ell. (1871).

10.038. REFULGENS, Tem., *Pig. et Gal.* II, p. 333; id., *Pl. Col.* 508, 513; Grant, *Cat.*, p. 278; *impeyanus*, auct. plur. (nec Lath.); Gould, *Cent. Him. B.*, pl. 60, 61 (1). — Himalaya, de l'Afghanistan au Boutan.

2662. *Var.* MANTOUI, Oust., *Bull. Soc. Zool. Fr.* XVIII, p. 19; Grant, *Handb. Game B.* I, p. 236; *refulgens*, Rothsch., *Ibis*, 1899, p. 441. — Himalaya?

2663. *Var.* OBSCURA, Oust., *l. c.*; Grant, *l. c.*; *refulgens*, Rothsch., *l. c.* — Himalaya?

(1) M. Sharpe n'admet pas la manière de voir de M. O.-Grant, qui considère l'*impeyanus* (Lath.) comme étant identique au *chambanus* de M. Marshall. Mais en examinant la description et la planche de Latham, on constate que cette dernière, pas plus que la diagnose, n'indique le blanc caractéristique du bas du dos du *L. refulgens*. Je confirme donc l'opinion de M. Grant.

Digitized by Google

10.039. IMPEYANUS (Lath., nec auct. plur.), *Ind.* II, p. 652; id., *Suppl. Gen. Syn.*, p. 208, pl. 114; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 31, pl. 208; *chambanus*, Marsh., *Ibis*, 1884, p. 421, pl. 10. — Chamba (Himalaya N.-W.)

10.040. LHUYSII, J. Verr., *Bull. Soc. d'Acclim.*, 2e sér. IV, p. 706; Sclat., *P. Z. S.*, 1868, p. 1, pl. 1; Gould, *B. Asia*, VII, pl. 54; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 403, pl. 110. — Moupin, Kokonoor E., Setchuan W. (Ch.)

10.041. SCLATERI, Jerd., *Ibis*, 1870, p. 147; Sclat., *P. Z. S.*, 1870, p. 162, pl. 14; Ell., *l. c.*, pl. 20; Gould, *B. As.* VII, pl. 55. — Assam N.-E. (Monts Mishmi).

## 1467. ACOMUS

*Houppifer!* Guér. (1829-38); *Alectryon*, Cab. (1846, nec Montf., 1810); *Acomus*, Rchb. (1852); *Houppiferus*, Ell. (1872).

10.042. ERYTHROPHTHALMUS (Raffl.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 321; Scl. et Wolf, *Zool. Sket.* II, pl. 34; Ell., *l. c.* II, pl. 28; *diardii*, Guér.-Mén., *Ic. Règ. An., Ois.*, p. 26, pl. 43, f. 2; *purpureus*, Gray, *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 42. — Malacca S., Sumatra.

10.043. PYRONOTUS (Gray), *List of B. Gall.*, p. 26 (1844); Ell., *l. c.* II, pl. 29; Salvad., *Ucc. Born.*, p. 307; *erythrothalmus (sic)*, Gray, *Ill. Ind. Zool.* II, pl. 38, f. 1 (1834, nec Raffl.); *personatus*, Tem. — Bornéo N.-E.

10.044. INORNATUS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1879, p. 250; id., *P. Z. S.*, 1879, p. 651, pl. 48. — Sumatra W.

## 1468. LOPHURA

*Lophura*, Flem. (1822); *Euplocomus*, Tem. (1830, nec Latr., 1809); *Macartneya*, Less. (1831); *Spicifer*, Kp. (1836); *Lophalector*, Cab. (1846); *Lophora*, Gr. (1870).

10.045. IGNITA (Shaw et Nodd.), *Nat. Misc.* IX, pl. 321; Flem., *Philos. of Zool.* II, p. 230; Büttik., *Notes Leyd. Mus.* XVII, p. 170; *macartneyi*, Tem. (pt.); ?*sumatranus* (fem.), Dub. — ?

10.046. NOBILIS (Sclat.), *P. Z. S.*, 1863, p. 119, pl. 16; Ell., *l. c.*, pl. 27; *ignitus*, auct. plur. (nec Shaw et Nodd.); *ignita*, Grant, *Cat.*, p. 288. — Bornéo, Banka.

10.047. SUMATRANA (Dubois), *Bull. Ac. R. Belg.* XLII (1879), p. 825; Vorderm., *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, 1890, p. 98; Büttik., *Notes Leyd. Mus.* XVII, p. 177; *ignitus* (pt.), auct. plur.; *rufa* (pt.), Grant, *Cat.*, p. 287; *Lophura sp.*, Grant, *l. c.*, p. 289 (en note). — Sumatra S.-E.

Digitized by Google

10.048. VIEILLOTI (Gray), *List Gen. B.*, p. 77; Gould, *B. As.* VII, pl. 15; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* I, p. 213, pl.; *macartneyi* (pt.), Tem.; *ignitus* (pt.), auct. plur.; Gray, *Ill. Ind. Zool.* II, pl. 39; Ell., *l. c.* II, pl. 26; *castaneus*, Gray; *rufus*, Hume; *rufa* (pt.), Grant. — Siam, Ténassérim, Malacca, Sumatra.

## 1469. DIARDIGALLUS

*Diardigallus*, Bonap. (1856).

10.049. PRÆLATUS, Bonap., *C. R.* XLIII, p. 415; Gould, *B. As.* VII, pl. 21 (mas.); Sclat., *List Phas.*, p. 6, pl. 6; Ell., *l. c.* II, pl. 24; *diardi*, Tem., *MS.*; Grant, *Cat.*, p. 290; *fasciolatus*, Blyth; *crawfurdi*, Schomb. — Siam, Cambodje, Cochin-Chine.

## 1470. LOBIOPHASIS

*Lobiophasis*, Sharpe (1874).

10.050. BULWERI, Sharpe, *Ann. Mag. N. H.*, 1874, p. 373; Gould, *B. As.* VII, pl. 13; Sclat., *P. Z. S.*, 1876, p. 465, pl. 44; *castaneicaudatus*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1877, p. 96 (juv.); Gould, *l. c.*, pl. 12. — Bornéo.

## 1471. CROSSOPTILON

*Crossoptilon*, Hodgs. (1838).

10.051. TIBETANUM, Hodgs., *J. A. S. Beng.* VII, p. 864, pl. 46; Sclat., *List Phas.*, p. 6, pl. 4; Ell., *l. c.* I, pl. 14; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 407, pl. 107; *auritum*, Gray, *Gen. B.*, pl. 125; *drouynii*, Verr. — Chine W., Thibet E.

10.052. LEUCURUM, Seeb., *Bull. Br. Orn. Club*, IV (1892), p. XVII; id., *Ibis*, 1893, p. 250; *tibetanum* (pt.), Oust., *Ann. Sc. Nat.*, 1892, p. 315. — Thibet E.

10.053. MANTCHURICUM, Swinh., *P. Z. S.*, 1862, p. 287; Ell., *l. c.* I, pl. 16; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 405, pl. 106; *auritum* (pt.), auct. plur. (nec Pall.); Gould, *B. As.* VII, pl. 22. — Mandchourie.

10.054. AURITUM (Pall.), *Zoogr. Rosso-Asiat.* II, p. 86; Ell., *l. c.* I, pl. 17; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 406, pl. 108; *cærulescens*, Dav.; M.-Ew., *C. R.* LXX, p. 538. — Chine W.

10.055. HARMANI, Elwes, *Ibis*, 1881, p. 399, pl. 13; Grant, *Cat.*, p. 296. — Thibet.

Digitized by Google

## 1472. GENNÆUS

*Gennæus*, Wagl. (1832); *Nycthemerus*, Sw. (1837); *Alectrophasis*, Gray (1841); *Grammatoptilus*, Rchb. (1852); *Hierophasis*, Ell. (1872); *Euplocamus* (pt.), auct. plur.

10.056. ALBOCRISTATUS (Vig.), *P. Z. S.*, 1830, p. 9; Gould, *Cent. B. Him.*, pl. 66, 67; Wagl., *Isis*, 1832, p. 1228; Ell., *l. c.* II, pl. 18; *hamiltonii*, Gray; *leucomelas*, Hodgs. (pt.) — Himalaya W., de Hazara au Népaul.

10.057. LEUCOMELANUS (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 633; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* I, p. 185, pl.; *leucomelas*, Hodgs. (pt.), *Icon. ined.*, *Gall.*, pl. 14, f. 79. — Népaul.

10.058. MELANONOTUS (Blyth), Hutt., *J. A. S. Beng.*, 1848, 2, p. 694; Mitch., *P. Z. S.*, 1858, p. 544, pl. 149, f. 2; Ell., *l. c.* II, pl. 119; Beav., *Ibis*, 1868, p. 381; *muthura*, Grant. — Himalaya E., du Sikkim au Boutan.

10.059. EDWARDSI, Oust., *Bull. Mus. Paris*, 1896, p. 316; id., *Arch. Mus.* (4), I, pl. 10. — Annam.

10.060. HORSFIELDI (Gray), *Gen. B.* III, p. 498, pl. 126; Ell., *l. c.* II, pl. 20; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* I, p. 198, pl. — Boutan E., Assam, Haute-Birmanie.

10.061. WICKHAMI, Oates, *Man. Game B. Ind.* II, *App.* (1898). — Haute-Birmanie.

10.062. ANDERSONI (Ell.), *P. Z. S.*, 1871, p. 137; id., *Mon.* II, pl. 22; Anders., *B. W. Yun.*, p. 670, pl. 53; *crawfurdi*, Hume et Dav.; *davisoni*, Grant, *Cat.*, p. 304. — Monts Kachin (Yunnan).

10.063. BELI, Oust., *Bull. Mus. Paris*, 1898, n° 6, p. 259. — Annam.

10.064. WILLIAMSI, Oates, *Man. Game B. Ind.* I, p. 342. — Haute-Birmanie.

10.065. CUVIERI (Tem.), *Pl. Col.* 1; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* I, p. 202; *melanion*, Vieill. — Monts du N. de l'Arakan.

10.066. LINEATUS (Vig.), *Phil. Mag.*, 1831, p. 147; Jard. et Sel., *Ill. Orn.* (n. s.), pl. 12; Scl. et Wolf, *Zool. Sket.* II, pl. 38; Ell., *l. c.* II, pl. 23; *reynaudii*, Less.; *fasciatus*, Mc Clell. — Pégou, Tênassérim N.

2664. *Var.* OATESI, Og.-Grant, *Cat.*, p. 306; *cuvieri* (pt.), auct. plur.; *lineatus*, Feild. (nec Vig.) — Arakan S.-E.

10.067. SHARPEI, Oates, *Man. Game B. of Ind.* I, p. 357. — Monts Karin (Tênass.)

10.068. NYCTHEMERUS (Lin.); *Pl. Enl.* 123, 124; Gould, *B. As.* VII, pl. 17; Ell., *l. c.* II, pl. 21; ? *crawfurdii*, Gray (mas. juv.?); *argentatus*, Sw. — Chine S.

10.069. WHITEHEADI, Grant, *Ibis*, 1899, p. 586; id., *P. Z. S.*, 1900, p. 505, pl. 34. — Haïnan.

10.070. RUFIPES, Oates, *Man. Game B. of Ind.* I, p. 362. — Birmanie.

10.071. SWINHOEI (Gould), *P. Z. S.*, 1862, p. 284; Gould, *B. As.* VII, pl. 16; Scl. et Wolf, *Zool. Sket.* II, pl. 37; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 417, pl. 102; Grant, *Cat.*, p. 309. — Formose.

Digitized by Google

## 1473. PUCRASIA

*Eulophus*, Less. (1836, nec Géoff., 1764); *Pucrasia*, Gray (1841); *Gallophasis*, Hodgs. (1843); *Lophotetrax*, Cab. (1846); *Lochmophasis*, Heine (1890).

10.072. MACROLOPHA (Less.), *Dict. Sc. N.* LIX, p. 196; Gould, *B. As.* VII, pl. 26; Ell., *l. c.* I, pl. 28; *pucrasia*, Gray, *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 40. — Himalaya W.

2665. *Var.* BIDDULPHI, Marsh., *Ibis*, 1879, p. 461; id., *J. f. O.*, 1879, p. 424; *macrolopha*, Adams (nec Less.) — Cachemire.

10.073. NIPALENSIS, Gould, *P. Z. S.*, 1854, p. 100; id., *B. As.* VII, pl. 28; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* I, p. 166, pl.; *pucrasia* et *macrolopha* (pt.), auct. plur.; *duvauceli*, Bp.; Ell., *l. c.* I, pl. 29. — Népaul.

10.074. CASTANEA, Gould, *P. Z. S.*, 1854, p. 99; id., *B. As.* VII, pl. 27; *duvaucelii*, Gr. (nec Bp.) — Afghanistan N., Kafiristan.

10.075. MEYERI, Madar., *Ibis*, 1886, p. 145; Grant, *Cat.*, p. 315; *darwini*, Oust. (nec Swinh.), *Le Natur.*, 1886, p. 276. — Thibet centr., Haut-Mékong.

10.076. XANTHOSPILA, Gray, *P. Z. S.*, 1864, p. 259, pl. 20; Gould, *B. As.* VII, pl. 24; Ell., *l. c.* I, pl. 30; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 407, pl. 104; *davidiana*, A. M.-Edw.; *var. ruficollis*, Dav. et Oust. — Chine N.-W., Mandchourie et Thibet.

10.077. DARWINI, Swinh., *P. Z. S.*, 1872, p. 552; Ell., *Mon.* I, pl. 30bis; Gould, *B. As.* VII, pl. 25; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 409. — Tchékiang et Fokien (Chine E.)

## 1474. CATREUS

*Catreus*, Cab. (1851); *Lophophasianus*, Rchb. (1852); *Phasianus* (pt.), auct. plur.

10.078. WALLICHII (Hardw.), *Tr. Linn. Soc.* XV, 1827, p. 166; Gould, *B. Asia*, VII, pl. 18; *staceii*, Vig.; Gould, *Cent. B. Him.*, pl. 68. — Himalaya, du Népaul au Chamba.

## 1475. PHASIANUS (1)

*Phasianus*, Lin. (1766); *Syrmaticus*, Wagl. (1832); *Graphephasianus*, Rchb. (1852); *Calophasis*, Ell. (1872).

10.079. COLCHICUS, Lin.; Ell., *Mon. Phas.* II, pl. 2; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg., Ois.* II, p. 55, pl. 175; Dress., *B. Eur.* VII, p. 85, pl. 469; *marginatus*, Mey. et Wolf. — Europe S.-E., Transcaucasie (introd. dans l'Eur. cent. et occid.)

2666. *Var.* SEPTENTRIONALIS, Lorenz., *J. f. O.*, 1888, p. 572. — Caucase N.

2667. *Var.* TALISCHENSIS, Lorenz., *J. f. O.*, 1888, p. 571. — Talisch (Casp. S.-W.)

(1) Voy. aussi : Seebohm, *Ibis*, 1887, pp. 168-173, 1888, pp. 312-316.

Digitized by Google

10.080. PERSICUS, Severtz., *Bull. Mosc.*, 1875, p. 208; id., *J. f. O.*, 1875, p. 225; *shawi*, Ell., *Ibis*, 1876, p. 132. — Perse.

2668. *Var.* PRINCIPALIS, Sclat., *P. Z. S.*, 1885, p. 322, pl. 22; *komarowi*, Bogd., *Bull. Ac. St-Pétersb.*, 1886, p. 356. — Afghanistan N.-W., Perse N.-E.

2669. *Var.* ZERAFSHANICA, Tarnowski, Field, LXXVII, p. 409; *klossowskii*, Tarn., *l. c.*; *tarnowskii*, Seeb., *P. Z. S.*, 1892, p. 271. — Zérafshan.

10.081. SHAWI, Ell., *P. Z. S.*, 1870, p. 403; id., *Mon.* II, pl. 1; Gould, *B. As.* VII, pl. 35; *insignis*, Ell. — Turkestan E.

2670. *Var.* TARIMENSIS, Przev., *Dritte Reise in cent. As*, p. 95; Pleske, *P. Z. S.*, 1888, p. 415. — De Karaschar à Lob-nor.

2671. *Var.* CHRYSOMELAS, Severtz., *Bull. Mosc.*, 1875, pt. 3, p. 207; id., *Ibis*, 1875, p. 493; Gould, *B. As.* VII, pl. 36; *dorrandti* et *oxianus*, Severtz., *J. f. O.*, 1875, p. 225; *insignis*, Ell. — Amou-Daria.

10.082. MONGOLICUS, Brandt, *Bull. Ac. St-Pétersb.* III, p. 51; Gould, *B. As.* VII, pl. 41; Ell., *l. c.* II, pl. 4; *colchicus*, Licht. (nec Lin.); *torquatus*, Kar. (nec Gm.) — Asie centr., Turkestan.

2672. *Var.* TURCESTANICA, Lorenz., *Orn. Monatsb.* IV, p. 189. — Vallée du Syr-Daria (Turkestan).

2673. *Var.* SEMITORQUATA, Severtz., *Ibis*, 1875, p. 491; Pleske, *Bull. Acad. St-Pétersb.*, 1892, p. 295. — Dzungarie.

10.083. HOLDEREBI, Schalow, *J. f. O.*, 1901, p. 414, pl. 4. — Min-tschôu.

10.084. TORQUATUS, Gm., *S. N.* I, 2, p. 742; Gould, *B. As.* VII, pl. 39; Ell., *l. c.* II, pl. 5; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 409; *albotorquatus*, Bonn. — Sibérie E., Mongolie E., Corée, Chine.

2674. *Var.* SATSCHEUNENSIS, Przev., *Reis. in Tibet*, p. 59; Dedit., *J. f. O.*, 1886, p. 527; *shawi* (pt.), Seeb. — Sa-tschen (au N. des Monts Nan-Shan).

10.085. FORMOSANUS, Ell., *P. Z. S.*, 1870, p. 406; id., *Mon.* II, pl. 6; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 410; *torquatus* (pt.), Swinh. (1863). — Ile Formose.

10.086. DECOLLATUS, Swinh., *P. Z. S.*, 1870, p. 133; Ell., *l. c.* II, pl. 7; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 411, pl. 100. — Chine W. et centr.

2675. *Var.* STRAUCHI, Przev., *Mongol.* II, 2, p. 119, pl. 17. — Kansu N.-W.

10.087. ELEGANS, Ell., *Ann. and Mag. N. H.*, 1870, p. 312; id., *Mon.* II, pl. 8; *sladeni*, Ell. (ex Anders.), *P. Z. S.*, 1870, p. 408; Dav. et Oust., *Ois. Ch.*, p. 411. — Setchuan W., Yunnan W.

2676. *Var.* VLANGALI, Przev., *Mongol.* II, 2, p. 116, pl. 16; Grant, *Cat.*, p. 330. — Tsaidam (au S. des Monts Koko-nor).

10.088. VERSICOLOR, Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 23, pl. 205; Tem., *Pl. Col.* 486, 493; Ell., *l. c.* II, pl. 9; *diardi*, Tem. — Japon.

10.089. SOEMMERRINGI, Tem., *Pl. Col.* 487, 488; Gould, *B. As.* VII, pl. 37; Ell., *l. c.* II, pl. 12. — Japon.

2677. *Var.* SCINTILLANS, Gould, *Ann. Mag. N. H.*, 1866, p. 150; id., *B. Asia*, VII, pl. 38. — Japon.

Digitized by Google

10.090. REEVESI, Gray, in *Griff. ed. Cuv.* III, p. 25; id., *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 39; Gould, *B. Asia*, VII, pl. 33; Ell., *l. c.* II, pl. 11; ?*superbus*, Vieill. (nec Lin.); *veneratus*, Tem., *Pl. Col.* 483. — Chine.

10.091. ELLIOTI, Swinh., *P. Z. S.*, 1872, p. 550; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 412, pl. 101; Ell., *l. c.* II, pl. 13bis. — Chine S.-E

10.092. HUMIÆ (Hume), *Str. F.*, 1880, p. 461; id., *Ibis*, 1881, p. 608; Godw.-Aust., *P. Z. S.*, 1882, p. 715, pl. 51. — Manipour.

2678. *Var.* BURMANICA (Oates), *Ibis*, 1898, p. 124. — Birmanie.

## 1476. CHRYSOLOPHUS

*Thaumalea*, Wagl. (1832, nec Ruthe, 1831); *Chrysolophus*, J.-E. Gray (1833); *Epomia*, Hodgs. (1844).

10.093. PICTUS (Lin.); *Pl. Enl.* 217; Ell., *l. c.* II, pl. 15; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 414; Gray, *Ill. Ind. Zool.* II, pl. 41, f. 2. — Chine S. et W.

2679. ? *Var.* OBSCURA (Schl.), *Ned. Tijdschr. Dierk.* II, p. 152; Ell., *l. c.* II, pl. 16 (aberr.?). — ?

10.094. AMHERSTIÆ (Leadb.), *Tr. Linn. Soc.*, 1828, p. 129, pl. 15; Gould, *B. As.* VII, pl. 20; Ell., *l. c.* II, pl. 14; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 415, pl. 103. — Chine W., Thibet E.

## 1477. GALLUS

*Gallus*, Lin. (1746); *Alector*, Klein (1750); *Creagrius*, Glog. (1842).

10.095. FERRUGINEUS (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 761; Ell., *l. c.* II, pl. 32; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 420; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* I, p. 217, pl.; *Ph. gallus*, Lin.; *spadicea*, Bonn.; *bankiva*, Tem. — Inde, Indo-Chine, Malacca, îles Indo-malaises.

10.096. LAFAYETTEI, Less., *Traité d'Orn.*, p. 491; Des M., *Icon. Orn.*, pl. 18; Ell., *l. c.* II, pl. 33; *stanleyi*, Gray, *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 43, f. 1. — Ceylan.

10.097. SONNERATI, Tem., *Pig. et Gal.* II, p. 246; id., *Pl. Col.* 252, 253; Ell., *l. c.* II, pl. 34; *Ph. gallus*, Scop. (nec Lin.); *indicus*, Leach. — Inde S. et centr.

10.098. VARIUS (Shaw et Nodd.), *Nat. Misc.* X, pl. 353; Ell., *l. c.* II, pl. 35; *furcatus*, Tem., *Pl. Col.* 483; *javanicus*, Horsf. (1). — Java, Lombock, Flores, Bornéo.

(1) Hybrides : *Gallus æneus*, Tem., *Pl. Col.* 374, = *varius* × *domesticus; temmincki*, Gray, *P. Z. S.*, 1849, p. 62, pl. 7, = *ferrugineus* × *varius*. Le *Gallus stramineicollis*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1879, p. 317 (îles Soulou) est une race domestique, de même que le *G. violaceus*, Kels. *J. straits As. Soc.* XXIV, p. 167 (Bornéo ?)



Digitized by Google

## SUBF. IV. — NUMIDINÆ

### 1478. PHASIDUS

*Phasidus*, Cass. (1856).

10.099. NIGER, Cass., *Pr. Ac. Philad.*, 1856, p. 322; id., *Journ. Ac. Phil.*, 1858, p. 7, pl. 3; Ell., *l. c.* II, pl. 36. — Afrique W., du Gabon au Congo.

### 1479. AGELASTES

*Agelastes*, Bonap. (1849); *Agelastus*, Hartl. (1855).

10.100. MELEAGRIDES, Bp. (ex Tem.), *P. Z. S.*, 1849, p. 115; Ell., *l. c.* II, pl. 37; Büttik., *Notes Leyd. Mus.* VII, p. 230, X, p. 98. — Du Gabon à Libéria.

### 1480. NUMIDA (1)

*Numida*, Lin. (1766); *Numidia*, Flem. (1822); *Querelea*, Rchb. (1852).

10.101. MELEAGRIS, Lin.; *Pl. Enl.* 108; Ell., *Mon. Phas.* II, pl. 39; *galeata*, Pall.; *rendallii*, Ogilby; *maculipennis*, Sw.; *orientalis*, Cab. (domest.) — Afrique W., de Sénégambie au Niger, îles du Cap Vert.

2680. *Var.* MARCHEI, Oust., *Ann. Sc. Nat.*, 1882, art. 1 bis; id., *N. Arch. Mus.*, 1885, p. 305, pl. 14. — Gabon, Bas-Congo.

10.102. CORONATA, Gray, *List of B., Gall.*, p. 29; Ell., *l. c.* II, pl. 40; *cornuta*, Fch. et Hartl., *Vög. O.-Afr.*, p. 569. — Cafrerie, Natal.

10.103. TRANSVAALENSIS, Neum., *Orn. Monatsb.* VII, p. 26. — Transvaal.

10.104. PAPILLOSA, Rchw., *Orn. Monatsb.* II, p. 145; Fleck, *J. f. O.*, 1894, p. 390 (fig. col. de la tête); *mitrata*, Gr. (nec Pall.); *cornuta*, Gurn. (nec Hartl.); Grant, *Cat.*, p. 378 (pt.) — Afr. S.-W., du Benguela au fl. Orange et le désert de Kalahari.

10.105. REICHENOWI, Grant, *Ibis*, 1894, p. 535; Fleck, *J. f. O.*, 1894, p. 390 (fig. col. de la tête). — Kilima Ndjaro jusqu'au Massaïland et Kikuyu (Afr. E.)

10.106. ANSORGEI, Hart., in *Ansorge « Under the Afr. Sun »* *App.*, p. 331. — Afrique équat. angl.

10.107. UHEHENSIS, Rchw., *Orn. Monatsb.* VI, p. 88. — Uhehe (Afr. E. allem.)

10.108. MARUNGENSIS, Schalow, *Zeit. Ges. Orn.*, 1884, p. 105. — Marungu (Tangan. W.)

10.109. MAXIMA, Neum., *Orn. Mon.*, 1898, p. 21, 1899, p. 26. — Benguela.

10.110. INTERMEDIA, Neum., *l. c.*, 1898, p. 21, 1899, p. 26. — Victor.-Nyanza W., au S. jusqu'à Kagera.

10.111. MITRATA, Pall., *Spic. Zool.* I, 4, p. 18, pl. 3; Ell., *Mon. Phas.* II, pl. 41; *tiarata*, Bp.; *tiara*, Gray. — Afrique E., Madagascar, îles Comores.

(1) Voy. aussi : Neumann, *Orn. Monatsb.* VI, pp. 17-22.

Digitized by Google

10.112. PTILORHYNCHA, Licht. in Less., *Tr. d'Orn.*, p. 498; Gray, *Gen. B.* III, pl. 128; Rüpp., *Syst. Uebers.*, pp. 102, 105, pl. 39; Ell., *l. c.* II, pl. 42. — Afrique N.-E.

10.113. SOMALIENSIS, Neum., *Orn. Monatsb.*, 1899, p. 25. — Somaliland.

## 1481. GUTTERA (1)

*Guttera*, Wagl. (1832).

10.114. CRISTATA (Pall.), *Spic. Zool.* I, 4, p. 15, pl. 2; Ell., *l. c.* II, pl. 45; Finsch et Hartl., *Vög. O.-Afr.*, 572. — Afrique W., de Sierra-Leone au Togo.

2681. *Var.* GRANTI (Ell.), *P. Z. S.*, 1871, p. 584; id., *Mon.* II, pl. 43; *pucherani* (pt.), Grant, *Cat.*, p. 383. — Afrique E. allem.

2682. *Var.* EDOUARDI (Hartl.), *J. f. O.*, 1867, p. 36; id., *Ibis*, 1870, p. 444; *cristata* (pt.), auct. plur.; *pucherani*, Sharpe, *Lay. B. S. Afr.*, p. 586; *verreauxi*, Ell., *Ibis*, 1870, p. 500; id., *Mon.*, pl. 44. — Mozambique, Zambézie, Natal.

10.115. PUCHERANI (Hartl.), *J. f. O.*, 1860, p. 341; Ell., *Mon.* II, pl. 46; Fch. et Hartl., *Vög. O.-Afr.*, p. 574; *ellioti*, Bartl., *P. Z. S.*, 1877, p. 652, pl. 65; *cristata* (pt.), Layard. — Afrique E. allem. et angl., Zanzibar.

10.116. SCLATERI, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1898, p. 115. — Caméron (Edea).

10.117. PLUMIFERA (Cass.), *Pr. Ac. Philad.*, 1856, p. 321; id., *Journ. Ac. Phil.* IV, p. 6, pl. 2; Ell., *l. c.* II, pl. 47. — Du Caméron au Loango.

## 1482. ACRYLLIUM

*Acryllium*, Gray (1840); *Agryllium*, Gray (1867).

10.118. VULTURINUM (Hardw.), *P. Z. S.*, 1834, p. 52 (*vulturina*); Gray, *List Gen. B.*, p. 61; Hartl., *Vög. O.-Afr.*, p. 575; Ell., *l. c.* II, pl. 38. — Afrique E., du Somaliland au Kilima Ndjaro.

# SUBF. V. — PERDICINÆ

## 1483. LERWA

*Lerwa*, Hodgs. (1837); *Tetraoperdix*, Hodgs. (1844); *Tetraonoperdix*, Agass. (1846); *Lerva*, Blyth (1849); *Tetraeoperdix*, Heine (1887).

10.119. NIVICOLA, Hodgs., *Madr. Journ.*, 1837, p. 301; Gould, *B. Asia*, VII, pl. 75; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 392; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* II, p. 1, pl.; *Perdix lerwa*, Hodgs. (1853). — Himalaya, Chine W. (Montagnes).

(1) Voy. aussi : Reichenow, *Orn. Monatsb.*, 1898, pp. 1-3.

Digitized by Google

## 1484. TETRAOPHASIS

*Tetraophasis*, Elliot (1871).

10.120. OBSCURUS (Verr.), *N. Arch. Mus.*, *Bull.*, 1869, p. 33, pl. 6; Ell., *Mon. Phas.*, pl. 21; Gould, *B. Asia*, VII, pl. 44. — Thibet E.

10.121. SZECHENYII, Madar., *Zeit. Ges. Orn.* II, p. 50, pl. 2; id., *Ibis*, 1886, p. 145; *desgodinsi*, Oust., *Le Nat.*, 1886, p. 276. — Thibet, Chine W.

## 1485. TETRAOGALLUS (1)

*Tetraogallus*, Gray (1833); *Chourtka*, Motsch. (1859); *Megaloperdix*, Brandt (1843); *Oreotetrax*, Cab. (1846).

10.122. TIBETANUS, Gould, *P. Z. S.*, 1853, p. 47; id., *B. Asia*, VII, pl. 32; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 391; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* I, p. 273, pl. — Thibet, Chine W.

10.123. HENRICI, Oust., *Ann. Sc. Nat.*, 1891, pp. 295, 313; Grant, *Cat.*, p. 106. — Chine W.

10.124. ALTAICUS (Gebl.), *Bull. Acad. St-Pétersb.*, 1837, p. 31; Gray, *P. Z. S.*, 1842, p. 105; Gould, *B. Asia*, VII, pl. 31. — Monts Altaï.

10.125. HIMALAYENSIS, Gray, *P. Z. S.*, 1842, p. 105; Gould, *B. Asia*, VII, pl. 30; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* I, p. 267, pl.; *nigellii*, Jard. et Sel. (pt.); Gray, *Ill. Ind. Zool.* II, pl. 46. — Himalaya, Altaï.

2683. *Var.* GROMBCZEWSKII, Bianchi, *J. f. O.*, 1899, p. 429; *himalayensis* (pt.), auct. plur. — Kuen-Lun W.

2684. *Var.* KOSLOWI, Bianchi, *l. c.*, p. 430. — Altyn-tagh, Nan-schan.

10.126. CASPIUS (Gm.), *Reise*, IV, p. 67, pl. 10; Gould, *B. Asia*, VII, pl. 29; *nigelli*, Jard. et Sel. (pt.); *raddei*, Bolle et Brm., *J. f. O.*, 1873, p. 4; *challayei*, Oust.; *tauricus*, Dress. — Asie Mineure, Caucase, Perse.

10.127. CAUCASICUS (Pall.), *Zoogr.* II, pp. 76, 87, pl.; Radde, *Orn. Cauc.*, p. 335, pl. 21, ff. 1, 2; *alpina*, Motsch.; *caspius*, Gould (pt.). — Caucase.

## 1486. CACCABIS

*Caccabis*, *Alectoris*, Kaup (1829); *Chacura*, *Pyctes*, Hodgs. (1844).

10.128. SAXATILIS (Mey. et Wolf), *Tasch. Deuts.* I, p. 305, pl.; Naum., *Vög. Deutschl.* VI, p. 546, pl. 164; Dress., *B. Eur.* VII, p. 95, pl. 470; *rufa*, Lath. (nec Lin.); *græca*, Steph.; *rupestris*, Brm.; *melanocephala*, Fatio (nec Rüpp.), aberr. — Montagnes de l'Europe centr. et mérid.

(1) Voy. aussi : Bianchi, *Journ. f. Orn.*, 1899, pp. 421-434.

Digitized by Google

2685. *Var.* CHUKAR (Gray), *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 54; Gould, *Cent. B. Him.*, pl. 71; *saxatilis* (pt.), auct. plur.; *pugnax*, Hodgs.; *græca* (pt.), auct. plur.; *synaica, altaica*, Bp.; *sinaitica*, Heugl.; *chukor*, Hodgs.; *var. pubescens*, Swinh.; *arenarius, pallescens* et *pallidus*, Hend. et Hume; *hyemalis*, Severtz. — Europe S.-E., Arabie, Perse, Asie centr. jusqu'en Chine.

2686. *Var.* MAGNA, Przew., *Mongolia*, II, p. 127; Dedit., *J. f. O.*, 1886, p. 551. — Thibet N., Chine W.

10.129. RUFA (Lin.); Dress., *B. Eur.* VII, p. 105, pl. 471, f. 1; *rubra*, Briss.; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg.*, *Ois.* II, p. 64, pl. 176; *rufidorsalis, intercedens*, Brm.; *atrorufa* et *xanthopleura*, Vinc.; *var. australis*, Tristr., *Ibis*, 1889, p. 28. — Europe S.-W. et centr., Madeire, Açores, Canaries.

2687. *Var.* HISPANICA, Seoane, *Mém. Soc. Zool. Fr.* VII, p. 93. — Espagne.

10.130. PETROSA (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 758; Dress., *B. Eur.* VII, p. 111, pl. 471, f. 2; *barbara*, Bonn. — Europe S.-W., Afrique N.-W., Canaries.

2688. *Var.* SPATZI, Rchw., *Journ. f. Orn.*, 1895, p. 110. — Tunisie S.

2689. *Var.* KOENIGI, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1899, p. 189. — Ténériffe.

10.131. ? BARBATA, Rchw., *Orn. Mon.*, 1896, p. 76 (aberr.?) — ?

10.132. MELANOCEPHALA (Rüpp.), *N. Wirbelth. Vög.*, p. 11, pl. 5; Heugl., *Vög. N.-O. Afr.* III, p. 919; *yemensis*, Nichols., *P. Z. S.*, 1851, p. 128, pl. 40. — Arabie.

## 1487. AMMOPERDIX

*Ammoperdix*, Gould (1851).

10.133. BONHAMI (Fras.), *P. Z. S.*, 1843, p. 70; Des M., *Icon. Orn.*, pl. 29; Gould, *B. Asia*, VII, pl. 1; *griseogularis*, Brandt; Radde, *Orn. Cauc.*, p. 352; *cinereogularis*, Cab., *J. f. O.*, 1873, p. 458. — Arabie, Asie S.-W. jusqu'au N.-W. de l'Inde.

10.134. HEYI (Tem.), *Pl. Col.* 328, 329; Gould, *B. Asia*, VII, pl. 2; *rupicola*, Licht.; *flavirostris*, Heugl. — Arabie, Palestine.

10.135. CHOLMLEYI, Og.-Grant, *Handb. Game B.* II, *App.*, p. 293. — Egypte, Nubie.

## 1488. FRANCOLINUS (1)

*Francolinus*, Steph. (1819); *Chætopus*, Sw. (1837); *Attagen*, Keys. et Bl. (1840); *Scleroptila, Clamator*, Blyth (1849); *Didymacis, Ortygornis*, Rchb. (1852); *Scleroptera*, Bp. (1856); *Perdicidens*, Heine (1860).

10.136. VULGARIS, Steph., in *Shaw's Gen. Zool.* XI, p. 319; Dubois, *Ois. Eur.* II, p. et pl. 127; Dress., *B. Eur.* VII, p. 123, pl. 473; *francolinus*, Lin.; *var. brevipes*, Hodgs.; *tristriatus, heurici, asiæ*, Bp. — Chypre, Sicile, Palestine, Asie Mineure, Perse jusqu'à l'Inde N. et centr.

(1) Voy. aussi : F. de Schaeck, *Monogr. des Francolins* (*Mém. Soc. Zool. de Fr.* IV, p. 272).

Digitized by Google

10.137. CHINENSIS (Osbeck), *Voy. en Chine*, II, p. 326; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 400; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* II, p. 27, pl.; *pintadeanus*, Scop.; *perlatus*, *madagascariensis*, Gm.; *maculatus*, Gray; *phayrei*, Blyth; *sinensis*, Spal.; *pictus*, Schomb. (nec J. et S.) — Indo-Ch. (sauf Ténass. et Malac.), Chine S. (introd. aux îles de la Réun. et Maurice).

10.138. PICTUS (Jard. et Selb.), *Ill. Orn.*, pl. 50; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* II, p. 19, pl.; *hepburnii* et *pallida*, Gray, *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 55, f. 1, 2. — Inde W. et centr., Ceylan.

10.139. LATHAMI, Hartl., *J. f. O.*, 1854, p. 210; id., *Orn. W.-Afr.*, p. 202; Grant, *Cat.*, p. 139; *peli*, Tem., *Bijdr. Dierk.* I, p. 50, pl. — Afrique W.

10.140. PONDICERIANUS (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 760; Tem., *Pl. Col.* 213; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* II, p. 51, pl.; *orientalis*, Gray, *Ill. Ind. Zool.*, pl. 56, f. 2. — Arabie et de la Perse jusqu'à l'Inde et Ceylan.

10.141. COQUI (Smith), *Rep. Exp. Cent. Afr.*, p. 55; *subtorquatus*, Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 15; *schlegeli*, Boc. (nec Heugl.); *stuhlmanni*, Rchw. — Afrique S. et E.

10.142. HUBBARDI, Og.-Grant, *Ibis*, 1895, p. 378. — Victoria-Nyanza.

10.143. SCHLEGELI, Heugl., *J. f. O.*, 1863, p. 275; id., *Orn. N.-O. Afr.* II, p. 898, pl. 30; *?buckleyi*, Grant, ex Shel. — Afrique équator.

10.144. STREPTOPHORUS, Grant, *Ibis*, 1891, p. 126; id., *Cat. B.*, p. 145, pl. 1. — Mt Elgon, Massaïland.

10.145. SEPHÆNA (Smith), *Rep. Exp. Centr. Afr.*, p. 55 (1836); *pileatus*, Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 14 (1838); Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* II, p. 890, pl. 29, f. 2. — Afrique S. et S.-W.

2690. *Var.* GRANTI, Hartl., *P. Z. S.*, 1865, p. 665, pl. 39, f. 1; *pileatus* (pt.), auct. plur. (nec Smith); *rovuma* (mas.), Gray; *schoensis* et *schoanus*, Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* II, p. 891, pl. 29, f. 2; *ochrogaster*, Hartl., *J. f. O.*, 1882, p. 327. — Afrique E.

10.146. KIRKI, Hartl., *P. Z. S.*, 1867, p. 827; Fch. et Hartl., *Vög. O.-Afr.*, p. 588, pl. 10, f. 1; *rovuma* (fem.), Gray; *granti*, Nichols. — Afr. E., de la Rovuma au Somaliland.

2691. *Var.* SPILOGASTRA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1888, p. 541; Grant, *Ibis*, 1890, p. 347. — Harar, Choa.

10.147. ALBOGULARIS, Gray, *List Gall. B.* III, p. 35; Hartl., *Orn. W.-Afr.*, p. 201; Grant, *Cat. B.*, p. 149, pl. 2. — Sénégambie.

10.148. SPILOLÆMUS, Gray, *List Gall. Br. Mus.*, p. 50 (*psilolæmus !*); Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* II, p. 897; Fch. et Hartl., *Vög. O.-Afr.*, p. 586; Grant, *Cat. B.*, p. 150, pl. 3. — Choa.

10.149. GUTTURALIS (Rüpp.), *N. Wirb.*, p. 13; id., *Vög. N.-O. Afr.*, p. 105, pl. 40; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* II, p. 895. — Afr. N.-E., de l'Abyssinie au Somaliland.

Digitized by Google

2692. *Var.* LORTI, Sharpe, *Bull. Br. Orn. Club,* VI, p. XLII; Lort Phil., *Ibis,* 1898, p. 425, pl. 10. — Somaliland.

2693. *Var.* ULUENSIS, Grant, *Ibis,* 1892, p. 44; id., *Cat. B.*, p. 151, pl. 4. — Ulu (Afrique E. angl.)

10.150. AFRICANUS, Steph., in *Shaw's Gen. Zool.* XI, p. 323; *afra,* Lath. (nec Müll.); *afer,* Gray; Sharpe, in *Lay. B. S. Afr.*, p. 595; *perlata* (pt.), Tem., *Pig. et Gal.* III, pp. 326, 721. — Afrique S., du Cap au Transvaal.

10.151. FINSCHI, Bocage, *Orn. Angola,* p. 406; Rchw. et Schal., *J. f. O.,* 1882, p. 116. — Angola, Benguela.

10.152. CASTANEICOLLIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1888, p. 542; Grant, *Ibis,* 1890, p. 330, pl. 11. — Choa.

2694. *Var.* BOTTEGI, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1898, p. 652. — Choa S.-W.

10.153. LEVAILLANTI (Valenc.), *Dict. Sc. Nat.* XXXVIII, p. 441; Tem., *Pl. Col.* 477; Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 83; *levaillantoides,* Sm. — Afrique S., du Cap au Transvaal.

10.154. CRAWSHAYI, Grant, *Ibis,* 1896, p. 482, pl. 12. — Nyassaland W.

10.155. KIKUYUENSIS, Grant, *Bull. Br. Orn. Club,* 1897, p. XXIII. — Afrique équat. E. angl.

10.156. GARIEPENSIS, Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 83, 84; Grant, *Cat.*, p. 153. — Afrique S.-E.

2695. *Var.* JUGULARIS, Büttik., *Notes Leyd. Mus.* XI, p. 76, pl. 4; Grant, *Ibis,* 1890, p. 348; *gariepensis,* auct. plur. (nec Smith). — Afrique S.-W.

2696. *Var.* SHELLEYI, Grant, *Ibis,* 1890, p. 348; id., *Cat.*, p. 157, pl. 6; *gariepensis,* auct. plur. (nec Smith). — Afrique S.-E.

10.157. ELGONENSIS, Grant, *Ibis,* 1891, p. 126; id., *Cat.*, p. 157, pl. 5. — Mt Elgon (Afr. centr. E.)

10.158. GULARIS (Tem.), *Pig. et Gal.* III, pp. 401, 731; Gray, *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 56, f. 1; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* II, p. 59, pl.; *monogrammica,* Less. — Inde N.-E.

10.159. ADSPERSUS, Waterh., in *Alex. Exp.* II, p. 267, pl.; Bocage, *Orn. Angola,* p. 410; Sharpe, in *Lay. B. S. Afr.*, p. 590; Grant, *Cat. B.*, p. 159, pl. 7. — Afrique S.-W.

10.160. GRISEOSTRIATUS, Grant, *Ibis,* 1890, p. 349, pl. 10, 1892, p. 46. — Quanza (Afr. S.-W.)

10.161. BICALCARATUS (Lin.); *Pl. Enl.* 137; Gray, *List Gall.*, p. 33; Hartl., *Orn. W.-Afr.*, p. 201; *senegalensis,* Bonn.; *adansonii,* Tem.; *albiscapus,* Rchb. — Afrique W., du Niger au Maroc.

10.162. CLAPPERTONI, Childr., Denh. et Clap., *Trav. App.* XXI, p. 198; Gray, *Gen. B.* III, pl. 130; Cretschm., *Rüpp. Zool. Atlas,* p. 13, pl. 9; *ruppelli,* Gray (pt.) — Soudan centr. et E.

Digitized by Google

2697. *Var.* Gedgei, Grant, *Ibis*, 1891, p. 124; Sharpe, *Ibis*, 1892, p. 551, pl. 14. — Elgon (Afr. centr. E.)

2698. *Var.* Hartlaubi, Bocage, *J. Sc. Lisb.*, 1869, p. 350; id., *J. f. O.*, 1876, p. 305; id., *Orn. Ang.*, p. 408. — Mossamedes (Afrique S.-W.)

10.163. dybowskii, Oust., *Le Natural.* XIV, p. 232 (1893). — Haut-Congo.

10.164. icterorhynchus, Heugl., *J. f. O.*, 1865, p. 275, 1864, p. 27; id., *Orn. N.-O. Afr.* II, p. 894, pl. 29, f. 1. — Afrique équator.

10.165. harwoodi, Weld-Bl. et Lav., *Ibis*, 1900, p. 197; Grant, *Ibis*, 1900, p. 335, pl. 6. — Abyssinie S.

10.166. nigrosquamatus, Neum., *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 8. — Ethiopie S.

10.167. sharpei, Grant, *Ibis*, 1892, p. 47; id., *Cat.*, p. 164; *ruppelli* (pt.), Gray et auct. plur. — Abyssinie, Choa.

10.168. capensis (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 759; Grant, *Cat.*, p. 165; *clamator*, Tem.; Sharpe, *Lay. B. S. Afr.*, p. 591; *nudicollis*, Tem. (pt.); *clamosus*, Less., *Tr. d'Orn.*, p. 504, pl. 87, f. 2. — Afrique S., du Cap à l'Orange.

10.169. natalensis, Smith, *S. Afr. Journ.*, 1833, p. 48; id., *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 13; *lechoho*, Sm. — Afrique S.-E.

10.170. hildebrandti, Cab., *J. f. O.*, 1878, pp. 206, 243, pl. 4, f. 2; *altumi*, Fisch. et Rchw., *J. f. O.*, 1884, p. 179, pl. 2 (fem.) — Afrique E. trop.

10.171. johnstoni, Shell., *Ibis*, 1894, p. 24. — Nyassaland.

10.172. fischeri, Rchw., *J. f. O.*, 1887, f. 51; Grant, *Ibis*, 1892, p. 49. — Ussere (Afr. E.)

10.173. squamatus, Cass., *Pr. Ac. Philad.*, 1857, p. 321; Bocage, *Orn. Angola*, p. 409; *ashantensis*, Rchw., *J. f. O.*, 1877, p. 13; *petiti*, Boc.; *modestus*, Cab., *J. f. O.*, 1889, p. 89. — Gabon, Congo.

10.174. schuetti, Cab., *J. f. O.*, 1880, p. 331, 1881, pl. 2. — Afrique E. et Angola.

10.175. tetraoninus, Weld-Bl. et Lav., *Ibis*, 1900, p. 197; Grant, *Ibis*, 1900, p. 336, pl. 5. — Abyssinie S.

10.176. ahantensis, Tem., *Bijdr. tot de Dierk.* I, p. 49, pl. 14; *ashantensis*, Gr. — Côte-d'Or, Libéria (Afr. W.)

10.177. jacksoni, Grant, *Ibis*, 1891, p. 123, 1892, p. 51, pl. 1. — Afrique équat. E.

10.178. erckeli (Rüpp.), *Neue Wirb.*, p. 12; Des M., in *Lef. Voy. en Abyss.*, p. 144, pl. 11; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* II, p. 882; *icteropus*, Heugl.; Hartl., *P. Z. S.*, 1865, p. 666, pl. 39, f. 2. — Afrique N.-E.

## 1489. PTERNISTES

*Pternistis*, Wagl. (1832); *Pternistes*, Gray (1840).

10.179. nudicollis (Bodd.); Gray, *List Gall. B.* III, p. 32; — Cap, Cafrerie, Trans-

Digitized by Google

Sharpe, *Lay. B.S. Afr.*, p. 589; Neum., *J. f. O.*, 1898, p. 300, pl. 3, f. 4. — vaal.

2699. *Var.* Melanogastra, Neum., *J. f. O.*, 1898, p. 299, pl. 3, f. 1. — Tanga, Usambara (Afr. E.)

2700. *Var.* Humboldti (Peters), *M. B. Akad. Wiss. Berl.*, 1854, p. 134; Bocage, *J. f. O.*, 1876, p. 504; Neum., *J. f. O.*, 1898, p. 300, pl. 3, f. 2; *nudicollis* (pt.), Fisch. et Rchw. — Mosambique.

2701. *Var.* Leucoparæa, Fisch. et Rchw., *J. f. O.*, 1884, p. 265; Neum., *J. f. O.*, 1898, pl. 3, f. 3; *humboldti* (pt.), Grant. — Kipini (Afr. E.)

10.180. afer (Müll.), *S. N.*, *Suppl.*, p. 129; *Pl. Enl.* 180; Grant, *Ibis*, 1892, p. 53; *rubricollis*, Gm.; *nudicollis*, Tem. (pt.); *sclateri*, Boc., *J. Sc. Lisb.* I, p. 327, pl. 6; id., *J. f. O.*, 1876, p. 303. — Afrique S.-W.

2702. *Var.* Benguellensis, Bocage, *J. Sc. Lisb.* XI, p. 154. — Galanga, Angola.

10.181. cranchi (Leach), *Tuck. Narrat. Explor. Riv. Zaire*, *App.*, p. 408; Wagl., *Isis*, 1832, p. 1229; *punctulata*, Gray, *Ill. Ind. Zool.* II, pl. 43, f. 3; *lucani*, Boc., *J. Sc. Lisb.*, 1879, p. 68. — Loango, Congo.

2703. *Var.* Boehmi, Rchw., *J. f. O.*, 1885, p. 465 (*böhmi*); *cranchi* (pt.), auct. plur.; Fch. et Hartl., *Vög. O.-Afr.*, p. 579, pl. 9; *rubricollis*, Böhm; *boehmi*, Schaeck. — Afrique centr. E.

10.182. swainsoni (Smith), *Rep. Exp. Cent. Afr.*, p. 54; id., *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 12; Gray, *List Gall. B.* III, p. 52. — Afrique S. et S.-E., Damaraland.

10.183. rufopictus, Rchw., *J. f. O.*, 1887, p. 52; Schaeck, *Mém. Soc. Zool. de Fr.* IV, p. 366. — Afrique équat. E.

10.184. leucoscepus (Gray), *List Gall. B. M.*, 1867, p. 48; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* II, p. 899; Grant, *Cat. B. B. M.* XXII, p. 181, pl. 8; *rubricollis*, auct. plur. (nec Gm.); Cretzschm., *Rüpp. Atl.*, p. 44, pl. 30. — Afrique N.-E. jusqu'au Somaliland.

10.185. infuscatus, Cab., *J. f. O.*, 1868, p. 413; id., *v. d. Deck. Reis.* III, p. 44, pl. 14; *rubricollis*, Rüpp. (nec Gm.); *clappertoni*, Shell. — Du Kilima Ndjaro au Somaliland.

## 1490. RHIZOTHERA

*Rhizothera*, Gray (1841).

10.186. longirostris (Tem.), *Pig. et Gal.* III, pp. 323, 721; Gray, *Ill. Ind. Zool.* II, pl. 43, f. 2; id., *List Gen. B.*, p. 79; Salvad., *Ucc. Borneo*, p. 310; *curvirostris*, Raffl. — Malacca, Sumatra, Bornéo.

2704. *Var.* Dulitensis, Grant, *Ibis*, 1895, p. 378. — Mt Dulit (Bornéo N.)



Digitized by Google

## 1491. PERDIX

*Perdix*, Briss. (1760); *Perdrix*, Brünn. (1772); *Starna*, Bonap. (1838); *Sacfa*, Hodgs. (1857).

10.187. CINEREA, Lath., *Ind. Orn.* II, p. 645; Dress., *B. Eur.* VII, p. 151, pl. 474, 475; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg.*, *Ois.* II, p. 69, pl. 177; *Tet. perdix*, Lin.; *cineracea*, *sylvestris*, Brm.; *var. sphagnetorum*, *scanica* et *lucida*, Altum, *J. f. O.*, 1894, pp. 254-269. — Europe, Asie centr.

2705. *Var.* ROBUSTA, Homey. et Tancré, *Mitth. orn. Ver. Wien*, 1883, p. 92, 1885, pl., ff. 3-5. — Europe E., Sibérie S.

2706. *Var.* HISPANIENSIS, Rchw., *Ber. Allg. Deutsch. Orn. Ges.*, 1893, p. 5; *charreola*, Seoane, *Mém. Soc. Zool. Fr.* VII, p. 94. — Espagne.

2707. ? *Var.* MONTANA, Briss., *Orn.* I, p. 224, pl. 21, f. 2; Jard., *Nat. Lib.*, *Orn.* IV, p. 101, pl. 2; *europæus*, P.-L.-S. Müll.; *torquata* et *varia*, Bechst. — Lorraine (Montagnes), France N.-W.

2708. *Var.* DAMASCENA, Briss., *l. c.*, p. 223; de la Font., *Fne. Luxemb.*, *Ois.*, p. 177; Grant, *Cat.*, p. 192; *minor*, Brm.; *peregrina*, Tschusi, *Ornis*, 1888, p. 250. — Europe centr. et mérid. (région Alpine ?)

2709. ? *Var.* PALLIDA, Demeez., in *Olphe-Gal.*, *Faune orn. Eur. Occ.*, fasc. XXXIX, p. 35; *palustris*, Demeez., *Ibis*, 1864, p. 223. — France N.-W. (côtes).

10.188. DAURICA (Pall.), *Zoogr. Rosso-As.* II, p. 78; *sibirica*, Pall.; *cinerea*, Lamp.; *barbata*, Verr. et Des M., *P. Z. S.*, 1863, p. 62, pl. 9; Gould, *B. Asia*, VII, pl. 73; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 392; *melanothorax*, Tegetm. — Asie N.-E. et centr., Mongolie, Chine N.

10.189. TURCOMANA, Stolzm., *Bull. Soc. Nat. Moscou*, 1897, p. 79. — Ferghana.

10.190. HODGSONIÆ, Gould, *B. Asia*, VII, pl. 74; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* II, p. 63, pl. — Thibet, Himalaya.

10.191. SIFANICA, Prjev., *Mongolia*, II, p. 124; Grant, *Cat.*, p. 193. — Thibet, Chine W.

## 1492. MARGAROPERDIX

*Margaroperdix*, Rchb. (1852).

10.192. MADAGASCARIENSIS (Scop.), *Del. Fl. et Faun. Insubr.* II, p. 93; Grant, *Cat.*, p. 196; *striatus*, Gm.; Tem., *Pl. Col.* 82; Hartl., *Orn. Madag.*, p. 63; M.-Edw. et Grand., *Hist. Madag.*, *Ois.* I, pl. 199-201; *griseus*, Gm.; *perlata*, Tem.; *strictus*, Cuv. — Madagascar (introd. à la Réunion).

Digitized by Google

## 1493. PERDICULA

*Perdicula*, Hodgs. (1837).

10.193. ASIATICA (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 469; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* II, p. 109, pl.; *cambayensis*, Tem., *Pl. Col.* 447; *pentah*, Syk.; *rupicola*, *rupicolor*, Hodgs.; *rubiginosa*, Gray; *argoondah*, Gould (nec Syk.) — Inde, Ceylan.

10.194. ARGOONDA (Syk.), *P. Z. S.*, 1832, p. 153; id., *Tr. Z. S.* II, p. 17, pl. 2; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* II, p. 117, pl.; *asiatica*, Jerd. (nec Lath.), *B. Ind.* III, p. 583. — Inde.

## 1494. MICROPERDIX

*Microperdix*, Gould (1862).

10.195. ERYTHRORHYNCHA (Syk.), *P. Z. S.*, 1832, p. 153; id., *Tr. Z. S.* II, p. 16, pl. 1; Gould, *B. Asia*, VII, pl. 3. — Inde S.-W.

2710. *Var.* BLEWITTI, Hume, *Str. F.* II, p. 512; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* II, p. 130, pl.; *erythrorhyncha*, Ball (nec Syk.) — Inde centr.

10.196. MANIPURENSIS, Hume, *Str. F.*, 1880, p. 467; Rchw. et Schal., *J. f. O.*, 1883, p. 408. — Manipour.

## 1495. ARBORICOLA

*Arborophila*, Hodgs. (1837); *Arboricola*, Hodgs. (1844); *Tropicoperdix*, Blyth (1859); *Phœnicoperdix*, Blyth (1861); *Oreoperdix*, Swinh. (1864); *Peloperdix*, Blyth (1866 ?); *Hyloperdix*, Sundev. (1872).

10.197. TORQUEOLA (Valenc.), *Dict. Sc. N.* XXXVIII, p. 435; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* II, p. 69, pl.; *megapodia*, Tem., *Pl. Col.* 462, 463; *olivacea*, Gray; id., *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 57; *torquata*, Less. — Himalaya et Monts Naga.

10.198. HENRICI, Oust., *Bull. Mus. Paris*, 1896, p. 317; id., *Arch. du Mus.*, 1899, I, pl. 9. — Annam.

10.199. ATROGULARIS, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1849, p. 819; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* II, p. 79, pl.; Grant, *Cat.*, p. 209. — Tippera, Assam, Manipour, Cachar et Monts Kachin.

10.200. ARDENS, Styan, *Bull. Orn. Cl.*, 1892, p. VI; id., *Ibis*, 1893, pp. 56, 436, pl. 12. — Haïnan.

10.201. CRUDIGULARIS (Swinh.), *Ibis*, 1864, p. 426; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 393; Blyth, *Ibis*, 1867, p. 160. — Formose.

10.202. INTERMEDIA, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1856, p. 277; id., *Ibis*, 1867, p. 159; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* II, p. 85, pl. — Manipour, Assam, Birmanie (montagnes).

Digitized by Google

10.203. RUFOGULARIS, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1849, p. 819; Hume et Marsh., *l. c.* II, p. 75, pl.; *rufipes*, Hodgs.; *tickelli*, Hume. — Himalaya, de Kumaon à l'Assam, Ténass.

10.204. GINGICA (Gm.), *S. N.* I, p. 760; Blyth, *Ibis*, 1870, p. 174; Grant, *Ibis*, 1892, p. 595, pl. 9; *scutata*, Gray. — Luçon ??

2711. *Var.* RICKETTI, Grant, *Ibis*, 1899, p. 444. — Fohkien.

10.205. MANDELLII (Hume), *Str. F.*, 1874, p. 449; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* II, p. 85, pl. — Sikkim, Boutan, Assam.

10.206. JAVANICA (Gm.), *S. N.* I, p. 761; Tem., *Pl. Col.* 148; Grant, *Cat.*, p. 214. — Java.

10.207. RUBRIROSTRIS (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1879, p. 251; Snellem., in *Veth's Midd.-Sum.* IV, p. 46, pl. 3; *vethi*, Schl. — Sumatra.

10.208. BRUNNEOPECTUS, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1855, p. 276; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* II, p. 87, pl. — Indo-Chine W.

10.209. HYPERYTHRA (Sharpe), *Ibis*, 1879, p. 266; Gould, *B. Asia*, VI, pl. 71; Grant, *Ibis*, 1892, p. 597; *erythrophrys*, Sharpe, *Ibis*, 1890, pp. 139, 284, pl. 4. — Bornéo N.-W.

10.210. ORIENTALIS (Horsf.), *Trans. Linn. Soc.*, 1822, p. 184; Grant, *Ibis*, 1892, p. 597; *personata*, Horsf., *Zool. Res.*, pl. 61. — Java.

10.211. SUMATRANA, Grant, *Ann. Mag. N. H.*, 1891, p. 297; id., *Ibis*, 1892, p. 598; *personata*, Gray (nec Horsf.) — Sumatra.

10.212. CHLOROPUS, Tick., *J. A. S. Beng.*, 1859, pp. 415, 453; Hume et Marsh., *l. c.* II, p. 91, pl. — Indo-Chine W. et S.

10.213. CHARLTONI (Eyton), *Ann. Mag. N. H.*, 1845, p. 250; Hume et Marsh., *l. c.*, p. 95, pl.; *pyrrhogaster*, Rchb. — Siam, Malacca, Bornéo N. et N.-E.

## 1496. HÆMATORTYX

*Hæmatortyx*, Sharpe (1879).

10.214. SANGUINICEPS, Sharpe, *Ibis*, 1879, p. 266; Gould, *B. Asia*, VI, pl. 70. — Bornéo N.-W.

## 1497. CALOPERDIX

*Caloperdix*, Blyth (1867).

10.215. OCULEA (Tem.), *Pig. et Gal.* III, pp. 408, 732; Gray, *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 58; Hume et Marsh., *l. c.*, p. 101, pl.; *ocellatus*, Vig. — Ténassérim S., Malacca.

2712. *Var.* SUMATRANA, Grant, *Bull. Orn. Cl.* II, p. v; id., *Ibis*, 1895, p. 118; id., *Cat.*, p. 224; *oculea* (pt.), auct. plur. — Sumatra, Java.

2713. *Var.* BORNEENSIS, Grant, *Bull. Orn. Cl.* II, p. v; id., *Ibis*, 1895, p. 117; *oculea* (pt.), Salvad. — Bornéo N.-W.

Digitized by Google

## 1498. ROLLULUS

*Rollulus*, Bonn. (1790); *Cryptonyx*, Tem. (1815); *Liponyx*, Vieill. (1816).

10.216. ROULROUL (Scop.), *Del. Fl. et Faun. Insubr.* II, p. 93; Gray, *List Gall. B.* III, p. 42 (1844); Hume et Marsh., *l. c.*, p. 105, pl.; *cristatus*, Sparrm.; *viridis*, Gm.; *porphyrio*, Shaw; *coronata*, Lath.; Tem., *Pl. Col.* 350, 351; *nigrifrons*, Drap. — Cochinchine, Ténasserim S., Malacca, Sumatra, Java, Bornéo.

## 1499. MELANOPERDIX

*Melanoperdix*, Jerd. (1864).

10.217. NIGRA (Vig.), *Zool. Journ.*, 1829, p. 349; Jerd., *B. Ind.* III, p. 580; Salvad., *Ucc. Borneo*, p. 509; ?*cambaiensis*, Lath.; ?*rufus*, Tem.; *ferrugineus*, Vig.; Gray, *Ill. Ind. Zool.* II, pl. 45, f. 1; *dussumieri*, Less., *Bél. Voy. Ind.*, p. 275, pl. 7; *æruginosus*, Eyt. — Malacca, Sumatra, Bornéo.

## 1500. COTURNIX

*Coturnix*, Moeh. (1752), Bonn. (1791); *Ortygion*, Keys. et Blas. (1840); *Perdortyx*, Montess. (1886).

10.218. COMMUNIS, Bonn., *Tabl. Encycl. méth.* I, p. 217, pl. 96; Dress., *B. Eur.* VII, p. 143, pl. 476; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg., Ois.* II, p. 76, pl. 178; *alba*, *nigra*, *varia*, *major*, Bechst.; *dactylisonans*, Tem.; Gould, *B. Eur.* IV, pl. 265; *media*, *minor*, Brm.; *europæus*, Sw.; *vulgaris*, Bout.; *baldami*, Naum.; Madar., *Aquila*, III, pl. 2; *leucogenys*, Brm.; *chinensis*, Swinh.; *lodoisiæ*, Verr. (aberr.); *ypsilophorus*, Bosc.; *communis orientalis*, Bodg. — Europe, Asie (excepté l'Indo-Ch.), au Nord jusqu'au 63° (en été); Afrique (en hiver).

2714. *Var.* AFRICANA, Tem. et Schl., *Fauna Jap.*, *Aves*, p. 103; *coturnix* (pt.), auct. plur.; *dactylisonans*, auct. plur. (nec Tem.); *communis* (pt.), auct. plur. (nec Bonn.); *capensis*, Licht.; Grant, *Cat.*, p. 257. — Afrique au S. du 15° l. S., Madagascar, îles Comores, Maurice, du Cap Vert, Canar., Madeire, Açores.

2715. *Var.* JAPONICA, Tem. et Schl., *Fauna Jap.*, p. 103, pl. 61; *coturnix*, Radde; *muta*, Dyb.; *communis* (pt.), auct. plur.; *ussuriensis*, Bodgs., *Consp. Av. Imp. Ross.* I, p. 45. — Japon, Sibérie E., Chine, Boutan, Karen-nee.

10.219. COROMANDELICA (Gm.), *S. N.* I, p. 764; Bonn., *Tabl. Encycl. méth.* I, p. 221; Gould, *B. Asia*, VII, pl. 9; Hume et Marsh., *l. c.* II, p. 152, pl.; *textilis*, Tem., *Pl. Col.* 35; *olivacea*, Buch.; *pluvialis*, Hodgs. — Inde, Ceylan, Birmanie.

Digitized by Google

10.220. DELEGORGUEI, Deleg., *Voy. Afr. austr.* II, p. 615; *histrionica*, Hartl.; id., *Beitr. Orn. W.-Afr.*, pp. 1, 38, pl. 11; *fornasini*, Bianc., *Spec. Zool. Mos.*, fasc. XVI, p. 599, pl. 1, f. 2; id., *Mem. Acc. Sc. Bolog.*, 1865, p. 521, pl. 2, f. 2; *crucigera*, Heugl. — Afrique, du 15° l. N. au Cap, et Arabie S.

10.221. PECTORALIS, Gould, *P. Z. S.*, 1837, p. 8; id., *B. Austr.* V, pl. 88; *australis*, Rams., *Ibis*, 1865, p. 86. — Australie, Tasmanie.

10.222. NOVÆ-ZEALANDIÆ, Quoy et Gaim., *Voy. Astrol., Zool.* I, p. 242, pl. 24, f. 1; Bull., *Man. B. N.-Zeal.*, p. 43, pl. 19; id., *B. N.-Zeal.*, I, p. 223, pl. 23. — Nouv.-Zélande (éteint.)

## 1501. SYNOECUS (1)

*Synoicus*, Gould (1843); *Synœcus*, Agass. (1846); *Synœcus*, Müll. (1869).

10.223. AUSTRALIS (Tem.), *Pig. et Gal.* III, pp. 474, 740; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 46, pl. 215; Gould, *B. Austr.* V, pl. 89; *sordidus*, Gould; id., *B. Austr.* V, pl. 91; *diemenensis*, Gould, *B. Austr.* V, pl. 90; *cervinus*, Gould. — Australie, Tasmanie, Nouv.-Guinée S.-E.

10.224. RAALTENI (Müll. et Schl.), *Land-en Volkenk.*, p. 158; Wall., *P. Z. S.*, 1865, p. 486; Grant, *Cat.*, p. 249. — Timor, Flores.

2716. *Var.* PALLIDIOR, Hart., *Novit. Zool.* IV, p. 271. — Ile Savu.

10.225. PLUMBEUS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1894, p. 152; Grant, *Handb. Game B.*, p. 192. — Vakena, Nouv.-Guinée S.-E.

## 1502. EXCALFACTORIA

*Excalfactoria*, Bonap. (1856); *Compsortyx*, Heine (1890).

10.226. CHINENSIS (Lin.); Bp., *C. R.* XLII, p. 881; Gould, *B. Asia*, VII, pl. 6; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 397; *sinensis*, Bonn.; *flavipes*, Blyth; *minima*, Gould; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 255; *caineana*, Swinh. — Inde, Ceylan, Indo-Chine, Malacca, Formose, Célèbes, Moluques.

2717. *Var.* LINEATA (Scop.), *Del Fl. et Faun. Insubr.* II, p. 87; Grant, *Cat.*, p. 253; *manillensis*, Gm.; *philippensis*, Hodgs.; *chinensis* (pt.), auct. plur. (nec Lin.); Gould, *B. Austr.* V, pl. 92; *nana*, Schinz; *australis*, Gould. — Philippines, Bornéo, Java, Sumatra, Australie.

10.227. LEPIDA, Hartl., *Sitz. Ver. Hamb.*, 1879, *Unterh.*; Salv. et Scl., *Ibis*, 1880, p. 155; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 256; *chinensis* (pt.), Scl. — Archipel Bismarck, Nouv.-Guin. S.-E.

(1) Le *S. lodoisiæ*, Verr. et Des M., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1862, p. 225. pl. 11, est tout simplement une aberration du *Coturnix communis*.

Digitized by Google

10.228. ADANSONI (Verr.), *Rev. et Mag. de Zool.*, 1851, p. 515; Grant, *Cat.*, p. 255; *emini*, Rchw., *J. f. O.*, 1892, p. 18, pl. 1, f. 3. — Afrique tropicale.

## 1503. PTILOPACHYS

*Ptilopachus*, Sw. (1837); *Petrogallus*, Gray (1837); *Ptilopachys*, Strickl. (1841).

10.229. FUSCUS (Vieill.), *Tabl. Enc. méth.* I, p. 366; id., *Gal. Ois.* II, p. 40, pl. 212; Jard. et Selby, *Ill. Orn.*, 1837, pl. 16; *ventralis*, Valenc.; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* III, p. 879; *erythrorhynchus*, Sw. — De Sénégambie à la Côte-d'Or, et Afrique N.-E.

2718. *Var.* FLORENTIÆ, Grant, *Bull. Br. Orn. Cl.*, 1899, p. 107; id., *Ibis*, 1900, p. 676. — Afrique E. angl.

## 1504. BAMBUSICOLA

*Bambusicola*, Gould (1862).

10.230. FYTCHII, Anders., *P. Z. S.*, 1871, p. 214, pl. 11; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 394; Anders., *Yunnan*, II, p. 673, pl. 54; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* II, p. 97, pl.; *hopkinsoni*, Godw.-Aust., *P. Z. S.*, 1874, p. 44. — Assam, Haute-Birmanie, Setchuan (Ch.)

10.231. THORACICA (Tem.), *Pig. et Gal.* III, pp. 335, 723; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 393; *sphenura*, Gray; id., *Fasc. B. China*, pl. 8; *bambusæ*, Swinh. — Chine S.

10.232. SONORIVOX, Gould, *P. Z. S.*, 1862, p. 285; id., *B. Asia*, VI, pl. 63; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 394. — Formose.

## 1505. GALLOPERDIX

*Galloperdix*, Blyth (1844); *Hepburnia*, Rchb. (1852); *Plectroperdix*, Heine (1890).

10.233. SPADICEA (Gm.), *S. N.* I, p. 759; Gould, *B. Asia*, VI, pl. 68; *northiæ*, Gray, *Ill. Ind. Orn.* II, pl. 43, f. 1; *madagascariensis*, Gray. — Inde (introd. à Madagascar).

10.234. LUNULATA (Valenc.), *Dict. Sc. Nat.* XXXVIII, p. 446; Hume, *N. and E. Ind. B.*, p. 553; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* I, p. 235, pl.; *hardwickii*, Gray; *nivosus*, Deless., *Mag. Zool., Ois.*, 1840, pl. 18; *lunulosa*, Blyth; Scl. et W., *Zool. Sket.* II, pl. 41. — Inde.

10.235. BICALCARATA (Penn.), *Ind. Zool.*, p. 40, pl. 7; Legge, *B. Ceyl.* III, p. 741, pl.; Hume et Marsh., *l. c.* I, p. 261, pl.; *zeylonensis*, Gm.; *ceylonensis*, Lath. — Ceylan.

Digitized by Google

### 1506. OPHRYSIA

*Ophrysia*, Bonap. (1856); *Malacortyx* et *Malacoturnix*, Blyth (1867).

10.236. SUPERCILIOSA (Gray), *Knowls. Menag., Aves*, p. 8, pl. 16; Bp., *C. R.* XLIII, p. 414; Hume et Marsh., *l. c.* II, p. 105, pl.; Grant, *Cat.*, p. 266. — Himalaya N.-W.

## FAM. V. — ODONTOPHORIDÆ (1)

### 1507. DENDRORTYX

*Dendrortyx*, Gould (1844).

10.237. MACROURUS (Jard. et Sel.), *Ill. Orn.* I, pl. 38, 49; Gould, *Mon. Odontoph.*, pt. I, pl. 20; *griseipectus*, *striatus*, Nels., *Auk*, 1897, p. 44; *dilutus*, Nels., *l. c.* 1900, p. 254. — Mexique S., Colima, Guerrero, Morelos.

2719. *Var.* OAXACÆ, Nels., *Auk*, 1897, p. 45. — Oaxaca.

10.238. BARBATUS, Licht., Gould, *Mon. Odont.*, pt. II, pl. 22. — Mex. S.-E., Vera-Cruz.

10.239. LEUCOPHRYS, Gould, *P. Z. S.*, 1845, p. 152; id., *Mon.*, pt. II, pl. 21. — Guatém., Costa-Rica.

10.240. HYPOSPODIUS, Salv., *Ibis*, 1897, p. 112. — Costa-Rica.

### 1508. CALLIPEPLA

*Callipepla*, Wagl. (1832).

10.241. SQUAMATA (Vig.), *Zool. Journ.*, 1830, p. 275; Gould, *l. c.*, pt. I, pl. 19; Cass., *Ill. B. Cat.*, p. 129, pl. 19; *cristata*, La Llave; *strenua*, Wagl.; *pallida*, Brewst. — Nouv.-Mexique, Arizona, Texas S.-W., Mexique N. et centr.

2720. *Var.* CASTANOGASTRIS, Brewst., *Bull. Nutt. Orn. Cl.*, 1883, p. 34; Bendire, *N. Am. B.*, p. 22, pl. 1, ff. 6, 7. — Rio Grande, Texas, Mexique N.-E.

### 1509. OREORTYX

*Oreortyx*, Baird (1860).

10.242. PICTUS (Dougl.), *Trans. Linn. Soc.* XVI, p. 143; Jard. et Sel., *Ill. Orn.* II, pl. 107; Gould, *l. c.*, pt. I, pl. 15; Baird, *B. N. Am.*, p. 642; Ridgw., *Auk*, 1894, p. 195, pl. 6. — États-Unis W. (Côtes).

2721. *Var.* PLUMIFERA (Gould), *P. Z. S.*, 1837, p. 42; Audub., *B. Am.* V, p. 69, pl. 291; Ridgw., *Auk*, 1894, p. 195, pl. 6; *pictus* (pt.), Grant. — Sierra-Nevada, Orégon, Californie E.

(1) Voy.: Ogilvie-Grant, *Cat. Birds Brit. Mus.* XXII, pp. 392-444 (1893); Gould, *A Monograph of the Odontophorinæ* (1844-50).

Digitized by Google

2722. *Var.* CONFINIS, Anth., *Pr. Calif. Ac. Sc.*, 1889, p. 74; *pictus* (pt.), Grant. — Basse-Californie.

## 1510. LOPHORTYX

*Lophortyx*, Bonap. (1838); *Callipepla* (pt.), auct. plur.

10.243. CALIFORNICUS (Shaw et Nodd.), *Nat. Misc.* IX, pl. 345; Audub., *Orn. Biogr.* V, p. 152, pl. 413; id., *B. Am.* V, p. 67, pl. 290; Bp., *Comp. List*, p. 42; Gould, *Mon. Odont.*, pt. I, pl. 16; *californianus*, Gray; *virginianus*, Hutt.; *brunnescens*, Ridgw. — États-Unis W., Basse-Californie.

2723. *Var.* VALLICOLA, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.* VIII, p. 355; Towns., *l. c.* X, pp. 200, 233. — Californie centr.

10.244. GAMBELI, Nutt., Gamb., *Pr. Ac. Philad.*, 1843, p. 260; Gould, *l. c.*, pt. III, pl. 17; Bend., *N. Am. B.*, p. 29, pl. 1, ff. 11-14; *venusta*, Gould; *californicus* (pt.), Coues; *deserticola*, Steph., *Auk*, 1895, p. 371. — États-Unis W., de l'Utah jusqu'au N. du Mexique.

2724. *Var.* FULVIPECTUS, Nels., *Auk*, 1899, p. 26. — Mexique N.-W.

10.245. DOUGLASI (Vig.), Dougl., *Trans. Linn. Soc.*, 1828, p. 145; Grant, *Cat.*, p. 404; *elegans*, Less., *Cent. Zool.*, p. 189, pl. 61; Gould, *l. c.*, pt. I, pl. 18; *spilogaster*, Vig. — Mexique W.

2725. *Var.* BENSONI (Ridgw.), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 148. — Sonora (Mexique N.)

10.246. ? LEUCOPROSOPON, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1895, pp. 10, 11 (hybride ?) — ?

## 1511. PHILORTYX

*Philortyx*, Gould (1846).

10.247. FASCIATUS, Gould (ex Natt.), *P. Z. S.*, 1843, p. 135; id., *Mon. Odont.*, pt. II, pl. 14; *perrotiana*, Des M.; *personatus*, Ridgw., *Auk*, 1886, p. 333. — Mexique S.

## 1512. EUPSYCHORTYX

*Eupsychortyx*, Gould (1844).

10.248. CRISTATUS (Lin.); *Pl. Enl.* 126; Less., *Ill. Zool.*, pl. 52; Gould, *l. c.*, pt. II, pl. 9; *temmincki*, Steph.; *neoxenus*, Vig.; Audub., *Orn. Biogr.* V, p. 228, pl. 423; *gouldi*, Berl., *J. f. O.*, 1892, p. 100. — Iles Curaçao et Aruba.

10.249. LEUCOPOGON (Less.), *Rev. Zool.*, 1842, p. 175; Des — Véragua, Colombie.



Digitized by Google

M., *Icon. Orn.*, pl. 36; *leucotis*, Gould; id., *Mon. Odont.*, pt. I, pl. 10.

10.250. SONNINI (Tem.), *Pig. et Gal.* III, pp. 451, 737; id., *Pl. Col.* 75; Gould, *l. c.*, pt. III, pl. 11; *cristatus*, Cab. (nec Lin.) — Vénézuéla, Guyane angl., Rio-Négro.

2726. *Var.* PALLIDA, Richm., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1895, p. 657. — Ile Margarita.

10.251. MOCQUERYSI, Hart., *Ibis*, 1894, p. 430; id., *Novit. Zool.* I, p. 675, pl. 15, f. 2; Grant, *Handb. Game B.* II, p. 131. — Cumana (Vénézuéla N.)

10.252. PARVICRISTATUS, Gould, *P. Z. S.*, 1843, p. 106; id., *Mon. Odont.*, pt. II, pl. 12. — Colombie.

10.253. LEYLANDI (Moore), *P. Z. S.*, 1859, p. 62; Grant, *Cat.*, p. 411; *leucofrenatus*, Ell., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1860, p. 106, pl. 3. — Honduras, Nicaragua, Costa-Rica.

10.254. HYPOLEUCUS, Gould, *P. Z. S.*, 1860, p. 62; Grant, *Cat.*, p. 413; *leucopogon*, Salv. et Scl. (nec Less.), *Ibis*, 1860, p. 277. — Guatémala.

## 1513. COLINUS

*Ortyx*, Steph. (1819, nec Oken, 1816); *Colinus*, Less. (1828); *Ortygia*, Boie (1828); *Colinia*, Nutt. (1832).

10.255. VIRGINIANUS (Lin.); *Pl. Enl.* 149; Audub., *Orn. Biogr.* I, p. 588, pl. 76; Gould, *Mon. Odont.*, pt. I, pl. 1; Stejn., *Auk*, II, p. 45; *marilandicus* et *mexicanus*, Lin.; *minor*, Bartr.; *borealis*, Tem.; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 44, pl. 214. — États-Unis E. jusqu'au Dakota et le Texas à l'Ouest.

2727. *Var.* FLORIDANA (Coues), *Key N. A. B.*, pp. 237, 591; Stejn., *Auk*, 1885, p. 45. — Florida (Cuba, introd.?)

2728. *Var.* TEXANA (Lawr.), *Ann. Lyc. N. Y.*, 1855, p. 1; Baird, *B. N. Am.*, p. 641, pl. 24; B., Br. et Rid., *B. N. Am.* III, p. 474; *maculata*, Nels., *Auk*, 1899, p. 26. — Texas S., W., Mex.

10.256. CUBANENSIS (Gould), in Gray, *Gen. B.* III, p. 514; id., *Mon. Odont.*, pt. III, pl. 2; Cory, *List B. West Ind.*, p. 24; *virginianus*, d'Orb. (nec Lin.) — Cuba.

10.257. PECTORALIS, Gould, *P. Z. S.*, 1842, p. 182; id., *Mon. Odont.*, pt. III, pl. 5; Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 189. — Véra-Cruz (Mex. E.)

2729. ? *Var.* NIGRIPECTUS, Nels., *Auk*, 1897, pl. 47. — Plnes de Puebla (Mex.)

2730. ? *Var.* MINOR, Nels., *Auk*, 1901, p. 47; Grant, *Ibis*, 1902, p. 240. — Chiapas, Tabasco (Mex. S.)

10.258. GRAYSONI (Lawr.), *Ann. Lyc. N. Y.*, 1867, p. 476; Stejn., *Auk*, 1885, p. 45; Grant, *Game B.* II, pl. 32. — Jalisco (Mex. W.)

Digitized by Google

10.259. GODMANI, Nels., *Auk*, 1897, p. 45, 1898, pl. 2. — Véra-Cruz (Mex.)

10.260. NIGROGULARIS (Gould), *P. Z. S.*, 1842, p. 181; id., *Mon.*, pt. II, pl. 4; Gray, *Gen. B.* III, pl. 132; Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 190; *segoviensis*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 593. — Yucatan, Honduras.

10.261. RIDGWAYI, Brewst., *Auk*, 1885, p. 199; Grant, *Cat.*, p. 422. — Arizona, Sonora.

10.262. INSIGNIS, Nels., *Auk*, 1897, p. 46. — Guatémala, Chiapas.

10.263. COYOLCOS (Müll.), *S. N. Suppl.*, p. 129; Gould, *l. c.*, pt. III, pl. 6; Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 189; *nigrogularis*, Gr. (nec Gould.) — Mexique S. (Oaxaca).

10.264. ATRICEPS (Grant), *Cat. B.* XXII, p. 424; id., *Handb. Game B.* II, p. 144, pl. 33; *coyolcos*, Gould (pt.), *l. c.*, pt. III, pl. 6 (fig. de gauche). — Mexique W. (Putla).

10.265. SALVINI, Nels., *Auk*, 1897, p. 45; Grant, *Ibis*, 1902, p. 241. — Chiapas (Mex.)

10.266. CASTANEUS (Gould), *P. Z. S.*, 1842, p. 182; id., *Mon.*, pt. III, pl. 3. — ?

## 1514. CYRTONYX

*Cyrtonyx*, Gould (1844).

10.267. MONTEZUMÆ (Vig.), *Zool. Journ.*, 1830, p. 275; Stejn., *Auk*, 1885, p. 46; *massena*, Less., *Ill. Zool.*, pl. 52; Gould, *l. c.*, pt. I, pl. 7; *guttata*, La Llave; *meleagris*, Wagl., *Isis*, 1832, p. 278; *perspicillata*, Licht.; *mearnsi*, Nels., *Auk*, 1900, p. 255. — Mexique, Arizona, Texas S.-W.

10.268. SALLÆI, Verr., *Arcana Nat.* I, p. 35, pl. 4; Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 194; *merriami*, Nels., *Auk*, 1897, p. 48; Grant, *Ibis*, 1902, p. 242. — Guerrero, Véra-Cruz (Mex.)

10.269. OCELLATUS, Gould, *P. Z. S.*, 1836, p. 75; id., *Mon. Odont.*, pt. II, pl. 8; *sumichrasti*, Lawr. — Mexique S. (Tehuantepec), Guatémala.

## 1515. DACTYLORTYX

*Dactylortyx*, Og.-Grant (1894).

10.270. THORACICUS (Gamb.), *P. Ac. Philad.*, 1848, p. 77; Grant, *Cat.*, p. 429; *lineolatus*, Gould, *Mon. Odont.*, pt. III, pl. 32; Nels., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1898, p. 66. — Mexique S., Yucatan, Guatémala, San-Salvador.

2731. *Var.* CHIAPENSIS, Nels., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1898, p. 66. — Chiapas (Mex. S.)

2732. *Var.* DEVIUS, Nels., *l. c.*, p. 68. — Jalisco (Mex. W.)

Digitized by Google

## 1516. ODONTOPHORUS

*Odontophorus*, Vieill. (1816); *Dentophorus*, Merr. fide Gray (1870); *Strophiortyx*, Bp. (1856); *Rhynchortyx*, Grant (1893).

10.271. GUIANENSIS (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 767; Gould, *Mon. Odont.*, pt. I, pl. 23; *dentata*, Tem.; *rufina*, Spix; *rufus*, Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 38, pl. 211. — Guyane angl., Bas-Amazone.

2733. *Var.* MARMORATA, Gould, *P. Z. S.*, 1843, p. 107; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1864, p. 371; *pachyrhynchus*, Tsch., *Faun. Per.*, p. 282; Gould, *l. c.*, pt. III, pl. 24; *castigatus*, Bangs, *Auk*, 1901, p. 336; Grant, *Ibis*, 1902, p. 243. — De Panama au Pérou et Bolivie.

10.272. CAPUEIRA (Spix), *Av. Sp. Nov.* II, p. 59, pl. 76[a]; Grant, *Cat.*, p. 434; *dentatus*, Max.; Gould, *l. c.*, pt. II, pl. 26; *capistrata*, J. et S., *Ill. Orn.* I, pl. 38. — Brésil E., de Bahia au Rio Grande do Sul.

10.273. MELANOTIS, Salv., *P. Z. S.*, 1864, p. 586, 1867, p. 161. — Nicaragua, Costa-Rica, Véragua.

10.274. ERYTHROPS, Gould, *P. Z. S.*, 1859, p. 99; Tacz., *ibid.*, 1883, p. 576. — Ecuador.

10.275. HYPERYTHRUS, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 223; *hypospodius*, Scl. et Salv., *Nomencl.*, p. 163. — Colombie.

10.276. SPECIOSUS, Tsch., *Arch. f. Nat.*, 1843, p. 387; id., *Faun. Per.*, p. 281, pl. 53; Gould, *l. c.*, pt. III, pl. 25. — Ecuador, Pérou.

10.277. MELANONOTUS, Gould, *P. Z. S.*, 1860, p. 382. — Ecuador.

10.278. LEUCOLÆMUS, Salv., *P. Z. S.*, 1867, p. 161. — Costa-Rica, Véragua.

10.279. PARAMBÆ, Rothsch., *Ibis*, 1898, p. 145; Hart., *Nov. Zool.* V, p. 503, pl. 3, f. 1. — Colombie, Ecuador N.

10.280. ATRIFRONS, Allen, *Bull. Amer. Mus.* XIII, p. 127. — Valparaiso (Colombie).

10.281. STELLATUS, Gould, *P. Z. S.*, 1842, p. 183; id., *Mon. Odont.*, pt. II, pl. 27; *leucostictos*, Natt. — Haut-Amazone, Ecuador E.

10.282. GUTTATUS (Gould), *P. Z. S.*, 1837, p. 79; Gray, *List Gall.*, p. 43 (1844); Gould, *l. c.*, pt. II, pl. 28; *consobrinus*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1893, p. 469 (fem.); Grant, *Ibis*, 1902, p. 244. — Amérique centr., du S. du Mexique à Panama.

10.283. VERAGUENSIS, Gould, *P. Z. S.*, 1856, p. 107; Zel., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1886, p. 112. — Du Costa-Rica à Panama.

10.284. BALLIVIANI, Gould, *P. Z. S.*, 1846, p. 69; id., *Mon. Odont.*, pt. III, pl. 29; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 290. — Bolivie, Pérou.

10.285. STROPHIUM, Gould, *P. Z. S.*, 1843, p. 134; id., *Mon. Odont.*, pt. I, pl. 31. — Colombie.

10.286. COLUMBIANUS, Gould, *P. Z. S.*, 1850, p. 94; id., *Mon. Odont.*, pt. III, pl. 30. — Vénézuéla.

10.287. SPODIOSTETHUS, Salv., *Ibis*, 1878, p. 447. — Du Nicarag. à Panama.

10.288. CINCTUS, Salv., *Ibis*, 1876, p. 379; Rowl., *Orn. Misc.* III, p. 39, pl. 86. — Véragua.

Digitized by Google

## FAM. VI. — TETRAONIDÆ (1)

### 1517. BONASA

*Bonasa*, Steph. (1819); *Bonasia*, Bp. (1850).

10.289. UMBELLUS (Lin.); *Pl. Enl.* 104; Steph., *Gen. Zool.* XI, p. 300; Baird, *B. N. Am.*, p. 630; Ell., *Mon. Tetr.*, pl. 1; *tympanus*, Bartr. — Amérique N.-E.

2734. *Var.* TOGATA (Lin.); Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.* 1885, p. 355. — Canada et le N. des États-Unis.

2735. *Var.* UMBELLOIDES (Dougl.), *Tr. Linn. Soc.* XVI, p. 148; Ell., *Mon. Tetr.*, pl. 2; Coues, *Key*, p. 585. — Amérique N.-W., Alaska.

2736. *Var.* SABINEI (Dougl.), *Tr. Linn. Soc.* XVI, p. 137; Baird, *B. N. Am.*, p. 631; Ell., *Mon. Tetr.*, pl. 3. — De la Californie au 55° l. N. (Amér. N.-W.)

### 1518. TETRASTES

*Tetrastes*, Keys. et Blas. (1840).

10.290. BONASIA (Lin.); Keys. et Blas., *Wirbelth. Eur.*, p. 200; *betulinus*, Scop.; Dress., *B. Eur.* V, p. 193, pl. 486; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg., Ois.* II, p. 30, pl. 174; *canus*, Sparrm.; *sylvestris*, Brm.; Ell., *Mon. Tetr.*, pl. 4; *rupestris*, Brm.; *europæa*, Gd. — Europe, Asie N. et centr., Japon.

2737. *Var.* SEPTENTRIONALIS, Seeb., *Ibis*, 1884, p. 430. — Zone arct. de Russie et Sibérie.

10.291. GRISEIVENTRIS, Menzb., *Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc.*, 1880, 1, p. 105, pl. 4; Seeb., *Ibis*, 1884, p. 430, pl. 11; id., *P. Z. S.*, 1884, p. 409. — Russie E. (gouv^t de Perm.)

10.292. SEVERTZOWI, Prjev., *Mongolia*, II, p. 130, pl. 18; id., in *Rowl. Orn. Misc.* II, p. 430, pl. 52; Dedit., *J. f. O.*, 1886, p. 538. — Chine W.

### 1519. PEDIOECETES

*Pediocœtes*, Baird (1858); *Pediœcetes*, Hayd. (1861).

10.293. PHASIANELLUS (Lin.); Ell., *P. Ac. Philad.*, 1862, p. 403; id., *Mon. Tetr.*, pl. 15; *kennicotti*, Suckl. — Amérique du Nord angl.

(1) Voy. : Ogilvie-Grant, *Cat. Birds Brit. Mus.* XXII, pp. 35-93 (1893); Elliot, *A Monograph of the Tetraonina or family of the Grouse* (1864-65).

Digitized by Google

2738. *Var.* COLUMBIANA (Ord.), *Guthrie's Geog.* II, p. 317 (1815); Ell., *l. c.*, pl. 14; Grant, *Cat.*, p. 83; *phasianellus* (pt.), auct. plur. — Amér. N.-W., du Nouv.-Mex. à l'Alaska (à l'O. des Mgnes Roch.)

2739. *Var.* CAMPESTRIS, Ridgw., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1884, p. 95; *A. O. U. Check-l.*, p. 176; *columbianus* (pt.), Grant. — Région des prairies de l'Amérique du Nord.

## 1520. CENTROCERCUS

*Centrocercus*, Swains. (1831).

10.294. UROPHASIANUS (Bonap.), *Zool. J.* III, p. 213; id., *Am. Orn.* III, p. 55, pl. 21, f. 1; Audub., *B. Am.* V, p. 106, pl. 297; Sw. et Rich., *Faun. Bor.-Am.* II, p. 358, pl. 58; Ell., *l. c.*, pl. 13. — Amérique N.-W., du Nouv.-Mexique et Californie jusqu'au 60° l. N. environ.

## 1521. TYMPANUCHUS

*Tympanuchus*, Glog. (1842); *Cupidonia*, Rchb. (1852).

10.295. CUPIDO (Lin.); Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 55, pl. 219; Baird, *B. N. Am.*, p. 628 (pt.); Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1885, p. 355; *brewsteri*, Coues. — Ile Martha Vineyard (Massachusetts).

2740. *Var.* AMERICANA (Rchb.), *Nat. Syst. Vög.*, p. XXIX; Ridgw., *Auk*, 1886, p. 132; *cupido* (pt.), auct. plur. (nec Lin.); Audub., *Am. Orn.* V, p. 93, pl. 296; Ell., *l. c.*, pl. 16; *pinnata*, Brewst., *Auk*, 1885, p. 82. — Vallée du Mississippi.

2741. *Var.* ATTWATERI, Bend., *For. and Stream*, XL, 1893, p. 425; id., *Auk*, 1894, p. 130. — Louisiane et Texas (côtes).

2742. *Var.* PALLIDICINCTA, Ridgw. in B. B. et Rid., *N. Am. B.* III, p. 446; id., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1885, p. 355; id., *Man.*, p. 203. — Du Texas au Kansas.

## 1522. DENDRAGAPUS

*Dendragapus*, Elliot (1864).

10.296. OBSCURUS (Say), *Long's Exp.* II, p. 14; Bp., *Am. Orn.* III, p. 27, pl. 18; Ell., *Pr. Ac. Philad.*, 1864, p. 23; id., *Mon. Tetr.*, pl. 7. — Mgnes Roch. du Nouv.-Mex. et Ariz. jusque Montana et Idaho.

2743. *Var.* FULIGINOSA (Baird, Br. et Rid.), *N. Am. B.* III, p. 425; Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1885, p. 355; *obscurus* (pt.), auct. plur. (nec Say). — Amérique N.-W., de Californie au 55° l. N.

2744. *Var.* RICHARDSONI (Dougl.), *Trans. Linn. Soc.* XVI, p. 140; Wils., *Ill. Zool.*, pl. 30, 31; Ell., *l. c.*, pl. 8; B., Br. et Rid., *N. Am. B.* III, p. 427. — Montagnes Rocheuses au N. de Montana.

Digitized by Google

## 1523. FALCIPENNIS

*Canace*, Rchb. (1852, nec Curtis, 1838); *Falcipennis*, Elliot (1864); *Canachites*, Stejn. (1885).

10.297. HARTLAUBI, Ell., *Pr. Ac. Philad.*, 1864, p. 23; id., *Mon. Tetr.*, pl. 11; *T. canadensis, var. franklinii*, Midd., *Sib. Reis.*, *Aves*, p. 202, pl. 17, f. 4; *T. falcipennis*, Hartl., *J. f. O.*, 1855, p. 39; *canadensis*, Radde (nec Lin.) — Sibérie N.-E., Kamtchatka.

10.298. CANADENSIS (Lin.); Audub., *B. Am.* V, p. 85, pl. 294; Baird, *B. N. Am.*, p. 622; Ell., *l. c.*, pl. 9; *canace*, Lin. — Amérique sept. entre le 43° et le 60° l. N., à l'E. des Mts Roch.

2745. *Var.* LABRADORIA (Bangs), *New Engl. Zool. Club*, I (1899), p. 47. — Labrador.

2746. *Var.* FRANKLINI (Dougl.), *Trans. Linn. Soc.* XVI, p. 139; Sw. et Rich., *F. Bor.-Am.* II, p. 348, pl. 61; Ell., *l. c.*, pl. 10; *canadensis* (pt.), Bp.; *osgoodi*, Bishop. — Amérique septentr. à l'Ouest des Montagnes Rocheuses.

## 1524. TETRAO

*Tetrao*, Lin. (1766); *Urogallus*, Scop. (1777).

10.299. UROGALLUS, Lin.; Ell., *l. c.*, pl. 5; Dubois, *Fne. Ill. Vert. Belg.*, *Ois.* II, p. 36, pl. 172, 172b; Mey., *Auer-, Rack. u. Birkw.*, pp. 1-15, pl. 1-3; *eremita*, Thunb.; *vulgaris*, Flem.; *major, crassirostris*, Brm.; *taczanowskii*, Mey., *l. c.*, p. 10; *thelyides* (aberr.), Mey., *Abh. Mus. Dresd.*, 1894-95, n° 3, p. 1, pl. (1). — Europe, Asie N. et centr. jusqu'au lac Baïkal.

2747. *Var.* URALENSIS, Nazar., *Bull. Mosc.*, 1886, p. 365; Menzb., *Ibis*, 1887, p. 302. — Monts Ourals.

10.300. PARVIROSTRIS, Bp., *C. R.* XLII, p. 880; Grant, *Cat.*, p. 66; *urogallus, var. rupestris* et *minor*, Pall., *Zoogr.* II, p. 58; *urogalloides*, Midd., *Sibir. Reise*, II, 2, p. 195, pl. 18, et auct. plur. (nec Nilss.); Ell., *l. c.*, pl. 6; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 390; *sachalinensis*, Bogd. — Sibérie E., Amourland, Mantchourie, Chine N.

2748. *Var.* KAMTSCHATICA, Kittl., *Reise Kamtsch.* II, p. 355; Tacz., *Bull. Soc. Zool. Fr.*, 1883, p. 333. — Kamtschatka.

(1) Les dénominations suivantes se rapportent à des hybrides des *T. urogallus* + *tetrix* : *hybridus*, Sparrm., *urogallides* et *urogalloides*, Nilss.; *medius*, Mey. (1811); *intermedius*, Langsd.; *maculatus* et *pseudourogallus*, Brm.; *T. tetrix urogallus*, Mey., *Unsere Auer-Rack* pl. 8-13.

Digitized by Google

## 1525. LYRURUS

*Lyrurus*, Swains. (1831); *Lyurus*, Gould (1837).

10.301. TETRIX (Lin.); Sw. et Rich., *F. Bor.-Am.* II, p. 497; Dubois, *l. c.* II, p. 43, pl. 173; ?*nemesianus*, Gm.; *juniperorum*, *ericæus*, Brm.; *derbianus*, Gould (1). — Europe, Asie N. et centr.

2749. *Var.* VIRIDANA, Lorenz, *J. f. O.*, 1891, p. 366 (*viridanus*); *tetrix* (pt.), Grant. — Du S. de la Russie jusqu'au Turkestan.

2750. *Var.* TSCHUSII, Johan., *Orn. Jahrb.*, 1898, *Beilage*. — Sibérie W.

10.302. MLOKOSIEWICZI (Tacz.), *P. Z. S.*, 1875, p. 266; Dress., *B. Eur.* V, p. 219, pl. 488; Radde, *Orn. Cauc.*, p. 358, pl. 23; *acatoptricus*, Radde, *l. c.* — Caucase.

## 1526. LAGOPUS

*Lagopus*, Briss. (1760); *Keron*, Mont. (1776); *Oreias*, *Attagen*, Kp. (1829); *Acetinornis*, Bonap. (1856).

10.303. SCOTICUS (Lath.), *Gen. Syn.*, *Suppl.* I, p. 290; Leach, *Syst. Cat.*, p. 27; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 62, pl. 221; Dress., *B. Eur.* V, p. 165, pl. 479; *saliceti* (pt.), Tem.; *persicus*, Gray; Ell., *l. c.*, pl. 20; *albus*, β. *scoticus*, Dubois, *Consp. Av. Eur.*, p. 21. — Iles Britanniques. (Introd. dans l'Ardenne belge.)

10.304. ALBUS (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 750; Audub., *B. Am.* V, p. 114, pl. 299; Ell., *l. c.*, pl. 17, 18; *T. lagopus*, Lin.; *lapponicus*, Gm.; *rehusak*, Bonn.; *cachinnans*, Retz.; *saliceti*, Tem.; *subalpinus*, Nilss.; *brachydactylus*, Gould, *B. Eur.* IV, pl. 255, 256. — Zone arctique.

2751. *Var.* ALLENI, Stejn., *Auk*, 1884, p. 369; id., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1885, p. 20; Grant, *Cat.*, p. 44. — Terre-Neuve.

10.305. MUTUS (Montin), *Phys. Sälsk. Hand.* I, p. 155 (1776-86); Leach, *Syst. Cat.*, p. 27; Ell., *l. c.*, pl. 21, 22; Dress., *B. Eur.* V, p. 157; pl. 477, 478; *T. lagopus*, Scop. (nec Lin.); *rupestris*, Bechst. (nec Gm.); *alpinus*, Nilss.; Dubois, *Ois. Eur.* II, p. et pl. 125; *vulgaris*, Vieill.; *mutans*, Forst.; *montanus*, Brm.; *cinereus*, Macg.; *scandinavica*, *meridionalis*, Sundev. — Montagnes de l'Europe et Monts Ourals.

2752. *Var.* RUPESTRIS (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 751; Audub., *B. Am.* V, p. 122, pl. 301; *mutus*, Sw. et Rich.; *americanus*, Aud.; *alpinus*, Midd. (nec Nilss.); *islandorum*, Faber. — Nord de l'Amérique et de l'Asie (parties arctiques), Islande.

(1) Hybrides : *L. tetrix* + *Lagopus albus* = *lagopoides* et *lagopides*, Nilss. = *tetrici-albus*, Coll.; *L. tetrix* + *L. scoticus* = *dicksonii*, Malm.; *L. tetrix* + *T. bonasia* = *bonasides*, Nilss. = *bonasiotetrix*, Bogd.

Digitized by Google

2753. *Var.* Reinhardti (Brm.), *Lehrb. Eur. Vög.*, p. 440; *groenlandicus*, Brm., Naum., 1855, p. 287; *occidentalis*, Sundev. — Groenland, Labrador.

2754. *Var.* Nelsoni, Stejn., *Zeit. Ges. Orn.*, 1884, p. 91; id., *Auk*, 1884, p. 226. — Ile Unalaska.

2755. *Var.* Ridgwayi, Stejn., *Zeit. Ges. Orn.*, 1884, p. 89, pl. 5; *insularis*, Bogd., *Consp. Av. Ross.*, p. 34. — Iles du Commandeur et de Behring.

2756. *Var.* Atkhensis, Turn., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1882, p. 230. — Ile Atkha.

2757. *Var.* Townsendi, Elliot, *Auk*, 1896, p. 26. — Iles Kyska et Adak.

2758. *Var.* Welchi, Brewst., *Auk*, 1885, p. 193. — Terre-Neuve.

2759. *Var.* Evermanni, Elliot, *Auk*, 1896, p. 25, pl. 3. — Ile Attu (Aléoutes).

10.306. hyperboreus, Sundev., in *Gaim. Voy. Scand.*, Atl., liv. XXXVIII, pl.; Stejn., *Zeit. Ges. Orn.*, 1884, p. 89; Ell., *Mon. Tetr.*, pl. 24; *hemileucurus*, Gould; Dress., *B. Eur.* V, p. 179, pl. 482. — Spitzberg.

10.307. leucurus, Sw. et Rich., *Faun. Bor.-Am.* II, p. 356, pl. 63; Audub., *B. Am.* V, p. 125, pl. 302; Ell., *l. c.*, pl. 25. — Montagnes Rocheuses, du Nouv.-Mex. à la Colombie angl.

2760. *Var.* Altipetens, Osg., *Auk*, 1901, p. 180. — Colorado.

# ORD. X. — ACCIPITRES (1)

## FAM. I. — SERPENTARIIDÆ

### 1527. SERPENTARIUS

*Serpentarius*, Cuv. (1798); *Secretarius*, Daud. (1800); *Gypogeranus*, Ill. (1811); *Ophiotheres*, Vieill. (1816).

10.308. secretarius (Scop.), *Del Faun. et Fl. Insubr.* II, p. 93; Levaill., *Ois. d'Afr.* I, pl. 25; *serpentarius*, Mill.; *reptilivorus*, Daud.; *africanus*, Shaw; *cristatus*, Vieill.; *capensis*, *philippensis*, Ogilby. — Afrique S. et E.

2761. *Var.* Gambiensis, Ogilby, *P. Z. S.*, 1835, p. 105; *orientalis*, Verr., *P. Z. S.*, 1856, p. 352. — Sénégambie, Soudan jusqu'au Choa.

## FAM. II. — CATHARTIDÆ

### 1528. SARCORHAMPHUS

*Sarcoramphus*, Dumér. (1806); *Gryphus*, Bonap. (1854).

10.309. gryphus (Lin.); Tem., *Pl. Col.* 155, 408, 494; — Andes, de l'Ecuador à

(1) Voy. : Sharpe, *Cat. Birds Brit. Mus.* I (1874); J.-H. Gurney, *A List of the Diurnal Birds of Prey* (1884); id. (jun.), *Catalogue of the Birds of Prey* (1894).



Digitized by Google

Steph., *Gen. Zool.* XIII, p. 6; *magellanicus*, Shaw; *condor*, Shaw, *Gen. Zool.* I, p. 2, pl. 2-4; *cuntur*, Bp. — la Patagonie.

10.310. ÆQUATORIALIS, Sharpe, *Cat. B.* I, p. 21; Scl., *P. Z. S.*, 1883, pl. 35; ?*gryphus*, Eyd. et Soul., *Voy. Bonite, Zool.*, p. 75, pl. 2. — Ecuador, ? Colombie.

## 1529. CATHARTES

*Cathartes*, Illig. (1811); *Gypagus*, Vieill. (1816); *Gyparchus*, Glog. (1842).

10.311. PAPA (Lin.); Illig., *Prodr.*, p. 236; Vieill., *Gal. Ois.* I, p. 11, pl. 3; Schl., *Mus. P.-B.*, *Vult.*, p. 1. — Amérique tropicale.

## 1530. CATHARISTA

*Çatharista*, Vieill. (1816); *Cathartes*, Gray (1844) et auct. plur. (nec Illig.); *Coragyps*, Bp. (1854); *Catharistes*, Sharpe (1874).

10.312. ATRATA (Bartr.), *Trav. N. et S. Carol.*, etc., p. 289; Wils., *Am. Orn.* IX, p. 104, pl. 75, f. 2; *aura*, Daud. (nec Lin.); *urubu*, Vieill., *Ois. Am. sept.*, pl. 11; *fœtens*, Licht.; *iota*, Jard.; *brasiliensis*, Bp. — Amérique mérid. tropic., Amér. centr., États-Unis S.-E.

## 1531. RHINOGRYPHUS

*Rhinogryphus*, Ridgw. (1873); *OEnops*, Sharpe (1874); *Cathartes*, Sharpe (1899, nec Illig).

10.313. AURA (Lin.); Vieill., *Ois. Am. sept.*, pl. 2; id., *Gal. Ois.* I, p. 16, pl. 4; *iota*, Mol.; *ruficollis*, Spix; *urbicola*, *ricordi*, Des M.; *septentrionalis*, Max.; *burroviana*, Sharpe. — Amérique sept., centr. et tropic.

2762. *Var.* FALKLANDICA (Sharpe), *Ann. N. H.*, 1873, p. 133; id., *Cat. B.* I, p. 27, pl. 2, f. 1; *aura* (pt.), auct. plur. — Iles Malouines ou Falkland.

2763. *Var.* PERNIGRA (Sharpe), *Cat.* I, p. 26; *aura* (pt.), auct. plur.; *iota*, Cass., *U. S. Expl. Exp.*, p. 83, pl. 1 (nec Mol.); *urubitinga*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1867, p. 589 (nec Pelz.) — Guyane, Amazone, Pérou.

2764. *Var.* BURROVIANA (Cass.), *Pr. Phil. Acad.*, 1845, p. 212; Ell., *B. N. Am.* II, pl. 26; *urubitinga*, Pelz., *Sitz. Akad. Wien.*, 1861, p. 7 (ex Natt.); Schl., *Mus. P.-B. Vult.*, p. 4; Sharpe, *Cat.*, p. 28, pl. 2, f. 2; *aura*, Scl. et Salv. (1867-73). — Guyane, Amazone jusqu'au Mexique E.

Digitized by Google

### 1532. GYMNOGYPS

*Gymnogyps*, Less. (1842); *Pseudogryphus*, Ridgw. (1874).

10.314. CALIFORNIANUS (Shaw et Nod.), *Nat. Misc.* IX, p. 1, pl. 301; Audub., *B. Am.* I, p. 12, pl. 1; Less., *Echo du Monde sav.*, 1842, p. 1037; Gray, *Gen. B.* I, pl. 2; *columbianus*, Ord.; *vulturinus*, Tem., *Pl. Col.* 31. — Californie S. et Basse-Californie.

## FAM. III. — VULTURIDÆ

### 1533. VULTUR

*Vultur*, Briss. (1760); *Ægypius*, Savig. (1808); *Polypteryx*, Hodgs. (1844).

10.315. MONACHUS (Lin.); Levaill., *Ois. d'Afr.* I, pl. 12; Dress., *B. Eur.* V, p. 383, pl. 321; *cinereus*, Gm.; *chincou*, *vulgaris*, *arrianus* et *niger*, Daud. — Afr. N.-E., Eur. S., Asie S.-W. et centr. jusqu'en Chine.

### 1534. LOPHOGYPS

*Vultur* (pt.), auct. plur.; *Lophogyps*, Bonap. (1854).

10.316. OCCIPITALIS (Burch.), *Trav.* II, p. 329; Tem., *Pl. Col.* 13; Cretzschm., in *Rüpp. Atl.*, p. 35, pl. 22; *galericulatus*, Less.; *eulophus*, Ehr.; *chincou*, Strickl (nec Daud.) — Afrique tropicale.

### 1535. OTOGYPS

*Otogyps*, Gray (1841); *Hemigyps*, Hodgs. (1844).

10.317. AURICULARIS (Daud.), *Traité*, II, p. 10; Levaill., *Ois. d'Afr.* I, p. 36, pl. 9; *auriculatus*, Shaw.; *tracheliotus*, Wolf; *ægypius* et *imperialis*, Tem., *Pl. Col.* 407, 426; *nubicus*, H. Smith. — Afrique trop., Égypte, Europe S.

10.318. CALVUS (Scop.), *Del. Faun. et Fl. Insubr.* II, p. 85; Gould, *B. Asia*, pt. XII, pl.; *pondicerianus*, Lath.; Tem., *Pl. Col.* 2; Gray, *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 15, f. 2. — Inde, Indo-Chine.

### 1536. GYPS

*Gyps*, Savig. (1809).

10.319. FULVUS (Gm.); Dub., *Ois. Eur.* I, pl. 2; Dress., *B. Eur.* V, p. 373, pl. 319, 320; *percnopterus*, Shaw et Nod.; *trencalos*, Bechst.; *vulgaris*, Savig.; *leucocephalus*, Mey. et W.; *persicus*, Pall.; *albi-* — Europe centr. et S., Afrique N. et N.-E.

Digitized by Google

*collis*, Linderm.; *occidentalis*, Schl.; *ægyptius*, Licht.; *orientalis*, Schl.; *hispaniolensis*, Sharpe.

2765. *Var.* FULVESCENS, Hume, *Ibis*, 1869, p. 356; Sharpe, *Cat. B.* I, p. 7. — Afghanistan, Inde N.

10.320. HIMALAYENSIS, Hume, *Rough Notes*, I, p. 14; Jerd., *Ibis*, 1871, p. 235; *indicus*, Tem., *Pl. Col.* 26 (nec Scop.); *nivicola*, Severtz. — Himalaya, Thibet, Turkestan.

10.321. KOLBI (Daud.), *Traité*, II, p. 15; Levaill., *Ois. d'Afr.* I, p. 44, pl. 10; Schl., *Mus. P.-B. Vultures*, p. 7; Sharpe, *Cat.* I, p. 8, pl. 1; *fulvus* (pt.), auct. plur.; *indicus*, Cass. (nec Scop.) — Afrique S.

10.322. RUPPELLI (Brm.), *Naum.*, 1852, 3, p. 44; Bp., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1854, p. 550; *kolbii*, Cretzschm., *Rüpp. Atlas*, p. 47, pl. 52; *vulgaris*, Bp.; *magnificus*, Müll., *Beitr. Orn. Afr.*, pl. 5. — Égypte, Afrique N.-E. et E. jusqu'au Transvaal, Damara.

10.323. INDICUS (Scop.), *Del. Faun. et Fl. Insubr.* II, p. 85; Jerd., *B. of Ind.* I, p. 9; Sharpe, *Cat.* I, p. 10; *tenuiceps*, Hodgs.; *tenuirostris*, Gray, *Gen. B.* I, pl. 3. — Inde, Indo-Chine, Malacca.

2766. *Var.* PALLESCENS, Hume, *Str. Feath.*, 1873, p. 150; Sharpe, *l. c.*, p. 11. — Inde N.-W.

## 1537. PSEUDOGYPS

*Pseudogyps*, Sharpe (1873).

10.324. BENGALENSIS (Gm.), *S. N.* I, p. 245; Gray, *Ill. Ind. Zool.*, pl. 15, f. 1; *leucocephalus*, *var.* β, Lath.; Levaill., *Ois. d'Afr.* I, p. 50, pl. 11; *changoun*, Daud.; *leuconotus*, Gray, *l. c.*, pl. 14; *indus*, Less. — Inde, Indo-Chine, Malacca.

10.325. AFRICANUS, Salvad., *Not. Stor. R. Accad. Torino*, 1865, p. 133; Sharpe, *l. c.*, p. 12; Du Boc., *Orn. Angola*, p. 1, pl. 9; *bengalensis* (pt.), Rüpp., Brm., Heugl.; *moschatus*, Württ., *Naum.*, 1857, p. 432 (*descr. nulla*); *indicus*, Hartl.; *tenuirostris*, Antin. — Afrique tropicale.

## 1538. NEOPHRON

*Neophron*, Savig. (1808); *Percnopterus*, Steph. (1825); *Necrosyrtes*, Glog. (1842); *Gypiscus*, Sundev. (1873).

10.326. PERCNOPTERUS (Lin.); Dress., *B. Eur.* V, pl. 322; *fuscus*, Bodd.; *leucocephalus*, Gm.; *stercorarius*, La Peyr.; *albus*, Daud.; *meleagris*, Pall.; *meleagrides*, Tem.; *ægyptiacus*, Steph.; *europæus*, *capensis*, Brm. — Afrique, Europe S., Asie S.-W.

Digitized by Google

2767. *Var.* GINGINIANA (Lath.), *Ind. Orn.* I, p. 7; Blyth, *Ibis*, 1866, p. 233; *percnopterus* (pt.), auct. plur. — Inde.

10.327. MONACHUS (Tem.), *Pl. Col.* 222; Sharpe, *l. c.*, p. 19; *pileatus* (pt.), auct. plur. — Afrique tropicale.

2768. *Var.* PILEATA (Burch.), *Trav.* II, p. 195 (*Vultur pileatus*); Sharpe, *l. c.*, p. 18; *caruncula-tus*, Smith. — Afrique S.

## FAM. IV. — FALCONIDÆ

### SUBF. I. — GYPAËTINÆ

#### 1539. GYPAËTUS

*Gypaëtus*, Storr. (1784); *Gyptus*, Dumér. (1806); *Phene*, Savig. (1809).

10.328. BARBATUS (Lin.); Naum., *Vög. Deutschl.* I, pl. 5, 6; Dub., *Ois. Eur.* I, pl. 5 et 5*; Dress., *B. Eur.* V, p. 401, pl. 323-325; *magnus*, *barbarus*, Gm.; *grandis*, Storr; *aureus*, *alpinus*, *castaneus*, Daud.; *leucocephalus*, *melanocephalus*, Mey. et W.; *ossifraga*, Vieill. (nec Savig.); *hemalacha-nus*, Hut.; *subalpinus*, *altaicus*, Gebl.; *occiden-talis*, Schl.; *orientalis*, Blyth. — Europe centr. et mérid. (montagnes), Asie centr., Himalaya, Chine N.

2769. *Var.* ATLANTIS, Erl., *J. f. O.*, 1898, p. 395, pl. 4, 5; *barbatus* (pt.), auct. plur.; *meridionalis*, Keys. et Bl.; *occidentalis*, Tacz. — Maroc, Algérie, Tunisie.

2770. *Var.* OSSIFRAGA (Savig.), *Ois. d'Égypte*, p. 245; Sharpe, *Cat.* I, p. 230; *barbatus* (pt.), auct. plur.; *meridionalis* (pt.), auct. plur.; Rüpp., *Syst. Uebers.*, p. 9, pl. 1; *nudipes*, Brm. — Afrique N.-E., E. et S.

### SUBF. II. — GYPOHIERACINÆ

#### 1540. GYPOHIERAX

*Gypohierax*, Rüpp. (1835); *Racama*, Gray (1840).

10.329. ANGOLENSIS (Gm.), *S. N.* I, p. 252; Gray, *Gen. B.* I, pl. 4; *hypoleucus*, Benn.; Jard. et Sel., *Ill. Orn.*, sér. 2, pl. 13. — Afrique tropicale.

Digitized by Google

## SUBF. III. — POLYBORINÆ

### 1541. POLYBORUS

*Polyborus*, Vieill. (1816); *Caracara*, Less. (1831).

10.330. THARUS (Mol.), *Saggio St. Nat. Chil.*, p. 264; Strickl., *Orn. Syn.*, p. 18; Sharpe, *Cat.* I, p. 31; *plancus, brasiliensis*, Gm.; Sw., *Zool. Ill.*, sér. 2, pl. 2; *cheriway*, Lath. (nec Jacq.); *vulgaris*, Spix; Vieill., *Gal. Ois.* I, p. 23, pl. 7; *caracara*, Gr. — Amérique mérid., de l'Amazone à Magellan.

10.331. CHERIWAY (Jacq.), *Beitr.*, p. 17, pl. 4 (1784); Cab., *Schomb. Reis. Guin.* III, p. 741; *brasiliensis*, Audub., *B. Am.* I, p. 21, pl. 4; *tharus*, Cass. (1855); *auduboni*, Cass. (1865). — S. des États-Unis, Calif., Amér. centr., Colombie, Ecuador, Vénézuéla, Guyane, Trinidad, Cuba.

2771. *Var.* PALLIDA, Nels., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1898, p. 8. — Iles Tres-Marias.

10.332. LUTOSUS, Ridgw., *Bull. U.S. Geol. Surv.* I, p. 489; id., *Orn. of Guadeloupe Isl.*, p. 192. — Guadeloupe (Californie).

### 1542. IBYCTER

*Ibycter, Daptrius*, Vieill. (1816); *Gymnops*, Spix (1824); *Phalcobænus*, Lafr. (1843); *Senex*, Gray (1839); *Aetriorchis*, Kaup (1844); *Helotriorchis*, Rchb. (1850).

18 333. ATER (Vieill.), *Anal.*, p. 22; id., *Gal. Ois.*, pl. 5; Sw., *Classif. B.* II, p. 209; *aterrimus*, Tem., *Pl. Col.* 37, 342; Burm., *Th. Bras.* II, p. 39; ? *fasciatus*, Spix (juv.?) — Guyane, Brésil, Amazone, Ecuador.

10.334. AMERICANUS (Bodd.), *Tabl. Pl. Enl.*, p. 23; *Pl. Enl.* 417; Schl., *Mus. P.-B., Polyb.*, p. 9; Sharpe, *Cat.* I, p. 35; *aquilinus*, Gm.; *formosus*, Lath.; *nudicollis*, Daud.; Burm., *Th. Bras.* II, p. 37. — Brésil, Amaz., Ecuad., Colombie jusqu'au Guatémala et l'Honduras.

10.335. MEGALOPTERUS (Meyen), *Beitr.*, p. 64, pl. 7; Tsch., *Fauna Per.*, pp. 16, 78; Schl., *l. c.*, p. 4; *montanus*, d'Orb., *Voy. Am. mér., Ois.*, p. 51, pl. 2; *crassirostris*, Pelz.; ? *gymnocephalus*, d'Orb., *Voy.*, p. 50. — Pérou, Chili, Bolivie (Andes).

10.336. ALBIGULARIS (Gould), *P. Z. S.*, 1837, p. 9; Darw., *Voy. Beagle, B.*, p. 13, pl. 1; Sharpe, *l. c.*, p. 37. — Patagonie.

10.337. CARUNCULATUS (Des M.), *Rev. et Mag. de Zool.*, 1853, p. 154; Scl., *P. Z. S.*, 1860, p. 81; id., *Ibis*, 1861, p. 19, pl. 1. — Colombie, Ecuador.

10.338. AUSTRALIS (Gm.), *S. N.* I, p. 259; Gr. in Jard. et Sel., *Ill. Orn.*, sér. 2, pl. 24; *novæ-zealandiæ*, Cuv.; Tem., *Pl. Col.* 192, 224; *antarcticus*, Less.; — Iles Malouines ou Falkland.

Digitized by Google

*brasiliensis*, King; *leucurus*, Darw.; *plancus*, Forst.

### 1543. MILVAGO

*Milvago*, Spix (1824).

10.339. CHIMACHIMA (Vieill.), *N. Dict.* V, p. 239; d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 63; Schl., *l. c.*, p. 5; *crotophagus*, Max.; *degener*, Licht.; *ochrocephalus*, Spix, *Av. Bras.* I, p. 12, pl. 5; *strigilatus*, Spix, *l. c.*, p. 10, pl. 4. — Brésil, Amaz., Guyane, Vénézuéla, Colombie, Panama.

10.340. CHIMANGO (Vieill.), *N. Dict.* V, p. 260; Gray, *Gen. B.* I, pl. 5; Schl., *l. c.*, p. 6; *pezopora*, Meyen. — Amér. mérid. du 20° l. S. à la Terre de Feu.

## SUBF. IV. — CIRCAËTINÆ

### 1544. HERPETOTHERES

*Herpetotheres*, Vieill. (1817); *Cachinna*, Flem. (1822); *Macagua*, Less. (1831).

10.341. CACHINNANS (Lin.); Spix, *Av. Bras.* I, p. 8, pl. 5ᵃ; Schl., *Mus. P.-B.*, *Astures*, p. 26; Vieill., *Gal. Ois.* I, p. 47, pl. 19; Sharpe, *Cat.* I, p. 278; *Cachinna herpetotheres*, Gray. — Amérique centr. et mérid., du S. du Mexique au Paraguay.

### 1545. CIRCAËTUS

*Circaëtus*, Vieill. (1816).

10.342. GALLICUS (Gm.), *S. N.* I, p. 295; Vieill., *N. Dict.* VII, p. 137; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg.*, *Ois.* I, p. 22, pl. 5; Dress., *B. Eur.* V, p. 563, plᵃ 349, 350; *leucamphomma*, Bek.; *leucopsis*, Bechst.; *brachydactyla*, Wolf; *anguium*, *meridionalis*, Brm. — Europe mér. et centr., Afrique N. et N.-E., Asie centr.

2772. *Var.* HYPOLEUCA (Pall.), *Zoogr. Rosso-Asiat.* I, p. 334; *gallicus* (pt.), auct. plur.; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 21; *orientalis*, Brm. — Inde, Chine, au S. jusqu'aux îles de la Sonde.

10.343. CINEREUS, Vieill., *N. Dict.* XXIII, p. 445; id., *Gal. Ois.*, pl. 12; Schl., *Mus. P.-B.*, *Buteones*, p. 25; *pectoralis*, Smith; *thoracicus*, Less.; *funereus*, Rüpp., *Neue Wirb.*, *Vög.*, p. 351, pl. 14. — Afrique tropicale.

10.344. BEAUDOUINI, Verr. et Des M., *Ibis*, 1862, p. 212, pl. 7; Schl., *l. c.*, p. 25; *fasciatus*, Heugl. (*descr. nulla*). — Sénégambie, Afrique N.-E.

10.345. FASCIOLATUS, Gray, *Cat. Accipitr.*, p. 18; Ayres, *Ibis*, 1862, p. 35, pl. 3; Sharpe, *Cat.* I, p. 285. — Natal.

Digitized by Google

10.346. CINERASCENS, Müll., *Naum.*, 1851, p. 27; id., *Beitr. Vög. Afr.*, Lief. 2, pl. 6; *zonurus*, Würt.; Heugl., *Ibis*, 1860, p. 410, pl. 15; *melanotis*, Verr., in Hartl., *Orn. W. Afr.*, p. 7. — Afrique tropicale.

1546. SPHLORNIS

*Hæmatornis*, Vig. (1830, nec Sw.); *Spilornis*, Gray (1840); *Ophoaëtus*, Jerd. (1844).

10.347. CHEELA (Lath.), *Ind. Orn.* I, p. 14; Schl., *Mus. P.-B.*, *Buteones*, p. 25; Bp., *Consp.* I, p. 17; *undulatus*, Vig.; Gould, *Cent. Him. B.*, pl. 1; *nipalensis*, Hodgs.; *orientalis*, Gurn.; *hoya*, Swinh. — Himalaya, Inde.

2773. *Var.* ALBIDA (Tem. ex Cuv.), *Pl. Col.* 19; *melanotis*, Jerd., *Madr. Journ.*, 1844, p. 165; Sharpe, *Cat.* I, p. 289 (pt.); *spilogaster*, Blyth; Legge, *B. Ceyl.*, p. 61. — Inde S., Ceylan.

2774. *Var.* RUTHERFORDI, Swinh., *Ibis*, 1870, p. 85; *melanotis* (pt.), Sharpe, *l. c.* — Assam, Indo-Chine, Aïnan.

2775. *Var.* DAVISONI, Hume, *Str. Feath.*, 1873, pp. 305, 422; *melanotis* (pt.), Sharpe, *l. c.* — Iles Andaman.

10.348. MINIMUS, Hume, *Str. Feath.*, 1873, p. 464. — Iles Nicobar.

10.349. PALLIDUS, Wald., *Ibis*, 1872, p. 365; Sharpe, *l. c.*, p. 290, pl. 9. — Bornéo.

10.350. BACHA (Daud)., *Traité*, II, p. 43; Levaill., *Ois. d'Afr.* I, p. 69, pl. 15; Schl., *Valk Vog.*, pl. 22; *bido*, Horsf., *Tr. Linn. Soc.*, 1822, p. 137. — Philippines, Malacca, Java, Sumatra.

10.351. ELGINI (Tytl.), *J. A. S. B.*, 1863, p. 87; Hume, *Str. Feath.* II, p. 144. — Iles Andaman, Nicobar.

10.352. RAJA, Sharpe, *Bull. Br. Orn. Club*, I, p. 4. — Sarawak (Bornéo).

10.353. SALVADORII, Berl., *Nov. Zool.* II, p. 73. — Ile Nias.

10.354. RUFIPECTUS, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 222; id., *B. As.*, pt. XII, pl.; Schl., *Valk Vogels*, pp. 37, 72, pl. 23, ff. 1-3; *celebensis*, Schl. — Célèbes.

10.355. SULAENSIS (Schl.), *Valk Vog.*, pp. 38, 72, pl. 23, ff. 4-6; Wald., *Ibis*, 1868, p. 16. — Iles Soula.

10.356. HOLOSPILUS (Vig.), *P. Z. S.*, 1830-31, p. 96; Gray, *Cat. Accipitr.*, p. 10; id., *Gen. B.* I, pl. 7; Schl., *Mus. P.-B.*, *Buteones*, p. 28. — Philippines.

10.357. PANAYENSIS, Steere, *List Birds and Mam. Philipp*, p. 7. — Panay, Guimaras, Negros (Philipp.)

10.358. ASTURINUS, Mey., *S. B. Ges. Isis*, *Dresden*, p. 1884, p. 13. — ?

1547. PITHECOPHAGA

*Pithecophaga*, O. Grant (1896).

10.359. JEFFERYI, Grant, *Bull. B. O. Club*, VI, p. 17; id., *Ibis*, 1897, pl. 5. — Samar (Philippines).

Digitized by Google

Cornell University Library

1 PTILOPUS PONAPENSIS. 2 P PELEWENSIS. 3 GLOBICERA RUFIGULA

Digitized by Google

# Publications de M. Alph. DUBOIS

en vente à la librairie de Henri **LAMERTIN**,
**20, rue du Marché-au-Bois, à Bruxelles.**

**Faune illustrée des Vertébrés de la Belgique.** *Oiseaux.* — 4 vol. in-4° avec 427 pl. coloriées à la main et cartes 1876-1893. — *Il ne reste plus qu'un exemplaire, dont les 5 planches manquantes sont remplacées par des aquarelles peintes par l'auteur* . . . . . fr. [illegible]

**Le même ouvrage**, avec cartes mais sans atlas, 2 vol. in-4° . . . 75

**Les Lépidoptères de la Belgique**, leurs chenilles et leurs chrysalides, décrits et figurés d'après nature sur l'une des plantes nourricières. 3 vol. in-4° avec 451 pl. coloriées à la main. 1861-1884. . . 275

**Revue des derniers systèmes ornithologiques et nouvelle Classification proposée pour les Oiseaux.** Broch. in-8°. Paris, 1891 . . . . . 1 [illegible]

**Histoire populaire des animaux utiles de la Belgique.** Nouvelle édition illustrée, revue et augmentée. — 1 vol. in-12, Bruxelles, 1889 . . . . . 1 75

**Les Animaux nuisibles de la Belgique** (*Vertébrés*). — 1 vol. in-12, illustré. *Avec la liste de tous les Vertébrés observés en Belgique.* Bruxelles 1895 . . . . . 2

**Tableau synoptique des oiseaux insectivores** qu'il est défendu de prendre en tout temps. — Nouveau tirage en chromo . . . . 2 [illegible]

**Revue critique des oiseaux de la famille des Bucérotidés**, broch. in-8°, avec 2 pl. col., Bruxelles, 1884 . . . . 2

**Manuel de zoologie**, *conforme aux progrès de la science*, 1 vol. in-12, avec 177 gravures intercalées dans le texte. Bruxelles 1882 . . . [illegible]

**Aperçu du Règne animal** ou premières notions de zoologie, 1 vol. in-12, avec 166 gravures. (Ouvrage adopté pour l'Enseignement moyen). — Bruxelles 1882 . . . . . 3

**Conspectus systematicus et geographicus avium Europæarum**, broch. in-8°, Bruxelles 1871 . . . . 2

**Archives cosmologiques.** *Revue des sciences naturelles.* 1 vol. in-8°, avec 13 pl. — Bruxelles 1867 . . . . . 3

**Traité d'Entomologie horticole, agricole et forestière.** 1 vol. in-8°, avec 4 pl. col. (*Ouvrage couronné.* — Gand, 1865 (*Epuisé.*)

---

Alph. Lameere. **Manuel de la Faune de Belgique.** Animaux non insectes. — Tome I, in-18 avec figures dans le texte. Bruxelles, 1895. 5 [illegible]
Tome II. Insectes inférieurs, in-18, 858 pages et 721 figures dans le texte. 1900. Cartonné toile anglaise . . . 7 [illegible]

Bruxelles. — Imprimerie de l'Office de Publicité, 17, rue des Paroissiens.

SYNOPSIS AVIUM

# NOUVEAU
# MANUEL D'ORNITHOLOGIE

PAR

**Alphonse DUBOIS**

Docteur en sciences naturelles,
Conservateur au Musée Royal d'Histoire naturelle de Belgique,
Officier de l'Ordre de Léopold,
Membre du Comité international et permanent d'Ornithologie,
de la Commission permanente d'étude des collections du Musée de l'État Indépendant du Congo,
Membre honoraire, correspondant ou effectif de plusieurs Sociétés savantes.

**Fascicule XII**

ACCIPITRES, STRIGES, HERODIONES (1re partie).

Pl. XIV

BRUXELLES
H. LAMERTIN, éditeur
80, RUE DU MARCHÉ-AU-BOIS

1902

# AVIS

Nous rappellerons que les tables alphabétiques des genres, des espèces et des variétés paraîtront dans le dernier fascicule.

Le prix du fascicule restera fixé à 6 francs pour tous les abonnés qui se feront inscrire avant la fin de la publication.

## ON SOUSCRIT à

BRUXELLES, chez l'éditeur, M. H. **Lamertin**, 20, rue du Marché-au-Bois.
AMSTERDAM, chez MM. **Feikema, Caarelsen & C^e**.
BERLIN, chez M. **R. Friedländer & Sohn**, Carlstr. 11, N. W.
LONDRES, chez MM. **William & Norgate**, 14, Henrietta street.
MADRID, chez M. **Romo y Fussel**.
MILAN, chez M. **Ulrico Hœpli**, 57, Corso Vittorio Emanuele.
OXFORD, chez M. **James Parker & C^e**, 27, Broad street.
PARIS, chez M. **P. Klincksieck**, 5, rue Corneille.
NEW-YORK, chez M. **G.-E. Stechert**, 9 East 16^th street.

### 1548. DRYOTRIORCHIS

*Dryotriorchis*, Shell. (1874).

10.360. SPECTABILIS (Schl.), *Nederl. Tijdschr.* I, p. 13, pl. 6; Shell., *Ibis*, 1874, p. 91; Gurn., *P. Z. S.*, 1880, p. 621, pl. 58. — Afrique W.

### 1549. EUTRIORCHIS

*Eutriorchis*, Sharpe (1875).

10.361. ASTUR, Sharpe, *P. Z. S.*, 1875, p. 70, pl. 13; M.-Edw. et Grand., *Ois. Madag.* I, p. 31, pl. $9^b$, $9_c$.

### 1550. HELOTARSUS

*Helotarsus*, Smith (1830); *Terathopius*, Less. (1831).

10.362. ECAUDATUS (Daud.), *Traité*, II, p. 54; Levaill., *Ois. d'Afr.* I, p. 31, pl. 7, 8; Des M., *Voy. Abyss.*, p. 66, pl. 11; Sharpe, *Cat.* I, p. 300; *typus*, Smith; *leuconotus*, Rüpp., *Syst. Uebers.*, p. 10; *brachyurus*, Brm.; *brevicaudatus*, Pelz.; *var. fasciatus*, Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 81. — Toute l'Afrique au S. du Sahara.

## SUBF. V. — GYMNOGENYNÆ

### 1551. GYMNOGENYS

*Polyboroides!* Smith (1830); *Gymnogenys*, Less. (1831).

10.363. RADIATUS (Scop.), *Del. Faun. et Fl. Insubr.* II, p. 85; Kp., *Mus. Senck.* III, p. 260; Sharpe, *Cat.*, p. 48; *madagascariensis*, Daud.; Less., *Traité*, p. 64; *gymnogenys*, Tem., *Pl. Col.* I, pl. 307. — Madagascar.

10.364. TYPICUS (Smith), *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 81, 82; Sharpe, *Cat.*, p. 48; *melanostictus*, Licht.; *radiatus* (pt.), auct. plur.; *malzacii*, Verr., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1855, p. 349, pl. 13. — Afrique trop.

## SUBF. VI. — CIRCINÆ

### 1552. CIRCUS

*Circus*, Lacép. (1806); *Pygargus*, Koch (1816); *Strigiceps*, Bp. (1831); *Glaucopteryx*, Kp. (1844); *Spizacercus*, Kp. (1845); *Spilocircus*, Kp. (1847); *Pterocircus*, Kp. (1850).

10.365. CYANEUS (Lin.); Gould, *B. Eur.* I, pl. 33; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg., Ois.* I, p. 87, pl. 20; *griseus*, — Europe et Asie au S. du 60° l. N., Afrique



Digitized by Google

| | |
|---|---|
| Gm.; *gallinarius*, Savig.; *variabilis*, Pall.; *variegatus*, Vieill.; *dispar*, Koch; *ægithus*, Leach; *strigiceps*, Nilss.; *pygargus*, Naum.; *nigripennis*, *pallens* et *cinereus*, Brm. | N. et N.-E. |
| 10.366. HUDSONIUS (Lin.); Vieill., *Ois. Am. sept.*, pl. 8, 9; Sharpe, *Cat.*, p. 55; *fuliginosus*, Gm.; *europogistus*, Daud.; *variegatus*, *uliginosus*, Vieill.; *cyaneus*, Audub., *B. Am.*, pl. 356; *var. americanus*, Sw. et Rich., *F. Bor.-Am.*, p. 55, pl. 29. | Amérique, du 55° l. N. à Panama, îles Bahama, Cuba. |
| 10.367. MACRURUS (Gm.), *S. N.* I, p. 269; Dubois, *l. c.* I, p. 90, pl. 21; *swainsoni*, Smith; Dress., *B. Eur.* V, p. 441, pl. 330; *superciliaris*, Smith; *albescens*, Less.; *pallidus*, Syk.; *dalmatinus*, Rüpp.; *æquipar*, Puch.; *desertorum*, Brm. | Europe et Asie, entre le 51° et le 10° l. N., Afrique. |
| 10.368. CINERARIUS (Mont.), *Tr. Linn. Soc.*, 1808, p. 188; Dubois, *l. c.* I, p. 95, pl. 22; ? *pygargus*, Lin.; Sharpe, *Cat.*, p. 64; *ater* et *montagui*, Vieill.; *cineraceus*, Tem.; Dress., *B. Eur.* V, p. 423, pl. 328; *cinerascens*, Steph.; *nipalensis*, Hodgs.; *pratorum*, *elegans*, Brm. | Europe tempérée, Asie centr. et mérid., Afrique. |
| 10.369. MAURUS (Tem.), *Pl. Col.* 461; Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 58; *lalandii*, Smith; *ater*, Gray. | Afrique S. |
| 10.370. CINEREUS, Vieill., *N. Dict.* IV, p. 454; Sharpe, *Cat.*, p. 56; *campestris*, Bonn. et V.; *histrionicus*, Quoy et G., *Voy. Uranie*, p. 95, pl. 15, 16; *poliopterus*, Cab. in *Tsch. Faun. Per.*, p. 113, pl. 3. | S. de l'Amérique mérid. jusqu'au 15° l. S. environ, Malouines. |
| 10.371. MACULOSUS (Vieill.), *Ois. Am. sept.*, pl. 3[bis]; *macropterus*, *albicollis* et *leucophrys*, Vieill., *N. Dict.* IV, pp. 456, 458, 464; *palustris*, Tem., *Pl. Col.* 22; *superciliosus*, Less.; *megaspilus*, Gould; Gray, *Gen. B.*, pl. 11. | Amérique mérid. |
| 10.372. MELANOLEUCUS (Forst.), *Ind. Zool.*, p. 12, pl. 11; Vieill., *N. Dict.* IV, p. 465; Jerd., *B. Ind.* I, p. 98; Levaill., *Ois. d'Afr.* I, p. 155, pl. 52 (Tchoug). | Asie or., de Sibérie E. à l'Indo-Chine, Inde E., Ceylan. |
| 2776. *Var.* PHILIPPINENSIS, Steere, *List. B. and Mam. Phil.*, p. 7. | Philippines. |
| 10.373. MAILLARDI, Verr., in *Mail.*, *L'île de la Réunion*, II, p. 12; Scl., *Ibis*, 1863, p. 163, pl. 4. | Iles de la Réunion et Comores. |
| 2777. *Var.* MACROSCELES, A. Newt., *P. Z. S.*, 1865, p. 186; id., *Ibis*, 1865, p. 557; M.-Edw. et Grand., *H. Madag.*, *Ois.* I, p. 90, pl[a] 27, 28, 29[b], f. 2, 29[c], f. 2. | Madagascar. |
| 10.374. WOLFI, Gurn., *P. Z. S.*, 1865, p. 823, pl. 44; id., *Ibis*, 1873, p. 421; Salvad., *Orn. Pap.* I, p. 72; *gouldi* (pt.), Sharpe, *Cat.*, p. 72. | Nouv.-Calédonie, îles Fidji. |
| 10.375. APPROXIMANS, Peale, *U. S. Expl. Exp.*, 1848, p. 64; | Australie S. et E., |

Digitized by Google

Gurn., *Ibis*, 1870, p. 536, 1875, p. 225; *assimilis*, Gould, *B. Austr.* I, pl. 26 (nec J. et S.); *gouldi*, Bp.; Sharpe, *Cat.*, p. 72 (pt.) — Nouv.-Zélande.

10.376. SPILOTHORAX, Salvad. et D'Alb., *Ann. Mus. Civ. Genov.*, 1875, p. 807; Salvad., *Orn. Pap.* I, p. 71. — Nouv.-Guinée S.-E.

10.377. SPILONOTUS, Kaup, *Contr. Orn.*, 1850, p. 59; Swinh., *Ibis*, 1863, p. 213, pl. 5. — Sibér. E., Chine, Indo-Chine, arch. Malais.

10.378. ÆRUGINOSUS (Lin.); Savig., *Ois. d'Egypte*, p. 90; Dress., *B. Eur.* V, p. 415, pl. 326, 327; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 30; *rufus*, Gm. (ex Briss.); Dubois, *Fne. ill., Ois.* I, p. 84, pl. 19; *arundinaceus*, Bechst.; *Ac. circus*, Pall.; *variegatus*, Syk.; *aquaticus*, Brm.; *sykesii*, Less. — Europe jusqu'au 60°, Asie jusqu'au 52° l. N., Japon, Formose, Philippines, Afrique N. et N.-E.

2778. *Var.* UNICOLOR, Radde, *Orn. Cauc.*, p. 106, pl. 3; *abdullæ*, Floer., *Orn. Monatsb.* IV, p. 155. — Caucase.

10.379. RANIVORUS (Daud.), *Traité*, II, p. 170; Cuv., *Règ. an.* I, p. 358; Levaill., *Ois. d'Afr.* I, pl. 23; *levaillanti*, Sm.; *pygargus*, Kp. (nec Lin.) — Afrique S.

10.380. HUMBLOTI, M.-Edw. et Grand., *Ois. Madag.* I, p. 747, pl. 29ª, 29ᵇ, f. 1, 29ᶜ, f. 1. — Iles Comores.

10.381. ASSIMILIS, Jard. et Sel., *Ill. Orn.* I, 1826, pl. 51; Schl., *Vog. Ned. Ind., Valkv.*, pp. 29, 67, pl. 20, ff. 2, 3; *jardinii*, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 141; id., *B. Austr.* I, pl. 27. — Australie E. jusqu'au Cap York, Célèbes.

## SUBF. VII. — ACCIPITRINÆ

### 1553. MICRASTUR

*Brachypterus*, Less. (1836, nec Kugel); *Carnifex*, Less. (1842, nec Sundev.); *Micrastur*, Gray (1841); *Climacocercus*, Cab. (1845); *Rhynchomegus*, Bp. (1854).

10.382. MELANOLEUCUS et *semitorquatus* (Vieill.), *Nouv. Dict.* X, p. 322; Gurn., *Ibis*, 1879, p. 171 (en note); *leucomelas*, Licht.; *brachypterus*, Tem., *Pl. Col.* 116, 141; *naso*, Less.; *percontator*, Cabot. — Amérique centrale et mérid.

10.383. AMAURUS, Gurn., *Ibis*, 1879, p. 171; id., *List of Diurn. B. of Prey*, p. 24. — De Panama à l'Ecuador.

10.384. MIRANDOLLEI (Schl.), *Ned. Tijdschr.*, 1863, p. 131; id., *Mus. P.-B., Astures*, p. 27; *microrhynchus*, Pelz., *Reis. Nov. Vög.*, p. 11. — Guyane, Amazone.

10.385. GUERILLA, Cass., *Pr. Phil. Acad.*, 1848, p. 87; id., *Journ. Phil. Acad.* I, pl. 40; Sharpe, *l. c.*, p. 79; *concentricus*, Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 285; *gilvicollis* et *xanthothorax*, Scl. (1859). — Amérique centr. jusqu'à l'Ecuador.

Digitized by Google

2779. *Var.* JUGULARIS, Gurn., *List of Diurn. B. of Prey*, pp. 25, 118. — Brésil, Vénézuéla, Colombie.

10.386. RUFICOLLIS (Vieill.), *N. Dict.* X, p. 322; Cab., *J. f. O.*, 1865, p. 40; *leucauchen*, Tem., *Pl. Col.* 36; *xanthothorax*, Tem., *l. c.*, pl. 92; Burm., *Th. Bras.* II, p. 85. — Guyane, Vénézuéla, Brésil, Amazone.

10.387. ZONOTHORAX (Cab.), *J. f. O.*, 1865, p. 406; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1869, p. 366; Ridgw., *Pr. Ac. N. S. Phil.*, 1875, p. 489. — Colombie, Vénézuéla.

10.388. GILVICOLLIS (Vieill.), *N. Dict.* X, p. 323; Pelz., *Reis. Nov. Vög.*, p. 10; id., *Orn. Bras.*, pp. 7, 399; *concentricus*, Less.; *pelzelni*, Ridgw. — Brésil, Amazone, Colombie, Pérou.

## 1554. GERANOSPIZIAS

*Ischnosceles*, Strickl. (1844, nec Burm.); *Geranospiza*, Kp. (1847); *Geranopus*, Kp. (1850); *Geranospizias*, Sundev. (1872).

10.389. CÆRULESCENS (Vieill.), *N. Dict.* X, p. 318; Sharpe, *Cat. B.*, p. 81 (pt.); *hemidactylus*, Tem., *Pl. Col.* 3; Schl., *Mus. P.-B., Astures*, p. 33. — Amérique mérid. trop.

2780. *Var.* GRACILIS (Tem.), *Pl. Col.* 91; Burm., *Th. Bras.* II, p. 124; Ridgw., *Cat. Falc. Bost. Mus.*, p. 43. — Brésil E., Paraguay.

10.390. NIGER (Du Bus), *Bull. Acad. R. Brux.* XIV, 1847, p. 102; id., *Esq. Orn.*, pl. 16; *aterrimus*, Licht.; *gracilis* et *cærulescens*, Scl. (1856-59). — Amérique centr., du Mex. S. à Panama.

## 1555. UROTRIORCHIS

*Urotriorchis*, Sharpe (1874); *Astur* (pt.), auct. plur.

10.391. MACRURUS (Hartl.), *J. f. O.*, 1855, p. 355; Schl., *Mus. P.-B., Astures*, p. 25; Sharpe, *Cat. B.* I, p. 83. — Afrique W.

## 1556. MELIERAX

*Melieraxe*, Gray (1840).

10.392. CANORUS (Risl.), in *Thunb. Diss. Ac.* III, 1799, p. 264; Fch. et Hartl., *Vög. Ostafr.*, p. 92; Levaill., *Ois. d'Afr.* I, p. 117, pl. 27; *musicus*, Daud.; Schl., *l. c.*, p. 20; *cantans*, Kp. — Afrique E.

10.393. POLIOPTERUS, Cab., in *v. d. Decken's Reis.* III, p. 40; Shell., *P. Z. S.*, 1882, p. 305; *somaliensis*, Neum., *Orn. Mon.*, 1897, p. 192. — Afrique E., du Kilima-Ndjaro au Somalil.

10.394. POLYZONUS (Rüpp.), *Neue Wirbelth.*, p. 36, pl. 15; id., *Syst. Uebers.*, p. 12; *musicus* (pt.), Vig., Horsf., Moore, Hartl. (1857). — Afrique N.-E., Soudan, Sénégamb., Arab. S.

Digitized by Google

2781. *Var.* Mechowi, Cab., *J. f. O.*, 1882, p. 229; Gurn., *List Diurn. B. of Prey*, p. 27. — Angola, Damara jusqu'au Mashonaland.

2782. ? *Var.* Metabates, Heugl., *Ibis*, 1861, p. 72; id., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 63. — Nil Blanc.

10.395. gabar (Daud.), *Traité*, II, p. 87; Levaill., *Ois. d'Afr.* I, p. 136, pl. 33; Schl., *l. c.*, p. 48; Du Boc., *Orn. Angola*, p. 15; *leucorrhous*, Bonn. et V.; *erythrorhynchus*, Sw.; *niloticus*, Sund.; *sphenurus*, Strickl. (juv.); *gabarinus*, Bp.; *micronisus*, Beaum. — Afrique, sauf la région occid.

10.396. niger (Bonn. et V.), *Enc. méth.* III, p. 1269; Vieill., *Gal. Ois.* I, pl. 22; Lay., *B. S. Afr.*, p. 31; id., éd. Sharpe, p. 20; Du Boc., *Orn. Ang.*, p. 33; *carbonarius*, Licht.; *maurus*, Rüpp.; *miltopus*, Heugl., *J. f. O.*, 1861, p. 429. — Afrique, sauf la région occid.

## 1557. ASTURINULA

*Kaupifalco!* Bp. (1854); *Asturinula*, Fch. et Hartl. (1870).

10.397. monogrammica (Tem.), *Pl. Col.* 314; Sw., *B. W. Afr.* I, pl. 4; Schl., *l. c.*, p. 24; Sharpe, *Cat.*, p. 275. — Afrique trop.

2783. *Var.* Meridionalis (Hartl.), *P. Z. S.*, 1860, p. 109; *monogrammicus* (pt.), auct. plur. — Afrique S.

## 1558. ASTUR

*Astur*, Lacép. (1801); *Dædalion*, Savig. (1809); *Sparvius*, Vieill. (1816); *Tachyspiza*, *Lophospiza*, Kp. (1844); *Nisastur*, Blyth (1844); *Scelospiza*, Kp. (1847); *Erythrospiza*, Kp. (1867); *Lophospizias*, *Urospizias*, etc. Sund. (1872).

### *a. Astur.*

10.398. palumbarius (Lin.); Dress., *B. Eur.* V, p. 587, pl. 354; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg. Ois.* I, p. 76, pl. 17; *incertus*, *marginatus*, Lath.; *albescens*, Bodd.; *dubius*, Sparrm.; *gallinarius*, *nævius*, Gm.; *astur*, Pall.; *indicus*, Hodgs. — Europe et Asie centr. jusqu'au 60° l. N., au S. jusqu'à l'Himal. et la Corée, Afr. N.

10.399. hensti, Schl., *Mus. P.-B.*, *Rev. Accipitr.*, p. 62 (1873); Sharpe, *Cat.*, p. 97; M.-Edw. et Grand., *H. Madag. Ois.* I, p. 98, pl. 30. — Madagascar.

10.400. candidissimus, Dybowski, *Bull. Soc. Zool. de France*, 1883, p. 353, 1884, p. 149. — Kamtschatka.

10.401. atricapillus (Wils.), *Am. Orn.* VI, pl. 52, f. 3; *regalis*, Tem., *Pl. Col.* 495; *palumbarius*, Sw. et Rich. (nec Lin.); Aud., *B. N. Am.*, fol. pl. 141; *pictum*, Less. — Amérique du Nord.

2784. *Var.* Striatula, Ridgw., *B. N. Am.*, p. 240. — Amérique N.-W.

Digitized by Google

β. *Lophospizias.*

10.402. TRIVIRGATUS (Tem.), *Pl. Col.* 303; Schl., *l. c., Astures*, p. 22; Sharpe, *Cat.*, p. 105; *cristatus*, Gray; *indicus*, Hodgs. — Inde, Ceylan, archipel Malais, Formose, Haïnan.

2785. *Var.* RUFITINCTA, Mc Clell., *P. Z. S.*, 1839, p. 153. — Himal. E., Indo-Chine.

10.403. GRISEICEPS, Schl., *Mus. P.-B., Astures*, p. 25; Wall., *Ibis*, 1864, p. 184, pl. 5; Schl., *Vog. Ned. Ind. Valkv.*, pp. 19, 58, pl. 11, ff. 1, 2; *tenuirostris*, Brügg. (juv.) — Célèbes.

γ. *Scelospizias.*

10.404. FRANCESI (Smith), *S. Afr. Q. Journ.* II, p. 280; Kaup, *Isis*, 1847, pp. 173, 366; *francissæ*, Bp.; *var. typicus*, M.-Edw. et Grand., *H. Madag.*, *Ois.* I, p. 99, pl. 31, 32, f. 1; *madagascariensis*, Hartl., *Faun. Madag.*, p. 20. — Madagascar.

2786. *Var.* PUSILLA (Gurn.), *Ibis*, 1875, p. 358; *francesi*, Scl., *Ibis*, 1864, pl. 7. — Iles Comores.

10.405. BRUTUS (Poll.), *Ned. Tijdschr.*, 1866, p. 80; Schl. et Poll., *Faun. Madag., Ois.*, p. 38, pl. 12, f. 2; Schl., *Mus. P.-B., Rev. Acc.*, p. 95; Sharpe, *Cat.*, p. 107. — Ile Mayotte (Comores).

10.406. POLYZONOIDES (Smith), *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 11; Du Boc., *Orn. d'Angola*, p. 19; *badius*, Fsch. et Hartl., *Vög. Ostafr.*, p. 81 (nec Gm.) — Afrique S. jusqu'au Nyassaland au N.

10.407. ?TIBIALIS, Verr., *J. f. O.*, 1861, p. 100; Sharpe, *Cat.* I, p. 108; *hartlaubi*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1871, p. 613 (nec Verr.) — Afrique W.

10.408. BUTLERI, Gurn. jun., *Ibis*, 1898, pp. 290, 313. — Ile Car Nicobar.

10.409. BADIUS (Gm.), *S. N.* I, p. 280; Kp., *Isis*, 1847, p. 190; Schl., *Mus. P.-B., Astures*, p. 48; *brownii*, Shaw; *dussumieri*, Tem., *Pl. Col.* 308, 336; *dukhunensis*, Syk.; *scutarius*, *fringillaroides*, Hodgs.; *bifasciatus*, Peale. — Inde, Ceylan.

2787. *Var.* POLIOPSIS (Hume), *Str. Feath.*, 1874; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 24; *badius* (pt.), Scl. (1864), Swinh. (1870-71). — Indo-Chine, Haïnan, Formose.

2788. *Var.* CENCHROIDES, Severtz., *Turk. Jevotn.*, p. 63; id., *Ibis*, 1875, p. 104; Blanf., *Zool. and Geol. E. Persia*, p. 108; Bidd., *Ibis*, 1881, p. 40. — Asie centr., Beloutchistan.

2789. *Var.* SPHENURA (Rüpp.), *Neue Wirb.*, p. 42 (*sphenurus*); id., *Syst. Uebers.*, pp. 6, 11, pl. 2; *brachydactylus*, Sw.; *ruppellii*, Kp.; *hybris*, Licht.; *polioparejus*, *guttatus*, Heugl., *J. f. O.*, 1861, pp. 428, 430. — Afrique N.-E., et du Soudan à la Sénégambie.

Digitized by Google

10.410. BREVIPES (Severtz.), *Bull. Soc. I. Nat. Mosc.*, 1850, p. 234, pl. 1-3; Tristr., *Ibis*, 1863, p. 260; Dress., *B. Eur.* V, p. 633, pl. 339, 360; *gurneyi*, Bree; *badius*, auct. plur. (nec Gm.) — Europe S.-E., Palestine, Égypte.

10.411. TACHIRO (Daud.), *Traité*, II, p. 90; Tem., *Pl. Col.* 377, 420; Schl., *l. c.*, p. 46; *polyzonus*, Less.; Des M., *Icon. Orn.*, pl. 61. — Afrique S.-E.

2790. *Var.* UNDULIVENTER (Rüpp.), *Neue Wirb.*, p. 40, pl. 18, f. 1; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 67; *tachiro* (pt.), Sharpe, *Cat.* I, p. 99. — Afrique N.-E.

2791. *Var.* SPARSIMFASCIATA, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1895, p. 97. — Ile Zanzibar.

2792. *Var.* CASTANILIA (Bp.), *Rev. Zool.*, 1853, p. 578 (*castanilius*); Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, pl. 18; *macroscelides*, Hartl.; Sharpe, *Cat.*, p. 100, pl. 3; *zonarius*, Hartl. — Afrique W.

10.412. TOUSSENELII (Verr.), *Rev. et Mag. de Zool.*, 1854, p. 538; Sharpe, *Cat. B.* I, p. 101, pl. 6, f. 1. — Afrique W.

δ. *Erythrospizias.*

10.413. TRINOTATUS (Bp.), *Consp.* I, p. 33; Schl., *Mus. P.-B., Astures*, p. 45; id., *Vog. Ned. Ind. Valkv.*, pp. 27, 65, pl. 19, ff. 1-3; Sharpe, *Cat.*, p. 101; Mey. et Wg., *B. Cel.*, pl. 1. — Célèbes N.

2793. *Var.* HÆSITANDA (Hart.), *Nov. Zool.* III, p. 162. — Célèbes S.

ε. *Tachyspizias.*

10.414. SOLOENSIS (Lath.), *Gen. Hist.* I, p. 209; Sharpe, *Cat.* I, p. 114, pl. 4, f. 1; Schl., *l. c.*, p. 44; *cuculoides*, Less. (nec Tem.); *minutus*, Less.; *badius* et *virgatus* (pt.), Swinh. — Chine, Indo-Chine, Malacca, Moluques et les îles Indo-malaises.

2794. ? *Var.* CUCULOIDES (Tem.), *Pl. Col.* 110, 129; Sharpe, *Cat.*, p. 115, pl. 4, f. 2; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 24; *soloensis*, Salvad., *Orn. Pap.* I, p. 66. — Chine S. jusqu'à l'archipel Indo-malais.

## 1359. LEUCOSPIZIAS

*Leucospiza*, Kaup (1844); *Leucospizias*, Sundev. (1872).

10.415. NOVÆ-HOLLANDIÆ (Gm.), *S. N.* I, p. 264; Gould, *B. Austr.* I, pl. 15; *albus*, White; *clarus*, Lath.; *niveus*, Vieill.; *candidum*, Less.; *leucœtus*, Forst. — Australie S. et E., Tasmanie.

2795. *Var.* LEUCOSOMA (Sharpe), *Cat.* I, p. 119 (*leucosomus*); Salvad., *Orn. Pap.* I, p. 42; *novæ-hol-* — Nouv.-Guinée, Waigiou.

Digitized by Google

*landiæ* (pt.), Schl., *Vog. Ned. Ind.*, pp. 19, 58, pl. 11, f. 3, et auct. plur. (nec Gm.)

10.416. CINEREUS (Vieill.), *N. Dict.* X, p. 338; Sharpe, *Cat.* I, p. 117; *rayi*, Vig.; *novæ-hollandiæ* (pt.), Gould, *B. Austr.* I, pl. 14. — Australie S., E.

10.417. POLIOCEPHALUS (Gray), *P. Z. S.*, 1858, p. 170; Scl., *P. Z. S.*, 1860, p. 322, pl. 10; ?*contumax*, Rosenb. (*descr. nulla*); *rufitorques* (pt.), Schl.; *spilothorax*, Salvad. — Nouv.-Guinée, Arou, Jobi, Salawati, Mysol, Waigiou.

## 1560. UROSPIZIAS

*Urospiza*, Kp. (1845); *Urospizias*, Sundev. (1872).

10.418. HAPLOCHROUS (Scl.), *Ibis*, 1859, p. 275, pl. 8; Schl., *Mus. P.-B.*, *Rev. Accip.*, p. 91; Shpe, *Cat.* I, p. 119. — Nouv.-Calédonie.

10.419. ALBIGULARIS (Gray), *Ann. N. H.*, 1870, p. 327; id., *Cruise of the Curaçoa*, p. 334, pl. 1. — Iles Salomon.

2796. ?*Var.* WOODFORDI (Sharpe), *P. Z. S.*, 1888, p. 183; Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.*, 1901, p. 379. — Ile Guadalcanar (Salomon).

10.420. VERSICOLOR (Rams.), *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1881, p. 718; *holomelas*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1888, p. 182. — Iles Ugi, Guadalcanar (Salomon).

10.421. MEYERIANUS (Sharpe), *Journ. Linn. Soc.*, 1877, p. 458, pl. 22; *albigularis* (pt.), Salvad., *Orn. Pap.* I, p. 44. — Ile Jobi.

10.422. PULCHELLUS (Rams.), *Journ. Linn. Soc.*, 1883, p. 131; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 508; *soloensis*, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.* IV, p. 66 (nec Lath.); *shebæ*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1888, p. 183; Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.*, 1901, p. 380. — Iles Salomon.

10.423. JARDINEI, Gurn., *Ibis*, 1887, p. 96, pl. 3. — Guyane angl.?

10.424. ETORQUES, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.*, 1875, p. 191; id., *Orn. Pap.* I, p. 49, III, p. 508; *poliocephalus*, Gr. (juv.); *æquatorialis* (pt.), Wall.; *griseogularis* (pt.), Kp.; *rufitorques* (pt.), Schl.; *henicogrammus* (pt.), Sharpe; *hiogaster*, Rams. (nec Müll.); *novæ-guineæ*, Madar. — Nouv.-Guinée, Sorong, Salawati, Jobi, Mafor.

10.425. DAMPIERI, Gurn., *Ibis*, 1882, p. 453; *etorques*, Scl., *P. Z. S.*, 1877, p. 109 (nec Salvad.) — Archipel Bismarck.

10.426. MISORIENSIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.*, 1875, p. 904; id., *Orn. Pap.* I, p. 49. — Iles Misori et Jobi.

10.427. PALLIDICEPS, Salvad., *Ibis*, 1879, p. 474; id., *Orn. Pap. Mol.* I, p. 64 (1880); *wallacei* (pt.), Sharpe; *cruentus*, *torquatus* et *rufitorques* (pt.), auct. plur. — Ile Bourou (Moluques).

10.428. HIOGASTER (Müll. et Schl.), *Nat. Gesch.*, p. 110 (1839-44); Hombr. et Jacq., *Voy. Pôle S.*, *Zool.*, p. 48, pl. 2, f. 1; Schl., *Mus. P.-B.*, *Astures*, p. 43; Sharpe, *Cat.* I, p. 104. — Amboine, Céram (Moluques).

Digitized by Google

10.429. HENICOGRAMMUS (Gray), *P. Z. S.*, 1860, p. 343; Sharpe, *Cat.*, p. 124; Salvad., *Orn. Pap.* I, p. 54; *muelleri*, Wall.; Sharpe, *l. c.*, p. 102; *cruentus* (pt.), Schl., *Vog. Ned. Ind.*, *Valkv.*, pl. 14, f. 1, pl. 15, f. 1. — Halmahera, Morotai (Moluques).

10.430. GRISEIGULARIS (Gray), *P. Z. S.*, 1860, p. 343; Sharpe, *Cat.*, p. 122; Salvad., *l. c.*, p. 57; *cruentus* (pt.), Schl., *Mus. P.-B.*, *Astures*, p. 40; id., *Vog. Ned. Ind.*, *Valkv.*, pl. 14, ff. 3, 4, pl. 15, ff. 2, 3, pl. 16, ff. 1, 2; *æquatorialis*, Wall.; *henicogrammus* (pt.), Sharpe, *Cat.*, p. 124; *halmaheræ*, A. B. Mey., *Sitz. Ges. Isis. Dresd.*, 1884, *Abh.* I, p. 11. — Batjan, Halmahera, Ternate, Tidore, Morotai, Obi, Gueboh (Moluques).

10.431. ALBIVENTRIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 983; id., *Orn. Pap.* I, p. 56; *poliocephalus* (pt.) et *rufitorques* (pt.), Schl., *Mus. P.-B.*, *Rev. Acc.*, pp. 80, 83. — Iles Key.

10.432. SHARPEI (Oust.), *Bull. Soc. Philom.* II, p. 25; Salvad., *Ibis*, 1881, p. 607. — Iles Mariannes.

10.433. RUFITORQUES (Peale), *U. S. Expl. Exp.*, 1848, p. 68, pl. 19; Cass., *U. S. Expl. Exp.*, 1858, p. 90, pl. 2, ff. 1, 2; Sharpe, *Cat.*, p. 121; *cruentus*, Fch. et Hartl., *Fna. Centr. Pol.*, p. 3. — Iles Fidji.

10.434. ? HAWAII (Dole), *Hawaiian Annual*, 1879, p. 43; *Ibis*, 1880, p. 241. — Iles Hawaï.

10.435. POLIONOTUS, Salvad., *Mem. Accad. Torino*, XL, 1889, p. 19. — Ile Ténimber.

10.436. NATALIS (Lister), *P. Z. S.*, 1888, p. 525. — Ile Christmas.

10.437. MELANOCHLAMYS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 905; id., *Orn. Pap. Mol.* I, p. 65. — Nouv.-Guinée N.-W.

10.438. SYLVESTRIS (Wall.), *P. Z. S.*, 1863, pp. 484, 487; id., *Ibis*, 1868, p. 10; *torquatus* (pt.), Schl., *Vog. Ned. Ind.*, *Valkv.*, pl. 17, f. 5 (juv.). — Flores.

10.439. TORQUATUS (Tem.), *Pl. Col.* 45; Kp., *Contr. Orn.*, 1850, p. 64; Schl., *l. c.*, pl. 17, ff. 1-4; Sharpe, *Cat.*, p. 125; Salvad., *Orn. Pap. Mol.* I, p. 60 (pt.); *æquatorialis* (pt.), Wall. — Nouv.-Guinée, Waigiou, Timor, Savu.

2797. *Var.* WALLACEI (Sharpe), *Cat. B.* I, p. 128, pl. 5; Gurn., *Ibis*, 1875, p. 365; Hart., *Nov. Zool.* V, p. 122. — Lombok, Flores, Djampea, Kalao, Bourou.

2798. *Var.* SUMBAENSIS (A. B. Mey.), *Abh. Ber. Mus. Dresd.*, 1892-93, p. 7; *torquatus* (pt.), Hart. (ex Sumba). — Sumba.

2799. *Var.* CRUENTA (Gould), *P. Z. S.*, 1842, p. 115; id., *B. Austr.* I, pl. 18; Sharpe, *Cat.* I, p. 127; *torquatus* (pt.), Salvad., *Orn. Pap.* I, p. 60. — Australie W.



Digitized by Google

10.440. APPROXIMANS (Vig. et Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XV, p. 181; Gould, *B. Austr.* I, pl. 17; *radiatus*, Tem., *Pl. Col.* 123; *fasciatus*, Vig. et Horsf.; *sharpii*, Rams. (nec Oust.); *maculosus*, Coles, *Vict. Nat.*, 1897, p. 43. — Australie.

## 1561. COOPERASTUR

*Cooperastur*, Bp. (1854); *Astur* et *Accipiter* (pt.), auct. plur.

10.441. POLIOGASTER (Tem. ex Natt.), *Pl. Col.* 264; Schl., *Mus. P.-B.*, *Astures*, p. 43; Sharpe, *Cat.* I, p. 120. — Brésil.

10.442. PECTORALIS (Bp.), *Rev. et Mag. de Zool.*, 1850, p. 490, 1854, p. 538; Schl., *l. c.*, p. 18; Sharpe, *l. c.*, p. 121. — Brésil.

10.443. PILEATUS (Tem.), *Pl. Col.* 205; Sharpe, *Cat.* I, p. 153; *beskii*, Licht. — Brésil.

10.444. BICOLOR (Vieill.), *N. Dict.* X, p. 325; Bp., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1854, p. 538; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, pp. 137, 170, pl. 69; *variegatus*, Less.; *sexfasciatus*, Sw.; *dynastes*, Verr. — Amérique centr., Colombie, Ecuador, Guyane.

10.445. COOPERI Bp.), *Am. Orn.* I, pl. 10, f. 1; Schl., *Mus. P.-B.*, *Rev. Accip.*, p. 73; Sharpe, *Cat.* I, p. 137; *stanleyi*, Audub., *B. Am.*, pl. 36 et 141, f. 3. — Amérique du Nord tempérée.

2800. *Var.* MEXICANA (Sw.), *Faun. Bor.-Am.*, p. 45; Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1888, p. 92. — États-Unis W., Mexique.

10.446. GUNDLACHI (Lawr.), *Ann. Lyc. N. Y.*, 1862, p. 252; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 170; Gundl., *J. f. O.*, 1871, p. 367; *cooperi* et *pileatus*, Lemb. (nec auct.) — Cuba.

10.447. GUTTATUS (Vieill.), *N. Dict.* X, p. 325; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 169, pl. 85. — Paraguay, Bolivie.

10.448. CHILENSIS (Phil. et Landb.), *Arch. f. Naturg.*, 1864, p. 43; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, pp. 73, 170, pl. 37; *cooperi*, Pelz., *Reise Nov. Vög.*, p. 13. — Chili jusqu'à Magellan.

## 1562. ACCIPITER

*Accipiter*, Briss. (1760); *Nisus*, Cuv. (1799); *Ierax*, Leach (1816); *Hieraspiza*, Kp. (1844); *Teraspiza*, Kp. (1867).

10.449. NISUS (Lin.); Pall., *Zoogr.* I, p. 370; Dress., *B. Eur.* V, p. 599, pl. 355-58; Dubois, *Fne. Ill. Vert. Belg.*, *Ois.* I, p. 80, pl. 18; *minutus*, Lin.; *nisus major* et *minor*, Bek.; *fringillarius*, Savig.; *communis*, Less.; *elegans*, *peregrinus*, Brm.; *brehmii*, C. Dub., *Orn. Gal.*, p. 170, pl. 112; *nisosimilis*, Tick.; *subtypicus*, Hodgs.; *intercedens*, Brm. — Europe et Asie centr. jusqu'au cercle polaire.

2801. *Var.* PALLENS, Stejn., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1893, p. 625. — Kamtschatka, Japon.

Digitized by Google

2802. *Var.* Melanoschista, Hume, *Ibis*, 1869, p. 356. — Himalaya.

2803. *Var.* Punica, Erlang., *Orn. Monatsb.*, 1897, p. 187. — Tunisie (tout le N. de l'Afrique?)

2804. *Var.* Granti, Sharpe, *Ann. and Mag. N. H.*, 1890, p. 483; Grant, *Ibis*, 1890, pl. 14. — Madeire.

2805. *Var.* Wolterstorffi, Kischm., *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 168. — Sardaigne.

10.450. fuscus (Gm.), *S. N.* I, p. 280; Audub., *B. Am.*, pl. 374; Schl., *Mus. P.-B.*, *Astures*, p. 30; *dubius*, Gm.; *striatus*, Vieill., *Ois. Am. sept.*, pl. 14; *vieillotinus*, Shaw; *velox* et *pennsylvanicus*, Wils.; *ardesiaceus*, Bonn. et V.; *malfini*, Less. — Amérique sept., Mexique, Guatémala.

2806. *Var.* Rufilata, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1888, p. 92. — Amérique N.-W. jusqu'aux Mnes Rocheuses, Mex. W.

10.451. fringilloides, Vig., *Zool. Journ.*, 1828, p. 454; d'Orb., in *Ram. de la Sagra, N. H. Cuba, Ois.*, p. 18; Ridgw., *Stud. of Amer. Falconidæ*, pp. 95, 117. — Cuba, Haïti.

10.452. tinus (Lath.), *Ind. Orn.* I, p. 50; Bp., *Consp.* I, p. 32; Sharpe, *Cat.* I, p. 139; *subniger*, *minutus*, Vieill.; *fontanieri*, Bp.; *superciliosus*, Strickl. — Amérique trop. méridionale.

10.453. minullus (Daud.), *Traité*, II, p. 88; Levaill., *Ois. d'Afr.* I, pl. 34; Schl., *l. c.*, p. 34; Sharpe, *Cat.*, p. 140; *satrapa*, *binotatus*, Licht.; *polyzonoides*, Bianc., *Spec. Zool. Mosamb.* XVIII, p. 318, pl. 3. — Afrique S. jusqu'au Mozambique et l'Angola.

2807. *Var.* Tropicalis, Rchw., *J. f. O.*, 1898, p. 139. — Afrique trop. E.

2808. *Var.* Erythropus (Hartl.), *J. f. O.*, 1855, p. 354; Schl., *l. c.*, p. 35; *zenkeri*, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1894, p. 125; id., *J. f. O.*, 1896, pl. 1. — Afrique W. de la Côte d'Or au Caméron.

10.454. ovampensis, Gurn., *Ibis*, 1875, p. 367, pl. 6. — Afrique S.-W. à l'E. jusqu'au Zambèze.

10.455. cirrhocephalus (Vieill.), *N. Dict.* X, p. 329; Schl., *l. c.*, p. 38; Salvad., *Orn. Pap.* I, p. 67; *torquatus*, Vig.; Gould, *B. Austr.* I, pl. 19; *melanops*, Strickl. — Australie, Tasmanie, Nouv.-Guinée, Salawati, Jobi.

10.456. madagascariensis, Verr., *S. Afr. Q. Journ.*, 1854, p. 282; M.-Edw. et Grand., *Madag.*, *Ois.*, p. 106, pls 55, 56; *lantzii*, Verr., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1866, p. 353, pl. 18. — Madagascar.

18.457. collaris (Knip), *MS.*; Scl., *Ibis*, 1860, p. 148, pl. 6; Ridgw., *Stud. of Am. Falc.*, p. 127. — Colombie.

10.458. ceramensis (Schl.), *Mus. P.-B.*, *Astures*, p. 39 (*N. cirrhocephalus ceramensis*); Finsch., *Neu-Guin.*, p. 155; *rubricollis*, Wall., *P. Z. S.*, 1863, p. 19, pl. 4; Sharpe, *Cat.* I, p. 144; Salvad., *Orn. Pap.* — Céram, Bourou, Morotai (Moluques).

Digitized by Google

I, p. 69; *erythrauchen* (pt.), Schl., *Vog. Ned. Ind.*, *Valkv.*, pp. 22, 60, pl. 13, f. 2.

10.459. BRACHYURUS, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1879, p. 465. — Nouv.-Bretagne.

10.460. ERYTHRAUCHEN, Gray, *P. Z. S.*, 1860, p. 344; Schl., *Vog. Ned. Ind.*, *Valkv.*, pp. 22, 60, pl. 13, ff. 1, 3, 4; Sharpe, *Cat.*, p. 145; Salvad., *Orn. Pap.* I, p. 68. — Halmahera, Morty, Batjan.

10.461. RHODOGASTER (Schl.), *Mus. P.-B.*, *Astures*, p. 30 (*N. virgatus rhodogaster*); Gurn., *Ibis*, 1865, p. 450; Schl., *Valkvogels*, pp. 21, 60, pl. 12, ff. 5, 6; Wald., *Trans. Z. S.* VIII, p. 109, pl. 11 (juv.); Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 25. — Célèbes.

2809. *Var.* SULAENSIS (Schl.), *Vog. Ned. Ind.*, *Valkv.*, pp. 26, 64, pl. 16, ff. 3, 4; Wall., *Ibis*, 1868, p. 10; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 26. — Iles Soula et Péling.

10.462. ERYTHROCNEMIS, Gray, *Cat. Accip. B. M.*, p. 70; Bp., *Gonsp.* I, p. 32; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 33, pl. 17; *striatus*, Burm., *Th. Bras.* II, p. 71. — Brésil, Bolivie.

2810. *Var.* SALVINI, Ridgw., *Bull. U. S. Geol. Surv.* II, 1876, p. 121; id., *Stud. Am. Falc.*, pp. 95, 121. — Vénézuéla.

10.463. CHIONOGASTER (Kaup), *P. Z. S.*, 1851, p. 41; Bp., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1854, p. 538; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 27, pl. 14; *erythrocnemis* (pt.), Scl. et Salv. (1859-61). — Guatémala, Nicaragua.

10.464. RUFIVENTRIS, Smith, *S. Afr. Q. Journ.* I, p. 231; id., *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 93; *exilis*, Tem., *Pl. Col.* 496; *perspicillaris*, Rüpp., *Neue Wirb.*, p. 41, pl. 18, f. 2. — Afrique S. et N.-E.

10.465. VENTRALIS, Scl., *P. Z. S.*, 1866, p. 503; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 25, pl. 13; Sharpe, *Cat.*, p. 149. — Vénézuéla, Colombie.

2811. *Var.* NIGRIPLUMBEA, Lawr., *Ann. Lyc. N.Y.*, 1869, p. 270; Salv., *Ibis*, 1874, p. 525; Ridgw., *Stud. Am. Falc.*, pp. 95, 122; *ventralis* (pt.), Sharpe. — Ecuador, Pérou.

10.466. HARTLAUBI (Verr.), in Hartl., *Orn. W. Afr.*, p. 15; id., *J. f. O.*, 1861, p. 101; Dubois, *Rev. et Mag. de Zool.*, 1874, p. 1, pl. 4; Sharpe, *Cat.*, p. 150, pl. 6, f. 2. — Afrique W., de Sénégambie au Gabon.

10.467. BUTTIKOFERI, Sharpe, *Notes Leyd. Mus.*, 1888, p. 199; Büttik., *Reiseb. Liberia*, II, pl. 30. — Libéria (Afr. W.)

10.468. VIRGATUS (Tem.), *Pl. Col.* 109; Vig., *Zool. Journ.* I, p. 338; Legge, *B. Ceyl.*, p. 26. — Indo S., Ceylan, Java, Sum., Mal., Andam.

2812. *Var.* AFFINIS, Hodgs., in *Gr. Zool. Misc.*, 1844, p. 81; Gurn., *Diurn. B. of Prey*, p. 39; *vir-* — Himalaya, Formose, Haïnan.

Digitized by Google

*gatus* (pt.), Sharpe; Hart., *Nov. Zool.*, 1894, p. 482.

2813. *Var.* MANILENSIS, Meyen, *Nov. Acta Acad. Leop.*, 1834, *Suppl.*, p. 69, pl. 9; Gurn., *l. c.*, p. 40; *stevensoni*, Tweed., *P. Z. S.*, 1878, p. 938, pl. 37. — Philippines.

2814. *Var.* GULARIS (Tem. et Schl.), *Faun. Jap.*, p. 5, pl. 2; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 28; *nisoides*, Blyth; Gurn., *l. c.*, p. 40; *stevensoni*, Gurn., *Ibis*, 1863, p. 447, pl. 11; *virgatus*, Sharpe (pt.); Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 26. — Sibérie, Mandchourie, Chine, Japon, Indo-Ch., Malacca, Sum., Java, Timor, Palawan, Bornéo, Célèbes N., Djampea.

2815. *Var.* RUFOTIBIALIS, Sharpe, *Ibis*, 1887, p. 437, 1889, p. 68, pl. 2; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 29. — Bornéo N.-W. (Kini Balu).

10.469. MELANOLEUCUS, Smith, *S. Afr. Q. Journ.*, 1850, p. 229; id., *Ill. S. Afr. Zool.*, pl. 18; Sharpe, *Cat.*, p. 156; *smithii*, Kp.; *apoxypterus*, *hypoxanthus*, Licht.; *temmincki*, Hartl.; *verreauxi*, Schl., *Mus. P.-B., Ast.*, p. 37. — Afrique trop., îles du Cap Vert.

### 1563. ERYTHROTRIORCHIS

*Urospizias*, Sharpe (1874, nec Kp.); *Erythrotriorchis*, Sharpe (1875); *Megatriorchis*, Salvad. et D'Alb. (1875).

10.470. RADIATUS (Lath.), *Ind. Orn.*, *Suppl.* II, p. 12; Gould, *B. Austr.* I, pl. 16; Schl., *l. c.*, p. 15; *caleyi*, Vig. et Horsf.; *testaceus*, Kp. — Australie E., centr. et N.

10.471. DORIÆ (Salvad. et D'Alb.), *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 805; Salvad., *Orn. Pap.* I, p. 41; Sharpe, *Hand.-L.* I, p. 234. — Nouv.-Guinée S.-E.

## SUBF. VIII. — AQUILINÆ

### 1564. MORPHNUS

*Morphnus*, Cuv. (1817).

10.472. GUIANENSIS (Daud.), *Traité*, II, p. 78; Cuv., *Rég. an.* I, p. 318; Burm., *Th. Bras.* II, p. 66; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* III, pl. 63; *sonnini*, *delicatus*, Shaw; *variegatus*, Bonn. et V.; *cristatus*, Less. — Amazone, Guyane, Panama.

10.473. TÆNIATUS, Gurn., *Ibis*, 1879, p. 173, pl. 3. — Ecuador.

Digitized by Google

## 1565. HARPYOPSIS

*Harpyopsis*, Salvad. (1875).

10.474. NOVÆ-GUINEÆ, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 682; Sharpe, *Mitth. Zool. Mus. Dresd.* I, p. 355, pl. 29; Salvad., *Orn. Pap.* I, p. 40. — Nouv.-Guinée.

## 1566. THRASAËTUS

*Harpyia* (Vieill., 1816, nec Ochsenh., 1810); *Thrasaëtus*, Gray (1837); *Nothrophrontes*, Glog. (1842).

10.475. HARPYIA (Lin.); Gray, *P. Z. S.*, 1837, p. 108; *coronatus*, Jacq.; *jacquini*, *cristatus*, Gm.; *destructor*, Daud.; Tem., *Pl. Col.* 14; *imperialis*, *regalis*, *caracca*, Shaw; *calquin*, Mol.; *maxima*, Bonn. et V.; *ferox*, Less. — Texas, Mexique, Amérique centr. et mérid. jusqu'au Paraguay.

## 1567. SPIZAËTUS

*Spizaëtus*, Vieill. (1816); *Plumipeda*, Flem. (1822); *Limnaëtus*, Vig. (1830); *Pternura*, Kp. (1845).

10.476. ORNATUS (Daud.), *Traité*, II, p. 77; Vieill., *Gal. Ois.*, pl. 21; Schl., *Mus. P.-B.*, *Astures*, p. 2; *mauduyti*, Daud.; Sharpe, *Cat.* I, p. 262; *superbus*, Shaw; *urutaurana*, Dum. — Amérique centr. et mérid. jusqu'au Paraguay.

10.477. DEVILLEI, Dubois, *Bull. Acad. R. Belg.* XXXVIII, 1874, p. 129, pl. 1, 2; *isidori* (pt.), Gurn. (1). — Ecuador.

10.478. TYRANNUS (Max.), *Reis. Bras.* I, p. 360; Tem., *Pl. Col.* 73; Gr., *Gen. B.* I, p. 14; Burm., *Th. Bras.* II, p. 62; *bracchata*, Spix, *Av. Bras.* I, pl. 3; *spixii*, Des M. — Amérique centrale et mérid. jusqu'au S. du Brésil.

10.479. BELLICOSUS (Daud.), *Traité*, II, p. 38; Levaill., *Ois. d'Afr.*, pl. 1; Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 42; *armiger*, Shaw. — Afrique S. et E., au N. jusqu'au Choa.

10.480. CORONATUS (Lin.); Levaill., *l. c.*, pl. 3; Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 40, 41; Bp., *Consp.* I, p. 28; *albescens*, Daud. — Afrique S. et W.

10.481. NIPALENSIS (Hodgs.), *J. As. Soc. B.*, 1836, p. 229, pl. 7; Jerd., *B. Ind.* I, p. 73; *pulcher* et *pallidus*, Hodgs.; *grandis*, Gray; *orientalis*, Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, pl. 3. — Himalaya, Inde, Chine, Japon.

(1) M. Gurney considère les figures des planches indiquées ci-dessus comme représentant le jeune et l'âge moyen du *Lophotriorchis isidori*; il peut avoir raison, mais cela demande à être confirmé. Dans son *Hand-list* (1899), M. Sharpe maintient le *devillei* comme espèce distincte.

Digitized by Google

2816. *Var.* Kelaarti, Legge, *Ibis*, 1878, p. 202; id., *B. Ceyl.*, p. 51, pl. — Inde S., Ceylan.

10.482. cirrhatus (Gm.), *S. N.* I, p. 274; Sharpe, *Cat.* I, p. 269; *ceylanensis*, Gm.; *cristatellus*, Tem., *Pl. Col.* 282. — Inde, Ceylan.

10.483. sphinx, Hume, *Str. Feath.*, 1873, p. 321; *ceylonensis*, Gurn., *Ibis*, 1877, p. 430; Legge, *B. Ceyl.*, p. 55, pl. — Inde S., Ceylan.

10.484. philippensis, Gurn., in *Gould's B. Asia*, pt. XV (1863); Wald., *Tr. Z. S.*, IX, p. 141, pl. 24; *philippinensis*, Sharpe, *Cat.* I, p. 261. — Philippines.

10.485. lanceolatus, Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, 1845, p. 8; Bonap., *Consp.* I, p. 29 (pt.); Salvad., *Orn. Pap.* I, p. 5; Wald., *Ibis*, 1868, p. 13; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 32; *cirrhatus* (pt.), Schl., *Vog. Ned. Ind.*, *Valkv.*, pl. 7, ff. 2, 3; *fasciolatus*, Schl., *Mus. P.-B., Ast.*, p. 9. — Iles Célèbes et Soula.

10.486. albogiger, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1845, p. 173, 1850, p. 335; Gould, *B. Asia*, pt. XV, pl.; Sharpe, *Cat.*, p. 271; *borneonensis*, Gray; *nanus*, Wall., *Ibis*, 1868, p. 14, pl. 1. — Ténassérim, Malacca, Sumatra, Bornéo.

10.487. limnaëtus (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 158; id., *Zool. Res. Java*, pl. 36; Tem., *Pl. Col.* 134; *caligatus*, Raffl.; *niveus*, Tem., *Pl. Col.* 127; *horsfieldi*, Vig.; *unicolor*, *nipalensis*, Blyth. — Himalaya, Bengal, Indo-Chine, Malacca, Sumatra, Bornéo, Java.

2817. *Var.* Floris, Hart., *Nov. Zool.* V, p. 46. — Flores.

10.488. andamanensis, Tytl., *Pr. A. S. B.*, 1865, p. 112; Hume, *Str. Feath.* II, p. 142, IV, p. 280; Sharpe, *Cat.*, p. 260. — Iles Andaman.

10.489. gurneyi (Gray), *P. Z. S.*, 1860, p. 342, pl. 169; Schl., *Mus. P.-B., Ast.*, p. 14; id., *Valkvog.*, pp. 17, 56, pl. 9; Salvad., *Orn. Pap.* I, p. 5. — Batjan, Ternate, Halmah., Morotai, Waigiou, Nouv.-Guinée, Jobi, Arou.

## 1568. LOPHOTRIORCHIS

*Lophotriorchis*, Sharpe (1874).

10.490. kieneri (Geoff. St-Hil.), *Mag. de Zool.*, 1835, pl. 35; Jerd., *Ill. Ind. Orn.*, p. 5, pl. 1; Sharpe, *Cat.* I, p. 255; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 35; *cristatellus*, Jard. et Sel., *Ill. Orn.*, pl. 66; *albogularis*, Tick. — Inde, Ceylan, Indo-Chine, Malacc., Iles de la Sonde, Philippines, Célèbes.

10.491. isidorei (Des M.), *Rev. Zool.*, 1845, p. 176; id., *Icon. Orn.*, pl. 1; Gurn., *Ibis*, 1877, pp. 424, 433; Sharpe, *Cat.* I, p. 256. — Colombie.

Digitized by Google

10.492. LUCANI, Sharpe et Bouv., *Bull. Soc. Zool. de Fr.*, 1877, p. 471 (1); Sushk., *B. B. O. C.* XI, p. 31. — Afrique trop.

## 1569. LOPHOAËTUS

*Lophoaëtus*, Kaup (1847).

10.493. OCCIPITALIS (Daud.), *Traité*, II, p. 40; Levaill., *Ois. d'Afr.* I, p. 8, pl. 2; Kp., *Isis*, 1847, p. 165; Schl., *Mus. P.-B.*, *Ast.*, p. 25; Sharpe, *Cat.* I, p. 274; *senegalensis*, Daud. — Toute l'Afrique, Madagascar.

## 1570. ICTINAËTUS

*Heteropus*, Hodgs. (1843, nec Dum. et Bibr., 1839); *Ictinaëtus*, Jerd. (1844); *Neopus*, Hodgs. (1844); *Onychaëtus*, Kp. (1844).

10.494. MALAYENSIS (Tem.), *Pl. Col.* 117; Schl., *Vog. Ned. Ind.*, *Valkv.*, pp. 8, 49, pl. 3, ff. 1, 2; Beav., *P. Z. S.*, 1868, p. 396, pl. 34; Blanf., *Faun. Br. Ind.*, *B.* III, p. 347; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 38; *pernigra*, Hodgs.; *ovivorus*, Jerd. — Inde, Ceylan, Indo-Ch. W., Malacca, gr. îles de la Sonde, Célèbes, Ternate, Halmahera, Nias.

## 1571. SPIZIASTUR

*Spiziastur*, Gray (1841).

10.495. MELANOLEUCUS (Vieill.), *N. Dict.* IV, p. 482; id., *Gal. Ois.*, pl. 14; Sharpe, *Cat.* I, p. 258; *atricapillus*, Tem., *Pl. Col.* 79. — Amérique centr. et mérid. jusqu'au Brésil.

## 1572. NISAËTUS

*Nisaëtus*, Hodgs. (1836); *Eutolmaëtus*, *Butaëtus*, Blyth (1845); *Hieraëtus*, Kp. (1845); *Tolmaëtus*, Blyth (1846); *Pseudaëtus*, Bp. (1856); *Aquilastur*, Brm. (1860).

10.496. FASCIATUS (Vieill.), *Mém. Soc. Linn. Paris*, 1822, p. 152; Dress., *B. Eur.* V, p. 575, pl. 331, f. 1, pl. 332, 333; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg.*, *Ois.* II, p. 703, pl. 321; *bonellii*, Tem., *Pl. Col.* 288; *intermedia*, Boit.; *grandis*, Hodgs.; *niveus*, Jerd.; *nipalensis*, *rubriventer*, Hodgs.; *strenuus*, Jerd., *wiedii*, Brm. — Europe S. (accident. Belg.), Afrique N. et N.-E.; Asie S.-W., Inde.

10.497. SPILOGASTER (Bp. ex Du Bus), *Rev. et Mag. de Zool.*, 1850, p. 487; Schl., *Mus. P.-B.*, *Ast.*, p. 12; — Afrique tropicale.

(1) M. Gurney (*List of Diurnal B. of Prey*, p. 52) considère cet oiseau comme étant un jeune du *Nisaëtus spilogaster*.

Digitized by Google

Sharpe, *Cat.* I, p. 252; *zonurus*, Müll.; id., *Beitr. Orn. Afr.*, pl. 1; *bonellii* (pt.), auct. plur.; *leucostigma*, Heugl.; *ayresii*, Gurn., *Ibis*, 1862, p. 149, pl. 4 (juv.); *Limn. africanus*, Cass., *P. Phil. Acad.*, 1865, p. 4.

10.498. PENNATUS (Gm.), *S. N.* I, p. 272; Tem., *Pl. Col.* 33; Bureau, *Ass. fr. pour l'avancem. des Sc.*, IV, pl. 13; Dress., *B. Eur.* V, p. 481, pl. 336, 337; *minuta*, Brm.; *milvoides*, Jerd.; *brehmii*, Müll.; *longicaudata*, Heugl.; *albipectus*, Severtz. — Europe mér., Afrique, Asie S.-W. et centr., Inde, Ceylan.

10.499. MORPHNOIDES (Gould), *P. Z. S.*, 1840, p. 161; id., *B. Austr.* I, pl. 2; Sharpe, *Cat.* I, p. 254; *cristatus*, Blyth. — Australie.

10.500. WEISKEI, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 185. — Nouv.-Guinée S.-E.

## 1373. AQUILA (1)

*Aquila*, Briss. (1760); *Pteroaëtus*, Kaup. (1844).

10.501. CHRYSAËTUS (Lin.); Dress., *B. Eur.* V, p. 533, pl. 345; Dubois, *Fnc. ill.*, *Ois.* I, p. 11, pl. 3; *fulvus*, Lin.; *melanoaetus*, *canadensis*, *albus*, *niger*, Gm.; *cygneus*, *melanonotus*, Lath.; *nobilis*, Pall.; *regalis*, Tem.; *regia*, Less.; *fuscicapilla*, Brm. — Europe, N. de l'Asie jusqu'au N. de la Chine, Amérique du N. jusqu'au Mex.

2818. *Var.* BARTHELEMYI, Jaub., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1852, p. 543; id. et Lap., *Rich. Orn.*, p. 34, pl. 2; Murie, *P. Z. S.*, 1870, p. 80. — Midi de la France.

2819. *Var.* DAPHANEA, Hodgs., in *Gray's Zool. Misc.*, p. 81; Sharpe, *Hand-l.* I, p. 261; *chrysaetus*, auct. — Himalaya et autres montagnes de l'Asie centr.

10.502. VERREAUXI, Less., *Cent. Zool.*, p. 105, pl. 38; Des M., in *Lef. Voy. Abyss.*, *Zool.*, p. 49, pl. 4; Sharpe, *Cat.*, p. 234; *vulturina*, Smith (nec Daud.?); Schl., *Mus. P.-B. Aq.*, p. 9; *nigra*, James; *leucoprymna*, Licht. — Afrique S. et N.-E.

10.503. ADELBERTI, Brm. (*major* et *minor*), *Ber. Vers. deutsch. Orn. Ges.*, 1860, p. 55; Dress., *B. Eur.* V, p. 517, pl. 342, 343 (fig. de gauche); *heliaca*, Boc.; *imperialis*, Saund.; *leucolena*, Dress. — Europe S.-W., Afrique N.

10.504. MOGILNIK (Gm.), *Nov. Com. Petrop.* XV, p. 445; Dress., *B. Eur.* V, p. 521, pl. 343 (fig. de droite), 344; *heliaca*, Savig., *Descr. Égypte*, p. 459, pl. 12; Sharpe, *Cat.*, p. 238; *imperialis*, Bechst. et auct. plur.; *crassipes*, Hodgs. — Europe S. et S.-E., Asie centr., Inde N., Chine.

(1) Quid: *Aquila boliviara*, Boeck. (Guerney, *Cat. of the Birds of Prey*, 1894, p. 23).



Digitized by Google

10.505. BIFASCIATA, Gray et Hardw., *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 17; *nipalensis*, Hodgs., *As. Res.* XVIII, 2, p. 13, pl. 1; *mogilnik*, Sharpe (nec Gm.), *Cat.*, p. 240. — Europe S.-E., Asie centr. jusqu'au N.-W. de l'Inde.

2820. *Var.* ORIENTALIS, Cab., *J. f. O.*, 1854, p. 369; Dress., *B. Eur.* V, pl. 340; *mogilnik* (pt.), Alleon, *Rev. et Mag. de Zool.*, 1866, p. 273, pl. 20; *nipalensis*, Dress., *l. c.* V, p. 507. — Steppes de l'Asie et de l'Europe or.

2821. ? *Var.* AMURENSIS, Swinh., *P. Z. S.*, 1871, p. 358; Prjev., in *Rowl. Orn. Misc.* II, p. 144; Gurn., *List Diurn. B. of Prey*, p. 55. — Amour, Mongolie.

10.506. RAPAX (Tem.), *Pl. Col.* 455; Dress., *B. Eur.* V, p. 513, pl. 341; *senegala* et *nævioides*, Cuv., *Reg. An.* I, p. 326; *choka*, Smith; *belasirius*, Levaill.; *raptor, variegata*, Brm.; *substriata, isabellina*, Heugl.; *lestris*, L. Brm.; *culleni*, Bree. — Afrique, Espagne, Asie centr., Inde N.-W.

2822. *Var.* ALBICANS, Rüpp., *Neue Wirb.*, p. 34, pl. 13; Gurn., *List Diurn. B. of Pr.*, p. 50; Erlang., *J. f. O.*, 1898, p. 418, pl. 7; Sushk., *B. B. O. C.* LXXIV, p. 7; *rapax* (pt.), auct. plur. — Afrique N.-E. et N.-W.

2823. *Var.* VINDHIANA, Frankl., *P. Z. S.*, 1831, p. 114; Hume, *Nest and Eggs Ind. B.*, p. 29; *punctata*, Gr. et Hardw., *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 16; ?*fusca*, id., pl. 26. — Inde.

2824. *Var.* MURINA, Sushk., *Bull. Br. Orn. Cl.* LXXIV, p. 8. — Himalaya E., (Darjiling).

10.507. FULVESCENS, Gray et Harw., *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 29; Jerd., *B. Ind.* I, p. 60; Gurn., *Ibis*, 1877, pp. 225, 325-29; Sushk., *l. c.*, p. 9; *vindhiana* (pt.), Sharpe; *nævia var. pallida*, Licht., *J. f. O.*, 1853, p. 69, pl. 4 (juv.) — Russie, Sibérie W., Altaï, Turkestan, Inde N.-W.

10.508. ? GLITSCHI, Severtz., *Str. Feath*, 1875, p. 422. — Steppes de l'Europe or. et de l'Asie.

10.509. MACULATA (Gm.), *S. N.* I, p. 258; Blanf., *Ibis*, 1894, p. 287; *clanga*, Pall., *Zoogr.* I, p. 351; Dress., *B. Eur.* V, p. 409, pl. 339; *vittata*, Hodgs.; *fuscoater*, Wod.; *unicolor*, Brm.; *nævia* (pt.), auct. plur. — Europe centr., Afrique N.-E., Asie centr., Inde.

2825. *Var.* POMARINA, Brm., *Vög. Deutschl.*, p. 27; Dress., *B. Eur.* V, p. 491, pl. 358; *nævia*, auct. plur. (nec Gm.); Dubois, *Fne. ill., Ois.* I, p. 16, pl. 4; *fusca, subnævia*, Brm.; *maculata*, Sharpe (nec Gm.), *Cat.*, p. 246; *boeki*, Hom. — Europe centr. et mérid.

10.510. HASTATA (Less.), *Voy. Bél.*, p. 217; Anders., *P. Z. S.*, 1875, p. 23, pl. 3; *unicolor*, Blyth; *punctatus*, Jerd. — Inde.

10.511. WAHLBERGI, Sundev., *OEfv. K. Akad. Stockh.*, — Afrique tropicale.

Digitized by Google

1850, p. 100; Sharpe, *Cat.*, p. 243; *brehmii*, Müll.; *desmursi*, Verr., in Hartl., *Orn. W. Afr.*, p. 4; Gurn., *Tr. Z. S.* IV, p. 366, pl. 77.

## 1574. UROAËTUS

*Uroaëtus*, Kaup (1844).

10.512. AUDAX (Lath.), *Ind. Orn. Suppl.*, p. 2; Sharpe, *Cat.*, p. 231; *albirostris*, Vieill.; *fucosus*, Tem., *Pl. Col.* 32; Gould, *B. Austr.* I, pl. 1; *cuneicaudata*, Brm. — Australie, Tasmanie.

## 1575. THALASSOAËTUS

*Thalassoaëtus*, Kaup (1844); *Haliaëtus* (pt.), auct. plur.

10.513. PELAGICUS (Pall.), *Zoogr. Rosso-As.* I, p. 343, pl. 18; Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 11, pl. 4 (juv.); *leucopterus*, Tem., *Pl. Col.* 489 (ad.); *imperator*, Kittl. — Kamtschatka, Japon.

2826. *Var.* BRANICKII (Tacz.), *P. Z. S.*, 1888, p. 451; Scl., *P. Z. S.*, 1896, p. 784, pl. 37; ?*pelagicus*, Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 13. — Corée, ? Chine N.

2827. *Var.* MACRURA, Menzb., in *Bull. Br. Orn. Club.* XI, p. 4. — Sibérie E. (Yakutsk.)

## 1576. HALIAËTUS

*Haliaëtus*, Savig. (1809); *Cuncuma*, Hodgs. (1837); *Pontoaëtus*, Kp. (1844); *Blagrus*, Blyth (1849).

10.514. ALBICILLA (Lin.); Dress., *B. Eur.* V, p. 551, pl. 347, 348; Dubois, *Fnc. ill.*, *Ois.* I, p. 4, pls. 1, 1b; *ossifragus*, Lin.; *albicaudus*, Gm.; *hinnularius*, Lath.; *pygargus*, Daud.; *nisus*, Savig.; *leucocephala*, Wolf (nec Lin.); *borealis*, Fab.; *orientalis*, *islandicus*, *groenlandicus*, *cinereus*, *funereus*, *germanicus*, Brm.; *pelagicus* (nec Pall.) et *brooksi*, Hume. — Europe, Asie N., Groenland, Islande, N. de l'Inde et de la Chine.

2828. *Var.* HYPOLEUCA, Ridgw. (ex Stejn.), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1883, p. 90. — Ile de Behring (1).

10.515. LEUCOCEPHALUS (Lin.); Vieill., *Ois. Am. sept.*, pl. 111; Audub., *B. Am.* I, pl. 31; Gould, *B. Eur.* I, pl. 11; *ossifragus*, Wils.; *washingtonianus*, Nutt.; *washingtonii*, Audub. — Amérique du N. jusqu'en Floride.

2829. *Var.* ALASCANA, Towns., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1897, p. 145. — Alaska.

(1) M. Ridgway pense que la var. *Hypoleuca* est une forme orientale de l'*albicilla*, propre au Kamtschatka, aux îles Aléoutiennes, au Japon et à la Chine.

Digitized by Google

10.516. VOCIFER (Daud.), *Traité*, II, p. 65; Levaill., *Ois. d'Afr.* I, p. 17, pl. 4; Des M., *Icon. Orn.* pl. 8; *clamans*, Brm.; *var. orientalis*, Heugl. — Afrique tropicale.

10.517. VOCIFEROIDES, Des M., *Rev. Zool.*, 1845, p. 175; id., *Icon. Orn.* pl. 7; *vociferator*, Schl. et Pol., *Faun. Madag. Ois.*, p. 42, pl. 15. — Madagascar.

10.518. LEUCORYPHUS (Pall.), *Reise Russ. Reichs*, I, p. 454; Dress., *B. Eur.* V, p. 345, pl. 346; *fulviventer*, Vieill.; *macei*, Tem., *Pl. Col.* 8, 223 (juv.); *unicolor*, Gray; *albipes*, *lanceolatus*, Hodgs.; *deserticola*, Eversm.; *pallasi*, C. Dub., *Ois. Eur.* I, p. et pl. 5ᵉ. — Russie S., Asie centrale.

10.519. LEUCOGASTER (Gmel.), *S. N.* I, p. 257; Tem., *Pl. Col.* 49; Gould, *B. Austr.* I, pl. 3; ?*blagrus*, Daud.; *dimidiatus*, Raffl.; *oceanica*, Less.; *sphenurus*, Gould; *cultrungius*, Blyth. — Inde, Ceylan, Indo-Chine, Arch. Indien, Australie.

## SUBF. IX. — BUTEONINÆ

### 1577. ARCHIBUTEO

*Archibuteo*, Brm. (1828); *Triorchis*, Kaup (1829); *Butaëtes*, Less. (1831); *Lagopus*, Fras. (1844, nec Briss., 1760); *Hemiaëtus*, Hodgs. (1844).

10.520. LAGOPUS (Brünn.), *Orn. Bor.*, p. 4 (1764); Dress., *B. Eur.* V, p. 471, plᵉ 334, 335; Dubois, *Fne. ill., Ois.* I, p. 30, pl. 7; *sclavonicus*, *norwegicus*, Lath.; Seeb., *Ibis*, 1883, p. 122; *pennatus*, *plumipes*, Daud.; *africanus*, *planiceps*, *alticeps*, *sublagopus*, Brm.; *buteo*, Less. (nec Lin.) — Europe N. et centr., Sibérie, Alaska.

2830. *Var.* SANCTI-JOHANNIS (Gm.), *S. N.* I, p. 273; Sharpe, *Cat.* I, p. 197; *spadiceus*, Gm.; *lagopus* (pt.), auct. plur.; Audub., *B. Am.*, plᵉ 166, 422; *niger*, Wils.; *ater*, Vieill. — Amérique sept.

10.521. FERRUGINEUS (Licht.), *Abh. K. Akad. Berlin*, 1838, p. 428; Cass., *B. Calif. and Tex.*, pp. 104, 159, pl. 26; *regalis*, Gray, *Gen. B.*, pl. 6; *californicus*, Hutch. — Amérique N.-W. jusqu'au Texas et Mexique.

10.522. HEMIPTILOPUS, Blyth, *J. A. S. B.*, 1846, p. 1; Schal., *J. f. O.*, 1901, pl. 3; *strophiatus*, Hodgs. (*nomen nudum*); Sharpe, *Cat.* I, p. 199, pl. 7, f. 2; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 20, pl. 7; *cryptogenys*, Hodgs.; *aquilinus*, Strickl.; *asiaticus*, Gr.; *leucoptera*, Hume; *hemilasius*, Przew. — Sibérie, Népaul, Thibet, Chine.

2831. *Var.* HOLDERERI, Schal., *J. f. O.*, 1901, p. 426. — Asie centr. (1).

(1) La synonymie et la répartition géographique de l'espèce et de sa variété *Holdereri* ne sont pas encore bien établies.

Digitized by Google

## 1578. BUTEO

*Buteo*, Cuv. (1800); *Craxirex*, Gould (1841); *Tachytriorchis*, Kaup (1844); *Butaquila*, Hodgs. (1844); *Paciloptemis*, Kaup (1847); *Onychotes*, Ridgw. (1870); *Dromolestes*, Sund. (1874).

10.523. LEUCOCEPHALUS, Hodgs., in *Gr. Zool. Misc.*, p. 81; id., *P. Z. S.*, 1843, p. 37; Gurn., *List Diurn. B. of Prey*, pp. 62, 134; *aquilinus*, Hodgs.; *hemilasius*, Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 18, pl. 7; *asiaticus*, Blyth; *ferox* (pt.), Sharpe, *Cat.* I, p. 176, pl. 8. — Sibérie E., Chine, Japon.

10.524. FEROX (Gm.), *N. Comm. Ac. Petrop.* XV, p. 442, pl. 10; Thien., *J. f. O.*, 1853, p. 108; Dress., *B. Eur.* V, p. 463, pl. 333; *rufinus*, Cretz. in *Rüpp. Atl.*, p. 40, pl. 27; *canescens*, Hodgs.; *longipes*, Jerd.; *leucurus*, Naum. (nec Vieill.); *eximius*, Brm.; *pectoralis*, Strickl.; *africanus*, Würt.; *var. obscura*, Pelz.; *fuliginosus*, Hume; *nigricans*, Severtz. — Europe S.-E., Afrique N.-E., Asie S.-W. et centr. jusqu'au N.-W. de l'Inde.

10.525. MENETRIESI, Bogd., *Tr. Soc. Kazan*, VIII (1879), p. 45; Ehmcke, *J. f. O.*, 1898, p. 140. — Europe S.-E.

2852. *Var.* ZIMMERMANNÆ, Ehmcke, *J. f. O.*, 1895, p. 117, 1898, p. 140-146; Schalow, *J. f. O.*, 1900, p. 249; ? *vulpina*, Licht., *Nomencl. Av.*, p. 3 (1854). — Europe E. et centr.

10.526. PLUMIPES, Hodgs., *P. Z. S.*, 1843, p. 37; Sharpe, *Cat.*, p. 180, pl. 7, f. 1; *japonicus*, Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 16, pl. 6 et 6b. — Himalaya E., Chine, Japon.

10.527. DESERTORUM (Daud.), *Traité*, II, p. 164; Dress., *B. Eur.* V, p. 457, pl. 332; *rufiventer*, Jerd., *Ill. Ind. Orn.*, pl. 27; *cirtensis*, Levail. jun., *Expl. sc. de l'Alg.*, pl. 3; *capensis*, Tem. et Schl.; *minor*, Heugl.; *tachardus*, Bp.; *vulgaris*, Jerd. (nec Leach); *delalandi*, Des M.; *rufinus*, Tacz. (nec Cretzsch.) — Eur. S. et E., Afrique, Inde.

10.528. VULGARIS, Leach, *Syst. Cat. Mam. and B.*, p. 10; Dress., *B. Eur.* V, p. 449, pl. 331; Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* I, p. 26, pl. 6; ? *glaucopis* et *versicolor*, Gm.; *albus*, Daud.; *fasciatus*, *mutans*, Vieill.; *pojana*, Savi; *communis*, Less.; *septentrionalis*, *medius*, *murum*, *major*, *minor*, Brm.; *fuscus*, Macg.; *albidus*, *variegatus*, Selys (nec Gm.); *cinereus*, Bp.; *variabilis*, Bail.; *var. obscura*, *etrusca*, Pelz. — Europe.

10.529. BRACHYPTERUS, Hartl. (ex Pelz.), *Faun. Madag.*, — Madagascar.

Digitized by Google

p. 1; Roch et Newt., *Ibis*, 1862, p. 266, pl. 8; Sharpe, *Cat.*, p. 183.

10.530. SOLITARIUS (Peale), *Zool. U. S. Expl. Exp.*, *B.*, p. 62 (1848); Cass., *l. c.*, 1858, p. 97, pl. 4; Scl., *P. Z. S.*, 1878, p. 548; id., *Rep. on Voy. « Challenger » Zool.* II, pt. VIII, p. 96, pl. 21; *Onychotes gruberi*, Ridgw., *Pr. Phil. Acad.*, 1870, p. 142; Gurn., *Ibis*, 1881, p. 396-98, pl. 12; Sharpe, *Handl.* I, p. 256, n° 20. — Iles Hawaï ou Sandwich.

10.531. AUGURALIS, Salvad., *Atti Soc. Ital. Sc. Nat.*, 1865, p. 377; Sharpe, *Cat.*, p. 175; Du Boc., *Orn. Angola*, p. 22; *augur*, Brm. (nec Rüpp.); *desertorum*, Antin; *delalandi*, Boc.; *anceps*, Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 93. — Afrique W. et N.-E.

10.532. AUGUR, Rüpp., *Neue Wirb.*, p. 38, pl. 16; Heugl., *l. c.*, p. 92; Sharpe, *Cat.*, p. 175; *hydrophilus*, Rüpp., *l. c.*, p. 39, pl. 17. — Afrique N.-E. et équator.

10.533. JAKAL (Daud.), *Traité*, II, p. 161; Levaill., *Ois. d'Afr.* I, p. 73, pl. 16; Ayres, *Ibis*, 1859, p. 240, 1860, p. 204, 1877, p. 340. — Afrique S.

10.534. BOREALIS (Gm.), *S. N.* I, p. 266; Audub., *B. Am.*, pl. 51; Gosse, *B. Jam.*, p. 11, pl. 2; *leverianus*, Gm.; *ruficaudus*, *ferruginicaudus*, *americanus*, Vieill. — Amérique N.-E., Antilles.

2833. *Var.* HARLANI (Audub.), *B. Am.*, pl. 86; Salvin, *Ibis*, 1874, p. 314; Sharpe, *Cat.*, p. 191. — Sud des États-Unis, Amérique centr.

2834. *Var.* CALURUS, Cass., *Pr. Phil. Acad.*, 1855, p. 281; Baird, *B. N. Am.*, p. 22, pl. 14; Gurn., *Ibis*, 1876, p. 236-241; *montanus*, Nutt. — Amérique N.-W., Mexique.

2835. *Var.* KRIDERI, Hoopes, *Pr. Phil. Acad.*, 1873, p. 238, pl. 5; Ridgw., *B. N. Am.*, p. 258. — Du Minésota au Texas.

2836. *Var.* LUCASANA, Ridgw., *Hist. N. Am. B.* III, p. 285. — Basse-Californie.

2837. *Var.* SOCORROENSIS, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1880, p. 220. — Ile Socorro.

2838. *Var.* FUMOSA, Nels., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1898, p. 7 (*fumosus*). — Tres-Marias.

10.535. ?VENTRALIS (Gould), *P. Z. S.*, 1837, p. 10; Darw., *Zool. Beagle, B.*, p. 27; Cass., *U. S. Expl. Exp.*, 1858, p. 94, pl. 3, f. 2; Philippi, *Arch. f. Naturg.*, 1899, I, p. 166. — Chili, Patagonie.

10.536. COSTARICENSIS, Ridgw., *Hist. N. Am. B.* III, p. 285. — Costa-Rica.

10.537. ?COOPERI, Cass., *Pr. Phil. Acad.*, 1856, p. 253; Baird, Cass. et Lawr., *B. N. Am.*, p. 31, pl. 16. — Californie.

10.538. LINEATUS (Gm.), *S. N.* I, p. 268; Wils., *Am. Orn.* VI, p. 86, pl. 55, f. 3; Cass., *B. Cal.*, p. 99; Sharpe, *Cat.*, p. 191 (pt.); *hyemalis*, Gm.; Vieill., *Ois. Am. sept.*, pl. 7; *fuscus*, V., *l. c.*, pl. 5. — Amérique N.-E.

Digitized by Google

2839. *Var.* ELEGANS, Cass., *Pr. Phil. Ac.*, 1855, p. 281; Baird, Cass. et Lawr., *B.N.Am.*, p. 28, pl. 2, 3. — Amérique N.-W.

2840. *Var.* ALLENI, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1884, p. 514. — Floride.

10.539. ABBREVIATUS, Cab., in *Schomb. Reis. Guian.* III, p. 739; *albonotatus*, Gray (*descr. nulla*); *zonocercus*, Scl., *Tr. Z. S.* IV, p. 265, pl. 59; Ell., *B. N. Am.* II, pl. 33; *cabanisii*, Schl. — États-Unis S., Basse-Calif., Amér. centr. et N. de l'Amér. mérid.

10.540. PENNSYLVANICUS (Wils.), *Am. Orn.* VI, p. 92, pl. 54, f. 1; Baird, *B. N. Am.*, p. 30; *latissimus*, Wils.; Sharpe, *Cat.*, p. 198; *wilsoni*, Bp.; *platypterus*, Bonn. et V. — Amér. N.-E., Amér. centr. et N. de l'Amér. mérid.

10.541. SWAINSONI, Bp., *Comp. List B.*, p. 3; id., *Consp.* I, p. 19; *F. buteo*, Audub.; *vulgaris*, Sw. et Rich., *Faun. Bor.-Am.*, p. 47, pl. 27; *bairdii*, Hoy; Cass., *B. Cal.*, pp. 99, 257, pl. 41; *oxypterus*, Cass., id., in *B. N. Am.*, p. 25, pl. 15, f. 2; *insignatus*, Cass., *B. Cal.*, p. 102, pl. 31; *obsoletus*, Sharpe (nec Gm.), *Cat.*, p. 184; *harlani*, Bryant (nec Audub.) — Amérique du N., centr. et mérid. jusqu'à la Patagonie.

10.542. ALBICAUDATUS, Vieill., *N. Dict.* IV, p. 477; Sharpe, *Cat.*, p. 162; *leucurus*, Vieill.; *pterocles*, Tem., *Pl. Col.* 56, 139; Schl., *Mus. P.-B.*, *Buteones*, p. 13; *albicauda*, Less.; *tricolor*, Hartl. — Amérique trop. mérid.

2841. *Var.* SENNETTI, Allen, *Bull. Amer. Mus.*, 1893, p. 144. — Amérique centr. jusqu'au Texas.

2842. *Var.* COLONA, Berl., *J. f. O.*, 1892, pp. 90-91. — Iles Curaçoa, Bonaire.

10.543. HYPOSPODIUS, Gurn., *Ibis*, 1876, p. 73, pl. 3; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1877, pp. 487, 540. — Colombie, Vénézuéla, Amazone, Brésil.

10.544. POECILOCHROUS, Gurn., *Ibis*, 1879, pp. 176-78. — Ecuador.

10.545. ERYTHRONOTUS (King.), *Zool. Journ.*, 1827, p. 424; Darw., *Voy. Beagle, B.*, p. 26; Sclat., *Ibis*, 1860, p. 25, pl. 1, f. 3; Sharpe, *Cat.*, p. 172; *braccata*, Meyen; *varius*, Gould; *tricolor*, d'Orb., *Voy. Am. mér.*, pp. 69, 106, pl. 30; *leucurus*, Lafr. (nec V.); *polyosoma*, Schl.; *albicaudatus*, Scl. et Sal., *P. Z. S.*, 1873, p. 186. — Amérique S.-W., de Patagonie au Pérou, îles Malouines.

10.546. ? MELANOSTETHUS, Phil., *Arch. f. Nat.*, 1899, I, p. 167. — Santiago (Chili).

10.547. ? POECILOGASTER, Phil., *l. c.* — Chili.

10.548. ? MACRONYCHUS, Phil., *l. c.*, p. 168. — Valdivia (Chili).

10.549. ? ATER, Phil., *l. c.* — Valdivia (Chili).

10.550. UNICOLOR, d'Orb. et Lafr., *Syn. Av.*, p. 7; d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 109; Gurn., *Ibis*, 1876, pp. 69, 242; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1879, p. 657; *erythronotus* (pt.), Sharpe. — Bolivie, Chili.

10.551. EXSUL, Salv., *Ibis*, 1875, p. 371; Gurn., *Ibis*, 1876, pp. 69, 76. — Ile Juan Fernandez.

Digitized by Google

10.552. POLIOSOMUS (Quoy et Gaim.), *Voy. de l'Uran.*, *Ois.*, p. 92, pl. 14; Less., *Traité*, p. 82; Sharpe, *Cat.*, p. 171. — Chili, Patagonie, Malouines.

10.553. ?PICTUS, Phil., *Arch. f. Naturg.*, 1899, I, p. 169; *ventralis?* — Chili.

10.554. ?ALBIGULA, Phil., *l. c.*, p. 170. — Valdivia (Chili).

10.555. GALAPAGOENSIS (Gould), *P. Z. S.*, 1837, p. 9; *leucops*, Gray; *infulatus*, Kp.; *galapagensis*, Sund., *P. Z. S.*, 1871, p. 125; Sharpe, *Cat.*, p. 170. — Iles Galapagos.

## 1579. PARABUTEO

*Antenor*, Ridgw. (1873, nec Montf.); *Parabuteo*, Ridgw. (1874); *Erythrocnema*, Sharpe (1874).

10.556. UNICINCTUS (Tem.), *Pl. Col.* 315; Sharpe, *Cat.*, p. 85; *tæniurus*, Tsch., *Faun. Per.*, pl. 1. — Amérique mérid. trop.

2843. *Var.* HARRISI (Audub.), *B. N. Am.*, pl. 392; Ridgw., *Stud. Am. Falc.*, pp. 162, 302; *unicinctus* (pt.), auct. plur. — États-Unis du S., Basse-Calif., Amér. centr.

## 1580. BUTEOLA

*Buteola*, Bonap. (1855).

10.557. BRACHYURA (Vieill.), *N. Dict.* IV, p. 477; *albifrons*, Max.; *melanoleucus*, Less.; *poliogaster*, Gray; *diadema*, Kp.; *minutus*, Pelz. — Amér. centr., Guyane, Amazone jusqu'au Pérou.

10.558. FULIGINOSA (Scl.), *P. Z. S.*, 1858, p. 356; id., *Tr. Z. S.* IV, p. 267, pl. 62; Cass., in *Baird's, B. N. Am.*, pl. 15, f. 1; Ridgw., *Man. N. Am. B.* (1896), p. 236; *obsoletus* (pt.), Sharpe, *Cat.*, p. 184. — Amér. trop. jusqu'au N. du Mexique et la Floride.

## 1581. RUPORNIS

*Rupornis*, Kaup (1844).

10.559. RUFICAUDA (Scl. et Salv.), *P. Z. S.*, 1869, p. 133; id., *Ex. Orn.*, pl. 88; Gurn., *Ibis*, 1876, p. 482; Sharpe, *Cat.*, p. 205. — Du Nicaragua à Panama.

2844. *Var.* GRISEICAUDA, Ridgw., *Pr. Bost. Soc. N. H.*, 1873, p. 47; Gurn., *Ibis*, 1876, p. 482. — Du Mexique au Nicaragua.

2845. *Var.* GRACILIS, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.* VIII, p. 578. — Ile Cozumel (Yucatan).

10.560. PUCHERANI (Verr.), *Rev. et Mag. de Zool.*, 1855, p. 350; Scl. et Salv., *Ex. Orn.*, pp. 177, 180, pl. 89; Sharpe, *Cat.*, p. 205; *magnirostris*, d'Orb. (nec Gm.); *gularis*, Licht. — Brésil S., Paraguay, Argentine.

Digitized by Google

10.561. SATURATA (Scl. et Salv.), *P. Z. S.*, 1876, p. 357; Gurn., *Ibis*, 1876, p. 481. — Bolivie, Argentine N.

10.562. RIDGWAYI, Cory, *Journ. Bost. Zool. Soc.*, 1883, p. 46; id., *Auk*, 1884, p. 4. — Haïti, St.-Domingue.

10.563. MAGNIROSTRIS (Gm.), *S. N.* I, p. 282; *Pl. Enl.* 464; Scl. et Salv., *Ex. Orn.*, p. 180; *insectivorus* (pt.), Spix; *macrorhynchus*, Pelz. — Amazone, Guyane, Colombie, petites Antilles.

10.564. NATTERERI (Scl. et Salv.), *P. Z. S.*, 1869, p. 132; id., *Exot. Orn.*, pp. 173, 180, pl. 87; *magnirostris*, Tem., *Pl. Col.* 86 et auct. plur. — Brésil S. et E., Pérou.

10.565. LEUCORRHOA (Quoy et Gaim.), *Voy. de l'Uran.*, p. 91, pl. 13 (*leucorrhous*); Schl., *Mus. P.-B.*, *Asturinæ*, p. 5; Scl. et Salv., *Ex. Orn.*, p. 180. — Colombie, Vénézuéla, Brésil jusqu'au Pérou.

## 1582. ASTURINA

*Asturina*, Vieill. (1816); *Asturisca*, Sundev. (1872).

10.566. NITIDA (Lath.), *Ind. Orn.* I, p. 41; Tem., *Pl. Col.* 87, 294; Cab., *Schomb. Reis. Guian.* III, p. 737; *cinerea*, Vieill.; *striolatus*, Cuv. — Brésil, Guyane, Colombie, Amazone.

10.567. PLAGIATA (Licht.), *Nomencl.*, p. 3; Schl., *Mus. P.-B.*, *Astures*, p. 1; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, pl. 90; *nitida*, Cass. (nec Lath.) — États-Unis S.-W., Amérique centr.

10.568. ?ÆTHIOPS, Phil., *Arch. f. Naturg.*, 1899, I, p. 168. — Chili.

10.569. ?ELEGANS, Phil., *l. c.*, p. 169. — Chili.

## 1583. BUTASTUR

*Butastur*, Hodgs. (1843); *Poliornis*, Kp. (1844).

10.570. TEESA (Frankl.), *P. Z. S*, 1831, p. 115; Gr. et Harw., *Ill. Ind. Zool.* II, pl. 30; Oat., *B. Br. Burmah*, II, p. 195; *hyder*, Syk. — Inde, Indo-Chine N.-W.

10.571. INDICUS (Gm.), *S. N.* I, p. 264; Sharpe, *Cat.* I, p. 297; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 45; *javanicus*, Lath.; *poliogenys*, Tem., *Pl. Col.* 325; *fasciatus*, Hay; *barbatus*, Eyt.; *pygmæus*, Blyth; *pyrrhogenys*, Gray. — Asie E., Japon, Formose, Philippines, Célèbes, Moluques, Malac., Born., Java.

10.572. LIVENTER (Tem.), *Pl. Col.* 438; Sharpe, *Cat.*, p. 296; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 49; *pallidus*, Less. — Indo-Chine, Célèbes S., Born., Java, Timor.

10.573. RUFIPENNIS (Sund.), *Oefv. Vet. Akad. Förh. Stockh.*, 1850, p. 131; Strickl., *P. Z. S.*, 1850, p. 214, pl. 22; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 95; *percnopsis*, Du Bus, *Esq. Orn.*, pl. 29; *mulleri*, Heugl. — Afrique N.-E.



Digitized by Google

## 1584. GERANOAËTUS

*Geranoaëtus*, Kaup (1844); *Heteroaëtus*, Kp. (1850).

10.574. MELANOLEUCUS (Vieill.), *N. Dict.* XXXII, p. 57; Sharpe, *Cat.*, p. 169; Schl., *l. c.*, p. 5; *fuscessens*, Vieill.; *aguia*, Tem., *Pl. Col.* 302. — Patagonie, Chili, Pér., Colombie, Brésil.

## 1585. LEUCOPTERNIS

*Leucopternis*, Kaup (1847); *Pseudastur*, Blyth (1849).

10.575. PRINCEPS, Scl., *P. Z. S.*, 1865, p. 429, pl. 24; Salv., *Ibis*, 1872, pp. 241-43; Sharpe, *Cat.*, p. 220. — Costa-Rica.

10.576. PALLIATA, Pelz. (ex Natt.), *Sitz. Akad. Wien*, 1861, p. 11; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 97, pl. 49; Salv., *Ibis*, 1872, p. 242; *polionotus*, Gr. (*descr. nulla*); *melanonota*, Schl. (nec Vieill.). — Brésil S.

10.577. GHIESBREGHTI (Du Bus), *Esq. Orn.*, pl. 1; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 121; Gurn., *Ibis*, 1876, p. 470 (1). — Amérique centr., du S. du Mex. à Panama.

10.578. ALBICOLLIS (Lath.), *Ind. Orn.* I, p. 36; Kp., *Isis*, 1847, p. 210; *picatus*, Shaw; *melanotus*, Vieill.; *pœcilonotus*, Tem., *Pl. Col.* 9. — Amazone, Guyane, Vénézuéla, Trinidad.

10.579. OCCIDENTALIS, Salv., *Ibis*, 1876, p. 496. — Ile Puna (Ecuador W.)

10.580. LACERNULATA (Tem.), *Pl. Col.* 437; Sharpe, *Cat.*, p. 218; *skotopterus*, Max.; *scotoptera*, Kp.; Schl., *Mus. P.-B.*, *Astur.*, p. 11. — Brésil S.

10.581. MELANOPS (Lath.), *Ind. Orn.* I, p. 37; Tem., *Pl. Col.* 105; Kp., *Isis*, 1847, p. 210; Sharpe, *Cat.*, p. 220. — Amazone, Guyane.

10.582. KAUPI, Bp., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1850, p. 481; Sharpe, *l. c.*, p. 219; *kuhlii*, Bp. (*laps.*); *superciliaris*, Pelz.; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 75, pl. 38. — Amazone.

10.583. SEMIPLUMBEA, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1861, p. 288; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, pl. 61; Salv., *Ibis*, 1872, p. 243. — Amér. centr., de Costa-Rica à Panama.

10.584. PLUMBEA, Salv., *Ibis*, 1872, p. 240, pl. 8; Sharpe, *l. c.*, p. 216. — De l'Ecuad. à Panama.

10.585. SCHISTACEA (Sundev.), *Öfv. K. Vet. Akad. Förh.*, 1849, p. 152; Scl., *Tr. Z. S.* IV, p. 261, pl. 58; Salv., *Ibis*, 1872, p. 243; Sharpe, *l. c.*, p. 216; *ardesiacus*, Licht. — Amazone, Colombie.

(1) M. Sharpe écrit "*ghiesbrechti*", mais cette orthographe n'est pas exacte. Aug. Ghiesbreght, de Bruxelles, explora le Mexique en 1838 et 1839 par ordre du Gouvernement belge, et il découvrit à cette époque l'oiseau qui lui fut dédié par le Vicomte B. Du Bus.

Digitized by Google

## 1586. URUBITINGA

*Urubitinga*, Lafr. ex Less. (1842); *Hypomorphnus*, Cab. (1844); *Spizigeranus*, Kaup (1844).

10.586. ANTHRACINA (Nitzsch ex Licht.), *Pteryl.*, p. 85; Lafr., *Rev. Zool.*, 1848, p. 241; *M. urubitinga*, Lemb., *Aves de Cuba*, pl. 3, f. 3; Sharpe, *l. c.*, p. 215; *mexicanus*, Du Bus; *gundlachii*, Cab., *J. f. O.*, 1854, extrah., p. 80; *unicinctus*, Léot. — Amérique trop., Cuba, États-Unis S.-W.

10.587. ZONURA (Shaw), *Gen. Zool.* VII, p. 62; Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 129; *urubitinga*, Gm.; Tem., *Pl. Col.* 55; *fulvus*, *niger*, *ater*, Vieill.; *picta*, Spix; *longipes*, Illig.; *brasiliensis*, Strickl. — Amér. mérid., du Paraguay au Vénézuéla et jusqu'au Costa-Rica.

2846. *Var.* RIDGWAYI, Gurn., *List Diurn. B. of Prey*, pp. 77, 148; *zonura* (pt.), Lawr. et Sum., *B. S.-W. Mexico*, in *Bull. U. S. Mus.*, n° 4, p. 42. — Mexique, Guatémala.

## 1587. HARPYHALIAËTUS

*Harpyhaliaëtus*, Lafr. (1842); *Urubitornis*, Verr. (1856); *Plangus*, Sund. (1874).

10.588. CORONATUS (Vieill.), *N. Dict.* XIV, p. 257; Tem., *Pl. Col.* 234; Lafr., *R. Z.*, 1842, p. 173; Sharpe, *Cat.*, p. 221; *azaræ*, Kp.; *Pl. neogæus*, Sund. — De la Patagonie à la Bolivie et le S. du Brésil.

2847. *Var.* SOLITARIA (Cab. et Tsch.), *Arch. f. Naturg.*, 1844, p. 264; Tsch., *Faun. Per.*, p. 94, pl. 2; Gurn., *Ibis*, 1876, p. 490. — Chili, Pérou, Colombie jusqu'au Guatémala.

## 1588. HETEROSPIZIAS

*Spizigeranus*, Gray (1869, nec Kaup); *Heterospizias*, Sharpe (1874).

10.589. MERIDIONALIS (Lath.), *Ind. Orn.* I, p. 36; Sharpe, *Cat.*, p. 160; *rufulus*, Vieill.; *rutilans*, Licht.; Tem., *Pl. Col.* 25; *buzon*, Spix. — Amérique mérid. trop. jusqu'au Paraguay.

## 1589. BUTEOGALLUS

*Buteogallus*, Less. (1831).

10.590. ÆQUINOCTIALIS (Gm.), *S. N.* I, p. 265; Levaill., *Ois. d'Afr.* I, p. 86, pl. 21; Scl. et Salv., *Nomencl.*, p. 119; Sharpe, *Cat.*, p. 212; *buson*, Daud.; *canthartoides*, Less. — Guyane, Vénézuéla, Colombie.

Digitized by Google

### 1590. BUSARELLUS

*Busarellus*, Lafr. (1842); *Ichthyoborus*, Kaup (1850).

10.591. NIGRICOLLIS (Lath.), *Ind. Orn.* I, p. 35; Levaill., *Ois. d'Afr.* I, p. 84, pl. 20; Burm., *Th. Bras.* II, p. 47; *F. busarellus*, Daud.; *melanobronchos*, Shaw; *leucocephalus*, V.; *milvoides*, Spix, *Av. Bras.* I, pl. 1 *d*. — Brésil, Amazone, Guyane.

## SUBF. X. — MILVINÆ

### 1591. HALIASTUR

*Haliastur*, Selby (1840); *Dentiger*, Hodgs. (1844); *Ictinoaëtus*, Kp. (1850); *Milvaquila*, Burm. (1850).

10.592. INDUS (Bodd.), *Tabl., Pl. Enl.* 25; Buff., *Pl. Enl.* 416; Gr., *Gen. B.* I, p. 18; Jerd., *B. Ind.* I, p. 101; Sharpe, *l. c.*, p. 313; *pondicerianus*, Gm.; *garuda*, Less.; *rotundicauda*, Hodgs. — Inde, Ceylan, Birmanie.

2848. *Var.* INTERMEDIA, Gurn., *Ibis*, 1865, p. 28, 1878, pp. 460-66; *indus* et *pondicerianus* (pt.), auct. plur.; *var. ambiguus*, Brügg.; *girrenera* (pt.), Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 54. — Indo-Chine, Malacca, grandes îles de la Sonde, Philippines, Célèbes.

2849. *Var.* GIRRENERA (Vieill.), *Gal. Ois.* I, pl. 10; Sharpe, *l. c.*, p. 315; Gurn., *Ibis*, 1878, pp. 460-66; *leucosternus*, Gould; id., *B. Austr.* I, pl. 4; *indus* (pt.), Schl., *Vog. Ned. Ind.*, *Valkv.*, p. 51, pl. 4, f. 3. — Australie, Nouv.-Guinée, Moluques, Ténimber, Céram, Amboine, Arou.

10.593. SPHENURUS (Vieill.), *N. Dict.* XX, p. 564; id., *Gal. Ois.* I, pl. 15; Gr., *Gen. B.* I, p. 18; Sharpe, *l. c.*, p. 316; *canorus*, Vig. et Horsf. — Australie, Nouv.-Calédonie.

### 1592. MILVUS

*Milvus*, Cuv. (1800); *Hydroictinia*, Kaup (1844); *Lophoictinia*, Kp. (1847).

10.594. ICTINUS, Savig., *Ois. d'Égypte*, p. 239; Dress., *B. Eur.* V, p. 643, pl. 361; *F. milvus*, Lin.; *regalis*, Briss.; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg., Ois.* I, p. 45, pl. 10; *ruber*, Brm.; *vulgaris*, Selby (ex Lin., 1749). — Europe, Asie Mineure, Afrique N.

10.595. MELANOTIS, Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 14, pl. 5 et 5[b]; *niger*, *var. melanotis*, Schr.; *niger*, Radde, *Reis. Sibir.*, p. 135, pl. 1, f. 1; *major*, Hume; *govinda*, Swinh. (nec Syk.) — Asie N.-E., Japon, Formose, Himalaya, Inde, Birmanie.

Digitized by Google

10.596. GOVINDA, Sykes, *P. Z. S.*, 1832, p. 81; Dubois, *Ois. Eur.* II, pl. 195; Brooks, *Ibis*, 1879, p. 282; *cheela*, Jerd.; *ater*, Blyth; *palustris*, Anders., *Pr. As. Soc. Beng.*, 1873, p. 142. — Inde, Birmanie.

2850. *Var.* AFFINIS, Gould, *P. Z. S.*, 1837, p. 40; id., *B. Austr.* I, pl. 21; Sharpe, *Cat.*, p. 323; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 60. — Australie, petites îles de la Sonde, Célèbes.

10.597. MIGRANS (Bodd.), *Tabl. Pl. Enl.*, p. 28; Dress., *B. Eur.* V, p. 651, pl. 362; ? *korschun*, Gm.; Sharpe, *Cat.*, p. 322; *ater, austriacus*, Gm.; *russicus, castaneus*, Daud.; *fuscoater*, Mey. et Wg.; *regalis*, Pall.; *fuscus*, Brm.; *niger*, Bp. (ex Briss.); Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* I, p. 48, pl. 11; *ætolius*, Schl.; *reichenowi*, Erl. — Europe centr. et mérid., Asie centr., Afrique.

10.598. ÆGYPTIUS (Gm.), *S. N.* I, p. 261; Levaill., *Ois. d'Afr.*, pl. 22; *forskahli*, Gm.; *parasitus*, Daud.; *parasiticus*, Lath.; *ætolius*, Savig., *Ois. d'Égypte*, p. 260, pl, 3, f. 1; *leucorhynchus*, Brm. — Europe S.-E., Afrique, Madagascar.

10.599. ISURUS, Gould, *P. Z. S.*, 1837, p. 140; id., *B. Austr.* I, pl. 22; Schl., *Mus. P.-B., Milvi*, p. 4; Sharpe, *l. c.*, p. 326; *pacificus*, Strickl. — Australie.

## 1593. GYPOICTINIA

*Gypoictinia*, Kaup (1850).

10.600. MELANOSTERNON (Gould), *P. Z. S.*, 1840, p. 162; id., *B. Austr.* I, pl. 20; Kp., *Contr. Orn.*, 1850, p. 61; Sharpe, *Cat.*, p. 335. — Australie.

## 1594. ELASAS

*Elanoides!*, Vieill. (1818); *Elasas*, Heine (1890).

10.601. FURCATUS (Lin.); Vieill., *Ois. Am. sept.*, p. 38, pl. 10; Audub., *B. Am.* I, p. 78, pl. 18; *yetapa*, Bonn. et Vieill.; *forficatus*, Ridgw. — États-Unis, Amérique centr. et mérid. jusqu'au Brésil.

## 1595. NAUCLERUS

*Nauclerus*, Vig. (1825); *Chelictinia*, Less. (1843); *Chelidopteryx*, Kp. (1845); *Cypselopteryx*, Kp. (1851).

10.602. RIOCOURI (Vieill.), *Gal. Ois.* I, p. 43, pl. 16; Tem., *Pl. Col.* 85; Vig., *Zool. Journ.*, 1825, p. 386; *africanus*, Sw. — Afrique N.-E. et Sénégambie.

Digitized by Google

### 1596. GAMPSONYX

*Camponyx*, Vig. (1825); *Chondrohierax*, Less.

10.603. SWAINSONI, Vig., *Zool. Journ.*, 1825, p. 69; Gray, *Gen. B.* I, p. 26, pl. 9; Forb., *Ibis*, 1881, p. 355; Ridgw., *Stud. Am. Falc.*, p. 150; *rufifrons*, Boie; *torquatus*, Less. — Brésil. Guyane, Vénézuéla, Colombie, jusqu'au Nicaragua.

### 1597. ELANUS

*Elanus*, Savig. (1809).

10.604. CÆRULEUS (Desf.), *Mém. Ac. R. des Sc.*, 1787, p. 503, pl. 15; Strickl., *Orn. Syn.*, p. 157; Dress., *B. Eur.* V, p. 665, pl. 365; Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* I, p. 41, pl. 9; *vociferus*, Lath.; *melanopterus*, Daud.; *clamosus*, Shaw; *cæsius*, Savig.; *minor*, Bp. — Europe mérid., Afrique, Inde, Ceylan, Indo-Chine W., Malacca.

10.605. HYPOLEUCUS, Gould, *P. Z. S.*, 1859, p. 127; id., *B. Asia*, pt. XII, pl.; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 62; *intermedius*, Schl., *Mus. P.-B.*, *Milvi*, p. 7; id., *Vog. Ned. Ind.*, pp. 31, 68, pl. 24, ff. 2, 3. — Philippines, Célèbes, Java, Bornéo, Sumatra.

10.606. AXILLARIS (Lath.), *Ind. Orn.*, *Suppl.* I, p. 9; Gray, *Ann. N. H.*, 1843, p. 189; Gould, *B. Austr.* I, pl. 23; Sharpe, *l. c.*, p. 338; *notatus*, Gould. — Australie.

10.607. LEUCURUS (Vieill.), *N. Dict.* XX, p. 563; Bp., *Comp. List.*, p. 4; *dispar*, Tem., *Pl. Col.* 319; Audub., *B. Am.*, pl. 351, 352. — S. des États-Unis, Amérique centr. et méridion. jusqu'au Chili et l'Argentine.

10.608. SCRIPTUS, Gould, *P. Z. S.*, 1842, p. 80; id., *B. Austr.* I, pl. 24. — Australie.

### 1598. ICTINIA

*Ictinia*, Vieill. (1816); *Nertus*, Boie (1828); *Pœcilopteryx*, Kaup (1845).

10.609. PLUMBEA (Gm.), *S. N.* I, p. 283; Tem., *Pl. Col.* 180; Vieill., *N. Dict.* XVI, p. 76; *cenchris*, Vieill., *Ois. Am. sept.*, p. 38, pl. 10bis. — Amérique centrale et mérid. jusqu'au Brésil.

10.610. MISSISSIPIENSIS (Wils.), *Am. Orn.* III, p. 80, pl. 25, f. 1; Gr., *Gen. B.* I, p. 26; *ophiophagus*, Vieill.; id., *Gal. Ois.*, p. 44, pl. 17; *plumbeus*, Audub., *B. Am.*, pl. 117 (nec Gm.) — S des États-Unis jusqu'au Guatémala.

### 1599. ROSTHRAMUS (1)

*Rosthramus*, Less. (1831); *Hamirostrum*, Sundev. (1872).

10.611. SOCIABILIS (Vieill.), *N. Dict.* XVIII, p. 318; d'Orb., — Mexique, Amérique

(1) Les auteurs ne sont pas d'accord sur la nomenclature et la synonymie de ce genre; j'ai suivi M. Gurney père; son fils réduit le tout à deux espèces : *hamatus* et *sociabilis* et il a peut-être raison (Voy. *Cat. B. of Prey*, p. 26).

Digitized by Google

*Voy. Am. mér., Ois.*, p. 73; Gurn., *Ibis*, 1879, p. 341; *hamatus*, Tem., *Pl. Col.*, texte de la pl. 61; Burm., *Th. Bras.* II, p. 46; id., *La Plata-Reise*, II, p. 435; *leucopygus*, Spix, *Av. Bras.*, p. 7, pl. 2; Schl., *Mus. P.-B.*, *Polybori*, p. 8; Sharpe, *Cat.*, p. 328. — centr. et mérid. jusqu'à l'Argentine.

2851. *Var.* PLUMBEA, Baird, Brew. et Ridgw., *Birds N. Am.* III, p. 208; Gurn., *Ibis*, 1879, p. 341; *hamatus*, Gundl.; *sociabilis* (pt.), auct. plur.; Mayn., *B. Florida*, pl. 1. — Floride, Cuba.

10.612. HAMATUS (Tem.), *Pl. Col.* 61 et peut-être 231; Baird, Brew. et Ridgw., *B. N. Am.* III, p. 209; Gurn., *Ibis*, 1879, p. 340; *sociabilis*, auct. plur. (nec Vieill.); Sharpe, *Cat.*, p. 327; *leucopygus*, Sharpe, *Hand-list*, I, p. 269. — Nord de l'Amérique mérid.

2852. *Var.* TÆNIURA, Cab., *J. f. O.*, 1854, p. 80; Sharpe, *Cat.*, p. 328; Gurn, *l. c.*, p. 340. — Amazone.

## 1600. MACHÆRHAMPHUS

*Machæramphus*, Westerm. (1848); *Machærorhamphus*, Hartl. (1854); *Stringonyx*, Gurney (1865).

10.613. ALCINUS, Westerm., *Bijd. tot de Dierk.* I, p. 29, pl. 12; Schl., *Handl. Dierk.* I, p. 168, pl. 1, f. 6; Sharpe, *Cat.*, p. 342; Salvad., *Orn. Pap.* I, p. 25. — Ténassérim S., Malacca, Bornéo, Sumatra, Nouv.-Guinée.

10.614. ANDERSSONI (Gurn.), *P. Z. S.*, 1865, p. 618; id., *Tr. Z. S.* VI, p. 117, pl. 29; Anders., *B. Damara Land*, p. 23, ff. 1-3; Sharpe, *Cat.*, p. 343; *alcinus*, Bartl. (nec West.) — Madagascar, Afrique S.-W.

10.615. REVOILI, Oust., *Bibl. Hautes études*, XXXI, art. X, p. 1 (1886). — Somaliland.

## 1601. PERNIS

*Pernis*, Cuv. (1817); *Pterochalinus*, Glog. (1842).

10.616. APIVORUS (Lin.); Dress., *B. Eur.* VI, p. 3, pl. 364-66; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* I, p. 34, pl. 8 et 8b; *polyorhynchus*, Bechst.; *lacertarius*, Pall.; *variabilis*, Koch; *tachardus*, Bonn. et V.; *communis*, Less.; *apium*, *vesparum*, *platyura*, Brm. — Europe, Asie centr. jusqu'en Chine, Afrique, Madagascar.

2853. *Var.* ORIENTALIS, Tacz., *Mém. Acad. St-Pétersb.*, 1891, p. 50; *apivorus*, Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 24. — Sibérie E., Japon.

10.617. PTILONORHYNCHUS (Tem.), *Pl. Col.* 44; Steph., *Gen. Zool.* XIII, pl. 35; Sharpe, *Cat.*, p. 347; *cristata*, Cuv.; *torquata*, *ruficollis*, *albigularis* et *maculosa*, Less.; *ellioti*, Jam.; *bharatensis*, Hodgs. — Inde, Ceylan, Indo-Chine, Malacca, Java, Sumatra, Banka.

Digitized by Google

10.618. TWEEDDALEI, Hume, *Str. Feath.*, 1881, p. 446, 1882, p. 513, pl.; *ptilorhynchus*, Tweed., *Ibis*, 1877, p. 286. — Malacca.

10.619. CELEBENSIS, Wall., *Ibis*, 1868, p. 17; Sharpe, *l. c.*, p. 349; Mey. et Wg., *B. Cel.* I, p. 65, pl. 2 et 3; *cristatus* (pt.), Schl., *Vog. Ned. Ind.*, *Valkv.*, pl. 26, f. 4; *ptilorhyncha* (pt.), Wald. — Célèbes.

## 1602. HENICOPERNIS

*Dædalion*, Bp. (1854, nec Savig., 1809); *Henicopernis*, Gray (1859).

10.620. LONGICAUDA (Garn.), *Voy. Coq. Zool.* I, p. 588, pl. 10; Sclat., *Ibis*, 1860, p. 322; Sharpe, *Cat.*, p. 341; Salvad., *Orn. Pap.* I, p. 22. — Nouv.-Guinée, Salawati, Waigiou, Mysol, Arou, Misori.

2854. *Var.* INFUSCATA, Gurn., *Ibis*, 1882, p. 128; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 505; *longicauda*, Gurn., *Ibis*, 1879, p. 469. — Nouv.-Bretagne.

## 1603. LEPTODON

*Cymindis*, Cuv. (1817, nec Latr., 1806); *Leptodon*, Sundev. (1835); *Odontriorchis*, Kaup (1844); *Regerhinus*, Kaup (1845).

10.621. CAYENNENSIS (Gm.), *S. N.* I, p. 263; *Pl. Enl.* 473; Tem., *Pl. Col.* 270 (juv.); Sharpe, *Cat.*, p. 333; *palliatus*, Tem., *Pl. Col.* 204 (juv.); *cyanopus*, Bonn. et V.; *buteonides*, Less. — Amér. centr., Guyane, Amazone, Brésil.

10.622. UNCINATUS (Tem.), *Pl. Col.* 103, 104, 105; Sharpe, *Cat.*, p. 330; *vitticaudatus*, Max.; *cuculoides*, Sw.; *pucherani*, Léot., *Ois. Trin.*, p. 40; *boliviensis*, Burm. — Amérique centr., Colombie, Vénézuéla, Guyane, Brésil, Bolivie, Ecuador.

10.623. MEGARHYNCHUS (Des M.), in *Casteln.*, *Voy. Zool. Ois.*, p. 9, pl. 1; Sharpe, *l. c.*, p. 332; Gurn., *Ibis*, 1880, p. 318. — Pérou.

10.624. WILSONI (Cass.), *Journ. Ac. Philad.* 1847, p. 21, pl. 7; Gurn., *Ibis*, 1880, p. 321; Sharpe, *l. c.*, p. 333. — Cuba.

## 1604. BAZA

*Lophotes*, Less. (1831, nec Giorna); *Baza*, Hodgs. (1836); *Avicida*, Sw. (1837); *Lepidogenys*, Gray (1839); *Hytiopus*, Hodgs. (1841); *Lophastur*, Blyth (1842).

10.625. LOPHOTES (Tem.), *Pl. Col.* 10; Gray, *List Gen. B.*, p. 4; Schl., *Mus. P.-B.*, *Milvi*, p. 4; Sharpe, *Cat.*, p. 332; *cristatus*, Bonn. et V.; *lathami*, Gr.; *indicus*, Less.; *syama*, Hodgs. — Inde, Ceylan, Indo-Chine, Malacca.

Digitized by Google

10.626. MADAGASCARIENSIS (Smith), *S. Afr. Q. Journ.*, 1835, p. 285; Schl., *P. Z. S.*, 1866, p. 420; Schl. et Pol., *Faun. Madag.*, p. 45, pl. 16; M.-Edw. et Grand., *Ois. de Madag.*, p. 68, pl. 19-21; *verreauxii*, Hartl. (nec Lafr.) — Madagascar.

10.627. CUCULOIDES (Sw.), *B. W. Afr.* I, p. 104, pl. 1; Sharpe, *Cat.* I, p. 354, pl. 11, f. 2. — Afrique W. et équator.

10.628. EMINI, Rchw., *Journ. f. Orn.*, 1894, p. 165. — Afrique équator.

10.629. VERREAUXI (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1846, p. 150; Gray, *Gen. B.* I, pl. 9, f. 2; Sharpe, *l. c.*, p. 354; *buteoides*, Lafr.; *cafer*, Sundev. — Afrique S.-E.

10.630. MAGNIROSTRIS, Gray, *Cat. Accip. Br. Mus.*, p. 19; Sharpe, *l. c.*, p. 356, pl. 10, f. 1; *crassirostris*, Kp., *Isis*, 1847, p. 359. — Philippines.

10.631. ERYTHROTHORAX, Sharpe, *P. Z. S.*, 1875, p. 623; id., *Cat. B. Br. Mus.* I, p. 357, pl. 10, f. 2; *magnirostris*, Schl., *Ned. Ind.*, *Valkv.*, pl. 28, f. 4; *celebensis*, Schl., *Mus. P.-B.*, *Rev. Accipitr.*, p. 135; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 75. — Célèbes, Banggai, Soula.

10.632. JERDONI (Blyth), *J. A. S. Beng.*, 1842, p. 464; *reinwardti* (pt.), Müll. et Schl.; *sumatrensis*, Lafr., *Rev. Zool.*, 1848, p. 210; Sharpe, *Cat. B.* I, p. 357, pl. 11, f. 1; *incognita*, Hume. — Sumatra, Malacca, Ténassérim, Birm., Himalaya E.

2855. *Var.* BORNEENSIS, Brüggem., *Abh. nat. Ver. Bremen*, 1878, p. 47; Sharpe, *Ibis*, 1893, p. 357; *reinwardti* et *magnirostris* (pt.), Schl.; *jerdoni*, Salvad., *Ucc. Born.*, p. 11 (nec Blyth). — Bornéo.

10.633. CEYLONENSIS, Legge, *Str. Feath.*, 1876, p. 247; id., *B. Ceyl.*, p. 94, pl.; Gurn., *Ibis*, 1880, pp. 462, 470. — Inde S., Ceylan.

10.634. LEUCOPAIS, Sharpe, *Ibis*, 1888, p. 195. — Palawan (Philippines).

10.635. SUBCRISTATA (Gould), *P. Z. S.*, 1857, p. 140; id., *B. Austr.* I, pl. 25; Gray, *Gen. B.* I, p. 25; Gurn., *Ibis*, 1880, p. 462. — Australie, Nouv.-Guinée S.-E.

10.636. REINWARDTI (Müll. et Schl.), *Nat. Versch. Av.*, p. 55, pl. 5; Schl., *Valk Vogels*, pp. 40, 77, pl. 27, ff. 1-3; Gr., *Gen. B.* I, p. 23; Sharpe, *Cat.* I, p. 358. — Moluques.

2856. *Var.* STENOZONA, Gray, *P. Z. S.*, 1858, p. 169, 1859, p. 153; Scl., *Ibis*, 1860, p. 322. — Iles Key, Arou, Nouv.-Guin., Salawati, Misol, Misori, Timor.

2857. *Var.* GURNEYI, Rams., *Journ. Linn. Soc.*, *Zool.*, 1881, p. 130. — Iles Salomon.

2858. *Var.* BISMARCKI, Sharpe, in *Gould's B. N. Guin.* I, pl. 4 (1888). — Archipel Bismarck, Nouv.-Guinée N.-E.

2859. *Var.* TIMORLAOENSIS, Mey., *Abhandl. Ber. Zool. Mus. Dresden*, 1892-93, n° 3, p. 5. — Ile Ténimber.



Digitized by Google

10.637. RUFA, Schl., *Vog. Ned. Ind., Valkv.*, pp. 41, 78, pl. 27, f. 4, pl. 28, ff. 1-3; Sharpe, *Cat.*, p. 360; Salvad., *Orn. Pap.* I, p. 30; *reinwardti* (pl.), auct. plur. — Ternate, Batjan, Halmahera, Tidore, Morty (Moluques).

## SUBF. XI. — FALCONINÆ

### 1605. HARPAGUS

*Harpagus*, Vig. (1824); *Bidens*, Spix (1824); *Diodon*, Less. (1831); *Diplodon*, Nitzsch (1840).

10.638. DIODON (Tem.), *Pl. Col.* 198; Vig., *Zool. Journ.*, 1825, p. 338; Burm., *Th. Bras.* II, p. 102; *femoralis*, Spix, *Av. Bras.* I, p. 15, pl. 8. — Brésil, Argentine.

10.639. BIDENTATUS (Lath.), *Ind. Orn.* I, p. 38; Tem., *Pl. Col.* 38, 228; Vig., *l. c.*; Sharpe, *l. c.*, p. 362; *rufiventer*, Spix, *l. c.*, p. 14, pl. 6; *albiventer*, Spix, *l. c.*, pl. 7; *brasiliensis*, Less.; *rufipes*, Sw. — Brésil N., Guyane, Vénézuéla, Trinidad, Colombie, Ecuador, Pérou.

10.640. FASCIATUS, Lawr., *Pr. Philad. Acad.*, 1868, p. 429; Salvin, *Ibis*, 1870, p. 115; Gurn., *Ibis*, 1881, p. 123. — Du Guatémala à Panama.

### 1606. MICROHIERAX

*Hierax*, Vig. (1824, nec Leach, 1816); *Microhierax*, Sharpe (1874).

10.641. CÆRULESCENS (Lin.); Sharpe, *Cat.*, p. 366; *bengalensis*, Blyth; *eutolmus*, Gray; Blanf., *Faun. Br. Ind., B.* III, p. 432; Gurn., *Ibis*, 1881, p. 271. — Himalaya, Indo-Chine.

10.642. FRINGILLARIUS (Drap.), *Dict. class. H. N.* VI, p. 412, pl. 5; Sharpe, *l. c.*, p. 367; Gurn., *Ibis*, 1881, p. 271; *cærulescens*, auct. plur. (nec Lin.); Horsf., *Zool. Res. Java*, pl. 35; Tem., *Pl. Col.* 97; Schl., *Mus. P.-B., Falc.*, p. 35; *malayensis*, Strickl. — Malacca, Sumatra, Java, Bornéo.

10.643. LATIFRONS, Sharpe, *Ibis*, 1879, p. 237, pl. 7; Gurn., *Ibis*, 1881, p. 274. — Bornéo N.-W., ? îles Nicobar.

10.644. MELANOLEUCUS (Blyth), *J. As. Soc. Beng.* XII, pl. 1, p. 179; Sharpe, *Cat.*, p. 368; Hume, *Str. Feath.* II, p. 525; *sinensis*, Sharpe, *Ibis*, 1875, p. 254. — Assam, Cachar, Chine S.

10.645. ERYTHROGENYS (Vig.), *P. Z. S.*, 1831, p. 96; Fras., *Zool. Typ.*, pl. 31; Sharpe, *l. c.*, p. 369; *sericeus*, Kittl., *Kupf. Vög.*, p. 4, pl. 3, f. 3; *gironnieri*, Eyd. et Soul., *Voy. Bonite, Ois.* I, p. 71, pl. 1. — Luçon (Philippines).

10.646. MERIDIONALIS, Og.-Grant, *Ibis*, 1897, p. 220. — Samar, Cebu, Mindan.

### 1607. POLIOHIERAX

*Poliohierax*, Kaup (1847).

10.647. SEMITORQUATUS (Smith), *Rep. Exp. Centr. Afr.*, — Afrique N.-E., E. et S.

Digitized by Google

p. 44; id., *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 1; Kp., *Isis*, 1847, p. 47; Sharpe, *l. c.*, p. 370; *castanonotus*, Heugl.; Scl., *Ibis*, 1861, p. 346, pl. 13.

10.648. INSIGNIS, Wald., *P. Z. S.*, 1871, p. 627; id., *Ibis*, 1872, pp. 200, 471; Tweed., in *Rowl. Orn. Misc.* III, p. 169, pl. 103. — Indo-Chine.

## 1608. SPIZIAPTERYX

*Spiziapteryx*, Kaup (1851); *Hemihierax*, Burm. (1861).

10.649. CIRCUMCINCTUS, Kaup, *P. Z. S.*, 1851, p. 43; Sharpe, *l. c.*, p. 371; Scl., *Ibis*, 1862, p. 23, pl. 2; *punctipennis*, Burm. — Argentine.

## 1609. NESIHIERAX

*Harpe*, Bp. (1855, nec Lacép., 1802); *Harpa*, Sharpe (1874, nec Lamarck, 1799); *Nesierax*, Oberh. (1899).

10.650. NOVÆ-ZEALANDIÆ (Gm.), *S. N.* I, p. 268; Schl., *l. c.*, p. 35; Sharpe, *l. c.*, p. 372; Bull., *B. N. Zeal.*, p. 1, pl. 1; Oberh., *Pr. Acad. N. Sc. Philad.*, 1899, p. 203; *australis* (pt.), H. et Jacq. — Nouv.-Zélande.

2860. *Var.* BRUNNEA (Gould), *P. Z. S.*, 1837, p. 158; Bull., *l. c.*, p. 6; *australis*, Sharpe, *l. c.*, p. 373; *ferox*, Peale; *novæ-zealandiæ*, Cass. — Nouv.-Zélande.

## 1610. DISSODECTES

*Dissodectes*, Sclat. (1864); *Cerchneis* (pt.), Sharpe (1874).

10.651. ARDESIACUS (Bonn. et V.), *Encycl. méth.* I, p. 1258; Fritsch, *Vög. Eur.*, pl. 3, f. 4; Schl., *l. c.*, p. 21; Scl., *Ibis*, 1864, p. 306; *concolor*, Tem., *Pl. Col.* 336; Sw., *B. W. Afr.* I, p. 112, pl. 3; *unicolor*, Sw. — Afrique trop.

10.652. DICKINSONI, Scl., *P. Z. S.*, 1864, pp. 248, 249; id., *Ibis*, 1864, p. 305, pl. 8; *dickersoni*, Sharpe, *l. c.*, p. 447 (*laps.*) — Zambèze, Nyasaland, Angola.

10.653. ZONIVENTRIS (Peters), *Sitz. K. Akad. Wiss. Berl.*, 1853, p. 7; Sharpe, *Cat.*, p. 447, pl. 14, f. 2; M.-Edw. et Grand., *Ois. de Madag.* I, p. 55, pl. 10; Scl., *Ibis*, 1864, p. 306. — Madagascar.

## 1611. HIERACIDEA

*Hieracidea*, Gould (1837).

10.654. BERIGORA (Vig. et Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XV, 1827, p. 184; Sharpe, *l. c.*, p. 421; *occidentalis*, Gould, *P. Z. S.*, 1844, p. 105; id., *B. Austr.* I, pl. 12. — Australie.

Digitized by Google

10.655. ORIENTALIS (Schl.), *Naum.*, 1855, p. 254; Sharpe, *l. c.*, p. 422; *berigora*, Gr. et auct. plur. (nec Vig. et H.); Gould, *B. Austr.* I, pl. 11. — Australie, Tasmanie.

2861. *Var.* NOVÆ-GUINEÆ, Mey., *J. f. O.*, 1894, p. 89. — Nouv.-Guinée E.

## 1612. TINNUNCULUS (1)

*Tinnunculus*, Vieill. (1807); *Cerchneis*, Boie (1826); *Ægypius*, Kp. (1829); *Falcula*, Hodgs. (1837); *Tichornis*, *Poecilornis*, Kp. (1844).

10.656. ALAUDARIUS (Gm.), *S. N.* I, p. 279 (ex Briss., 1760); Dubois, *Fne. ill., Ois.* I, p. 72, pl. 16; Dress., *B. Eur.* VI, p. 113, pl. 384; *tinnunculus*, Lin.; *fasciatus*, Retz.; *brunneus*, Bechst.; *murum*, *media*, etc., Brm.; *rufescens*, Sw.; *interstinctus*, M'Clel. — Europe, Asie au S. jusqu'à l'Inde, Afrique.

2862. *Var.* NEGLECTA (Schl.), *Mus. P.-B., Rev. Accip.*, p. 43. — Iles du Cap Vert.

2863. *Var.* CANARIENSIS, Kœnig, *J. f. O.*, 1889, p. 263, 1890, pl. 1. — Iles Madeire et Canaries.

2864. *Var.* JAPONICA (Tem. et Schl.), *Faun. Jap.*, p. 2, pl. 1 et 1b; Gurn., *Ibis*, 1881, pp. 456-465. — Japon, Chine N.

2865. *Var.* SATURATA, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1859, p. 277; id., *Ibis*, 1866, p. 258; *atratus*, Blyth; *interstinctus*, Gurn., *Ibis*, 1881, pp. 456-465 (nec M'Clel.) — Himalaya, Chine S., Indo-Chine, Afrique N.-E. (Montagnes).

10.657. RUPICOLUS (Daud.), *Traité*, II, p. 155; Levaill., *Ois. d'Afr.* I, p. 144, pl. 35; Sharpe, *Cat.* I, p. 429; id., *P. Z. S.*, 1874, p. 581, pl. 68; *capensis*, Shaw. — Afrique S.

10.658. MOLUCCENSIS, Hombr. et Jacq., *Voy. Pôle Sud*, *Zool.* III, p. 46, pl. 1, f. 2; Gurn., *Ibis*, 1881, p. 469; Sharpe, *l. c.*, p. 430; *tinnunculus*, Horsf. (nec Lin.) — Amboine, Bourou, Céram, Goram, Peling (Moluques).

2866. *Var.* ORIENTALIS, Mey. et Wig., *B. Celebes*, p. 79; *moluccensis* (pt.), Schl., *Vog. Ned. Ind.*, *Valke.*, pp. 6, 47, pl. 1, f. 5. — Halmahéra, Morty, Ternate, Tidore, Batjan.

2867. *Var.* OCCIDENTALIS, Mey. et Wig., *Abh. Mus. Dresd.*, 1896, n° 2, p. 8; id., *B. Cel.*, p. 79; *moluccensis* (pt.), Schl., *Valke.*, pl. 1, ff. 4, 5. — Célèbes, îles de la Sonde.

10.659. RUPICOLOIDES (Smith), *S. Afr. Q. Journ.*, 1850, p. 258; id., *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 92; Sharpe, *l. c.*, p. 432; *smithii*, Schl. — Afrique S.

2868. *Var.* ARTHURI, Gurn., *List Diurn. B. of Pr.*, p. 156. — Mombasa (Afrique E.)

10.660. FIELDI, Elliot, *Field Columb. Mus. Orn.* I, p. 58. — Somalil., Afr. E. angl.

(1) Pour la priorité du genre *Tinnunculus*, voy. Gurney, *Ibis*, 1881, p. 455.

Digitized by Google

10.661. ALOPEX, Heugl., *Syst. Uebers.*, p. 10; id., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 41; id., *Ibis*, 1861, p. 69, pl. 3; Sharpe, *l. c.*, p. 452, pl. 14, f. 1; *rupicolus*, Antin. (nec Daud.) — Afrique N.-E.

2869. *Var.* REICHENOWI, Dubois; *deserticola*, Rchw., *Orn. Monatsb.* VII, 1899, p. 190 (nec Mearns, 1892). — Togoland, Côte d'Or.

10.662. CENCHROIDES (Vig. et Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XV, p. 185; Gould, *B. Austr.* I, pl. 15; Schl., *Mus. P.-B., Falc.*, p. 29. — Australie, Tasmanie.

10.663. PUNCTATUS (Tem.), *Pl. Col.* 45; Schl. et Pol., *Faun. Madag., Ois.*, p. 35, pl. 11, f. 3; Schl., *Rev. Accip.*, p. 44. — Ile Maurice.

10.664. NEWTONI, Gurn., *Ibis*, 1863, p. 34, pl. 2; Schl. et Pol., *l. c.*, pl. 11, ff. 1, 2; *gracilis*, Hartl. (nec Less.); *punctatus* (pt.), Schl., *Mus. P.-B., Falc.*, p. 28. — Madagascar.

10.665. GRACILIS (Less.), *Traité*, p. 93; Des M., *Icon. Orn.*, pl. 25; Schl. et Pol., *l. c.*, p. 34, pl. 11, ff. 4, 5. — Seychelles.

10.666. NAUMANNI (Fleisch), in *Fisch., Jahrb. f. Forstm., Jäg. u. Jagdfr.*, 1818, pp. 173-176; Sharpe, *l. c.*, p. 455; Rchw., *Orn. Mon.*, 1898, p. 142; *xanthonyx*, Natt.; *tinnunculoides*, Tem.; *cenchris*, Naum., *Vög. Deutschl.* I, p. 318, pl. 29 (1822); Dress., *B. Eur.* VI, p. 125, pl. 385; *tinnuncularius*, Roux. — Europe S. et S.-E., Afrique, Asie S.-W.

2870. *Var.* PEKINENSIS (Swinh.), *P. Z. S.*, 1870, pp. 442, 448, 1871, p. 341; *cenchris* (pt.), auct. plur. — Himalaya, Chine.

10.667. SPARVERIUS (Lin.); Audub., *B. Am.* I, p. 94, pl. 22; Schl., *Mus. P.-B., Falc.*, p. 45; Vieill., *Ois. Am. sept.*, pl. 12, 13; *noveboracensis*, Gm. — Amérique sept. jusqu'au N. de l'Amérique mérid.

2871. *Var.* BREVIPENNIS, Berl., *J. f. O.*, 1892, p. 91. — Iles Curaçao, Bonaire, Aruba.

2872. *Var.* DESERTICOLA (Mearns), *Auk*, 1892, p. 265. — Amérique N.-W.

2873. *Var.* PENINSULARIS (Mearns), *l. c.* — Basse-Californie.

2874. *Var.* CINNAMOMINA (Swains.), *An. in Menag.*, p. 281; Sharpe, *l. c.*, p. 459; *sparverius* (pt.), auct. plur.; *australis*, Ridgw., *Pr. Phil. Acad.*, 1870, p. 149. — Amérique mérid. jusqu'au détroit de Magellan.

2875. *Var.* ÆQUATORIALIS (Mearns), *Auk*, 1892, p. 269. — Ecuador.

10.668. CARIBBÆARUM (Gm.), *S. N.* I, p. 284; Gurn., *Ibis*, 1881, pp. 547-61; Grisd., *Ibis*, 1882, p. 491. — Petites Antilles.

10.669. ISABELLINUS (Sw.), *An. in Menag.*, p. 281; *Pl. Enl.* 444; Sharpe, *l. c.*, p. 441; Gurn., *Ibis*, 1881, pp. 547, 561. — Guyane, Vénézuéla.

10.670. DOMINICENSIS (Gm.), *S. N.* I, p. 288; Ridgw., *Pr.* — Antilles, Floride.

Digitized by Google

*Phil. Acad.* 1870, p. 149; Sharpe, *l. c.*, p. 439.

10.671. SPARVERIOIDES (Vig.), *Zool. Journ.*, 1828, p. 436; d'Orb., in *Ram. de la Sagra, H. N. Cuba, Ois.*, p. 30, pl. 1; Fras., *Zool. Typ.*, pl. 30; Sharpe, *l. c.*, p. 443; *leucophrys*, Ridgw. — Cuba.

## 1613. ERYTHROPUS

*Erythropus*, Brehm (1828); *Pannyschistes*, Kaup (1829); *Cerchneis* (pt.), Sharpe.

10.672. VESPERTINUS (Lin.); Dress., *B. Eur.* VI, p. 93, pl. 382; *rufus*, Scop.; *rufipes*, Beseke; Naum., *Vög. Deutschl.* I, p. 311, pl. 28; *erythrourus*, Raf.; *rubripes*, Less.; *pallidus* et *minor*, Brm. — Europe S. et S.-E., Afrique W.

2876. *Var.* AMURENSIS, Radde, *Reis. Sibir.* II, p. 102, pl. 1; Gurn., *Ibis*, 1868, p. 41, pl. 2; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 34; Sharpe, *Cat.*, p. 445; *vespertinus* (pt.), auct. plur.; *concolor*, Gurn.; *raddei*, F. et Hartl. — Amour, Chine, Afrique E. et S.-W.

## 1614. HYPOTRIORCHIS

*Falco* (pt.), auct. plur.; *Hypotriorchis*, Boie (1826); *Æsalon*, Kaup (1829); *Dendrofalco*, Gray (1840); *Lithofalco*, Blas. (18?); *Chicquera*, Bp. (1854); *Turumtia*, Blyth (1863); *Rhynchofalco*, Ridgw. (1873); *Tolmerus*, Heine (1890).

10.673. CONCOLOR (Tem.), *Pl. Col.*, texte de la pl. 330; Gould, *B. Eur.* I, pl. 25; Dubois, *Ois. Eur.* I, p. et pl. 22; M.-Edw. et Grand., *H. Madag.*, *Ois.*, p. 37, pl. 11, 12; *schistaceus*, Hemp. et Ehr., *Symb. Phys.*, *Aves*, pl. 19; *tibialis*, Kp. — Afrique N.-E. et E., Arabie, Madagascar.

10.674. ELEONORÆ (Gené), *Rev. Zool.*, 1839, p. 105; Dress., *B. Eur.* VI, p. 105, pl. 383; Sharpe, *Cat.*, p. 404; *arcadicus*, Linderm.; *plumbeus*, Brm.; *dichrous*, Erh.; *radama*, Roch et Newt. — Europe mérid., Palestine, Afrique N.-E., Madagascar.

10.675. SUBBUTEO (Lin.); Dress., *B. Eur.* VI, p. 69, pl. 379; Dubois, *Fne. Ill. Vert. Belg.*, *Ois.* I, p. 63, pl. 14; *barletta*, Daud.; *hirundinum* et *arboreus*, Brm. — Europe et Asie jusqu'au 63° l. N., Afrique.

2877. *Var.* GRACILIS, Brm., *Vogelf.*, 1855, p. 27; Erl., *J. f. O.*, 1898, p. 461, pl. 10; *horus*, Heugl., *Ibis*, 1860, p. 409; *subbuteo* (pt.), auct. plur. — Afrique N.

10.676. CUVIERI (Smith), *S. Afr. Q. Journ.*, 1850, p. 592; Sharpe, *Cat.*, p. 400; *boschii*, Schl., *Nederl. Tijdschr.*, 1861, p. 125, pl. 5; id., *Mus. P.-B.*, *Falc.*, p. 23. — Afrique S. et W.

2878. *Var.* FASCHINUCHA (Rchw. et Neum.), *Orn. Monatsb.*, 1895, p. 114, 1899, pl. 1. — Afrique E.

Digitized by Google

10.677. SEVERUS (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, 1822, p. 135; Schl., *Vog. Ned. Ind.*, *Valkv.*, pp. 4, 45, pl. 2, ff. 2, 3; *aldrovandi*, Tem., *Pl. Col.* 128; *rufipedioides*, Hodgs.; *guttata*, Gray. — Himal., Bengal, Ceylan, Birm., Malacca, Philipp., îles de la Sonde, Célèbes, Ternate, Halmah., Céram, Salawati, Jobi, Nouv.-Guinée S., Nouv.-Bretagne.

2879. *Var.* PAPUANA (Mey. et Wg.), *Abh. Mus. Dresd.*, 1893, n° 3, p. 6; id., *B. Cel.*, p. 84. — Nouv.-Guinée.

2880. *Var.* INDICA (Mey. et Wg.), *B. Cel.*, p. 84. — Inde.

10.678. RELIGIOSUS (Sharpe), *Cat.* I, p. 397; Gurn., *List Diurn. B. of Prey*, p. 102; *frontatus*, Schl. (nec Gould), *Vog. Ned. Ind.*, *Valkv.*, pl. 2, ff. 3, 6 (nec f. 4). — Céram, Halmahera.

10.679. LUNULATUS (Lath.), *Ind. Orn.*, *Suppl.* II, p. 13; Wal., *Ibis*, 1868, p. 5; *longipennis*, Sw.; *frontatus*, Gould; id., *B. Austr.* I, pl. 10. — Australie, Tasmanie.

10.680. FUSCO-CÆRULESCENS (Vieill.), *N. Dict.* XI, p. 90; Sharpe, *Cat.*, p. 400; *thoracicus*, Licht.; *femoralis*, Tem., *Pl. Col.* 121, 343; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 5; *aurantius*, Heerm. — Texas S., Amérique centr. et mérid.

2881. *Var.* OPHRYOPHANES, Salvad., *Boll. Musei Torino*, X, n° 208, p. 20 (1895). — Colonia (Paraguay).

10.681. RUFIGULARIS (Daud.), *Traité*, II, p. 131; Gr., *Gen. B.* I, p. 20; Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 5, 397; *albigularis*, Daud.; ? *aurantius*, Lath.; Elliot, *B. N. Am.* II, pl. 32; Schl., *Rev. Acc.*, p. 40; *thoracicus*, Don.; *cucullatus*, Sw.; *aurantiacus*, Kp.; *hæmorrhoidalis*, Hahn et Kust. — Amérique centr. et mérid.

10.682. DEIROLEUCUS (Tem.), *Pl. Col.* 348; Schl., *Mus. P.-B.*, *Falc.*, p. 24; Pelz., *l. c.*, p. 397; ? *aurantius*, Gm.; Sharpe, *Cat.*, p. 402. — Du Guatémala au Brésil et Pérou.

10.683. CHICQUERA (Daud.), *Traité*, II, p. 121; Gould, *Cent. B. Him.*, pl. 2; Schl., *l. c.*, p. 20; *typus*, Bp.; Gurn., *List Diurn. B. of Prey*, p. 105. — Inde.

10.684. RUFICOLLIS (Swains.), *B. W.-Afr.* I, p. 107, pl. 2; Sharpe, *l. c.*, p. 404; *macrodactylus*, Sw.; *chicquera*, Heugl. (nec Daud.) — Afrique trop.

10.685. ÆSALON (Tunst. ex Briss.), *Orn. Brit.*, p. 1 (1771); Dress., *B. Eur.* VI, p. 83, pl. 380, 381; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* I, p. 67, pl. 15; *regulus*, Pall.; *lithofalco* et *falconiarum*, Gm.; *smirilus*, Savig.; *sibiricus*, Shaw; *cæsius*, Mey.; *orientalis*, Brm.; *alaudarius*, Severtz.; *merillus*, Sharpe (1899). — Europe et Asie jusqu'au 72° l. N., Afrique N.

2882. *Var.* PALLIDA, Sushk., *Bull. Br. Orn. Club*, XI, p. 5. — Steppes des Kirghiz.

Digitized by Google

10.686. COLUMBARIUS (Lin.); Audub., *B. Am.* I, p. 88, pl. 21; Schl., *l. c.*, p. 19; Vieill., *Ois. Am. sept.* I, p. 39, pl. 11; *obscurus*, Gm.; *intermixtus*, Daud.; *temerarius*, Audub.; *auduboni*, Blackw. — Amérique sept., Antilles, N. de l'Amérique mérid.

2883. *Var.* SUCKLEYI (Ridgw.), *Bull. Essex Inst.* V, p. 201 (1873); Baird, Brew. et Rid., *Land B. of N. Am.* III, p. 147. — Amérique N.-W. (De Sitka à la Californie).

2884. *Var.* RICHARDSONI, Ridgw., *Pr. Phil. Acad.*, 1870, p. 147; B., Br. et Rid., *l. c.*, p. 148; Bish., *N. Am. Fauna*, XIX, 1900, p. 75; *æsalon*, Sw. et Rich., *Faun. Bor.-Am.*, pt. 2, p. 37, pl. 25 (fem.) — Intérieur de l'Amérique du N. jusqu'au Texas et l'Arizona.

## 1615. FALCO

*Falco*, Lin. (1766); *Gennaia*, Kaup (1847); *Gennadas*, Heine (1890).

10.687. PEREGRINATOR, Sundev., *Physiogr. Tidsskr. Lund.* 1857, p. 177; Gould, *B. of Asia*, pt. III, pl.; Sharpe, *l. c.*, p. 382; *shaheen*, Jerd., *Ill. Ind. Orn.*, pl. 12, 28; *sultaneus*, Hodgs.; *ruber*, Schl., *l. c.*, p. 5. — Inde.

2885. *Var.* ATRICEPS, Hume, *Ibis*, 1869, p. 356; Gurn., *Ibis*, 1882, p. 291, pl. 10. — Inde N. et N.-W.

10.688. PEREGRINUS, Tunst., *Orn. Brit.*, p. 1 (1771, ex Briss.); Dress., *B. Eur.* VI, p. 31, pl. 372; *orientalis, hornotinus, communis*, Gm. (1788); Dubois, *Fne. Ill., Ois.* I, p. 59, pl. 13; *calidus*, Lath.; *lunulatus*, Daud. (nec Lath.); *abietinus*, Bechst.; *pinetarius*, Shaw; *gentilis*, Wils.; *cornicum, griseiventris, leucogenys*, Brm.; *anatum*, Bp.; *micrurus*, Hodgs.; *peregrinoides*, Vian. — Europe, Asie, Amérique sept., Afrique.

2886. *Var.* PEALEI, Ridgw., *Bull. Essex Inst.*, 1873, p. 201; Bd., Br. et Rid., *Land B. N. Am.* III, p. 137; *polyagrus*, Cass., *B. Calif.*, pl. 16 (fig. d'arrière). — Amérique N.-W. jusqu'à l'Orégon, îles Aléoutes et du Commandeur.

2887. *Var.* CASSINI, Sharpe, *Ann. N. H.* XI, 1873, p. 233; id., *Cat.*, p. 384; ?*nigriceps*, Cass., *U. S. Astr. Exped.*, 1855, p. 176, pl. 14. — Chili, Malouines.

10.689. MELANOGENYS, Gould, *P. Z. S.*, 1837, p. 159; id., *B. Austr.* I, pl. 8; Sharpe, *l. c.*, p. 385; *peregrinus*, Vig. et Horsf. (nec auct.); *macropus*, Sw.; *communis* (pt.), Schl., *Valk Vog.*, pl. 1, f. 2. — Australie.

2888. *Var.* ERNESTI, Sharpe, *Ibis*, 1894, p. 545; Gurn., *Cat. B. of Prey*, p. 29; *melanogenys* (pt.), Sharpe, *Cat.*, p. 386. — Java, Bornéo, Sumatra, Philippines, Nouv.-Guinée, îles Fidji.

Digitized by Google

10.690. MINOR, Bonap., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1850, p. 484; Sharpe, *Cat.*, p. 383, pl. 12; Gurn., *Ibis*, 1882, p. 306; Dress., *B. Eur.* VI, p. 43, pl. 373; *peregrinoides*, Sm. (nec Tem.); *radama*, Bp.; *var. capensis*, Grill. — Afrique N.-E., E. et S.

2889. *Var.* PUNICA, Levaill. jun., *Expl. de l'Algérie, Ois.*, pl. 1 (*punicus*); Gurn., *Ibis*, 1882, p. 307; *brookei*, Sharpe, *Ann. Mag. N. H.* XI, 1873, pp. 20, 222; *barbarus* (pt.), Shpe, *Cat.*, p. 386. — Europe S., Afrique N.

10.691. BARBARUS (Lin.); Schl., *Mus. P.-B., Falc.*, p. 5; Salv., *Ibis*. 1859, pl. 6; Dress., *B. Eur.* VI, p. 47, pl. 374; *peregrinoides*, Tem., *Pl. Col.* 479; *F. lanarius alphanet*, Schl. — Afrique N. et N.-E., Sénégambie, Europe S., Asie S.-W., Inde N.-W.

10.692. BABYLONICUS, Gurn., *Ibis*, 1861, p. 218, pl. 7; Gould, *B. Asia*, pt. XX, pl.; Anders., *P. Z. S.*, 1876, pl. 23; Sharpe, *Cat.*, p. 387; *peregrinoides*, Hodgs.; *tscherniaievi*, Severtz. — Mésopotamie, Asie centr. jusqu'au N.-W. de l'Inde.

10.693. FELDEGGII, Schl., *Abhandl. Geb. Zool.*, p. 3, pl. 10, 11 (1841); Sharpe, *l. c.*, p. 389; *lanarius*, Schl., *Crit. Uebers.*, p. 2; Jaub. et Lap., *Rich. Orn.*, p. 54, pl. 5; *rubens*, Thien.; *peregrinoides*, Fritsch (nec Tem.); *biarmicus*, Tayl. (nec Tem.); *tanypterus*, König-Warth.; *lanarius græcus*, Schl. — Afrique N. et N.-E., Europe S., Asie Mineure jusqu'en Perse.

2890. *Var.* TANYPTERA, Schl., *Abh. Geb. Zool.*, p. 8, pl. 12, 13; *biarmicus*, Rüpp., *Neue Wirb.*, p. 44 (nec Tem.); *cervicalis*, Horsf. et M.; *lanarius nubicus*, Schl., *Mus. P.-B., Falc.*, p. 15. — De la Sénégambie jusque dans le N.-E. de l'Afrique.

10.694. BIARMICUS, Tem., *Pl. Col.* 324; Sharpe, *Lay. B. S. Afr.*, p. 58, pl. 2; *chicqueroides*, Smith; *lanarius cervicalis* et *lanarius capensis*, Schl. — Afrique S.

10.695. JUGGUR, Gray, *Ill. Ind. Orn.* II, pl. 26; Schleg., *Abh. Geb. Zool.*, p. 13, pl. 15; Sharpe, *Cat.*, p. 393; *thermophilus*, Hodgs.; *cherrug*, Blyth (nec Gray). — Beloutchistan, Afghanistan, Inde, Assam.

10.696. HYPOLEUCUS, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 162; id., *B. Austr.* I, pl. 7; Sharpe, *l. c.*, p. 394; Gurn., *Ibis*, 1882, p. 451. — Australie.

10.697. SUBNIGER, Gray, *Ann. N. H.*, 1843, p. 371; id., *Gen. B.* I, pl. 8; Gould, *B. Austr.* I, pl. 9. — Australie.

## 1616. HIEROFALCO

*Hierofalco*, Cuv. (1817); *Pnigohierax*, Cab. (1872).

10.698. SACER (Gm. ex Briss.), *S. N.* I, p. 273; Schl., *l. c.*, p. 16; Dress., *B. Eur.* VI, p. 59, pl. 376, 377; — Europe S.-E., Asie centr. jusqu'en Chine



Digitized by Google

*lanarius*, Pall.; Gould, *B. Eur.* I, pl. 20; *cherrug*, Gray, *Ill. Ind. Orn.*, pl. 25; *cyanopus*, Thien.; *saker*, Sharpe, *Cat.*, p. 417; *gurneyi*, Menzb., *Orn. Turkest.*, p. 283. — et le N.-W. de l'Inde.

2891. *Var.* MILVIPES (Hodgs.), in *Gr. Zool. Misc.*, p. 81; Jerd., *Ibis*, 1871, p. 240; Gurn., *Ibis*, 1882, p. 445; Blanf., *Faun. Brit. Ind.*, *B.* III, p. 421; *hendersoni*, Hume, *Ibis*, 1871, p. 407; id. et Hend., *Lahore to Yark.*, p. 171, pl. 1; Menzb., *Orn. Turk.*, pl. 6; *saker* (pt.), Sharpe, *Cat.*, 417. — Thibet, Mongolie, Népaul, Beloutchistan, Turkestan.

2892. *Var.* LORENZI, Menzb., *Bull. Br. Orn. Club*, XI, p. 3 (1900-1901). — Sibérie centrale.

10.699. MEXICANUS (Schl.), *Abhandl. Geb. Zool.*, p. 15; id., *Mus. P.-B.*, *Falc.*, p. 18; Sharpe, *l. c.*, p. 420; *polyagrus*, Cass., *B. Calif.*, p. 88, pl. 16. — États-Unis W., Mexique.

10.700. CANDICANS (Gm.), *S. N.* I, p. 275; Schl., *l. c.*, p. 7; Sharpe, *P. Z. S.*, 1873, p. 417, pl. 39; Dress., *B. Eur.* VI, p. 21, pl. 368, 369; *islandus*, Brün. (pt., nec Gm.); *rusticolus* (pt.), Mohr; *islandus albus* et *maculatus*, Gm.; *groenlandicus*, Turt. (nec Daud.); *uralensis*, Menzb. — Groenland, Amérique N.-E. (arctique), Europe N.-W.

10.701. RUSTICOLUS (Lin.); Stejn., *Auk*, 1885, p. 187; *islandus* (pt.), Brün.; *islandus fuscus*, Müll.; *groenlandicus*, Daud.; *arcticus*, Holb. — Amérique arctique.

2893. *Var.* GYRFALCO (Lin.); Dress., *B. Eur.* VI, p. 15, pl. 367; Schl., *Voy. Nederl.*, pl. 4, 5; *norwegicus*, Tristr.; Schl., *Mus. P.-B.*, *Falc.*, p. 12. — N. de l'Europe, accidentellement l'Europe centrale.

2894. *Var.* OBSOLETA (Gm.); Stejn., *Auk*, 1887, p. 187; *labradora*, Audub., *B. Am.*, pl. 196; *labradorus*, Dress., *Rowl. Orn. Misc.* I, p. 185, pl. ; Gurn., *Ibis*, 1882, pp. 579-81. — Labrador, baie d'Hudson, Canada.

2895. ?*Var.* HOLBOELLI, Sharpe, *P. Z. S.*, 1873, p. 415; id., *Cat. B.* I, p. 415, pl. 13; *groenlandicus*, Schl. (pt.); *arcticus*, auct. plur. (nec Gm.); *islandus* (pt.) et *rusticolus* (pt.), Stejn., *Auk*, 1885, pp. 187, 188. — Groenland S.

2896. *Var.* ALTAICA, Menzb., *Orn. Turk.*, p. 272. — Mts Altaï, Turkestan.

10.702. ISLANDUS (Gm.), *S. N.* I, p. 271 et auct. plur. (nec Brünn); Gould, *B. Gt. Br.*, pt. XII, pl.; *islandicus*, Hanc.; Schl., *l. c.* — Islande.

Digitized by Google

## FAM. V. — PANDIONIDÆ

### 1617. PANDION

*Pandion*, Sivig. (1809); *Triorches*, Leach (1816); *Balbuzardus*, Flem. (1828).

10.703. HALIAËTUS (Lin.); Dress., *B. Eur.* VI, p. 139, pl. 386, 387; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* I, p. 8, pl. 2; *arundinaceus*, Gm.; *fluvialis*, Savig.; *balbuzardus*, Dumt.; *alticeps*, *planiceps*, Brm.; *indicus*, Hodgs.; *albigularis*, *minor*, *fasciatus*, Brm. — Europe et Asie jusqu'au 68° l. N., Afrique.

2897. *Var.* CAROLINENSIS (Gm.), *S. N.* I, p. 263; Audub., *B. N. Am.*, pl. 81; Bd., Brew. et Rid., *B. N. Am.* III, p. 182; *cayennensis*, Gm.; *piscatrix* et *americana*, Vieill., *Ois. Am. sept.* I, pp. 29, 31, pl. 4. — Amérique du 65° l. N. au 18° l. S.

2898. *Var.* LEUCOCEPHALA, Gould, *Syn. B. Austr.* III, pl. 6; id., *B. Austr.* I, pl. 6; Schl., *Vog. Ned. Ind.*, pp. 12, 52, pl. 3, f. 3; *gouldi*, Kp. — Australie, Océanie, Malacca.

### 1618. POLIOAËTUS

*Ichthyaëtus*, Lafr. (1839 sans indication du type); *Polioaëtus*, Kaup (1850).

10.704. ICHTHYAETUS (Hors.), *Tr. Linn. Soc.*, 1822, p. 136; id., *Zool. Res. Java*, pl. 34; Schl., *Vog. Ned. Ind.*, pp. 13, 62, pl. 5, ff. 1, 2; *unicolor*, Gray, *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 19; *plumbeus*, Hodgs.; *bicolor*, Gray; *horsfieldi*, Blyth; *hucarius*, Hodgs. — Inde, Ceylan, Indo-Chine, Malacca, grandes îles de la Sonde, Célèbes, Philippines.

10.705. HUMILIS (Müll. et Schl.), *Verh. Nat. Ges. Natuurk. Comm., Aves*, 1839-44, p. 47, pl. 6; Sharpe, *Cat.*, p. 434; *nanus*, Blyth; *plumbeus humilis*, Mey, et Wg., *Abh. Mus. Dresd.*, 1896, n° 2, p. 7. — Cachar, Birmanie, Malacca, Bornéo, Célèbes, Peling.

2899. *Var.* MAJOR, Mey. et Wg., *B. Celebes*, p. 44. — Rég. subhimalayenne, de l'Afgh. à l'Assam.

## FAM. VI. — ASIONIDÆ (1)

### SUBF. I. — ASIONINÆ

### 1619. ASIO

*Asio*, Briss. (1760); *Otus*, Cuv. (1799); *Nyctalops*, Wagl. (1832); *Brachyotus*, Gould (1837); *Phasmoptynx*, Kp. (1848); *Rhinoptynx*, Kp. (1852); *Nisuella*, (pt.), Bp. (1854).

10.706. OTUS (Lin.); Dress., *B. Eur.* V, p. 251, pl. 303; — Europe et Asie jus-

(1) Voy.: Sharpe, *Catalogue Birds Brit. Mus.* II (1875).

Digitized by Google

Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* I, p. 128, pl. 29; *albicollis*, *italicus*, Daud.; *O. asio*, Leach; *europæus*, Steph.; *vulgaris*, Flem.; *communis*, Less.; *aurita*, Ren.; *sylvestris*, *arboreus*, *gracilis*, *major*, *minor*, *assimilis*, Brm.; *verus*, Finsch. — qu'au 64° l. N., et l'Himalaya au S., Japon, Afrique N.

2900. *Var.* Canariensis, Madar., *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 54. — Canaries.

2901. *Var.* Wilsoniana (Less.), *Traité*, p. 110; Baird, *B. N. Am.*, p. 55; *otus*, Wils. (nec Lin.); Audub., *B. Am.*, pl. 385; *americanus*, Steph.; *zonurus*, Kp.; *peregrinator*, Strickl. — Amérique sept. tempérée jusqu'au plateau Mexicain.

10.707. clamator, Vieill., *Ois. Am. sept.*, p. 52, pl. 20; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.*, *Aves*, II, p. 5; *mexicana*, Gm.; Sharpe, *Cat.* II, p. 231; *maculata*, Vieill.; *longirostris*, Spix; *americanus*, Burm., *Th. Bras.* II, p. 123. — Amérique mérid., du Brésil à Panama.

2902. *Var.* Midas (Licht.), *Nomencl. Av.*, p. 6; Schleg., *Mus. P.-B.*, *Oti*, p. 2. — Brésil S., E., Argentine.

10.708. madagascariensis (Smith), *S. Afr. Q. Journ.* II, p. 316; Puch., *Arch. du Mus.* IV, p. 328, pl. 23; M.-Edw. et Grand., *H. Madag.*, *Ois.*, pl. 38. — Madagascar.

10.709. accipitrinus (Pall.), *Reise Russ. Reichs*, I, p. 455; Dress., *B. Eur.* V, p. 257, pl. 304; Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* I, p. 131, pl. 30; *minor*, Gm.; *brachyotus*, Forst.; *arctica*, Sparrm.; *palustris*, Bechst.; *tripennis*, Schr.; *caspia*, Shaw; *ægolius*, Pall.; *microcephalus*, Leach; *brachyura*, Nilss.; *sandwichensis*, Bloxh.; *ulula*, Less.; *palustris*, *agrarius*, *leucopsis*, Brm.; *breviarius*, Licht.; *cassinii*, Brew.; *gmelini*, Malm.; *meilhennyi*, Stone. — Cosmopolite.

2903. *Var.* Portoricensis, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.* IV, 1882, p. 366. — Porto-Rico.

2904. *Var.* Galapagoensis (Gould), *P. Z. S.*, 1837, p. 10; Darw., *Voy. Beagl.*, *B.* III, p. 32, pl. 3; *accipitrinus* (pt.), Sharpe. — Iles Galapagos.

10.710. capensis (Smith), *S.-Afr. Q. Journ.* II, 1835, p. 316; id., *Zool. S. Afr.*, pl. 67; Dress., *B. Eur.* V, p. 265, pl. 305; *nisuella*, Daud. (teste Rchw.) — Afrique, Espagne S.

2905. *Var.* Major (Schl.), *Mus. P.-B.*, *Rev. Accip.*, p. 5; M.-Edw. et Grand., *H. Madag.*, *Ois.*, pl. 37. — Madagascar.

10.711. butleri, Hume, *Str. Feath.* VII, p. 316, VIII, p. 416. — Mékran, Sinaï.

10.712. stygius (Wagl.), *Isis*, 1832, p. 1221; Sharpe, *l. c.*, p. 241; *siguapa*, d'Orb., in *Ram. de la Sagra*, — Amérique trop., Cuba.

Digitized by Google

*H. N. Cuba*, p. 31, pl. 2; *melanopsis*, Licht.

10.713. ? MACRURUS (Kaup), *Tr. Z. S.* IV, p. 252; Sharpe, *Cat.* II, p. 242. — Mexique.

### 1620. PSEUDOSCOPS

*Pseudoscops*, Kaup (1848).

10.714. GRAMMICUS (Gosse), *B. Jamaica*, p. 19, pl. 4; Kp., *Isis*, 1848, p. 769; Sharpe, *Cat.* II, p. 242. — Jamaïque.

## SUBF. II. — KETUPINÆ

### 1621. KETUPA

*Ketupa*, Less. (1831); *Cultrunguis*, Hodgs. (1836); *Smilonyx*, Sundev. (1872).

10.715. CEYLONENSIS (Gm.), *S. N.* I, p. 287; Gr., *Gen. B.* I, p. 38; Schl., *Mus. P.-B., Oti*, p. 19; Sharpe, *l. c.*, p. 4; *leschenaulti*, Tem., *Pl. Col.* 20; *hardwickii*, Gray, *Ill. Ind. Zool.* II, pl. 31; *dumeticola*, Tick.; *nigripes*, Hodgs. — Palestine, Inde, Ceylan, Indo-Chine, Chine S.

10.716. FLAVIPES (Hodgs.), *J. A. S. B.* V, p. 364; Gr., *Gen. B.* I, p. 38; Sharpe, *l. c.*, p. 5; *magnifica*, Swinh., *Ibis*, 1873, p. 127. — Himalaya, Chine.

10.717. JAVANENSIS, Less., *Traité d'Orn.*, p. 114; Schl., *l. c.*, p. 18; *ketupa*, Horsf.; *ceylonensis*, Tem., *Pl. Col.* 74 (nec Gm.) — Ténassérim, Malacca, Java, Sum., Bornéo.

10.718. MINOR, Büttik., *Notes Leyd. Mus.* XVIII, 1896, p. 165. — Ile Nias.

### 1622. SCOTOPELIA

*Scotopelia*, Bp. (1850); *Megapelia*, Kaup (1851); *Scotoglaux*, Heine (1860).

10.719. PELI, Bonap., *Consp.* I, p. 44; Gurn., *Ibis*, 1859, p. 445, pl. 15; Feh. et Hartl., *Vög. Ost-Afr.*, p. 100; Sharpe, *l. c.*, p. 10; *typica*, Bp. — De Sénégambie au Gabon et Afrique S.-E.

10.720. USSHERI, Sharpe, *Ibis*, 1871, pp. 101, 417, pl. 12; id., *Cat.* II, p. 11. — Côte d'Or.

2906. *Var.* OUSTALETI, Rochebr., *Bull. Soc. Philom.* VII, 1883, p. 165. — Sénégambie.

10.721. BOUVIERI, Sharpe, *Ibis*, 1875, p. 261; id., *Cat.* II, p. 11, pl. 1. — Gabon.

Digitized by Google

## SUBF. III. — BUBONINÆ

### 1632. BUBO

*Bubotus*, Rafin. (1815, teste Gray); *Bubo*, Cuv. (1817); *Ascalaphia*, Geof. St.-Hil. (1830); *Heliaptex*, Sw. (1837); *Urrua*, Hodgs. (1837); *Mesomorpha*, Hodgs. (1841); *Aibryas*, *Nyctaetus*, Glog. (1842); *Megaptynx*, *Pachyptynx*, *Nisuella* (pt.), Bp. (1854).

10.722. IGNAVUS, Forst., *Syn. Cat. Brit. B.*, p. 3; Dress., *B. Eur.* V, p. 359, pl. 315; Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* I, p. 124, pl. 28; *Str. bubo*, Lin.; *microcephalus*, Steph.; *maximus*, Flem.; *europæus*, Less.; *germanicus*, *septentrionalis*, *grandis*, *melanotus*, Brm.; *atheniensis*, Bp. — Europe.

2907. *Var.* SIBIRICA, Licht., *Nomencl. Av.*, p. 7; Menzb., *Ibis*, 1885, p. 262; Dub., *Ois. Eur.* I, p. et pl. 29[a]; *turcomanus* (pt.), auct. plur. (nec Eversm.); *scandiacus*, Cab.; *pallidus*, Brm. — Sibérie N.-W., Baskiria.

2908. *Var.* TURCOMANA (Eversm.), *Add. Pall. Zoogr.*, p. 3; Sharpe, *Cat.* II, p. 17 (pt.); Menzb., *Ibis*, 1885, p. 262; *cinereus*, Gray, *Gen. B.* I, pl. 15; *hemachalana*, Hume; *maximus* (pt.), Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 39. — Sibérie S.-W. au N. jusqu'au 54°, Turkestan, Pamir, Thibet, Himalaya, Chine.

10.723. ASCALAPHUS, Savig., *Descr. Égypte*, p. 295, pl. 3, f. 2; Gould, *Ois. Eur.* I, pl. 37; Tem., *Pl. Col.* 57; *savignyi*, Géoff.; *ascalaphus barbarus* et *desertorum*, Erlang., *Orn. Monatsb.*, 1897, p. 192; id., *J. f. O.*, 1898, pl[s] 12 et 13. — Afrique N. et N.-E.

10.724. BENGALENSIS (Frankl.), *P. Z. S.*, 1831, p. 115; Gould, *Cent. B. Himal.*, pl. 3; Schl., *l. c.*, p. 8; *cavearia*, Hodgs. — Inde.

10.725. CAPENSIS, Smith, *S. Afr. Q. Journ.* II, 1, p. 317; id., *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 70; *dilloni*, Prév. et Des M.; id., in *Lef.*, *Voy. Abyss. Zool.*, p. 73, pl. 3; *ascalabotes*, Licht. — Afrique S.

10.726. MACKINDERI, Sharpe, *Ibis*, 1900, p. 564; id., *P. Z. S.*, 1900, pl. 45. — M[t] Kenia (Afrique E.)

10.727. ABYSSINICUS (Guér.-Men.), *Rev. Zool.*, 1843, p. 321; id. et Lafr., *Voy. Abyss.* III, *Ois.*, p. 185, pl. 3; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 107; Gurn., *Ibis*, 1890, p. 262; *montanus*, Heugl. — Abyssinie, Choa, Somaliland.

2909. *Var.* MILESI, Sharpe, *Ibis*, 1886, p. 165, pl. 7. — Arabie S.-E.

10.728. MACULOSUS (Vieill.), *N. Dict.* VII, p. 44; id., *Gal. Ois.* I, pl. 23[bis]; Bp., *Consp.* I, p. 49; ? *nisuella*, Daud.; *africana*, Tem., *Pl. Col.* 50. — Afrique S. jusqu'au 12° l. S. environ.

10.729. LETTII, Buttik., *Notes Leyd. Mus.* XI, pp. 34, 115, pl. 6. — Libéria (Afrique W.)

Digitized by Google

10.730. MAGELLANICUS (Gm.), *S. N.* I, p. 286; *Pl. Enl.* 385; Sharpe, *Cat.* II, p. 29; *nacurutu*, Vieill.; *crassirostris*, Burm., *Th. Bras.* II, p. 121; *virginianus*, Scl. et Salv. (pt.). — S. de l'Amérique mérid. jusqu'au 14° l. S. environ.

10.731. VIRGINIANUS (Gm.), *S. N.* I, p. 287; Wils., *Am. Orn.* VI, p. 52, pl. 50, f. 1; Audub., *B. N. Am.* I, p. 143, pl. 39; *wapacuthu*, Gm.; *maximus*, Bartr.; *ludovicianus*, Daud.; *pinicola*, Vieill., *Ois. Am. sept.*, pl. 19; *crassirostris*, V.; *macrorhyncha*. Tem., *Pl. Col.* 62; *atlanticus*, Cass. — Amérique N.-E., Amérique centr. jusqu'au Costa-Rica.

2910. *Var.* PALLESCENS, Stone, *Amer. Nat.*, 1897, p. 275; *subarcticus*, *A. O. U. Check-l.*, p. 148 (1895, nec Hoy); *occidentalis*, Stone. — États-Unis W., Colombie angl., Manitoba.

2911. *Var.* MAYENSIS, Nels., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1901, p. 170. — Yucatan.

2912. *Var.* ARCTICA, Sw., *Faun. Bor.-Am.*, p. 86, pl. 30 (*arcticus*); *subarcticus*, Hoy, *Pr. Ac. N. Sc. Phil.* VI, p. 211; Allen, *Auk*, 1898, p. 71; *virginianus* (pt.), Sharpe. — Amérique arctique, États-Unis N.-W.

2913. *Var.* SATURATA, Ridgw., *Man. N. Am. B.*, 1896, p. 263 (*saturatus*). — Du Labrad. à l'Alaska, Californie S.

2914. *Var.* PACIFICA, Cass., *B. N. Am.*, p. 49; Ridgw., *B. N. Am.* III, p. 65; *virginianus* (pt.), Shpe. — Amérique N.-W.

2915. *Var.* NIGRESCENS, Berl. et Tacz., *P. Z. S.*, 1884, p. 309. — Ecuador.

10.732. COROMANDUS (Lath.), *Ind. Orn.* I, p. 53; Sharpe, *l. c.*, p. 35; *umbrata*, Blyth; *sinensis*, Heude. — Inde, Chine.

10.733. CINERASCENS, Guér.-Men., *Rev. Zool.*, 1843, p. 321; Des M., in *Lefeb.*, *Voy. Abyss.*, *Zool.*, p. 74, pl. 4; Gurn., *Ibis*, 1868, p. 149; *africanus*, Rüpp. (nec Tem.); *maculosus*, Horsf. et Moore (nec V.); Fch. et Hartl., *Vög. Ostafr.*, p. 105; *melanotus* et *selenotis*, Heugl. — Afrique N.-E. et W.

10.734. LACTEUS (Tem.), *Pl. Col.* 4; Schl., *Mus. P.-B.*, *Oti*, p. 11; Sharpe, *l. c.*, p. 33; *sultaneus*, Less. — Afrique S.

2916. *Var.* VERREAUXI, Bonap., *Consp.* I, p. 49; Buckl., *Ibis*, 1874, p. 362; Gurn., in *Anders. B. Dam.*, p. 41; *lacteus* (pt.), Sharpe. — Afrique N.-E., Niger.

## 1624. HUHUA

*Huhua*, Hodgs. (1836); *Etoglaux*, Hodgs. (1841); *Ptiloskelos*, Tick. (1859).

10.735. ORIENTALIS (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 140; Schl., *Mus. P.-B.*, *Oti*, p. 12; Sharpe, *Cat.* II, p. 39; *sumatrana*, Raffl.; *strepitans*, Tem., *Pl. Col.* 174, 229. — Ténassérim S., Malacca, Java, Sumatra, Bornéo.

Digitized by Google

2917. *Var.* MINOR (Schl.), *Mus. P.-B., Oti*, p. 13; id., *Rev. Accip.*, p. 5. — Bangka.

10.736. SHELLEYI, Sharpe et Uss., *Ibis*, 1872, p. 182; Sharpe, *Cat.* II, p. 37, pl. 2. — Côte d'Or (Afr. W.)

10.737. POENSIS (Fras.), *P. Z. S.*, 1853, p. 13; Sharpe, *Ibis*, 1869, p. 194, pl. 4; *fasciolatus*, Hartl., *J. f. O.*, 1855, p. 354; Sclat., *P. Z. S.*, 1863, p. 376, pl. 33. — De la Côte d'Or au Gabon.

10.738. LEUCOSTICTA (Hartl.), *J. f. O.*, 1855, p. 354; id., *Orn. W. Afr.*, p. 18; Schl., *l. c.*, p. 16; Sharpe, *Cat.* II, p. 41. — De la Côte d'Or au Gabon.

10.739. NIPALENSIS (Hodgs.), *As. Res.* XIX, p. 172; id., *J. A. S. B.* VI, p. 362; Sharpe, *l. c.*, p. 37; *pectoralis*, Jerd., *Madr. Journ.* X, p. 89, pl. 1; *orientalis*, Blyth (nec Horsf.) — Himalaya, Inde S. et Ceylan (Montagnes).

## 1625. PSEUDOPTYNX

*Pseudoptynx*, Kaup (1848).

10.740. PHILIPPENSIS (Gray), *Cat. Accipitr.*, 1844, p. 45; Kaup, *Contr. Orn.*, 1852, p. 117; Wald., *Tr. Z. S.* IX, p. 144, pl. 25, f. 2; *philippinensis*, Schl.; Sharpe, *l. c.*, p. 43. — Ile Luçon (Philipp.)

10.741. GURNEYI, Tweed., *P. Z. S.*, 1878, p. 940. — Mindanao (Philipp.)

10.742. BLAKISTONI (Seeb.), *P. Z. S.*, 1883, p. 466. — Japon (Yéso).

10.743 DOERRIESI (Seeb.), *B. B. O. C.* V, p. 4; id., *Ibis*, 1896, p. 133. — Sibérie E., Ussuri S.-W.

## 1626. SCOPS

*Scops*, Savig. (1809); *Ephialtes*, Keys. et Bl. (1840); *Pisorhina*, *Megascops*, *Acnemix*, *Ptilopsis*, Kaup (1848); *Lempijius*, Bp. (1854); *Scototheres*, Heine (1890).

10.744. GIU (Scop.), *Ann.* I, p. 19; Dress., *B. Eur.* V, pl. 314; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* I, p. 135, pl. 31; *S. scops*, Lin.; *zorca*, *carniolica*, *pulchella*, Gm.; *ephialtes*, Savig.; *aldrovandi*, Flem.; *europæus*, Less.; *senegalensis*, Sw.; *longipennis*, Kp.; *kamtschatkensis*, Bp.; *minor*, *rupestris*, *rufescens*, *pygmæa*, Brm.; *vera*, Fch. — Europe mérid., occid. centr., Asie centr., Asie Mineure, Afrique N., N.-E. et N.-W.

2918. *Var.* SOCOTRANA, Grant et Forb., *Bull. Liverp. Mus.* II, p. 2. — Ile Socotra.

2919. *Var.* CAPENSIS, Smith, *S.-Afr. Q. Journ.*, ser. 2, n° 4, 1, p. 314; Sharpe, *Cat.* II, p. 52, pl. 3, f. 1; *latipennis*, Kp.; *senegalensis*, auct. plur. (nec Sw.); *fazoglensis*, Würt.; *S. zorca africanus*, Schl. — Afrique trop. et mérid.

Digitized by Google

2920. *Var.* UGANDÆ (Neum.), *J. f. O.*, 1898, p. 500. Uganda.

2921. *Var.* HENDERSONI (Cass.), *Pr. Philad. Acad.*, 1852, p. 186; Hartl., *Orn. W. Afr.*, p. 20; Sharpe, *l. c.*, p. 52. Angola.

2922. *Var.* PENNATA, Hodgs., *J. A. S. Beng.* VI, p. 369; Jerd., *B. Ind.* I, p. 156; Sharpe, *l. c.*, p. 55. Himalaya, Inde.

2923. *Var.* STICTONOTA, Sharpe, *l. c.*, p. 54, pl. 5, f. 2; *bakkamæna*, Swinh., *Ibis*, 1860, p. 47 (nec Forst.); *japonicus*, Swinh., *Ibis*, 1863, p. 89; *sunia*, Swinh., *P. Z. S.*, 1871, p. 343. Sibérie E., Japon, Chine, Indo-Chine, Himalaya E.

2924. *Var.* RUFIPENNIS, Sharpe, *l. c.*, p. 60; *pennatus*, Jerd., *Madr. Journ.* XIII, p. 119, pl. 2 (nec Hodgs.) Madras.

2925. *Var.* ELEGANS (Cass.), *Pr. Philad. Acad.*, 1852, p. 183; Sharpe, *l. c.*, p. 87 (part.); *japonicus*, Sharpe (nec Tem. et Schl.), *l. c.*, p. 56. Japon, îles Liu Kiu.

2926. *Var.* MALAYANA, Hay, *Madr. Journ.* XIII, 2, p. 147; *gymnopodus*, Gray (*descr. nulla*); Kp., *Contr. Orn.*, 1852, p. 111; Sharpe, *l. c.*, pp. 58, 65, pl. 4, ff. 1, 2. De Malacca jusqu'en Chine.

2927. *Var.* NICOBARICA (Hume), *Str. Feath.*, 1876, p. 285. Iles Nicobar.

2928. *Var.* MINUTA, Legge, *Ann. Mag. N. H.*, 1878, p. 175. Ceylan.

10.745. BRUCEI (Hume), *Str. Feath.* I, p. 8; Sharpe, *l. c.*, p. 62; *obsoletus*, Cab., *J. f. O.*, 1875, p. 126. Transcasp., Asie centr., Afghanistan, Sindh., Inde centr.

10.746. SPILOCEPHALA (Blyth), *J. A. S. B.* XV, p. 8; Sharpe, *l. c.*, p. 63; *pennata* (pt.), Hodgs.; *nepalensis*, Gray; *gymnopodus*, Hume (nec Gr.) Himalaya, Birmanie (montagnes).

2929. *Var.* HAMBROECKI (Swinh.), *Ann. N. H.*, sér. 4, VI, p. 153; id., *P. Z. S.*, 1871, p. 344; Sharpe, *l. c.*, p. 64; *japonicus*, Swinh., *Ibis*, 1863, p. 348 (nec T. et Schl.) Formose.

10.747. SUNIA, Hodgs., *As. Research.* XIX, p. 175; Jerd., *Ill. Ind. Zool.*, pl. 41; *bakkamæna*, Blyth, *Ibis*, 1866, p. 255 (nec Forst.); *pennatus* (pt.), Gould; *giu* (pt.), Blanf., *F. B. I.*, *B.* III, p. 292. Inde, Indo-Chine W., Malacca.

10.748. NOVÆ-ZEELANDIÆ, Bonap. ex Schl., *Consp.* I, p. 47; Schl., *Mus. P.-B., Oti*, p. 27; ?*parvissima*, Ellm., *Zoologist*, 1861, p. 272. Nouv.-Zélande.

10.749. SCAPULATA, Bocage, *Jorn. Sc. Lisb.*, 1888, p. 229. St-Thomas (Afr. W.)

10.750. LEUCOPSIS (Hartl.), *Rev. Zool.*, 1849, p. 496; id., *Beitr. Orn. W.-Afr.*, p. 16, pl. 1; Shpe, *l. c.*, p. 311. St-Thomas (Afr. W.)

10.751. MEGALOTIS, Gray, *Cat. Accip.*, 1844, p. 45; Wald., *Tr. Z. S.* IX, p. 143, pl. 25, f. 3; Sharpe, *l. c.*, p. 69. Philippines.

10.752. PODARGINA (Hartl. et Fsch.), *P. Z. S.*, 1872, p. 90; Iles Pelew.



Digitized by Google

Finsch, *Journ. Mus. Godeffr.*, p. 2, pl. 1; Sharpe, *l. c.*, pp. 151, 313.

10.753. BECCARII, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 906; id., *Orn. Pap.* I, p. 77. — Ile Misori.

10.754. MENADENSIS (Quoy et Gaim.), *Voy. Astrol.*, *Ois.* I, p. 170, pl. 2, f. 1; Bp., *Consp.* I, p. 47; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 103. — Célèbes.

2950. *Var.* MAGICA (Müll.), *Nat. Gesch. Land u. Vogelk.*, p. 110; Schl., *Mus. P.-B.*, *Oti*, p. 22; Sharpe, *l. c.*, p. 70, pl. 5. — Céram, Amboine.

2951. *Var.* LEUCOSPILA (Gray), *P. Z. S.*, 1860, p. 344; Sharpe, *l. c.*, p. 72, pl. 6; *magicus* (pt.), Schl. — Halmahera, Batjan.

3952. *Var.* BOURUENSIS, Sharpe, *l. c.*, p. 73, pl. 7, f. 2; *leucospila* (pt.), Salvad.; *magicus* (pt.), Schl. — Ile Bouru.

2953. *Var.* MOROTENSIS, Sharpe, *l. c.*, p. 75, pl. 7, f. 1. — Ile Morty.

2954. *Var.* BROOKEI, Sharpe, *Bull. B. O. Club*, 1, p. 4 (1892); Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 107. — Bornéo N.-W.

2955. *Var.* SIBUTUENSIS, Sharpe, *Bull. B. O. C.* II, p. 9 (1893); Mey. et Wg., *l. c.* — Iles Soulou.

2956. *Var.* SIAOENSIS, Schl., *Mus. P.-B.*, *Rev. Accip.*, p. 13. — Sanghir.

2957. *Var.* RUTILA (Pucb.), *Rev. Zool.*, 1849, p. 29; Sharpe, *Cat.* II, p. 80; *menadensis* (pt.), auct. plur.; M.-Edw. et Grand., *H. Madag.*, *Ois.*, p. 133, pl. 40. — Madagascar.

2958. *Var.* CAPNODES, Gurn., *Ibis*, 1889, p. 104. — Anjouan (Comores).

2959. *Var.* ALBIVENTRIS, Sharpe, *l. c.*, p. 78, pl. 8, f. 1. — Flores.

10.755. SULAENSIS (Hart.), *Novit. Zool.* V, 1898, p. 126. — Ile Soula.

10.756 SYLVICOLA, Wall., *P. Z. S.*, 1863, p. 487; Sharpe, *l. c.*, p. 82; Hart., *Novit. Zool.* V, pl. 1, f. 1. — Flores.

10.757. PRYERI, Gurn., *Ibis*, 1889, p. 302. — Iles Liu Kiu (Japon).

10.758. SEMITORQUES (Tem. et Schl.), *Faun. Jap.*, p. 25, pl. 8; Schl., *Mus. P.-B.*, *Oti*, p. 23; Sharpe, *l. c.*, p. 83. — Japon.

10.759. PLUMIPES (Hume), *Rough Notes*, II, p. 397; id., *Nests and Eggs Ind. B.* I, p. 68; *semitorques*, Jerd. — Himalaya.

10.760. BAKKAMÆNA (Forst), Blanf., *Faun. Br. Ind.*, *B.* III, p. 297; *malabaricus*, Jerd.; Sharpe, *l. c.*, p. 94; *griseus*, Jerd.; *lettoides*, Blyth; *jerdoni*, Wald.; *bakkamuna*, Holdsw. — Inde S., Ceylan.

10.761. LETTIA, Hodgs., *As. Research*, XIX, p. 176; Sharpe, *l. c.*, p. 85; *lempiji*, Gray (nec Horsf.) — Himalaya.

10.762. GLABRIPES (Swinh.), *Ann. N. H.*, ser. 4, VI, p. 152; id., *P. Z. S.*, 1872, p. 343; id., *Ibis*, 1874, p. 269; *elegans* (pt.), Sharpe (nec Cass.) — Chine, Formose.

2940. *Var.* ERYTHROCAMPA (Swinh.), *Ibis*, 1874, p. 269; — Chine.

Digitized by Google

Sharpe, *l. c.*, p. 89; *lempiji*, Scl., *Ibis*, 1861, p. 29 (nec Horsf.)

10.763. LEMPIJI (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 140; Blyth, *J. A. S. B.* XV, 1, p. 182; *noctula*, Tem., *Pl. Col.* 99; Schl., *l. c.*, p. 24; *javanicus*, Less.; *indicus*, Bp. — Indo-Chine, Malacca, Java, Bornéo, Sumatra.

2941. *Var.* UMBRATILIS (Swinh.), *Ibis*, 1870, p. 342; id., *P. Z. S.*, 1871, p. 344; Sharpe, *l. c.*, p. 93. — Haïnan.

10.764. EVERETTI, Tweed., *P. Z. S.*, 1878, p. 492; *fuligi-nosa*, Sharpe, *Ibis*, 1888, p. 197. — Mindanao, Palawan, Samar (Philipp.)

10.765. MANTANANENSIS, Sharpe, *Bull. B. O. Club*, I, 1892, p. 4. — Ile Mantanani (Bornéo N.-W.)

10.766. SOLOKENSIS (Hart.), *Bull. B. O. Club*, II, 1893, p. 59. — Solok (Sumatra W.)

10.767. LONGICORNIS, Grant, *Bull. B. O. Club*, III, 1894, p. 51. — Luçon (Philippines).

10.768. MINDORENSIS, Whiteh., *Ibis*, 1899, p. 98. — Mindoro (Philippines).

10.769. WHITEHEADI, Grant, *Bull. B. O. Club*, IV, 1895, p. 40; id., *Ibis*, 1895, pp. 440, 485. — Luçon.

10.770. ALFREDI, Hart., *Nov. Zool.* IV, p. 527, V, pl. 1, f. 1. — Flores.

10.771. LEUCOTIS (Tem.), *Pl. Col.* 16; Schl., *l. c.*, p. 17; Sharpe, *Cat.* II, p. 97. — Afrique tropicale.

10.772. SAGITTATA (Cass.), *Journ. Ac. Philad.* II, p. 96, pl. 12; Sharpe, *l. c.*, p. 98. — Ténassérim S., Malacca.

10.773. BALLI (Hume), *Str. Feath.* I, p. 407; Sharpe, *l. c.*, p. 100; *spilocephalus*, Ball., *Str. Feath.* I, p. 53. — Iles Andaman.

10.774. RUFESCENS (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 140; Schl., *Rev. Accip.*, p. 10; Sharpe, *l. c.*, p. 102; *mantis*, Tem. et Schl. — Malacca, Sumatra, Java, Bornéo.

10.775. ICTERORHYNCHA, Shell., *Ibis*, 1873, p. 138; Sharpe, *l. c.*, p. 103. — Côte d'Or.

10.776. LATOUCHEI, Rick., *Ibis*, 1900, p. 535. — Fohkien (Chine).

10.777. IDAHOENSIS, Merr., *N. Am. Faun.*, n° 5, p. 96, pl. 1. — Idaho.

10.778. BARBARA, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, p. 57; id., *Exot. Orn.*, p. 101, pl. 51; Sharpe, *l. c.*, p. 107. — Guatémala.

2942. *Var.* ASPERSA (Brewst.), *Auk*, 1888, p. 87 (*Megascops aspersus*). — Chihuahua (Mexique).

10.779. BRASILIANA (Gm.), *S. N.* I, p. 289; Bp., *Consp.* I, p. 46; Schl., *l. c.*, p. 21; *choliba*, Vieill.; *decussata*, Licht.; *crucigera*, *undulata*, Spix, *Av. Bras.* I, pp. 22, 23, pl. 9 et 10; *lophotes*, *portoricensis*, Less.; *watsoni*, Cass.; *argentina*, Licht. — Amérique mérid. de l'Uruguay à la Colombie et jusqu'au Costa-Rica, Venézuéla, Guyane.

2943. ?*Var.* ATRICAPILLA (Tem.), *Pl. Col.* 43; Burm., *Th Bras.* II, p. 128. — Brésil S. et E.

2944. *Var.* USTA, Scl., *Tr. Z. S.* IV, p. 265, pl. 61; Sharpe, *l. c.*, p. 111. — Haut-Amazone.

2945. *Var.* GUATEMALÆ, Sharpe, *Cat.* II, p. 112, pl. 9; *marmoratus*, Nels, *Auk*, XV, p. 49; *vermi-* — Amérique centr., du Mexique à Panama.

Digitized by Google

*culatus*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 267.

2946. *Var.* Roraimæ, Salv., *Ibis*, 1897, p. 441. — Guyane angl.

2947. *Var.* Sanctæ-Catharinæ, Salv., *Ibis*, 1897, p. 440. — Brésil S.

2948. *Var.* Cassini, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1878, I, p. 102. — Vera-Cruz (Mexique).

2949. *Var.* Hastata, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 268. — Mexique W.

10.780. ingens, Salv., *Ibis*, 1897, p. 440. — Ecuador.

10.781. asio (Lin.); Wils., *Am. Orn.* VI, pl. 42, f. 1; Tem., *Pl. Col.* 80; *nævia*, Gm.; *striatus*, Vieill. — Amérique N.-E., au S. jusqu'en Géorgie.

2950. *Var.* Floridana, Ridgw., *B. N. Am.* III, p. 51; Coues, *Birds N.-W.*, p. 505; Sharpe, *l. c.*, p. 118. — Basse-Géorgie, Floride, etc.

2951. *Var.* Trichopsis, Wagl., *Isis*, 1832, p. 276; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* III, pl. 62; *maccallii*, Cass., *B. Calif. Tex.*, p. 180; *enano*, Lawr. — Texas, Mexique E.

2952. *Var.* Ridgwayi (Nels. et Palm.), *Auk*, 1894, p. 40. — Michoacan (Mexique).

2953. *Var.* Pinosa (Nels. et Palm.), *Auk*, 1894, p. 39. — Vera-Cruz (Mexique).

2954. *Var.* Cineracea (Ridgw.), *Auk*, XII, p. 390; *trichopsis*, Sharpe et auct. plur. (nec Wagl.) — Arizona, Mexique N. et centr.

2955. *Var.* Aikeni (Brewst.), *Auk*, 1891, p. 139. — Colorado.

2956. *Var.* Bendirei (Brewst.), *Bull. Nutt. Orn. Club*, VII, 1882, p. 51. — Californie.

2957. *Var.* Kennicotti, Ell., *Pr. Philad. Acad.*, 1867, p. 69; id., *B. N. Am.*, pl. 27; Ridgw., *B. N. Am.* III, p. 53. — Amérique N.-W., de l'Orégon à Sitka.

2958. *Var.* Maxwellæ (Ridgw.), *Field and Forest*, 1877, pp. 210, 215. — Mtnes Rocheuses, du Color. au Montana.

2959. *Var.* Macfarlanei (Brewst.), *Auk*, 1891, p. 140; *saturatus*, Brewst., *l. c.*, p. 141. — S. de la Colombie angl. jusqu'à l'Orégon centr. et le Montana.

2960. *Var.* Vinacea (Brewst.), *Auk*, 1888, p. 88. — Chihuahua (Mex. N.)

2961. *Var.* Cooperi (Ridgw.), *Pr. U. S. Nat. Mus.* I, p. 116. — Mex. W., Salvador, Nicarag., Costa-Rica.

## 1627. LOPHOSTRIX

*Lophostrix*, Less. (1837); *Scops* (pt.), auct. plur.

10.782. cristata (Daud.), *Traité*, II, p. 207; Levaill., *Ois. d'Afr.* I, pl. 45; Sharpe, *Cat.* II, p. 122; *superciliosa*, Shaw; *griseatus*, Cuv.; Schl., *Mus. P.-B.*, *Oti*, p. 16. — Bas-Amaz. et Guyane jusqu'à l'Ecuador.

10.783. stricklandi, Scl. et Salv., *Ibis*, 1859, p. 229; Sharpe, *l. c.*, p. 124; *cristata var.*, Strickl., *Contr. Orn.*, 1852, p. 60, pl. 10. — Amérique centr. du Mexique à Panama.

Digitized by Google

## 1628. PSILOSCOPS

*Psiloscops*, Coues (1898).

10.784. FLAMMEOLA (Kp. ex Licht.), *Tr. Z. S.* IV, p. 226; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, pl. 50; Ell., *B. N. Am.* I, pl. 28; Sharpe, *l. c.*, p. 105. — De la Californie au Guatémala.

10.785. NUDIPES (Vieill.), *Ois. Am. sept.*, pl. 22; Sharpe, *l. c.*, p. 121; *psilopoda*, Vieill. — Du Costa-Rica à Panama.

## 1629. HETEROSCOPS

*Heteroscops*, Sharpe (1889).

10.786. LUCIÆ, Sharpe, *Ibis*, 1888, p. 478, 1889, p. 77, pl. 3. — Bornéo N.-W.

## 1630. GYMNOSCOPS

*Gymnoscops*, Tristr. (1880).

10.787. INSULARIS, Tristr., *Ibis*, 1880, p. 356, pl. 14. — Ile Mahé (Seychelles).

## 1631. SCELOGLAUX

*Sceloglaux*, Kaup (1848).

10.788. ALBIFACIES (Gray), *Voy. Ereb. and Ter.*, *B.*, p. 2; Kp., *Isis*, 1848, p. 768; Bull., *B. New Zeal.*, pl. 20; Sharpe, *Voy. Ereb. and Ter.*, 2e éd., *B.*, p. 25, pl. 1; *haasti*, Bull.; *ejulans*, Potts. — Nouv.-Zélande.

## 1632. NINOX

*Ninox*, Hodgs. (1837); *Hieracoglaux*, *Spiloglaux*, Kp. (1848); *Cephaloptynx*, *Ctenoglaux*, Kp. (1852); *Rhabdoglaux*, Bp. (1854).

10.789. SCUTULATA (Raffl.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 280; Sharpe, *l. c.*, p. 156; *hirsuta*, Tem., *Pl. Col.* 289; *malaccensis*, Eyt. — Inde S., Ceylan.

2962. *Var.* LUGUBRIS (Tick.), *J. A. S. B.* II, p. 573; Sharpe, *l. c.*, p. 154; *nipalensis*, Hodgs., *Madr. Journ.* V, p. 24, pl. 14; *jeridius*, Hodgs.; *scutellatus*, Blyth; *hirsuta*, *madagascariensis*, Bp.; *burmanica*, Hume. — Himalaya, Malabar, Birmanie, Malacca.

2963. *Var.* BORNEENSIS (Bp.), *Conspect. Av.* I, p. 41; id., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1854, p. 543; Schl., *Mus. P.-B.*, *Strig.*, p. 25; *scutulata* (pt.), Sharpe. — Bornéo, Java.

2964. *Var.* JAPONICA (Tem. et Schl.), *Faun. Jap.*, p. 29, pl. 9; Bp., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1854, p. 545; — Japon, Chine, Corée, Bornéo N., Célèbes.

Digitized by Google

| | |
|---|---|
| *scutulata* (pt.), Sharpe ; *florensis*, Wall. ; *macroptera*, W. Blas., *Ornis*, 1888, p 545. | Sanghir, Soula, Ternate. |
| 2965. *Var.* AFFINIS, Beavan, *Ibis*, 1867, pp. 316, 334 ; Walden, *Ibis*, 1874, p. 129, pl. 5. | Iles Andaman, Nicobar. |
| 10.790. OCHRACEA (Schl.), *Ned. Tijdschr. Dierk.* IV, p. 185 ; Sharpe, *Cat. B.* II, p. 167, pl. 11, f. 2 ; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 94, pl. 4. | Célèbes. |
| 10.791. PHILIPPENSIS, Bp., *C. R.* XLI, p. 654 ; Wald., *Tr. Z. S.* IX, p. 144, pl. 25, f 1 ; Schl., *l. c*, p. 26 ; Sharpe, *l. c.*, p. 167. | Philippines. |
| 10.792. EVERETTI, Sharpe, *Bull. B. O. C.* VI, p. 47 ; id., *Ibis*, 1897, p. 449. | Ile Siassi (Soulou). |
| 10.793. SPILOCEPHALA, Tweedd., *P. Z. S.*, 1878, p. 940. | Mindanao, Basilan. |
| 10.794. SPILONOTA, Bourns et Worc , *Occ. Pap. Minnes. Acad.* I (1894), p. 8. | Cebu, Mindanao. |
| 10.795. REYI, Oust., *Bull. Ass. Sc. France*, 1880, n° 39, p. 206. | Iles Soulou. |
| 10.796. MINDORENSIS, Grant, *Ibis*, 1896, p. 465. | Mindoro (Philippines). |
| 10.797. BOOBOOK (Lath.), *Ind. Orn. Suppl.* II, p. 15 ; Gould, *B. Austr.* I, pl. 32 ; Sharpe, *Ibis*, 1875, p. 258 ; *marmorata*, Gould. | Australie. |
| 2966. *Var.* ALBARIA, Rams., *Tab. List Austr. B.*, p. 37 (1888). | Ile Lord Howe. |
| 2967. *Var.* OCELLATA (Hombr. et Jacq.), *Voy. Pôle Sud, Zool.* III, p. 51, pl. 3, f. 2 ; Sharpe, *Ibis*, 1875, p. 258 ; id., *Cat.*, p. 170. | Australie N.-W. |
| 10.798. ROSSELIANA, Tristr., *Ibis*, 1889, p. 557. | Ile Rossel (Louisiades). |
| 10.799. FUSCA (Vieill.), *N. Dict.* VII, p. 22 ; Sharpe, *Cat.* II, p. 172, pl. 12, f. 1 ; *maugei*, Tem., *Pl. Col.* 46 ; *guteruhi*, Müll. | Timor. |
| 10.800. NOVÆ-ZEALANDIÆ (Gm.), *S. N.* I, p. 296 ; Sharpe, *l. c.*, p. 173 ; *fulva*, Lath. ; *zelandica*, Quoy et G., *Voy. Astr.* I, p. 168, pl. 2, f. 1 ; *venatica*, Peale. | Nouv.-Zélande. |
| 10.801. MACULATA (Vig. et Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XV, p. 189 ; Gould, *B. Austr.* I, pl. 33 ; Sharpe, *l. c.*, p. 174 ; Gurn., *Ibis*, 1885, p. 139. | Tasmanie, Australie S. et S.-E., île Norfolk. |
| 10.802. DIMORPHA (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Genov.*, 1874, VI, p. 308 ; Sharpe, *Ibis*, 1875, p. 258 ; Salvad., *Orn. Pap.* I, p. 83. | Nouv.-Guinée. |
| 10.803. CONNIVENS Lath.), *Ind. Orn Suppl.* II, p. 12 ; Gould, *B. Austr.* I, pl. 34 ; Sharpe, *l. c.*, p. 175 ; *frontata*, Less. ; *fortis*, Gould. | Australie. |
| 2968. *Var.* OCCIDENTALIS, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 2e sér., I, p. 1086. | Australie N.-W. |
| 2969. *Var.* PENINSULARIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 992. | Cap York (Austr. N.) |

Digitized by Google

10.804. RUFISTRIGATA (Gray), *P. Z. S.*, 1860, p. 344; Sharpe, *l. c.*, p. 177. — Halmahéra.

10.805. ASSIMILIS, Salvad. et D'Alb., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 809; *albomaculata*, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1879, p. 249. — Nouv.-Guinée S.-E.

10.806. THEOMACHA (Bonap.), *C. R.* XLI, p. 654; Wall., *Ibis*, 1868, p. 24; Sharpe, *l. c.*, p. 178; *hoedtii*, Schl., *N. T. D.* IV, p. 5. — Nouv.-Guinée, Mysol, Waigiou.

2970. *Var.* OBSCURA, Hume, *Str. Feath.* I, pp. 11, 421; Wald., *Ibis*, 1874, p. 129, pl. 4. — Iles Andaman, Nicobar.

10.807. GOODENOVIENSIS, De Vis, *Ann. Rep. Brit. New-Guin.*, p. 58 (1890). — Ile Goodenough.

10.808. STRENUA (Gould), *P. Z. S.*, 1837, p. 142; id., *B. Austr.* I, pl. 55; Schl., *Mus. P.-B., Str.*, p. 40; *rufa*, Gould, *l. c.*, pl. 36. — Australie.

10.809. HUMERALIS (Bp.), *Consp.* I, p. 40; Hombr. et Jacq., *Voy. Pôle Sud, Zool.* III, p. 53, pl. 4, f. 1; Salvad., *Orn. Pap.* I, p. 84; *fransenii*, Schl., *N. T. D.* III, p. 256; *undulata*, Rams. — Nouv.-Guinée, Waigiou.

10.810. ARUENSIS (Schl.), *Ned. Tijdschr. Dierk.* III, p. 329; Sharpe, *l. c.*, p. 181; Salvad., *Orn. Pap.* I, p. 86. — Iles Arou.

10.811. ODIOSA, Scl., *P. Z. S.*, 1877, p. 108; Salvad., *Orn. Pap.* I, p. 86. — Nouv.-Bretagne.

10.812. SUPERCILIARIS (Vieill.), *N. Dict.* VII, p. 33; M.-Edw. et Grand., *H. Madag.*, pl. 39; *sonnerati*, Tem., *Pl. Col.* 21; *polleni*, Schl.; id. et Pol., *Faun. Mad., Ois.*, p. 49, pl. 17. — Madagascar.

10.813. PUNCTULATA (Quoy et Gaim.), *Voy. de l'Astrol., Zool.* I, p. 165, pl. 1, f. 1; Schl., *M. P.-B., Str.*, p. 29; Sharpe, *Cat.*, p. 183; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 109. — Célèbes.

2971. *Var.* PLATENI, W. Blas. (in Litt.); Hartl., *Abh. nat. Ver. Brem.* XVI, 1899, p. 270. — Mindoro (Philippines).

10.814. GRANTI, Sharpe, *P. Z. S.*, 1888, p. 183; *punctulata*, Rams. (nec Q. et G.). — Guadalcanar (Salomon).

10.815. HYPOGRAMMA (Gray), *P. Z. S.*, 1860, p. 344; Sharpe, *Cat.* II, p. 183, pl. 10; Salvad., *Orn. Pap.* I, p. 87. — Baijan, Halmahera, Ternate.

10.816. SQUAMIPILA (Bp.), *Consp.* I, p. 41; Sharpe, *l. c.*, p. 184, pl. 12, f. 2; Salvad., *Orn. Pap.* I, p. 89. — Céram, Mysol.

10.817. VARIEGATA (Quoy et Gaim.), *Voy. Astrol., Zool.* I, p. 166, pl. 1, f. 2; Salvad., *l. c.*, p. 88; Sharpe, *l. c.*, p. 185; *novæ-britanniæ*, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1877, p. 105. — Nouv.-Irlande, Nouv.-Bretagne.

2972. *Var.* SOLOMONIS, Sharpe, *P. Z. S.*, 1876, p. 637, pl. 62. — Iles Salomon.

10.818. RUDOLFI, A.-B. Mey., *Ibis*, 1882, p. 232, pl. 6. — Ile Sumba.

Digitized by Google

10.819. HANTU (Wall.), *P. Z. S.*, 1863, p. 22; Sharpe, *Cat.*, p. 185, pl. 11, f. 1; Salvad., *l. c.*, p. 90. — Ile Bourou.

10.820. FORBESI, Sel., *P. Z. S.*, 1883, p. 51. — Ile Ténimber.

10.821. NATALIS, Lister, *P. Z. S.*, 1888, p. 525. — Ile Christmas.

10.822. JACQUINOTI (Bp.), *Consp.* I, p. 42; Hombr. et Jacq., *Voy. Pôle Sud*, pl. 3, f. 1; Salvad., *l. c.*, p. 84; *tæniata*, Jacq. et Puch., *Voy. Zool.* III, p. 50; Sharpe, *l. c.*, p. 186. — Iles Salomon.

10.823. TERRICOLOR, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1879, p. 466; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 514; *goldiei*, Gurn., *Ibis*, 1883, p. 169. — Nouv.-Guinée S.-E.

## SUBF. IV. — SYRNIINÆ

### 1633. SYRNIUM

*Syrnium*, Savig. (1809); *Ulula*, Cuv. (1817); *Aluco*, Kp. (1829); *Bulaca*, Hodgs. (1836); *Meseidus*, Hodgs. (1841); *Ptynx*, Bp. (1850); *Myrtha*, *Macabra*, Bp. (1854); *Tybo*, Heine (1890).

10.824. ALUCO (Lin.); Dress., *B. Eur.* V, pl. 306; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg.*, *Ois.* I, p. 115, pl. 26; *stridula*, Lin.; *sylvestris*, *rufa*, Scop.; *soloniensis*, Gm.; *sylvatica*, Steph.; *ululans*, Savig.; *ædium*, *rufescens*, Brm. — Europe, Asie Mineure, Afrique N.

2973. *Var.* NIVICOLA (Hodgs.), in *Gray's Zool. Misc.*, p. 82; *nivicolum*, Blyth, *J. A. S. Beng.* XIV, pp. 185, 550. — Himalaya, Chine.

2974. *Var.* WILLKOUSKII, Menzb., *Ibis*, 1897, p. 113. — Transcaucasie.

10.825. BIDDULPHI, Scully, *Ibis*, 1881, p. 423, pl. 14. — Asie centr., Inde N.-W., Afghanistan.

10.826. DAVIDI, Sharpe, *Ibis*, 1875, p. 256; id., *Cat.*, p. 251; *fuscescens*, Dav. (nec Tem.); *fulvescens*, Swinh. (nec Tem. et Schl.) — Moupin (Chine).

10.827. URALENSE (Pall.), *Reise*, I, p. 455; Tem., *Pl. Col.* 27; Dress., *B. Eur.* V, pl. 307; *liturata*, Tengm.; *macroura*, Mey. et Wolf.; *macrocephala*, Meisn. — Europe N., Sibérie.

2975. *Var.* FUSCESCENS, Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, *Aves*, pl. 10; *rufescens*, T. et S., *l. c.*, p. 30; Schl., *Mus. P.-B.*, *Str.*, p. 11. — Japon.

10.828. NEBULOSUM (Forst.), *Phil. Trans.* XXII, p. 386; Vieill., *Ois. Am. sept.*, pl. 17; Audub., *B. Am.*, pl. 46; Dubois, *Ois. Eur.*, pl. 27[a]; *varius*, Bart. — Canada E., États-Unis E. jusqu'au Texas.

2976. *Var.* ALLENI, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1880, p. 8. — Caroline S.

2977. *Var.* HELVEOLA, Bangs, *Pr. New Eng. Zool. Club*, 1899, p. 31. — Texas S.

Digitized by Google

2978. *Var.* SARTORII, Ridgw., *N. Am. B.* III, p. 29. — Mexique E.

10.829. OCCIDENTALE, Xant., *Pr. Philad. Acad.*, 1859, p. 193; Baird, *B. N. Am.*, *App.*, pl. 66; Sharpe, *l. c.*, p. 260. — États-Unis S.-W., Californie, Mexique.

2979. *Var.* CAURINA, Merr., *Auk*, 1898, p. 39. — Colombie angl., Washington (État).

10.830. FULVESCENS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, p. 58; Sharpe, *l. c.*, p. 258; Salv. et Godm., *Biol. Centr. Am.* III, pl. 61. — Mexique S., Guatémala.

10.831. RUFIPES (King), *Zool. Journ.* III, p. 426; Sharpe, *l. c.*, p. 261; *fasciata*, Des M., *Icon. Orn.*, pl. 37. — Chili, Patagonie.

10.832. SELOPUTO (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 140; Schl., *Mus. P.-B., Str.*, p. 22; *sinensis*, Lath.; Sharpe, *l. c.*, p. 261; *orientalis*, Shaw; *pagodarum*, Tem., *Pl. Col.* 230. — Indo-Chine, Malacca, Java, Sumatra.

10.833. OCELLATUM, Less., *Rev. Zool.*, 1839, p. 289; Gould, *B. As.*, pt. XXII, pl.; *sinensis*, Gr. et Hardw., *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 21 (nec Lath.); Schl., *l. c.*, p. 21. — Inde.

10.834. WHITEHEADI, Sharpe, *Ibis*, 1888, p. 196, pl. 3; *wiepkeni*, W. Blas., *Ornis*, 1888, p. 304. — Palawan (Philippines).

10.835. LEPTOGRAMMICUM (Tem.), *Pl. Col.* 525; Schl., *l. c.*, p. 20; Sharpe, *l. c.*, p. 264. — Bornéo.

10.836. MYRTHA (Bonap.), *Consp.* I, p. 44; Salvad., *Ucc. Bornéo*, p. 21; Schl., *l. c.*, p. 19; *leptogrammicum*, Cass. (nec Tem.); *sumatrana*, Bp., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1854, p. 541. — Sumatra.

10.837. NIASENSE, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.*, 1887, p. 526. — Ile Nias.

10.838. WOODFORDI (Smith), *S. Afr. Q. Journ.*, ser. 2, pt. 1, p. 312; id., *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 71; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 122. — Afrique S. du Cap au Nyassaland.

2980. *Var.* SUAHELICA, Rchw., *Mittl. Hochl. N. Deutsch. Ost-Afr.*, 1898, p. 272. — Afrique E. allem.

2981. *Var.* UMBRINA, Heugl., *J. f. O.*, 1863, p. 12; *woodfordi* (pt.), Sharpe. — Afrique N.-E.

2982. *Var.* ZANSIBARICA, Rchw., *Mittl. Hochl. N. Deutsch. Ost-Afr.*, p. 272. — Zanzibar.

10.839. NUCHALE, Sharpe, *Ibis*, 1870, p. 487; id., *Cat.*, p. 265; *woodfordi*, Hartl. (nec Smith). — De la Côte d'Or à l'Angola (Afr. W.)

10.840. BOHNDORFFI, Sharpe, *Journ. Linn. Soc., Zool*, 1884, p. 439. — Niam-Niam.

10.841. NIGRICANTIUM, Sharpe, *Ibis*, 1897, p. 449. — Afrique E. allem.

10.842. NEWARENSE (Hodgs.), *Asiat. Research.* XIX, p. 168; Swinh., *P. Z. S.*, 1871, p. 344; Sharpe, *Cat.*, p. 281; *indrânee*, Gray (nec Syk.); *indrani*, Schl., *l. c.*, p. 19; *caligatus*, Swinh. — Himalaya, Birmanie, Formose.



Digitized by G

2983. *Var.* MAINGAYI, Hume, *Str. Feath.*, 1878, p. 27; Sharpe, *P. Z. S.*, 1887, p. 478. — Malacca.

10.843. INDRANI (Sykes), *P. Z. S.*, 1832, p. 82 (*indranee*); Sharpe, *l. c.*, p. 282; *monticola*, Jerd.; *ochrogenys*, Hume, *Str. Feath.*, 1873, p. 431. — Inde, Ceylan.

## 1634. SCOTIAPTEX

*Scotiaptex*, Swains. (1837).

10.844. CINEREA (Gm.), *S. N.* I, p. 291; Sw. et Rich., *Faun. Bor.-Am.*, p. 77, pl. 31; Audub., *B. N. Am.*, pl. 351; *acclamator*, Bartr. — Amérique arctique, États-Unis.

10.845. LAPPONICA (Retz.), *Faun. Suec.*, p. 79; Naum., *Vög. Deutschl.*, pl. 349; Dress., *B. Eur.* V, pl. 308; *barbata*, Pall.; *cinereum*, Bp. (nec Gm.); *microphthalmos*, Tyzenh. — Nord de l'Europe, Sibérie.

## 1635. PULSATRIX

*Pulsatrix*, Kaup (1848).

10.846. PERSPICILLATA (Lath.), *Ind. Orn.* I, p. 58; Sharpe, *Cat. B.*, p. 277 (pl.); *personata* et *torquata*, Daud., *Traité*, II, pp. 192 5; Levaill., *Ois. d'Afr.* I, pl. 42, 44; Tacz., *Orn. Pér.* I, p. 180; *larvata*, Shaw et Nod., *Nat. Misc.* XIX, p. 801; *melanota*, Puch. (nec Tsch.) — Amérique tropicale.

10.847. MAXIMILIANI, Dubois (1); *Strix pulsatrix*, Max., *Reise Bras.* I, p. 366; id., *Beitr. z. Naturg. Bras.* III, 268; Schl., *Mus. P.-B.*, *Strig.*, p. 17 (en note). — Brésil.

10.848. MELANONOTA (Tschudi), *Arch. f. Nat.*, 1844, p. 267; id., *Faun. Per.*, p. 114, pl. 4; Sharpe, *l. c.*, p. 280; Tacz., *Orn. Pér.* I, p. 184. — Pérou, Brésil.

10.849. FASCIATIVENTRIS, Salvad. et Festa, *Boll. Musei Torino*, XV, n° 368, p. 32. — Ecuador.

(1) C'est bien à tort que certains auteurs ont réuni le *Strix pulsatrix* du Prince de Wied au *perspicillata* avec lequel il n'a aucun rapport. Le *pulsatrix* est d'une taille plus forte, ses teintes générales sont d'un brun roussâtre fauve; la raie sourcilière peu distincte, et les parties ventrales sont d'un roux jaunâtre; à la gorge existe une tâche blanche peu développée. Les doigts n'ont que deux écailles nues, tandis qu'il y en a trois chez le *perspicillata*. Longueur totale 46 centimètres; ailes 35; queue 20; tarses 5.

D'après Schlégel, deux sujets de cette espèce se trouvent au Musée du Prince de Wied à Frankfort, et un au Musée de Bruxelles; c'est probablement ce dernier qui a servi à la description de Schlégel: j'en donne une figure sur l'une des planches de mon *Synopsis*. Comme le terme *Pulsatrix* est devenu générique, je dédie l'espèce à Maximilien Prince de Wied, qui l'a découverte et décrite pour la première fois.

Digitized by Google

### 1336. CICCABA

*Ciccaba*, Wagl. (1832).

10.850. ALBIGULARIS (Cass.), *Pr. Philad. Ac.* IV, p. 124; id., *Journ. Philad. Ac.* II, p. 52, pl. 4; Sharpe, *l. c.*, p. 270; *albipunctatum*, Kp.; *macabrum*, Bp. — Colombie, Ecuador.

10.851. SUPERCILIARIS (Pelz.), *Verh. z.-b. Wien*, 1863, p. 1125; Sharpe, *l. c.*, p. 271; *zonocercum*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1867, p. 590 (nec Gr.); *polygrammicum*, Gr. — Brésil, Amazone.

10.852. SUINDA (Vieill.), *N. Dict.* VII, p. 34; Sharpe, *l. c.*, p. 272; *dominicensis*, Tsch.; *cayennensis* (pl.), Schl. — Brésil.

10.853. VIRGATA (Cass.), *Pr. Philad. Ac.* IV, p. 124; id., *Journ. Ph. Ac.* II, p. 51, pl. 3; Schl., *Mus. P.-B., Strig.*, p. 13; *zonocercum*, Gray; *cayennensis* (pl.), Kp.; *lineatum*, Lawr. — Amérique centr., Colombie, Vénézuéla.

2984. *Var.* SQUAMULATA (Bp., ex Licht.), *Consp.* I, p. 53. — Mexique.

10.854. BUBULA (Daud.), *Traité*, II, p. 190; Levaill., *Ois. d'Afr.* I, pl. 41; Wagl., *Isis*, 1832, p. 1222; Schl., *l. c.*, p. 17; *lineata*, Shaw; *albomarginata*, Spix, *Av. Bras.*, pl. 10ª. — Guyane, Brésil.

10.855. NIGROLINEATA (Scl.), *Tr. Z. S.* IV, p. 268, pl. 63; Scl. et Salv., *Nomencl.*, p. 117; Shpe, *l. c.*, p. 276. — Amérique centr.

2985. *Var.* SPILONOTA, Sharpe, *Cat.* II, p. 277 (ex Gray). — Colombie.

## SUBF. IV. — SURNIINÆ

### 1637. GISELLA

*Gisella*, Bonap. (1854).

10.856. HARRISI (Cass.), *Pr. Philad. Ac.* IV, p. 157; id., *Tr. Phil. Ac.* II, p. 53, pl. 3; Schl., *l. c.*, p. 9; *lathami*, Bp.; *albipunctatus*, Bp. (nec Kp.) — Colombie.

10.857. JHERINGI, Sharpe, *Ibis*, 1899, p. 439; v. Jhering, *Ibis*, 1900, p. 217. — Stᵗ-Paul, Rio-Grande do Sul (Brésil S.-E.)

### 1638. NYCTALA

*Nyctala*, Brehm (1828); *Ægolius*, Kp. (1829); *Scotophilus*, Sw. (1837).

10.858. TENGMALMI (Gm.), *S. N.* I, p. 291; Dress., *B. Eur.* V, pl. 313; Dubois, *Fne. Ill. Vert. Belg., Ois.* I, p. 106, pl. 24; *dasypus*, Bechst.; *planiceps*, *pinetorum*, *abietum*, Brm.; *funerea*, Bp.; *minor*, *bædekeri*, Brm. — Europe sept. et centr., Sibérie.

2986. *Var.* RICHARDSONI, Bp., *Comp. List B. Eur. and N. Am.*, p. 7; Ridgw., *Am. Nat.*, 1871, p. 285. — Amérique arctiq., Canada, États-Unis N.

Digitized by Google

10.859. ACADICA (Gm.), *S. N.* I, p. 296; Audub., *B. Am.*, pl. 199; Bp., *l. c.*, p. 7; *passerina*, Penn.; Wils., *Am. Orn.* IV, p. 66, pl. 34, f. 1; *acadiensis*, Lath.; *albifrons*, Shaw; *wilsoni*, Boie; *frontalis*, Licht.; *kirtlandi*, Hoy. — États-Unis, Mexique.

## 1639. SURNIA

*Surnia*, Dumér. (1806); *Nycthierax*, Sund. (1872).

10.860. ULULA (Lin.); Dress., *B. Eur.* V, pl. 311; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* I, p. 101, pl. 23; *funerea*, Lin.; *nisoria*, Mey. et Wg.; *uralensis*, Shaw; *doliata*, Pall. — Europe N., Sibérie, Kamtsch., Alaska.

2987. *Var.* CAPAROCH (P. L. S. Müll., nec *caparacoch*), *S. N., Suppl.*, p. 69; Steju., *Auk*, 1884, p. 362; *canadensis*, Briss.; *funerea*, auct. plur. (nec Lin.); Dress., *B. Eur.* V, pl. 312; *hudsonia*, Gm.; *borealis*, Less.; *ulula*, Cass. (nec L.) — Amérique sept., N. des États-Unis.

## 1640. NYCTEA

*Nyctea*, Steph. (1826); *Nyctia*, Sw. (1837); *Leuchybris*, Sund. (1872).

10.861. SCANDIACA (Lin.); Dress., *B. Eur.* V, pl. 309, 310; *S. nyctea*, Lin.; Audub., *B. Am.*, pl. 121; *arctica*, Bartr.; *nivea*, Thunb.; *albus*, Daud.; *candida*, Lath.; *erminea*, Shaw; *nivea europæa* et *nivea americana*, Brm.; *var. arctica*, Ridgw. — Toute la zone arctique, en hiver dans la zone plus tempérée.

## 1641. ATHENE

*Noctua*, Savig. (1809, nec Fabr.); *Athene*, Boie (1822); *Carine*, Kp. (1829).

10.862. NOCTUA (Scop.), *Ann.* I, p. 22; Dress., *B. Eur.* V, pl. 317; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* I, p. 110, pl. 23; *passerina*, Gm.; *psilodactyla*, *nudipes*, Nilss.; *indigena*, Brm.; *veterum*, Schl.; *minor*, Degl. et Gerbe; ?*chiaradiæ*, Gigl. — Europe centr. et mérid.

2988. *Var.* GLAUX (Savig.), *Descr. de l'Égypte, Ois.*, p. 287; Dress., *l. c.*, pl. 318; *persica*, Vieill.; *meridionalis*, Less.; *bactriana*, Hutt.; *numida*, Levaill. jun.; *noctua*, *passerina* et *veterum* (pt.), auct. plur. — Les contrées côtoyant la Méditerranée, Asie S.-W.

2989. *Var.* BACTRIANA, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1847, p. 771; Blanf., *Faun. Brit. Ind., Birds*, III, p. 303; *plumipes*, Swinh., *P. Z. S.*, 1870, p. 448; *persica*, Dav. (nec Vieill.); *orientalis*, Severtz. — Mongolie, Chine N., Thibet, Turkestan et Afghanistan.

Digitized by Google

10.863. SPILOGASTRA, Heugl., *J. f. O.*, 1863, pp. 14-15; id., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 119, pl. — Afrique N.-E.

10.864. BRAMA (Tem.), *Pl. Col.* 68; Schl., *Mus. P.-B., Strig.*, p. 29; Sharpe, *l. c.*, p. 138; *indica*, Frankl.; *tarayensis*, Hodgs. — Inde.

2990. *Var.* PULCHRA, Hume, *Str. Feath.* I, p. 469, III, p. 39; Sharpe, *l. c.*, p. 140. — Birmanie, Pégou.

## 1642. HETEROGLAUX

*Heteroglaux*, Hume (1873).

10.865. BLEWITTI, Hume, *Str. Feath.* I, p. 468; Sharpe, *l. c.*, p. 141. — Inde centr.

## 1643. SPEOTYTO

*Speotyto*, Glog. (1842); *Pholeoptynx*, Kp. (1848).

10.866. CUNICULARIA (Mol.), *Stor. Chil.*, p. 343; Audub., *B. N. Am.*, pl. 422; *grallaria*, Spix; Tem., *Pl. Col.* 146; *urucurea*, Less.; *socialis*, Gamb. — Amérique mérid.

2991. *Var.* FLORIDANA, Ridgw., *A. O. U. Check-liste*, 2e éd., 1895, p. 150; Palm., *Auk*, 1896, p. 99, pl. 2; *bahamensis*, Cory, *Auk*, 1891, p. 348. — Floride, Iles Bahama.

2992. *Var.* CAVICOLA, Bangs, *Auk*, 1900, p. 287; *bahamensis*, Mayn. (nec Cory). — Nouv.-Providence (Bahama).

2993. *Var.* HYPOGÆA (Bp.), *Amer. Orn.* I, p. 72; Cass., *B. Cal. and Texas*, p. 118; id., *B. N. Am.*, p. 59; *cunicularia* (pt.), Sharpe et auct. plur.; *obscura*, Steph., *Auk*, 1895, p. 272. — Amérique N.-W. et centr.

2994. *Var.* DOMINICENSIS (Gm.), *S. N.* I, p. 296; Cory, *Bull. Natt. Orn. Club*, VI, p. 154 (1881). — Haïti et St-Domingue.

2995. *Var.* GUADELOUPENSIS, Ridgw., *B. N. Am.* III, p. 90; Sharpe, *l. c.*, p. 147. — Petites Antilles.

2996. *Var.* AMAURA, Lawr., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1878, p. 254. — Antigua (pet. Antilles).

2997. *Var.* ROSTRATA, Towns., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1890, p. 133. — Ile Clarion (Basse-Californie).

2998. *Var.* BRACHYPTERA, Richm., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1896, p. 663. — Ile Margarita.

2999. *Var.* TOLIMÆ, Stone, *Pr. Acad. Philad.*, 1899, p. 503. — Tolima (Colombie).

## 1644. GYMNASIO

*Gymnasio*, Bonap. (1854); *Gymnoglaux*, Cab. (1855).

10.867. NUDIPES (Daud.), *Traité*, II, p. 199; Vieill., *Ois. Am. sept.* I, p. 45, pl. 16; Bp., *Rev. et Mag. de* — Petites Antilles.

Digitized by Google

*Zool.*, 1854, p. 543; Newt., *Ibis*, 1859, p. 64, pl. 1; *newtoni*, Lawr.; *krugi*, Gundl.

10.868. LAWRENCEI (Scl. et Salv.), *P. Z. S.*, 1868, p. 328, pl. 29; *nudipes*, Lemb., *Aves Cuba*, p. 23, pl. 4, f. 2 (nec Daud.) — Cuba.

## 1645. GLAUCIDIUM

*Glaucidium*, Boie (1826); *Nyctipetes*, Sw. (1837); *Tænioptynx*, *Microglaux*, Kaup (1848); *Microptynx*, Kp. (1852); *Phalænopsis*, Bonap. (1854).

10.869. NANUM (King), *Zool. Journ.* III, p. 427 (*Str. nana*); Boie, *Isis*, 1826, p. 970; Gray, *Gen. B.* 1, pl. 12; *ferox*, Fras. (nec V.); *leucolaima*, Bp.; *chilensis*, Licht. — Chili, Patagonie.

10.870. PASSERINUM (Lin.); Boie, *Isis*, 1826, p. 976; Dress., *B. Eur.* V, pl. 316; *pusilla*, Daud.; *pygmæa*, Bechst.; *acadica*, Tem. (nec Gm.); *microrhynchum*, Brm. — Europe sept. et centr.

3000. *Var.* ORIENTALIS, Tacz., *Mém. Acad. St.-Pétersb.* XXXIX, p. 128 (1891). — Sibérie.

10.871. SIJU (D'Orb.), in *Ram. Sagra, H. N. Cuba, Ois.*, p. 33, pl. 5; Shpe, *l. c.*, p. 195; *havanensis*, Licht. — Cuba.

10.872. GNOMA, Wagl., *Isis*, 1832, p. 275; Sharpe, *Ibis*, 1875, pp. 58, 259, pl. 1, ff 1, 2; id., *Cat.*, p. 194; *passerinoides*, Audub.; *infuscatum*, Cass. — Amérique N.-W., de la Colombie angl. aux Mgnes Rocheuses et le plateau mexicain.

3001. *Var.* CALIFORNICA, Scl., *P. Z. S.*, 1857, pp. 4, 126; Ridgw,, *Pr. Bost. Soc. N. H.* XVI, p. 95; *gnoma* (pt.), Sharpe. — Amér. N.-W., des côtes de la Colombie angl. à celles de la Calif.

3002. *Var.* HOSKINSI, Brewst., *Auk*, 1888, p. 156. — Basse-Californie.

3003. *Var.* FISHERI, Nels. et Palm., *Auk*, 1894, p. 41; *gnoma* (pt.), Salv. et Godm., *Biol.*, *Aves*, II, p. 35. — Puebla, Mexique.

3004. *Var.* PALMARUM, Nels., *Auk*, 1901, p. 46. — San Blas (Mexique).

3005. *Var.* COBANENSIS, Sharpe, *Ibis*, 1875, p. 259; id., *Cat.*, p. 199, pl. 13, f. 1; *gnoma* (pt.), Salv. et Godm., *l. c.*, p. 35. — Guatémala.

10.873. GRISEICEPS, Sharpe, *Ibis*, 1875, pp. 41, 259, pl. 2, f. 2; id., *Cat.*, p. 196; *pumilum* (pt.), auct. plur. — Amérique centr.

10.874. PUMILUM (Tem.), *Pl. Col.* 39; Kp., *Contr. Orn.*, 1852, p. 105; Sharpe, *l. c.*, p. 198; *minutissima*, Max.; *ferox*, Strickl. (nec V.) — Brésil.

10.875. FEROX (Vieill.), *N. Dict.* VII, p. 22; Sharpe, *l. c.*, p. 200; *ferruginea*, Max.; Tem., *Pl. Col.* 199; *passerinoides*, Tem., *l. c.*, pl. 344; *infuscata*, Tem.; *phalænoides* (pt.), Scl. et Salv. — Amérique mérid. trop.

Digitized by Google

3006. *Var.* PHALÆNOIDES (Daud.), *Traité*, II, p. 206; Sharpe, *l. c.*, p. 203; *ferrugineum*, Tayl.; *infuscata*, Finsch. — Trinidad.

3007. *Var.* RIDGWAYI, Sharpe, *Ibis*, 1875, pp. 55, 259; id., *Cat.*, p. 205; *infuscata*, *jardinii*, *gnoma*, *phalænoides* (pt.), auct. plur. — Texas, Nouv.-Mex., Arizona, Mexique, Amérique centr.

10.876. JARDINEI (Bonap.), *C. R.* XLI, p. 654; Cab., *J. f. O.*, 1869, p. 208; Sharpe, *l. c.*, p. 207; *langsbergii*, Ridgw. (nec Bp.) — Vénézuéla, Ecuador, Colombie jusqu'au Costa-Rica.

10.877. TEPHRONOTUM (Sharpe), *Ibis*, 1875, p. 260; id., *Cat.*, p. 211, pl. 13, f. 2. — ? (Amérique mérid.)

10.878. PERLATUM (Vieill.), *N. Dict.* VII, p. 26; Sharpe, *l. c.*, p. 209; *occipitalis*, Tem., *Pl. Col.* 54; *licua*, Licht.; *pusilla*, Heugl.; *capensis*, Schl.; *senegalensis*, Chapm. — Afrique N.-E., E. et S.

10.879. KILIMENSE, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1893, p. 178. — Kilima-Ndjaro.

10.880. SJOESTEDTI (*sjöstedti*), Rchw., *Orn. Mon.*, 1893, p. 65. — Caméron.

10.881. BRODIEI (Burton), *P. Z. S.*, 1835, p. 152; Schl., *Mus. P.-B.*, *Strig.*, p. 35; Jerd., *B. Ind.* I, p. 146; *tubiger*, *badia*, Hodgs.; *minutilla*, Gould, *B. Asia*, pt. XXII, pl. — Himalaya, Assam, Ténassérim, Malacca et le S. de la Chine.

10 882. PARDALOTUM (Swinh.), *Ibis*, 1863, p. 216; Sharpe, *Ibis*, 1875, p. 259; id., *Cat.*, p. 214. — Formose.

10.883. SYLVATICUM (Bp. ex Müll.), *Consp.* I, p. 40; Schl., *Mus. P.-B.*, *Strig.*, p. 36; Sharpe, *l. c.*, p. 215; Büttik., *Notes Leyd. Mus.* XXI, pl. 13; *borneense*, Sharpe, *Bull. B. O. C.* I, p. 55. — Sum., Bornéo N.-W.

## 1646. TÆNIOGLAUX

*Tænioglaux*, Kaup (1848); *Smithiglaux*, Bp. (1854).

10.884. CAPENSIS (Smith), *S. Afr. Q. Journ.* (2), n° 4, 1, p. 313; id., *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 33; Kp., *Isis*, 1848, p. 769; Sharpe, *l. c.*, p. 223. — Afrique S. du Cap au Nyassaland.

10.885. CASTANEA (Rchw.), *Orn. Monatsb.*, 1893, p. 62. — Andundi (Afr. centr.)

10.886. CASTANOPTERA (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 140; Tem., *Pl. Col.* 98; Kp, *Contr. Orn.*, 1852, p. 106. — Java.

10.887. CASTANONOTA (Blyth), *Cat. B. Mus. A. S. B.*, p. 39; Bp., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1854, p. 544; Schl., *l. c.*, p. 34. — Ceylan.

10.888. RADIATA (Tick.), *J. A. S. Beng.* II, p. 572; Bp., *l. c.*, p. 544; Schl., *l. c.*, p. 34; *perlineata*, Hodgs.; *erythroptera*, Gould; *undulata*, Blyth. — Inde.

3008. *Var.* MALABARICA (Blyth), *J. A. S. Beng.* XV, p. 280; Sharpe, *l. c.*, p. 218; *radiata* (pt.), — Inde S., Ceylan.

Digitized by Google

Blanf., *Faun. Br. Ind.*, *B.* III, p. 306; *cuculoides*, *spadicea*, Jerd.

10.889. CUCULOIDES (Gould), *Cent. Himal. B.*, pl. 4; Schl., *l. c.*, p. 33; *auribarbis*, Hodgs. — Himalaya, Assam, Birmanie.

10.890. WHITELYI (Blyth), *Ibis*, 1867, p. 313; Sharpe, *l. c.*, p. 222; *cuculoides*, Swinh. (nec Gould). — Chine, Haïnan.

### 1647. MICROPALLAS

*Micrathene*, Coues (1866, nec Sundev.); *Micropallas*, Coues (1889).

10.891. WHITNEYI (Coop.), *Pr. Calif. Acad. Sc.*, 1861, p. 118; Coues, *Pr. Philad. Acad.*, 1866, p. 15; Elliot, *B. N. Am.*, pl. 29. — États-Unis S.-W., Mexique, Basse-Californie.

10.892. GRAYSONI (Ridgw.), *Auk*, 1886, p. 333; *socorroensis*, Sharpe, *Hand-List* I, p. 299. — Ile Socorro (Mex. W.)

## SUBF. V. — PHODILINÆ

### 1648. PHODILUS

*Phodilus*, J. Géof. St.-Hil. (1831); *Photodilus*, Gurn. (1894),

10.893. BADIUS (Horsf.), *Zool. Research. Java*, pl. 37; Tem., *Pl. Col.* 318; Géof. St.-Hil., *Ann. Sc. Nat.* XXI, p. 201; Schl., *l. c.*, p. 23; *nipalensis*, Hume. — Himalaya E., Indo-Chine W., Malacca, Java, Bornéo.

10.894. ASSIMILIS, Hume, *Str. Feath.*, 1877, p. 138. — Ceylan.

# FAM. VII. — STRIGIDÆ

### 1649. HELIODILUS

*Heliodilus*, Milne-Edw. (1878).

10.895. SOUMAGNEI, Grandid., *Bull. Soc. Philom.*, 1878, p. 65; M.-Edw. et Grand., *H. Madag., Ois.*, p. 112, pl. 36*a*, *b* et *c*. — Madagascar.

### 1650. STRIX

*Strix*, Lin. (1766); *Aluco*, Flem. (1828); *Hybris*, Nitzsch (1840); *Stridula*, Selys (1842); *Eustrinx*, Webb et Berth. (1844); *Megastrix*, Kp. (1848); *Glaux*, Blyth (1850); *Scelostrix*, *Dactylostrix*, Kp. (1852); *Glyphidiura*, Rchb. (?).

10.896. FLAMMEA (Lin.); Naum., *Vög. Deutschl.*, pl. 47, f. 2; Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* I, p. 119, pl. 27; *alba*, Scop.; *guttata*, Brm.; *bakkamma*, Forst.; *adspersa*, *vulgaris*, *obscura*, Brm. — Scandinavie S., Europe centr. jusqu'en France.

Digitized by Google

3009. *Var.* Kirchhoffi, Brm., *Naumannia*, 1858, p. 219; *paradoxa* et *splendens*, Brm.; *meridionalis*, Koen.; ?*africana*, Bp.; *flammea* (pt.), Dress., *B. Eur.* V, pl. 302. — Iles Britanniques, Europe mérid., Afrique N., iles Canaries.

3010. *Var.* Maculata, Brm., *Naum.*, 1855, p. 270; *margaritata*, Brm. — Soudan, Afrique N.-E.

3011. *Var.* Ernesti, Kleinsch., *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 168. — Sardaigne.

3012. *Var.* Schmitzi, Hart., *Novit. Zool.* VII, p. 534. — Madeire.

3013. *Var.* Insularis, Pelz., *J. f. O.*, 1872, p. 23. — Iles du Cap Vert.

3014. *Var.* Poensis, Fras., *P. Z. S.*, 1842, p. 189; *affinis*, Layard, *B. S. Afr.*, p. 42. — Fernando-Po, Afrique austr., Madagascar.

3015. *Var.* Javanica, Gm., *S. N.* I, p. 295; Jerd., *B. Ind.* I, p. 177; *indica*, Blyth, *Ibis*, 1860, p. 251; Gould, *B. Asia.* pt. XXIV, pl.; ?*pusilla*, Blyth. — Inde, Indo-Chine, iles de la Sonde.

3016. *Var.* Sumbaensis, Hart., *Nov. Zool.* IV, p. 270. — Ile Sumba.

3017. *Var.* Perlata, Licht., *Verz. Doubl.*, p. 59; D'Orb., *Voy. Am. mér.*, *Ois.*, p. 135; Burm., *Th. Bras.* II, p. 137; *var. guatemalæ*, Ridgw. — Amérique centr. et mérid.

3018. *Var.* Pratincola, Bp., *Comp. List*, p. 7; De Kay, *Zool. N. Y.*, *B.*, p. 31, pl. 13, f. 28. — Amér. sept. temp., au S. jusqu'au 41° l. N.

3019. *Var.* Furcata, Tem., *Pl. Col.* 452; Gundl., *J. f. O.*, 1871, p. 377. — Jamaïque.

3020. *Var.* Contempta, Hart., *Nov. Zool.* V, p. 500. — Ecuador N.-W.

3021. *Var.* Bargei, Hart., *Bull. B. O. C.* I, p. 13. — Ile Curaçao.

3022. *Var.* Punctatissima, Gould, in *Darw. Zool. Beagle, B.*, p. 34, pl. 4; Bp., *Consp.* I, p. 55. — Iles Galapagos.

3023. *Var.* Nigrescens, Lawr., *Pr. U. S. Nat. Mus.* I (1878), p. 64. — Ile Dominica (Antilles).

3024. *Var.* Glaucops, Kaup, *Contr. Orn.*, 1852, p. 118; *dominicensis*, Cory, *Bull. Nutt. O. C.*, 1883, p. 95. — St-Domingue.

3025. *Var.* Deroepstorffi, Hume, *Str. Feath.*, 1875, p. 390. — Iles Andaman.

3026. *Var.* Delicatula, Gould, *P. Z. S.*, 1836, p. 140; id., *B. Austr.* I, pl. 31. — Australie, Nouv.-Calédonie, Nouv.-Hébrides, iles Loyalty.

3027. *Var.* Lulu, Peale, *U. S. Expl. Exp.*, *B.*, 1848, p. 74, pl. 21. — Iles Tahiti, Tonga et Samoa.

3028. *Var.* Rosenbergi, Schl., *Ned. Tijdschr. Dierk.* III, p. 181; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 109 (1). — Célèbes.

(1) Dans son *Cat. of Birds* (II, p. 291) M. Sharpe réunit ces variétés au type spécifique et ne reconnaît qu'une espèce très variable. Je pense cependant qu'il y a lieu de distinguer ces différentes formes climatériques. Dans son *Hand-list* (1899), M. Sharpe tombe dans un excès contraire : il considère toutes ces variétés comme autant d'espèces distinctes.



Digitized by Google

10.897. INEXPECTATA, Schl, *Notes Leyd. Mus.* I, p. 59; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 112. — Célèbes N.

10.898. NOVÆ HOLLANDIÆ, Steph, *Gen. Zool.* XIII, 2, p. 61; Sharpe, *l. c.*, p. 503; *personata*, Vig.; Gould, *B. Austr.* I, pl. 29; *cyclops*, Gould, *Syn. B. Austr.*, pt. 3, pl. 50, f. 2. — Australie, Nouv.-Calédonie, îles Loyalty.

3029. *Var.* CAYELII, Hart., *Nov. Zool.* VII, p. 228. — Bourou (Kayeli).

10.899. SOROROCULA, Scl., *P. Z. S.*, 1883, p. 52. — Ile Tênimber.

10.900. CASTANOPS, Gould, *P. Z. S.*, 1836, p. 140; id., *B. Austr.* I, pl. 28; Schl., *Mus. P.-B., Strig.*, p. 7. — Tasmanie.

10.901. AURANTIA, Salvad., *Atti R. Acc. Torino*, XVI, 1881, p. 619; id., *Orn. Pap.* III, p. 512. — Nouv.-Bretagne.

10.902. TENEBRICOSA, Gould, *P. Z. S.*, 1845, p. 80; id., *B. Austr.* I, pl. 30; Schl., *l. c.*, p. 7. — Australie.

10.903. ARFAKI, Schl., *Notes Leyd. Mus.* I, p. 101 (1879). — Nouv.-Guinée (Monts Arfak).

10.904. CAPENSIS, Smith, *S.-Afr. Q. Journ.*, ser. 2, n° 4, pt. 1, p. 317; id., *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 45; Schl., *l. c.*, p. 6; *punctata*, Licht.; Shell., *Ibis*, 1875, p. 66. — Afrique S.

10.905. CABRÆ, Dubois, *sp. nov.* (1). — Congo indépendant.

10.906. CANDIDA, Tick., *J. A. S. Beng.* II, p. 572; Jerd., *Ill. Ind. Orn.*, pl. 30; Schl., *l. c.*, p. 6; *longimembris*, Jerd.; *amauronota*, Cab.; *pithecops*, Swinh.; *walleri*, Digg.; *oustaleti*, Hartl., *P. Z. S.*, 1879, p. 295. — Inde, Indo-Chine, Formose, Philippines, Célèbes, Australie E. et S.-E., Fidji.

10.907. THOMENSIS, Hartl., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1852, p. 2; id., *Orn. W.-Afr.*, p. 21; de Mull., *Descr. de nouv. Ois. d'Afr.*, pl. 15. — Ile St-Thomas (Afrique W.)

# ORD. XI. — HERODIONES (2)

## FAM. I. — IBIDIDÆ (3)

### 1651. IBIS

*Ibis*, Cuv. (1817); *Threskiornis*, Gray (1842); *Pseudibis*, Hodgs. (1844); *Carphibis*, *Inocotis*, *Nipponia*, Rchb. (1852); *Craptocephalus*, Elliot (1877).

10.908. ÆTHIOPICA (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 706; Rüpp., — Afrique, Asie S.-W.

(1) *Supra nigricante-brunnea, maculis albis notata; facie alba, regione periophthalmica nigra; corpore subtus rufo, maculis cordiformibus nigricantibus; subcaudalibus albis; rectricibus brunneis, lateralibus albis immaculatis.* Taille : 37 centimètres; ailes 30; queue 10; tarses 87 millimètres. — Cette espèce est dédiée au Commandant Alph. Cabra, qui l'a découverte au sud des Cataractes en octobre 1901. Le type se trouve au Musée du Congo, à Tervueren.

(2) Voy. : Sharpe, *Catalogue Birds Brit. Mus.* XXVI, pp. 1-327 (1898).

(3) Voy. aussi : Elliot, *P. Z. S*, 1877, pp. 477-510.

Digitized by Google

*S. U.*, p. 122; *religiosa*, Cuv.; Dub., *Ois. Eur.* II, pl. 145; *egretta*, Tem.; *sacer*, Böhm.

3030. *Var.* Bernieri, Bp., *Consp.* II, p. 151; Schl. et Pol., *Faun. Madag.* II, p. 126; Milne-Edw. et Grand., *H.-N. Madag.* II, p. 331, pl. 218-221. — Madagascar.

3031. *Var.* Abbotti, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1893, p. 599; Sharpe, *Cat.* XXVI, p. 264. — Ile Aldabra.

10.909. melanocephala (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 709; Jard. et Sel., *Ill. Orn.* III, pl. 120; Schl., *Mus. P.-B.*, *Ibis*, p. 15; *leucon*, Tem., *Pl. Col.* 481; *macei*, Wagl.; *bengala*, Cuv.; *aimolene*, Hodgs.; *propinqua*, Swinh., *P. Z. S.*, 1870, p. 428. — Inde, Ceylan, Indo-Chine, Chine, Japon, Java.

10.910. molucca, Cuv., *Règn. an.* I, p. 520; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 380; *strictipennis*, Gould; id., *B. Austr.* VI, pl. 46; *stricticollis*, Jerd. (err.) — Australie, Nouv.-Guinée, Salawati, Waigiou, Céram.

10.911. spinicollis, James., *Edinb. New-Phil. Journ.*, 1855, p. 215; Jerd. et Sel., *Ill. Orn.*, 1857, pl. 17; Schl., *l. c.*, p. 12; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 45. — Australie.

10.912. papillosa, Tem., *Pl. Col.* 504; Schl., *l. c.*, p. 11; *papillata*, Wagl. — Inde, Bornéo.

10.913. davisoni (Hume), *Str. Feath.*, 1875, p. 300; *papillosus*, Oat. (nec Tem.); *armandi*, Oust. — Indo-Chine.

10.914. nippon, Tem., *Pl. Col.* 551; id. et Schl., *Fna. Jap.*, p. 117, pl. 71; *temmincki*, Rchb. — Sibér. E., Mandchour., Japon, Form., Haïn.

3032. *Var.* Sinensis, David, *C. R.* LXXV, p. 64; id. et Oust., *Ois. Chine*, p. 434, pl. 117. — Chine.

10.915. gigantea, Oust., *Bull. Soc. Philom.*, 1877, p. 25. — Cochinchine.

## 1652. GERONTICUS

*Geronticus*, Wagl. (1832); *Comatibis*, Rchb. (1852).

10.916. calvus (Bodd.), *Tabl. Pl. Enl.*, p. 52; Wagl., *Isis*, 1832, p. 1232; *Pl. Enl.* 867; *niger*, Gm.; *gonocephala*, Wag. — Afrique S.

10.917. comatus (Ehr.); Rüpp., *Neue Wirb.*, p. 49; Schl., *l. c.*, p. 9; Dress., *B. Eur.* VI, p. 329, pl. 408; ?*eremita* (Lin.), Rothsch., Hart. et Kleinschm., *Novit. Zool.* IV, pp. 371-377, pl. 8, 9, 10; *calvus* (pt.), Levaill., Blanf., Danf. — Asie mineure, Afrique N.-E.

## 1653. BOSTRYCHIA

*Bostrychia*, Rchb. (1852).

10.918. carunculata (Rüpp.), *Neue Wirb.*, p. 49, pl. 19; Schl., *l. c.*, p. 10; Rchb., *Grallæ*, pl. 83, f. 1011. — Afrique N.-E.

Digitized by Google

### 1654. HAGEDASHIA

*Hagedashia*, Bp. (1855); *Parnopio*, Heine et Rchw. (1890).

10.919. CAFFRENSIS (Licht.), Cat. Mus. Hamb.; Bp., *Consp.* II, p. 152; *hagedash* et *chalcoptera*, Vieill.; id., *Gal. Ois.*, pl. 246; *leucocephalus*, Rchw., *Vög. Deut.-Ost Afr.*, p. 55. — Afrique tropicale et S.

### 1655. THERISTICUS

*Theristicus*, Wagl. (1832).

10.920. CAUDATUS (Bodd.), *Tabl. Pl. Enl.*, p. 57; *Pl. Enl.* 976; Salvad., *Ibis*, 1900, p. 506; *albicollis*, Gm.; *mandurria*, Drap.; *melanopis* (pt.), auct. plur. (nec Gm.); *columbianus*, Finsch, *Not. Leyd. Mus.* XXI, p. 23 (juv.); *melanopsis* (pt.), Sharpe. — Guyane, Vénézuéla, Colombie, Brésil, Bolivie, Paraguay, Uruguay, Argent. N.

10.921. MELANOPIS (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 655; Salvad., *Ibis*, 1900, p. 511; *albicollis*, Less. (nec Gm.), *Voy. Coq.* I, p. 242; *melanops*, Darw.; *melanopsis*, Bibra; *caudatus* (pt.), auct. plur. (nec Bodd.) — Magellan, Patagonie, Argentine S., Chili, Pérou W.

10.922. BRANICKII, Berl. et Stolzm., *Ibis*, 1894, p. 404; Salvad., *Ibis*, 1900, p. 515, pl. 9 et 10; *melanopis* (pt.), auct. plur.; *caudatus* (pt.), Ell., Tacz.; *melanopsis* (pt.), Sharpe, *Hand.-l.* I, p. 186. — Haut-Pérou, Ecuador.

### 1656. HARPIPRION

*Harpiprion*, Wagl. (1832); *Molybdophanes*, Rchb. (1852).

10.923. CAYENNENSIS (Gm.), *S. N.* I, p 652; *Pl. Enl.* 820; Schl., *l. c.*, p. 8; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 420; *sylvatica*, Vieill.; *dentirostris*, Wagl. — Brésil, Guyane, Vénézuéla, Colombie, Ecuador.

10.924. CÆRULESCENS (Vieill.), *N. Dict.* XVI, p. 18; Schl., *l. c.*, p. 9; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 419; *plumbea*, Tem., *Pl. Col.* 255. — Du Brésil centr. au Paraguay et Argentine.

### 1657. PHIMOSUS

*Phimosus*, Wagl. (1832).

10.925. INFUSCATUS (Licht.), *Verz. Doubl.*, p. 75; Burm., *Th. Bras.* III, p. 422; *nudifrons*, Spix, *Av. Bras.* II, p. 69, pl. 86. — Argentine, Brésil jusqu'en Colombie.

### 1658. LOPHOTIBIS

*Lophotibis*, Rchb. (1852).

10.926. CRISTATA (Bodd.), *Tabl.*, p. 51; *Pl. Enl* 841; Schl., *l. c.*, p. 6; M.-Edw. et Grand., *H.-N. Madag.*, p. 536, pl. 222-25. — Madagascar E. et N.-E.

Digitized by Google

10.927. OLIVACEA (Du Bus), *Bull. Acad. Brux.*, 1837, p. 105; id., *Esq. Orn.*, pl. 3; ?Büttik., *Notes Leyd. Mus.* VII, p. 243; *ochracea*, Bp. (1). — Guinée, île Principe, ? Gabon.

## 1659. LAMPRIBIS

*Lampribis*, Elliot (1877).

10.928. RARA, Rothsch., Hart. et Kleinschm., *Novit. Zool.* IV, p. 377; *olivacea*, Ell. (nec Du Bus), *P. Z. S.*, 1877, p. 507, pl. 51. — Afrique W. (Libéria ?).

## 1660. CERCIBIS

*Cercibis*, Wagl. (1832).

10.929. OXYCERCA (Spix), *Av. Bras.*, p. 69, pl. 87; Schl., *l. c.*, p. 8; Wagl., *Isis*, 1832, p. 1232. — Amazone, Guyane.

## 1661. PLEGADIS (2)

*Plegadis*, Kaup (1829); *Tantalides*, Wagl. (1832); *Falcinellus*, Gray (1841, nec Bechst., 1803, nec Vieill., 1816); *Plegadornis*, Brm. (1855).

10.930. FALCINELLUS (Lin.); Dress., *B. Eur.* VI, p. 335, pl. 409; *castaneus*, Briss.; Dubois, *Fne. ill., Ois.* II, p. 376, pl. 241; *rufa*, Scop.; *igneus, viridis*, Gm.; *sacra*, Tem.; *chichi*, Dumt.; *mexicanus*, Ord.; *cuprea*, Brm.; *ordi, bengalensis, peregrina*, Bp.; *major, minor*, Brm.; *erythrorhynchus*, Cab.; *autumnalis*, Doderl. — Europe S., acc. centr., Asie S., Australie, îles de la Sonde, Afrique, États-Unis E. jusqu'en Floride, Jamaïque, Cuba.

3033. *Var.* GUARAUNA (Lin.); Burm., *Th. Bras.* III, p. 425; Bd., Cass. et Lawr., *B. N. Am.*, pl. 87; *mexicanus*, Gm.; *chichi*, Vieill.; *chalcopterus*, Tem., *Pl. Col.* 51; *erythrorhyncha*, Gould; *ordi*, auct. plur. (nec Bp.); *brevirostris*, Peale; *falcinellus* (pt.), auct. plur.; *igneus*, Scl. et Salv. (nec Gm.); *thalassina*, Ridgw. — De l'Orégon au S. des États-Unis, grandes Antilles, Amérique centr. et mérid. jusqu'en Patagonie, îles Sandwich.

(1) MM. Rothschild, Hartert et Kleinschmidt pensent que l'*Ibis olivacea* de Du Bus n'est autre chose qu'un *Hagedashia caffrensis*, tandis que l'Ibis décrit et figuré sous le même nom par M. Elliot est une autre espèce pour laquelle ils proposent le nom de " *rara* " (*Novit. Zool.* IV, pp. 376-77). Le type de l'*Ibis olivacea* est au Musée de Bruxelles et n'a que fort peu de rapport avec l'Hagedash, mais il diffère également de l'oiseau figuré dans le mémoire de M. Elliot (*Proc. Zool. Soc.*, 1877, pl. 51). Les deux espèces sont donc parfaitement distinctes quoique provenant toutes deux de l'Afrique occidentale; mais comme elles ont été confondues jusqu'ici, il n'est pas encore possible de dire exactement l'habitat de chacune d'elles. M. le Cte Salvadori m'informe qu'il a reçu de M. Fea un Ibis provenant de l'île Principe, qui est parfaitement semblable à celui figuré par Du Bus; ceci tranche définitivement la question.

(2) Voir la note à la page 520 au sujet du terme de *Falcinellus* adopté par beaucoup d'auteurs.

Digitized by Google

3034. *Var.* Ridgwayi (Allen), *Bull. Mus. C.-Z.*, 1876, p. 335; Tacz., *Orn. Pérou*, III, p. 416; *ordi, falcinellus* et *igneus*, auct. plur. (pt.) — Pérou, Bolivie.

3035. *Var.* Humeralis, De Vis, *Rep. Brit. New-Guin.*, 1898, p. 90, — Nouv.-Guinée S.-E.

### 1662. EUDOCIMUS

*Eudocimus*, Wagl. (1832); *Guara*, *Leucibus*, Rchb. (1852).

10.931. albus (Lin.); Wagl., *Isis*, 1832, p. 1232; Audub., *B. Am.* VI, p. 54, pl. 360; Burm., *Th. Bras.* III, p. 426; *coco*, Jacq.; *griseus*, Gm.; *longirostris*, Wagl. — États-Unis du S., Amér. centr., Amazone, Pérou, gr. Antilles.

10.932. ruber (Lin.); Audub., *B. Am.* VI, p. 55, pl. 359; Dubois, *Orn. Gal.*, p. 55, pl. 25; *fuscus* et *minutus*, Lin.; *leucopygus*, Spix, *Av. Bras.*, p. 70, pl. 88. — Haut-Amazone, Brésil N., Guyane, grandes Antilles et S. des États-Unis.

## FAM. II. — PLATALEIDÆ

### 1663. PLATALEA

*Platea*, Briss. (1760); *Platalea*, Lin. (1766); *Spatherodia*, *Leucerodia*, Rchb. (1852); *Platibis*, Bp. (1855).

10.933. leucerodia, Lin.; Dress., *B. Eur.* VI, p. 319, pl. 407; Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* II, p. 371, pl. 240; *leucopodius*, Gm.; *nivea*, Cuv.; *leucerodius*, Naum.; *pyrrhops*, Hodgs.; *major*, Tem. et Schl., *F. J.*, p. 119, pl. 75. — Europe centr. et mér., Afrique E., Asie centr., Chine, Japon, Inde.

10.934. regia, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 106; id., *B. Austr.* VI, pl. 50; *melanorhynchos*, Rchb.; *latirostrum*, Ellm.; *intermedia*, Grant, *Ibis*, 1889, p. 52, pl. 1, ff. 2, 2ᵃ. — Australie jusqu'aux Moluques.

10.935. tenuirostris, Tem., *Man. d'Orn.* I, p. 103 (1820); Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* II, p. 1126, pl. 50, f. 1; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag.*, *Ois.*, p. 524, plˢ 215-17; ?*alba* et ?*cristata*, Scop.; *nivea*, Burch.; *chlororhynchos*, Drap.; *telfairii*, Vig.; *nudifrons*, Less.; *luzoniensis*, Bp. — Afrique, Madagascar.

10.936. minor, Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 120, pl. 76; Sharpe, *Cat.* XXVI, p. 50; Grant, *Ibis*, 1889, p. 54, pl. 1; ff. 3, 3ᵃ, 6; *japonica*, Rchw., *J. f. O.*, 1877, p. 159. — Corée, Chine, Japon, Formose.

Digitized by Google

10.937. FLAVIPES, Gould, *P. Z. S.*, 1837, p. 106; id., *B. Austr.* VI, pl. 49; Schl., *Mus. P.-B., Ciconii*, p. 24; Sharpe, *l. c.*, p. 51. — Australie.

### 1664. AJAJA

*Ajaja*, Rchb. (1852); *Mystrorhamphus*, Heine (1890).

10.938. MEXICANA (Gamb.), *Journ. Phil. Acad.* I, 1849, p. 222; *ajaja*, Lin.; Audub., *B. Am.* VI, p. 72, pl. 362; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 412; *rosea*, Rchb. (ex Briss.); Rchw., *J. f. O.*, 1877, p. 157. — États-Unis S.-E., Amérique centr. et mér. jusqu'à l'Argentine.

## FAM. III. — CICONIIDÆ

## SUBF. I. — TANTALINÆ

### 1665. TANTALUS

*Tantalus*, Lin. (1766); *Tantalides*, Rchb. (1852); *Tantalops*, Coues (1884).

10.939. LOCULATOR, Lin.; Audub., *B. Am.* VI, p. 64, pl. 361; Schl., *Mus. P.-B., Ciconiæ*, p. 17; *nandapoa*, Vieill.; *plumicollis*, Spix. — S. des États-Unis, Amérique centr. et mér.

### 1666. PSEUDOTANTALUS

*Pseudotantalus*, Ridgw. (1883).

10.940. LEUCOCEPHALUS (Forst.), *Ind. Zool.*, p. 20, pl. 10; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 125, pl. 247; Schl., *l. c.*, p. 17; *rodopteron*, Hodgs.; *indicus*, Cuv.; *longimembris*, Swinh. — Inde, Indo-Chine, Chine.

10.941. CINEREUS (Raffl.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, 1822, p. 327; Sharpe, *Cat.*, p 326; *lacteus*, Tem., *Pl. Col.* 352; Schl., *l. c.*, p. 18. — Malacca, Java, Sumatra.

10.942. IBIS (Lin.); *Pl. Enl.* 389; Schl., *l. c.*, p. 18; Fch. et Hartl., *Vög. Ostafr.*, p. 729; *rhodinopterus*, Wagl.; *longirostris*, Brm. — Afrique trop., Madagascar.

## SUBF. II. — CICONIINÆ

### 1667. CICONIA

*Ciconia*, Briss. (1760); *Sphenorhynchus*, Hempr. et Ehr. (1832, nec Max., 1831) *Melanopelargus*, Rchb. (1852); *Abdimia*, Bp. (1855).

10.943. ALBA, Bechst., *Naturg. Deutschl.* IV, p. 82 (1793); Dress., *B. Eur.* VI, p. 297, pl. 405; Dubois, *Fne.* — Europe centr. et mér., Asie S.-W. jusqu'au

Digitized by Google

*Ill.*, *Ois.* II, p. 358, pl. 238; *A. ciconia*, Lin.; *albescens*, *nivea*, *candida*, *major*, Brm.; *asiatica*, *azretti*, *orientalis*, *mycteriorhyncha*, Severtz.; *azreth*, Bogd. — N.del'Inde,Afrique.

10.944. BOYCIANA, Swinh., *P. Z. S.*, 1873, p. 513; Scl., *P. Z. S.*, 1874, pp. 2, 306, pl. 1; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 450. — Sibérie E., Corée, Japon.

10.945. NIGRA (Lin.); Dress., *B. Eur.* VI, p. 309, pl. 406; *fusca*, Briss.; Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* II, p. 366, pl. 239; *Melanop. niger*, Rchb.; *chrysopelargus*, Licht. — Europe, à l'E. jusqu'en Mongolie, Chine et Inde; Afrique.

10.946. ABDIMII, Licht., *Verz. Doubl.*, p. 76; Cretzchm. in *Rüpp. Atl.*, p. 11, pl. 8; Empr. et Ehr., *Symb. Phys.*, fol. F, pl. 5; Schl., *Mus. P.-B.*, *Ciconiæ*, p. 5; *sphenorhyncha*, Bp. — Afrique trop., Arabie (accid. Espagne).

## 1668. DISSOURA

*Dissoura*, Cab. (1850); *Diplocercus*, Jerd., ex Blyth (1864); *Dissura*, Butl. (1879).

10.947. EPISCOPUS (Bodd.), *Tabl.*, p. 54; *Pl. Enl.* 906; *leucocephala*, Gm.; Schl., *l. c.*, p. 9; *umbellata*, Wagl.; *biclavata*, Hodgs.; *bicaudata*, Tick.; *microscelis*, Gray; *pruyssenaerii*, Heugl., *J. f. O.*, 1863, p. 29. — Afrique tropic., Inde, Ceylan, Indo-Chine, Malacca, îles Indo-Malaises, Célèbes.

3056. *Var.* STORMI (W. Blas.), *Geogr. Ges. u. Naturh. Mus. Lübeck*, II, 1896, p. 90; id., *Orn. Monatsb.*, 1896, p. 180. — Bornéo S.

## 1669. EUXENURA

*Euxenura*, Ridgw. (1878).

10.948. MAGUARI (Gm.), *S. N.* I, p. 623; Vieill., *Gal. Ois.*, p. 138, pl. 254; Gould, *B. Eur.* IV, pl. 285; *pillus*, Mol.; *jaburu*, Spix; *dicrura*, Rchw., *J. f. O.*, 1877, p. 169. — Amérique mérid. jusqu'au Chili et Argentine.

## 1670. ANASTOMUS

*Anastomus*, Bonn. (1790); *Hians*, Lacép. (1801); *Rynchoschasme*, Herm. (1804); *Empharis*, Raf. (1815); *Chænorhamphe*, Dumt. (1817); *Chenorhamphus*, Gray (1848); *Hiator*, Rchb. (1852).

10.949. OSCITANS (Bodd.), *Tabl.*, p. 55; *Pl. Enl.* 932; Jerd., *B. Ind.* III, p. 765; *coromandeliana*, Gm.; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 133, pl. 251; *pondiceriana*, Gm.; *albus*, *cinereus*, Vieill.; *indicus*, Less.; *typus*, Tem. — Inde, Ceylan, Cochinchine.

Digitized by Google

10.950. LAMELLIGERUS, Tem., *Pl. Col.* 256; *capensis*, Less. — Afrique tropicale.
3037. *Var.* MADAGASCARIENSIS, M.-Edw., *C. R.* XCI, p. 1037 (1881); id. et Grand., *H. N. Madag.*, p. 519, pl. 211-14. — Madagascar.

## 1671. XENORHYNCHUS

*Xenorhynchus*, Bonap. (1855).

10.951. ASIATICUS (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 670; Hume et Davis., *Str. F.*, 1878, p. 469; *indica*, Lath.; *australis*, Shaw; Gr. et Hardw., *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 64; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 51; *leucoptera* et *xenorhynchus*, Wagl. — Inde, Birmanie, Malacca, Nouv.-Guin., Australie N.

## 1672. EPHIPPIORHYNCHUS

*Ephippiorhynchus*, Bonap. (1855).

10.952. SENEGALENSIS (Shaw), *Tr. Linn. Soc.* V, p. 35, pl. 3; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 139, pl. 255; *ephippiorhyncha*, Tem.; Cretzschm., in *Rüpp. Atl.*, p. 5, pl. 3. — Afrique tropicale.

## 1673. MYCTERIA

*Mycteria*, Lin. (1766).

10.953. AMERICANA, Lin.; *Pl. Enl.* 817; Schl., *l. c.*, p. 11; Tacz., *Orn. Pérou*, III, p. 411; *C. mycteria*, Licht. — Amér. mérid. et centr. jusqu'au Texas.

## 1674. LEPTOPTILUS

*Leptoptilos*, Less. (1831); *Argala*, Hodgs. (1838); *Cranopelargus*, Glog. (1842); *Osteorophea*, Hodgs. (1844).

10.954. DUBIUS (Gm.), *S. N.* I, p. 624; *argala*, Lath.; Schl., *l. c.*, p. 13; *marabou*, Tem., *Pl. Col.* 300; *migratoria*, Hodgs.; *nudifrons*, Jerd.; *immigratoria*, Hodgs. — Inde, Indo-Chine.

10.955. JAVANICUS (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 188; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 449; *crinita*, Buch.; *capillata*, Tem., *Pl. Col.* 312; *nudifrons*, *cristata*, Mc Clell.; *calva*. Jerd. — Inde, Ceylan, Chine S., Indo-Chine, Malac., gr. îles de la Sonde.

10.956. CRUMENIFERUS, Less. (ex Cuv.), *Traité d'Orn.*, p. 585; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 1114; *argala*, Tem., *Pl. Col.* 301 et auct. plur. (nec Lath.); *marabou*, Denh. et Clapp.; *vetula*, Sund. — Afrique tropicale.
3038. *Var.* RUPPELLI, Wirth., *Naum.*, 1852, pt. 2, p. 56; Rchw., *J. f. O.*, 1877, p. 165. — Région du Nil Blanc.



Digitized by Google

## FAM. IV. — PHŒNICOPTERIDÆ (1)

### 1675. PHOENICOPTERUS

*Phœnicopterus*, Lin. (1766); *Phœnicorodias*, *Phœniconaias*, Gray (1869).

10.957. RUBER (Lin., pt.); Wils., *Am. Orn.* VIII, p. 45, pl. 66; Audub., *B. Am.* VI, p. 169, pl. 375; *bahamensis*, Less.; *americanus*, Max.; *erythræus* (pt.), Verr.; Gray, *Ibis*, 1869, p. 442, pl. 14, f. 6; *glyphorhynchus*, Gr., *l. c.*, pl. 14, f. 5; ?*ignipalliatus*, Berl. — Amérique trop. et subtrop., du Sud des États-Unis au Para et les îles Galapagos.

10.958. ROSEUS, Pall. (ex Barr., 1745), *Zoogr. Rosso-As.* II, p. 207; Dress., *B. Eur.* VI, p. 343, pl. 410; *ruber* (pt.), Lin. et auct. plur.; *major*, Dum.; *europæus*, Sw.; *ignipalliatus*, Gray (nec d'Orb.); *antiquus*, Tem.; *plinii*, Rchb.; *erythræus* (pt.), Verr. et auct. plur.; *platyrhynchus*, *minor*, *pygmæus*, Brm.; *antiquorum*, Gray; *andersoni*, Brooks; *roseus*, *var. parva*, Severtz. — Europe mérid. jusqu'en Asie centr. et le lac Baïkal, Inde, Ceylan, Afrique.

10.959. CHILENSIS, Mol., *Hist. Nat. Chili*, p. 214; *Pl. Enl.* 63; Schl., *Mus. P.-B.*, *Anseres*, p. 117; *ruber* (pt.), Vieill.; *ignipalliatus*, d'Orb. et Géoff. St.-Hil., *Ann. Sc. Nat.* XVII, 1829, p. 454; id., *Mag. de Zool.*, 1832, pl. 2; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 422. — Sud de l'Amér. mérid., au N. jusqu'à l'Uruguay, le Chili et le Pérou central.

10.960. MINOR, Géoffr., *Bull. Sc. Soc. Philom.*, 1798, p. 98, pl., ff. 1, 2, 3; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 183, pl. 273; Tem., *Pl. Col.* 419; *parvus*, Vieill.; *capensis*, Smith; *blythi*, Bp.; *erythræus*, Hartl. et auct. plur. (nec Verr.); *rubidus*, Feild. — Afrique S.-E. et N.-E., Madagascar, Inde N.-W.

### 1676. PHOENICOPARRUS

*Phœnicoparrus*, Bonap. (1856); *Lipocentrus*, Sundev. (1872); *Phœnicoparra*, Stejn. (1885).

10.961. ANDINUS (Philippi), *Anal. Univ. de Chile*, 1854, p. 337; id., *Reise Wüste Atacama*, p. 164, *Zool.*, pl. 4, 5, f. *a*; Scl., *Argent. Orn.* II, p. 119; Salvad., *Cat. B.*, p. 21. — Chili.

10.962. JAMESI (Rahmer), *Anal. Univ. de Chile*, 1886, p. ?; Sclat., *P. Z. S.*, 1886, p. 399, pl. 36; Salvad., *l. c.*, p. 22; *andinus* (pt.), auct. plur. (nec Philippi). — Tarapacá (Chili), Pérou S.

(1) Voy. : Salvadori, *Catalogue Birds Brit. Mus.* XXVII, pp. 8-22 (1895).

Digitized by Google

## FAM. V. — SCOPIDÆ (1)

### 1677. SCOPUS

*Scopus*, Gm. (1788); *Cepphus*, Wagl. (1827).

10.963. UMBRETTA, Gm., *S. N.* I, p. 618; *Pl. Enl.* 796; Schl., *Mus. P.-B., Ciconiæ*, p. 15; Fsch. et Hartl., *Vög. Ostafr.*, p. 727; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag., Ois.*, p. 514, pl. 208; *Cepphus scopus*, Wagl.; *fusca*, Forst. — Afrique trop., Arabie, Madagascar.

## FAM. VI. — BALÆNICEPIDÆ

### 1678. BALÆNICEPS

*Balæniceps*, Gould, 1851.

10.964. REX, Gould, *P. Z. S.*, 1851, p. 1, pl. 35; Jard., *Contr. Orn.*, 1851, p. 11, pl. 68; Park., *Tr. Z. S.* IV, pp. 269-351, pl. 64-67. — Haut-Nil Blanc.

## FAM. VII. — ARDEIDÆ

### SUBF. I. — ARDEINÆ

### 1679. ARDEA

*Ardea*, Lin. (1766); *Lepterodas*, Hemp. et Ehr. (1832); *Demiegretta*, Blyth (1846); *Typhon*, *Agamia*, Rchb. (1852); *Ardeomega*, *Audubonia*, Bonap. (1855); *Florida*, *Hydranassa*, Baird (1858); *Megerodius*, Heine (1860); *Pyrrherodias*, Fch. et Hartl. (1870); *Doryphorus*, Rchw. (1877); *Dichromanassa*, Ridgw. (1878); *Phoyx*, Stejn. (1887); *Glaucerodius*, *Lepterodius*, *Doriponus*, Heine et Rchw. (1890); *Melanophoyx*, Sharpe (1894); *Notophoyx*, Sharpe (1898).

10.965. GOLIATH, Cretzchm., in *Rüpp. Atl.*, p. 39, pl. 36; Tem., *Pl. Col.* 474; *nobilis*, Blyth; *gigantodes*, Licht. — Afrique, Madagascar, ? Inde.

10.966. SUMATRANA, Raffl., *Tr. Linn. Soc.* XIII, 1822, p. 325; Jerd., *B. Ind.* III, p. 740; *typhon*, Tem., *Pl. Col.* 475; *rectirostris*, Gould, *B. Austr.* VI, pl. 54; *robusta*, *nobilis*, Bp.; *temmincki*, Rchb. — Aracan, Ténass., Malac., îles de la Sonde, Célèbes, Australie.

10.967. INSIGNIS, Hodgs., *Icon. ined. Grall.*, pl. 61, f. 2; Sharpe, *Cat.*, p. 70; *nobilis*, Gray (nec Blyth). — Himalaya E.

(1) Voy.: Sharpe, *Catalogue Birds Brit. Mus.* XXVI (1898).

Digitized by Google

10.968. HUMBLOTI, M.-Edw. et Grand., *Hist. N. Madag.*, *Ois.*, p. 546. — Madagascar E.

10.969. MELANOCEPHALA, Vig. et Childr., in *Denh. et Clapp. Voy.* II, *App.*, p. 201; Dress., *B. Eur.* VI, p. 225, pl. 397; *atricollis*, Wagl.; Des M., *Ic. Orn.*, pl. 30. — Afrique (accid. Europe S.)

10.970. COCOI, Lin.; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 390; *cærulescens, coco* et *fuscicollis*, Vieill.; *plumbea*, Merr.; *maguari*, Spix, *Av. Bras.*, pl. 90; *major*, Fras.; *palliata*, Hartl. — Amérique mérid.

10.971. CINEREA, Lin.; Dress., *B. Eur.* VI, p. 207, pl. 395; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 315, pl. 230; *major*, Lin.; *johannæ*, Gm.; *shenana*, Sand.; *vulgaris*, Bechst.; *brag*, Géoff.; *leucophæa*, Gould; *cineracea*, *minor*, etc., Brm. — Europe, Asie, Archipel Indien, Afrique, Madagascar, Australie.

10.972. HERODIAS, Lin.; Audub., *B. Amer.* VI, p. 122, pl. 369; *hudsonius*, Lin. — Amér. du N. et centr., Ant., Vén., Colomb.

3039. *Var.* WURDEMANNI, Baird, *B. N. Am.*, p. 669, pl. 86; *occidentalis* (pt.), B, Br. et Rid., *Wat. B. N. Am.*, p. 6. — Floride S.

3040. *Var.* WARDI, Ridgw., *Bull. Nutt. Orn. Cl.* VII, p. 5; Ridgw., *Man. N.-Am. B.*, p. 129. — Floride.

10.973. OCCIDENTALIS, Audub., *B. Am.*, pl. 281; id., *B. Am.* in-8°, VI, p. 110, pl. 368; Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 128. — Floride S., grandes Antilles.

10.974. PURPUREA, Lin.; Dress., *B. Eur.* VI, p. 217, pl. 396; *purpurascens*, Briss.; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 321, pl. 231; *rufa*, *variegata*, Scop.; *caspia*, *purpurata*, *botaurus*, *badia*, Gm.; *monticola*, La Peyr.; *pharaonica*, Bp. — Europe centr. et mér., Asie S.-W., Afrique, Madagascar.

3041. *Var.* MANILLENSIS, Meyen, *Acta Acad. Leop.-Car.* XVI, *Suppl.*, p. 102; Sharpe, *Cat.* XXVI, p. 65, pl. 1; *purpurea* (pt.), auct. plur. — Inde, Ceylan, Chine, Malacca, gr. îles de la Sonde, Célèbes.

10.975. CÆRULEA, Lin.; *Pl. Enl.* 349; Audub., *B. Am.* VI, p. 148, pl. 372; Schl., *Mus. P.-B. Ardeæ*, p. 22; ? *thula*, Mol.; ? *ohula*, Gm.; *cyanopus*, Gm.; ? *plumbea*, Brown; *cærulescens*, Lath.; *chalybea*, Steph.; *ardesiaca*, Less. (nec Wagl.); ? *nivea*, Gosse; *poucheti*, Bp. — États-Unis E., Amér. centr., Antilles, Colombie, Vénézuéla, Guyane, Brésil, Ecuador.

10.976. ARDESIACA, Wagl., *Syst. Av.*, *Ardea*, p. 189, sp. 20; Schl. et Pol., *Faune de Madag.* II, p. 122; *albicollis*, Vieill. (fem.); *calceolata*, Du Bus, *Bull. Acad. Brux.* IV, 1838, p. 40, pl. 2; *flavimana*, Sund.; *concolor*, *puella*, Heugl. — Afrique trop., Madagascar.

3042. *Var.* VINACEIGULA (Sharpe), *Cat. B.* XXVI, p. 105; pl. 1ª; *ardesiaca* (pt.), Gurn., *Ibis*, 1871, p. 264. — Transvaal.

Digitized by Google

10.977. RUFA, Bodd., *Tabl.*, p. 54; *Pl. Enl.* 902; Schl., *l. c.*, p. 21; ?*æquinoctialis*, Lin.; *rufescens*, Gm.; *pealei*, Bp.; id., *B. Am.* IV, p. 96, pl. 26, f. 1; *cubensis*, Lemb., *Av. Cuba*, p. 84, pl. 13, f. 1. — Sud des États-Unis, Mexique, Guatém., grandes Antilles.

10.978. NOVÆ-HOLLANDIÆ, Lath., *Ind. Orn.* II, p. 701; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 53; Schl., *l. c.*, p. 28; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 342; *leucops*, Wagl. — Austr., Nouv.-Zélande, Nouv.-Calédonie, Nouv.-Guinée, Mol.

10.979. PACIFICA, Lath., *Ind. Orn.*, *Suppl.*, p. 65; Jard. et Sel., *Ill. Orn.*, pl. 90; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 52; *bullaragang*, Wagl. — Australie.

10.980. ARUENSIS, Gray, *P. Z. S.*, 1858, pp. 188, 197 (*juv.*); Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 344; Sharpe, *Cat.*, p. 113, pl. 1[b]; *picata*, Gould (nec Raffl.); id., *B. Austr.* VI, pl. 62; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 816; *landsbergi*, Schl., *Notes Leyd. Mus.* I, p. 113 (*juv.*); *flavirostris*, Sharpe, *l. c.*, p. 654. — Australie N., Nouv.-Guinée, îles Arou, Ténimber, Timorl., Amboine, Célèbes.

10.981. CULARIS, Bosc, *Act. de la Soc. d'H. N. de Paris*, I, 1792, p. 4, pl. 2; Schl., *l. c.*, p. 23; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag.*, *Ois.*, p. 531; *albicollis*, Vieill. (mas.); *jugularis* (pt.), Less.; *schistacea*, Hempr. et Ehr., *Symb. Phys. Zool.* II, fol. 1, pl. 6; *affinis*, Gray; *cineracea*, Cab. (nec Brm.), *Von der Deck. Reis.* III, p. 49, pl. 17. — Afrique trop., Madagascar.

3043. *Var.* ASHA, Syk., *P. Z. S.*, 1832, p. 157; Jerd., *B. Ind.* III, p. 747; *gularis*, auct. plur. (nec Bosc.) — Asie S.-W., de la Perse jusqu'à Ceyl. (côtes).

10.982. TRICOLOR, P.-L.-S. Müll., *S. N.*, *Anh.*, p. 111; *Pl. Enl.* 350; Sharpe, *l. c.*, p. 126; *leucogaster*, Bodd.; Schl., *l. c.*, p. 9. — Guyane, Brésil, ? Vénézuéla.

3044. *Var.* RUFICOLLIS (Gosse), *B. Jam.*, p. 338, pl. 93 (*juv.*); *ludoviciana*, auct. plur. (nec Gm.); Wils., *Am. Orn.* VIII, p. 13, pl. 64, f. 1; *leucogaster*, d'Orb.; *leucoprymna*, Licht.; *tricolor*, auct. plur. (nec Müll.); *cyanirostris*, Cory. — États-Unis tempér. E., Amérique centrale, Antilles.

10.983. AGAMI, Gm., *S. N.* I, p. 629; *Pl. Enl.* 858 et 859; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 396; *fusca*, Lath.; *gamia*, Sw.; *picta*, Rchb. — Amérique centr., Colombie, Guyane, Amazone, Pérou.

10.984. SACRA, Gm., *S. N.* I, p. 640; *Pl. Enl.* 926; Bull., *B. New Zeal.*, p. 228, pl. 24, f. 1; *novæ-guineæ*, Gm.; *matook*, Vieill.; *nigerrima*, Wagl.; *jugularis*, Forst. et auct. plur.; Schl., *l. c.*, p. 23; *æquinoctialis*, *novæ-hollandiæ*, Forst.; *greyi*, Gray; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 61; *concolor*, Blyth; *atra*, Cuv.; *albolineata*, Gray; *andamanensis*, Beav.; *ringeri*, Steju. — Australie, Nouv.-Zélande, Océanie, Archipel Indien, Asie S.-E., îles Andaman et Nicobar.

Digitized by Google

## 1680. HERODIAS

*Herodias*, Boie (1822); *Garzetta*, Kaup (1829); *Egretta*, Bp. (1850); *Casmerodius*, Glog. (1842); *Leucophoyx*, *Mesophoyx*, Sharpe (1894).

10.985. ALBA (Lin.); Dress., *B. Eur.* VI, p. 251, pl. 598; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 323, pl. 252; *candida*, Briss.; *egrettoides*, Gm.: *egretta*, Bechst.; *flavirostris*, *melanorhynchos*, Wagl.; *modesta*, Gray; *torra*, Frankl.; *orientalis*, *nigrirostris*, Bp.; *victoriæ*, Macg.; *latiefii* et *brachyrhynchus*, Brm. — Europe S. et centr., Asie centr. et S., Afrique, Madagascar.

3045. *Var.* TIMORIENSIS (Less.), *Traité d'Orn.*, p. 575; Sharpe, *l. c.*, p. 98; *flavirostris*, auct. plur. (nec Vieill.); *longicollis*, Meyen; *syrmatophorus*, Gould, *B. Austr.* VI, pl. 56; *egretta*, auct. plur. (pt., nec Gm.); *alba*, auct. plur. (pt., nec Lin.); *intermedia*, Fsch. (nec Wagl.); *modesta*, Swinh. (nec Gray); *torra*, Salvad. (nec Frankl.) — Chine N., Japon, Formose, Archipel Indien, Nouv.-Guin., Australie, Tasman., Nouv.-Zélande.

10.986. EGRETTA (Gm.), *S. N.* I, p. 629; Wils., *Am. Orn.* VII, p. 106, pl. 61, f. 4; Audub., *B. Am.* VI, p. 132, pl. 370; ?*galatea*, Mol.; ?*thula*, Gm.; *leuce*, Licht.; *americana*, Sw.; *alba* (pt.), auct. plur. (nec L.); *californica*, Bd., Cass. et Lawr. — Amérique tempérée, centr. et mérid. jusqu'en Patagonie.

10.987. INTERMEDIA (Wagl.), *Isis*, 1829, p. 659; Fsch. et Hartl., *Vög. N.-O. Afr.*, p. 686; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 852; Sharpe, *l. c.*, p. 85; *melanopus*, Wagl.; *egrettoides*, Tem. (nec Gm.); *plumiferus*, Gould; id., *B. Austr.* VI, pl. 57; Sharpe, *l. c.*, p. 87; *brachyrhynchos*, Brm.; Sharpe, *l. c.*, p. 87. — Afrique N.-E., E. et S., Asie mérid., Japon, Arch. Indien, Philipp., Célèbes, Mol., Nouv.-Guin., Austr.

10.988. EULOPHOTES, Swinh., *Ibis*, 1860, p. 64; id., *P. Z. S.*, 1863, p. 320; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 824, pl. 44; ?*melanopus*, Blyth (nec Wagl.); *nivea* (pt.), Rchw.; *sacra* (pt.), Sharpe; ?*immaculata*, Mey. et Wg. (syn.) — Japon, Formose, Chine S., Ténass., Andam., Célèb., Nouv.-Guin. S., Australie, Tasm.

10.989. GARZETTA (Lin.); Dress., *B. Eur.* VI, p. 259, pl. 599; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 331, pl. 255; *nivea*, Gm.; *xanthodactyla*, Raf.; *orientalis*, Gray; *jubata*, *lindermayeri*, Brm.; *nigrirostris*, Hodgs. (nec Gr.) — Europe mérid., Asie centr. et S., Japon, Philipp., Afrique.

3046. *Var.* NIGRIPES (Tem.), *Man. d'Orn.* IV, p. 376 (1840); Sharpe, *l. c.* p. 122; *immaculata*, Gould, *B. Austr.* VI, pl. 58; *garzetta* (pt.), auct. plur.; *melanopus*, Bp. — Java, Archipel Malais, Australie.

10.990. CANDIDISSIMA (Gm.), *S. N.* I, p. 633; Audub., *B. Am.* VI, p. 163, pl. 374; Tacz., *Orn. Pérou*, III, p. 393; *nivea*, Jacq. (nec Gm.); *carolinensis*, Ord.; *lactea*, Less.; ?*thulæ*, Bp. — États-Unis, Amérique centr. et mérid. jusqu'au Chili et Argentine.

Digitized by Google

## 1681. BUBULCUS

*Bubulcus*, Bp. (1854).

10.991. LUCIDUS (Rafin.), *Caratteri*, p. 3; Salvad., *Ucc. Ital.*, p. 243; Sharpe, *Cat.* XXVI, p. 213; *ibis*, Lin. (pt.); *ruficapilla*, Vieill.; *A. bubulcus*, Aud.; Dress., *B. Eur.* VI, p. 243, pl. 400, f. 1; *veranii*, Roux; *russata*, Wagl. (pt.); Gould, *B. Eur.* IV, pl. 278; *coromanda* (pt.), auct. plur. (nec Bodd.); *coromandelica*, Rüpp.; *ruficrista*, Bp. — Europe mérid. jusqu'en Asie centr., Afrique, Madagascar.

10.992. COROMANDUS (Bodd.), *Tabl.*, p. 54; *Pl. Enl.* 910; Schl., *Mus. P.-B.*, p. 30; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 441; *coromandeliensis*, Steph.; *affinis*, Horsf.; *flavirostris*, Vieill.; *russata* (pt.), Wagl.; *caboja*, Frankl.; *flavicans*, Hodgs.; *coromandensis*, Bp.; *coromandelianus*, Swinh. — Asie orient., Inde, Ceylan, Moluques, Célèbes, îles de la Sonde, Japon S., Formose, Philipp.

## 1682. ARDEOLA

*Ardeola*, Boie (1822); *Buphus*, Boie (1826); *Erythrocnus*, Sharpe (1894).

10.993. RALLOIDES (Scop.), *Ann.* I, p. 88; Dress., *B. Eur.* VI, p. 251, pl. 400, f. 2; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 335, pl. 234; *marsigli* et *pumila*, Lép.; *comata*, Pall.; *castanea*, Gm.; *grisea*, Bodd. (nec L.); *squaiotta*, *senegalensis*, ?*erythropus*, Gm.; *botaurulus*, Schr.; *griseo-alba*, Bosc; *audax*, Lap.; *deaurata*, Merr.; *illyricus*, Brm.; *subralloides*, Würt.; *leucoptera*, Chapm.; *luteus*, Dod. — Europe mérid. accid. centr., à l'E. jusqu'à la Mer Caspienne, Afrique.

3047. *Var.* IDÆ (Hartl.), *J. f. O.*, 1860, p. 167; *elegans*, Roch et Newt., *Ibis*, 1863, p. 170; *leucoptera*, Schl. (nec Bodd.) — Madagascar.

10.994. GRAYI (Syk.), *P. Z. S.*, 1852, p. 158; Gr. et Hardw., *Ill. Ind. Zool.* II, pl. 48; Sharpe, *l. c.*, p. 207; ?*leucoptera*, Bodd.; ?*malaccensis*, Gm.; *macronata*, Hodgs.; *leucoptera*, auct. plur. — Asie S.-W., Inde, Ceylan, Indo-Chine, Malacca.

10.995. BACCHUS (Bp.), *Consp. Av.* II, p. 127; Sharpe, *l. c.*, p. 211; *leucoptera* (pt.), auct. plur.; *prasinoscelis*, Swinh., *Ibis*, 1860, p. 64. — Sibér. E., Japon, Chine, Birm., Malac., Bornéo, Andaman.

10.996. SPECIOSA (Horsf.), *Trans. Linn. Soc.* XIII, p. 189; id., *Zool. Research. in Java*, pl. 62; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 838; *pseudoralloides*, Brm.; *malaccensis*, Less.; *A. leucoptera speciosa*, Schl. — Java, Lombock, Sumbawa, Sumba, Bornéo, Célèbes.

10.997. RUFIVENTRIS (Sundev.), *Oefvers. K. Vet.-Akad., Stockh.*, 1850, p. 110; Ayres, *Ibis*, 1871, p. 265, pl. 9; *semirufa*, Schl., *l. c.*, p. 33. — Afrique S. jusqu'au Zambèze, Damara.

Digitized by Google

## 1683. ARDETTA

*Ardetta*, Gray (1842); *Erodiscus*, Glog. (1842); *Nannocnus*, Stejn. (1887).

10.998. MINUTA (Lin.); Dress., *B. Eur.* VI, p. 259, pl. 401; Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* II, p. 339, pl. 255; *pusillus*, Brm. (nec V.) — Europe centr. et mér., Asie S.-W., Afrique.

3048. *Var.* PAYESI (Hartl. ex Verr.), *J. f. O.*, 1858, p. 42; Neum., *J. f. O.*, 1898, p. 283. — Afrique W. et S.

3049. *Var.* PODICEPS (Bp.), *Consp. Av.* II, p. 134; Fsch. et Hartl., *Vög. Ostafr.*, p. 708; M.-Edw. et Grand., *H. Madag. Ois.*, p. 359, pl. 229ᵃ, 230, 230ᵃ; *minuta* (pl.), auct. plur. (nec Lin.); *australis*, Schl., *l. c.*, p. 39; *pusilla*, Rchw. (nec V.); *podicipes*, Shpe, *l. c.*, p. 225. — Afrique E. et centr., Madagascar.

10.999. SINENSIS (Gm.), *S. N.* I, p. 642; Schl., *l. c.*, p. 40; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 448; *lepida*, Horsf.; *melanophis*, *melanoptera*, Cuv.; *pulchra*, Hume. — Japon, Corée, Chine, Inde, Ceylan, Indo-Chine, Malacca, Archipel Malais, Nouv.-Guin., Austr.

11.000. EXILIS (Gm.), *S. N.* I, p. 643; Wils., *Am. Orn.* VIII, p. 37, pl. 65, f. 4; Audub., *B. Am.* VI, p. 100, pl. 366; ? *spadicea*, Gm. — Amér. sept., au N. jusqu'aux gr. lacs, Am. centr., gr. Antilles.

3050. *Var.* NEOXENA, Cory, *Auk*, 1886, p. 262; Sharpe, *l. c.*, p. 233; *neoxerius*, Scott, *Auk*, 1892, p. 141. — Du Canada E. à la Floride.

11.001. ERYTHROMELAS (Vieill.), *N. Dict.* XIV, p. 422; Burm., *Th. Bras.* III, p. 413; *exilis* (pl.), Gr., Scl. et Salv.; *variegata*, Léot. (nec Scop.); *involucris*, Tacz. (nec V.), *Orn. Pér.* III, p. 399. — Amérique mérid., de Panama et Guyane au S. du Brésil.

11.002. PUSILLA (Vieill.), *N. Dict.* XIV, p. 432; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 68; *maculata*, Lath. (nec Bodd.) et auct. plur.; *punctata*, Gray; *novæ-zelandiæ*, Purdie. — Australie, Nouv.-Zélande.

11.003. INVOLUCRIS (Vieill.), *Enc. méth.* III, p. 1127; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1869, p. 634; Scl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 101, pl. 17; *exilis* (pl.), Gr.; *erythromelas* (pl.), Hartl., Burm., Rchw. — Brésil S., Paraguay, Chili, Patagonie N., Argentine.

11.004. CINNAMOMEA (Gm.), *S. N.* I, p. 643; Gr. et Hardw., *Ill. Ind. Zool.*, pl. 66, f. 1 (*juv.*); Schl., *l. c.*, p. 40; Schrenck, *Reis. Amurl.*, p. 447, pl. 14, ff. 1, 2; *nebulosa*, Horsf. — Inde, Ceylan, Nicobar, Sib. E., Chine, Indo-Ch., Form., Phil., Cél., îles de la Sonde.

11.005. EURHYTHMA, Swinh., *Ibis*, 1873, p. 73, pl. 2; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 856, pl. 45; *cinnamomea*, Schr., *Reis. Amurl.* II, p. 447, pl. 13, f. 3 (*juv.*); *sinensis*, Tacz. (nec Gm.); *riedeli*, Mey. et Wg. — Japon, Sibérie E., Chine, Cochinchine, Bornéo N., Célèbes N., Java.

Digitized by Google

Cornell University Library

1 CASPOPHAGA WESTERMANI. 2 COLUMBA UNICINCTA.

Digitized by Google

## Publications de M. Alph. DUBOIS

**en vente à la librairie de Henri LAMERTIN, 20, rue du Marché-au-Bois, à Bruxelles.**

---

**Faune illustrée des Vertébrés de la Belgique.** *Oiseaux.* — 4 vol. in 4° avec 427 pl. coloriées à la main et cartes (1876-1893). — *Il ne reste plus qu'un exemplaire, dont les 3 planches manquantes sont remplacées par des aquarelles peintes par l'auteur* . . . fr. 400

**Le même ouvrage**, avec cartes mais sans atlas, 2 vol. in-4° . . 75

**Les Lépidoptères de la Belgique**, leurs chenilles et leurs chrysalides, décrits et figurés d'après nature sur l'une des plantes nourricières. 5 vol. in-4° avec 451 pl. coloriées à la main (1861-1884) . 275

**Revue des derniers systèmes ornithologiques et nouvelle Classification proposée pour les Oiseaux.** Broch. in-8°, Paris, 1891 . . . . . 1 25

**Histoire populaire des animaux utiles de la Belgique.** Nouvelle édition illustrée, revue et augmentée, — 1 vol. in-12, Bruxelles, 1889 . . . . . 1 75

**Les Animaux nuisibles de la Belgique** *(Vertébrés).* — 1 vol. in-12, illustré. *Avec la liste de tous les Vertébrés observés en Belgique.* Bruxelles 1895 . . . . . 2

**Tableau synoptique des oiseaux insectivores** qu'il est défendu de prendre en tout temps. — Nouveau tirage en chromo . . . 2 50

**Revue critique des oiseaux de la famille des Bucérotidés**, broch. in-8°, avec 2 pl. col., Bruxelles, 1884 . . . . 2

**Manuel de zoologie**, *conforme aux progrès de la science*, 1 vol. in-12, avec 177 gravures intercalées dans le texte. Bruxelles 1882 . . 6

**Aperçu du Règne animal** ou premières notions de zoologie, 1 vol. in-12, avec 166 gravures. (Ouvrage adopté pour l'Enseignement moyen.) — Bruxelles 1882 . . . . . 3

**Conspectus systematicus et geographicus avium Europæarum**, broch. in-8°, Bruxelles 1871 . . . . . 2

**Archives cosmologiques.** *Revue des sciences naturelles.* 1 vol. in-8°, avec 13 pl. — Bruxelles 1867 . . . . . 8

**Traité d'Entomologie horticole, agricole et forestière.** 1 vol. in-8°, avec 4 pl. col. *(Ouvrage couronné.)* — Gand, 1865 *(Épuisé.)*

---

Aug. Lameere, **Manuel de la Faune de Belgique** (Animaux non insectes). Tome I, in-18 avec figures dans le texte. Bruxelles, 1895. 5 50
Tome II (Insectes inférieurs), in-18, 858 pages et 721 figures dans le texte. 1900. Cart., toile anglaise . . . . . 7 00


Bruxelles. — Polleunis & Ceuterick, imprimeurs, rue des Ursulines, 37.

SYNOPSIS AVIUM

# NOUVEAU
# MANUEL D'ORNITHOLOGIE

PAR

Alphonse DUBOIS

Docteur en sciences naturelles,
Conservateur au Musée Royal d'Histoire naturelle de Belgique,
Officier de l'Ordre de Léopold,
Membre du Comité international et permanent d'Ornithologie,
de la Commission permanente d'étude des collections du Musée de l'État Indépendant du Congo,
Membre honoraire, correspondant ou effectif de plusieurs Sociétés savantes.

**Fascicule XIII**

**HERODIONES (fin), GRALLATORES, PALAMEDEÆ, ANSERES (1re partie).**

**Pl. XV**

BRUXELLES
H. LAMERTIN, éditeur
20, RUE DU MARCHÉ-AU-BOIS

1903

# AVIS

Nous rappellerons que les tables alphabétiques paraîtront à la fin de la publication, en même temps que le supplément; ce dernier comprendra les nouvelles espèces décrites depuis la mise sous presse du *Synopsis avium*, ainsi que les corrections.

Le prix du fascicule restera fixé à 6 francs pour tous les abonnés qui se feront inscrire avant la fin de la publication.

## ON SOUSCRIT à

BRUXELLES, chez l'éditeur, M. H. **Lamertin**, 20, rue du Marché-au-Bois.
AMSTERDAM, chez MM. **Feikema, Caarelsen & Cie**.
BERLIN, chez M. R. **Friedländer & Sohn**, Carlstr. 11, N. W.
LONDRES, chez MM. **William & Norgate**, 14, Henrietta street.
MADRID, chez M. **Romo y Fussel**.
MILAN, chez M. **Ulrico Hœpli**, 37, Corso Vittorio Emanuele.
OXFORD, chez M. **James Parker & Cie**, 27, Broad street.
PARIS, chez M. **P. Klincksieck**, 3, rue Corneille.
NEW-YORK, chez M. **G.-E. Stechert**, 9 East 16th street.

## 1684. ARDEIRALLA

*Ardeiralla*, Verr. (1855); *Dupetor*, Heine (1890); *Xanthocnus* et *Erythrophoyx*, Sharpe (1894); *Ardeirallus*, Sharpe (1898).

11.006. STURMI (Wagl.), *Syst. Av.*, *Ardea*, p. 191, sp. 37; Gray, *Gen. B.* III, pl. 150; Schl., *l. c.*, p. 45; *gutturalis*, Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 91; *plumbea*, Sw.; *gularis*, Rchb.; *pusilla*, Heugl. (nec V.); *eulopha*, Heugl., *J. f. O.*, 1862, p. 407. — Afrique trop., Canaries.

11.007. FLAVICOLLIS (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 701; Gr. et Hardw., *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 66, f. 2; Jerd., *Ill. Ind. Orn.*, pl. 16; Schl., *l. c.*, p. 45; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 364; *nigra*, Vieill.; *picata*, Raffl.; *australis*, *bilineata*, Less. ex Cuv. — Inde, Ceylan, Chine S. et centr., Indo-Ch., Malacca, gr. îles de la Sonde, Célèbes.

3051. *Var.* GOULDI (Bonap.), *Consp. Av.* II, p. 132; Finsch, *Neu-Guin.*, p. 183; Sharpe, *Cat.*, p. 249; *flavicollis*, Gould, *B. Austr.* VI, pl. 65 (et auct. plur., nec Lath.); *australis*, Schl., *l. c.*, p. 46; *javanica*, Scl. (nec Horsf.) — Australie.

3052. *Var.* NESOPHILA (Sharpe), *Bull. B. O. C.* III, n° XVI, p. 32; id., *Cat. B.* XXVI, p. 250, pl. 3, f. 1; *flavicollis* (pt.), Scl., Finsch. — Archipel Bismarck.

3053. *Var.* MELÆNA (Salvad.), *Atti R. Accad. Sc. Torino*, XIII, 1877-78, p. 1186; id., *Orn. Pap.* III, p. 367; *flavicollis* (pt.), auct. plur.; *melas*, Sharpe, *l. c.*, p. 251, pl. 3, f. 2. — Moluques.

11.008. WOODFORDI, Grant, *P. Z. S.*, 1888, p. 202; Sharpe, *l. c.*, p. 252, pl. 4. — Iles Salomon.

11.009. PRÆTERMISSA (Sharpe), *B. O. Cl.* III, n° XI, p. 4; id., *Cat.*, p. 253, pl. 5. — Batjan, Céram (Moluques).

## 1685. ZEBRILUS

*Zebrilus*, Bonap. (1855); *Microcnus*, Rchw. (1877).

11.010. PUMILUS (Bodd.), *Tabl.*, p. 54; *Pl. Enl.* 763; Scl. et Salv., *Nomencl.*, p. 126; Sharpe, *l. c.*, p. 241; Forb., *Bull. Liverp. Mus.* III, pl. 1, 2; *undulata*, Gm.; Schl., *l. c.*, p. 56; *philippensis*, Gm.; *radiolata*, Wagl. — Guyane, Brésil.

## 1686. BUTORIDES

*Butorides*, Blyth (1849); *Ocniscus*, Cab. (1856).

11.011. ATRICAPILLA (Afzel.), *Acta Acad. Stockh.* XXV, 1804, p. 264; Schl., *l. c.*, p. 42; Fsch. et Hartl., *Vög. Ostafr.*, p. 701; *thalassina*, Sw.; *sturmi*, Licht., Brm., Hartl. (nec Wagl.) — Afrique tropicale.



Digitized by Google

3054. *Var.* Rutenbergi (Hartl.), *P. Z. S.*, 1880, p. 39; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag.*, p. 557, pl. 227 *d*; *atricapilla* (pt.), Sharpe. — Madagasc., ?Comores.

3055. *Var.* Brevipes (Hempr. et Ehr.), *Symb. Phys.*, fol. *m*, note 2; Bp., *Consp.* II, p. 129; Sharpe, *l. c.*, p. 278; *atricapilla* (pt.), auct. plur. (nec Afzel.) — Côtes de la mer Rouge, Arabie, Socotra.

11.012. striata (Lin.); *Pl. Enl.* 908; Bd., Br. et Ridgw., *Water. B. N. Am.* I, p. 50; Sharpe, *l. c.*, p. 175; *grisea*, Bodd.; *torquata*, Shaw; *cyanura*, *fuscicollis*, Vieill.; *scapularis*, Licht.; Schl., *l. c.*, p. 42. — Amérique mérid. trop. jusqu'à l'Argentine.

3056. *Var.* Robinsoni, Richm., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1895, p. 655. — Ile Margarita.

11.013. javanica (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 190; Schl., *l. c.*, p. 43; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 422; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 359; *chloriceps* vel *virescens*, Hodgs., *Icon. ined. Grallæ*, *App.*, pl. 42; *thalassina*, Kel. (nec Sw.); *atricapilla* (pt.), E. Newt. — Inde, Ceylan, Chine S., Indo-Ch., Malacca, Philippines, îles de la Sonde, Célèbes.

3057. *Var.* Amurensis (Schrenck), *Reis. Amurl.* I, p. 441; Sharpe, *Cat.* XXVI, p. 181; *scapularis*, Tem. et Schl., *F. J.*, p. 116 (nec Licht.); *macrorhyncha*, auct. plur. (nec Gould); *javanica*, Swinh. (nec Horsf.); *griseus*, Blak. et Pryer; *schrenkii*, Bogd. — Amour, Japon, Chine (Philippines, Formose, gr. îles de la Sonde en hiver).

3058. *Var.* Spodiogastra, Sharpe, *Bull. B. O. Club*, III, p. 17; id., *Cat.*, p. 182, pl. 2; *javanica* (pt.), auct. plur. — Iles Andaman et Nicobar.

3059. *Var.* Stagnatilis (Gould), *P. Z. S.*, 1847, p. 221; id., *B. Austr.* VI, pl. 67; *macrorhyncha*, Gould, *l. c.*, pl. 66; *patruelis*, Peale; *viridiceps*, Gray; *javanica* (pt.), auct. plur. — Austr., Nouv.-Guin., Mol., Timor, Flores, îles Salom., Nouv.-Caléd., Fidji, etc.

3060. *Var.* Albolimbata, Rchw., *Orn. Mon.*, 1900, p. 140. — Iles Chagos.

11.014. sundevalli (Rchw.), *J. f. O.*, 1877, p. 255; Sharpe, *l. c.*, p. 185; *javanicus*, Scl. et Salv. (1870, nec Horsf.); *plumbea*, auct. plur. (nec Merr.) — Iles Galapagos.

11.015. virescens (Lin.); *Pl. Enl.* 909 et 912; Audub., *B. Am.* VI, p. 105, pl. 367; Schl., *l. c.*, p. 41; *chloroptera*, *maculata*, Bodd.; *ludoviciana*, Gm. — Amérique du Nord et centr., Vénézuéla, Antilles.

3061. *Var.* Frazari (Brewst.), *Auk*, 1888, p. 83. — Basse-Californie.

3062. *Var.* Anthonyi (Mearns), *Auk*, 1895, p. 257. — Ét.-Unis S.-W., Mex.

3063. *Var.* Bahamensis (Brewst.), *Auk*, 1888, p. 83. — Iles Bahama.

3064. *Var.* Saturata, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 577. — Ile Swan (mer Caraïbe).

3065. *Var.* Brunnescens (Lemb.), *Av. Cuba*, p. 84; Rchw., *J. f. O.*, 1877, p. 255; *virescens* (pt.), Sharpe. — Cuba.

Digitized by Google

## 1687. SYRIGMA

*Syrigma*, Ridgw. (1878); *Syricter*, Heine et Rchw. (1890).

11.016. SIBILATRIX (Tem.), *Pl. Col.* 271; Burm., *Th. Bras.* III, p. 407; Schl., *l. c.*, p. 36; *cyanocephalus*, Heine et Rchw. (nec Mol.); *cyanocephalum*, Sharpe, *l. c.*, p. 170. — Brésil S., Uruguay, Paraguay, Argentine.

## 1688. NYCTICORAX

*Nycticorax*, Rafin. (1815); *Nyctiardea*, Sw. (1837); *Scotæus*, Keys. et Blas. (1840); *Nycterodius*, Macg. (1842); *Calherodius*, Bp. (1855).

11.017. GRISEUS (Lin.); Dress., *B. Eur.* VI, p. 269, pl. 402; Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* II, p. 351, pl. 237; *Ard. nycticorax*, Lin.; *kwakwa* et *ferruginea*, S. Gm.; *nævia*, Bodd.; *jamaicensis*, *hoactli*, *gardeni*, *maculata*, Gm.; *europæus*, Steph.; *vulgaris*, *brevipes*, Ehr.; *orientalis*, *badius*, *meridionalis*, Brm.; *discors*, Nutt.; *americana*, Bp.; *ardeola*, Tem.; *guttatus*, Heugl.; *ægyptius*, Gurn. — Europe centr. et mér., Asie centr. et mér., Japon, les îles de la Sonde jusqu'à Célèbes, Afrique, Madagascar, Amér. du 50°l.N.à l'Ecuador.

11.018. CYANOCEPHALUS (Molina), *Saggio St. Chili*, p. 260; Sharpe, *l. c.*, p. 156; *nycticorax*, Kittl., *Kupf. Vög.*, pt. 3, p. 26, pl. 35, f. 1 (nec L.); *americanus*, Gould (nec Bp.); *gardeni* et *nævius* (pt.), Gr.; *obscurus*, Licht.; Schl., *l. c.*, p. 39. — Du Chili à Magellan.

3066. *Var.* TAYAZUGUIRA (Vieill.), *N. Dict.* XIV, p. 417; Sharpe, *l. c.*, p. 155; *gardeni* (pt.), Gr. et auct. plur.; *americanus*, Tsch., *Faun. Per.*, pp. 50, 297 (nec Bp.); *obscurus*, Scl. et auct. plur. (nec Licht.); Tacz., *Orn. Per.* III, p. 406; Scl. et Huds., *Arg. Orn.* II, p. 105. — Brésil centr., Pérou jusqu'en Patagonie et les îles Malouines.

11.019. LEUCONOTUS (Wagl.), *Syst. Av.*, *Ardea*, p. 189, sp. 33; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 1088; Cab. in *v. d. Deck. Reis.* III, p. 50, pl. 18; *cucullata*, Wagl.; Schl., *l. c.*, p. 60; *ocularia*, Müll., *Naum.*, 1851, Heft 4, p. 29. — Afrique tropicale.

11.020. MAGNIFICUS, Grant, *Ibis*, 1899, p. 586; id., *P. Z. S.*, 1900, pl. 53. — Haïnan.

11.021. CALEDONICUS (Gm.), *S. N.* I, p. 626; Schl., *l. c.*, p. 59; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 63; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 841; *maculata*, Lath.; *novæ-hollandiæ*, *australis*, Vieill.; *sparmanni*, Wagl.; *ferruginea*, Forst.; *australasiæ*, Gray; *manillensis* (pt.), Gr.; Hartl. et Finsch., *P. Z. S.*, 1872, pp. 89, 117. — Australie, îles de l'Amirauté et Pelew, Célèbes.

Digitized by Google

3067. *Var.* Crassirostris, Vig., *Voy. Blossom, Zool.*, p. 27; Seeb., *P. Z. S.*, 1889, p. 586; Sharpe, *l. c.*, p. 161; *caledonica*, Kittl., *Kupf. Vög.* III, p. 27, pl. 35, f. 2 (nec Gm.) — Iles Bonin.

11.022. manillensis, Vig., *P. Z. S.*, 1831, p. 98; Fras., *Zool. Typ.*, pl. 66; Schl., *l. c.*, p. 60; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 845; *caledonica*, Meyen (nec Gm.); *minahassæ*, Mey. et Wg., *J. f. O.*, 1894, p. 115. — Philippin., Bornéo N., Labuan, Célèbes N.

3068. *Var.* Mandibularis, Grant, *P. Z. S.*, 1888, p. 203; Sharpe, *l. c.*, p. 161; *manillensis* (pt.), auct. plur.; *caledonicus*, Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 372 (pt., nec Gm.) — Iles Salomon et Archipel Bismarck.

## 1689. NYCTANASSA

*Nycterodius*, Rchb. (1852, nec Macg.); *Nyctanassa*, Stejn. (1887).

11.023. violacea (Lin.); *Pl. Enl.* 899; Audub., *B. Am.* VI, p. 89, pl. 364; *jamaicensis*, *cayennensis*, Gm.; *sexsetacea*, Vieill.; *callocephala*, Wagl. — Amér. N.-E. et centr., Antilles, Amér. mérid. jusqu'au Brésil.

11.024. pauper (Scl. et Salv.), *P. Z. S.*, 1870, pp. 323, 327; Sharpe, *Cat.*, p. 134, pl. 1[c]; *violaceus*, Gould (nec L.) — Iles Galapagos.

## 1690. GORSACHIUS

*Gorsachius*, Puch. (1851); *Gorsakius*, Bp. (1855); *Butio*, Rchw. (1877).

11.025. melanolophus (Raffl.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 326; Blyth, *Ibis*, 1865, p. 38, 1867, p. 173; Sharpe, *l. c.*, p. 166; *limnophilax*, Tem., *Pl. Col.* 581; *limnicola*, Rchb.; *typus*, Puch.; *philippensis*, Mart.; *goisagi*, Hartl. et Fsch. (nec Tem.); *kutteri*, Cab. — Assam, Indo-Chine, Inde, Ceylan, îles Nicobar, Andaman, de la Sonde, Philip., Haïnan, Formose.

11.026. goisagi (Tem.), *Pl. Col.* 582; id. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 116, pl. 70; *melanolophus*, auct. plur. (nec Raffl.) — Japon (Philippines et Formose en hiver).

## 1691. BOTAURUS

*Botaurus*, Briss. (1760); *Butor*, Sw. (1837).

11.027. stellaris (Lin.); Dress., *B. Eur.* VI, p. 281, pl. 403; Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* II, p. 345, pl. 236; *lacustris*, *arundinaceus*, Brm.; *tarayensis*, Hodgs. — Eur., Asie et Afr., du 59° au 20° env. I.N., plus au S. en Afr.

3069. *Var.* Capensis (Schl.), *Mus. P.-B.*, *Ardeæ*, p. 48; Ayres, *Ibis*, 1869, p. 300; *stellaris* (pt.), auct. plur. (nec Lin.) — Afrique australe.

Digitized by Google

11.028. POECILOPTILUS (Wagl.), *Syst. Av.*, *Ardea*, sp. 28; Bp., *Consp.* II, p. 135; Bull., *B. New Zeal.* (éd. 2), II, p. 142, pl. 37; *melanotus*, Gray; *australis*, Gould, *B. Austr.* VI, pl. 64; *poioceloptera*, Hutt.; *pœcilopterus*, Walk. — Australie, Nouv.-Zélande, Nouv.-Calédonie.

11.029. LENTIGINOSUS (Montag.), *Orn. Dict., Suppl.*; Gould, *B. Eur.* IV, pl. 281; Dress., *B. Eur.* VI, p. 289, pl. 404; *stellaris, var.* Gm.; *minor*, Wils.; Audub., *B. Am.* VI, p. 94, pl. 365; *mokoho*, Vieill.; *hudsonius*, Merr.; *americana*, Sw.; *mugitans*, Cab.; *adspersus*, Licht.; *freti hudsonis*, Schl., *l. c.*, p. 49. — Amérique septentr. et centr. jusqu'au 58° l. N. (accidentellement aux îles Britanniques).

11.030. PINNATUS (Wagl., ex Licht.), *Isis*, 1829, p. 663; Schl., *l. c.*, p. 49; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 181, pl. 91; *brasiliensis*, Max. (nec Lin.); *lentiginosus*, Burm., *Th. Bras.* III, p. 408 (nec Mont.) — Brésil, Guyane (accid. Nicaragua).

## 1692. TIGRISOMA

*Tigrisoma*, Swains. (1828); *Heterocnus*, *Tigrornis*, Sharpe (1898).

11.031. BRASILIENSE (Lin.); *Pl. Enl.* 790 (*juv.*) et 860; Gr., *List Grall. Br. Mus.*, p. 81; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 401; Rchw., *J. f. O.*, 1877, p. 250; *cocoi* et *lineata*, Bodd.; *lineatum*, Sharpe, *l. c.*, p. 194; *tigrina*, *flava*, Gm. — Guyane, Amazone jusqu'au Pérou, Ecuador, Colombie, Trinidad.

11.032. EXCELLENS, Ridgw., *Pr. U.S. Nat. Mus.*, 1887, p. 595. — Costa-Rica, Honduras.

11.033. MARMORATUM (Vieill.), *N. Dict.* XIV, p. 415; Berl., *J. f. O.*, 1887, pp. 30, 123; Scl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 104; *braliliense*, Hartl., White (nec L.); *tigrina*, Hartl. (nec Gm.); *fasciatum*, Salv. (nec Such). — Paraguay, Argentine.

11.034. BAHIÆ, Sharpe, *Cat. B.* XXVI, p. 196, pl. 2ᵃ; *tigrinum*, Bp., *Consp.* II, p. 556 (nec Gm.) — Bahia (Brésil).

11.035. FASCIATUM, Such, *Zool. Journ.* II, p. 117; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, pl. 92; *lineata*, Max. (nec Gm.); Schl., *l. c.*, p. 53. — Brésil S., E.

11.036. SALMONI, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1875, p. 38, 1879, p. 542; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 402. — Colombie, Ecuador, Pérou.

11.037. CABANISI, Heine, *J. f. O.*, 1859, p. 407; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 95, pl. 48; Schl., *l. c.*, p. 51; *tigrinum*, Scl. (1858-60); *brasiliense*, Moore (nec L.) — Amérique centr., du Mexique à Panama.

11.038. LEUCOLOPHUM, Jard., *Ann. Mag. N. H.*, 1846, p. 86; Hartl., *Orn.-W. Afr.*, p. 225; Schl., *l. c.*, p. 50. — Afrique W.

Digitized by Google

### 1693. ZONERODIUS

*Zonerodius*, Salvad. (1882).

11.039. HELIOSYLUS (Less.), *Voy. Coq., Zool.* I, p. 722, pl. 44; id., *Traité d'Orn.*, p. 572; Salvad., *Orn. Pap.* III, pp. 368, 565; *phaethon*, Rchw. — Nouv.-Guinée, Salawati, Iles Arou.

### 1694. COCHLEARIUS

*Cochlearius*, Briss. (1760); *Cancroma*, Lin. (1766); *Cymbops*, Wagl. (1827).

11.040. CANCROPHAGUS (Lin.); *Pl. Enl.* 38, 869; Heine et Rchw., *Nomencl. Mus. Hein.*, p. 310; *Cancroma cochlearia*, Lin.; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 129, pl. 249; Sharpe, *Cat.*, p. 165. — Amérique mérid. trop.

3070. *Var.* ZELEDONI (Ridgw.), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1885, p. 93; Stejn., *Stand. Nat. Hist.* IV, p. 178; Sharpe, *l. c.*, p. 165; *cochlearia* (pt.), auct. plur. (nec L.) — Amérique centr. du Mexique à Panama.

# ORD. XII. — GRALLATORES

## SUBORD. I. — ALECTORIDES (1)

## FAM. I. — ARAMIDÆ

### 1695. ARAMUS

*Aramus*, Vieill. (1816); *Notherodius*, Wagl. (1829).

11.041. SCOLOPACEUS (Gm.), *S. N.* I, p. 647; *Pl. Enl.* 848; Vieill., *N. Dict.* VIII, p. 301; Audub., *B. Am.*, pl. 377; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 387; *carau*, V.; *gigas*, Licht. (1823); *ardeoides*, Spix; *guarauna*, Max. — Amérique mérid., des Guyane, Vénézuéla et Pérou jusqu'au N. de l'Argentine.

11.042. PICTUS (Bartr.), *Trav. Florida*, p. 291 (1792); Coues, *Pr. Philad. Acad.*, 1875, p. 354; *scolopaceus* (pt.), auct. plur. (nec Gm.); Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 134, pl. 252; *giganteus*, Bp., *Journ. Acad. Philad.*, 1825, p. 31 (nec Licht.); *guarauna*, Wagl. (nec Max.); *holostictus*, Cab. — Floride S., Amérique centr., gr. Antilles, Colombie, Ecuador.

(1) Voy. : Sharpe, *Catalogue Birds Brit. Mus.* XXIII (1894).

Digitized by Google

## FAM. II. — EURYPYGIDÆ

### 1696. EURYPYGA

*Eurypyga*, Illig. (1811); *Helias*, Rafin. (1815).

11.043. HELIAS (Pall.), *Neue Nord. Beytr.* II, p. 48, pl. 3 (1781); *Pl. Enl.* 782; Illig., *Prodr.*, p. 257; Schl., *Mus. P.-B., Ralli*, p. 75; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 388; *solaris*, Bodd.; *phalænoides*, Vieill. — Vénézuéla, Guyane, Amazone, Bolivie, Brésil.

11.044. MAJOR, Hartl., *Syst. Verz. Mus. Bremen*, p. 108; Schl., *l. c.*, p. 74; Sharpe, *Cat.*, p. 242; *helias*, Scl. et Salv. (nec Pall.) — Amérique centr., Colombie, Ecuador.

## FAM. III. — RHINOCHETIDÆ

### 1697. RHINOCHETUS

*Rhinochetus*, Verr. et Des M. (1860).

11.045. JUBATUS, Verr. et Des M., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1860, p. 440, pl. 21; Bartl., *P. Z. S.*, 1868, p. 115, pl. 12; Sharpe, *l. c.*, p. 246. — Nouv.-Calédonie.

## FAM. IV. — GRUIDÆ

### 1698. GRUS

*Grus*, Pall. (1767); *Megalornis*, Gray (1841); *Antigone*, Rchb. (1852); *Leucogeranus*, Bp. (1855); *Limnogeranus, Sarcogeranus, Pseudogeranus*, Sharpe (1893).

11.046. COMMUNIS, Bechst., *Naturg. Deutschl.* III, p. 60 (1793); Dress., *B. Eur.* VII, p. 337, pl. 505; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 308, pl. 229; *A. grus*, L.; *cinerea*, Mey. et W.; *vulgaris*, Pall.; *canorus*, Forst.; *cineracea*, Brm.; *nostras*, Olphe-Gal. — Europe jusqu'au 65° l. N., Afrique N. et N.-E.

3071. *Var.* LILFORDI, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* XXIII, p. 252; *cinerea* et *communis* (pt.), auct. plur.; *longirostris*, Blyth (nec Tem. et S.); *cineracea*, Severtz., *J. f. O.*, 1875, p. 182 (nec Brm.); *orientalis*, Tegetm. (nec Frankl.) — Sibérie orient. à l'ouest jusqu'à l'Obi, Chine, Inde N.-W.

11.047. CANADENSIS (Lin.); Sw. et Rich., *Faun. Bor.-Am.*, p. 373; Schl., *Mus. P.-B., Ralli*, p. 2; Sharpe, *l. c.*, p. 256; *fusca*, Vieill.; *americana*, Gr. (nec L.); *fraterculus*, Cass. (*juv.*) — Sibérie N.-E., Amér. arct., Alaska, États-Unis W.

Digitized by Google

3072. *Var.* MEXICANA (P. L. S. Müll.), *S. N., Suppl.*, p. 110; Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1885, p. 356; *pratensis*, Bartr.; *poliophæa*, Wagl.; *americana* (pt.), Audub., *B. Am.*, pl. 261 (*juv.*); *longirostris*, Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 117, pl. 72; *canadensis* (pt.), auct. plur.; *schlegeli*, Blyth; *cinerea*, Seeb. (nec Mey. et W.) — États-Unis, Mexique.

11.048. MONACHUS, Tem., *Pl. Col.* 555; Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 119, pl. 75; Schl., *l. c.*, p. 4; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 434. — Sibérie orient., Chine, Japon.

11.049. NIGRICOLLIS, Przew., in *Rowl. Orn. Misc.* II, p. 436, pl. 9; Tegetm., *Monogr. Cranes*, p. 70, pl. 1; Sharpe, *l. c.*, p. 258. — Kokonoor.

11.050. JAPONENSIS (P. L. S. Müll.), *S. N., Suppl.*, p. 110; Seeb., *B. Japan. Emp.*, p. 331; *viridirostris*, Vieill.; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 435; *collaris*, Tem. (nec Bodd.); *montignesia*, Bp.; Scl. in *Wolf's Zool. Sket.*, ser. I, pl. 46; *leucauchen*, Blak. et Pr. (nec Tem.) — Sibérie orient., Corée, Chine, Japon.

11.051. AMERICANA (Lin.); *Pl. Enl.* 889; Audub., *B. Am.* V, p. 188, pl. 313; Schl., *l. c.*, p. 4; Sharpe, *l. c.*, p. 259; *struthio*, Wagl.; *hoyanus*, Dudl. — Amérique du N., du Saskatchewan au Mexique centr.

11.052. LEUCOGERANUS, Pall., *Reis. Russ. Reichs*, II, *Ank.*, p. 714, pl. F; id., *Zoogr.* II, p. 103; Tem., *Pl. Col.* 467; Dress., *B. Eur.* VII, p. 359, pl. 507; *gigantea*, Gm.; *polii*, Yule. — Europe S.-E., Asie centr., Jap., Chine, Inde N.-W.

11.053. ANTIGONE (Lin.); *Pl. Enl.* 865; Schl., *l. c.*, p. 3; *collaris*, Bodd.; Sharpe, *l. c.*, p. 262; *torquata*, Vieill.; *orientalis*, Frankl. — Asie centr., Inde N. et centr.

3073. *Var.* SHARPEI, Blanf., *Bull. Br. O. Cl.* V, 1895, p. 6; id., *Ibis*, 1896, p. 136; *antigone*, Sharpe, *Cat.*, p. 264 (pt., nec Lin.) — Indo-Chine, Malacca.

11.054. AUSTRALASIANA, Gould, *B. Austr.* VI, pl. 48; Schl., *l. c.*, p. 3. — Australie E.

11.055. LEUCAUCHEN, Tem., *Pl. Col.* 449; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 435; *antigone*, Pall. (nec Lin.); ? *vipio*, Pall.; Schl., *l. c.*, p. 3. — Japon, Sibérie E. jusque dans la Chine centrale.

## 1699. BUGERANUS

*Bugeranus*, Glog. (1842); *Laomedontia*, Rchb. (1852).

11.056. CARUNCULATUS (Gm.), *S. N.* I, p. 643; Vieill., *Gal. Ois.* II, *Suppl.*, pl. 20; Gray, *Gen. B.* III, pl. 149; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 1253; *palearis*, Forst. — Afr. S., du Benguéla au Zambèze, Afr. E. jusqu'au Choa.

Digitized by Google

### 1700. TETRAPTERYX

*Anthropoides!* Vieill. (1816); *Tetrapteryx,* Thunb. (1818); *Philorchemon,* Glog. (1842); *Scops!* Gray (1845); *Geranus,* Bp. (1854).

11.057. PARADISEA (Licht.), *Cat. Rer. Rariss. Hamb.*, p. 28 (1793); Schl., *l. c.*, p. 6; *capensis,* Thunb.; *stanleyanus,* Vig., *Zool. Journ.*, 1826, p. 234, pl. 8; *caffra,* Fritsch. — Afrique S. du Cap au 20° l. S.

11.058. VIRGO (Lin.); *Pl. Enl.* 241; Naum., *Vög. Deutschl.* IX, p. 386, pl. 232; Dress., *B. Eur.* VII, p. 353, pl. 506; Dav. et Oust., *Ois. Chine,* p. 436; *ornata,* Brm. — Europe S., Asie centr. jusqu'au N. de la Chine et le N.-W. de l'Inde, Afrique N. et N.-E.

### 1701. BALEARICA

*Balearica,* Briss. (1760); *Geranarchus,* Glog. (1842).

11.059. PAVONINA (Lin.); Vieill., *Gal. Ois.* II, pl. 257 (*juv.*); Schl., *l. c.*, p. 7; Fsch. et Hartl., *Vög. Ostafr.*, p. 667; *G. balearica,* Vieill. — Afrique W. jusqu'au N.-E. et équator.

3074. *Var.* REGULORUM (Benn.), *P. Z. S.*, 1833, p. 118; Gray, *Knowsl. Menag.*, pl. 13; *Pl. Enl.* 265; *chrysopelargus,* Teget. (nec Licht.); Sharpe, *l. c.*, p. 274 (1); *pavonina,* Chapm. (nec L.) — Afrique S. jusqu'au Zambèze.

3075. *Var.* GIBBERICEPS, Rchw., *J. f. O.*, 1892, p. 125; *regulorum,* Böhm, *J. f. O.*, 1885, p. 52 (nec Ben.); *pavonina,* Rchw., *J. f. O.*, 1887, p. 48 (nec L.); *chrysopelargus,* Shell. (nec Sharpe). — Afrique E.

## FAM. V. — PSOPHIIDÆ

### 1702. PSOPHIA (2)

*Psophia,* Lin. (1766).

11.060. CREPITANS, Lin.; *Pl. Enl.* 169; Vieill., *Gal. Ois.* III, pl. 162; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 383; Sharpe, *l. c.*, p. 279. — Guyane, Amazone jusqu'à Yquitos.

3076. *Var.* NAPENSIS, Scl. et Salv., *Nomencl. Av. Neotrop.*, pp. 141, 162; Sharpe, *l. c.*, p. 280. — Ecuador.

(1) Le Dr Reichenow fait remarquer que l'*Ardea chrysopelargus,* Licht., ne se rapporte pas à la Grue royale, mais à la *Ciconia nigra,* L. (*Orn. Mon.*, 1898, p. 119.)

(2) Voy. aussi : W. Blasius, *Journ. für Orn.*, 1884, pp. 203-210.



Digitized by Google

11.061. LEUCOPTERA, Spix, *Av. Bras.* II, p. 67, pl. 84; Gray, *Gen. B.* III, pl. 148; Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 299, 455. — Haut-Amazone, Pérou.

3077. *Var.* OCHROPTERA, Pelz. (ex Natt.), *Sitz. k. Akad. Wien*, 1857, p. 371; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1867, p. 592. — Rio-Négro.

11.062. VIRIDIS, Spix, *Av. Bras.* II, p. 66, pl. 83; Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 299, 455; Sharpe, *l. c.*, p. 281. — Amazone.

11.063. OBSCURA, Pelz. (ex Natt.), *Sitz. k. Akad. Wien*, 1857, p. 373; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1867, p. 592; Scl., *Ibis*, 1898, p. 520, pl. 11; Finsch, *Notes Leyd. Mus.* XX, p. 81; *viridis* (pt.), Sharpe. — Amazone.

11.064. ?CANTATRIX, W. Blas., *J. f. O.*, 1884, p. 203. — Bolivie.

## FAM. VI. — CARIAMIDÆ

### 1703. CARIAMA

*Cariama*, Briss. (1760); *Microdactylus*, Géoffr. (1809); *Dicholophus*, Illig. (1811); *Lophorhynchus*, Vieill. (1816); *Sariama*, Bp. (1857); *Chunga*, Rchb. (1860); *Chunnia*, Burm. (1861).

11.065. CRISTATA (Lin.); Tem., *Pl. Col.* 237; Sharpe, *Cat. B.* I, p. 42; *marcgravii*, Géoffr., *Ann. du Mus.* XIII, 1809, p. 370, pl. 26; *saurophaga*, Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 148, pl. 239. — Brésil, Paraguay.

11.066. BURMEISTERI (Hartl.), *P. Z. S.*, 1860, p. 335; Scl., *P. Z. S.*, 1870, p. 666, pl. 36; Burm., *La-Plata Reis.* II, p. 508. — Argentine N.

## FAM. VII. — OTIDÆ

### 1704. AFROTIS

*Lophotis*, Rchb. (1849, nec *Lophotes*, Less.); *Afrotis*, Bonap. (1854); *Compsotis*, Heine (1890).

11.067. RUFICRISTA (Smith), *Ill. Zool. S. Afr.*, *B.*, pl. 4; Schl., *Mus. P.-B. Cursores*, p. 5; Shpe, *l. c.*, p. 291. — Afrique S. jusqu'au Transv. et Benguela.

11.068. GINDIANA (Oust.), *Bull. Soc. Phil.*, 1881, p. 163; Sharpe, *l. c.*, p. 292; *fulvicrista*, Cab., *Orn. Centralbl.*, 1882, p. 14; *maculipennis*, Shell. (1889, nec Cab.) — Somaliland, Afrique équatoriale jusqu'au Kilima-Ndjaro.

11.069. AFRA (Forst.), *Icon. ined. in Brit. Mus.*, n° 134; Rchb., *Handb.*, *Gall.*, pl. 254, ff. 2165-67; Sharpe, *l. c.*, p. 294. — Afrique S.

Digitized by Google

3078. *Var.* AFROIDES (Smith), *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 19; *leucoptera*, Rchb., *l. c.*, ff. 2168-70; Sharpe, *l. c.*, p. 294; *afra*, Barr. (nec Forst.); *atra*, Bryd. — Afrique S.-E.

## 1705. HETEROTETRAX

*Heterotis*, Sharpe (1893, nec Ehrenb.); *Heterotetrax*, Sharpe (1894).

11.070. VIGORSI (Smith), *P. Z. S.*, 1830, p. 11; Schl., *l. c.*, p. 5; Sharpe, *l. c.*, p. 296; *scolopacea*, Tem., *Pl. Col.* 576. — Afrique S.

11.071. RUPPELLI (Wahlb.), *J. f. O.*, 1857, p. 1; Sharpe, *l. c.*, p. 297; *picturata*, Hartl., *P. Z. S.*, 1865, p. 88, pl. 6. — Afrique S.-W.

11.072. HUMILIS (Blyth), *J. A. S. Beng.*, 1856, p. 305; Fsch. et Hartl., *Vög. Ostafr.*, p. 618. — Somaliland.

## 1706. OTIS

*Otis*, Lin. (1766); *Tetrax*, Leach (1816); *Lissotis*, *Trachelotis*, Rchb. (1849); *Neotis*, Sharpe (1893).

11.073. TARDA, Lin.; Dress., *B. Eur.* VII, p. 369, pl. 508; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 84, pl[a] 179, 179[b]; *major*, Brm.; *barbata*, C. Dub. — Europe centr. et mér., Asie centr., Inde N.-W., Afrique N.

3079. *Var.* DYBOWSKII, Tacz., *J. f. O.*, 1874, p. 331; Bogd., *Consp. Av. Imp. Ross.*, p. 61; Menzb., *Orn. Turkest.*, pl. 64; Sharpe, *l. c.*, p. 286; *tarda* (pt.), auct. plur. (nec Lin.) — Sibérie E., Mandchourie, Corée, Japon.

11.074. TETRAX, Lin.; Dress., *l. c.*, p. 382, pl. 509; Dubois, *l. c.*, p. 89, pl[a] 180, 180[b]; *campestris*, Leach; *tetrao*, Macg.; *minor*, Brm. — Europe S., Afrique N., Asie centr. jusqu'au N.-W. de l'Inde.

11.075. LUDWIGI, Rüpp., *Mus. Senck.* II, p. 223, pl. 14; Schl., *l. c.*, p. 7; Shpe, *l. c.*, p. 299; *colei*, Smith. — Afrique S.

11.076. BURCHELLI (Heugl., ex Württ.), *J. f. O.*, 1867, p. 301; id., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 943, pl. 31. — Afrique N.-E.

11.077. CAFFRA, Licht., *Cat. Rer. Nat. Hamb.*, p. 36; Schl., *l. c.*, p. 7; Bryden, *Kloof and Karroo*, pl. 14, f. 1; *stanleyi*, Gray; *ruficollis*, Wagl. — Afrique S., à l'Ouest jusqu'au Benguela, à l'Est jusqu'à l'Équateur.

11.078. DENHAMI, Childr., in *Denh. and Clapp. Trav.* II, *App.*, p. 199; Gray, *Gen. B.* III, pl. 141; *caffra* (pt.), Rüpp.; *arabs*, Ant. (nec L.) — Soudan, Kordofan, Sennaar.

11.079. HEUGLINI, Hartl., *Ibis*, 1859, p. 344, pl. 11; Fsch. et Hartl., *Vög. Ostafr.*, p. 615; Sharpe, *l. c.*, p. 303. — Somaliland.

11.080. NUBA, Rüpp., *Atl., Vög.*, p. 1, pl. 1; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 945; Sharpe, *l. c.*, p. 305. — Afrique N.-E.

Digitized by Google

11.081. MELANOGASTER, Rüpp., *Mus. Senckenb.* II, p. 240; id., *Neue Wirb.*, *Vög.*, p. 16, pl. 7; Schl., *l. c.*, p. 9; Heugl., *Syst. Uebers.*, p. 53. — Afrique tropicale, à l'E. jusqu'au Natal.

11.082. LOVATI (Grant), *Bull. Br. Orn. Club*, X, p. 39; id., *Ibis*, 1900, p. 326. — Abyssinie.

11.083. HARTLAUBI, Heugl., *J. f. O.*, 1863, p. 1; id., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 954, pl. 32; Fsch. et Hartl., *Vög. Ostafr.*, p. 616. — Afrique N.-E., E. jusqu'au Natal.

11.084. MACULIPENNIS, Cab., *J. f. O.*, 1868, p. 413; id., in *Vonder Deck. Reis.* III, p. 45, pl. 15; Fsch. et Hartl., *Vög. Ostafr.*, p. 616. — Afrique E.

11.085. CÆRULESCENS, Vieill., *Enc. méth.* I, p. 334; Tem., *Pl. Col.* 532; Schl., *l. c.*, p. 4; *veroxii* et *ferox*, Smith; *cana*, Licht. — Afrique S.

11.086. CANICOLLIS, Rchw., *Orn. Centralbl.*, 1881, p. 79; id., *J. f. O.*, 1881, p. 334; Sharpe, *l. c.*, p. 309. — Afrique N.-E. et E.

11.087. SENEGALENSIS, Vieill., *Enc. méth.* I, p. 333; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 959; *rhaad*, Rüpp., *Mus. Senckenb.* II, p. 230, pl. 15; *semitorquata*, Heugl. — De Sénégambie à l'Afrique N.-E.

11.088. BARROVII, Gray, in *Griff. An. Kingd.*, *Birds*, III, p. 302; Sharpe, *l. c.*, p. 311; *torquata*, Cuv. (*descr. nulla*); Schl., *l. c.*, p. 4; *senegalensis*, auct. plur. (nec Vieill.); *cærulescens*, Butl., Feild. et Reid (nec Vieill.) — Afrique S., du Natal au Zambèze.

## 1707. SYPHEOTIS

*Sypheotides*, Less. (1839); *Comatotis*, Rchb. (1850); *Sypheotis*, Bonap. (1856); *Houbaropsis*, Sharpe (1893).

11.089. INDICA (Gm.), *S. N.* I, p. 725; *aurita*, Lath.; Tem., *Pl. Col.* 533; Less., in *Bélang. Voy.*, pl. 10; Jard. et Sel., *Ill. Orn.*, pl. 40 (mas.), 92 (fem.); Sharpe, *Cat.*, p. 313; *atriceps*, Gr.; *marmorata*, Gr. et Hardw., *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 60; *fulva*, Syk. — Inde.

11.090. BENGALENSIS (Gm.), *S. N.* I, p. 724; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* I, p. 23, pl. 5; *delicosa*, Gr. et Hardw., *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 61, 62; *himalayanus*, Gould, *Cent. B. Him.*, pl. 73-75. — Inde.

## 1708. HOUBARA

*Houbara*, Bp. (1831); *Chlamydotis*, Less. (1839).

11.091. MACQUEENII (Gr. et Hardw.), *Ill. Ind. Zool.* II, pl. 47; C. Dub., *J. f. O.*, 1856, p. 301, pl. 3; Dress., *B.* — Asie S.-W. jusqu'au N.-W. de l'Inde

Digitized by Google

*Eur.* VII, p. 393, pl. 511; Dubois, *Fne. Ill. Vert. Belg., Ois.* II, p. 95, pl. 181; *O. houbara*, auct. plur. (nec Desf.); *undulata*, Gr. (1863), (nec Jacq.) (accid. Europe centrale, Belgique).

11.092. UNDULATA (Jacq.), *Beytr.*, p. 24, pl. 9 (1784); Dress., *B. Eur.* VII, p. 391, pl. 510; *O. houbara*, Desf., *Mém. Acad. R. Sc.*, 1787, p. 496, pl. 10; *ornata*, Brm. — Les contrées entourant la Méditerranée, à l'E. jusqu'en Arménie.

3080. *Var.* FUERTAVENTURÆ, Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.* I, p. 689, II, p. 54. — Ile Fortaventura (Canaries).

### 1709. EUPODOTIS

*Eupodotis*, Less. (1839); *Choristis*, Bp. (1854).

11.093. ARABS (Lin.); Rüpp., *Atlas*, pl. 16; Levaill. jun., *Expl. sc. de l'Alg., Ois.*, pl. 10; Schl., *l. c.*, p. 8; *abyssinica*, Gr.; ?*rhaad*, Lath., *Ind. Orn.* II, p. 660. — Afrique N., N.-E. et Arabie.

11.094. KORI (Burch.), *Trav. S. Afr.* I, pp. 393, 402; Rüpp., *Mus. Senckenb.* II, p. 213, pl. 13; Sharpe, *l. c.*, p. 324; *cristata*, Gray (nec Scop.?) — Afr. S. jusqu'au Benguela à l'O., le Somal. et le Choa à l'E.

11.095. EDWARDSI (Gr. et Hardw.), *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 59; Schl., *l. c.*, p. 8; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* I, p. 7, pl. 3; *migriceps*, Vig.; Gould, *Cent. B. Himal.*, pl. 72; *leuconiensis*, Gr. — Inde.

11.096. AUSTRALIS (Gray), in *Griff. ed. Cuv., An. Kingd., Birds*, III, p. 305; Schl., *l. c.*, p. 9; *australasiana*, Gould, *B. Austr.* VI, pl. 4. — Australie.

## SUBORD. II. — LIMICOLÆ (1)

## FAM. VIII. — ŒDICNEMIDÆ

### 1710. OEDICNEMUS

*OEdicnemus*, Tem. (1815); *Fedoa*, Leach (1816).

11.097. SCOLOPAX (Gm.), *Reis. Russl.* III, p. 87, pl. 16; Dress., *B. Eur.* VII, p. 401, pl. 512; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 100, pl. 182; *illyricus*, Pill.; *crepitans*, Tem.; *griseus*, Koch; *europæus*, Vieill.; *belonii*, Roux; *desertorum, arenarius*, Brm.; *indicus*, Salvad.; *senegalensis*, Severtz. (nec Sw.) — Europe centr. et mérid., Asie centrale W., Inde, Birmanie, Ceylan, Afr. N.-E.

3081. *Var.* SAHARÆ, Rchw., *J. f. O.*, 1894, p. 102. — Sahara.

(1) Voy.: Sharpe, *Catalogue Birds Brit. Mus.* XXIV (1896); Seebohm, *The geographical distribution of the Charadriidæ* (1887).

Digitized by Google

11.098. SENEGALENSIS, Swains., *B. W. Afr.* II, p. 228; Seeb., *Geogr. Distr. Charadr.*, p. 78; *crepitans* (pt.), auct. plur. (nec Tem.); *inornatus*, Salvad.; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 989. — Sénégambie, Gabon, Afrique N.-E. jusqu'en Égypte.

11.099. VERMICULATUS, Cab., *J. f. O.*, 1868, p. 413; id., in *Von der Deck. Reis.* III, p. 46, pl. 16; Seeb., *Geogr. Distr. Charadr.*, p. 80; *natalensis*, Gr. (*descr. nulla*); *senegalensis* (pt.), auct. plur. (nec Sw.) — Afrique S.E.- et S.-W. jusqu'au Congo, à l'E. jusqu'au Victoria-Nyanza.

11.100. BUTTIKOFERI, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1898, p. 182; *vermiculatus*, Büttik. (nec Cab.) — Libéria (Afrique W.)

11.101. BISTRIATUS (Wagl.), *Isis*, 1829. p. 648; Seeb., *l. c.*, p. 85; *vocifer*, L'Herm., *Magas. de Zool.*, 1837, pl. 84; *americanus*, Sw.; *mexicanus*, Licht. — Amérique centrale et méridionale jusqu'à l'Amazone.

3082. *Var.* DOMINICENSIS, Cory, *Journ. Bost. Zool. Soc.*, 1883, p. 46; id., *Auk*, 1884, p. 4; id., *B. S. Domingo*, p. 140, pl. 19. — Saint-Domingue.

11.102. SUPERCILIARIS, Tschudi, *Arch. f. Naturg.*, 1843, 1, p. 387; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 59, pl. 30; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 333. — Pérou W.

11.103. CAPENSIS, Licht., *Verz. Doubl.*, p. 69; Seeb., *l. c.*, p. 81; *maculosus*, Tem., *Pl. Col.* 292; *macrocnemus*, Licht.; *affinis*, auct. plur. (nec Rüpp.) — Afrique S., S.-W. et E.

3083. *Var.* AFFINIS, Rüpp., *Mus. Senck.* II, p. 210; id., *Syst. Uebers.*, p. 117, pl. 42; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 990; Seeb., *l. c.*, p. 82. — Afrique N.-E. et équat.

3084. *Var.* DODSONI, Grant, *Ibis*, 1900, p. 193. — Arabie S.

## 1711. BURHINUS

*Burhinus*, Illig. (1811).

11.104. GRALLARIUS (Lath.), *Ind. Orn.*, *Suppl.*, p. 66; Rechb., *Av. Syst. Nat.*, p. 17; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 5; Seeb., *l. c.*, p. 83; *magnirostris*, Lath. (nec Vieill.); *frenatus*, Lath.; *longipes*, Vieill.; *novæhollandiæ*, Steph.; *giganteus*, Licht.; *australis*, Scl. — Australie.

## 1712. ESACUS

*Esacus*, Less. (1831); *Carvanaca*, Hodgs. (1836); *Pseudops*, Hodgs. (1841); *Orthorhamphus*, Salvad. (1874).

11.105. RECURVIROSTRIS (Cuv.), *Règ. An.* I, p. 500; Less., *Tr. d'Orn.*, p. 547; Gray, *Gen. B.* III, pl. 143; *grisea*, Hodgs.; id., *Icon. ined. in Br. Mus.*, *Grallæ*, pl. 43. — Inde, Ceylan, Birmanie, Ténassérim.

Digitized by Google

11.106. MAGNIROSTRIS (Vieill.), *N. Dict.* XXIII, p. 231; Tem., *Pl. Col.* 387; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 6; *major*, Brm. — Australie jusqu'à l'archipel Bismarck et Bornéo.

## FAM. IX. — DROMADIDÆ

### 1713. DROMAS

*Dromas*, Payk. (1805); *Erodia*, Salt (1814).

11.107. ARDEOLA, Payk., *K. Vet.-Akad. Handl. Stockh.*, 1805, pp. 182, 188, pl. 8; Tem., *Pl. Col.* 362; Sharpe, *Cat.* XXIV, p. 28; *amphilensis*, Salt; *charadrioides*, Jerd. — Les côtes et les îles de la mer Rouge et de l'Océan Indien (Afr. E., Madag., Inde, Ceylan, etc.).

## FAM. X. — GLAREOLIDÆ

### 1714. STILTIA

*Stiltia*, Bonap. (1856); *Rhimphalea*, Heine et Rchw. (1890).

11.108. ISABELLA (Vieill.), *Analyse*, p. 69; id., *Gal. Ois.* II, p. 159, pl. 263; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 286; *grallaria*, Tem.; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 22; *australis*, Leach. — Austr., Nouv.-Guinée, Arou, Key, Moluques, Céléb., Flores, Java, Bornéo.

### 1715. GLAREOLA

*Glareola*, Briss. (1760); *Trachelia*, Scop. (1769); *Pratincola*, Degl. (1843, nec Koch); *Dromochelidon*, Landl. (1846); *Galachrysia*, Bp. (1856); *Galactochrysea*, H. et Rchw. (1890).

11.109. PRATINCOLA (Lin.); Dress., *B. Eur.* VII, p. 411, pl. 513, f. 1; *torquata*, Briss.; Dubois, *Fne. Ill. Vert. Belg., Ois.* II, p. 143, pl. 192; *fusca*, L.; *austriaca*, *senegalensis*, *nævia*, Gm.; *natrophila*, Landb.; *limbata*, Gray. — Europe mérid., Asie centr., Inde N.-W., Afrique.

11.110. MELANOPTERA, Nordm., *Bull. Soc. I. Nat. Moscou*, 1842, p. 314, pl. 2; Gould, *B. Asia*, VII, pl. 63; Dress., *B. Eur.* VII, p. 419, pl. 513, f. 2; *pratincola*, Pall. (nec L.); *nordmanni*, Fisch.; *pallasi*, Bruch. — Europe S.-E., Caucase, Afrique.

11.111. ORIENTALIS, Leach, *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 132, pl. 13; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 23; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 284; *torquata*, Jerd. (nec Briss.); *thermophila vel longipes*, Hodgs.; *pratincola*, Radde (nec L.) — Asie orientale jusqu'à l'Inde et Ceylan, archipel Malais, Australie.

Digitized by Google

11.112. OCULARIS, Verr., *S. Afr. Q. Journ.*, 1833, p. 80; Schl. et Pol., *Faune Madag., Ois.*, p. 130, pl. 38; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag., Ois.*, p. 645, pl. 256-58; *geoffroyi*, Puch., *Mag. Zool.*, 1845, pl. 57. — Afrique E., Madagascar.

11.113. MARCHEI, Oust., *Bull. Soc. Philom.*, 1877, p. 104; *megapoda*, Gr. (*descr. nulla*); *nuchalis*, Hartl. (nec Gr.); *G. nuchalis liberiæ*, Schl., *Notes Leyd. Mus.*, 1881, p. 58; Sharpe, *Cat.* XXIV, p. 63, pl. 5, f. 1. — Afrique W., de Libéria au Niger.

11.114. EMINI, Shell., *P. Z. S.*, 1888, p. 49; Seeb., *Geogr. Distr. Charadr.*, p. 209; Sharpe, *l. c.*, p. 64, pl. 5, f. 2. — Afrique équatoriale.

11.115. NUCHALIS, Gray, *P. Z. S.*, 1849, p. 63, pl. 9; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 984; Seeb., *l. c.*, p. 266. — Haut-Nil Blanc.

11.116. CINEREA, Fras., *P. Z. S.*, 1843, p. 26; Gray, *Gen. B.* III, pl. 144; Seeb., *l. c.*, p. 265. — Afrique W., du Niger au Congo.

11.117. LACTEA, Tem., *Man. d'Orn.* II, p. 503 (1820); id., *Pl. Col.* 399; Gould, *B. Asia*, VII, pl. 64; *orientalis*, Jerd. (nec Leach); *nipalensis vel cinerascens* et *gangetica*, Hodgs. — Inde jusqu'à l'Assam et Manipour, Ceylan.

## FAM. XI. — CURSORIIDÆ

### 1716. ORTYXELUS

*Ortyxelus*, Vieill. (1834); *Torticella, Psilocnemis*, Glog. (1842); *Helortyx*, Agass. (1846); *Oxytelus*, Rchb. (1852).

11.118. MEIFFRENI (Vieill.), *N. Dict.* XXXV, p. 49; Tem., *Pl. Col.* 60, f. 1; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 92, pl. 300; *nivosus*, Sw., *Zool. Ill.* III, pl. 163; *isabellinus*, Heugl., *Syst. Uebers.*, p. 52. — Afrique W., N.-E. et équatoriale.

### 1717. PLUVIANUS

*Pluvianus*, Vieill. (1816); *Hyas*, Glog. (1827); *Ammoptila*, Sw. (1837); *Cheilodromas*, Rüpp. (1837).

11.119. ÆGYPTIUS (Lin.); Dress., *B. Eur.* VII, p. 521, pl. 527; *melanocephalus*, Gm.; *africanus*, Lath.; *chlorocephalus*, Vieill.; *charadrioides*, Wagl.; *ægyptiacus*, Brm. — Contrées entourant la Méditerranée, Afrique W. et N.-E.

### 1718. CURSORIUS

*Cursorius*, Lath. (1790); *Tachydromus*, Illig. (1811); *Cursor*, Wagl. (1827).

11.120. GALLICUS (Gm.), *S. N.* I, p. 692; Dress., *B. Eur.* VII, p. 425, pl. 514; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, — Afrique N., Asie S.-W. jusqu'à l'Inde N.-W.,

Digitized by Google

p. 714, pl. 182[b]; *europæus*, Lath.; *corrira*, Bonn.; *isabellinus*, Mey.; *pallidus*, *brachydactylus*, Brm.; *jamesoni*, Jerd.; *bogolulovi*, Zarudn. — îles Canaries et du Cap Vert (accid. Europe, Belgique).

11.121. SOMALENSIS, Shell., *Ibis*, 1885, p. 415; Seeb., *Geogr. Distr. Charadr.*, p. 237, pl. 11. — Somaliland.

11.122. RUFUS, Gould, *P. Z. S.*, 1836, p. 81; id., *Icon. Av.*, pl. 10; Schl., *l. c.*, p. 13; Seeb., *l. c.*, p. 238; *capensis*, *burchelli*, Sw. — Afrique S.

11.123. COROMANDELICUS (Gm.), *S. N.* I, p. 692; *Pl. Enl.* 892; Gould, *B. Asia*, VII, pl. 65; Seeb., *l. c.*, p. 241; *asiaticus*, Lath.; *orientalis*, Sw.; *taragensis*, Hodgs. — Inde, Ceylan.

11.124. TEMMINCKI, Swains., *Zool. Ill.* II, pl. 106; *senegalensis*, Licht.; Sw., *B. W. Afr.* II, pl. 24; Seeb., *l. c.*, p. 239. — Afrique trop.

## 1719. RHINOPTILUS

*Rhinoptilus*, Strickl. (1850); *Macrotarsius*, Blyth (1848, nec Lacép.); *Chalcopterus*, Rchb. (1852); *Hemerodromus*, Heugl. (1863).

11.125. BICINCTUS (Tem.), *Man. d'Orn.* II, p. 515 (1820); Jard. et Sel., *Ill. Orn.* I, pl. 48; Seeb., *l. c.*, p. 242; *africanus*, Tem.; *collaris*, Vieill.; *grallator*, Leadb. — Afrique S.

3085. *Var.* BISIGNATA (Hartl.), *P. Z. S.*, 1865, p. 87; Sharpe, *Cat.*, p. 45, pl. 1; *gracilis*, Fisch. et Rchw., *J. f. O.*, 1884, p. 178; *bicinctus gracilis*, Seeb., *l. c.*, p. 244. — Afrique E. et S.-W.

3086. *Var.* HARTINGI, Sharpe, *Bull. B. O. C.* III, p. 14; id., *Cat.*, p. 46, pl. 2. — Somaliland.

11.126. CINCTUS (Heugl.), *Syst. Uebers.*, p. 54; id., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 792; Seeb., *l. c.*, p. 245; Sharpe, *Cat.*, p. 46, pl. 3, f. 2; *bicinctus* (pt.), Schl., Salvad. — Afrique N.-E. et E.

3087. *Var.* SEEBOHMI, Sharpe, *Bull. B. O. C.* III, p. 13; id., *Cat.*, p. 47, pl. 3, f. 1; *cinctus* (pt.), auct. plur. (nec Heugl.); Seeb., *l. c.*, p. 245 (pt.), pl. 12. — Afrique S.-W.

11.127. CHALCOPTERUS (Tem.), *Pl. Col.* 298; Sharpe, *Cat.*, p. 48, pl. 4, f. 1; *temmicki*, Rchb.; *superciliaris*, Heugl., *J. f. O.*, 1865, p. 98. — De Sénégamb. au N.-E. de l'Afrique, Afr. E., S. et S.-W.

3088. *Var.* ALBOFASCIATA, Sharpe, *Bull. B. O. C.* III, p. 14; id., *Cat.*, p. 49, pl. 4, f. 2; *chalcopterus* (pt.), auct. plur. — Natal, Transvaal, Damara, Benguéla.

11.128. BITORQUATUS (Blyth), *J. A. S. Beng.*, 1848, p. 254; Jerd., *B. Ind.* III, p. 628; Seeb., *l. c.*, p. 247, pl. 13. — Inde centr.



Digitized by Google

## FAM. XII. — CHARADRIIDÆ (1)

### SUBF. I. — HÆMATOPODINÆ

#### 1720. HÆMATOPUS

*Hæmatopus*, Lin. (1758); *Ostralega*, Briss. (1760); *Melanibyx*, Rchb. (1852).

11.129. OSTRALEGUS, Lin.; Dress., *l. c.* VII, p. 567, pl. 533; Dubois, *l. c.* II, p. 137, pl. 190; *pica*, Scop.; *europæa*, *vulgaris*, Less.; *bathicus*, *orientalis*, Brm. — Europe, Asie S.-W. et centr., Afr. N. et E. jusqu'au Mozamb.

11.130. OSCULANS, Swinh., *P. Z. S.*, 1871, p. 405; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 432; Seeb., *l. c.*, p. 303; *ostralegus* (pt.), auct. plur. (nec L.); *longirostris* (pt.), Swinh. (1863). — Sibérie E., Kamtschatka, Japon, Formose, Chine, Birmanie.

11.131. LONGIROSTRIS, Vieill., *N. Dict.* XV, p. 410; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 7; Seeb., *l. c.*, p. 304; *picatus*, Vig.; *australasianus*, Gould; *finschi*, Mart., *Orn. Monatsb.*, 1897, p. 190 (aberr.) — Australie, Tasmanie, Nouv.-Zél., Nouv.-Guin. et Moluques.

11.132. REISCHEKI, Rothsch., *Ibis*, 1900, p. 181. — Nouv.-Zél. (Kaiparu).

11.133. LEUCOPUS (Garn. et Less.), *Voy. Coq.* I, p. 721; Seeb., *l. c.*, p. 306; *leucopodus*, Garn.; *luctuosus*, Cuv.; *arcticus*, Jard., ed. *Wils. Am. Orn.* III, p. 35, pl. 64; id. et Selby, *Ill. Orn.*, pl. 123. — Magellan, îles Malouines.

11.134. PALLIATUS, Tem., *Man. d'Orn.* II (1829), p. 532; Audub., *B. Am.* V, p. 236, pl. 324; Jard. et Sel., *Ill. Orn.*, pl. 7; Seeb., *l. c.*, p. 305; *ostralegus*, Wils. (nec L.); *brasiliensis*, Licht. — États-Unis, Amérique centr., Antilles, Amér. mérid. jusqu'au S. du Brésil.

3089. *Var.* GALAPAGENSIS, Ridgw., *Auk*, 1886, p. 331; Sharpe, *l. c.*, p. 116; *palliatus*, Scl. et Salv. (nec Tem.); *leucopus galapagensis*, Seeb., *l. c.*, p. 307. — Iles Galapagos.

3090. *Var.* FRAZARI, Brewst., *Auk*, 1888, p. 84; Sharpe, *l. c.*, p. 117; *palliatus* (pt.), Scl. et Salv.; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 330. — Du S. de la Californie jusqu'au Chili, îles Tres-Marias.

3091. *Var.* DURNFORDI, Sharpe, *Cat. B.* XXIV, p. 117, pl. 6; *palliatus* (pt.), Durnf.; Scl. et Huds., *Arg. Orn.* II, p. 176. — Patagonie.

11.135. UNICOLOR, Wagl., *Isis*, 1852, p. 1230; Gray, *Voy. Er. and Terr. B.*, p. 12, pl. 10; Seeb., *l. c.*, p. 308; *fuliginosus*, Gould, *B. Austr.* VI, pl. 8; *niger*, Ellm.; *ophthalmicus*, Rams. — Australie, Nouv.-Zélande.

(1) Voy. aussi : Seebohm, *The Geographical distribution of the Charadriidæ* (1887).

Digitized by Google

3092. *Var.* CAPENSIS (Licht.), *Verz. Doubl.*, p. 73; Seeb., *l. c.*, p. 309; *niger*, auct. plur. (nec Pall.); Gray, *Gen. B.* III, pl. 146; *moquini*, Bp.; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 1041; Sharpe, *l. c.*, p. 119. — Afrique, Canaries, Madeire.

11.136. NIGER, Pall., *Zoogr. Rosso-As.* II, p. 131; Seeb., *l. c.*, p. 310; Sharpe, *l. c.*, p. 120; *bachmani*, Audub., *B. Am.* V, p. 243, pl. 325. — Amér. N.-W. des îles Aléoutes et de l'Alaska jusqu'en Calif.

3093. *Var.* ATRA (Less.), *Traité d'Orn.*, p. 548; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 88, pl. 250; Seeb., *l. c.*, p. 311; *niger*, Q. et G. (nec Pall.); *townsendi*, Audub., *B. Amer.*, pl. 427, f. 3; id., *B. Am.* V, p. 245, pl. 326. — Du S. du Pérou jusqu'en Patagonie (côte W.) et îles Malouines.

## SUBF. II. — CHARADRIINÆ

### 1721. OREOPHILUS

*Oreophilus*, Jard. et Selby (1835); *Dromicus*, Less. (1844).

11.137. RUFICOLLIS (Wagl.), *Isis*, 1829, p. 653; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 347; Scl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 174; *totanirostris*, Jard. et Sel., *Ill. Orn.* III, pl. 151; Seeb., *l. c.*, p. 111, pl. 4; *lessoni*, Bp. — Pérou, Chili, Argentine, Patagonie, Malouines.

### 1722. ERYTHROGONYS

*Erythrogonys*, Gould (1837).

11.138. CINCTUS, Gould, *P. Z. S.*, 1837, p. 155; id., *B. Austr.* VI, pl. 21; *rufiventer*, Less.; *rufiventris*, Seeb., *l. c.*, p. 108. — Australie.

### 1723. SARCIOPHORUS

*Sarciophorus*, Strickl. (1841); *Xiphidiopterus*, *Tylibyx*, Rchb. (1852); *Lobipluvia*, Bp. (1856); *Dilobus*, Heine et R. (1890); *Zonifer*, *Anomalophrys*, Shpe (1896).

11.139. TECTUS (Bodd.), *Tabl.*, p. 51; *Pl. Enl.* 834; Seeb., *l. c.*, p. 197; *pileatus*, Gm.; Schl., *Mus. P.-B.*, *Cursores*, p. 65. — Sénégambie, Afrique N.-E.

3094. *Var.* LATIFRONS, Rchw., *J. f. O.*, 1881, p. 334; id., *Vög. Deusch Ost-Afr.*, p. 36. — Du Somalil. à la région du Teita (Afrique E.)

11.140. TRICOLOR (Vieill.), *N. Dict.* XXVII, p. 147; Strickl., *P. Z. S.*, 1841, p. 33; *pectoralis*, Wagl.; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 11; Seeb., *l. c.*, p. 200; *vanelloides*, Peale. — Australie, Tasmanie.

Digitized by Google

11.141. SUPERCILIOSUS (Rchw.), *J. f. O.*, 1886, p. 116, pl. 3, f. 2, 1890, p. 107, 1891, p. 372; Shpe, *l. c.*, p. 156. — Afr. W. du Togoland au Congo et le Tangan.

11.142. MELANOCEPHALUS (Rüpp.), *Syst. Ueb.*, p. 115, pl. 44, Seeb., *l. c.*, p. 194; Sharpe, *l. c.*, p. 153. — Afrique N.-E.

11.143. ALBICEPS (Gould), *P. Z. S.*, 1834, p. 45; Fras., *Zool. Typ.*, pl. 64; Seeb., *l. c.*, p. 195, pl. 8; *speciosus*, Antin. — Afr. W. de Libéria au Congo, à l'E. jusqu'au Nil Blanc.

11.144. MALABARICUS (Bodd.), *Tabl.*, p. 53; *Pl. Enl.* 880; Seeb., *l. c.*, p. 198; Sharpe, *l. c.*, p. 130; *bilobus*, Gm.; *myops*, Less.; *fuscus*, Hodgs, *Icon. ined. Grall.*, pl. 50. — Inde, Ceylan.

## 1724. LOBIVANELLUS

*Lobivanellus*, Strickl. (1841); *Sarcogrammus*, Rchb. (1852); *Lobibyx*, Heine et Rchw. (1890); *Microsarcops*, Sharpe (1896).

11.145. LOBATUS (Lath.), *Ind. Orn.*, *Suppl.*, p. 65; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 9; Seeb., *l. c.*, p. 190; *novæhollandiæ*, Steph.; *gallinaceus*, Wagl.; *personatus*, Kirk (nec Gould). — Australie.

11.146. MILES (Bodd.), *Tabl.*, p. 51; *Pl. Enl.* 835; Schl., *l. c.*, p. 66; *ludoviciana*, Gm.; *callæas*, Wagl.; *personatus*, Gould, *B. Austr.* VI, pl. 10; Seeb., *l. c.*, p. 188. — Australie, Nouv.-Guinée, îles Arou et Moluques.

11.147. SENEGALUS (Lin.); *Pl. Enl.* 362; Schl., *l. c.*, p. 68; *senegalensis*, Müll.; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 1000; Seeb., *l. c.*, p. 191; *albicapillus*, Vieill.; id., *Gal. Ois.* II, p. 100, pl. 236; *strigilatus*, Sw. — Afrique W. et N.-E.

11.148. LATERALIS (Smith), *Ill. Zool. S. Afr. B.*, pl. 23; Fsch. et Hartl., *Vög. Ostafr.*, p. 643; Seeb., *l. c.*, p. 193; *senegalensis*, Kirk (nec L.). — Afrique S.-W. et S.-E. jusqu'au Vict.-Nyanza et le Benguéla.

11.149. CUCULLATUS (Tem.), *Pl. Col.* 505; Seeb., *l. c.*, p. 187; Sharpe, *l. c.*, p. 148; *tricolor*, Horsf. et auct. plur. (nec V.); *macropterus*, Wagl. — Java, Sumatra, Bornéo, Timor.

11.150. INDICUS (Bodd.), *Tabl.*, p. 50; *Pl. Enl.* 807; Schl., *l. c.*, p. 68; Seeb., *l. c.*, p. 184; *goensis*, Gm.; Gould, *Cent. B. Him.*, pl. 78; *atrogularis*, Wagl. — Arabie, Asie S.-W., Inde, Ceylan.

3095. *Var.* ATRONUCHALIS, Jerd., *B. Ind.* III, p. 648; Seeb., *l. c.*, p. 186; Sharpe, *l. c.*, p. 152. — Indo-Chine, Malacca, Sumatra.

11.151. CINEREUS (Blyth), *J. A. S. Beng.*, 1842, p. 587; id., *Cat. B. Mus. As. Soc.*, p. 261; Schl., *l. c.*, p. 69; Seeb., *l. c.*, p. 183; *inornatus*, Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 106, pl. 63. — Asie orient., Japon, à l'Ouest jusqu'au Bengale.

Digitized by Google

## 1725. HOPLOPTERUS

*Hoplopterus*, Bonap. (1831); *Hoploxypterus*, Bonap. (1856).

11.152. SPINOSUS (Lin.); *Pl. Enl.* 801; Dress., *B. Eur.* VII, p. 559, pl. 550; Seeb., *l. c.*, p. 219; *persicus*, Bonn.; *senegalensis*, Steph. (nec L.); *cristatus*, Steph. (nec Mey.); *melasomus*, Sw., *B. W. Afr.* II, p. 257, pl. 26; *armatus*, Brm. — Europe S.-E., Afrique W., N.-E. et E.

11.153. VENTRALIS (Wagl.), *Syst. Av.*, *Charadrius*, p. 59, sp. 11; Gray et Hardw., *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 50; *duvaucellii*, Less.; *bicolor*, Tem. — Inde, Indo-Chine, Hainan.

11.154. SPECIOSUS (Wagl.), *Isis*, 1829, p. 649; Finsch et Hartl., *Vög. Ostafr.*, p. 659; Seeb., *l. c.*, p. 221; *albiceps*, Tem., *Pl. Col.* 526 (nec Gd.); *armatus*, Jard. et Sel., *Ill. Orn.* I, pl. 54. — Afrique S.-E. et E.

11.155. CAYANUS (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 749; *Pl. Enl.* 833; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 335; Seeb., *l. c.*, p. 229, pl. 10; *stolatus*, Wagl.; *spinosus*, Max. (nec L.) — Amérique méridionale jusqu'au S. du Brésil.

## 1726. BELONOPTERUS

*Belonopterus*, Rchb. (1852).

11.156. CAYENNENSIS (Gm.), *S. N.* I, p. 706; *Pl. Enl.* 836; Seeb., *l. c.*, p. 216; Sharpe, *l. c.*, p. 163; *lampronotus*, Wagl. — Amér. mérid. de la Colombie et la Guyane jusqu'à l'Uruguay.

3096. *Var.* CHILENSIS (Mol.), *Sag. St. Chili*, p. 239; Seeb., *l. c.*, p. 218; *cayennensis*, auct. plur. (nec Gm.); *occidentalis*, Harting, *P. Z. S.*, 1874, p. 451; *grisescens*, Praz., *Orn. Monatsb.*, 1896, p. 23. — Pérou, Chili, Patagonie, îles Malouines.

## 1727. PTILOSCELIS

*Ptiloscelis*, Bonap. (1856).

11.157. RESPLENDENS (Tschudi), *Arch. f. Nat.*, 1843, p. 388; id., *Faun. Per.*, pp. 49, 295; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 336; Seeb., *l. c.*, p. 228; *ptiloscelis*, Gray, *Gen. B.* III, pl. 145. — Amérique S.-W. de l'Ecuador au Chili.

## 1728. VANELLUS

*Vanellus*, Briss. (1760).

11.158. CAPELLA, Schaeff., *Mus. Orn.*, p. 49 (1789); Bd., Br. et Ridgw., *Water. B. N. Am.* I, p. 130; *T.* — Europe, Asie et Afrique, entre le 65° et

Digitized by Google

*vanellus*, Lin.; *vulgaris*, Bechst.; Dress., *B. Eur.* VII, p. 545, pl. 531; Dubois, *Fne. Ill. Vert. Belg.*, *Ois.* II, p. 129, pl. 189; *cristatus*, Mey. et Wolf; *gavia*, Leach; *bicornis*, etc., Brm.; *candidus*, *pallidus*, *varius*, Naum. (aberr.) — le 30e l. N.

## 1729. CHÆTUSIA

*Chætusia*, Bonap. (1841); *Hemiparra*, De Fil. (1865); *Defilippia*, Salvad. (1865, nec Lioy, 1864); *Limnetes*, Fsch. et Hartl. (1870); *Nomusia*, Heugl. (1873); *Eurypterus*, Sharpe (1896, nec De Kay, 1826); *Euhyas*, Sharpe (1896, nec Fitz., 1843); *Zapterus*, Oberh. (1899).

11.159. GREGARIA (Pall.), *Reis. Russ. Reichs*, I, p. 456; Dress., *B. Eur.* VII, p. 527, pl. 528; Seeb., *l. c.*, p. 211; *fasciata*, Gm.; *keptuschka*, Lepech.; *coronatus*, Rüpp.; *ventralis*, Jerd. (nec Wagl.); *pallidus*, Heugl.; *wagleri*, Gr. — Europe S.-E., Asie centrale jusqu'à l'Altaï, Inde, Afrique N.-E.

11.160. LEUCURA (Licht.), *Verz. Doubl.*, p. 70; Dress., *B. Eur.* VII, p. 531, pl. 529; Seeb., *l. c.*, p. 213; *villotei*, Sav., *Descr. Eg.*, pl. 6, f. 2; *flavipes* et *grallarius*, Less.; *aralensis*, Eversm. — Europe S.-E., Asie S.-W. jusqu'à l'Inde, Égypte.

11.161. CRASSIROSTRIS, De Fil., in Hartl., *J. f. O.*, 1855, p. 427; De Fil., *Atti Soc. Ital. Sc. N.*, 1865, p. 370; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 994, pl. 33; Seeb., *l. c.*, p. 214; Sharpe, *l. c.*, p. 126, pl. 7, f. 2; *macrocercus*, Heugl.; *nivifrons*, Ogd. — Afrique N.-E. et du Haut-Nil Blanc jusqu'au Victoria Nyanza.

11.162. LEUCOPTERA (Rchw.), *J. f. O.*, 1889, p. 265; Sharpe, *l. c.*, p. 127, pl. 7, f. 1; *crassirostris*, auct. plur. (nec De Fil.); *albiceps*, Hol. et Pelz. (nec Gd.); *burrowsii*, Sharpe. — Afrique S.-E. et E.

## 1730. STEPHANIBYX

*Stephanibyx*, Rchb. (1852).

11.163. CORONATUS (Bodd.), *Tabl.*, p. 49; *Pl. Enl.* 800; Schl., *l. c.*, p. 82; Seeb., *l. c.*, p. 222; *atricapillus*, Gm.; *dinghami*, Verr. — Afrique S.-W., S. et E. jusqu'au Somaliland et le Choa.

11.164. MELANOPTERUS (Cretzschm.), in Rüpp., *Atlas*, p. 46, pl. 31; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 1010; Seeb., *l. c.*, p. 224; *spixii*, Wagl.; *frontalis*, Sundev.; *inornatus*, Shell. (nec Sw.) — Afrique N.-E. et E., Arabie.

11.165. INORNATUS (Sw.), *B. W. Afr.* II, p. 259; Schl., *l. c.*, p. 63; Seeb., *l. c.*, p. 225; Bocage, *Orn. Angola*, p. 425; *melanopteroides*, Tem. — De Libéria au Congo, et du Natal à Zanzibar.

Digitized by Google

## 1731. SQUATAROLA

*Squatarola*, Leach (1816).

11.166. HELVETICA (Lin.); Dress., *B. Eur.* VII, pl. 517-519; Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* II, p. 125, pl. 184; *varia* et *squatarola*, Lin.; *hypomelas*, *pardela*, Pall.; *nævius*, Gm.; *melanogaster*, Bechst.; *apricarius*, Wils. (nec L.); *grisea*, Leach; *cinerea*, Flem.; *wilsoni*, Licht.; *longirostris*, etc., Brm.; *rhynchochomega*, Bp.; *subtridactyla*, Gr.; *megalorhynchus*, Rchw.; *australis*, Olphe-Gal. — Presque cosmopolite.

## 1732. CHARADRIUS

*Charadrius*, Lin. (1758); *Pluvialis*, Briss. (1760); *Ochthodromus*, Rchb. (1852); *Cirrepidesmus*, *Pluviorhynchus*, Bonap (1856); *Podasocys*, Coues (1866); *Hyetoceryx*, Heine (1890).

11.167. PLUVIALIS, Lin.; Dress., *B. Eur.* VII, p. 435, pl. 515, f. 1; *apricarius*, L.; *aureus*, Briss.; Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* II, p. 105, pl. 183; *auratus*, Suck.; *altifrons*, Brm. — Europe et Asie occidentale jusqu'à la Nouvelle-Zemble et l'Islande.

11.168. DOMINICUS, P. L. S. Müll., *S. N.*, *Anhang.*, p. 116; *pluvialis*, Wils., *Am. Orn.* VII, p. 71, pl. 59, f. 5 (nec L.); *virginicus*, Licht.; Baird, *B. N. Am.*, p. 690; *marmoratus*, Wagl.; *americanus*, Schl., *l. c.*, p. 33; Seeb., *l. c.*, p. 100. — Amérique septentrionale, centrale et méridionale jusqu'au Chili, Antilles.

3097. *Var.* FULVA, Gm., *S. N.* I, p. 687; Dress., *B. Eur.* VII, p. 443, pl. 516, 517, ff. 2, 3; *xanthocheilus*, Wagl.; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 13; *taitensis*, Less.; *glaucopus*, Licht.; *orientalis* et *longipes*, Tem. — Asie orientale, Japon, Archipel Indien, Australie, Océanie.

14.169. OBSCURUS, Gm., *S. N.* I, p. 686; Bull., *B. New Zeal.*, p. 208; Seeb., *l. c.*, p. 151, pl. 6; Bull., *B. New Zeal.*, 2e éd., II, p. 1, pl. 25, f. 1; *glareola*, Licht. — Nouvelle-Zélande.

11.170 BICINCTUS, Jard. et Sel., *Ill. Orn.* I, pl. 28; Schl., *l. c.*, p. 37; Bull., *l. c.*, p. 9; Seeb., *l. c.*, p. 149. — Austr., Tasmanie, îles Norfolk, Lord Howe.

11.171. WILSONI, Ord., in *Wils. Am. Orn.* IX, p. 77, pl. 73, f. 5; Seeb., *l. c.*, p. 154; *wilsonius*, Vieill.; Audub., *B. Am.* V, p. 214, pl. 319; *crassirostris*, Spix; *rufinuchus*, Ridgw. — Amérique N.-E., centrale et méridionale jusqu'au Pérou et Brésil.

11.172. GEOFFROYI, Wagl., *Syst. Av.*, *Charadr.*, p. 61, n° 19; Kittl., *Kupfert. Vög.*, p. 26, pl. 34, f. 2; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 1020, pl. 34, f. 3; *leschenaulti*, Less.; *columbinus*, Wagl.; *griseus*, — Asie orientale, Japon, Formose, Haïnan, Chine, Inde, Archipel Malais, Austra-

Digitized by Google

Less.; *rufinus*, Blyth; *inornata* (pl.), Gould, *B. Austr.* VI, pl. 19; *fuscus*, Puch.; *gigas*, Brm.; *asiaticus*, Tristr. (nec Pall.); *crassirostris*, Severtz. (nec Spix); *magnirostris*, Severtz. — lie, Afrique, Madagascar.

11.173. MONGOLICUS, Pall., *Zoogr.* II, p. 136; Middend., *Reis. Sibir., Zool.*, p. 211, pl. 19, ff. 2, 3; Seeb., *l. c.*, p. 147; *mongolus*, Pall., *Reis. R. R.* III, p. 700; Sharpe, *l. c.*, p. 223; *cirrhepidesmus*, *gularis*, Wagl.; *sanguineus*, Less.; *inornata*, Gould, *B. Austr.* VI, pl. 19 (fig. de droite); *mastersi*, Rams. — Asie N.-E., côtes de la mer de Béring, Alaska, Chine, Japon, Archipel Malais, Australie.

3098. *Var.* PYRRHOTHORAX, Gould, *B. Eur.* IV, pl. 299; Sharpe, *Cat.*, p. 226; *leschenaulti* (nec Less.) et *rufinellus*, Blyth; *subrufinus*, Hodgs.; *ruficollis*, Schl.; *mongolicus*, auct. plur. (nec Pall.); *pamirensis*, Richm., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1895, p. 590. — Asie centrale, Inde W., Indo-Chine W., Malacca, Java, Bornéo, Afrique N.-E.

11.174. ASIATICUS, Pall., *Reis. Russ. Reichs*, II, p. 715; Schl., *l. c.*, p. 38; Dress., *B. Eur.* VII, p, 479, pl. 520, f. 1, 522; Seeb., *l. c.*, p. 144; *caspius*, Pall.; *jugularis*, Wagl.; *damarensis*, Strickl.; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 1018, pl. 34, ff. 1, 2. — Asie centrale, Inde W., Afrique.

11.175. MONTANUS, Towns., *Journ. Acad. Philad.*, 1837, p. 192; Audub., *B. Am.* V, p. 213, pl. 318; Seeb., *l. c.*, p. 153; *asiaticus* (pl.), Schl., *l. c.*, p. 38. — États-Unis W., Mexique, Basse-Californie.

11.176. VEREDUS, Gould, *P. Z. S.*, 1848, p. 38; id., *B. Austr.* VI, pl. 14; Seeb., *l. c.*, p. 115; *xanthocheilus*, Bp. (nec Wagl.); *asiaticus* (pl.), Schl.; Harting, *Ibis*, 1870, p. 209, pl. 6. — Mongolie, Chine jusqu'aux Moluques et l'Australie.

## 1733. EUDROMIAS

*Eudromias*, Brm. (1831); *Zonibyx*, Rchb. (1852); *Morinellus*, Bp. (1856); *Peltohyas*, Sharpe (1896).

11.177. MORINELLUS (Lin.); Dress., *B. Eur.* VII, p. 507, pl. 526; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 109, pl. 185; *tartaricus*, Pall.; *anglus*, Müll.; *sibiricus*, Lepech.; *montana*, *stolida*, Brm. — Europe, Asie et Afrique N. du 30° l. N. au Spitzberg et à la Nouvelle-Zemble.

11.178. MODESTUS (Licht.), *Verz. Doubl.*, p. 71; Scl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 171; *urvillii*, Garn.; *cincta*, Less., *Voy. Coq.* I, p. 126, pl. 43; *nebulosus*, Less.; *rubecola*, King.; Jard. et Sel., *Ill. Orn.* II, pl. 110; *fusca*, Gould. — Argentine, Chili, Patagonie, îles Malouines.

11.179. AUSTRALIS, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 174; id., *B. Austr.* VI, pl. 15; Seeb., *l. c.*, p. 110. — Australie.

Digitized by Google

## 1734. OXYECHUS

*Oxyechus*, Rchb. (1852).

11.180. VOCIFERUS (Lin.); Audub., *B. Am.* V, p. 207, pl. 317; Seeb., *l. c.*, p. 120; Rchb., *Grall.*, p. 18, pl. 172, ff. 725-26; *torquatus*, L.; *?jamaicensis*, Müll. — Amérique sept. temp., Amérique centr. et méridi. (accidentellement Europe W.)

11.181. TRICOLLARIS (Vieill.), *N. Dict.* XXVII, p. 147; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 1027, pl. 54, f. 5; Seeb., *l. c.*, p. 134; *indicus*, Lath.; *bitorquatus*, Licht.; *cinereicollis*, Heugl., *Syst. Uebers.*, p. 56. — Afrique N.-E., E. et S.

11.182. BIFRONTATUS (Cab.), *Orn. Centralbl.*, 1882, p. 14; id., *J. f. O.*, 1882, p. 112, 1883, pl. 6, f. 3; Seeb., *l. c.*, p. 137; *tricollaris* (pt.), auct. plur. (nec Vieill.) — Madagascar.

11.183. FORBESI (Shell.), *Ibis*, 1883, p. 560, pl. 14; Seeb., *l. c.*, p. 136; *tricollaris* (pt.), auct. plur. (nec V.); *indica*, Schl.; *nigris*, Harting. — Afrique W. de Sénégambie au Gabon.

## 1735. ÆGIALEUS

*Ægialeus*. Rchb. (1852).

11.184. SEMIPALMATUS (Bonap.), *Obs. Wils.*, 1825, n° 219; Audub., *B. Am.* V, p. 218, pl. 320; Seeb., *l. c.*, p. 123; *hiaticula*, Wils. (nec L.); *brevirostris*, Max. — Amérique septentrionale, centrale et méridionale, Groenland, Sibérie N.-E.

## 1736. ÆGIALITIS

*Ægialitis*, Boie (1822); *Leucopolius*, Bp. (1856); *Ægialophilus*, Gould (1865).

11.185. HIATICULA (Lin.); Dress., *B. Eur.* VII, p. 467, pl. 523; *torquatus*, Briss.; Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* II, p. 113, pl. 186; *ægyptiacus*, L.; *septentrionalis*, Brm.; *annulata*, Gr.; *arabs*, Licht.; *?homeyeri*, Brm.; *auritus*, *hiaticuloides*, Heugl; *intermedius*, Gurn. (nec Ménétr.); *hiaticula major*, Seeb., *l. c.*, p. 126. — Europe jusqu'au Spitzberg, à l'E. jusqu'au Baikal et le N.-W. de l'Inde, Groenland, Afrique.

11.186. PLACIDA (Gray), *Cat. Mam., etc., Nepal pres. Hodgs.*, p. 70; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 428; Seeb., *l. c.*, p. 307; *indicus*, Schl.; *longipes*, Dav. (nec T. et S.); *hartingi*, Swinh.; *hiaticula*, Blyth (nec L.); *tenuirostris*, Hume, *Str. F.* I, p. 17. — Japon, Sibérie E., Mandchourie, Corée, Chine, Himalaya E.

11.187. DUBIA (Scop.); Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* II, p. 117, pl. 187; *curonicus*, Gm.; Dress., *B. Eur.* VII, p. 491, pl. 524; *philippinus*, Lath.; *minor*, Mey. et Wolf; *fluviatilis*, Bechst.; *minutus*, Pall.; *pusillus*, Horsf.; *hiaticuloides*, Frankl.; *interme-* — Europe et Asie entre le 60° et le 20° l. N, Japon, Philippines, Afrique.



Digitized by Google

*dius*, Ménétr. ; *zonatus*, Sw. ; *alexandrinus*, Thien. (nec L.); *simplex*, Licht. ; *gracilis*, *pygmæus*, Brm. ; *microrhynchus*, Ridgw. ; *hiaticula*, Rams. (nec L.)

3099. *Var.* JERDONI, Legge, *P. Z. S.*, 1880, p. 39; id., *B. Ceylon*, p. 956; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 303; Seeb., *l. c.*, p. 152. — Inde, Ceylan, Indo-Ch., îles de la Sonde, Nouvelle-Guinée.

11.188. PERONI (Bonap.), *C. R.* XLIII, p. 417; Schl., *l. c.*, p. 33; Swinh , *P. Z. S.*, 1870, p. 139; Wald., *Tr. Z. S.* VIII, p. 90, pl. 10, f. 2; *alexandrinus*, Motl. et Dillw. (nec L.); *philippinus*, Pelz. — Grandes îles de la Sonde jusqu'à Célèbes.

11.189. ALEXANDRINA (Lin.); Blyth et Wald., *B. Burma*, p. 154; *cantianus*, Lath.; Dress., *B. Eur.* VII, p. 483, pl. 523; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 121, pl. 188; *albifrons*, Mey. et Wolf; *littoralis*, Bechst.; *albigularis*, Brm. ; *niveifrons*, Blanf. ; *marginatus*, Fsch. ; *cantianus minutus*, Seeb., *l. c.*, p. 169. — Europe, Asie et Afrique (côtes), au N. jusqu'au 60° l. N.

3100. *Var.* DEALBATA, Swinh., *Ibis*, 1870, p. 361 ; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 431 ; Seeb., *l. c.*, p. 170; *alexandrina* (pt.), Sharpe. — Chine S., Formose, Haïnan.

3101. *Var.* NIVOSA, Baird, Cass. et Lawr., *B. N. Am.*, p. 696; Coues, *Check-l. N. Am. B.*, p. 97; Stejn., *P. U. S. Nat. Mus.*, 1883, p. 35; *cantianus* et *tenuirostris* (pt.), auct. plur. — Côtes de l'Amérique occidentale de la Californie jusqu'au Chili.

11.190. OCCIDENTALIS, Cab., *J. f. O.*, 1872, p. 158, 1885, pl. 6, f. 1 ; Seeb., *l. c.*, p. 174. — Chili N.

11.191. MARGINATA (Vieill.), *N. Dict.* XXVII, p. 138 ; Gurn., *Ibis*, 1860, p. 218; Seeb., *l. c.*, p. 161 ; *leucopolius*, Wagl. ; *nivifrons*, Cuv. ; *albidipectus*, Ridgw. — Afrique S.

3102. *Var.* MECHOWI, Cab., *J. f. O.*, 1884, p. 437, 1885, pl. 6, ff. 2ᵃ, 2ᵇ. — Angola.

3103. *Var.* PALLIDA (Strickl.), *Contr. Orn.*, 1852, p. 158 ; Sharpe, *Cat.*, p. 284 ; *marginata* (pt.), auct. plur. (nec V.); *tenellus*, Hartl., *Faun. Madag.*, p. 72 ; *niveifrons*, Schl. (nec Cuv.); *marginatus var. tenellus*, M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag., Ois.*, p. 509 ; Seeb., *l. c.*, p. 163, pl. 7. — Afrique tropicale, Madagascar.

11.192. VENUSTA (Fisch. et Rchw.), *J. f. O.*, 1884, p. 178, 1885, pl. 6, ff. 4ᵃ, 4ᵇ ; Cab., *J. f. O.*, 1884, p. 437 ; Sharpe, *l. c.*, p. 286. — Afrique E.

11.193. RUFOCINCTA (Rchw.), *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 123. — Afrique S.-W.

11.194. RUFOCAPILLA (Tem.), *Pl. Col.* 147, f. 2; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 17 ; *canus*, Gould, *P. Z. S.*, 1837, p. 134. — Austr., Tasm., Nouv.-Zél., Nouv.-Guin. S.

11.195. COLLARIS (Vieill.), *N. Dict.* XXVII, p. 136 ; Tacz., — Amérique centrale et

Digitized by Google

*Orn. Pér.* III, p. 344; Seeb., *l. c.*, p. 173; *azaræ*, Tem., *Pl. Col.* 184; *larvatus*, Less.; *nivosa*, Salv. (nec Cass.); *gracilis*, Cab.; Rchw., *J. f. O.*, 1885, pl. VI, ff. 3ᵃ, 3ᵇ. — méridionale jusqu'à l'Argentine, petites Antilles.

11.196. MELODA (Ord.), in Wils., *Amer. Orn.* VII, p. 71; Audub., *B. Amer.* V, p. 223, pl. 321; Seeb., *l. c.*, p. 121; *hiaticula var.*, Wils.; *okeni*, Wagl. — Amérique N.-E., du S. du Labrador aux Antilles.

3104. *Var.* CIRCUMCINCTA, Coues, *Check-l. N. Am. B.*, 1873, p. 133; Seeb., *l. c.*, p. 122. — Vallée du Mississippi, au N. jusqu'au lac Winnipeg.

11.197. FALKLANDICA (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 747; Scl., *P. Z. S.*, 1860, p. 386; Scl. et Huds., *Arg. Orn.* II, p. 172; Seeb., *l. c.*, p. 156; *trifasciatus*, Licht.; *pyrocephalus*, Garn.; *annuligerus*, Wagl.; *bifasciata*, Fras. — Chili, Argentine, Patagonie, îles Malouines.

11.198. PECUARIA (Tem.), *Pl. Col.* 183; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 1035, pl. 34, f. 7; Seeb., *l. c.*, p. 158; *varius*, Vieill. (nec L.); Harting, *Ibis*, 1873, p. 262, pl. 8; *pastor*, Cuv.; *kitlittzi*, Rchb.; *isabellinus*, Müll.; *pectoralis*, *frontalis*, Licht.; *longipes*, Heugl. — Afrique, au N. jusqu'au Delta du Nil.

3105. *Var.* SANCTÆ-HELENÆ, Harting, *Ibis*, 1873, p. 266, pl. 9; Seeb., *l. c.*, p. 160; *pecuarius*, auct. plur. (nec Tem.). — Ile Stᵉ-Hélène.

11.199. THORACICA, Richm., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1896, p. 53. — Madagascar.

11.200. MELANOPS (Vieill.), *N. Dict.* XXVII, p. 139; Sharpe, *l. c.*, p. 300; *nigrifrons*, Tem., *Pl. Col.* 47, f. 1; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 20; Seeb., *l. c.*, p. 138; *russatus*, Jerd., *Madr. Journ.* XII, p. 215. — Australie.

11.201. CUCULLATA (Vieill.), *N. Dict.* XXVII, p. 136; Sharpe, *l. c.*, p. 302; *monachus*, Wagl.; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 18; Seeb., *l. c.*, p. 127, pl. 15. — Australie, Tasmanie.

## 1737. PLUVIANELLUS

*Pluvianellus*, Jacq. et Pucher. (1853).

11.202. SOCIABILIS, Jacq. et Puch., *Voy. Pôle Sud, Zool.* III, p. 125, pl. 30; Seeb., *l. c.*, p. 107, pl. 2. — Patagonie.

## 1738. THINORNIS

*Thinornis*, Gray (1846).

11.203. NOVÆ-ZEALANDIÆ (Gm.), *S. N.* I, p. 684; Gray, *Voy. Ereb. and Terr., B.*, p. 12, pl. 2: Bull., *B. N. Zeal.*, p. 214, pl. 23; Seeb., *l. c.*, p. 128; *dudoroa*, Wagl.; *torquatula*, Forst., *Icon. ined.*, pl. 121; ? *atricinctus*, Ellm. — Nouv.-Zélande, île Chatham.

Digitized by Google

3106. *Var.* Rossi, Gray, *Voy. Ereb. and Terr.*, *B.*, p. 12, pl. 11; Sharpe, *l. c.*, p. 505; *novæ-zealandiæ* (pt.), Seeb., *l. c.*, p. 129. — Iles Auckland.

### 1739. ANARHYNCHUS

*Anarhynchus*, Quoy et Gaim. (1830).

11.204. FRONTALIS, Quoy et Gaim., *Voy. del'Astrol.*, *Zool.* I, p. 252, pl. 31, ff. 2-5; Bull., *B. New Zeal.*, 2e éd., p. 9, pl. 26, f. 2; Seeb., *l. c.*, p. 152; *albifrons*, Rchb. — Nouv.-Zélande.

## FAM. XIII. — SCOLOPACIDÆ

## SUBF. I. — HIMANTOPODINÆ

### 1740. HIMANTOPUS

*Himantopus*, Briss. (1760); *Macrotarsus*, Lacép. (1801); *Himantellus*, Rafin. (1815); *Hypsibates*, Nitzsch (1827).

11.205. PLINII, Gerini, *Orn. meth. Dig.* IV, p. 67 (1773); Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 274, pl. 221; *Char. himantopus*, Lin.; *hæmatopus*, Bodd.; *candidus*, Bonn. (1790); Dress., *B. Eur.* VII, p. 587, pl. 555, 556; *vulgaris, rufipes*, Bechst.; *atropterus, melanopterus*, Mey.; *albicollis*, Vieill.; *asiaticus*, Less.; *intermedius*, Blyth; *longipes, melanocephalus*, etc., Brm.; *minor*, Natt.; *autumnalis*, Fsch. (ex Hasselq.); *nigricollis*, Severtz. — Europe centrale et méridionale, Asie centrale et méridionale, Afrique, Madagascar.

11.206. BRASILIENSIS, Brm., *Vög. Deutschl.*, p 684; Seeb., *l. c.*, p. 281; Scl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 179; *melanurus!* Vieill.; Sharpe, *l. c.*, p. 316; *mexicanus*, Max. (nec Müll.); *nigricollis*, Gould (nec V.); Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 382. — Brésil, Chili, Argentine.

11.207. LEUCOCEPHALUS, Gould, *P. Z. S.*, 1837, p. 26; id., *B. Austr.* VI, pl. 24; Seeb., *l. c.*, p. 283; *melanopterus*, S. Müll. (nec Mey.); *novæ-hollandiæ*, Bp.; *rufipes*, Mart. (nec Bechst.); *autumnalis*, Wald. (nec Hasselq.) — Australie, Nouv.-Guinée, Moluques, îles de la Sonde.

3107. *Var.* PICATA, Ellm., *Zool.*, 1861, p. 7470; *picatus*, Seeb., *l. c.*, p. 284; *novæ-zealandiæ*, Rchb. (nec Gould); *leucocephalus*, auct. plur. (nec Gould); *albicollis*, Bull. (nec V.) — Nouv.-Zélande.

Digitized by Google

11.208. MEXICANUS (P. L. S. Müll.), *S. N., Anh.*, p. 117; Lath., *Ind. Orn.* II, p. 741; Seeb., *l. c.*, p. 279; *himantopus*, Wils. (nec L.); *nigricollis*, Vieill. et auct. plur.; Audub., *B. Am.* VI, p. 31, pl. 354; *leucurus*, Vieill. — États-Unis, Amérique centrale et méridionale jusqu'au Pérou et Amazone, Antilles, Galapagos.

11.209. KNUDSENI, Stejn., *P. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 81, pl. 6, f. 2; Seeb., *l. c.*, p. 280; Rothsch., *Avif. Lays.*, pl. 67; *nigricollis*, Pelz. (nec V.); *candidus*, Dole (nec Bonn.) — Iles Sandwich.

11.210. MELAS, Hombr. et Jacq., *Ann. Sc. Nat.* XVI, 1841, p. 320; Seeb., *l. c.*, p. 285; *novæ-zealandiæ*, Gould; id., *B. Austr.* VI, pl. 25; Bull. *New-Zeal.*, éd. 2, p. 24, pl. 27, f. 1; *niger*, Ellm. — Nouvelle-Zélande.

## 1741. CLADORHYNCHUS

*Leptorhynchus*, Du Bus (1835, nec Ménétr., 1832); *Cladorhynchus*, Gray (1841); *Xiphidiorhynchus*, Rchb. (1845).

11.211. LEUCOCEPHALUS (Vieill.), *N. Dict.* III, p. 103; id., *Gal. Ois.* II, pl. 271; Salv., *Ibis*, 1874, p. 252, note; *orientalis*, Cuv.; *pectoralis*, Du Bus, *Bull. Acad. R. Belg.*, 1835, 2, p. 420, pl. 7; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 26; *palmatus*, Gd. — Australie.

## 1742. RECURVIROSTRA

*Recurvirostra*, Lin. (1752); *Avocetta*, Briss. (1766); *Himantopus*, Seeb. (pt., 1887).

11.212. AVOCETTA, Lin.; Dress., *B. Eur.* VII, p. 577, pl. 554; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 270, pl. 220; *Avoc. recurvirostris*, Bodd.; *europæa*, Dum.; *tephroleuca*, Vieill.; *fissipes*, etc., Brm.; *sinensis*, Swinh. — Europe centrale et méridionale, Asie centrale, Inde, Ceylan, Afrique, Madagascar.

11.213. AMERICANA, Gm., *S. N.* I, p. 693; Audub., *B. Am.* VI, p. 24, pl. 353; Seeb., *l. c.*, p. 291; *occidentalis*, Vig. — Amérique sept. tempérée, Amér. centr., grandes Antilles.

11.214. NOV.Æ-HOLLANDIÆ, Vieill., *N. Dict.* III, p. 103; Bull., *B. New Zeal.*, ed. 2, II, p. 20, pl. 27, f. 1; *rubricollis*, Tem.; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 27; Seeb., *l. c.*, p. 292. — Australie, Nouvelle-Zélande.

11.215. ANDINA, Phil. et Landb., *Arch. f. Naturg.*, 1863, p. 131; Harting, *Ibis*, 1874, p. 257, pl. 9; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 384; Seeb., *l. c.*, p. 286. — Chili (Andes).

Digitized by Google

## SUBF. II. — TOTANINÆ

### 1743. IBIDORHYNCHUS

*Ibidorhynchus*, Vig. (1850); *Clorhynchus*, Hodgs. (1855); *Falcirostra*, Severtz. (1873).

11.216. STRUTHERSI, Vig., *P. Z. S.*, 1850, p. 174; Gould, *B. Himalaya*, pl. 79; id., *B. Asia*, VII, pl. 61; *strophiatus*, Hodgs.; *kaufmanni*, *longipes*, Severtz. — Himalaya, Asie centr. jusqu'en Mongolie et le N. de la Chine.

### 1744. NUMENIUS

*Numenius*, Briss. (1760); *Phæopus*, Cuv. (1817); *Cracticornis*, Gray (1841); *Mesoscolopax*, Sharpe (1896).

11.217. ARQUATUS (Lin.); Dress., *B. Eur.* VIII, p. 245, pl. 563; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 249, pl. 215; *madagascariensis*, Lin.; *major*, Steph.; *virgatus*, Cuv. — Europe, Asie S.-W., Afrique, Madagascar.

3108. *Var.* LINEATA, Cuv., *Règ. An.* I, p. 521; Seeb., *l. c.*, p. 524; *nasicus*, Tem.; *arquatula*, Hodgs.; *cassini*, Swinh., *Ibis*, 1867, p. 398. — Asie orientale, centrale et méridionale, Archipel Malais.

11.218. TENUIROSTRIS, Vieill., *N. Dict.* VIII, p. 802; Dress., *B. Eur.* VIII, p. 237, pl. 562; Dubois, *l. c.* II, p. 254, pl. 216; Seeb., *l. c.*, p. 525; *syngenicus*, v. d. Mühl., *Orn. Griechenl.*, p. 111. — Europe méridionale et centrale, Afrique N., région Aralo-Caspienne.

11.219. CYANOPUS, Vieill., *N. Dict.* VIII, p. 306; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 330; *australis*, Gould; id., *B. Austr.* VI, pl. 42; *major*, Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 110, pl. 66; *rostratus*, Licht.; *australasianus*, Gr.; *rufescens*, Gd.; *tahitiensis*, Swinh., *P. Z. S.*, 1871, p. 410 (nec Gm.) — Asie orientale, Japon, Archipel Indien, Australie.

11.220. LONGIROSTRIS, Wils., *Am. Orn.* VIII, p. 23, pl. 64, f. 4; Audub., *B. Am.* VI, p. 33, pl. 355; *melanopus*, Vieill.; *occidentalis*, Woodh. — Amérique sept. tempérée, Amér. centr., grandes Antilles.

11.221. PHÆOPUS (Lin.); Dress., *l. c.*, VIII, p. 227, pl. 561; Dubois, *l. c.* II, p. 257, pl. 217; *minor*, Leach; *vulgaris*, Flem.; *islandicus*, Brun.; *melanorhynchus*, Bp.; *hæsitatus*, Hartl., *Orn. W. Afr.*, p. 233. — Europe, Islande, Groenland, Afrique, Inde, Indo-Chine, Malacca.

3109. *Var.* VARIEGATA (Scop.), *Del Fl. et Faun. Insubr.* II, p. 92; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 332; *luzoniensis*, Gm.; *phæopus* (pt.), auct. plur. (nec L.); *atricapillus*, V.; *uropygialis*, Gould; id., *B. Austr.* VI, pl. 43; *tahitensis*, Cass. (nec Gm.); *minor*, Rosenb. (nec Leach); *melanorhynchus*, Tacz. (nec Bp.) — Asie orientale, Japon, Archipel Indien, Australie.

Digitized by Google

11.222. HUDSONICUS, Lath., *Ind. Orn.* II, p. 712; Audub., *B. Am.* VI, p. 42, pl. 356; *borealis*, Gm. (nec Forst.); *rufiventris*, Vig.; *brasiliensis*, Max.; *intermedius*, Nutt.; *phæopus* (pt.), Cab.; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 308. — Amérique septentrionale, centrale et méridionale.

11.223. TAHITIENSIS (Gm.), *S. N.* I, p. 656; Seeb., *l. c.*, p. 332; *femoralis*, Peale, *U.S. Exped.*, *B.*, 1848, p. 233, pl. 64; *phæopus* (pt.), Schl.; *australis*, Dole (nec Gd.); *tibialis*, Layard. — Amérique N.-W., îles Hawaï et autres du Pacifique.

11.224. BOREALIS (Forst.), *Phil. Trans.*, 1772, pp. 411, 431; Audub., *B. Am.* VI, p. 45, pl. 357; Dress., *B. Eur.* VIII, p. 221, pl. 560; Dubois, *Ois. Eur.* II, p. et pl. 144ᵃ; *brevirostris*, Licht.; Tem., *Pl. Col.* 381; *microrhynchus*, Phil. et Landb. — Amérique septentrionale, centrale et méridionale.

11.225. MINUTUS, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 176; id., *B. Austr.* VI, pl. 49; Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 111, pl. 67; Sharpe, *Cat.* XXIV, p. 371; *minor*, S. Müll. et auct. plur. (nec Leach). — Asie orientale, Japon, Archipel Indien, Australie.

## 1745. LIMOSA

*Limosa*, Briss. (1760); *Limicula*, Vieill. (1816); *Fedoa*, Steph. (1824).

11.226. LAPPONICA (Lin., 1758); Dress., *l. c.* VIII, p. 203, plᵉ 558, f. 1, 559, f. 2; *rufa*, Briss.; Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* II, p. 244, pl. 214; *ægocephala*, Lin.; *leucophæa*, Lath.; *gregaria*, Otto; *ferrugineus*, Mey.; *meyeri*, Leisl.; *noveboracensis*, Leach; *pectoralis*, Steph. — Europe et Sibérie occidentale jusqu'au 74° latitude N., Afrique N. et N.-W.

3110. *Var.* BAUERI, Naum., *Vög. Deutschl.* VIII, p. 429 (1836); Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 459; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 329; *brevipes*, *australasiana*, Gr.; *novæ-zealandiæ*, Gray; *uropygialis*, Gould; id., *B. Austr.* VI, pl. 29; *foxii*, Peale; *rufa* et *lapponica* (pt.), auct. plur.; *punctata*, Ellm.; *melanuroides*, Tristr., *Ibis*, 1876, p. 265 (nec Gd.) — Alaska, Asie orientale, Japon, Archipel Indien, Australie, Nouvelle-Zélande, îles Fidji et Samoa.

11.227. BELGICA (Gm.), *S. N.* I, p. 665; Salvad., *Elenco Ucc. Ital.*, p. 228; Saund., *Man. Br. B.*, p. 609; *S. limosa*, Lin.; *ægocephala*, auct. plur. (nec Lin.); Dress., *l. c.* II, plᵉ 558, f. 2, 559, f. 1; *melanura*, Leisl.; Dubois, *l. c.* II, p. 240, pl. 213; *islandica*, Brm. — Europe jusqu'au 68°½ latitude N., Islande, Groenland, Asie occidentale, Inde, Ceylan, Afrique N. et N.-E.

3111. *Var.* MELANUROIDES, Gould, *P. Z. S.*, 1846, p. 84; id., *B. Austr.* VI, pl. 28; *ægocephala*, Pall. (nec L.); *melanura*, Horsf. (nec Leisl.); *brevipes*, auct. plur. (nec Gr.) — Asie or. jusqu'au 55°1. N., Japon, à l'Ouest jusqu'au Jenisseï, Arch. Indien, Austr.

Digitized by Google

11.228. HUDSONICA (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 720; Audub., *B. Am.* V, p. 335, pl. 349; *edwardsi*, Sw.; *australis*, Gr.; *hæmastica*, Coues, et auct. plur. amer. — Amér. sept., centr. et mérid., de l'Alaska aux Malouines.

11.229. FEDOA (Lin.); Audub., *B. Am.* V, p. 331, pl. 348; *marmorata*, Lath.; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 115, pl. 343; *americana*, Steph.; *adspersa*, Naum. — Amérique septentr. de l'Alaska au Guatémala et Cuba.

## 1746. MACRORHAMPHUS

*Macrorhamphus*, Leach (1816); *Limnodromus*, Max (1833); *Pseudoscolopax*, Blyth (1859).

11.230. GRISEUS (Gm.), *S. N.* I, p. 658; Dress., *B. Eur.* VIII, p. 187, pl. 556; *noveboracensis*, Gm.; Audub., *B. Am.* VI, p. 10, pl. 351; *ferrugineicollis*, *leucophæa*, Vieill. (nec Lath.); *paykullii*, Nilss.; *scolopacea*, Say; *punctatus*, Less.; *longirostris*, Bell. — Sibérie E., Amérique septentrionale et centrale, au S. jusqu'au Brésil.

11.231. TACZANOWSKII, Verr., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1860, p. 206, pl. 14; Seeb., *Geogr. Distr. Charadr.*, p. 399; *semipalmatus*, auct. plur. (nec Gm.) — Sibérie E., Bengale N.-E., Birmanie, Bornéo.

## 1747. MICROPALAMA

*Hemipalma*, Bp. (1827, nec 1826); *Micropalama*, Baird (1858).

11.232. HIMANTOPUS (Bonap.), *Ann. Lyc. N. Y.*, 1826, p. 157; Audub., *B. Am.* V, p. 271, pl. 334; Baird, *B. N. Am.*, p. 726; *douglasii*, Sw.; *auduboni*, Nutt.; *multistriata*, Gray; *multifasciata*, Licht. — Amérique N.-E., centrale et Antilles, au Sud jusqu'au Chili et l'Uruguay.

## 1748. SYMPHEMIA

*Symphemia*, Rafin. (1819); *Catoptrophorus*, Bp. (1826); *Hodites*, Kp. (1829).

11.233. SEMIPALMATA (Gm.), *S. N.* I, p. 659; Audub., *l. c.* V, p. 324, pl. 347; Seeb., *l. c.*, p. 358; *crassirostris*, Vieill.; *atlantica*, Rafin.; *speculifera* Cuv., *Règ. Anim.* I, p. 551; Seeb., *l. c.*, p. 359; *inornata*, Brewst., *Auk*, 1887, p. 145. — Amér. sept. jusqu'au 56° l. N., Amér. centr. et Nord de l'Amér. mérid., Antilles (accidentellement Europe W.)

## 1749. TOTANUS

*Totanus*, Bechst. (1803); *Glottis*, Koch (1816); *Limicola*, Leach (1816); *Gambetta*, *Erythroscelis*, *Helodromas*, *Rhyacophilus*, Kp. (1829); *Heteroscelus*, Baird (1858, nec Lath.); *Pseudototanus*, Hume (1878); *Heteractitis*, *Pseudoglottis*, Stejn. (1884); *Ægialodes*, Heine (1890).

11.234. FUSCUS (Lin.); Dress., *B. Eur.* VIII, p. 165, pl. 568, ff. 2, 3, 569, f. 1; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, — Europe et Asie jusqu'au 70° lat. N.,

Digitized by Google

p. 197, pl. 204; *maculata*, Tunst.; *cantabrigiensis*, Lath.; *nigra, curonica*, Gm.; *atra*, Sand.; *natans*, Otto; *longipes*, Leisl.; *raii*, Leach; *indicus*, Rchb.; *ocellatus*, Bp.; *obscurus*, C. Dub. — Japon, Afrique N.

11.235. CALIDRIS (Lin.); Dress., *l. c.*, p. 157, pl. 568, f. 1, 569, f. 2; Dubois, *l. c.*, p. 202, pl. 205; *striata, gambetta*, Lin.; *littoralis*, etc., Brm. — Europe jusqu'au 70° et en Asie jusqu'au 55° l. N., Archipel Malais, Afrique.

11.236. STAGNATILIS, Bechst., *Orn. Taschenb.* II, p. 292; Dress., *l. c.*, p. 151, pl. 566; Dubois, *l. c.*, p. 193, pl. 203; *tenuirostris*, Horsf.; *guinetta*, Pall.; *lathami*, Gr. et Hardw.; *gracilis*, Brm. — Europe et Asie jusqu'au 50° l. N., Archipel Malais, Australie.

11.237. MELANOLEUCUS (Gm.), *S. N.* I, p. 659; Audub., *Orn. Biogr.* IV, p. 68, pl. 308; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 565; *vociferus*, Wils., *Am. Orn.* VII, p. 57, pl. 58, f. 5; *solitarius*, Vieill. (nec Wils.); *chilensis*, Phil.; *vociferans*, Heine et Rchw. — Amérique septentrionale, centrale et méridionale, Antilles.

11.238. FLAVIPES (Gm.); Audub., *B. Am.* V, p. 313, pl. 344; *natator, fuscocapillus*, Vieill. — Amér., du cercle arctique au Chili et Argent. (acc. Europe.)

11.239. OCHROPUS (Lin.); Dress., *l. c.*, p. 155, pl. 564; Dubois, *l. c.*, p. 211, pl. 207; *leucurus, rivalis*, Brm.; *punctulatus*, C. Dub., *Pl. Col., Ois. Belg.* II, p. 186 (1857). — Europe et Asie jusqu'au cercle polaire, Afrique.

11.240. SOLITARIUS (Wils.), *Amer. Orn.* VII, p. 53, pl. 58, f. 3; Audub., *B. Am.* V, p. 309, pl. 343; *chloropygius, punctatus*, Vieill.; *caligatus*, Licht.; *glareola*, Ord. (nec L.); *macroptera*, Spix. — Amérique sept., centr. et mérid., du cercle polaire arctique à l'Argent., Antilles.

11.241. INCANUS (Gm.), *S. N.* I, p. 658; Seeb., *Geogr. Distr. Charadr.*, p. 560; *glareola*, Pall. (nec L.); *solitarius*, Blox. (nec Wils.); *fuliginosus*, Gould; *undulata, pacifica*, Forst.; *polynesiæ*, Peale, *U. S. Expl. Exped.*, p. 257, pl. 65, f. 1; *oceanicus*, Less.; *brevipes*, Cass. (nec V.); Baird, *B. N. Am.*, p. 734, pl. 88. — Amérique N.-W. jusqu'au Mexique, Galapagos, Océanie.

3112. *Var.* BREVIPES, Vieill., *N. Dict.* VI, p. 410; Seeb., *l. c.*, p. 561; *pulverulentus*, Müll.; Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 109, pl. 65; *griseopygius*, Gould, *B. Austr.* VI, p. 58; *incanus* (pt.), auct. plur. (nec Gm.) — Asie E. jusqu'au Kamtschatka, Japon, Archipel Malais, Australie.

11.242. GUTTIFER, Nordm., in *Erman's Reise um die Erde*, p. 17; Stejn., *Zeitschr. ges. Orn.* I, p. 225, pl. 10; Seeb., *l. c.*, p. 554; *haughtoni*, Armstr., *Str. F.* IV, p. 344; Harting, *Ibis*, 1883, p. 155, pl. 4. — Kamtschatka, Asie E., Birmanie, Bengale N.-E., Haïnan.

11.243. GLOTTIS (Lin., 1758); Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 188, pl. 202; *nebularius*, Gunn. (1767); Sharpe, — Europe et Asie jusqu'au cercle polaire,



Digitized by Google

*Cat. B.* XXIV, p. 481; *cineracea*, Lath.; *canescens*, Gm.; Dress., *B. Eur.* VIII, p. 173, pl. 570; *fistulans*, *griseus*, Bechst.; *chloropus*, Mey.; *natans*, Koch; *glottoides*, Vig.; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 36; *horsfieldi*, Syk.; *floridanus*, Bp.; *vigorsi*, Gr.; *nivigula*, Hodgs.; *albicollis*, Brm.; *littoreus*, Rchw. — Japon, Archipel Malais, Australie, Afrique (accidentellement Amérique).

3113. *Var.* EURHINA, Oberh., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1900, p. 207. — Asie centrale.

11.244. GLAREOLA (Gm.), *S. N.* I, p. 677; Dress., *l. c.* VIII, p. 143, pl. 565; Dubois, *l. c.* II, p. 207, pl. 206; *littorea*, Pall.; *grallatoris*, Mont.; *affinis*, Horsf.; *sylvestris*, *palustris*, etc., Brm.; *glareoloides*, Hodgs. — Europe et Asie jusqu'au 70° latitude N., Japon, Archipel Malais, Afrique.

## 1750. ACTITIS

*Actitis*, Ill. (pt., 1811); *Tringoides!* Bp. (1831); *Guinetta*, Gr. (1840).

11.245. HYPOLEUCA (Lin.); Illig., *Prodr.*, p. 262; Dress., *l. c.* VIII, p. 127, pl. 563; *guinetta*, Briss.; Dubois, *l. c.*, p. 215, pl. 208; *leucoptera*, Pall.; *cinclus*, *stagnatilis*, etc., Brm.; *empusa*, Gould; id., *B. Austr.* VI, pl. 55; *schlegeli*, Bp. — Europe et Asie jusqu'au cercle polaire, Océanie, Australie, Afrique, Madagascar.

11.246. MACULARIA (Lin.); Audub., *B. Am.* V, p. 303, pl. 342; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 218, pl. 208[b]; *notata*, Bp.; *hypoleucos*, *var. macularius*, Ridgw.; *T. solitarius cinnamomeus*, Brewst. — Amérique, du cercle polaire arctique au 20° l. S. (accid. Europe W., Belgique.)

## 1751. TEREKIA

*Xenus*, Kaup (1829, nec Ross.); *Terekia*, Bp. (1838); *Simorhynchus*, Keys. et Blas. (1840); *Rhynchosimus*, Heine et Rchw. (1890).

11.247. CINEREA (Güld.), *Nov. Comm. Petrop.* XIX, p. 473, pl. 19; Dress., *B. Eur.* VIII, p. 195, pl. 572; *recurvirostra*, Pall.; *javanicus*, Horsf.; *sumatrana*, Raffl.; *terek*, Vieill.; *terekensis*, Steph.; *indiana*, Less.; *terekius*, Seeb., *l. c.*, p. 369. — Europe N.-E., Asie, Archipel Indien, Australie, Afrique.

## 1752. PAVONCELLA

*Pavoncella*, Leach (1816); *Machetes*, Cuv. (1817); *Philomachus*, Gray (1841).

11.248. PUGNAX (Lin.); Dress., *l. c.* VIII, p. 87, pl[s] 557, 558; Dubois, *l. c.* II, p. 183, pl[s] 201, 201[b]; *littorea*, L.; *grenovicensis*, *equestris*, Lath.; *alticeps*, *planiceps*, Brm.; *indica*, *hardwickii*, Gray; *optatus*, Hodgs.; *cinerea*, Butl. — Europe jusqu'au 70° l. N., en Asie depuis la mer Caspienne jusqu'au Kamtschatka, au S. jusqu'à l'Inde (pas en Chine et Indo-Ch.), Afrique.

Digitized by Google

### 1753. BARTRAMIA

*Bartramia*, Less. (1831); *Actidurus*, Bp. (1831); *Euliga*, Nutt. (1834); *Actiturus*, Bp. (1838).

11.249. LONGICAUDA (Bechst.), *Kurze Uebers. Lath.*, p. 453, pl. 184; Dress., *l. c.*, p. 119, pl. 562; *bartramia*, Wils., *Am. Orn.* VII, p. 65, pl. 59, f. 2; Audub., *B. Am.* V, p. 248, pl. 527; *variegatus*, *melanopygius*, Vieill.; *laticauda*, Less. — Amérique septentrionale, centrale et méridionale jusqu'à l'Uruguay (accid. Europe W.)

### 1754. EREUNETES

*Ereunetes*, Illig. (1811); *Hemipalama*, Bp. (1825); *Heteropoda*, Nutt. (1834).

11.250. PUSILLUS (Lin.); Cass., *Pr. Acad. Philad.*, 1860, p. 196; *petrificatus*, Ill.; *semipalmata*, Wils., *Amer. Orn.* VII, p. 151, pl. 65, f. 4; Audub., *B. Am.* V, p. 277, pl. 536; *brevirostris*, Spix; *brissoni*, Less.; *minor*, Lemb. — Amérique septentr., centrale et méridionale jusqu'au 43° latitude Sud.

3114. *Var.* MAURI (Bp.), *Comp. List B.*, p. 49; Gundl., *J. f. O.*, 1856, p. 419; *cabanisi*, Licht.; *occidentalis*, Lawr., *Pr. Ac. N. Sc. Philad.*, 1864, p. 107. — Amérique N.-W. de l'Alaska à l'Amérique centrale (côtes), Sibérie N.-E.

## SUBF. III. — SCOLOPACINÆ

### 1755. ARENARIA

*Arenaria*, Briss. (1760); *Morinella*, Mey. et Wolf (1810); *Strepsilas*, Illig. (1811); *Cinclus*, Gr. (1841).

11.251. INTERPRES (Lin.); Dress., *B. Eur.* VII, p. 555, pl. 552; Dubois, *Fne. Ill. Vert. Belg. Ois.* II, p. 133, pl. 191; *morinella*, Lin.; *hudsonica*, P. L. S. Müll.; *collaris*, Mey. et Wolf; *cinclus*, Pall.; *oahuensis*, Blox.; *borealis*, *littoralis*, etc., Brm.; *cinerea*, Ol.-Gal. — Cosmopolite.

11.252. MELANOCEPHALA (Vig.), *Zool. Journ.*, 1829, p. 356; Cass., *B. N. Am.*, p. 702, pl. 7; Seeb., *Geogr. Distr. Charadr.*, p. 411; *interpres*, *var. melanocephalus*, Coues, *Key N. Am. B.*, p. 247; Stejn., *Auk*, 1884, p. 129. — Amérique N.-W., de l'Alaska à la Californie.

### 1756. APHRIZA

*Aphriza*, Audub. (1839).

11.253. VIRGATA (Gm.), *S. N.* I, p. 674; Gr., *Gen. B.* III, pl. 147; Seeb., *Geogr. Distr. Charadr.*, p. 412; — Amérique W., de l'Alaska au Chili.

Digitized by Google

*borealis*, Gm.; *townsendi*, Audub., *B. Amer.*, pl. 428; *winterfeldti*, Tschudi; id., *Faun. Per.*, p. 296, pl. 54.

### 1757. TRYNGITES

*Tryngites*, Cab. (1856).

11.254. SUBRUFICOLLIS (Vieill.), *N. Dict.* XXXIV, p. 465; Turn., *Contr. Nat. Hist. Alaska*, p. 189; *rufescens*, Vieill., *l. c.*, p. 470; Audub., *B. Am.* V, p. 264, pl. 331; Dress., *B. Eur.* VIII, pl. 561; *brevirostris*, Licht.; *nævius*, Heerm.; *squalida*, Natt. — Amérique, de la zone arctique jusqu'au Paraguay (accidentellement Europe).

### 1758. CALIDRIS

*Calidris*, Cuv. (1800), Illig. (1811); *Arenaria*, Bechst. (1803, nec Briss. (1860).

11.255. ARENARIA (Lin.); Dress., *B. Eur.* VII, p. 555, pl. 552; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 150, pl. 195; *calidris*, L.; *rubidus*, Gm.; *vulgaris*, *grisea*, Bechst.; *tridactyla*, Pall.; *tringoides*, Vieill.; *americana*, *mulleri*, Brm. — Europe, Asie, Amérique jusqu'au 82° latit. N., Afrique, Madagascar (côtes), presque cosmopol.

### 1759. EURHYNORHYNCHUS

*Eurhynorhynchus*, Nilss. (1821).

11.256. PYGMÆUS (Lin.); Boie, *Isis*, 1826, p. 979; Gray, *Gen. B.* III, p. 580, pl. 156; Harting, *Ibis*, 1869, p. 427, pl. 12; *griseus*, Nilss.; *orientalis*, Blyth. — Asie N.-E. jusqu'en Chine, Inde et Birm., Japon, Amér. N.-W.

### 1760. TRINGA

*Tringa*, Lin. (1758); *Erolia*, Vieill. (1816); *Pelidna*, Cuv. (1817); *Falcinellus*, Cuv. (1829, nec Vieill.); *Leimonites*, *Ancylocheilus*, *Actodromas*, Kp. (1829); *Canutus*, Brm. (1831); *Schœniclus*, Gray (1844); *Arquatella*, Baird (1858); *Delopygia*, *Heteropygia*, Coues (1861); *Limnocinclus*, Gould (1865); *Actia*, H. et Rchw. (1890).

11.257. SUBARQUATA (Guld.), *Nov. Comm. Petrop.* XIX, p. 471; Dress., *B. Eur.* VIII, p. 59, pl. 555; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 162, pl. 196; *africana*, *pygmæa*, Gm.; *dethardingi*, Siemss.; *islandica*, Retz.; *pusillus*, Bechst.; *ferrugineus*, Mey.; *falcinella*, Pall.; *variegata*, *varia*, Vieill.; *cursorius*, Tem., *Pl. Col.* 510; *macrorhyncha*, *arquata*, Brm.; *chinensis*, Gr.; *cuvieri*, Bp. — Europe, Asie, Afrique, Archipel Indien, Australie (sur les côtes et les rives des fleuves; accidentellement Amérique N.-W.)

11.258. CANUTUS, Lin.; Dress., *l. c.*, p. 77, pl. 553, 556; Dubois, *l. c.*, p. 154, pl. 194; *cinerea*, Brünn.; *calidris* et *islandica*, Lin.; *australis*, *nævia*, Gm.; — Zone arctique, côtes de l'Europe, de l'Afr. N. et W., Amér. E.

Digitized by Google

*ferruginea*, Mey. et Wolf; *rufa*, Wils.; *rufescens*, Brm.; *lomatina*, Licht.; *cooperi*, Bd., Cass. et Lawr., *B. N. Am.*, p. 716. — jusqu'au 32° l. S., Asie E., Archip. jusqu'à la Nouv.-Zél.

11.259. CRASSIROSTRIS, Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 107, pl. 64; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 468; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 512; *magnus*, Gould; id., *B. Austr.* VI, pl. 33; *tenuirostris*, Swinh. (nec Horsf.) — Asie orientale, Japon, Inde, Archipel Malais, Australie.

11.260. ALPINA, Lin.; Dress., *l. c.*, p. 21, pl. 548; *cinclus*, Briss.; Dubois, *l. c.*, p. 166, pl. 197; *variabilis*, Bechst.; *schinzi*, Brm.; *minor*, Schl.; *torquata*, Degl. — Europe, Asie entre le 20° et le 72° latitude N., Afrique N. et N.-E.

3115. *Var.* PACIFICA, Coues, *Pr. Ac. N. Sc. Philad.*, 1861, p. 189; *variabilis, cinclus, alpina* (pt.), auct. plur.; Audub., *B. Am.* V, p. 266, pl. 332; *americana*, Baird., Cass. et Lawr., *B. N. Am.*, p. 719 (nec Brm.) — Amérique septentrionale et centrale, Sibérie E. jusqu'en Chine.

11.261. MARITIMA, Brünn., *Orn. bor.*, p. 54 (1764); Gm., *S. N.* I, p. 678; Dubois, *l. c.*, p. 159, pl. 195; *lincolniensis, canadensis*, Lath.; *nigricans*, Mont.; *arquatella*, Pall.; *striata*, Flem. (nec Lin.); Dress., *l. c.*, p. 69, pl. 554; *littoralis*, Brm. — Europe jusqu'au Spitzberg, Sibér. N.-W., Groenland, Amérique N.-E.

3116. *Var.* COUESI (Ridgw.), *Bull. Nutt. Orn. Club*, 1880, p. 160; Seeb., *l. c.*, p. 430; *maritima* (pt.), auct. plur. — Amérique N.-W., îles Aléoutiennes.

3117. *Var.* PTILOCNEMIS, Coues, *Birds N.-W.*, p. 491; Seeb., *l. c.*, p. 431; *crassirostris*, Dall (nec T. et S.); *gracilis*, Harting. — Iles Pribilov et de la mer de Behring, Alaska en hiver.

11.262. TEMMINCKI, Leisl., in *Bechst., Naturg. Deutschl., Nachtr.* II, p. 78; Dress., *l. c.*, pl. 549, f. 1, 551, f. 2; Dubois, *l. c.*, p. 175, pl. 199; *gracilis*, Brm.; *damacensis*, Tacz. (1882). — Europe et Asie jusqu'au 70° lat. N., Japon, Afrique N. et N.-E.

11.263. MINUTA, Leisl., in *Bechst., Naturg. Deutschl., Nachtr.* I, p. 74; Dress., *l. c.*, p. 29, pl. 549, f. 1, 550, f. 1, 551, f. 1; Dubois, *l. c.*, p. 171, pl. 198; *pusilla* (pt.), Mey. et W. (nec L.); *damacensis*, Tacz. (1876); *orientalis*, Tacz. (1895). — Europe jusqu'à la Nouvelle-Zemble, Asie occidentale, Inde, Ceylan, Afrique.

3118. *Var.* RUFICOLLIS, Pall., *Reis. Russ. Reichs.* III, p. 700; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 742; Seeb., *l. c.*, p. 437, pl. 15; *salina*, Pall.; *albescens*, Tem., *Pl. Col.* 41; *australis*, Less.; *minuta* (pt.), auct. plur. (nec Leisl.); *damacensis*, Swinh.; *minutilla*, Bean (nec V.) — Asie orientale, Japon, Indo-Chine, Archipel Malais jusqu'à l'Australie.

11.264. SUBMINUTA, Middend., *Reis. in N. u. O. Sibir., Zool.* II, p. 222, pl. 19, f. 6; Seeb., *l. c.*, p. 438; ? *damacensis*, Horsf.; Sharpe, *Cat.*, p. 553 et auct. plur. (nec Horsf.); *minuta*, Blyth (nec Leisl.); — Asie orientale, îles de la mer de Behring, Japon, Indo-Chine, Bengale, Archipel

Digitized by Google

*salina*, Gr. (nec Pall.); *ruficollis*, Wald. (nec Pall.); Dav. et Oust., *Ois. Ch.*, p. 472. — Malais jusqu'en Australie.

11.265. MINUTILLA, Vieill., *N. Dict.* XXXIV, p. 466; Dress., *l. c.*, p. 51, pl. 552, ff. 2, 3; *pusilla*, Wils. (nec Lin.); Audub., *B. Am.* V, p. 280, pl. 337; *wilsoni*, Nutt.; *temmincki*, D'Orb. (nec Leisl.); *nana*, *georgica*, Licht. — Amérique septentr., centr. et mérid. jusqu'au Brésil, Antilles (accidentellement Europe).

11.266. MACULATA, Vieill., *N. Dict.* XXXIV, p. 465; Dress., *l. c.*, p. 11, pl. 556; *pectoralis*, Say; Gould, *B. Eur.* IV, pl. 527; *fuscicollis*, Tsch. (nec Vieill.); *dominicensis*, Degl.; *maculosa*, Moore. — Amérique sept., centr. et mérid., de l'Alaska à la Patagonie (accid. Europe).

11.267. ACUMINATA (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.*, 1821, p. 192; Swinh., *P. Z. S.*, 1863, p. 316; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 313; Seeb., *l. c.*, p. 441; *australis*, Jard. et Sel., *Ill. Orn.* II, pl. 91 (nec Gm.); Gould, *B. Austr.* VI, pl. 30; *subarquata*, S. Müll. (nec Güld.); *rufescens*, Midd. (nec V.) — Asie orientale, Japon, Archipel Indien, Australie, Nouvelle-Zélande, Alaska.

11.268. BAIRDI (Coues), *Pr. Ac. N. Sc. Philad.*, 1861, p. 194; Tacz., *Orn. Pérou*, III, p. 359; Seeb., *l. c.*, p. 444; *schinzi*, Gr. (nec Brm.); *pectoralis*, Cass. (nec Say); *dorsalis*, Licht.; *bonapartii*, Baird. — Amérique W. de l'Alaska au Chili.

11.269. FUSCICOLLIS, Vieill., *N. Dict.* XXXIV, p. 461; Dress., *B. Eur.* VIII, p. 15, pl. 547; *schinzi*, Bp. (nec Brm.); *bonapartii*, Schl.; Seeb., *l. c.*, p. 444; *americana*, Brm.; *melanotos*, Bp. (nec V.) — Amérique N.-E., Antilles, Amér. centr. et mérid. E. jusqu'aux îles Malouines.

## 1761. LIMICOLA

*Limicola*, Koch (1816); *Tringa* (pt.), auct. plur.

11.270. PLATYRHYNCHA (Tem.), *Man. d'Orn.*, p. 398 (1815); Dress., *B. Eur.* VIII, p. 3, pl. 545; Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* II, p. 179, pl. 200; *pygmæus*, Bechst. (nec Lath.); *pusillus*, Bechst. (nec L.); *eloroides*, Vieill.; *hartlaubi*, Verr.; *sibirica*, Dress. — Europe sept. et Sibérie, hiverne dans le N. de l'Afrique, le S. de l'Asie et dans l'Archipel Indien.

## 1762. GALLINAGO

*Gallinago*, Leach (1816); *Telmatias*, Boie (1826); *Pelorhynchus*, Kp. (1829); *Nemoricola*, Hodgs. (1837); *Homoptilura*, Gray (1840); *Xylocota*, Bp. (1855); *Cœnocorypha*, Gray (1855); *Spitura*, Bp. (1856).

11.271. STENURA (Kuhl), in *Bp.*, *Ann. Stor. Nat. Bolog.* IV, 1830, p. 335; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 478; Seeb., *l. c.*, p. 477; *stenoptera*, Kl.; *horsfieldi*, Gray; id. et Hardw., *Ill. Ind. Zool.* II, pl. 54, f. 3; *heterura*, *biclavus*, Hodgs.; *pectinicauda*, Peale; *indica*, Licht (nec Hodgs.); *sthenura*, Le Mess.; *heterocerca*, Prjev. nec Cab.) — Asie orientale, à l'ouest jusqu'au Jenisseï et l'Inde.

Digitized by Google

11.272. MEGALA, Swinh., *Ibis*, 1861, p. 345; Schl., *Mus. P.-B., Scolop.*, p. 12; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 479; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 537; *solitaria*, Swinh. (1860, nec Hodgs.); *uniclavus*, Gr. (1860, (nec Hodgs.); *stenura*, Radde, *Reis. Sibir.* II, p. 334, pl. 13 (nec Kl.); *burka* et *australis*, Fsch. (nec Lath.); *heterura*, Cab. (nec Hodgs.); *heterocerca*, Cab., *J. f. O.*, 1870, p. 235. — Sibérie E., Japon, Chine, Philippines, Bornéo, Moluques.

11.273. MEDIA (Frisch), *Vorst. Vög. Deutschl.*, pl. 228 (1763); Gerini, *Orn. Meth. Dig.* IV, p. 59, pl. 446 (1775); Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 223, pl. 209; *major*, Gm.; Dress., *B. Eur.* VII, p. 631, pl. 541; *paludosa*, Retz.; *palustris*, Pall.; *leucurus*, Sw.; *nisoria*, etc., Brm.; *montagui*, Bp. — Europe jusqu'au 70° latitude N., Sibérie occidentale jusqu'au Jenisseï, Afrique.

11.274. NIGRIPENNIS, Bonap., *Icon. Faun. Ital., Ucc.*, p. 4; Fsch. et Hartl., *Vög. Ostafr.*, p. 769; *æquatorialis*, Rüpp; Seeb., *l. c.*, p. 500; *angolensis*, Bocage. — Afrique tropicale jusqu'au Cap de Bonne-Espérance.

3119. *Var.* MACRODACTYLA, Bp., *Icon. Faun. Ital., Ucc.*, p. 3 (1852); id., *C. R.* XLIII, p. 579; Sharpe, *Cat.*, p. 649; *elegans*, *mauritiana*, Desj.; *bernieri*, Puch., *Rev. Zool.*, 1845, p. 279; *nigripennis* (pt.), Fsch. et Hartl.; *nigripennis, var. bernieri*, M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag., Ois.*, p. 637, pl. 260. — Madagascar, île Maurice.

11.275. GALLINARIA, O. F. Müll., *Zool. Dan. Prodr.*, p. 25 (1776); *Scolopax gallinago*, Lin.; *cœlestis*, Frenz. (1801); Dress., *B. Eur.* VII, p. 641, pl^s 542, 545; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 226, pl. 211; *media*, Leach et auct. plur. (nec Frisch); *sakhalina*, Vieill.; *brehmi*, Kp.; *sabinii*, Vig.; *faeroeensis*, etc., Brm.; *delamottii*, *pygmæa*, Bail.; *uniclavus*, Hodgs.; *scolopacina*, *burka*, Bp.; *peregrina*, Tem.; *latipennis*, Hartl.; *vulgaris*, C. Dub.; *russata*, Gould; *wilsoni*, Swinh. (nec Tem.) — Europe, Asie jusqu'au 70° latitude Nord, Islande, Afrique N. et N.-E., Sénégambie.

11.276. DELICATA (Ord.), ed. *Wils. Amer. Orn.* IX, p. 218 (1825); Turn., *Contr. N. H. Alaska*, p. 146; Sharpe, *Cat.*, p. 642; *gallinago*, Wils. (nec L.); *wilsoni*, Tem.; Audub., *B. Amer.* V, p. 359, pl. 350; *drummondi*, *douglasii*, Sw.; *gallinaria, var. wilsoni*, Ridgw. — Amérique septentrionale jusqu'au cercle arctique, Amérique centrale et Nord de l'Amérique méridionale.

11.277. PARAGUAYÆ (Vieill.), *N. Dict.* III, p. 356 (1816); Schl., *Mus. P.-B., Scolop.*, p. 11; Sharpe, *Cat.*, p. 650 (part.); *frenata*, Ill. (*descr. nulla*); Burm., *Th. Bras.* III, p. 577; Seeb., *l. c.*, p. 494; *longirostris*, Cuv.; *wilsoni*, Léot. (nec Tem.); *S. frenata brasiliensis*, Seeb. — Amérique méridionale jusque l'Argentine.

Digitized by Google

3120. *Var.* Andina (Tacz.), *P. Z. S.*, 1874, p. 561; id., *Orn. Pér.* III, p. 575; *frenata* (pl.), auct. plur. — Pérou.

3121. *Var.* Magellanica (King), *Zool. Journ.*, 1835, p. 95; Seeb., *l. c.*, p. 496; Deichl., *J. f. O.*, 1897, p. 152; *paraguayæ*, Sharpe, *l. c.*, p. 650 (nec Vieill.) — Magellan, Malouines.

3122. *Var.* Chilensis (Seeb.), *Geogr. Distr. Charadr.*, p. 496; Deichl., *J. f. O.*, 1897, p. 152. — Chili, Patagonie.

11.278. nobilis, Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 31; Schl., *l. c.*, p. 9; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 196, pl. 98; *granadensis*, Bp. — Colombie, Ecuador.

11.279. australis (Lath.), *Ind. Orn., Suppl.*, p. 65; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 40; Seeb., *l. c.*, p. 473; *hardwickii*, Gray. — Japon, Formose, Australie, Tasmanie.

11.280. dubia, Deichl., *J. f. O.*, 1897, p. 151. — Japon.

11.281. solitaria, Hodgs., *Glean. in Science*, III, p. 258; id., *Icon. ined. in Br. Mus., Grall.*, pl. 104, *App.*, pl. 48; Sharpe, *Cat.*, p. 654 (pt.); *hyemalis*, Eversm., *Bull. Soc. Mosc.*, 1845, p. 257, pl. 6. — Himalaya, du Turkestan à l'Altaï au S. jusqu'à l'Assam.

3123. *Var.* Japonica (Bp.), *C. R.* XLIII, p. 715 (1856); Swinh., *Ibis*, 1873, p. 364; Seeb., *Ibis*, 1886, p. 129; id., *Geogr. Distr. Charadr.*, p. 476; Stejn., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 129; *solitaria* (pt.), auct. plur.; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 476, pl. 122. — Japon, Sibérie S.-E., Chine.

11.282. nemoricola, Hodgs., *P. Z. S.*, 1856, p. 8; id., *Icon. ined. Br. Mus., Grall.*, pl. 96b, 97, 98; Schl., *l. c.*, p. 16; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* III, p. 325, pl.; *nepalensis*, Bp. — Himalaya, Inde, Assam, Birmanie.

11.283. gigantea (Tem.), *Pl. Col.* 403; Schl., *l. c.*, p. 8; *lacunosa*, Licht.; *undulata gigantea*, Seeb., *l. c.*, p. 493. — Brésil, Paraguay.

11.284. undulata (Bodd.), *Tabl.*, p. 54; *Pl. Enl.* 895; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 196; Seeb., *l. c.*, p. 492; *paludosa*, Gm.; Schl., *l. c.*, p. 8. — Guyane.

11.285. strickland, Gray, *List Grall. Brit. Mus.*, p. 112; id., *Voy. Erebus and Terr., B.*, pl. 25; Schl., *l. c.*, p. 15; *meridionalis*, Peale; *spectabilis*, Hartl.; *paludosa*, Scl. (1857, nec Gm.); *nobilis*, Oust. (1891, nec Scl.) — Du Chili à Magellan.

11.286. jamesoni (Bp.), *C. R.* XLI, p. 660; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 196; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 576; Seeb., *l. c.*, p. 489. — Colombie, Ecuador, Pérou, Bolivie.

11.287. aucklandica (Gray), *List Grall. Br. Mus.*, p. 112; id., *Voy. Ereb. and Terr.*, p. 15, pl. 13; Seeb., *l. c.*, p. 472; *holmesii*, Peale; *tristrami*, Rothsch. — Iles Auckland et Antipodes.

Digitized by Google

3124. *Var.* HUEGELI, Tristr., *Bull. Br. Orn. Club,* I, 1893, p. 47; id., *Ibis,* 1893, p. 447. — Ile Snares.

3125. *Var.* PUSILLA, Bull., *Ibis,* 1869, p. 41; id., *B. New Zeal.*, ed. 2, II, p. 33, pl. 28, f. 1; Forb., *Ibis,* 1893, p. 529, pl. 14; *aucklandica* (pt.), auct. plur. (nec Gr.) — Ile Chatham.

11.288. IMPERIALIS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1869, p. 419; id., *Exot. Orn.*, p. 193, pl. 97; Seeb., *l. c.*, p. 491. — Colombie.

## 1763. LIMNOCRYPTES

*Limnocryptes,* Kaup (1829); *Philolimnos,* Brm. (1831); *Ascalopax,* Keys. et Blas. (1840).

11.289. GALLINULA (Lin.); Dress., *B. Eur.* VII, p. 653, pl. 544; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 231, pl. 210; *stagnatilis* et *minor,* Bechst.; *minima,* Leach. — Europe et Asie jusqu'au 70° latit. N., Afrique N.

## 1764. SCOLOPAX

*Scolopax,* Lin. (1766); *Rusticola,* Vieill. (1816); *Neoscolopax,* Salvad. (1882).

11.290. RUSTICOLA, Lin.; Dress., *l. c.*, p. 615, pl. 540; Dubois, *l. c.*, p. 234, pl. 212; *rusticula,* Bodd.; *vulgaris,* Vieill.; *major,* Leach (nec Gm.); *pinetorum, sylvestris, orientalis,* etc., Brm.; *europæa,* Less.; *indicus,* Hodgs.; *communis,* Selby; *scoparia,* Bp. — Europe et Asie jusqu'au 60° latit. N. à l'E. et jusqu'au cercle polaire à l'Ouest, Afrique N.

11.291. SATURATA, Horsf., *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 191; id., *Zool. Research., Java,* pl. 63; Seeb., *l. c.*, p. 506, pl. 21; *javanica,* Less.; *russata,* Blyth; *rosenbergi,* Schl.; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 335. — Java, Nouvelle-Guinée.

11.292. ROCHUSSENI, Schl., *Nederl. Tijdschr. Dierk.* III, p. 254; Seeb., *l. c.*, p. 505, pl. 20; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 336. — Ile Obi (Moluques).

## 1765. PHILOHELA

*Microptera,* Nutt. (1834, nec *Micropterus,* Less. 1831); *Philohela,* Gray (1841).

11.293. MINOR (Gm.), *S. N.* I, p. 661; Wils., *Am. Orn.* VI, p. 40, pl. 48, f. 2; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 112, pl. 242; *americana,* Audub., *B. Am.* VI, p. 15, pl. 332. — Amérique septentrionale jusqu'au 50° latitude Nord.



Digitized by Google

### 1766. PHEGORNIS

*Leptopus*, Fras. (1844, nec Rafin., 1815); *Leptodactylus*, Fras. (1844, nec Fitz., 1826); *Leptoscelis*, Des M. (1846, nec Hall., 1835); *Phegornis*, Gray (1847); *Prosobonia*, Bp. (1850); *Æchmorhynchus*, Coues (1874).

11.294. MITCHELLI (Fras.), *P. Z. S.*, 1844, p. 137; id., *Zool. Typ.*, pl. 65; Des Murs, *Icon. Orn.*, pl. 41; Seeb., *Geogr. Distr. Char.*, p. 450, pl. 16. — Chili, Bolivie, Pérou.

11.295. CANCELLATUS (Gm.), *S. N.* I, p. 675; Seeb., *l. c.*, p. 451, pl. 17; *parvirostris*, Peale, *U. S. Expl. Exp.*, *B.*, p. 255, pl. 66, f. 2; *rufescens*, *var.* β., Bp. — Iles Paumotu et Christmas.

11.296. LEUCOPTERA (Gm.), *S. N.* I, p. 678; Schl., *Handl. Dierk.* I, p. 435, pl. 7, f. 89; Seeb., *l. c.*, p. 452, pl. 18; *pyrrhetræa*, Licht. — Ile Tahiti.

### 1767. RHYNCHÆA (1)

*Rostratula*, Vieill. (1816); *Rhynchœa*, Cuv. (1817).

11.297. CAPENSIS (Lin.), *Pl. Enl.* 881, 922; Cuv., *Règ. An.* I, p. 488 (1817); Shell., *B. Egypt.*, p. 250, pl. 11; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 480; *bengalensis*, L.; *chinensis*, *madagascariensis*, Bodd.; *indica*, *maderaspatana*, Gm.; *sinensis*, Lath.; *viridis*, *alba*, Vieill.; *orientalis*, Horsf.; *africana*, Less.; *picta*, Gr.; *variegata*, Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 109, pl. 240; *variabilis*, Tem.; *caffra*, Licht. — Afrique, Madagascar, Asie méridionale jusqu'en Chine et Japon, îles de la Sonde.

11.298. AUSTRALIS, Gould, *P. Z. S.*, 1837, p. 155; id., *B. Austr.* VI, pl. 41; Stejn., *Stand. N. H.* IV, *Birds*, p. 110. — Australie.

11.299. SEMICOLLARIS (Vieill.), *N. Dict.* VI, p. 402; Schl., *Mus. P.-B.*, *Scolop.*, p. 18; Seeb., *l. c.*, p. 459, pl. 19; *atricapilla*, Vieill.; *hilarea*, Valenc.; Less., *Ill. Zool.*, pl. 18; *occidentalis*, King.; *hilærea* et *hilarii*, Burm.; *curvirostris*, Licht. — Amérique méridionale au S. jusqu'à l'Argentine.

## SUBF. VI. — PHALAROPINÆ

### 1768. CRYMOPHILUS

*Phalaropus* (pt.), auct. plur.; *Crymophilus*, Vieill. (1816).

11.300. FULICARIUS (Lin.); Dress., *B. Eur.* VII, p. 606, pl. 538, 539, f. 1; Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* II, — Zone arctique jusqu'au 82 $^{1}/_{2}$° latitude N.,

(1) Le terme générique de *Rostratula* a priorité sur celui de *Rhynchæa*, mais ce dernier a été adopté par tous les auteurs, même par Vieillot après 1816. Il me semble donc qu'il n'y a pas lieu de ressusciter une dénomination abandonnée par son propre auteur, comme l'ont fait MM. Stejneger et Sharpe.

Digitized by Google

p. 261, pl^e 218 et 219, f. 1; *lobatus*, auct. plur. (nec L.); *glacialis*, Gm.; *hyperboreus*, Lath. (nec L.); *rufus*, Bechst.; *platyrhynchus*, Tem.; *griseus*, Leach; *rufescens*, Keys. et Blas.; *platyrostris*, Nordm.

en hiver dépasse rarement vers le Sud le 50° lat. N.

### 1769. PHALAROPUS

*Phalaropus*, Briss. (1760); *Lobipes*, Cuv. (1817); *Steganopus*, Vieill. (1819); *Holopodius*, Bp. (1828).

11.301. HYPERBOREUS (Lin.); Dress., *l. c.* VII, p. 597, pl^e 537, 539, f. 2; *lobata*, L.; *cinereus*, Briss.; Dubois, *l. c.*, p. 266, pl^e 218 et 219, f. 2; *fusca*, Gm.; *vulgaris*, Bechst.; *williamsii*, Sim.; *ruficollis*, *cinerascens*, Pall.; *angustirostris*, Naum.; *lobipes*, Keys. et Bl.; *australis*, *moluccensis*, Tem.; *asiaticus*, *tropicus*, Hume.

Zone arctique jusqu'au 75° l. N., en hiver au S. jusqu'au 45° en Europe, à l'E. jusqu'à la Nouv.-Guinée et en Amérique jusqu'au Guatémala.

11.302. TRICOLOR (Vieill.), *N. Dict.* XXXII, p. 136; Stejn., *Auk*, 1885, p. 183; *lobatus*, Wils. (nec L.); *wilsoni*, Sabine; Sw. et Rich., *Faun. Bor.-Am.* II, p. 405, pl. 69; Gray, *Gen. B.* III, pl. 158; *fimbriatus*, Tem., *Pl. Col.* 370; *frenatus*, Vieill.; *incanus*, Jard. et S.; *stenodactylus*, Wagl.

Amérique : au N. jusqu'au lac Winnipeg, descend vers le S. en hiver jusqu'en Patagonie.

## SUBORD. III. — FULICARIÆ

## FAM. XIV. — PARRIDÆ (1)

### 1770. HYDROPHASIANUS

*Hydrophasianus*, Wagl. (1832); *Hydrophasis*, Sharpe (1896).

11.303. CHIRURGUS (Scop.), *Del. Flor. et Faun. Insubr.* II, p. 92; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 483; *luzoniensis*, *sinensis*, Gm.; Gould, *B. Asia*, VII, pl. 68; *indica*. Hodgs., *Icon. ined.*, *Grall.*, pl. 109, f. 1 (nec Lath.)

Inde, Ceylan, Indo-Chine, Malacca, îles de la Sonde, Philippines, Formose.

### 1771. METOPIDIUS

*Metopidius*, Wagl. (1832).

11.304. INDICUS (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 765; Schl., *Mus. P.-B.*, *Ralli*, p. 67; Jerd., *B. Ind.* III, p. 708; *cuprea*, Valent.; *cristata*, Vieill.; *ænea*, Cuv.; *superciliosa*, Horsf.; id., *Zool. Res. Java*, pl. 64; *phœnicura*, Hodgs.; *arata*, Tick.; *melanochloris*, *melanoviridis*, Vieill.

Inde, Indo-Chine, grandes îles de la Sonde.

(1) Voy. : Sharpe, *Catalogue of Birds Brit. Mus.* XXIV, pp. 68-89 (1896).

Digitized by Google

### 1772. ACTOPHILUS

*Phyllopezus*, Sharpe (1896, nec Peters, 1877); *Actophilus*, Oberh. (1899).

11.305. AFRICANUS (Gm.), *S. N.* I, p. 709; Sw., *Zool. Ill.*, ser. 2, pl. 6; Schl., *l. c.*, p. 69; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag.*, *Ois.*, p. 581. — Afrique.

11.306. ALBINUCHA (I. Géoff.), *Mag. de Zool.*, 1832, *Aves*, pl. 6; Schl., *l. c.*, p. 70; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag.*, *Ois.*, p. 579, pl. 237-239; *atricollis*, Sw. — Madagascar.

### 1773. HYDRALECTOR

*Hydralector*, Wagl. (1832).

11.307. GALLINACEUS (Tem.), *Pl. Col.* 464; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 75; *cristatus*, Rchb. (nec V.); Schl., *l. c.*, p. 68; *novæ-hollandiæ*, Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 309. — Australie, Célèbes, Bornéo S.

3126. *Var.* NOVÆ-GUINEÆ (Rams.), *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1878, p. 298; Sharpe, *Cat.*, p. 81; *gallinacea* et *cristata* (pt.), auct. plur. — Nouvelle-Guinée.

### 1774. PARRA

*Parra*, Lin. (1766); *Jacana*, Schäff. (1774); *Asarcia*, Sharpe (1896).

11308. JACANA, Lin.; *Pl. Enl.* 322; Schl., *l. c.*, p. 66; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 331; *jassana*, Cab.; *intermedia*, Scl.; *spinosa*, Ridgw. (nec L.) — Amérique méridionale.

11309. MELANOPYGIA, Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 283; Sharpe, *l. c.*, p. 84. — Colombie, Panama.

11.310. NIGRA, Gm., *S. N.* I, p. 708; Schl., *l. c.*, p. 65; *hypomelæna*, Gray, *Gen. B.* III, pl. 159; Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 283. — Panama, Colombie, Vénézuéla.

11.311. GYMNOSTOMA, Wagl., *Isis*, 1831, p. 517; Schl., *l. c.*, p. 66; Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 183; ?*variabilis*, Lin.; Sharpe, *l. c.*, p. 86; ?*spinosa*, L.; Ell., *Auk*, 1888, p. 297; Coues, *Auk*, 1897, p. 88; *cordifera*, Less.; Des Murs, *Icon. Orn.*, pl. 42; *puniceа*, Licht.; *violacea*, Cory. — Du Texas au Costa-Rica et grandes Antilles.

### 1775. MICROPARRA

*Microparra*, Cab. (1877); *Aphalus*, Elliot (1888).

11.312. CAPENSIS (Smith), *Ill. Zool. S. Afr.*, *B.*, pl. 52; Cab., *J. f. O.*, 1877, p. 350; Elliot, *Auk*, 1888, p. 301; Sharpe, *Cat.*, p. 89. — Afrique S. et E.

Digitized by Google

## FAM. XV. — MESŒNATIDÆ (1)

### 1776. MESOENAS

*Mesites*, Géoff. St-Hil. (1838, nec Schönh.); *Mesitornis*, Bp. (*ubi?* teste Gray); *Mesœnas*, Rchb. (1850).

11.313. VARIEGATA (Géoff. St-Hil.), *C. R.* VI (1838), p. 443; id., *Rev. Zool.*, 1838, p. 50; id., *Mag. de Zool.*, 1839, p. 10, pl. 5 et 6; Des M., *Ic. Orn.*, pl. 11; M.-Edw. et Grand., *H. Madag., Ois.*, p. 601, pl. 246-251; *unicolor*, Des M., *l. c.*, pl. 12. — Madagascar.

## FAM. XVI. — RALLIDÆ (1)

### SUBF. I. — RALLINÆ

### 1777. RALLUS

*Rallus*, Lin. (1766); *Biensis*, Pucher. (1845); *Limnopardalus*, Cab. (1856); *Pardirallus*, Bp. (1856); *Ortygonax*, Heine et Rchw. (1890).

11314. ELEGANS, Audub., *B. Am.*, pl. 213; id., *B. Am.* 8°, V, p. 160, pl. 309; Baird, *B. N. Am.*, p. 746; *crepitans*, Wils. (nec Gm.) — Amérique septentr., du Canada au Texas et Floride, Cuba.

3127. *Var.* BELDINGI, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1882, p. 345; Bd., Brew. et Ridgw., *Water-B. N. Am.* I, p. 356. — Basse-Californie.

3128. *Var.* TENUIROSTRIS, Ridgw., *Amer. Nat.* VII, 1874, p. 14; id., *Man. N. Am. B.*, p. 138. — Mexique.

11.315. LEVIPES, Bangs, *P. New Engl. Zool. Club*, I, p. 45. — Californie.

11.316. LONGIROSTRIS, Bodd., *Tabl.*, p. 52; *Pl. Enl.* 849; Schl., *l. c.*, p. 11; *crepitans*, Cab. (nec Gm.); *cypereti*, Tacz., *P. Z. S.*, 1877, p. 747; id., *Orn. Pér.* III, p. 315. — Des Guyanes au Pérou.

3129. *Var.* CRASSIROSTRIS, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1869, p. 19; *longirostris* (pt.), auct. plur. — Brésil.

3130. *Var.* CREPITANS, Gm., *S. N.* I, p. 713; Audub., *B. Am.* V, p. 165, pl. 310; Ridgw., *Bull. Nutt. Orn. Club* V, 1880, p. 140; *longirostris* (pt.), auct. plur. (nec Bodd.) — Amérique N.-E.

3131. *Var.* WAYNEI, Brewst., *Bull. New Engl. Zool. Club*, I, p. 49. — Géorgie.

3132. *Var.* CARIBÆA, Ridgw., *Bull. Nutt. Orn. Club*, V, 1880, p. 140; Bd., Brew. et Ridgw., *Water-B. N. Am.* I, p. 359; *longirostris*, auct. plur. — Antilles.

(1) Voy. : Sharpe, *Catalogue Birds Brit. Mus.* XXIII (1894).

Digitized by Google

(nec Bodd.); *crepitans*, auct. plur. (nec Gm.); *elegans*, March (nec Audub.)

3133. *Var.* Cubana, Chapm., *Bull. Amer. Mus. N. H.*, 1892, p. 288. — Cuba.

3134. *Var.* Corvi, Mayn.; Cory, *B. W. Ind.*, p. 254; North., *Auk*, 1891, p. 77; Cory, *Auk*, 1891, p. 291; *caribæus* (pt.), Sharpe, *Cat.*, p. 13. — Iles Bahama.

3135. *Var.* Scotti, Sen., *Auk*, 1888, p. 305. — Floride.

3136. *Var.* Saturata, Ridgw., *Bull. Nutt. Orn. Club*, 1880, p. 140; Bd, Br. et Ridgw., *Water-B. N. Am.* I, p. 359; Sharpe, *l. c.*, p. 13, pl. 1; *crepitans*, Tayl. (nec Gm.); *scottii*, auct. plur. (nec Sen.) — Louisiane (côtes).

3137. *Var.* Obsoleta, Ridgw., *Amer. Nat.* VIII, 1871, p. 211; id., *Bull. Nutt. Orn. Club*, 1880, p. 159; *elegans*, Newb. (nec Audub.) — Amérique N.-W. de l'État de Washington à la Californie.

11.317. virginianus, Lin.; Aud., *B. Am.* V, p. 174, pl. 311; Schl., *l. c.*, p. 10; Sharpe, *Cat.*, p. 17, pl. 2, f. 2; *limicola*, Vieill. — Amérique du Nord et centrale jusqu'au Guatémala.

3138. *Var.* Æquatorialis, Sharpe, *Cat. B.* XXIII, p. 18, pl. 2, f. 1; *virginianus* (pt.), auct. plur. (nec L.) — Colombie, Ecuador, Pérou.

11.318. semiplumbeus, Sclat., *P. Z. S.*, 1856, p. 31; Schl., *l. c.*, p. 11; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 314; Sharpe, *l. c.*, p. 19, pl. 3. — Colombie.

11.319. antarcticus, King, *Zool. Journ.*, 1828, p. 95; Scl., *P. Z. S.*, 1867, p. 333, 1868, p. 445; Sclat. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 148; *rufopennis*, Gray; *uliginosus*, Phil. — Chili, Argentine, Patagonie.

11.320. peruvianus, Tacz., *Orn. Pérou*, III, p. 313. — Pérou.

11.321. aquaticus, Lin.; Dress., *B. Eur.* VII, p. 257, pl. 495; Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* II, p. 279, pl. 222; *obscura*, Gm.; *sericeus*, Leach; *germanicus*, *minor*, *fuscilateralis*, Brm. — Europe W. jusqu'au 66° l. N., Islande, Eur. E. et Asie W. jusqu'au 55°, Afr. N.

3139. *Var.* Indica, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1849, p. 820; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 489; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* III, p. 257, pl. 44; *aquaticus* (pt.), auct. plur. (nec L.); *var. japonicus*, Bp. — Sibérie E., Japon, Chine, Indo-Chine, Inde E, Ceylan.

11.322. cærulescens, Gm., *S. N.* I, p. 716; Schl., *l. c.*, p. 9; Fsch. et Hartl., *Vög. Ostafr.*, p. 777; *caffer*, Forst., *Icon. ined.*, f. 129; *aquaticus*, Gurn. (1859, nec L.) — Afrique S., jusque l'Angola à l'Ouest et le Tanganika à l'Est.

11.323. madagascariensis, Verr., *S. Afr. Q. Journ.* II, p. 80; Schl., *l. c.*, p. 10; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag.*, *Ois.*, p. 568, pl. 230b, f. 1, 231; *poliocephalus*, Gray; *typus*, Pucl.; *bernieri*, Gray. — Madagascar.

Digitized by Google

11.324. MACULATUS, Bodd., *Tabl.*, p. 48; *Pl. Enl.* 775; Schl., *l. c.*, p. 13; Scl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 148, pl. 19; *variegatus*, Gm.; Burm., *Th. Bras.* III, p. 382; *nivosus*, Sw.; Gundl., *Orn. Cuba*, p. 361. — Argentine, Paraguay, Brésil, Guyane, Vénézuéla, Colombie.

11.325. RYTIRHYNCHUS, Vieill., *N. Dict.* XXIII, p. 549; Scl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 149; *setosus*, King.; *cæsius*, Tsch. (nec Spix); *zelebori*, Pelz. — Brésil S., Argentine, Mendoza, Pérou central.

3140. *Var.* SANGUINOLENTA, Sw., *An. in Menag.*, p. 335; Sharpe, *l. c.*, p. 30; *cæsius*, Cass. (nec Spix); Schl., *l. c.*, p. 8; *bicolor*, Gray; *ricordi*, Bp.; *rytirhynchus*, Scl. et Salv. (nec V.); Oust., *Miss. Sc. Cap Horn, Zool.* VI, *Ois.*, p. 131, pl. 2. — Du Chili central au Pérou.

3141. *Var.* VIGILANTIS, Sharpe, *l. c.*, p. 31, pl. 4; *rytirhynchus* (pt.), auct. plur. (nec V.); *antarcticus*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1881, p. 14. — Magellan.

11.326. NIGRICANS, Vieill., *N. Dict. d'H. N.* XXVIII, p. 560; Schl., *l. c.*, p. 8; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 317; *immaculatus*, Licht.; *cæsia*, Spix, *Av. Bras.* II, p. 73, pl. 95. — Brésil jusqu'au Pérou et la Colombie.

## 1778. HYPOTÆNIDIA

*Hypotænidia*, Rchb. (1852); *Lewinia*, Bp. (1856); *Donacias*, Heine et Rchw. (1890).

11.327. STRIATA (Lin.); Jerd., *B. Ind.* III, p. 726; Schl., *l. c.*, p. 24; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 488; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 692; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* II, p. 245, pl. 43, f. 2; *gularis*, Horsf.; *albiventer*, Sw.; *indicus*, Rchb. (nec Blyth); *celebensis*, Pelz. (nec Q. et G.); *jouyi*, Stejn. — Inde S., Ceylan, Indo-Chine, Malacca, Formose, Archipel Indo-Malais, Célébes.

3142. *Var.* OBSCURIOR, Hume, *Str. F.* II, 1874, p. 302, 1879, p. 113; id. et Marsh., *Game B. Ind.* II, p. 253, pl. 43, f. 1; *striata* (pt.), auct. plur. (nec L.); *ferrea*, Wald; *abnormis*, Hume. — Iles Andaman.

11.328. OWSTONI, Rothsch., *Nov. Zool.* II, p. 481; *marchei*, Oust., *Arch. Mus. Paris*, VIII, 1896, p. 32. — Iles Mariannes.

11.329. PACIFICA (Gm.), *S. N.* I, p. 717; Forst., *Icon. ined.*, pl. 128. — Tahiti (*éteint*).

11.330. BRACHYPUS (Sw.), *An. in Menag.*, p. 336; Gould, *Handb. B. Austr.* II, p. 336; *pectoralis*, Less. (nec Gould); *lewini*, Sw.; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 77. — Australie, Tasmanie, îles Auckland.

3143. *Var.* EXSUL, Hart., *Nov. Zool.* V, p. 50. — Flores.

11.331. MUELLERI (Rothsch.), *Bull. Brit. Orn. Club*, VIII, p. 40 (1893); Sharpe, *l. c.*, p. 330. — Iles Auckland, Nouvelle-Zélande S.

11.332. PHILIPPENSIS (Lin.); *Pl. Enl.* 774; Bull., *B. N. Zeal.*, p. 176, pl. 20, f. 2; id., *l. c.*, éd. 2, II, — Archipel Malais, Australie, Nouvelle-

Digitized by Google

p. 95, pl. 33, f. 2; *assimilis*, Gray; *pacificus*, *var.* Forst.; *pectoralis*, Gould, *B. Austr.* VI, pl. 76 (nec Cuv.); *forsteri*, Hartl.; *etorques*, Bp.; *R. hypotænidia*, Verr. et Des M.; *rufopes*, Ellm.; *hypoleucus*, Hartl. et Fsch.; *pictus*, Potts; *australis*, Pelz. — Zélande et îles du Pacifique.

3144. *Var.* MACQUARIENSIS (Hutton), *Ibis*, 1879, p. 454; Scl., *P. Z. S.*, 1881, p. 968. — Ile Macquarie.

11.333. TORQUATA (Lin.); Mey., *N. Acta Acad.*, *C. L.-C. Cur.* XXVI, *Suppl.* I, p. 108, pl. 19; Schl., *l. c.*, p. 22; *lineatus*, Less. — Philippines.

11.334. CELEBENSIS (Quoy et Gaim.), *Voy. de l'Astrol. Zool.* I, p. 250, pl. 24, f. 2; Schl., *l. c.*, p. 22; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 697. — Célèbes.

11.335. SATURATA, Salvad., *M. S.*; Scl., *Ibis*, 1880, p. 310, note; Salvad., *Ann. Mus. Gen.*, 1882, p. 319; id., *Orn. Pap.* III, p. 260. — Nouvelle-Guinée N.-W., Salawati.

11.336. SULCIROSTRIS (Wall.), *P. Z. S.*, 1862, p. 346; Scl., *Ibis*, 1880, p. 311, pl. 6; Sharpe, *l. c.*, p. 46. — Iles Soula.

3145. *Var.* JENTINKI, Sharpe, *Notes Leyd. Mus.*, 1893, XV, p. 268; id., *Cat.*, p. 350; *sulcirostris* (pt.), Hart., *Nov. Zool.* V, p. 136; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 698. — Ile Soula-Mangola.

11.337. INSIGNIS, Scl., *P. Z. S.*, 1880, pp. 66 et 312, pl. 8; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 261. — Nouvelle-Bretagne.

## 1779. CABALUS

*Cabalus*, Hutton (1873); *Nesolimnas*, Andr. (1896).

11.338. DIEFFENBACHI (Gray), in *Dieffenb. Trav. N. Zeal.* II, *App.*, p. 197; Gray, *Voy. Erebus and Terror, B.*, p. 14, pl. 15; Bull., *B. N. Zeal.*, p. 179, pl. 20, f. 2. — Ile Chatham (*éteint*).

11.339. MODESTUS, Hutton, *Ibis*, 1872, p. 247, 1873, p. 349; id., *Tr. N. Zeal. Inst.* VI, 1874, p. 108; *dieffenbachi (juv.)*, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* XXIII, p. 47, pl. 6; *pygmæus*, Forb. — Ile Mangare (Chatham).

11.340. SYLVESTRIS (Scl.), *P. Z. S.*, 1869, p. 472, pl. 35; Sharpe, *l. c.*, p. 48. — Ile Lord Howe.

## 1780. EULABEORNIS

*Eulabeornis*, Gould (1844); *Tricholimnas*, Sharpe (1893).

11.341. CASTANEIVENTRIS, Gould, *P. Z. S.*, 1844, p. 56; id., *B. Austr.* VI, pl. 78; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 267. — Australie N., îles Arou.

11.342. POECILOPTERUS (Hartl.), *Ibis*, 1866, p. 171; Fsch. et Hartl., *Faun. Centralpolyn.*, p. 156, pl. 12, f. 1; Sharpe, *l. c.*, p. 50. — Iles Fidji.

Digitized by Google

11.343. WOODFORDI (Og.-Grant), *Ann. Mag. N. H.*, 1889, p. 320; Sharpe, *l. c.*, p. 50, pl. 7. — Iles Salomon.

11.344. LAFRESNAYANUS (Verr. et Des M.), *Rev. et Mag. de Zool.*, 1860, p. 437; Gray, *Cruise of Curaçoa*, pl. 21; Sharpe, *l. c.*, p. 51. — Nouvelle-Calédonie.

## 1781. GYMNOCREX

*Gymnocrex*, Salvad. (1875); *Schizoptila*, Brüggem. (1876).

11.345. ROSENBERGI (Schl.), *Ned. Tydschr. Dierk.* III, p. 212; Brügg., *Abh. Nat. Ver. Bremen*, V, p. 94; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 689, pl. 42, f. 1. — Célèbes.

11.346. PLUMBEIVENTRIS (Gray), *P. Z. S.*, 1861, pp. 432, 438; Schl., *Mus. P.-B.*, *Ralli*, p. 17; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 268; *hoeveni*, Rosenb.; *intactus*, Scl., *P. Z. S.*, 1869, p. 120, pl. 10. — Halmahera, Morotai, Nouvelle-Guinée, Mysol, îles Arou et Salomon.

## 1782. ARAMIDOPSIS

*Aramidopsis*, Sharpe (1893).

11.347. PLATENI (W. Blas.), in *Russ.*, *Isis*, 1886, p. 103; Sharpe, *Cat.*, p. 331; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 690, pl. 42, f. 2. — Célèbes.

## 1783. ARAMIDES

*Aramides*, Pucher. (1845); *Ortygarchus*, Cab. (1848).

11.348. MANGLE (Spix), *Av. Bras.* II, p. 74, pl. 97; Burm., *Th. Bras.* III, p. 385; Sharpe, *l. c.*, p. 54; *ruficollis*, Bp. (nec Gm.); Schl., *l. c.*, p. 15. — Brésil.

11.349. WOLFI, Berl. et Tacz., *P. Z. S.*, 1883, p. 576; Sharpe, *l. c.*, p. 55. — Ecuador.

11.350. AXILLARIS, Lawr., *Pr. Philad. Acad.*, 1863, p. 107; Sharpe, *l. c.*, p. 56; *mangle*, Cab. (nec Spix); ?*ruficollis*, Licht. (nec Gm.) — Colombie, Vénézuéla, Guyane, Honduras, Mexique S.

11.351. GUTTURALIS, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* XXIII, p. 57, pl. 5; ?*ruficollis*, Gm. et auct. plur.; *ruficeps* (pt.), Gray (nec Spix). — Pérou.

11.352. CAYANEA (P. L. S. Müll.), *S. N.*, *Suppl.*, p. 119; *Pl. Enl.* 352; *major*, Bodd.; *cayennensis*, Gm. et auct. plur.; *ruficeps* (pt.), Gr.; *maximus*, Schl., *l. c.*, p. 14. — Colombie, Guyane anglaise, Brésil N.

3146. *Var.* CHIRICOTE (Vieill.), *N. Dict.* XXVIII, p. 531; Sharpe, *l. c.*, p. 58; *maximus*, V.; *ruficollis*, *var.*, Sw., *Zool. Ill.* III, pl. 173; *ruficeps*, Spix, *Av. Bras.* II, p. 74, pl. 96; *cayennensis* (pt.), auct. plur. (nec Gm.) — Brésil, Amazone, Pérou jusqu'à Panama.



Digitized by Google

3147. *Var.* ALBIVENTRIS, Lawr., *Proc. Philad. Acad.*, 1867, p. 234; Sharpe, *l. c.*, p. 59; *cayennensis* (pt.), auct. plur. — Mexique, Guatémala, Honduras anglais.

3148. *Var.* PLUMBEICOLLIS, Zeledon, *Ann. Mus. Nac. Costa-Rica* I, p. 131, II, p. 3; Sharpe, *l. c.*, p. 332. — Honduras, Costa-Rica, Nicaragua.

11.353. YPACAHA (Vieill.), *N. Dict.* XXVIII, p. 568; Scl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 150; *melampyga*, Licht.; *gigas*, Spix, *Av. Bras.* II, p. 75, pl. 99; Burm., *Th. Bras.* III, p. 383; Schl., *l. c.*, p. 14. — Brésil S., Argentine.

11.354. SARACURA, Spix, *Av. Bras.* II, p. 75, pl. 98; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, p. 449; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 319; *nigricans*, Bp. (nec V.); *melanurus*, Bp.; *plumbea*, Max. — Brésil, Pérou.

11.355. CALLOPTERA, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1878, p. 439, pl. 28. — Ecuador.

## 1784. MEGACREX

*Megacrex*, D'Alb. et Salvad. (1879).

11.356. INEPTA, D'Alb. et Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.*, 1879, p. 130; Gould, *B. New-Guin.* V, pl. 69; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 272. — Nouvelle-Guinée S.-E.

## 1785. HABROPTILA

*Habroptila*, Gray (1860).

11.357. WALLACEI, Gray, *P. Z. S.*, 1860, p. 365, pl. 172; Schl., *l. c.*, p. 78; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 271. — Halmahera (Moluques).

## 1786. OCYDROMUS

*Ocydromus*, Wagl. (1830); *Gallirallus*, Lafr. (1841).

11.358. AUSTRALIS (Sparrm.), *Mus. Carls.* I, pl. 14; Gray, *Voy. Ereb. and Terr.*, p. 13, pl. 14; Schl., *l. c.*, p. 73; Bull., *B. N. Zeal.*, ed. 2, II, p. 116, pl. 35, f. 1; *troglodytes*, Forst. (*descr. nulla*); *brachypterus*, Schl., *l. c.*, p. 73 (nec Lafr.); *hectori*, Hutt.; *earli*, Fsch. (nec Gr.) — Nouvelle-Zélande (île S.)

11.359. EARLI, Gray, *Ibis*, 1862, p. 328; Bull., *B. N. Zeal.*, p. 165, pl. 19, f. 1; Sharpe, *l. c.*, p. 66; *greyi*, Bull., *B. N. Zeal.*, ed. 2, II, p. 105, pl. 34, f. 1. — Nouvelle-Zélande (îles N. et S.)

11.360. BRACHYPTERUS (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1841, p. 245; id., *Mag. de Zool.*, 1842, pl. 24; *fuscus*, Du Bus, *Esq. Orn.*, pl. 2; *nigricans*, Bull.; *finschi*, Hutt. — Nouvelle-Zélande (île S.)

Digitized by Google

## 1787. HIMANTORNIS

*Himantornis*, Hartl. (1855); *Psammocrex*, Oust. (1884).

11.361. HÆMATOPUS, Hartl., *J. f. O.*, 1855, p. 357; id., *Orn. W. Afr.*, p. 242; Schl., *l. c.*, p. 28; *himantopus*, Schl., *Handl. Dierk.* II, p. 448, pl. 7; *Psammocrex petiti*, Oust., *Le Nat.* II, 1884, p. 509. — Afrique W., de Libéria au Bas-Congo.

## 1788. ROUGETIUS

*Rougetius*, Bp. (1856); *Calamodromus*, Rchw. (1890); *Dryolimnas*, Sharpe (1893)

11.362. ABYSSINICUS (Rüpp.), *Syst. Uebers.*, p. 127, pl. 46; Schl., *l. c.*, p. 16; *rougeti*, Guér., *Rev. Zool.*, 1843, p. 322; Des M., in *Lef.*, *Voy. Abyss.*, p. 167, pl. 13. — Abyssinie, Choa.

11.363. CUVIERI (Puch.), *Rev. Zool.*, 1845, p. 279; Sharpe, *l. c.*, p. 70; *gularis*, Less. (nec Horsf.); Guér.-Mén., *Icon. Rég. An. Ois.*, pl. 58, f. 1; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag.*, *Ois.*, p. 569, pl. 232; *bernieri*, Bp.; *kioloides*, Roch et Newt. (nec Puch.) — Madagascar, île Maurice.

3149. *Var.* ALDABRANA (Günt.), *Ann. Mag. N. H.*, 1879, p. 164; Sharpe, *l. c.*, p. 71. — Ile Aldabra.

## 1789. CANIRALLUS

*Canirallus*, Bp. (1856, *descr. nulla*); Hartl. (1877).

11.364. OCULEUS (Hartl.), *J. f. O.*, 1855, p. 357; id., *Orn. W. Afr.*, p. 241; Bp., *C. R.* XLIII, p. 600; Hartl., *Faun. Madag.*, p. 80; Schl., *l. c.*, p. 20. — Afrique W., de Libéria à la Côte d'Or.

3150. *Var.* BATESI, Sharpe, *Bull. Br. O. Club*, LXX, 1900, p. 56. — Congo français et Caméron.

11.365. KIOLOIDES (Pucher.), *Rev. Zool.*, 1845, p. 279; Bp., *l. c.*, p. 600; Schl. et Pol., *Faun. Madag. Ois.*, p. 135, pl. 36; *griseifrons*, Gray, *Gen. B.* III, pl. 161; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag.*, *Ois.*, p. 571, pl. 233. — Madagascar.

## 1790. RALLINA

*Rallina*, Rchb. (1846); *Euryzona*, Bp. (1856); *Limnobænus*, Sund. (1872); *Castanolimnas*, Sharpe (1893).

11.366. FASCIATA (Raffl.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 328; Schl., *l. c.*, p. 19; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* II, p. 235, pl.; Oates, *Handb. B. Br. Burm.* II, p. 341; *euryzona*, Tem.; *ruficeps*, Cuv. — Indo-Chine, Malacca, Archipel Indo-Malais, Halmahera, îles Pelew.

Digitized by Google

11.367. SUPERCILIARIS (Eyt.), *Ann. Mag. N. H.*, 1845, p. 230; Hodgs., *Icon. ined. in Br. Mus.*, *Grallæ*, pl. 116; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 275; *nigrolineata*, Gray (*descr. nulla*); *ceylonica*, Blyth (nec Gm.); *amauroptera*, Jerd.; *euryzonoides*, Bp. et auct. plur. (nec Lafr.); *telmatophila*, Hume. — Inde, Ceylan, Indo-Chine, Malacca.

11.368. EURYZONOIDES (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1845, p. 368; Tweedd., *P. Z. S.*, 1877, p. 767; Sharpe, *Cat.*, p. 78, pl. 8, f. 1. — Philippines.

3151. *Var.* MINAHASA (Wall.), *P. Z. S.*, 1862, pp. 335, 346; Sharpe, *l. c.*, p. 78, pl. 8, f. 2; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 699; *tricolor* (pt.), Schl. — Célèbes, îles Soula.

11.369. SEPIARIA (Stejn.), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 395. — Liu Kiu (Japon).

11.370. FORMOSANA, Seeb., *Ibis*, 1895, pp. 146, 211. — Formose.

11.371. TRICOLOR, Gray, *P. Z. S.*, 1858, p. 188; Schl., *l. c.*, p. 18; Gould, *B. Austr., Suppl.*, pl. 78; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 265. — Arou, Waigiou, Mysol, Nouv.-Guinée, Duc York, Austr. N.-E.

3152. *Var.* VICTA, Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 175. — Ile Ténimber.

11.372. CANNINGI (Blyth), *Ibis*, 1863, p. 119; Shpe, *l. c.*, p. 80. — Iles Andaman.

11.373. FUSCA (Lin.); *Pl. Enl.* 773; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* II, p. 217, pl.; Schl., *l. c.*, p. 20; *rubiginosus*, Tem., *Pl. Col.* 357; *flammiceps*, Hodgs. — Inde, Ceylan, Indo-Ch., Bornéo, Java, Philippines, Christmas.

3153. *Var.* ERYTHROTHORAX (Tem. et Schl.), *Faun. Jap., Aves*, p. 121, pl. 78; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 486; Seeb., *Ibis*, 1892, p. 490; *fusca* (pt.), auct. plur. (nec L.) — Chine, Japon, Formose.

3154. *Var.* PHÆOPYGA (Stejn.), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 394; Sharpe, *l. c.*, p. 148. — Ile Liu Kiu.

11.374. PAYKULLI (Ljungh.), *Sver. Vet.-Akad. Handl.*, 1813, p. 258; Hume, *Str. F.*, 1879, p. 406; *erythrothorax*, Radde (nec T. et S.); *rufigenis*, Wall.; *mandarina*, Swinh., *Ann. Mag. N. H.*, 1870, p. 173; id., *P. Z. S.*, 1871, p. 415; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 488, pl. 123. — Sibérie E., Chine, Indo-Chine, Malacca, Java, Bornéo, Philippines.

11.375. MARGINALIS (Bp.), *C. R.* XLIII, p. 599 (*descr. nulla*); Hartl., *Orn. W. Afr.*, p. 241; Sharpe, *l. c.*, pp. 92, 335; *suahelensis*, Tristr., *P. Z. S.*, 1882, p. 93; Sharpe, *l. c.*, p. 150. — Afrique tropicale.

## 1791. CREX

*Crex*, Bechst. (1803); *Ortygometra*, Leach (1816); *Crecopsis*, Sharpe (1893).

11.376. PRATENSIS, Bechst., *Ornith. Taschenb.*, p. 337 (1803); Dress., *B. Eur.* VII, p. 291, pl. 499; Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* II, p. 283, pl. 223; *crex*, Lin.; *herbarum*, *alticeps*, Brm. — Europe jusqu'au cercle pol. à l'Ouest, Sibérie W. jusq. Jenisseï, Asie S.-W., Afrique.

Digitized by Google

11.377. EGREGIA, Peters, *M. B. k. Akad. Berl.*, 1834, p. 134; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 1241; *fasciata*, Heugl.; *angolensis*, Hartl.; Sharpe, *P. Z. S.*, 1870, p. 147; id., *Cat.*, p. 81. — Afrique tropicale.

## 1792. STICTOLIMNAS

*Stictolimnas*, Büttik. (1893).

11.378. SHARPEI, Büttik., *Notes Leyd. Mus.*, 1893, p. 274. — Amér. mérid. (loc. ign.)

## 1793. PORZANA

*Porzana*, Vieill. (1816); *Zapornia*, Leach (1816); *Phalaridion*, Kp. (1829); *Mustelirallus*, Bp. (1856); *Neocrex*, Scl. et Salv. (1868); *Phalaridium*, Sund. (1872); *Galeolimnas*, Heine (1890); *Amaurolimnas*, *Poliolimnas*, *Anurolimnas*, Sharpe (1893).

11.379. FULICULA (Scop.), *Ann.* I, p. 108; Salvad., *Elench. Ucc. Ital.*, p. 234; *R. porzana*, Lin.; *maruetta*, Leach; Dress., *B. Eur.* VII, p. 267, pl. 496; Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* II, p. 287, pl. 204; *maculata*, *punctata*, *leucothorax*, *gracilis*, Brm. — Eur. jusqu'au 65° l. N., Sibér. occ. jusq. 55° l. N.; Asie S.-W. et S. jusq. Birmanie, Afrique.

11.380. CAROLINA (Lin.); Audub., *B. Am.* V, p. 145, pl. 306; Baird., Cass. et Lawr., *B. N. Am.*, p. 749; Schl., *l. c.*, p. 28; *stolidus*, Vieill. — Amérique septentrion. et centr., Antilles, Colombie, Ecuador.

11.381. FLUMINEA, Gould, *P. Z. S.*, 1842, p. 139; id., *B. Austr.* VI, pl. 79; *novæ-hollandiæ*, Cuv., *M. S.* — Australie.

11.382. ALBICOLLIS (Vieill.), *N. Dict.* XXVIII, p. 561; Schl., *l. c.*, p. 34; *olivaceus*, V.; *mustelina*, Licht.; *gularis*, Jard. et Sel., *Ill. Orn.* I, pl. 39. — Brésil, Guyane, Vénézuéla, Trinidad.

11.383. PUSILLA (Pall.), *Reise Russ. Reichs*, III, *App.*, p. 700; Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* II, p. 294, pl. 226; *minuta*, Pall. (pt.); *intermedius*, Herm.; Sharpe, *Cat.*, p. 105; *bailloni*, Vieill.; Dress., *l. c.*, pl. 497; *stellaris*, Tem.; *pygmæa*, Brm. et auct. plur.; *foljambei*, Eyt. — Europe jusqu'au 55° l. N., à l'E. jusqu'au lac Baïkal, Afrique, Madagascar.

3155. *Var.* AURICULARIS, Rchw., *J. f. O.*, 1898, p. 139; *pusilla*, Sharpe (nec Pall.), *Cat.*, p. 106; *pygmæa*, auct. plur. (nec Brm.); *minuta*, Radde; *bailloni*, auct. plur. (nec V.) — Sibér. E., Japon, Chine, Birm., Inde, Ceylan, Philippines, Bornéo.

3156. *Var.* AFFINIS (Gray), *Voy. Ereb. and Terr.*, *B.*, p. 14; Bull., *B. New Zeal.*, p. 182, pl. 22, f. 1; *punctatus*, Ellm.; *pygmæa*, Fsch. (nec Brm.) — Nouvelle-Zélande.

3157. *Var.* OBSCURA, Neum., *Orn. Mon.*, 1897, p. 191. — Massaïland (Afr. E.)

11.384. PALUSTRIS, Gould, *P. Z. S.*, 1842, p. 139; id., *B. Austr.* VI, pl. 80. — Australie.

Digitized by Google

11.385. PARVA (Scop.), *Ann.* I, p. 108; Dress., *B. Eur.* VII, p. 283, pl. 498; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 291, pl. 225; *pusillus*, Gm. (nec Pall.); *mixtus*, Lapeyr.: *minuta*, *foljambii*, Mont.; *peyrousei*, V.; *olivacea*, Leach; *minutissima*, Brm. — Europe centr. et mér., Turkest., Afghanistan jusqu'à l'Inde N.-W., Afr. N.-W.

11.386. SPILOPTERA, Durnf., *Ibis*, 1877, p. 194, pl. 3; *salinazi*, Scl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 155 (nec Phil.) — Argentine.

11.387. FLAVIVENTRIS (Bodd.), *Tabl.*, p. 52; *Pl. Enl.* 847; Schl., *l. c.*, p. 31; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, p. 455; *minutus*, Gm. (nec Pall.); Gosse, *B. Jam.*, p. 372, pl. 104; *superciliaris*, Vieill.; *gossii*, Bp. — Cuba, Jamaïque, Guyane, Brésil.

11.388. TABUENSIS (Gm.), *S. N.* I, p. 717; Sharpe, *Cat.*, p. 111 (pt.); Finsch, *MT. Orn. Ver. Wien*, XVII, p. 4; ? *umbrina*, Cass.; ? *minor*, Ellm. — Ile Tongatabu (*éteint?*)

11.389. PLUMBEA (Gray), in *Griff. ed. Cuv.* III, p. 410; *immaculata*, Sw.; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 82; *vitiensis*, Hartl.; *tabuensis* (pt.), Sharpe, *Cat.*, p. 111, 335. — Iles Philipp., Samoa, Fidji, Nouv.-Hébr., Nouv.-Cal., Austr., Nouv.-Zél., Chath.

11.390. TAHITIENSIS (Gm.), *S. N.* I, p. 717; Hartl., *Arch. f. Naturg.*, 1852, p. 136; id., *J. f. O.*, 1854, p. 169; Fsch. et Hartl., *Orn. Centralpol.*, p. 170; *minutus*, Forst. (pt., nec Pall.) — Tahiti.

11.391. GALAPAGOENSIS, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* XXIII, p. 113; *spilonota* (pt.), Salv., *Tr. Z. S.* IX, p. 300. — Iles Galapagos.

11.392. BICOLOR, Wald., *Ann. Mag. N. H.*, 1872, p. 47; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* II, p. 223, pl. 38, f. 1; *elwesi*, Hume, *Str. F.*, 1875, p. 283. — Himalaya E. jusqu'à Manipour.

11.393. CONCOLOR (Gosse), *B. Jamaica*, p. 369, pl. 103; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, p. 452; *castaneus*, Cuv. (*descr. nulla*); *boecki*, Bp.; *cayennensis*, Moore (nec Gm.); *guatemalensis*, Lawr. — Jamaïque, Guatémala jusqu'au Pérou W., le Brés. et la Guyane.

11.394. CASTANEICEPS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, p. 455; id., *Exot. Orn.*, pl. 78; Sharpe, *l. c.*, p. 88; *verreauxii*, Bp. (*descr. nulla*). — Ecuador.

11.395. HAUXWELLI, Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 103, pl. 53; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 324; *sclateri*, Bp. (*descr. nulla*); *fasciata*, Scl. et Salv. (1867, nec Raffl.) — Haut-Amazone.

11.396. CINEREA (Vieill., nec *Rallus cinereus*), *N. Dict.* XXVIII, p. 29; Schl., *l. c.*, p. 32; *quadristrigatus*, Horsf.; *leucosoma*, Sw.; *tannensis*, Forst.; *quadristriata*, Licht.; *ocularis*, Gr.; *sandwichensis*, Rchb. (nec Gm.); *leucophrys*, Gould; id., *B. Austr.* VI, pl. 81; *var. media* et *minima*, Bp.; *superciliaris*, Fsch. (nec V.) — Malacca, Philippines, archipel Indien, Australie et la plupart des îles du Pacifique.

Digitized by Google

11.397. ERYTHROPS, Scl., *P. Z. S.*, 1867, p. 343, pl. 21; Tacz., *Orn. Pérou*, III, p. 325; *schomburgki*, Schl., *l. c.*, p. 37 (nec Cab.) — De l'Argentine au Vénézuéla et Pérou.

11.398. UNIFORMIS (Hart.), *Nov. Zool.* VIII, p. 369. — Ecuador N.-W.

11.399. COLOMBIANA (Bangs), *Pr. Biol. Soc. of Washington*, 1898, p. 171. — Colombie.

## 1794. PENNULA

*Pennula*, Dole (1879); *Kittlitzia*, Hartl. (1892, nec Hart.); *Aphanolimnas*, Sharpe (1892).

11.400. ECAUDATA (King), in *Cook's Voy. Pacif. Ocean*, III, p. 119; Hartl., *Abh. nat. Ver. Brem.*, 1892, p. 396; Sharpe, *l. c.*, p. 114 (pt.); *obscurus*, Gm. — Hawaï (Sandwich).

11.401. SANDWICHENSIS (Gm.), *S. N.* I, p. 525; Hartl., *l. c.*, p. 397; Rothsch., *Avif. Lays.*, pl. 76; *millsi*, Dole, *Haw. Ann.*, 1879, p. 14; *ecaudata* (pt.), Sharpe, *l. c.*, p. 114; *wilsoni*, Fsch., *Notes Leyd. Mus.* XX, p. 79. — Iles Sandwich.

11.402. MONASA (Kittl.), *Denkw. Reis. russ. Amer.* II, p. 30; Hartl., *Abh. nat. Ver. Brem.*, 1892, p. 391; Sharpe, *Bull. Br. Orn. Cl.*, 1892, p. 20; id., *Cat.*, p. 115. — Ile Kushai.

## 1795. SAROTHRURA

*Alechthelia*, Sw. (1837, nec Less., 1831); *Corethrura*, Rchb. (1849, nec Gray, 1846); *Sarothrura*, Heine et Rchw. (1890).

11.403. PULCHRA (Gray) in *Griff. ed. Cuv.*, *Aves*, pp. 410, 542; Sharpe, *Cat.*, p. 116, pl. 9; *cinnamomeus*, Less.; Hartl., *Orn. W. Afr.*, p. 242. — Afrique W. (de Sénégambie au Congo) et Afrique équator.

11.404. INSULARIS (Sharpe), *P. Z. S.*, 1870, p. 400, 1871, p. 31; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag.*, *Ois.*, p. 575, pl. 236. — Madagascar.

11.405. LINEATA (Sw.), *An. in Menag.*, p. 339; Sharpe, *l. c.*, p. 118; *jardinii*, Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 21; Schl., *l. c.*, p. 27; *ruficollis* (pt.), Gr.; Lay., *B. S. Afr.*, p. 339. — Afrique S., de Knysna au Natal.

11.406. WATERSI (Bartl.), *P. Z. S.*, 1879, p. 772, pl. 63; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag.*, *Ois.*, p. 577, pl. 234. — Madagascar.

11.407. ELEGANS (Smith), *Ill. Zool. S. Afr.*, *Aves*, pl. 22; Rchb., *Handb.*, *Fulicariæ*, pl. 125, f. 1221; Sharpe, *l. c.*, p. 120; *pulchra* (pt.), Gray. — Afrique S., de Knysna au Natal.

3158. *Var.* REICHENOWI, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* XXIII, p. 121; *elegans*, Rchw., *J. f. O.*, 1892, p. 178. — Caméron.

Digitized by Google

11.408. RUFA (Vieill.), *N. Dict.* XXVIII, p. 564; Sharpe, *l. c.*, p. 121; *dimidiata*, Tem.; Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 20; Schl., *l. c.*, p. 27; *ruficollis*, Gray (nec V.) — Afrique S. et S.-W., du Cap au Transvaal.

3159. *Var.* LUGENS (Boehm), *J. f. O.*, 1884, pp. 176, 244; Matsch., *J. f. O.*, 1887, pp. 139, 145. — Lac Tanganika.

11.409. BONAPARTEI (Bp. ex Hartl.), *C. R.* XLIII, p. 599; Hartl., *Orn. W. Afr.*, p. 242; Sharpe, *l. c.*, p. 123. — Gabon.

## 1796. RALLICULA

*Rallicula*, Schl. (1871); *Corethruropsis*, Salvad. (1875).

11.410. RUBRA, Schl., *Ned. Tydschr. Dierk.* IV, p. 55; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 270; Guillem., *P. Z. S.*, 1885, p. 664, pl. 39. — Nouv.-Guinée N.-W., (Monts Arfak).

11.411. LEUCOSPILA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 975, 1878, p. 346; id., *Orn. Pap.* III, p. 270. — Nouv.-Guinée N.-W., (Monts Arfak).

11.412. FORBESI, Sharpe, in *Gould's B. New Guin.* V, pl. 70; id., *Cat.*, p. 124; *rubra*, Sharpe (1886, nec Schl.) — Nouv.-Guinée S.-E.

## 1797. THYRORHINA

*Thyrorhina*, Scl. et Salv. (1868).

11.413. SCHOMBURGKI (Cab.), in *Schomb. Reis. Guian.* III, p. 760; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, p. 458; id., *Exot. Orn.*, pl. 67; Sharpe, *l. c.*, p. 125. — Guyane, Vénézuéla, Brésil.

## 1798. COTURNICOPS

*Coturnicops*, Bp. (1856); *Ortygops*, Heine et Rchw. (1890).

11.414. NOVEBORACENSIS (Gm.), *S. N.* I, p. 701; Audub., *B. Amer.* V, p. 152, pl. 307; Bd., Cass. et Lawr., *B. N. Am.*, p. 750; *hudsonica*, Lath.; *ruficollis*, Vieill. — Amérique septentr., Cuba, Bermudes.

11.415. EXQUISITA (Swinh.), *Ann. Mag. N. H.*, 1873, p. 376; id., *Ibis*, 1875, p. 135, pl. 3; *erythrothorax*, auct. plur. (nec Tem. et Schl.); *undulata*, Tacz., *J. f. O.*, 1874, p. 333. — Sibérie E., Chine N.-E., Japon.

11.416. NOTATA (Gould), *Voy. Beagle, B.*, p. 132, pl. 48; Scl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 155; Sharpe, *Cat.*, p. 128. — Uruguay, Argentine, Patagonie.

11.417. AYRESI, Gurn., *Ibis*, 1877, p. 352, pl. 7; Sharpe, *l. c.*, p. 129. — Afrique S.-E.

Digitized by Google

## 1799. PORZANULA

*Porzanula*. Frohawk (1892).

11.418. PALMERI, Froh., *Ann. Mag. N. H.*, 1892, p. 247; Hartl., *Abh. nat. Ver. Brem.* XII, p. 399. — Ile Laysan (Pacif. N.)

## 1800. CRECISCUS

*Creciscus*, Cab. (1856); *Rufirallus*, *Laterirallus*, Bp. (1856); *Donacophilus*, *Erythrolimnas*, Heine et Rchw. (1890).

11.419. JAMAICENSIS (Gm.), *S. N.* I, p. 718; Audub., *B. Am.* V, p. 157, pl. 308; Schl., *l. c.*, p. 67; Bd., Br. et Ridgw., *Water-B. N. Am.* I, p. 377; *pygmæa*, Blackw. — Amérique sept. temp., Amérique centrale, grandes Antilles.

3160. *Var.* SALINAZI (Phil.), *Arch. f. Nat.*, 1857, p. 262; Sharpe, *l. c.*, p. 136; *chilensis*, Bp. (*descr. nulla*); *jamaicensis* (pt.), auct. plur. (nec Gm.); Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 321. — Chili, Pérou.

3161. *Var.* COTURNICULUS (Ridgw.), *Amer. Nat.* VIII, p. 111; id., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1881, pp. 202, 222; Coues, *B. N.-West*, p. 340. — Iles Faralon (Californie).

11.420. SPILONOTUS (Gould), in *Darw., Voy. Beagle, B.*, p. 132, pl. 49; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, p. 456, 1871, p. 323; Sharpe, *Cat.*, p. 137. — Iles Galapagos.

3162. *Var.* SHARPEI, Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.* VI, p. 185; *spilonotus* (pt.), auct. plur. — Ile Indéfatigable (Galapagos).

11.421. CINEREUS (Vieill.), *N. Dict.* XXVIII, p. 556 (nec *Porphyrio cinereus*); Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, p. 456; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 322; *exilis*, Tem., *Pl. Col.* 523; Schl., *l. c.*, p. 35; Sharpe, *l. c.*, p. 138; *ruficollis*, Sw. — De l'Amazone à la Guyane, Trinidad.

3163. *Var.* VAGANS (Ridgw.), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 595. — Honduras.

11.422. MELANOPHÆUS (Vieill.), *N. Dict.* XXVIII, p. 549 (*melanophaius*); Schl., *l. c.*, p. 35; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 107, pl. 54; *lateralis*, Licht.; *albifrons*, Sw. — Brésil.

3164. *Var.* ÆNOPS (Scl. et Salv.), *P. Z. S.*, 1880, p. 161; Sharpe, *l. c.*, p. 140. — Ecuador.

11.423. ALBIGULARIS (Lawr.), *Ann. Lyc. N. Y.*, 1861, p. 302; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 109, pl. 55. — Colombie jusqu'au Véragua.

3165. *Var.* ALFARI (Ridgw.), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 111. — Costa-Rica.

3166. *Var.* CINEREICEPS, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1875, p. 90; Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, — Costa-Rica E., Nicaragua N.-E.



Digitized by Google

p. 111; Sharpe, *l. c.*, p. 537; *leucogastra*, Ridgw., *l. c.*, 1883, p. 408, 1887, p. 111.

11.424. LEUCOPYRRHUS (Vieill.), *N. Dict.* XXVIII, p. 550; Burm., *Reise La Plata*, II, p. 505; Scl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 154; *hypoleucos*, Licht. — Brésil S., Paraguay, Argentine.

11.425. LEVRAUDI (Scl. et Salv.), *P. Z. S.*, 1868, p. 452, pl. 55, 1873, p. 512; Sharpe, *l. c.*, p. 142. — Vénézuéla.

11.426. RUBER (Scl. et Salv.), *P. Z. S.*, 1860, p. 300; id., *Exot. Orn.*, p. 31, pl. 16; Sharpe, *l. c.*, p. 143. — Du Yucatan au Guatémala.

11.427. CAYANENSIS (Bodd.), *Tabl.*, p. 22; *Pl. Enl.* 368 et 753; *cayennensis*, Gm.; Burm., *Th. Bras.* III, p. 386; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 323; *viridis*, Müll.; *kiolo*, Vieill.; *aurita*, Gr.; *pileata*, Max.; *ecaudata*, Sw. (nec King); *poliotis*, Tem. — Brésil, Amazone, Guyane, Vénézuéla, Colombie.

11.428. FACIALIS (Tschudi), *Faun. Per.*, pp. 52, 301; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, p. 443; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 324. — Pérou.

## 1801. LIMNOCORAX

*Limnocorax*, Peters (1854).

11.429. NIGER (Gm.), *S. N.* I, p. 717; Schl., *l. c.*, p. 54; Gurn., *Ibis*, 1868, p. 470; Sharpe, *Layard's B. S. Afr.*, p. 618; *carinata*, Sw.; *flavirostra*, Sw., *B. W. Afr.* II, p. 244, pl. 28; *æthiops*, Forst.; *capensis, senegalensis, mosambicus*, Peters.; *erythropus, aterrima*, Heugl. — Afrique tropicale et méridion., Madeire.

## 1802. AMAURORNIS

*Amaurornis, Erythra*, Rchb. (1852); *Pisynolimnas*, Heine (1890); *OEnolimnas*, Sharpe (1894).

11.430. OLIVACEA (Meyen), *Nova Acta C. L.-C. Acad. Nat. Cur.* XVI, *Suppl.*, 1, p. 109, pl. 20; Wald., *Tr. Z. S.* IX, p. 251, pl. 55, f. 2; Sharpe, *l. c.*, p. 155. — Philippines.

11.431. MOLUCCANA (Wall.), *P. Z. S.*, 1863, p. 480; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 276; *olivacea*, Schl. (nec Mey.), *l. c.*, p. 43; *ruficrissa*, Gould; id., *Suppl. B. Austr.*, pl. 79; *frankii*, Schl., *Notes Leyd. Mus.* I, p. 163. — Moluques, Nouvelle-Guinée, archipel Bismarck, Australie N.-E.

11.432. AKOOL (Syk.), *P. Z. S.*, 1832, p. 164; Jerd., *B. Ind.* III, p. 722; Sharpe, *l. c.*, p. 155; *niger*, Frankl.; *modesta*, Sw.; *griseopectus*, Gr.; Hodgs., *Icon. ined.*, *Grallæ*, *App.*, pl. 183; *coccineipes*, Scl., *Ibis*, 1891, p. 44. — Inde jusqu'aux montagnes de l'Assam.

Digitized by Google

11.433. PHOENICURA (Forst.), *Zool. Ind.*, p. 19, pl. 9 (1781); Schl., *l. c.*, p. 41; Gould, *B. Asia*, VII, pl. 67; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 708; *chinensis*, Bodd.; *erythrura*, Bechst.; *javanica*, Horsf.; *sumatranus*, Raffl.; *leucomelæna*, S. Müll.; *thermophila*, Hodgs.; *major*, Bp. — Inde, Ceylan, Chine, Indo-Chine, Malac., Formose, Iles de la Sonde, Célèbes.

3167. *Var.* INSULARIS, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* XXIII, p. 162; *phœnicura*, Hume (nec Forst.) — Iles Andaman et Nicobars.

11.434. ISABELLINA (Bp.), *C. R.* XLIII, p. 599 (*descr. nulla*); Schleg., *Mus. P.-B.*, *Ralli*, p. 16; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 712, pl. 43, f. 2. — Célèbes.

## SUBF. II. — GALLINULINÆ

### 1803. TRIBONYX

*Tribonyx*, Du Bus (1840); *Brachyptrallus*, Lafr. (1840); *Microtribonyx*, Sharpe (1893).

11.435. MORTIERI, Du Bus, *Bull. Acad. Roy. Brux.* VII, 1840, p. 214, pl. 2; id., *Esq. Orn.*, pl. 5; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 71; *ralloides*, Lafr.; *gouldi*, Scl. — Australie S., Tasmanie.

11.436. VENTRALIS, Gould, *P. Z. S.*, 1836, p. 85; id., *B. Austr.* VI, pl. 72; Sharpe, *Cat.* XXIII, p. 165. — Australie N., W. et S.

### 1804. PAREUDIASTES

*Pareudiastes*, Hartl. et Finsch. (1871).

11.437. PACIFICUS, Hartl. et Fsch., *P. Z. S.*, 1871, p. 25, pl. 2; Fsch., *J. f. O.*, 1872, pp. 33, 54. — Iles Samoa.

### 1805. PORPHYRIORNIS

*Porphyriornis*, Allen (1892).

11.438. NESIOTIS (Scl.), *P. Z. S.*, 1861, p. 261, pl. 30; Allen, *Bull. Am. Mus. N. H.* IV, art. VI, p. 58. — Ile Tristan d'Acunha.

3168. *Var.* COMERI, Allen, *Bull. Am. Mus. N. H.* IV, art. VI, p. 57. — Ile Gough.

### 1806. GALLINULA

*Gallinula*, Briss. (1760); *Hydrogallina*, Lacép. (1801); *Stagnicola*, Brm. (1831).

11.439. TENEBROSA, Gould, *P. Z. S.*, 1846, p. 20; id., *B. Austr.* VI, pl. 73. — Australie E. et S., Nouvelle-Guinée S.

11.440. FRONTATA, Wall., *P. Z. S.*, 1863, pp. 35, 487; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 279; Mey. et Wg., *B. Cel.*, pl. 43, f. 1; *tenebrosa*, Bp., Rams. (nec Gould); *hæmatopus*, Tem. (*descr. nulla*). — Austr., Nouv.-Guin., Moluques, Célèbes, Born. S.-E., Flores.

Digitized by Google

11.441. ?LEPIDA, Brügg., *Alhandl. nat. Ver. Bremen*, 1877, p. 91. — ?

11.442. CHLOROPUS (Lin.); Dress., *B. Eur.* VII, p. 313, pl. 503; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 298, pl. 227; *fusca*, L.; *fistulans*, Gm.; *septentrionalis*, *minor*, *flavipes*, Brm.; *akool*, Jerd. (nec Syk.); *parvifrons*, *burnesi*, Blyth. — Europe, Asie, Afrique.

3169. ?*Var.* ORIENTALIS, Horsf., *Tr. Z. S.* XIII, p. 195 (1820); Salvad., *Ucc. Born.*, p. 342; Blas., *J. f. O.*, 1884, p. 218. — Asie S.-E., Malacca, Bornéo.

3170. *Var.* PYRRHORHOA, A. Newt., *P. Z. S.*, 1861, p. 18; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag., Ois.*, p. 241, pl. 240. — Madagascar, îles Maurice et Réunion.

11.443. GALEATA (Licht.), *Verz. Doubl.*, p. 80; Bp., *Amer. Orn.* IV, p. 128, pl. 37, f. 1; *chloropus*, Audub., *B. Am.*, pl. 224 (nec L.); Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 327; Scl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 156. — La majeure partie de l'Amérique, Antill.

3171. *Var.* GERMANI, Allen, *Bull. Mus. C. Z.*, 1876, p. 357; Hart., *Nov. Zool.* V, p. 63. — Lac Titicaca, Chili.

11.444. SANDWICHENSIS, Streets, *Ibis*, 1877, p. 25; Stejn., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 78, 1889, p. 380; Hart., *l. c.* V, p. 63; *chloropus*, auct. plur. (nec L.) — Iles Sandwich.

11.445. ANGULATA, Sundev., *Öfv. K. Vet.-Akad. Förh. Stockh.*, 1850, p. 110; Schl., *Mus. P.-B., Ralli*, p. 49; *pumila*, Scl., *Ibis*, 1859, p. 249, pl. 7; *minor*, Hartl. — Afrique tropicale.

## 1807. PORPHYRIOPS

*Porphyriops*, Pucher. (1845); *Hydrocicca*, Cab. (1847).

11.446. MELANOPS (Vieill.), *N. Dict.* XXVIII, p. 553; Cab., *Arch. f. Nat.*, 1847, p. 351; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, p. 461; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 326; *crassirostris*, Gray, in *Grif. An. Kingd. B.* III, p. 542, pl.; *femoralis*, Tschudi; *leucopterus*, Salvad. — Amérique méridionale, de l'Argentine et le Chili jusqu'en Colombie.

## 1808. GALLICREX

*Gallicrex*, Blyth (1849); *Hypnodes*, Rchb. (1852); *Gallinulopha*, Bp. (1854).

11.447. CINEREA (Gm.), *S. N.* I, p. 702; Wald., *Ibis*, 1873, p. 317; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 484; *G. cristata*, Lath. (nec *Fulica cristata*); Schl., *l. c.*, p. 39; *plumbea*, Vieill.; *gularis*, *lugubris*, Horsf.; Gray, *Fasc. B. China*, pl. 10; *nævia*, *porphyrioides*, Less.; *rufescens*, Jerd. — Inde, Ceylan, Chine, Japon, Indo-Chine, Malacca, grandes îles de la Sonde.

Digitized by Google

## 1809. PORPHYRIOLA

*Porphyrula,* Blyth (1849, *descr. nulla*); *Ionornis, Glaucestes,* Rchb. (1852); *Hydrornia,* Hartl. (1857); *Porphyriola,* Sundev. (1872, *porphyrula* rect.); *Ionocicca,* Salvad. (1887).

11.448. ALLENI (Thomps.), *Ann. Mag. N. H.,* 1842, p. 204; Gray, *Gen. B.* III, pl. 162; Dress., *B. Eur.* VII, p. 307, pl. 502; *chloronotus,* Blyth; *mutabilis,* Sundev.; *porphyrio,* Bp.; *variegatus,* Guir. — Afrique tropicale, Madagascar, Rodriguez (accident. Europe S. et Canaries).

11.449. MARTINICA (Lin.); Aud., *B. Amer.* V, p. 128, pl. 303; Schl., *l. c.,* p. 38; *martinicensis,* Gm.; *cyanicollis,* Vieill.; *porphyrio,* Wils., *Amer. Orn.* IX, p. 67, pl. 73, f. 2; *tavoua,* Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 170, pl. 267. — Texas, Floride, Amérique centrale, Antilles, Amérique méridionale tropicale.

11.450. PARVA (Bodd.), *Tabl.,* p. 54; *Pl. Enl.* 897; Schl., *l. c.,* p. 39; *flavirostris,* Gm.; *simplex,* Gould. — Guyane, Amazone, Brésil.

## 1810. PORPHYRIO

*Porphyrio,* Briss. (1760); *Cæsarornis,* Rchb. (1852).

11.451. CÆRULEUS (Vandelli), *Mem. Acad. Real. Lisb.* I, 1797, p. 37; Sel., *Ibis,* 1879, p. 187; *hyacinthus,* Tem.; Gould, *B. Eur.* IV, pl. 340; *chlorynothus,* Roux (nec V.); *antiquorum,* Bp.; *veterum,* Gr. (nec Gm.); Dress., *B. Eur.* V, p. 299, pl. 500; *cæsius,* Schl., *l. c.,* p. 32. — Europe méridionale, Mésopotamie, Afrique N.

11.452. MADAGASCARIENSIS (Lath.), *Ind. Orn. Suppl.,* p. 68; Gray, *Gen. B.* III, p. 598; *F. porphyrio,* Lin.; *chloronothos,* Vieill.; *smaragnotus,* Tem.; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag., Ois.,* p. 587, pl. 242-244; *erythropus,* Steph.; *hyacinthinus,* Rüpp. (nec Tem.); *ægyptiacus,* Heugl.; *smaragdonotus,* Gurn. — Afrique jusq. Égypte, Madagascar.

11.453. VETERUM, S. G. Gm., *Reis. Russl.* III, p. 79, pl. 12; Radde, *Orn. Cauc.,* pp. 40, 380, pl. 24; *poliocephala,* Lath.; *F. porphyrio,* Pall. (nec L.); *poliocephalus,* Vieill.; Jerd., *B. Ind.* III, p. 713; Sharpe, *l. c.,* p. 179; *hyacinthinus,* Nordm. (nec Tem.); *indicus,* Gr. (nec Horsf.); *neglectus,* Schl., *l. c.,* p. 33. — Caucase, Mésopotamie, Afghanistan, Inde, Ceylan, Birmanie.

11.454. BEMMELENI, Büttik., *Notes Leyd. Mus.* XI, p. 191. — Sumatra.

11.455. CALVUS, Vieill., *N. Dict.* XXVIII, p. 28; Mey. et Wg., *B. Cel.,* p. 717; *indicus,* Horsf.; Schl., *l. c.,* p. 33; Salvad., *Ucc. Born.,* p. 342. — Java, Sumatra, Bornéo, Célèbes S.

Digitized by Google

3172. *Var.* Edwarsi, Ell., *Ann. N. H.*, 1898, p. 98; *calvus*, Kelh. (nec V.) — Indo-Chine, Malacca.

3173. *Var.* Elliotí, Salvad., *Atti R. Accad. Torino*, 1879, p. 1168; id., *Orn. Pap.* III, p. 283; *indicus* et *calvus*, Scl. (pt.) — Iles de l'Amirauté.

3174. *Var.* Neobritannica, Mey., *Abhandl. Mus. Dresd.*, 1891, n° 4, p. 15. — Nouvelle-Bretagne.

3175. *Var.* Palliata, Brüggem., *Abhandl. nat. Ver. Bremen*, 1876, p. 89. — ?

11.456. bellus, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 176; id., *B. Austr.* VI, pl. 70. — Australie W.

3176. *Var.* Chathamensis, Sharpe, *Ibis*, 1893, p. 351; id., *Cat.*, p. 202. — Ile Chatham.

11.457. smaragdinus, Tem., *Pl. Col.* 421; *vitiensis*, Peale, *U. S. Expl., Exp., B.*, 1848, p. 221, pl. 62, f. 2; *melanopterus*, Bp.; *melanotus*, Fsch. (nec Tem.); *aneiteumensis*, Tristr.; *samoensis*, Fsch. (nec Peale); *indicus*, Lenz (nec Horsf.) — Célèbes, petites îles de la Sonde, Nouvelle-Guinée, archipel Bismarck, îles Fidji, etc.

3177. *Var.* Samoensis, Peale, *U. S. Expl. Exp., B.*, 1848, p. 220, pl. 62, f. 1; Sharpe, *l. c.*, p. 204; *indicus* (pt.), auct. plur. (nec Horsf.) — Iles Samoa.

11.458. melanonotus, Tem., *Man. d'Orn.* II, p. 701 (1820); Gould, *B. Austr.* VI, pl. 69; Bull., *B. New Zeal.*, ed. 2, II, p. 79, pl. 31; *stanleyi*, Rowl.; *cyanocephalus*, Ell. — Australie, Tasmanie, Nouv.-Zélande, îles Norfolk, Lord Howe, Nouv.-Guinée.

3178. *Var.* Pelewensis, Hartl. et Fisch., *P. Z. S.*, 1872, p. 107; *melanotus*, Hartl. et Fsch. (1868, nec Tem.) — Iles Pelew.

11.459. pulverulentus, Tem., *Pl. Col.* 405; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 721; *poliocephalus*, Schl., *l. c.*, p. 54 (nec Lath.) — Philippines, Karkellang.

## 1811. NOTORNIS

*Notornis*, Owen (1848).

11.460. mantelli, Owen, *Trans. Z. S.* III, p. 377, pl. 56, ff. 7-11; Gould, *B. Austr.*, *Suppl.*, pl. 76. — Nouvelle-Zélande.

11.461. hochstetteri, Mey., *Abbild. Vog.-Skel.*, pl. 34-37; id., *Zeitschr. ges. Orn.* II, p. 45, pl. 1. — Nouvelle-Zélande (île Sud).

11.462. parkeri, Forb., *Tr. N. Z. Inst.* XXIV, 1892, p. 187. — Nouvelle-Zélande (île Nord, éteint).

11.463. cærulescens (Sél.-Longch.), *Rev. Zool.*, 1848, p. 294; *erythrorhynchus*, Bp., *Consp.* II, p. 3. — Ile de la Réunion (éteint).

11.464. alba (White), *Journ. Voy. N. S. W.*, p. 238, pl. (1790); Salv., *Ibis*, 1873, p. 295, pl. 10; *P. melanotus var. alba*, Gray. — Iles Norfolk et de Lord Howe (éteint).

Digitized by Google

## SUBF. III. — FULICINÆ

### 1812. FULICA

*Fulica*, Lin. (1735); *Phalaria*, *Lysca*, *Lupha*, Rchb. (1853); *Lycornis*, Bp. (1854); *Lophophalaris*, Heine (1890).

11.465. ATRA, Lin.; Dress., *B. Eur.* VII, p. 527, pl. 504, f. 2; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 304, pl. 228; *aterrima*, L.; *fuliginosa* et *albiventris*, Scop.; *leuconyx* et *æthiops*, Sparrm.; *atrata*, *pullata*, Pall.; *lugubris*, Müll.; *platyuros*, Brm.; *japonica*, Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 120, pl. 77. — Europe et Asie jusqu'au 68° latitude N., Japon, Philippines, Java, Sumatra, Célèbes, Afrique N.

3179. *Var.* AUSTRALIS, Gould, *P. Z. S.*, 1845, p. 2; id., *B. Austr.* VI, pl. 74; *tasmanica*, Grant; *atra* (pt.), Schl., Seeb. — Australie, Tasmanie.

11.466. ? NOVÆ-ZEALANDIÆ, Colenso, *Tasm. Journ. N. Sc.*, 1845, p. 285. — Nouvelle-Zélande.

11.467. CRISTATA, Gm., *S. N.* I, p. 704; Vieill., *Gal. Ois.*, pl. 269; Dress., *B. Eur.* VII, p. 525, pl. 504, f. 1; *mitrata*, Licht. — Afrique, Madagascar, Europe S.-W.

11.468. CORNUTA, Bonap., *C. R.* XXXVIII, p. 925, XLIII, p. 600; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, p. 463. — Potosi (Bolivie).

11.469. ARDESIACA, Tschudi, *Arch. f. Naturg.*, 1831, p. 389; id., *Faun. Per.*, p. 303; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 113, pl. 57; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 528; *chilensis*, Des M. in Gay, *Faun. Chil.* VIII, p. 474, pl. 11. — Ecuador, Pérou, Bolivie, Chili N.

11.470. ARMILLATA, Vieill., *N. Dict.* XII, p. 47; Burm., *Th. Bras.* III, p. 390; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 115, pl. 58; *chloropoides*, King; *frontata*, Gr.; *chilensis*, Landb. (nec Des M.); *leucopyga*, Sharpe (1880, nec Licht.) — Brésil S., Bolivie et Chili jusqu'en Patagonie.

11.471. GIGANTEA, Eyd. et Soul., *Voy. Bonite*, p. 102, pl. 8; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 120; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 329; *gigas*, Rchb.; *maxima*, Brm. — Pérou, Bolivie, Chili N.

11.472. RUFIFRONS, Phil. et Landb., *Arch. f. Naturg.* XXVIII, 1862, p. 223; *leucopyga*, auct. (nec Wagl.); Schl., *l. c.*, p. 64; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 117, p. 59; Sharpe, *Cat.*, p. 220; *leucopygia*, Hartl.; *chloropoides*, Abb. (nec King). — De la Patagonie jusqu'au 24° latitude S., îles Malouines.

11.473. AMERICANA, Gm., *S. N.* I, p. 704; Audub., *B. Am.* V, p. 158, pl. 305; Sharpe, *l. c.*, p. 222; *wilsoni*, Steph.; *atra*, D'Orb. (nec L.) — Amérique du Nord et centrale, Antilles.

3180. *Var.* CARIBÆA, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.*, 1884, p. 358. — Petites Antilles.

Digitized by Google

11.474. LEUCOPTERA, Vieill., *N. Dict.* XII, p. 48; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 119, pl. 60; *gallinuloides*, King; *leucopyga*, Wagl. (1831, nec auct.); *stricklandi*, Hartl.; *chloropoides*, Landb. (nec King). — Amérique méridionale, de la Patagonie jusque vers le 10° latitude S.

11.475. ALAI, Peale, *U. S. Expl. Exp., B.*, p. 224 (1848); Cass., *U. S. Expl. Exp., B.*, p. 306, pl. 36 (1852); Sharpe, *l. c.*, p. 225; *atra*, Bloxh. (nec L.) — Iles Sandwich.

### 1813. LEGUATIA

*Leguatia*, Schl. (1858).

11.476. GIGANTEA, Schl., *Ibis*, 1866, pp. 146-168; id., *Ann. Sc. Nat.*, ser. 5, VI, pp. 25-49, pl. 1, ff. 1, 2. — Ile Maurice (éteint).

## FAM. XVII. — HELIORNITHIDÆ (1)

### 1814. PODICA

*Podica*, Less. (1831); *Rhigelura*, Wagl. (1832); *Podoa*, Bp. (1855, nec Illig.)

11.477. SENEGALENSIS (Vieill.), *N. Dict.* XIV, p. 277; id., *Gal. des Ois.* II, pl. 280; Less., *Tr. d'Orn.*, p. 596; Gray, *Gen. B.* III, pl. 173; Schl., *Mus. P.-B.*, *Urinatores*, p. 49; *josephina*, *pucherani*, Bp. — Afrique W., de Sénégambie au Congo.

3181. *Var.* PETERSI, Hartl., *Abh. nat. Ver. Hamburg*, II, p. 62; Finsch. et Hartl., *Vög. Ostafr.*, p. 790; Sharpe, in Lay., *B. S. Afr.*, p. 625, pl. 12; *mosambicana*, Pet.; *impipi*, Licht. — Afrique S.-E., E. et Damaraland.

11.478. CAMERUNENSIS, Sjöst., *Svenska Ak. Handl.* XXVII, n° 1, p. 29, pl. 1. — Caméroun.

### 1815. HELIOPAIS

*Heliopais*, Sharpe (1893); *Podica* (pt.), auct.

11.479. PERSONATA (Gray), *P. Z. S.*, 1848, p. 90, pl. 4; Schl., *l. c.*, p. 49; Sharpe, *Cat.*, p. 232. — Indo-Chine, Malacca, Sumatra.

### 1816. HELIORNIS

*Heliornis*, Bonn. (1790); *Podoa*, Illig. (1811).

11.480. FULICA (Bodd.), *Tabl.*, p. 54; *Pl. Enl.* 893; Gray, *Gen. B.* III, p. 654; Schl., *l. c.*, p. 48; *surinamensis*, Gm.; Burm., *Th. Bras.* III, p. 391; *fulicarius*, Bonn. — Brésil, Amaz., Guyane, Vénéz., Colombie jusque l'Honduras.

(1) Voy. : Sharpe, *Catalogue Birds Brit. Mus.* XXIII, p. 229 (1894).

Digitized by Google

# ORD. XIII. — PALAMEDEÆ (1)

## FAM. I. — PALAMEDEIDÆ

### 1817. PALAMEDEA

*Palamedea*, Moehr. (1752), Lin. (1766); *Anhima*, Briss. (1760).

11.481. CORNUTA, Lin.; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 154, pl. 261; Burm., *Thier. Bras.* III, p. 396; Salvad., *Cat. B. Br. Mus.* XXVII, p. 3; *bispinosa*, Humb. — Guyane, Vénézuéla, Amazone, Ecuador, Pérou.

### 1818. CHAUNA

*Chauna*, Illig. (1811); *Chavaria*, Rafin. (1815); *Opistholophus*, Vieill. (1816); *Ischyrornis*, Rchb. (1852); *Ischyornis*, Bp. (1856).

11.482. CHAVARIA (Lin.); Salvad., *l. c.*, p. 4; *fidelis* (pt.), Vieill.; *derbiana*, Gray, *Gen. B.* III, p. 591, pl. 160; Schl., *Mus. P.-B.*, *Ralli*, p. 72; *nigricollis*, Sclat., *P. Z. S.*, 1864, p. 75, pl. 11. — Vénézuéla, Colombie.

3182. *Var.* CRISTATA, Sw., *Classif. B.* II, p. 351; Salvad., *l. c.*, p. 6; *chavaria* (pt.), auct. plur.; Tem., *Pl. Col.* 219; Scl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 119; *fidelis* (pt.), Vieill.; *lophyra*, Natt. — Brésil S., Uruguay, Paraguay, Argentine.

# ORD. XIV. — ANSERES (1)

## FAM. I. — ANATIDÆ

### SUBF. I. — ANSERANATINÆ

### 1819. ANSERANAS

*Anseranas*, Less. (1828); *Choristopus*, Eyt. (1838).

11.483. SEMIPALMATA (Lath.), *Tr. Linn. Soc.*, 1798, p. 103; Eyt., *Mon. Anat.*, p. 78; *melanoleuca*, Lath.; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 2; Schl., *Mus. P.-B.*, *Anseres*, p. 92. — Australie, Tasmanie.

(1) Voy.: Salvadori, *Catalogue of Birds Brit. Mus.* XXVII (1895).



Digitized by Google

## SUBF. II. — CEREOPSINÆ

### 1820. CEREOPSIS

*Cereopsis*, Lath. (1801).

11.484. NOVÆ-HOLLANDIÆ, Lath., *Ind. Orn.*, *Suppl.*, p. 67; Tem., *Pl. Col.* 206; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 1; Schl., *l. c.*, p. 115; *cinereus*, Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 211, pl. 284; *griseus*, V.; *australis*, Sw. — Australie S., Tasmanie.

## SUBF. III. — PLECTROPTERINÆ

### 1821. PLECTROPTERUS

*Plectropterus*, Steph. (1824); *Plectrophanes*, Griff. (1829).

11.485. GAMBENSIS (Lin. ex Briss.); Shaw., *Mus. Lever.*, p. 229, pl. 56; Lafr., *Mag. de Zool.*, 1834, pl. 29, 30; Steph., *Gen. Zool.* XII, 2, p. 7, pl. 36; *spinosus*, Bonn.; *sclateri*, Sousa. — Afrique W. et E.

3183. *Var.* RÜPPELLI, Sclat., *P. Z. S.*, 1859, p. 152, pl. 153, f. 1; *gambensis*, Rüpp. et auct. plur. (nec Lin.); ? *brevirostris*, Brm. — Afrique N.-E. et équatoriale.

11.486. NIGER, Sclat., *P. Z. S.*, 1877, p. 47, pl. 7, 1880, p. 498; *gambensis* (pt.), auct. plur.; *gariepensis*, Eckl. (nom. nud.) — Afrique S.-E.

3184. *Var.* SCIOANA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1884, p. 239, 1888, p. 318; id., *Cat.*, p. 51. — Choa.

### 1822. CAIRINA

*Cairina*, Flem. (1822); *Moschatus*, Less. (1828); *Gymnathus*, Nutt. (1834); *Carina*, Eyt. (1838); *Hyonetta*, Sund. (1872).

11.487. MOSCHATA (Lin.); Flem., *Phil. of Zool.* II, p. 260; Dub., *Ois. Eur.* II, pl. 178; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 472; Scl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 129; *indica*, Ger.; *regia*, Mol.; *merianæ*, Shaw, *Nat. Misc.* II, pl. 69; *sylvestris*, Steph. (1). — Amérique tropicale du Mexique au Paraguay.

### 1823. SARCIDIORNIS

*Sarkidiornis*, Eyt. (1838); *Sarcidiornis*, Agass. (1846).

11.488. MELANONOTA (Penn.), *Ind. Zool.*, p. 12, pl. 11; *Pl. Enl.* 937; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 213, pl. 285; *tricolor*, Bodd.; *melanotos*, Gm.; *regia*, Hartl. (nec Mol.); *africanus*, Eyt. — Inde, Ceylan, Birmanie, Afrique au S. du Sahara, Madagascar.

(1) Hybrides : *Anas bicolor*, Donov.; *purpureo-viridis*, Schinz; *æneo-rufa*, Bp.; *maxima*, Gosse; *viola*, Bell; *viridi-ænea*, Bp.; *iopareia*, Phil.

Digitized by Google

11.489. CARUNCULATA (Licht.), *Abh. Ak. Berl.*, 1816-17, p. 176; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1876, pp. 577, 695, pl. 68; *regius* (pt.), Eyt.; *melanotus*, Burm. (nec Penn.) — Brésil, Paraguay, Argentine N.

## 1824. ASARCORNIS

*Asarcornis*, Salvad. (1895).

11.490. SCUTULATA (S. Müll.), *Verh. Land- en Volkenk.*, p. 159; Schl., *l. c.*, p. 64; Salvad., *Cat.*, p. 60. — Sumatra, Java.

3185. *Var.* LEUCOPTERA (Blyth), *J. A. S. B.*, 1849, p. 820; Jard., *Contr. Orn.*, 1850, p. 141, pl. 64; Hume et Marsh., *Game-B. Ind.* III, pp. 147, 172, pl. 20; Oates, *Man. Game-B. Ind.* II, p. 159. — De l'Assam à Malacca.

## 1825. RHODONESSA

*Rhodonessa*, Rchb. (1852).

11.491. CARYOPHYLLACEA (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 866; Gray, *Gen. B.* III, pl. 167; Jerd., *Ill. Ind. Orn.*, pl. 34; Schl., *l. c.*, p. 62; Hume et Marsh., *Game-B. Ind.* III, pp. 174, 455, pl. 25; *erythrocephala*, Bonn. — Inde.

## 1826. PTERONETTA

*Pteronetta*, Salvad. (1895).

11.492. HARTLAUBI (Cass.), *Pr. Ac. Philad.*, 1859, p. 175; Oust., *Nouv. Arch. Mus.* II, 1879, p. 122, pl. 6; Salvad., *Cat.*, p. 63; *cyanoptera*, Tem. (nec V.); *cuprea*, Schl., *Mus. P.-B.*, *Anserrs*, p. 62. — Afrique W. et équatoriale.

## 1827. NETTOPUS

*Nettapus*, Brandt (1836); *Anserella*, Sw. (1837); *Cheniscus*, Eyt. (1838, nec Moehr.); *Microcygna*, Gray (1840); *Nettopus*, Agass. (1846).

11.493. AURITUS (Bodd.), *Tabl.*, p. 48; *Pl. Enl.* 770; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag.*, *Ois.*, p. 714, pl. 264; *madagascariensis*, Gm.; *minuta*, C. Dub., *Orn. Gal.*, p. 110, pl. 70. — Afrique tropicale, Madagascar.

11.494. PULCHELLUS, Gould, *P. Z. S.*, 1841, p. 89; id., *B. Austr.* VII, pl. 4; Scl., *P. Z. S.*, 1880, p. 505; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 384. — Australie, Nouvelle-Guinée, Moluques, Tèninber, Célèbes.

11.495. COROMANDELIANUS (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 522; *Pl. Enl.* 949, 950; Schl., *l. c.*, p. 76; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 501; *coromandelica*, Bonn.; *girra*, Gr., in *Hardw. Ill. Ind. Zool.*, pl. 68; *affinis*, Jerd.; *kopschii*, Swinh. — Inde, Indo-Chine, Chine, Philippines, grandes îles de la Sonde, Célèbes.

Digitized by Google

3186. *Var.* Albipennis, Gould, *B. Austr.* VII, texte de la pl. 5; Schl., *l. c.*, p. 77; Sel., *P. Z. S.*, 1880, p. 505; *coromandelianus*, Gould, *B. Austr.* VII, pl. 5; *bicolor*, Less. — Australie E.

1828. ÆX

*Aix*, Boie (1828); *Dendronessa*, Sw. (1831); *Lampronessa*, Wagl. (1832); *Cosmonessa*, Rchb. (1852, nec Kp.); *Æx*, Scl. (1885).

11.496. sponsa (Lin.); Audub., *B. Am.* VI, p. 271, pl. 391; Schl., *l. c.*, p. 71; Salvad., *Cat.*, p. 73; *promissa*, Brm., *Nauman.*, 1855, p. 298. — Amérique septentrionale jusqu'au Mexique, gr. Antilles.

11.497. galericulata (Lin.); Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 217, pl. 287; Schl., *l. c.*, p. 70; Gould, *B. Asia*, VII, pl. 69; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 501. — Sibérie S.-E., Chine, Japon, Formose.

## SUBF. IV. — ANSERINÆ

1829. CHEN

*Chen*, Boie (1822); *Chionochen*, Rchb. (1852); *Exanthemops*, Ell. (1868).

11.498. cærulescens (Lin.); Gundl., *Rep. Fis.-Nat.* I, p. 387; Ell., *B. N. Am.*, pl. 43; *hyperboreus* (pt.), auct. plur. (nec Pall.) — Amérique N.-E.; en hiver les îles Bahama et Cuba.

11.499. hyperboreus (Pall.), *Spic. Zool.* VI, p. 25; Dress., *B. Eur.* VI, pl. 417; *albatus*, Cass.; Ell., *New and unfig. B. N. Am.* II, pl. 42; Dress., *l. c.*, f. 2. — Asie N., Japon, Amérique N.-W., États-Unis S.-W. en hiver.

3187. *Var.* Nivalis (Forst.), *Phil. Trans.*, 1772, p. 415; Ridgw., *Pr. Biol. Soc. Wash.* II, p. 107; *hyperboreus* (pt.), auct. plur. — Amérique N.-E. jusqu'au S.-E. des Etats-Unis en hiver.

11.500. rossi (Cass.), *Pr. Acad. Philad.*, 1861, p. 73; Schleg., *l. c.*, p. 108; Ell., *Ill. Am. B.* IV, pl. 44. — Amérique arctique, en hiver jusqu'en Calif.

1830. ANSER

*Anser*, Briss. (1760); *Anseria*, Rafin. (1815); *Marilochen*, *Eulabeia*, Rchb. (1852); *Eulabia*, Newt. (1893); *Melanonyx*, Boutourl. (1901).

11.501. ferus, Schaeff., *Mus. Orn.*, p. 67 (1789); Steph., *Gen. Zool.* XII, 2, p. 28, pl. 41; *cinereus*, Mey. et W. (nec Bonn.); Dress., *B. Eur.* VI, p. 355, pl. 411; Dubois, *Fne. Ill. Vert. Belg.*, *Ois.* II, p. 393, pl. 244; *Anas anser*, Lin.; *vulgaris*, Pall.; *palustris*, Flem.; *sylvestris*, Brm. (nec Briss.) — Europe jusqu'au cercle polaire, Palestine, Algérie, Maroc.

3188. *Var.* Rubrirostris, Hodgs., *Icon. Ined. in Mus. Brit.*, pl. 579; Tacz., *Bull. Soc. Zool. Fr.*, 1877, p. 41; *ferus*, Adams; *cinereus* (pt.), auct. plur. (nec Mey. et W.); *subalbifrons*, Severtz., *J. f. O.*, 1875, p. 184. — Sibérie, en hiver jusqu'au N. de l'Inde et le S. de la Chine.

Digitized by Google

11.502. ALBIFRONS (Scop.), *Ann. I. Hist. Nat.*, p. 69; Dress., *l. c.* VI, p. 375, pl. 414; Dubois, *l. c.* II, p. 405, pl. 247; *lombardella*, Gerini; *albicans*, Gm.; *erythropus*, Flem. (nec Lin.); *medius*, Bruch (nec Mey.); *bruchii*, Brm.; *intermedius*, Naum., *Vög. Deutschl.* XI, p. 340, pl. 288; *roseipes*, Schl.; *pallipes*, de Sélys. — Europe, Islande, Sibérie, Groenland; en hiver Europe S., Inde et Chine.

3189. *Var.* GAMBELI, Hartl., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1852, p. 7; Baird, *B. N. Am.*, p. 761; Coues, *Key*, p. 282; *albifrons* (pt.), auct. plur.; *erythropus* (pt.), Eyt.; *frontalis*, Baird. — Amérique sept., en hiv. jusqu'au Mex. et Cuba, la Côte or. de l'Asie jusqu. Japon.

11.503. ERYTHROPUS (Lin.); Dress., *l. c.*, p. 383; Dubois, *l. c.* II, p. 405, pl. 247[b]; *finmarchicus*, Gunn.; *albifrons* (pt.), auct. ant.; *temminckii*, Boie; *cineraceus*, *brevirostris*, Brm.; *minutus*, Naum., *Vög. Deutschl.* XI, p. 364, pl. 290. — Europe N. et Sibérie W., en hiver Europe W., Inde N.

3190. *Var.* RHODORHYNCHUS, Boutourl., *Dukie iycu*, p. 19. — *Les Oies sauvages*, etc. (en russe). — Sibérie, en hiver Inde, Chine, Japon.

11.504. NEGLECTUS, Suschk., *Ibis*, 1896, p. 135, 1897, p. 8, pl. 2, f. 1; *segetum* (pt.), auct. plur. — Russie orientale (lac Thoungak).

11.505. SYLVESTRIS, Briss.; Dubois, *l. c.* II, p. 398, pl. 245; *salvatica*, Ger.; *fabalis*, Lath.; *segetum*, Gm.; Dress., *l. c.*, pl. 412; *rufescens*, *platyuros*, *arvensis*, etc., Brm.; *paludosus*, Strickl. — Europe sept., en hiver dans le Midi jusqu'au N. de l'Afrique.

3191. *Var.* SERRIROSTRIS (Swinh. ex Gould), *P. Z. S.*, 1871, p. 417; *segetum* (pt.), auct. plur. — Sibérie, Corée et Chine.

3192. *Var.* MIDDENDORFFI, Severtz., *Turkest. Jevotn.*, pp. 70, 149; *grandis*, Midd. (nec Gm.); id., *Reise Sibir.* II, 2, p. 225, pl. 20, f. 1; *segetum* et *serrirostris* (pt.), auct. plur. — Sibérie E., île Behring, en hiver Asie centr., Chine et Japon.

3193. *Var.* MENTALIS, Oates, *Man. Game-B. Ind.* II, p. 77. — Japon.

11.506. CARNEIROSTRIS, Boutourl., *Dukie iycu*, etc. — *Les Oies sauvages de l'Emp. russe*, p. 28 (en russe). — Nouvelle-Zemble, en hiver Russie.

11.507. BRACHYRHYNCHUS, Baill., *Mém. Soc. R. d'Abbev.*, 1853, p. 74; Dress., *l. c.* VI, p. 369, pl. 413; Dubois, *l. c.*, p. 401, pl. 246; *phœnicopus*, Bartl.; *segetum* (pt.), auct. ant.; *cinereus*, Thor.; *rufescens*, Palm. (nec Brm.) — Spitzberg; Europe W. en hiver.

11.508. INDICUS (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 839; Gould, *Cent. Him. B.*, pl. 80; *undulata*, Bonn.; *melanocephalus*, Vieill.; *skorniakovi*, Severtz., *Turkest. Jevotn.*, pp. 70, 149, pl. 10, ff. 3, 4; id., *J. f. O.*, 1873, pp. 346, 377. — Asie centrale, en hiver Inde.

Digitized by Google

## 1831. CYGNOPSIS

*Cygnopsis*, Brandt (1836); *Cycnopsis*, Heine et Rchw. (1890).

11.509. CYGNOIDES (Lin.); Pall., *Zoogr.* II, p. 218, pl. 64; Schl., *l. c.*, p. 106; Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, pl. 81; *australis* et *orientalis*, Lin.; *moscoviticus*, *guineensis*, Briss.; *sinensis*, Steph.; *ferus*, Rchb.; *tuberculosus*, Schust. — Sibérie E., Chine, Japon.

11.510. ? GRANDIS (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 504; Pall., *Zoogr.* II, p. 221; Salvad., *Cat.*, p. 107 (en note). — Sibérie.

## 1832. PHILACTE

*Philacte*, Bann. (1870).

11.511. CANAGICA (Sevast.), *Nova Acta Ac. St.-Petersb.*, 1800, p. 346, pl. 10; Schl., *Mus. P.-B.*, *Anseres*, p. 115; Elliot, *Ill. Am. B.*, pl. 45; *pictus*, Pall. — Asie N.-E., Amérique N.-W., en hiver jusqu'en Californie.

## 1833. BRANTA

*Branta*, Scop. (1769); *Bernicla*, Boie (1822); *Leucopareia*, Rchb. (1852); *Rufibrenta*, Bp. (1856); *Leucoblepharon*, Baird (1858); *Brenthus*, Sund. (1872); *Ptocas*, Heine et Rchw. (1890); *Nesochen*, Salvad. (1895).

11.512. CANADENSIS (Lin.); *Pl. Enl.* 346; Audub., *B. Am.* VI, p. 178, pl. 376; Bann., *Pr. Ac. Phil.*, 1870, p. 131; ?*parvipes*, Cass.; ?*leucolæma*, Murr.; ?*barnstoni*, Ross. — Amérique sept. tempérée, en hiver jusqu'au Mexique.

3194. *Var.* HUTCHINSI (Rich.), *Faun. Bor.-Am.* II, p. 470; Audub., *B. Am.* VI, p. 198, pl. 377; Schl., *l. c.*, p. 105; *canadensis*, Pall. (nec L.); *leucopareius*, Brandt; *leucoparia*, Blak. et Pr. — Amérique arctique et subarctique, Sibérie N.-E., en hiver les Ét.-Unis et le Japon.

3195. *Var.* OCCIDENTALIS (Baird), *B. N. Am.*, p. 766; Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1885, p. 22; *canadensis* (pt.), Cass. (nec L.); *leucopareia*, Coues. — Amér. N.-W. jusqu'à Sitka au N. et la Californie au S. en hiv.

3196. *Var.* MINIMA, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1885, pp. 22, 355; *leucopareia*, Cass., *Ill. B. Cal.*, *Tex.*, p. 272, pl. 45 (nec Brandt) et auct. plur.; *munroii*, Rothsch.; id., *Avif. Lays.*, pl. 80. — Amérique N.-W. jusqu'en Californie, îles Sandwich.

11.513. LEUCOPSIS (Bechst.), *Orn. Taschenb.* II, p. 424; Dress., *l. c.* VI, p. 397, pl. 415, f. 1; Dubois, *l. c.* II, p. 385, pl. 242; *erythropus*, Gm. (nec L.); *bernicla*, Pall. (nec L.) — Groenl., Islande, Spitzberg, Nouv.-Zemble, en hiver Europe W. (accid. Amér. N.-E.)

11.514. BERNICLA (Lin.); Scop., *Ann. I. H. N.*, p. 67; *brenta*, Briss.; Dress., *l. c.* VI, p. 389, pl. 415, — Taimyr, Nouv.-Zemb., Terre de François-

Digitized by Google

f. 2; Dubois, *l. c.* II, p. 388, pl. 243; *monachus*, Beseke; *torquatus*, Bechst.; *platyuros*, *pallida*, Brm.; *melanopsis*, Macg. — Joseph, Spitzberg, en hiver Europe N. et W.

3197. *Var.* GLAUCOGASTER, C. L. Brm., *Isis*, 1830, p. 996; id., *Vög. Deutschl.*, p. 849; *micropus*, *collaris*, Brm.; *bernicla* (pt.), auct. plur. — Amérique N.-E., Groenland W.

3198. *Var.* NIGRICANS (Lawr.), *Ann. Lyc. N. H.*, 1846, p. 171, pl. 12; Cass., *Ill. B. Calif.*, p. 52, pl. 10; Coues, *Key*, p. 284; *bernicla* (pt.), auct. plur. — Amérique N.-W. jusqu'en Californie, Sibér. N.-E., Japon.

11.515. RUFICOLLIS (Pall.), *Spic. Zool.* VI, p. 21, pl. 5; Naum., *Vög. Deutschl.* XI, p. 408, pl. 295; Dress., *l. c.*, pl. 416; *torquata*, Gm.; *minor*, Lepech. — Sibérie W., Turkestan N., en hiver la mer Caspien^ne (acc. Eur.)

11.516. SANDVICENSIS (Vig.), *List of Anim. in the Gard. Z. S.*, 1835, p. 4; id., *P. Z. S.*, 1835, p. 65; Jard. et Sel., *Ill. Orn.*, ser. 2, pl. 8; *havaiiensis*, Eyd. et Soul., *Voy. Bonite, Zool.* I, p. 104, pl. 10; *hauaiensis*, Peale, *U. S. Expl. Exp., B.*, p. 249, pl. 59. — Iles Sandwich.

## SUBF. V. — CHENONETTINÆ

### 1834. CHLOËPHAGA

*Chloëphaga*, Eyt. (1838); *Tænidiestes*, Rchb. (1852); *Oressochen*, *Chloetrophus*, Bann. (1870); *Chloophaga*, Sund. (1872); *Tænidiesthes*, Heine (1890).

11.517. MELANOPTERA (Eyt.), *Mon. Anat.*, p. 95; Gould, *Voy. Beagle*, p. 154, pl. 50; Schl., *l. c.*, p. 100; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 467; *montana* et *anticola*, Tschudi. — Amérique S.-W., du Pérou et Bolivie à Magellan.

11.518. HYBRIDA (Mol.), *Sagg. Stor. Nat. Chili*, p. 213; Salvad., *Cat.*, p. 130; *magellanica*, Sparrm.; *antarctica*, Gm.; Less., *Voy. Coq.* I, p. 331, pl. 50 (fem.); Cass., *U. S. Astron. Exp.* II, p. 200, pl. 23; *ganta*, Forst. — Patagonie, Magellan, Terre-de-Feu, îles Malouines.

11.519. MAGELLANICA (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 505; Brown, *Ill.*, pl. 40 (mas.); *Pl. Enl.* 1006 (fem.); Schl., *l. c.*, p. 99; Salvad., *Cat.*, p. 132; *leucoptera*, Gm. — Patagonie, Magellan, Terre-de-Feu, Malouines.

3199. *Var.* INORNATA (King.), *P. Z. S.*, 1830-31, p. 15; Bp., *C. R.* XLIII, p. 648; Sharpe, *Zool. Ereb. and Terr., B.*, p. 37, pl. 30; ?*picta*, Gm.; *magellanica* (pt.), auct. plur. (nec Gm.); *dispar*, Ph. et Landb.; Scl. et Huds., *Arg. Orn.* II, p. 123 (pt.) — Chili centr. et S., Argentine S. jusqu'à Magellan.

11.520. RUBIDICEPS, Scl., *P. Z. S.*, 1860, pp. 387, 413, pl. 173; *inornata*, Gray (nec King.) — Iles Malouines.

Digitized by Google

11.521. POLIOCEPHALA, Sclat. (ex Gray), *P.Z.S.*, 1857, p. 128; Scl., *Argent. Orn.* II, p. 124; *inornata*, Gr. (nec King.), *Gen. B.* III, pl. 165; ? *leucopterus*, Licht. (nec Gm.); *chiloensis*, Ph. et Landb. — Chili S., Argentine S., Patagon., île Chiloe.

### 1835. CYANOCHEN

*Cyanochen*, Bonap. (1856); *Cyanauchen*, Schl. (1867).

11.522. CYANOPTERUS (Rüpp.), *Syst. Uebers.*, pp. 129, 137, pl. 49; Des M., in *Lef.*, *Voy. Abyss.* VI, p. 169, pl. 14; Bp., *C. R.* XLIII, p. 648; Schl., *l. c.*, p. 96. — Abyssinie, Choa.

### 1836. CHENONETTA

*Chenonetta*, Brandt (1836); *Chlamydochen*, Bp. (1856).

11.523. JUBATA (Lath.), *Ind. Orn.*, *App.*, p. 69; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 18; Schl., *l. c.*, p. 97; *lophotus*, Brandt. — Australie.

## SUBF. VI. — CYGNINÆ

### 1837. CYGNUS

*Cygnus*, Briss. (1760); *Olor*, Wagl. (1832); *Sthenelus*, Stejn. (1882); *Sthenelides*, Stejn. (1885).

11.524. FERUS, Briss.; Sal., *Orn.*, p. 405 (1767); Dubois, *l. c.* II, p. 410, pl. 248; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 493; *musicus*, Bechst.; Dress., *B. Eur.* VI, p. 433, pl. 419, f. 4; *canorus*, Humb.; *melanorhynchus*, Mey.; *olor*, Pall. (nec Gm.); *islandicus*, Brm.; *xanthorhinus*, Naum.; *linnæi*, Malm. — Europe et Asie du 33° au 74 1/2° l. N., Afrique N.

11.525. BEWICKI, Yarr., *Tr. Linn. Soc.*, 1850, II, p. 453; Dress., *l. c.* VI, p. 441, pl. 419, f. 3; Dubois, *l. c.* II, p. 414, pl. 250; *minor*, Keys. et Bl.; *melanorhinus*, Naum.; *ferus*, Gr. (nec Briss.); *americanus*, Hartl. (nec Sharpl.); *altumi*, Baedeck.; *islandicus*, C. Dub. (nec Brm.) — Asie, au N. jusqu'à la Nouv.-Zemble, au S. jusqu'en Chine et Japon (accid. Europe, Belgique).

3200. ? *Var.* DAVIDI, Swinh., *P. Z. S.*, 1870, p. 430; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 494. — Chine N.

11.526. COLUMBIANUS (Ord.), *Guthr. Geogr.*, 2° Am. ed., p. 319 (1815); Coues, *Bull. U. S. Geol. Surv. Terr.*, 1876, p. 444; *musicus*, Bp. (nec Bechst.); *bewickii*, Sw. et Rich. (nec Yarr.); *ferus*, Shr.; *americanus*, Sharpl.; Audub., *B. Am.* VI, p. 226, pl. 384. — Amérique septentr.

11.527. BUCCINATOR, Rich., *Faun. Bor.-Am.* II, p. 464; Audub., *B. Am.* VI, p. 219, pl. 382, 383; *passmori*, Hincks. — Amérique N.-W. jusqu'en Californie.

Digitized by Google

11.528. MANSUETUS, Salerne, *Orn.*, p. 404 (1767 ex Lin.); Dubois, *l. c.* II, p. 416, pl. 249; *olor*, Gm.; Dress., *l. c.* VI, p. 419, pl. 418, 419, ff. 5, 6; *gibbus*, Bechst.; *sibilus*, Pall.; *mutus*, Forst.; *gibbosus*, Kuhl; *sibilans*, Nilss.; *tuberculirostris*, C. Dub.; *immutabilis*, Pelz. (nec Yarr.); *unwini*, Hume; *pelzelni*, Stejn.; *immutabilis*, Yarr. (race domestique). — Suède S., Danemark, Russie S., Caspien., Turk., Mong. (acc. Eur. centr. et mér. et dans le N.-W. de l'Inde); domestique partout en Europe.

11.529. MELANOCORYPHUS (Mol.), *Sagg. Stor. Nat. Chili*, p. 207; Salvad., *Cat.*, p. 39; *nigricollis*, Gm.; Des M., in *Gay*, *Hist. Chile*, I, p. 445, pl. 14; Schl., *l. c.*, p. 79; *melanocephala*, Gm. — Amérique mérid. du 20e l. S. à Magellan et Malouines.

## 1838. CHENOPIS

*Chenopis*, Wagl. (1832); *Chenopsis*, Rchb. 1852).

11.530. ATRATA (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 834; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 215, pl. 286; Schl., *l. c.*, p. 80; *novæhollandiæ*, Bonn.; *plutonia*, Shaw. — Australie, Tasmanie.

## 1839. COSCOROBA

*Coscoroba*, Rchb. (1852); *Pseudolor*, Gray (1855); *Pseudocycnus*, Sund. (1872).

11.531. CANDIDA (Vieill.), *N. Dict.* XXIII, p. 331; Rchb., *Av. Syst. Nat.*, p. 10; Scl., *Argent. Orn.* II, p. 126; *A. coscoroba*, Mol., *Sagg. Stor. Nat. Chili*, p. 207; Gray, *Gen. B.* III, pl. 166; *anatoides*, King.; *hyperboreus*, D'Orb.; *chionis*, Illig. — Paraguay, Uruguay, Argentine, Chili, Patagonie, Malouines.

# SUBF. VII. — ANATINÆ

## 1840. DENDROCYGNA

*Dendronessa*, Wagl. (1832, nec Sw., 1831); *Dendrocygna*, Sw. (1837); *Leptotarsis*, Eyt. (1838); *Dendrocycna*, Scl. (1880).

11.532. VIDUATA (Lin.); *Pl. Enl.* 808; Eyt., *Mon. Anat.*, p. 110; C. Dub., *Orn. Gal.*, p. 71, pl. 44; Schl., *l. c.*, p. 90; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 471; *leucopsis*, Vieill. (nec Bechst.); *personata*, Württ.; ?*multicolor*, Scop.; ?*manillensis*, Gm. — Antilles, Amérique mérid. jusqu'à l'Argentine, Afrique au S. du Sahara, Madagascar.

11.533. FULVA (Gm.), *S. N.* I, p. 530; Hartl., *Syst. Verz. Ges. Mus.*, p. 118; Baird, *B. N. Am.*, 1860, pl. 63, f. 1; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 1301; Hume et Marsh., *Game B.* III, p. 119, pl. 16; *bicolor*, Vieill.; *virgata*, Max.; *major*, Jerd.; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag.*, *Ois.*, p. 731, pl. 272; *arcuata*, Gray (nec Horsf.); *africana*, Bp. — États-Unis S., Amérique trop.; Inde, Birmanie, Afrique trop., Madagascar.



Digitized by Google

11.534. ARCUATA (Horsf. ex Cuv.), *Zool. Res. in Java*, pl. 65; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 14; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 385; *badia*, S. Müll.; *vagans*, Eyt.; *gouldi*, Bp.; *javanica*, Jerd. (nec Horsf.) — Philip., Célèb., Born., Java, Timor, Sumba, Moluques, Nouv.-Guinée, Australie, Nouv.-Caléd., Fidji.

11.535. JAVANICA (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 199; Rchb., *Syn. Av., Natatores*, pl. 89, ff. 171-72; Hume et Marsh., *Game Birds*, III, p. 109, pl. 15; *arcuata* (pt.), auct. plur.; *awsuree*, Syk.; *caryophyllacea*, Sund.; *var. minor*, Bp. — Inde, Ceylan, Indo-Chine, Malacca, Sumatra, Bornéo, Java.

11.536. AUTUMNALIS (Lin.); Baird, *B. N. Amer.*, p. 770, pl. 63, f. 2; id., *Mex. B. Surv.* II, 2, p. 26, pl. 25; Cory, *B. W. Ind.*, p. 261. — Du Texas à Panama.

3201. *Var.* DISCOLOR, Scl. et Salv., *Nomencl. Av. Neotrop.*, pp. 129, 161; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 469; *autumnalis* (pt.), auct. plur. (nec L.) — Amérique méridionale tropicale.

11.537. ARBOREA (Lin.); *Pl. Enl.* 804; Schl., *l. c.*, p. 84; Cory, *B. W. Ind.*, p. 50; Salvad., *Cat.*, p. 162; ?*jacquini*, Gm. — Antilles et Bahama.

11.538. GUTTULATA, Wall., *P. Z. S.*, 1863, p. 36; *guttata*, Forst., *M. S.*; Schl., *l. c.*, p. 85; Salvad., *Cat.*, p. 164, pl. 1; *punctata*, Finsch; *arcuata*, Rosenb. (nec Horsf.); *vagans*, Rosenb. (nec Eyt.) — Mindanao, Célèbes, Moluques, Nouv.-Guinée.

11.539. EYTONI (Eyt. ex Gould), *Mon. Anat.*, p. 111; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 15; *versicolor*, Hartl. — Australie, Nouv.-Zélande W.

## 1841. ALOPOCHEN

*Chenalopex*, Steph. (1824, nec Vieill., 1819); *Alopochen*, Stejn. (1885).

11.540. ÆGYPTIACA (Lin.); *Pl. Enl.* 379, 982, 983; Steph., *Gen. Zool.* XII, p, 43, pl. 42; Gould, *B. Eur.*, pl. 353; Shell., *B. of Egypt*, p. 279; Stejn., *Stand. N. H. B.*, p. 141, f. 66; *africanus*, Bonn.; *merganser*, Naum.; *varia*, Bechst.; *varius*, Brm. — Afrique, Palestine.

11.541. JUBATA (Spix), *Av. Bras.* II, p. 84, pl. 108; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 468; *polycomos*, Less. ex Cuv.; *pollicaris*, Licht. — Amérique méridionale tropicale.

## 1842. TADORNA

*Tadorna*, Flem. (1822); *Vulpanser*, Keys. et Blas. (1840); *Radjah*, Rchb. (1852); *Gennæochen*, Heine (1890).

11.542. CORNUTA (S. G. Gm.), *Reis. Russl.* II, p. 185, pl. 19 (1774); Dress., *B. Eur.* VI, p. 451, pl. 420; Dubois, *Fne. Ill. Vert. Belg., Ois.* II, p. 423, pl. 251; *A. tadorna*, L.; *damiatica*, Gm.; *fami-* — Europe, Sibérie S., Chine N., Japon, en hiver le N. de l'Inde, le S. de la Chine et

Digitized by Google

*liaris*, Boie; *bellonii*, Steph.; *vulpanser*, Flem.; *gibbera*, etc., Brm. — le N. de l'Afrique.

11.543. RADJAH (Garn.), *Voy. Coq., Zool.* I, 2, p. 302, *Atlas*, pl. 49; Schl., *l.c.*, p. 69; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 8; Salvad., *Orn. Pap. e Mol.* III, p. 391; *eytoni*, Rchb.; *leucomelas*, Bp. — Moluques, îles Papous, Australie.

## 1843. STICTONETTA

*Stictonetta*, Rchb. (1852).

11.544. NÆVOSA (Gould), *P. Z. S.*, 1840, p. 177; id., *B. Austr.* VII, pl. 10; Schl., *l. c.*, p. 63; Salvad., *Cat.*, p. 324. — Australie S. et W., Tasmanie.

## 1844. CASARCA

*Casarca*, Bonap. (1838); *Nettalopex*, Heine et Rchw. (1890).

11.545. RUTILA (Pall.), *Nov. Comm. Petrop.* XIV, 1, p. 579, pl. 22, f. 1; Dress., *l. c.* VI, p. 641, pl. 421; *casarca*, L.; *rubra*, Brm. — Eur. S. et E., Afr. N. et N.-E., Asie centr., Jap., Inde N., Birm.

11.546. CANA (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 510; Schl., *l. c.*, p. 67; Salvad., *Cat.*, p. 182; *ferrugineus*, Bonn.; *montana*, Forst., *Icon. ined.*, pl. 69, 70; *rutila* (pt.), Gray, Layard, Holub. — Afrique S., du Cap au Transvaal.

11.547. VARIEGATA (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 505; Gray, *Zool. Ereb. and Terr., B.*, p. 15, pl. 16; Scl., *P. Z. S.*, 1864, p. 191, pl. 19; Bull., *B. New Zeal.*, p. 241, pl. 25; *picta*, Vieill. (nec Gm.); *castanea*, Eyt.; *cheneros*, Forst. — Nouv.-Zélande.

11.548. TADORNOIDES (Jard. et Selby), *Ill. Orn.* II, pl. 62; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 7; *kasarkoides*, Lafr.; *tadornina*, Heine et Rchw. — Australie S. et W., Tasmanie.

## 1845. ANAS

*Anas*, Lin. (1766); *Anassus*, Rafin. (1815); *Boschas*, Sw. (1831); *Elasmonetta*, Salvad. (1895); *Polionetta*, Oates (1899).

11.549. BOSCAS, Lin.; Dress., *B. Eur.* VI, pl. 422; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 432, pl. 253; *fera*, *domestica*, Briss.; *boschas*, *adunca*, L.; *monacha*, Scop.; *curvirostra*, Pall.; *cirrhata*, *persica*, *major*, *grisea*, *nævia*, *nigra*, Gm. (Aberr.); *archiboschas*, etc., Brm.; *pallescens*, Ol.-Gall. (1). — Europe et Asie entre le 30° et le 70° l. N., Islande, Groenland, Amér. du 10° au 70° l. N., Afr. N. et N.-E.

(1) Hybrides: *A. breweri*, Aud., *Orn. Biogr.* IV, p. 302, pl. 338; = *auduboni*, Bp.; *maxima*, Gosse, *B. Jam.*, p. 399.

Digitized by Google

11.550. WYVILLIANA, Sclat., *P. Z. S.*, 1878, p. 350; id., *Voy. Chall., B.*, p. 98, pl. 22 (*juv.*); Rothsch., *Avif. Lays.*, pl. 78, 79; *boschas* (pt.), auct. plur.; *superciliosa*, Dole (nec Gm.); *sandwichensis*, Bp. (*nom. nudum*). — Iles Sandwich.

11.551. LAYSANENSIS, Rothsch., *Bull. B. O. Club*, n° 4, 1892, p. 17; id., *Ibis*, 1893, p. 250; id., *Avif. Lays.*, pl. 80. — Ile Laysan (Sandwich).

11.552. MELLERI, Sclat., *P. Z. S.*, 1864, p. 487, pl. 34; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag., Ois.*, p. 724, pl. 269; *xanthorhynchus*, Roch et Newt. (nec Forst.); *erythrorhyncha*, Scl., 1863 (nec Gm.); *morelii*, Grand.; *mascarina*, Vins. — Madagascar.

11.553. OBSCURA, Gm., *S. N.* I, 2, p. 541; Audub., *B. Am.* VI, p. 244, pl. 386; Schl., *l. c.*, p. 41. — Amérique N.-E., Bermudes.

3202. *Var.* RUBRIPES, Brewst., *Auk*, 1902, p. 184. — De Terre-Neuve à la Virginie.

11.554. FULVIGULA, Ridgw., *Am. Nat.* VIII, 1874, p. 111; id., *Pr. U. S. Nat. Mus.* I, p. 251; *obscura* (pt.), auct. plur. — Floride, ? Antilles.

3203. *Var.* MACULOSA, Senn., *Auk*, 1889, p. 263; Salvad., *Cat.*, p. 203; *obscura* et *fulvigula* (pt.), auct. plur. — Du Texas E. au Kansas.

11.555. DIAZI, Ridgw., *Auk*, 1886, p. 332; id., *Man. N. Am. B.*, p. 32. — Mexique.

11.556. ABERTI, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.* I, p. 250, IX, p. 173; Salvad., *l. c.*, p. 204. — Mazatlan (Mexique).

11.557. LUZONICA, Fras., *P. Z. S.*, 1839, p. 113; id., *Zool. Typ.*, pl. 67; Schl., *l. c.*, p. 42; *luconica*, Fsch. — Philippines.

11.558. SUPERCILIOSA, Gm., *S. N.* I, p. 537; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 9; *leucophrys*, Forst. (nec V.); *mulleri*, Bp. — Iles de la Sonde, Nouv.-Guinée, Australie, Nouv.-Zélande.

3204. *Var.* PELEWENSIS, Hartl. et Fsch., *P. Z. S.*, 1872, p. 108; Fsch., *Journ. Mus. Godeffr.*, Heft VIII, p. 40; *superciliosa* (pt.), auct. plur. — Iles Pelew.

11.559. OUSTALETI, Salvad., *Bull. Br. O. Club*, XX, p. 1; id., *Cat.*, p. 189 (en note); ?*freycineti*, Bp. — Iles Mariannes.

11.560. POECILORHYNCHA, Forst., in *Penn. Zool. Ind.*, p. 23, pl. 13, f. 1; Gray et Hardw., *Ill. Ind. Zool.* I. pl. 67; Schl., *l. c.*, p. 43; Hume et Marsh., *Game B. Ind.* III, p. 168, pl. 22; *pœkilorhyncha*, Gm.; *erythrorhyncha*, Vieill. (nec Gm.) — Inde, Ceylan, Birmanie.

11.561. ZONORHYNCHA, Swinh., *Ibis*, 1866, p. 394; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 496; Seeb., *B. Jap. Emp.*, p. 243; *pœcilorhyncha*, auct. plur. (nec Forst.); Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 126, pl. 82. — Sibérie E., Mongolie, Chine, Japon, îles Kouriles.

11.562. UNDULATA, C. Dubois, *Orn. Gal.*, p. 119, pl. 77 — Afrique S., à l'Ouest

Digitized by Google

(1839); Salvad., *Cat.*, p. 212; *flavirostris*, Smith (nec Vieill.); id., *Ill. Zool. S. Afr.*, *B.*, pl. 96; *xanthorhyncha*, Forst.; Schl., *l. c.*, p. 43; *capensis*, Licht. (nec Gm.); *rueppelli*, Blyth. — jusqu'à Angola, à l'E. jusqu'à l'Abyssinie.

11.563. SPARSA, Smith, *Cat. S. Afr. Mus.*, p. 36; id., *Ill. Zool. S. Afr.*, *B.*, pl. 97; *leucostigma*, Rüpp., *Syst. Uebers.*, pp. 150, 158, pl. 48; *guttata*, Licht. — Afrique S. et E. jusqu'à l'Abyssinie.

11.564. SPECULARIS (King), *Zool. Journ.*, 1828, p. 98; Jard. et Sel., *Ill. Orn.* IV, pl. 40; *chalcoptera*, Kittl., *Mém. Acad. St-Pétersb.* II, 1835, p. 471, pl. 5; Schl., *l. c.*, p. 46. — Du Chili central à Magellan.

11.565. CRISTATA, Gm., *S. N.* I, p. 540; Schl., *l. c.*, p. 39; Tacz., *Orn. Pérou*, III, p. 475; *specularioides*, King; *pyrrhogastra*, Meyen; *lophyra*, Forst., *Icon. Ined.*, pl. 78. — Du Pérou à Magellan, Malouines.

11.566. CHLOROTIS, Gray, *Voy. Ereb. and Terr.*, *B.*, p. 15, pl. 20; Bull., *Man. B. New Zeal.*, p. 68; id., *Hist. B. New Zeal.*, 2e éd. II, p. 257, pl. 42; Salvad., *Cat.*, p. 287; *aucklandica*, Hect. (nec Gr.) — Nouvelle-Zélande, Chatham.

## 1846. EUNETTA

*Eunetta*, Bonap. (1856).

11.567. FALCATA (Georgi), *Reise Russ. Reichs*, I, p. 167; Dress., *B. Eur.* VI, p. 523, pl. 429; Hume et Marsh., *Game B. of Ind.* III, p. 231, pl. 30; *falcaria*, Pall.; *javana*, Bodd.; *javanensis*, Bonn.; *drepanopteros*, Mess.; *major*, Gm.; *multicolor*, Swinh. (nec Scop.) — Sibérie, Japon, Chine, Inde (accidentellement Europe).

## 1849. CHAULELASMUS

*Chauliodus*, Sw. (1831, nec Bloch, 1801); *Chauliodes*, Eyt. (1838, nec Latr., 1798); *Chaulelasmus*, Gray (1838); *Ktinorhynchus*, Eyt. (1838); *Ctenorhynchus*, Agass. (1846).

11.568. STREPERUS (Lin.); Dress., *l. c.*, p. 487, pl. 424; Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* II, p. 438, pl. 254; *cinerea*, *kekuschka*, Gm.; *canapiglia*, Ger.; *americanus*, Brm. — Europe, Asie, Afrique entre le 60° et le 20° l. N., en Amérique du 55° au 20° l. N.

3205. *Var.* COUESI, Streets, *Bull. Nutt. Orn. Club*, I, p. 46; id., *Bull. U. S. Nat. Mus.*, 1877, n° 7, p. 21; Salvad., *Cat.*, p. 226. — Iles Fanning.

## 1848. MARECA

*Mareca*, Steph. (1824); *Penelops*, Kp. (1829).

11.569. PENELOPE (Lin.); Dress., *l. c.*, p. 541, pls 432-33; — Europe et Asie, au S.

Digitized by Google

Dubois, *l. c.*, p. 441, pl. 223; *fistularis*, Briss.; *cogolca*, Gm.; *marigiana*, Ger.; ? *melanura*, Gm.; *kagolca*, *fistulans*, Brm.; *bimaculata*, Gray (Hybride). — jusqu'à Bornéo, Afrique N. et N.-E. (accidentellement Amérique N.-E.)

11.570. AMERICANA (Gm.), *S. N.* I, p. 526; Wils., *Am. Orn.* VIII, p. 86, pl. 69; Audub., *B. Am.* VI, p. 259, pl. 389; Steph., *Gen. Zool.* XII, 2, p. 135. — Amérique septentr. et centr., Antilles (accident. Sibérie E.)

11.571. SIBILATRIX (Poepp.), *Fror. Not.* XXXI, p. 10; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1876, p. 393; Scl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 135; *chiloensis*, King; Schl., *Mus. P.-B.*, *Anseres*, p. 46; *parvirostris*, Merr. — Chili, Paraguay, Argentine, Patagonie, Malouines.

## 1849. QUERQUEDULA

*Querquedula*, Steph. (1824); *Nettion*, Kp. (1829); *Cyanopterus*, Eyt. (1838, nec Halid., 1835); *Pterocyanea*, Bp. (1841); *Punanetta*, Bp. (1856); *Virago*, Newt. (1871); *Adelonetta*, Heine (1890).

11.572. VERSICOLOR (Vieill.), *N. Dict.* V, p. 109; Schl., *l. c.*, p. 57; Scl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 131; *maculirostris*, Licht.; Rchb., *Syn. Av.*, *Natat.*, pl. 89, f. 181; *fretensis*, King. — Paraguay, Uruguay, Argentine, Chili, Patagonie, Malouines.

11.573. PUNA (Licht.), *Mus. Ber.*; Tsch., *Arch. f. Naturg.*, 1844, I, p. 315; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 197, pl. 99; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 478. — Pérou, Bolivie, Chili N.

11.574. CIRCIA (Lin.); Dress., *B. Eur.* VI, p. 513, pl. 429; Dubois, *Fne. Ill. Vert.*, *Ois.* II, p. 448, pl. 257; *A. querquedula*, L.; *balbul*, Gm.; *glaucopterus*, *scapularis*, Brm.; *humeralis*, S. Mull.; *vulgaris*, Hodgs.; *pterocyanea*, Goeld. — Europe et Asie jusqu'au 60° latitude N., Japon, Archipel Malais, Afrique N. et N.-E.

11.575. DISCORS (Lin.); *Pl. Enl.* 966 et 403; Audub., *B. Am.* VI, p. 287, pl. 395; Schl., *l. c.*, p. 50; *inornatus*, Gosse, *B. Jam.*, *Ill.*, pl. 111 (fem.) — Amér. sept. et centr., Antilles, Colombie, Ecuador, Pérou.

11.576. CYANOPTERA (Vieill.), *N. Dict.* V, p. 104; Schl., *l. c.*, p. 51; *rafflesii*, King., *Zool. Journ.* IV, p. 97, *Suppl.*, pl. 29 (1828); Jard. et Sel., *Ill. Orn.*, 1858, pl. 23; *cœruleata*, Fras., *P. Z. S.*, 1843, p. 118. — Amér. N.-W., Mexique, Amér. S.-W., Argentine, Patagonie, Malouines.

11.577. FORMOSA (Georgi), *Reise Russ. Reich.*, p. 168; Dress., *l. c.* VI, p. 521, pl. 428; Dubois, *l. c.* II, p. 456, pl. 258[b]; *glocitans*, Pall.; *baikal*, Bonn.; *torquata*, Messer.; *picta*, Stel.; *perpulchra*, Yarr.; *cucullata*, Fisch. — Asie orientale jusqu'au 70° l. N., Japon, au S. jusqu'au 28° l. N. (accid. Asie W., Europe, Belgique).

11.578. CRECCA (Lin.); Dress., *l. c.*, pl. 426; Dubois, *l. c.* II, p. 452, pl. 258; *subcrecca*, *creccoides*, Brm.; *bimaculata*, Penn. (hybride). — Europe et Asie jusqu'au 70° l. N., au S. jusqu'à Ceylan, Japon, Afrique N.

Digitized by Google

3206. *Var.* CAROLINENSIS (Gm.), *S. N.* I, p. 553; Jard. et Sel., *Ill. Orn.* III, pl. 146; Audub., *B. Am.* VI, p. 281, pl. 392; *americana*, Bonn.; *migratoria*, Bartr.; *crecca*, auct. plur. (nec L.); *sylvatica*, Vieill.; *groenlandica*, Brm. — Amérique, de l'Honduras au 70° latitude N., Groenland, Antilles (accidentellement Europe).

11.579. CASTANEA (Eyt.), *Mon. Anat.*, p. 119, pl. 22; A. Newt., *P. Z. S.*, 1871, p. 649; *punctata*, Cuv. (nec Burch.); Gould, *B. Austr.* VII, pl. 11. — Australie, Tasmanie, Nouvelle-Zélande.

11.580. SALVADORII, Büttik., *Notes Leyd. Mus.*, 1896, p. 59. — Ile Sumba.

11.581. GIBBERIFRONS (S. Müll.), *Verh. Land- en Volkenk.*, p. 159; Finsch, *Neu-Guin.*, p. 183; Schl., *l. c.*, p. 58; Sel., *P. Z. S.*, 1882, p. 453, pl. 33; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 398; id., *Cat.*, p. 254, pl. 2, f. 2; *punctata*, Gould; *gracilis*, Bull.; *castanea*, auct. plur. (nec Eyt.) — Célèbes, îles de la Sonde, Nouv.-Guinée, Nouv.-Calédonie, Australie, Nouv.-Zélande.

3207. *Var.* ALBOGULARIS (Hume), *Str. Feath.* I, p. 303; Salvad., *Cat.*, p. 257, pl. 2, f. 1; *andamanensis*, Tytl. (*descr. nulla*); *gibberifrons*, auct. plur. (nec Müll.) — Iles Andaman.

11.582. BERNIERI, Hartl. (ex J. Verr.), *J. f. O.*, 1860, p. 173; id., *Vög. Madag.*, p. 363; M.-Edw. et Grand., *H. Madag.*, *Ois.*, p. 726, pl. 270; *assimilis* (pt.), Schl.; *vinsoni*, Grand.; *gibberifrons*, Grand. (nec Müll.) — Madagascar.

11.583. CAPENSIS (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 527; Sharpe, *Lay. B. S. Afr.*, p. 758; *larvata*, Cuv.; *georgica*, Gr. (nec Gm.); *assimilis*, Forst., *Icon. ined.*, pl. 75. — Afrique S. jusqu'à l'Angola à l'Ouest et le Choa à l'Est.

11.584. FLAVIROSTRIS (Vieill.), *N. Dict.* V, p. 107; Sel. et et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 131; *creccoides*, King.; Cass., *U. S. Astron. Exped.* II, p. 203, pl. 26; *oxyptera*, Hartl. (nec Meyen). — Brésil S., Argentine, Chili, Patagonie, îles Malouines.

3208. *Var.* OXYPTERA (Meyen), *Nov. Act.* XVI, *Suppl.*, p. 121, pl. 26; Tsch., *Faun. Per.*, pp. 53, 309; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 476; *creccoides* (pt.), Gr.; *angustirostris*, Ph. et Landb. (nec Ménétr.); *flavirostris* (pt.), Schl. — Chili septentrional et Pérou (Andes).

11.585. ANDIUM, Scl. et Salv., *Nomencl. Av. Neotrop.*, pp. 129, 162; id., *P. Z. S.*, 1875, p. 237, 1876, p. 387, pl. 34. — Ecuador et Vénézuéla (Andes).

11.586. GEORGICA (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 516; *N. georgicum*, Salvad., *Cat*, p. 264; *xanthorhyncha*, Forst., *Icon. ined.*, pl. 71; *eatoni*, Cab. (nec Sharpe); *antarctica*, Cab., *J. f. O.*, 1888, p. 118, pl. 1. — Géorgie S.

11.587. PUNCTATA (Burch.), *Travels.* I, p. 283 (1822); Sel., *P. Z. S.*, 1880, pp. 522, 534; *hottentota*, Smith (1837); id., *Ill. S. Afr. Zool.*, pl. 105; *pileata*, — Afrique S., à l'Ouest jusqu'à l'Angola, à l'Est jusqu'au Choa,

Digitized by Google

Licht.; *madagascariensis*, Grand.; *cyanorhyncha*, Böhm. — Madagascar.

11.588. BRASILIENSIS (Briss.); Gm., *S. N.* I, 2, p. 517; Burm., *Th. Bras.* III, p. 439; Schl., *l. c.*, p. 61; *mareca*, Bonn.; *ipecutiri*, Vieill.; *paturi*, Spix, *Av. Bras.* II, p. 85, pl. 109; *erythrorhyncha*, Eyt. (nec Gm.); *novæ-hispaniæ*, Rchb. (nec Gm.) — Amérique méridionale de la Colombie et des Guyanes à Magellan.

11.589. TORQUATA (Vieill.), *N. Dict.* V, p. 110 (nec Briss. neque Gm.); Schl., *l. c.*, p. 61; Scl., *Argent. Orn.* II, p. 132; *leucophrys*, Vieill.; *manillensis*, Eyt. (nec Gm.); *rubidoptera*, C. Dub., *Orn. Gal.*, p. 90, pl. 57; *rhodopus*, Merr. — Brésil S., Paraguay, Uruguay, Argentine.

## 1850. DAFILA

*Dafila*, Leach (1824); *Trachelonetta*, Kp. (1829); *Phasianurus*, Wagl. (1832); *Pœcilonitta*, Eyt. (1838); *Pœcilonetta*, Agass. (1842-46); *Daphila*, Coues (1874); *Dafilula*, Coues (1897).

11590. ACUTA (Lin., 1758); Dress., *B. Eur.* VI, p. 531, pl. 430, 431; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 445, pl. 256; *longicauda*, Briss.; *subulata*, Gm.; *alandica*, Sparrm.; *sparrmanni*, Lath.; *caudacuta*, Pall.; *tzitzihoa*, Vieill.; *caudata*, Brm.; *americana*, Bp.; ?*modesta*, Tristr., *P. Z. S.*, 1886, p. 79, pl. 7. — Europe, Asie et Amérique entre le 70° et le 10° lat. N., Afrique N., Groenland, Islande, Japon.

11.591. SPINICAUDA (Vieill.), *N. Dict.* V, p. 135; Schl., *l. c.*, p. 38; Sclat., *P. Z. S.*, 1870, p. 665, pl. 38; *oxyura*, Licht.; *urophasianus* (Scl., 1860, nec Vig.); *caudacuta*, Burm. (nec Pall.) — Du S. du Brésil et du Pérou jusqu'à Magellan et les îles Malouines.

11.592. EATONI (Sharpe), *Ibis*, 1875, p. 328; id., *Trans. Ven. Exp., Zool., Birds*, p. 5, pl. 6; Salvad., *Cat.*, p. 278, pl. 3; Coues, *Auk*, 1897, p. 207. — Iles Kerguelen et Crozette.

11.593. BAHAMENSIS (Catesb.), *Carolina*, I, p. 93, pl. 93 (1754); Lin., *S. N.* (1766); Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 482; *ilathera*, Bonn.; *rubrirostris*, Vieill.; *urophasianus*, Vig.; id., *Zool. Beechey's Voy., Orn.*, p. 31, pl. 14; *vigorsii*, Wagl.; *fimbriata*, Merr. — Bahama, Antilles, Amérique méridionale, îles Malouines.

3209. *Var.* GALAPAGENSIS (Ridgw.), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1889, p. 115; *bahamensis* (pt.), auct. plur. — Iles Galapagos.

11.594. ERYTHRORHYNCHA (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 517; Smith, *Ill. S. Afr. Zool., B.*, pl. 104; Schl., *l. c.*, p. 56; *melanura*, Vieill. (nec Gm.); *punctata*, Rchb. (nec Burch.); *pyrrhorhyncha*, Holub. — Sud de l'Afrique jusqu à l'Angola à l'Ouest et l'Abyssinie à l'Est, Madagascar.

Digitized by Google




Cornell University Library

LOPHURA SUMATRANA

Digitized by Google

Digitized by Google

## Publications de M. Alph. DUBOIS

en vente à la librairie de Henri LAMERTIN,
20, rue du Marché-au-Bois, à Bruxelles.

---

**Faune illustrée des Vertébrés de la Belgique**, *Oiseaux*. — 4 vol. in 4° avec 427 pl. coloriées à la main et cartes (1876-1893). — *Il ne reste plus qu'un exemplaire, dont les 5 planches manquantes sont remplacées par des aquarelles peintes par l'auteur* . . . fr. 400

**Le même ouvrage**, avec cartes mais sans atlas, 2 vol. in-4° . . . 75

**Les Lépidoptères de la Belgique**, leurs chenilles et leurs chrysalides, décrits et figurés d'après nature sur l'une des plantes nourricières. 5 vol. in-4° avec 431 pl. coloriées à la main (1861-1884) . 275

**Revue des derniers systèmes ornithologiques et nouvelle Classification proposée pour les Oiseaux.** Broch. in-8°, Paris, 1891 . . . . . 1 25

**Histoire populaire des animaux utiles de la Belgique.** Nouvelle édition illustrée, revue et augmentée, — 1 vol. in-12, Bruxelles, 1889 . . . . . 1 75

**Les Animaux nuisibles de la Belgique** *(Vertébrés)*. — 1 vol. in-12, illustré. *Avec la liste de tous les Vertébrés observés en Belgique.* Bruxelles 1895 . . . . . 2

**Tableau synoptique des oiseaux insectivores** qu'il est défendu de prendre en tout temps. — Nouveau tirage en chromo . . . 2 50

**Revue critique des oiseaux de la famille des Bucérotidés**, broch. in-8°, avec 2 pl. col., Bruxelles, 1884 . . . . 2

**Manuel de zoologie**, *conforme aux progrès de la science*, 1 vol. in-12, avec 177 gravures intercalées dans le texte. Bruxelles 1882 . . 6

**Aperçu du Règne animal** ou premières notions de zoologie, 1 vol. in-12, avec 166 gravures. (Ouvrage adopté pour l'Enseignement moyen.) — Bruxelles 1882 . . . . . 3

**Conspectus systematicus et geographicus avium Europæarum**, broch. in-8°, Bruxelles 1871 . . . . . 2

**Archives cosmologiques.** *Revue des sciences naturelles*. 1 vol. in-8°, avec 13 pl. — Bruxelles 1867 . . . . . 8

**Traité d'Entomologie horticole, agricole et forestière.** 1 vol. in-8°, avec 4 pl. col. *(Ouvrage couronné.)* — Gand, 1865 *(Épuisé.)*

---

Aug. Lameere, **Manuel de la Faune de Belgique** (Animaux non insectes). Tome I, in-18 avec figures dans le texte. Bruxelles, 1895. 5 50
Tome II (Insectes inférieurs), in-18, 858 pages et 721 figures dans le texte. 1900. Cart., toile anglaise . . . . . 7 00


Bruxelles. — Polleunis & Ceuterick, imprimeurs, rue des Ursulines, 37.

SYNOPSIS AVIUM

# NOUVEAU
# MANUEL D'ORNITHOLOGIE

PAR

**Alphonse DUBOIS**

Docteur en sciences naturelles,
Conservateur au Musée Royal d'Histoire naturelle de Belgique,
Officier de l'Ordre de Léopold,
Membre du Comité international et permanent d'Ornithologie,
de la Commission permanente d'étude des collections du Musée de l'État Indépendant du Congo,
Membre honoraire, correspondant ou effectif de plusieurs Sociétés savantes.

**Fascicule XIV**

**ANSERES, STEGANOPODES, GAVIÆ, TUBINARES, PYGOPODES, IMPENNES, APTERYGES, CASUARII, RHEÆ, STRUTHIONES. — SUPPLÉMENT (1re partie, p. 1053).**

**Pl. XVI**

BRUXELLES
H. LAMERTIN, éditeur
20, RUE DU MARCHÉ-AU-BOIS

1903

# AVIS

Nous commençons dans le présent fascicule la publication du *Supplément* (p. 1053), qui comprend les nouveautés décrites depuis la mise sous presse de notre *Synopsis* jusqu'en juin 1903, ainsi que les corrections. Dans le prochain fascicule paraîtront la fin du supplément et les tables alphabétiques des genres, des espèces et des variétés.

Le prix du fascicule restera fixé à 6 francs pour tous les abonnés qui se feront inscrire avant la fin de la publication.

## ON SOUSCRIT à

BRUXELLES, chez l'éditeur, M. **H. Lamertin**, 20, rue du Marché-au-Bois.
AMSTERDAM, chez MM. **Feikema, Caarelsen & Cie**.
BERLIN, chez M. **R. Friedländer & Sohn**, Carlstr. 11, N. W.
LONDRES, chez MM. **William & Norgate**, 14, Henrietta street.
MADRID, chez M. **Romo y Fussel**.
MILAN, chez M. **Ulrico Hœpli**, 57, Corso Vittorio Emanuele.
OXFORD, chez M. **James Parker & Cie**, 27, Broad street.
PARIS, chez M. **P. Klincksieck**, 5, rue Corneille.
NEW-YORK, chez M. **G.-E. Stechert**, 9 East 16th street.

## 1851. NESONETTA

*Nesonetta*, Gray (1844).

11.595. AUCKLANDICA, Gray, *Gen. B.* III, p. 627; id., *Voy. Ereb. and Terr., B.*, p. 16, pl. 17; Salvad., *Cat.*, p. 289. — Ile Auckland.

## 1852. SPATULA

*Spatula*, Boie (1822); *Rhynchaspis*, Steph. (1824); *Spatulea*, Flem. (1828); *Clypeata*, Less. (1828); *Rhynchasmus!* Koenig, 1893.

11.596. CLYPEATA (Briss., 1760; Lin. 1766); Dress., *B. Eur.* VI, p. 497, pl. 425; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 428, pl. 252; *mestolone*, Ger.; *rufigaster*, Lath.; *mexicana*, *rubens*, Gm.; *macrorhynchos*, etc., Brm.; *virescens*, Syk.; *spathulata*, C. F. Dub. — Europe, Asie et Amérique du 10° latitude N. au cercle polaire, Afrique N. et N.-E.

11.597. RHYNCHOTIS (Lath.), *Ind. Orn., Suppl.*, p. 70; Schl., *l. c.*, p. 35; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 12; Legge, *B. Ceyl.*, p. 1088; *variegata*, Gould; id., *B. Austr., Suppl.*, pl. 80. — Australie, Tasmanie, Nouvelle-Zélande.

11.598. PLATALEA (Vieill.), *N. Dict.* V, p. 157; Schl., *l. c.*, p. 35; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 480; *maculatus*, Jard. et Sel., *Ill. Orn.* III, pl. 147; *cæsioscapula*, Rchb.; *cæsioscapulata*, Bibra; *mexicana*, Licht. (nec Gm.) — Amérique méridionale, du Pérou et du Paraguay à Magellan et Malouines.

11.599. CAPENSIS (Smith), *Cat. S. Afr. Mus.*, p. 36; id., *Ill. S. Afr. Zool., B.*, pl. 98; Boc., *Orn. Angola*, p. 504; *clypeata* (pt.), Schl.; *smithii*, Hart. — Afrique S. jusqu'à l'Angola et le Transvaal.

## 1853. MALACORHYNCHUS

*Malacorhynchus*, Sw. (1831).

11.600. MEMBRANACEUS (Lath.), *Ind. Orn., Suppl.*, p. 69; Sw., *Journ. R. Inst.* II, n° IV, p. 18; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 15; *fasciata*, Shaw.; *iodotis*, Less.; *malacorhyncha*, Schl., *l. c.*, p. 36 (nec Gm.) — Australie, Tasmanie.

## 1854. MARMARONETTA

*Marmaronetta*, Rchb. (1852); *Marmonetta* (laps.), Mart. (1868).

11.601. ANGUSTIROSTRIS (Ménétr.), *Cat. rais. Cauc.*, p. 58; Schl., *l. c.*, p. 65; Dress., *B. Eur.* VI, p. 479, pl. 423; *marmorata*, Gould; id., *B. Eur.* V, pl. 373; Dub., *Ois. Eur.* II, p. et pl. 182. — Canaries, Eur. S.-W., Afrique N., Palestine, Caucase, Perse jusqu'à l'Inde.



Digitized by Google

### 1855. HETERONETTA

*Heteronetta*, Salvad. (1865).

11.602. MELANOCEPHALA (Vieill.), *N. Dict.* V, p. 163; Cass., *U. S. Astron. Exp.* II, p. 202, pl. 25; Salvad., *Atti Soc. Ital. Sc. Nat.* VIII, p. 574; Scl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 130; *atricapilla*, Merr.; Salvad., *Cat.*, p. 325; *nigriceps*, Licht. — Brésil S., Uruguay, Argentine, Chili.

## SUBF. VIII. — FULIGULINÆ

### 1856. NETTA

*Branta*, Boie (1822, nec Scop., 1769); *Netta*, Kaup (1829); *Callichen*, Brm. (1830); *Mergoides*, Eyt. (1836).

11.603. RUFINA (Pall.), *Reise*, II, *App*, p. 713; Dress., *B. Eur.* VI, p. 559, pl. 455; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 462, pl. 259; *cinerea*, Gm.; *ruficeps*, Pall.; *subrufinus*, *micropus*, Brm.; *ruficrista*, C. Dub. — Europe méridionale et centrale, et de la mer Caspienne au Turkestan jusqu'au N.-W. de l'Inde.

### 1857. METOPIANA

*Metopiana*, Bonap. (1856); *Metopias*, Heine (1890).

11.604. PEPOSACA (Vieill.), *N. Dict.* V, p. 132; Bp., *C. R.* XLIII, p. 649; Scl., *P. Z. S.*, 1870, p. 666, pl. 37; Scl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 137; *metopias*, Pöpp.; *albipennis*, Licht. — Brésil S., Paraguay, Uruguay, Argentine, Chili.

### 1858. AETHYIA

*Aythia*, Boie (1822); *Nyroca*, Flem. (1822); *Aethyia*, Agass. (1846); *Marila*, Rchb. (1852); *Aristonetta*, Baird (1858); *Ilyonetta*, Heine (1890).

11.605. FERINA (Lin.); Dress., *l. c.*, p. 551, pl. 434; Dubois, *l. c.*, p. 472, pl. 262; *ruficollis*, Scop.; *erythrocephala*, S. Gm.; *rufa*, Gm.; *ruficeps*, Brm. (1). — Europe et Asie du 62° au 20° l. N., Japon (accident. Islande); Afrique N. et N.-E.

3210. *Var.* AMERICANA (Bp.), fide Eyt., *Mon. Anat.*, p. 155; *ferina* (pt.), Gm. et auct. plur.; Audub., *B. Am.* VI, p. 311, pl. 396; *erythrocephala*, Bp. (nec Brm.) — Du Mexique au 55° latitude N., Antilles, Bahama.

(1) Hybrides : *marilloides*, Yarr.; *ferinoides*, Bartl.; *leucoptera*, A. Newt.; *homeyeri*, Bäd.; *intermedia*, Jaub.

Digitized by Google

11.606. BAERI (Radde), *Reis. S. O. Sibir.* II, p. 376, pl. 15; *Ibis*, 1866, p. 118; Salvad., *Cat.*, p. 344; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 307; *leucophthalmos*, Kittl. (nec Borkh.); *ferina*, Swinh. (err.); *nyroca*, Dav. (nec Güld.); *ferruginea*, Blak. et Pry. (nec Gm.) — Asie orientale du Kamtschatka jusqu'en Chine et Japon et le N.-E. du Bengale.

11.607. NYROCA (Güld.), *Nov. Comm. Petrop.* XIV, 1, p. 403 (1769); Dubois, *l. c.* II, p. 477, pl. 263; *rufila*, *scandiaca*, Lath.; *africana*, *ferruginea*, Gm.; Dress., *l. c.* VI, p. 581, pl. 438; *ægyptiaca*, Bonn.; *leucophthalmus*, Borkh.; *leucopis*, Naum.; *glaucion*, Pall. (nec L.); *obsoleta*, Brm. — Europe, Asie et Afrique entre le 20° et le 56° latitude N., rarement plus au Nord.

3211. *Var.* INNOTATA (Salvad.), *Bull. Br. Orn. Club*, 1894, p. 2; id., *Ibis*, 1895, p. 136; id., *Cat.*, p. 350, pl. 4; *nyroca*, A. M.-Edw. (nec Güld.) — Madagascar.

11.608. AUSTRALIS (Eyt.), *Mon. Anat.*, p. 160; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 16; Schl., *l. c.*, p. 30; *baeri*, Rothsch. et Hart., *Zool. Res.* I, p. 684 (nec Radde). — Australie, Tasmanie, Nouv.-Zél., Nouv.-Guinée, Waigiou.

11.609. ERYTHROPHTHALMA (Max.), *Beitr.* IV, p. 929; Burm., *Syst. Uebers. Th. Bras.* III, p. 438; Salvad., *Ibis*, 1896, p. 99. — Brésil S. et central.

3212. *Var.* NATIONI (Scl. et Salv.), *P. Z. S.*, 1877, p. 522, 1878, p. 477, pl. 32; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 484. — Pérou.

3213. *Var.* BRUNNEA (Eyt.), *Mon. Anat.*, p. 161, pl. 23; Salvad., *Cat.*, p. 351; *capensis*, Cuv. (nec Gm.); Schl., *Mus. P.-B., Anseres*, p. 31; *mariloides*, Blyth (nec Yarr.); *meridionalis*, Hart. — Afrique S. jusqu'à l'Angola et le Choa.

11.610. VALLISNERIA (Wils.), *Am. Orn.* VIII, p. 108, pl. 70, f. 3; Audub., *B. Am.* VI, p. 299, pl. 395; *erythrocephala*, Licht. (nec Brm.); *valisneriana*, Schl., *l. c.*, p. 25. — Amérique septentrionale et centrale, de l'Alaska au Guatémala et Antilles.

## 1859. FULIGULA

*Fuligula*, Steph. (1824); *Fulix*, Sundev. (1836); *Marila*, Bp. (1856, nec Rchb., 1852); *Nettarion*, Baird (1858).

11.611. MARILA (Lin.); Dress., *l. c.* VI, p. 563, pl. 436; Dubois, *l. c.* II, p. 468, pl. 261; *frenata*, Sparrm.; *islandica*, *leuconotos*, Brm.; *gesneri*, Eyt.; *marina*, Sw.; *mariloides*, Vig.; *marila nearctica*, Stejn. — Europe, Asie, Amérique et Afrique du 20° au 70° latit. N.

3214. *Var.* AFFINIS, Eyt., *Mon. Anat.*, p. 157; Baird, *Birds N. Amer.*, p. 791; Schl., *l. c.*, p. 28; *marila* (pt.), auct. plur.; Audub., *B. Am.* VI, p. 316, pl. 397; *minor*, Bell; *marila americana*, Schl.; *mariloides*, auct. plur. (nec Vig.) — Amérique septentrionale et centrale du Guatémala et des Antilles au 70° latitude N.

Digitized by Google

11.612. CRISTATA (Leach), *Syst. Cat. M. and B. Br. Mus.*, p. 39; Dress., *l. c.*, VI, p. 573, pl. 457; Dubois, *l. c.* II, p. 465, pl. 260; *A. fuligula*, L.; ?*colymbis*, Pall.; *vulgaris*, Hodgs.; *patagiata*, Brm.; *latirostris*, Bp.; *arctica*, Degl. et G.; *linnei*, Malm. — Europe, Asie et Afrique du 10° au 70° l. N., Philippines, gr. îles de la Sonde, Mariannes et Pelew.

11.613. NOVÆ-ZEALANDIÆ (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 542; Gray, *Voy. Ereb. and Terr.*, *B.*, p. 16, pl. 18; Schl., *l. c.*, p. 29; Bull., *Hist. B. New Zeal.*, p. 259, pl. 27, f. 2; *atricilla*, Forst. — Nouvelle-Zélande.

11.614. COLLARIS (Donov.), *Brit. B.* VI, pl. 147; Schl., *l. c.*, p. 26; *fuligula*, Wils. (nec L.); *ruftorques*, Bp.; Audub., *B. Am.* VI, p. 320, pl. 398. — Amér. sept. et centr. jusqu'au Guatémala et les Antilles.

## 1860. TACHYERES

*Micropterus*, Less. (1828, nec Lacép., 1802); *Tachyeres*, Owen (1875).

11.615. CINEREUS (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 506; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1876, p. 402; *brachyptera*, Lath.; Quoy et Gaim., *Voy. Uran., Zool.*, p. 139, pl. 39; *patachonica*, King; *pteneros*, Forst.; *macropterus*, Gigl. — Du Chili à Magellan et îles Malouines.

## 1861. CLANGULA

*Clangula*, Leach (1819); *Glaucion*, Kp. (1829, nec Oken, 1816); *Bucephala*, Baird (1859); *Glaucionetta*, *Charitonetta*, Stejn. (1885).

11.616. GLAUCION (Lin.); Dress., *l. c.* VI, p. 595, pl. 440; Dubois, *l. c.* II, p. 482, pl. 264; *A. clangula*, L.; *peregrina*, S. Gm.; *melanocephala*, Herm. (nec Gm.); *hyemalis*, Pall. (nec L.); *chrysophthalmos*, Steph.; *vulgaris*, Flem.; *peregrina*, *leucomelas*, Brm. (1). — Europe et Asie du 30° au 71° l. N., Japon.

3215. *Var.* AMERICANA, Bp., *Comp. List*, p. 58; Baird, *B. N. Am.*, p. 796; *clangula* et *glaucion* (pt.), auct. plur. — Amérique septentrionale du 70° l. N. au Mexique et Cuba.

11.617. ISLANDICA (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 541; Dress., *l. c.* VI, p. 603, pl. 441; Dub., *l. c.* II, p. 486, pl. 265; *scapularis*, Brm.; *barrowi*, Sw. et Rich., *Faun. Bor.-Am.* II, p. 456, pl. 70. — Islande, Groenland, Amérique arctique, jusqu'au centre des États-Unis en hiver.

11.618. ALBEOLA (Lin.); Dress., *l. c.* VI, p. 589, pl. 439; Audub., *B. Am.* VI, p. 369, pl. 408; *bucephala*, *rustica*, Lin. — Amér. sept. de l'Alaska et du Labrador jusqu'au Mexique (accident. Europe).

(1) Hybrides : *anatarius*, Eimb.; *angustirostris*, Brm.; *mergoides*, Kjärb.; *mergiformis*, Cabot.

Digitized by Google

### 1862. HARELDA

*Harelda*, Steph. (1824); *Pagonetta*, Kp. (1829); *Crymonessa*, Macg. (1842); *Melonetta*, Sundev. (1872).

11.619. GLACIALIS (Lin.); Dress., *l. c.* VI, p. 617, pl. 445, 444; Dubois, *l. c.* II, p. 489, pl. 267; *hyemalis*, Lin.; *miclonia*, Bodd.; *brachyrhynchos*, Beseke; *leucocephala*, Bechst.; *longicauda*, Leach; *faberi*, etc., Brm. — Zone arctique jusqu'au Spitzberg et la Nouv.-Zemble, descend en hiver jusque vers le 40° l. N.

### 1863. HISTRIONICUS

*Histrionicus*, Less. (1828); *Cosmonessa* et *Cosmonetta*, Kp. (1829); *Phlyaconetta*, Brandt (1847); *Phylaconetta*, Baird (1858).

11.620. MINUTUS (Lin.); Dress., *B. of Eur.* VI, p. 613; *histrionica*, Lin.; Dubois, *Fne. Ill. Vert., Ois.* II, p. 488, pl. 266; *histrionis*, Midd.; *torquata*, Brm. — Islande (accid. Europe), Asie N.-E., Japon, Amér. arct. jusqu'au centre des Ét.-Unis.

### 1864. OEDEMIA

*Oidemia*, Flem. (1822); *Melanitta*, Boie (1822); *Ania*, Leach (1824); *Maceranas*, *Macrorhamphus*, Less. (1828); *Pelionetta*, Kp. (1829); *OEdemia*, Strickl. (1841); *Melanonetta*, Sundev. (1872).

11.621. NIGRA (Lin.); Dress., *l. c.* VI, p. 665, pl. 449; Dubois, *l. c.* II, p. 500, pl. 270; ?*cinerea*, S. Gm.; *cinerascens*, Bechst.; *atra*, Pall.; *nigripes*, etc., Brm. — Europe et Asie jusqu'au 74° l. N.; dépasse rarem. le 50° en hiv.

3216. *Var.* AMERICANA, Sw. et Rich., *Faun. Bor.-Am.* II, p. 450; Baird, *B. N. Amer.*, p. 807; *nigra* (pt.), auct. plur. (nec L.); Wils., *Am. Orn.* VIII, p. 133, pl. 72; *wilsoni*, Gieb.; *nigra, var. americana*, Ridgw. — Amérique septentrionale et N.-E. de l'Asie, en hiver jusqu'en Californie et le Japon.

11.622. FUSCA (Lin.); Dress., *l. c.* VI, p. 657, pl. 448; Dubois, *l. c.* II, p. 503, pl. 271; *notata*, Bodd.; *carbo*, Pall.; *fuliginosa*, Bechst.; *hornschuchii*, *megapus*, etc., Brm.; *lugubris*, C. Dub. — Europe et Sibérie W. jusqu'au Spitzberg et Nouv.-Zemble, au S. jusq. 40° en hiv.

3217. *Var.* DEGLANDI, Bonap., *Rev. crit.*, p. 108; *fusca*, auct. plur. (nec L.); *velvetina*, Cass.; Baird, *B. N. Am.*, p. 805; *bimaculata*, Bd. — Amérique septentrionale, en hiver jusqu'au 40° l. N.

3218. *Var.* STEJNEGERI, Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 112; Seeb., *B. Jap. Emp.*, p. 250; *fusca*, *deglandi*, *velvetina* (pt.), auct. plur.; *carbo*, Salvad., *Cat.*, p. 411 (nec Pall.) — Asie N.-E., en hiver Chine et Japon; ? Amérique N.-W.

11.623. PERSPICILLATA (Lin.); Dress., *l. c.*, p. 669, pl. 450; Dubois, *l. c.* II, p. 506, pl. 272; *latirostris*, Bodd.; *trowbridgii*, Baird, *B. N. Am.*, p. 806. — Amér. jusq. 70° l. N., en hiver jusqu'à la Jamaïque et la Basse Calif.; Asie N.-E. (accid. Eur. N.-W.)

Digitized by Google

## 1865. CAMPTOLÆMUS

*Kamptorhynchus*, Eyt. (1838, nec Cuv.); *Camptorhynchus*, Bp. (1838); *Camptolaimus*, Gray (1841); *Camptolæmus*, Licht. (1854).

11.624. LABRADORIUS (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 557; *labradora*, Lath.; Aud., *B. Am.* VI, p. 329, pl. 400; Schl., *l. c.*, p. 19; *grisea*, Leib. (*juv.*); *labradorica*, Hall. — Amér. N.-E., en hiver jusqu'à la Nouv.-Jersey et les grands lacs (*éteint*).

## 1866. SOMATERIA

*Somateria*, Leach (1819); *Ganza*, Merr. (1819); *Platypus* (pt.), Brm. (1824); *Macropus*, Nutt. (1834, nec Spix, 1824); *Polysticta*, Eyt. (1836); *Eniconetta*, Gray (1840); *Stelleria*, Bp. (1842); *Heniconetta*, Agass. (1846); *Erionetta*, Coues (1884).

11.625. MOLLISSIMA (Lin.); Dress., *l. c.* VI, p. 629, pl. 445; Dubois, *l. c.* II, p. 493, pl. 268; *septentrionalis*, Ger.; *cuthberti* (pt.), Pall.; *lanuginosus*, Leach; *danica*, etc., Brm.; *thulensis*, Malmgr. — Europe arct. et N.-W., en hiver jusque sur les côtes de Belgique et de France.

3219. ? *Var.* BOREALIS (Brm.), *Lehrb. eur. Vög.*, p. 813; *leisleri* et *planifrons*, Brm.; *mollissima* (pt.), auct. plur. (nec L.) — Amér. arct., Groenland, en hiver jusq. côtes N.-E. des Ét.-Unis.

3220. *Var.* DRESSERI, Sharpe, *Ann. and Mag. N. H.*, 1877, p. 51, f. 2 (tête); Dress., *l. c.* VI, p. 642, f. 2 (tête); Coues, *B. N.-West*, p. 580; Salvad., *Cat.*, p. 424; *mollissima* (pt.), auct. plur. — Amérique N.-E., en hiver les côtes orientales des États-Unis et les grands lacs.

11.626. V-NIGRA, Gray, *P. Z. S.*, 1855, p. 212, pl. 107; Baird, *B. N. Am.*, p. 810; Ell., *Ill. Am. B.*, pl. 48; *cuthberti* (part.), Pall.; *mollissima*, Tacz. (nec L.) — Amérique N.-W., Asie N.-E.

11.627. SPECTABILIS (Lin.); Dress., *l. c.* VI, p. 643, pl. 446; Dubois, *l. c.* II, p. 499, pl. 269; *beringii*, Gm.; *megarhynchus*, etc., Brm.; *superba*, Leach. — Europe arct. W. et acc. Europe N.-W.; Amér. arct., en hiv. jusqu'aux gr. lacs.

11.628. STELLERI (Pall.), *Spic. Zool.*, fasc. VI, p. 35, pl. 5; id., *Zoogr.* II, p. 258, pl. 68; Dress., *l. c.* VI, p. 649, pl. 447; *dispar*, Sparrm.; *occidua*, Bonn. — Zone arct. et subarct.: Alaska, Groenland, Islande, Norwège jusq. Kamtschatka.

## 1867. LAMPRONETTA

*Lampronetta*, Brandt (1849); *Arctonetta*, Gray (1855).

1.629. FISCHERI, Brandt, *Mém. Acad. St-Pétersb.*, 1849, pp. 6, 10, 14, pl. 1, ff. 1-4; Gray, *P. Z. S.*, 1855, p. 211, pl. 108; Baird, *B. N. Am.*, p. 805. — Côtes de l'Alaska, mer de Behring, Asie N.-E. jusqu'au Delta de la Lena.

Digitized by Google

## SUBF. IX. — ERISMATURINÆ

### 1868. THALASSIORNIS

*Thalassornis*, Eyt. (1838); *Thalassiornis*, Gray (1844).

11.630. LEUCONOTA (Smith), *Cat. S. Afr. Mus.*, p. 37; Eyt., *Mon. Anat.*, p. 168; Gray, *Gen. B.* III, pl. 169, f. 1; Smith, *Ill. S. Afr. Zool.*, pl. 107; *brevipennis*, Licht. — Afrique S. jusqu'au Loango à l'Ouest et le Choa à l'Est.

3221. *Var.* INSULARIS, Richm., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1897, p. 678; *leuconotus* (pt.), auct. plur. (nec Smith). — Madagascar.

### 1869. NOMONYX

*Nomonyx*, Ridgw. (1880).

11.631. DOMINICUS (Lin.); *Pl. Enl.* 967, 968; Burm., *Th. Bras.* III, p. 459; Baird, *B. N. Am.*, pp. 811, 925; id., ed. 1860, pl. 92; Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1880, p. 15; *spinosa*, Gm.; *ortygoides*, Gosse, *B. Jam.*, p. 406. — Amér. trop., Antilles, au S. jusqu'au Chili et l'Argentine (accidentellement États-Unis E.)

### 1870. ERISMATURA

*Oxyura*, Bp. (1828, nec Sw., 1827); *Erismatura*, Bonap. (1852); *Cerconectes*, Wagl. (1852); *Gymnura*, Nutt. (1834); *Undina*, Gould (1837); *Bythonessa*, Glog. (1842).

11.632. LEUCOCEPHALA (Scop.), *Ann. I. Hist. Nat.*, p. 65; Savig., *Descr. de l'Égypte*, I, 4, p. 315, pl. 10, f. 2; Shell., *B. of Eg.*, p. 291, pl. 12; *mersa*, Pall.; *hyberna*, Ger.; *ruthenica*, Holl.; *unifasciata*, Eyt., *Mon. Anat.*, pl. 24, f. 1. — Afrique N., Europe S. jusqu'au Turkestan, le S. de la Sibérie et le N.-W. de l'Inde.

11.633. JAMAICENSIS (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 519; *rubida*, Wils., *Am. Orn.* VIII, p. 128, pl. 71, ff. 5, 6; Audub., *B. Am.* VI, p. 324, pl. 399; Schl., *l. c.*, p. 11; *ferruginea*, Frantz. — Amérique septentr., de la baie d'Hudson jusqu'à la Colombie et Antilles.

11.634. MACCOA (Smith), *Cat. S. Afr. Mus.*, p. 37; id., *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 108, 109; Eyt., *Mon. Anat.*, p. 169; Schl., *l. c.*, p. 10; *africana*, Rchb. — Afrique S., à l'E. jusqu'au Choa.

11.635. FERRUGINEA, Eyt., *Mon. Anat.*, p. 170; Gray, *Gen. B.* III, pl. 169; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 484. — Bolivie, Pérou.

3222. *Var.* ÆQUATORIALIS, Salvad., *Cat. B. Br. Mus.* XXVII, p. 450. — Ecuador.

3223. *Var.* VITTATA, Phil., *Arch. f. Naturg.*, 1860, 1, p. 26; Salvad., *l. c.*, p. 450; *ferruginea*, auct. plur. (nec Eyt.); Scl., *Argent. Orn.* II, p. 138; *cyanorhyncha*, Licht. — Chili, Uruguay, Argentine, Patagonie.

Digitized by Google

11.636. AUSTRALIS, Gould, *P. Z. S.*, 1836, p. 85; id., *B. Austr.* VII, pl. 17; Eyt., *Mon. Anat.*, p. 172; Schl., *l. c.*, p. 11. — Australie S. et W., Tasmanie.

### 1871. BIZIURA

*Biziura*, Steph. (1824); *Hydrobates*, Tem. (1826).

11.637. LOBATA (Shaw), *Nat. Misc.* VIII, pl. 255; Tem., *Pl. Col.* 406; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 18; *carunculata*, Vieill.; *novæ-hollandiæ*, Steph. — Australie, Tasmanie.

## SUBF. X. — MERGANETTINÆ

### 1872. SALVADORINA

*Salvadorina*, Rothsch. et Hart. (1894).

11.638. WAIGIUENSIS, Rothsch. et Hart., *Novit. Zool.* I, p. 683, II, p. 22, pl. 3; Salvad., *Cat.*, p. 454. — Waigiou.

### 1873. HYMENOLÆMUS

*Malacorhynchus*, Wagl. (1832, nec Sw., 1831); *Hymenolaimus*, Gray (1843); *Hymenolæmus*, Agass. (1846).

11.639. MALACORHYNCHUS (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 526; Gray, *Ann. and Mag. N. H.*, 1843, p. 370; id., *Gen. B.* III, pl. 168; Bull., *B. New Zeal.*, ed. 2, p. 276, pl. 45; *forsterorum*, Wagl. — Nouvelle-Zélande.

### 1874. MERGANETTA

*Merganetta*, Gould (1841); *Raphipterus*, Gay (1844).

11.640. ARMATA, Gould, *P. Z. S.*, 1841, p. 95; Gray, *Gen. B.* III, pl. 170 (mas.); Des M., *Icon. Orn.*, pl. 48 (fem.); *chilensis*, Gay; Des M., *l. c.*, pl. 5 (mas.) — Chili (Andes).

3224. *Var.* FRÆNATA, Salvad., *Cat. B.* XXVII, p. 458, pl. 5. — Chili central.

11.641. TURNERI, Sclat. et Salv., *P. Z. S.*, 1869, p. 600; id., *Exot. Orn.*, p. 199, pl. 100. — Andes du S. du Pérou.

11.642. GARLEPPI, Berl., *Orn. Monatsb.*, 1894 p. 110; Salvad., *l. c.*, p. 460; *leucogenys* (pt.), Rchw. (1882). — Bolivie et Tucuman (Andes).

11.643. LEUCOGENYS (Tsch.), *Arch. f. Nat.*, 1843, 1, p. 390, 1844, 1, p. 316; id., *Faun. Per.*, pp. 53, 311, pl. 36; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 486; *armata* (pt.), auct. plur. — Pérou (Andes).

11.644. COLUMBIANA, Des Murs, *Rev. Zool.*, 1845, p. 179; id., *Icon. Orn.*, pl. 6; Salvad., *Cat.*, p. 462; *armata* et *leucogenys* (pt.), auct. plur. — Vénézuéla, Colombie, Ecuador (Andes).

Digitized by Google

## SUBF. XI. — MERGINÆ

### 1875. MERGUS

*Mergus*, Lin. (1766); *Mergellus*, Selby (1840).

11.645. ALBELLUS, Lin.; Dress., *B. Eur.* VI, p. 699, pl. 454, 455; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 509, pl. 273; *glacialis*, Brünn.; *minutus*, Lin.; *albulus, pannonicus*, Scop.; *cinereus, minor*, Ger.; *furcifer*, Bes.; *mustelinus, panocicus, maculatus*, Bechst. — Europe et Asie jusq. cercle polaire, au S., en hiver, jusq. 30° l. N., Afr. N., Japon (accid. Amér. sept.)

### 1876. LOPHODYTES

*Lophodytes*, Rchb. (1852).

11.646. CUCULLATUS (Lin.); Audub., *B. N. Am.* VI, p. 402, pl. 413; Schl., *l. c.*, p. 5; Baird, *B. N. Am.*, p. 816; Gould, *B. Gr. Brit.* V, pl. 36; *fuscus*, Steph. — Amér. sept., du Groenland et de l'Alaska au Mexique et Cuba (acc. Europe occid.)

### 1877. MERGANSER

*Merganser*, Briss. (1760); *Mergus* (pt.), auct. plur.; *Prister*, Heine (1890).

11.647. CASTOR (Lin.); Schaeff., *Mus. Orn.*, p. 67; *merganser*, Lin.; Dress., *B. Eur.* VI, p. 685, pl. 452; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 513, pl. 274; *gulo*, Scop.; *asiaticus*, S. Gm.; *rubricapillus*, Gm.; *raucedula, æthiops*, Schaeff.; *raii*, Leach; *orientalis*, Gould (pt.); *aldrovandi*, Rchb.; *major*, C. F. Dub.; *pusillus*, Eyt. — Europe et Asie jusqu'au 70° latit. N.; en hiver dans le S. de l'Europe, en Chine et au Japon.

3225. *Var.* COMATA, Salvad., *Cat. B.*, p. 475; *serrator*, Hodgs. (nec L.); *orientalis* (pt.), Gould; *castor* et *merganser* (pt.), auct. plur. (nec L.); Hume et Marsh., *Game B. of Ind.* III, p. 299, pl. 40. — Asie centrale, Himalaya jusqu'à l'Assam, Mongolie W.

3226. *Var.* AMERICANA (Cass.), *Pr. Ac. Philad.*, 1853, p. 187; Baird, *B. N. Am.*, p. 813; Stejn., *Orn. Expl. Kamtsch.*, p. 177; *merganser*, Wils. (nec L.); Audub., *B. Am.* VI, p. 387, pl. 411; *castor*, Bp. (nec L.) — Amérique septentrionale jusqu'au 70° latitude N., en hiver jusqu'au 30° (accid. Bermudes).

11.648. SQUAMATUS (Gould), *P. Z. S.*, 1864, p. 184; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 511; Salvad., *Cat.*, p. 478; Grant, *Ibis*, 1900, p. 602, pl. 12. — Chine S.

11.649. SERRATOR (Lin.); Dress., *l. c.* VI, p. 695, pl. 453; Dubois, *l. c.* II, p. 518, pl. 275; *leucomelas, niger*, Gm.; *cristatus*, Leach (ex Briss.) — Europe, Asie, Amér. du 70° au 33° l. N. (accid. Afrique N.)



Digitized by Google

11.650. AUSTRALIS (Hombr. et Jacq.), *Ann. Sc. Nat.*, 1841, p. 320; id., *Voy. Pôle S.*, *Ois.*, pl. 31, f. 2; Bull., *Hist. B. New-Zeal.*, ed. 2, II, p. 279; *aucklandica* (pt.), Gray. — Iles Auckland.

11.651. BRASILIANUS (Vieill.), *Gal. Ois.* II, p. 209, pl. 283; Burm., *Th. Bras.* III, p. 441; *octosetaceus* et *octosetælus*, Vieill.; *lophotes*, Cuv. — Brésil S.-E.

# ORD. XV. — STEGANOPODES (1)

## FAM. I. — PHAËTHONTIDÆ

### 1878. PHAËTON

*Phaëton*, Lin. (1766); *Phaëthon*, Illig. (1811); *Tropicophilus*, Steph. (1826); *Phœnicurus*, Bp. (1855).

11.652. RUBRICAUDA, Bodd., *Tabl.*, p. 57; *Pl. Enl.* 979; Schl., *Mus. P.-B.*, *Pelec.*, p. 44; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 1472; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag.*, *Ois.*, p. 697, pl. 281, 281ᵃ; *phœnicurus*, Gm.; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 199, pl. 279; *melanorhynchus*, Gm.; *æthereus*, auct. plur. (nec L.); *novæ-hollandiæ*, Brandt; *candidus*, Verr.; *rubricaudatus*, Fsch. et Hartl. — La partie tropicale du Pacifique et Océan Indien.

3227. *Var.* ERUBESCENS, Banks, *Icon. ined.*, pl. 31; Rothsch., *Avif. Lays.*, part. III, p. 296. — Iles Kermadek, Norfolk, Lord Howe.

11.653. LEPTURUS, Lacép. et Daud., in *Buff. Hist. Nat.* XVI (1799), p. 280; *candidus*, Tem., *Man. d'Orn.* I, p. 112 (1820); Gray, *Gen. B.* III, pl. 183; M.-Edw. et Grand., *H. Madag.*, *Ois.*, p. 699, pl. 279, 280; *albus*, Schinz; *flavirostris*, *edwardsii*, Brandt; *leucurus*, Dub., *Ois. Eur.* II, p. et pl. 155ᵇ. — Zone tropicale des océans Atlantique, Indien et Pacifique.

3228. *Var.* AMERICANA, Grant, *Bull. B. O. Club*, 1897, p. 23; id., *Cat.*, p. 456; *æthereus*, Audub., *B. Am.* VII, p. 223, pl. 427; *flavirostris*, auct. plur. (nec Brandt). — Côte E. de l'Amérique septentrionale, des Bermudes aux Antilles.

11.654. FULVUS, Brandt, *Mém. Acad. St.-Pétersb.* V, 2, 1840, p. 269; Grant, *l. c.*, p. 455; *flavirostris*, Rchb.; *flavo-aurantius*, Lawr., *Ann. Lyc. N. York*, 1862, p. 142. — Ile Christmas, Océan Indien.

11.655. ÆTHEREUS, Lin.; Brandt, *Mém. Acad. St.-Pét.* V, 2, 1840, p. 257, pl. 2; Schl., *l. c.*, p. 43; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 436; *catesbyi*, Brandt, *l. c.*, p. 270. — Partie tropicale des océans Pacifique et Atlantique.

(1) Voy.: Ogilvie-Grant, *Catalogue of Birds Brit. Mus.* XXVI, pp. 330-483 (1898).

Digitized by Google

11.656. INDICUS, Hume, *Str. F.*, 1876, p. 481; Legge, *B. Ceyl.* III, p. 1173; Grant, *l. c.*, p. 439, pl. 6; *æthereus*, auct. plur. (nec L.); *rubricauda*, Blanf. (nec Bodd.) — Océan Indien.

## FAM. II. — PELECANIDÆ (1)

### 1879. PELECANUS

*Pelecanus*, Lin. (1735); *Onocrotalus*, Briss. (1766); *Cyrtopelicanus*, *Leptopelicanus* et *Catoptropelicanus*, Rchb. (1853).

11.657. ONOCROTALUS, Gm., *S. N.* I, 2, p. 569; Dress., *B. Eur.* VI, p. 193, pl. 393; Dub., *Ois. Eur.* II, p. et pl. 157 et 157*; *brissonii*, Childr.; *phœnix*, Less.; *longirostris*, Hume. — Europe, Afrique N., Asie S.-W. jusqu'au N.-W. de l'Inde.

3229. *Var.* ROSEA (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 570; Grant, *l. c.*, p. 466; *manillensis*, Gm.; *javanicus*, Horsf.; *minor*, Rüpp.; id., *Vög. N.-O. Afr.*, p. 132, pl. 49; *mitratus*, Licht.; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 531; *calirhynchus*, Hodgs.; *onocrotalus* (pt.), auct. plur.; *pygmæus*, Brm.; *megalophus*, Heugl.; *onocrotalus var. minor*, A. Dub., *Consp. Av. Eur.*, p. 31, n° 499; *rufescens*, Pelz. (nec Gm.) — Inde, Chine, Indo-Chine, Java, Bornéo, Sumatra, Philippines, Afrique (accidentellement Europe S.-E.)

3230. *Var.* SHARPEI, Barb., *P. Z. S.*, 1870, pp. 173, 409; Sclat., *P. Z. S.*, 1871, pl. 51; Dub., *Bull. Mus. R. H. N. Belg.*, 1883, p. 8; ?*giganteus*, A.-E. Brm., *J. f. O.*, 1855, p. 94. — Angola, Congo Indépendant.

11.658. CRISPUS, Bruch, *Isis*, 1832, p. 1109; Wern., *Atl. Ois. d'Eur.*, pl. 86; Dress., *l. c.* VI, p. 199, pl. 394; Dub., *Ois. Eur.* II, p. et pl. 158; *onocrotalus*, Pall. (nec L.); *patagiatus*, Brm.; *orientalis*, Wright. — Europe S.-E. jusqu'au N.-W. de l'Inde, la Mongolie et la Chine.

11.659. PHILIPPENSIS, Gmel., *S. N.* I, 2, p. 571; Schl., *l. c.*, p. 33; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 531; *gangeticus*, Hodgs.; id., *Icon. ined.*, pl. 149; *brevirostris*, Bp.; *philippinensis*, Blyth et Wald.; *manillensis*, Oat. (nec Gm.); *rufescens* (pt.), Hume (nec Gm.) — Inde, Ceylan, Chine Indo-Chine, Malacca, Haïnan, Philippines.

3231. *Var.* RUFESCENS, Gm., *S. N.* I, 2, p. 571; Cretzschm., in *Rüpp. Atl.* II, p. 31, pl. 21; Heugl., *Orn.*, *N.-O. Afr.*, p. 1503; *cristatus*, Less.; *phœospilus*, Wagl.; *philippensis* (pt.), Schl.; *philippensis var. rufescens*, A. Dub., *Bull. Mus. H. N. Belg.*, 1883, p. 9. — Afrique tropicale, Madagascar.

(1) Voy. aussi : A. Dubois, *Remarques sur les Oiseaux du genre Pélican* (*Bull. Mus. R. H. N. Belg.*, 1883, pp. 1-11.

Digitized by Google

11.660. ERYTHRORHYNCHUS, Gm., *S. N.* I, 2, p. 571; Baird, *B. N. Am.*, p. 868; Schl., *l. c.*, p. 55; *onocrotalus*, Forst. (nec L.); *trachyrhynchus*, Lath.; *hernandezii*, Wagl.; *americanus*, Audub., *Orn. Biogr.* IV, p. 88, pl. 311; id., *B. Am.* VII, pp. 20, 179, pl. 422; *brachydactylus*, Licht.; *occipitalis*, Ridgw. — Amérique du Nord jusqu'au 50° latit. N., en hiver l'Amérique centrale.

11.661. CONSPICILLATUS, Tem., *Pl. Col.* 276; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 74; *australis*, Steph. — Australie, Tasmanie, Nouvelle-Guinée.

11.662. FUSCUS, Gm., *S. N.* I, 2, p. 570; Audub., *B. Am.* VII, pp. 52, 191, pl. 425, 424; Schl., *l. c.*, p. 28; *carolinensis*, Gm.; *occidentalis*, Richm., *Auk*, 1899, p. 178. — Côtes du golfe du Mexique et Antilles.

3232. *Var.* CALIFORNICUS, Ridgw., *Auk*, 1886, p. 267; Grant, *l. c.*, p. 478; *fuscus* (pt.), auct. plur. — États-Unis W., Amérique centr. jusqu'à Panama, Galapagos.

3233. *Var.* MOLINÆ, Gray, *List of Birds*, pt. III, p. 189; Scl., *P. Z. S.*, 1868, p. 269; Ell., *P. Z. S.*, 1869, p. 588, pl. 44; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 424; *thagus*, auct. plur. (nec Mol.); Grant, *Cat.*, p. 480, pl. 5[b] (1); *barbieri*, Oust., *Bull. Soc. Phil.*, 1878, p. 208; *fuscus, var. molinæ*, A. Dub., *l. c.*, p. 11. — Chili, Pérou, Îles Galapagos.

## FAM. III. — PHALACROCORACIDÆ

### SUBF. I. — PHALACROCORACINÆ

#### 1880. PHALACROCORAX

*Phalacrocorax*, Briss. (1760); *Carbo*, Lacép. (1801); *Halieus*, Ill. (1811); *Gulosus*, Mont. (1813); *Carbonarius*, Rafin. (1815); *Hydrocorax*, Vieill. (1816, nec Briss., 1760); *Cormoranus*, Baill. (1833); *Graucalus*, Gray (1841, nec Cuv., 1817); *Gracalus*, Gray (1845); *Graculus*, *Hypoleucus*, Rchb. (1850-52); *Stictocarbo*, *Urile*, *Leucocarbo*, *Microcarbo*, Bp. (1855); *Halietor*, Heine (1860); *Melanocarbo*, Bernst. (1883); *Compsohalieus*, Ridgw. (1884); *Gripeus*, *Enygrothreres*, Heine (1890).

11.663. CARBO (Lin.); Dress., *B. Eur.* VI, p. 151, pl. 388; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 529, pl. 277; *vulgaris*, Lacép.; *sinensis*, Shaw et Nod.; *cormora-* — Europe, Islande, Asie jusqu'au delà du 60° l. N., Groenland,

(1) C'est bien à tort que certains auteurs ont adopté pour ce Pélican la dénomination de *thagus*, car l'oiseau décrit sous ce nom par Molina est évidemment un oiseau imaginaire, puisque Molina dit « que le corps n'est pas plus grand que celui d'une Bécasse, les pieds hauts de 22 pouces, la poche gulaire couverte de fines plumes grises, et que les bords des mandibules sont dentelés dans toute leur étendue. » — Comme on le voit, ces caractères ne peuvent se rapporter au Pélican qui nous occupe.

Digitized by Google

*nus*, Mey. et W.; *crassirostris*, Baill.; *gracilis*, *leucogaster*, Meyen; *medius*, Nilss.; *albiventris*, Tick.; *leucocephala*, *raptensis*, Hodgs.; *americanus*, Rchb.; *flavirostris*, *major*, Ellm.; *nudigula*, Brandt; *continentalis*, Severtz. — Amérique N.-E., Afrique.

3234. *Var.* NOVÆ-HOLLANDIÆ, Steph., in *Shaw*, *Gen. Zool.* XIII, 1, p. 95; Bull., *B. N. Zeal.*, ed. 2, II, p. 145; *carboides*, Gould; id., *B. Austr.* VII, pl. 66. — Australie, Tasmanie, Nouvelle-Zélande.

11.664. FILAMENTOSUS (Tem. et Schl.), *Faun. Jap.*, p. 129; Swinh., *Ibis*, 1861, p. 264; *capillatus*, Tem. et Schl., *l. c.*, pl. 83 et 83b. — Sibérie orient., Chine, Japon.

11.665. LUCIDUS (Licht.), *Verz. Doubl.*, p. 86; Schl., *Mus. P.-B.*, *Pelec.*, p. 12; *melanogaster*, Cuv.; *macrorhynchos*, Less.; *lugubris*, Rüpp., *Vög. N.-O. Afr.*, pp. 134, 140, pl. 50; *lalandii*, Pucher.; *gutturalis*, Rchw., *J. f. O.*, 1892, pp. 5, 133. — Afrique tropicale, îles du Cap Vert.

11.666. CAPENSIS (Sparrm.), *Mus. Carls.* III, pl. 61; Schl., *l. c.*, p. 19; *cristatus*, Puch. (nec Gm.); *tenuirostris*, Tem. et S. — Arique S. jusqu'au Natal et le Bas-Congo.

11.667. NIGROGULARIS, Grant et Forb., *Bull. Liverp. Mus.* II, p. 3. — Socotra.

11.668. GAIMARDI (Garn.), *Voy. Coq.*, p. 601, pl. 48; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 431; *cirriger*, King. — Amérique S.-W. du Pérou à Magellan.

11.669. PUNCTATUS (Sparrm.), *Mus. Carls.* I, pl. 10; Bull., *B. N. Zeal.*, ed. 2, II, p. 164, pl. 39, f. 1; Schl., *l. c.*, p. 21; *nævius*, Gm.; *dilophus*, Vieill.; *cirrhatus*, Ellm. — Nouvelle-Zélande.

11.670. FEATHERSTONI, Bull., *Ibis*, 1873, p. 90; id., *B. N. Zeal.*, ed. 2, II, p. 166, pl. 39, f. 2; *africanus*, Hutt. (nec Gm.) — Iles Chatham.

11.671. PERSPICILLATUS, Pall., *Zoogr. Rosso-As.* II, p. 305; Gould, *Zool. Voy. Sulph.*, p. 49, pl. 32; Schl., *l. c.*, p. 17; *urile* (pt.), Gm. et auct. plur. — Ile Behring (éteint).

11.672. BICRISTATUS, Pall., *Zoogr.* II, p. 301, pl. 75; *urile* (pt.), Gm. et auct. plur.; *violaceus*, Gm. (nec Penn.?); Tacz., *Bull. Soc. Zool. Fr.*, 1883, p. 342. — Sibérie orient., Kamtschatka, îles Kouriles, Alaska.

11.673. PELAGICUS, Pall., *Zoogr.* II, p. 303, pl. 76; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 333; *violaceus*, Rchb. et auct. plur. (nec Gm.); Schl., *l. c.*, p. 17; *bicristatus*, Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 130, pl. 84 et 84b (nec Pall.); *œolus*, Swinh. — Kamtschatka, îles Aléoutes, Kouriles, Japon N., Chine.

3235. *Var.* ROBUSTA, Bd., Br. et Ridgw., *Water-B. N. Am.* II, p. 160; *violaceus* et *pelagicus* (pt.), auct. plur.; ?*leucurus*, Audub. — Amérique N.-W., de l'Alaska à l'État de Washington.

3236. *Var.* RESPLENDENS, Aud., *Orn. Biog.* V, p. 148, — Amérique N.-W. de

Digitized by Google

pl. 412, f. 1; Bd., Br. et Ridgw., *Water-B. N. Am.* II, p. 160; *bairdi*, Coop., *Pr. Ac. Phil.*, 1863, p. 5; Ell., *B. N. Am.* II, pl. 49. — l'État de Washington au Mexique W.

11.674. PENICILLATUS (Brandt), *Bull. Acad. St.-Pétersb.*, III, p. 55; Heerm., *P. Ac. Phil.*, 1854, p. 178; *townsendi*, Aud., *Orn. Biog.* V, p. 150, pl. 412, f. 2; id., *B. N. Am.* VII, p. 149, pl. 418. — Amérique N.-W. de la Colombie britannique à la Californie.

11.675. GRACULUS (Lin.); Dress., *B. Eur.* VI, p. 165, pl. 389; Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* II, p. 535, pl. 278; *cristatus*, Gm.; *brachyuros*, Brm.; *linnæi*, Gray. — Europe W. (côtes), de la Laponie russe et cap N. au Portugal, îles Britanniques, Foeroé et Islande.

3237. *Var.* DESMARESTI, Payraud., *Ann. Sc. Nat.* VIII, 1826, p. 464; Gould, *B. Eur.* V, pl. 411; *graculus*, *cristatus* (pt.), auct. plur.; *leucogaster*, Cara, Glog. (nec Vieill.); *croaticus*, Brus., *Orn. Jahrb.*, 1891, p. 22. — Côtes et îles de la Méditerranée et des mers Noire et Caspienne.

11.676. CHALCONOTUS (Gray), *Voy. Ereb. and Terr.*, *B.*, p. 20, pl. 21; Bull., *B. N. Zeal.*, ed. 2, II, p. 162; ?*ater*, Less.; *glaucus*, Rchb.; Jacq. et Puch., *Voy. Pôle S.*, *Zool.* III, p. 127, *Atl.*, pl. 31, f. 1. — Nouvelle-Zélande.

11.677. AURITUS (Less.), *Traité d'Orn.*, p. 605; Grant, *Cat.*, p. 370; *dilophus*, Vieill. (1825, nec V., 1817), *Gal. Ois.* II, pl. 275 (nec descr.); Aud., *B. Am.* VII, p. 134, pl. 416; *floridanus*, Aud., *Orn. Biog.* III, p. 387, pl. 252; *brasiliensis*, Bp. (nec Gm.) — Amérique N.-E. du Labrador à la Floride, à l'Ouest jusqu'au Texas, Amérique centrale, Antilles.

3238. *Var.* CINCINATA (Brandt), *Bull. Ac. St.-Pét.*, 1837, p. 55; Baird, *B. N. Am.*, p. 877; Schl., *l. c.*, p. 22; Ell., *B. N. Am.* II, pl. 51; *dilophus* (pt.), auct. plur.; *albociliatus*, Ridgw. — Amérique N.-W., de l'Alaska au Mexique W., îles Aléoutes.

11.678. NEGLECTUS (Wahlb.), *J. f. O.*, 1857, p. 4; Sharpe, in *Lay. B. S. Afr.*, p. 779. — Afrique S.

11.679. FUSCICOLLIS, Steph., *Gen. Zool.* XIII, 1, p. 91; Legge, *B. Ceyl.* III, p. 1182; *leucotis*, Blyth; *sinensis*, Blyth; Jerd., *B. Ind.* II, p. 862; *egretta*, Bp. — Inde, Ceylan, Indo-Chine.

11.680. SULCIROSTRIS (Brandt), *Bull. Ac. St.-Pét.*, 1837, p. 56; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 67; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 408; *purpuragula*, Peale; *stictocephalus*, Bp. — Australie, Nouvelle-Zélande, archipel Austro-Malais jusqu'au S. de Bornéo.

11.681. VIGUA (Vieill.), *N. Dict.* VIII, p. 90; Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.*, 1889, p. 138; *graculus*, Tem. (nec L.); *brasilianus*, Licht.; Spix, *Av. Bras.* II, p. 83, pl. 106; Schl., *l. c.*, p. 22; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 429; Scl. et Huds., *Arg. Orn.* II, p. 91; *niger*, King; *mystacalis*, Less.; *magellanicus*, Rchb. — Côtes de l'Amérique méridionale et centrale, au nord jusqu'au Texas.

11.682. MEXICANUS (Brandt), *Bull. Acad. St.-Pét.*, 1837, — Vallée du Bas-Missis-

Digitized by Google

p. 56; Baird, *B. N. Am.*, p. 879; *graculus*, D'Orb. (nec L.); *resplendens* et *townsendi*, Lemb. (nec Aud.); *lacustris*, Gundl. — sipi jusqu'au Mexique occid., Guatémala, Nicaragua.

11.683. CARUNCULATUS (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 576; Forst., *Icon. ined.*, pl. 104; Bull., *Tr. N. Zeal. Inst.* IX, p. 338, pl. 15, f. 2; *purpurascens*, Brandt; *cirrhatus*, Gr. (nec Gm.) — Nouvelle-Zélande (Détroit de la reine Charlotte).

11.684. ONSLOWI, Forb., *Ibis*, 1893, p. 533; Grant, *Cat.*, p. 385; *carunculatus*, Hutt. (nec Gm.); *cirrhatus*, Bull. (nec Gm.); *imperialis*, Bull., *B. N. Zeal.*, ed. 2, II, p. 153, pl. 38, f. 2 (nec King). — Iles Chatham.

11.685. STEWARTI, Grant, *Cat. B.* XXVI, p. 385, pl. 5[a]; *cirrhatus* (pt.), auct. plur.; *carunculatus* et *colensoi* (pt.), Bull. — Nouvelle-Zélande, île Sud, île Stewart.

11.686. COLENSOI, Bull., *B. N. Zeal.*, ed. 2, II, p. 160; Forb., *Ibis*, 1893, pp. 538-40; Grant, *l. c.*, p. 386; *rothschildi*, Forb. — Ile Auckland.

11.687. CAMPBELLI (Filhol), *Bull. Soc. Philom.*, 1878, p. 132; Grant, *l. c.*, p. 387; *magellanicus*, Hutt. (nec Gm.); *nycthemerus*, Bp. (*descr. nulla*). — Ile Campbell.

11.688. BOUGAINVILLEI (Less.), *Voy. Thét. et de l'Espér.* II, p. 331; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 430; *albigula*, Brandt; *atriceps*, Cass. (nec King). — Pérou, Chili.

11.689. MAGELLANICUS (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 576; Forst., *Icon. ined.*, pl. 105; Hombr. et Jacq., *Voy. Pôle S.*, *Ois.*, pl. 31[bis]; *leucogaster*, Vieill.; *sarmientonus*, *erythrops*, King; *leucotis*, Less.; *mentalis*, Bp.; *penicillatus*, Schl. (pt.) — Sud de l'Amérique méridionale et îles Malouines.

11.690. ATRICEPS, King, *Zool. Journ.*, 1828, p. 102; Grant, *Cat.*, p. 390, f. 5 (tête); *imperialis*, King; Scl. et Salv., *Voy. Chall.*, *Zool.*, pt. VIII, p. 120, pl. 23, f. 1; *carunculatus*, Gould (nec Gm.); Schl., *l. c.*, p. 20; *cirrhatus*, Gray; *elegans*, Phil. — Amérique méridionale S.-W.

3239. *Var.* TRAVERSI, Rothsch., *Ibis*, 1899, p. 302. — Iles Macquaries.

3240. *Var.* VERRUCOSA (Cab.), *J. f. O.*, 1875, p. 540, 1876, pl. 1, f. 1; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1878, p. 652; id., *Voy. Chall.*, *Zool.*, pt. VIII, p. 122, pl. 26; *carunculatus*, Coues et Kid. (nec Gm.) — Iles Kerguelen.

3241. *Var.* ALBIVENTRIS (Less.), *Traité d'Orn.*, p. 604; Scl. et Salv., *Voy. Chall.*, *Zool.*, pt. VIII, p. 157, pl. 25, f. 2; *cirrhatus*, Gray (nec Gm.); *purpurascens*, Bp.; *carunculatus*, auct. plur. (nec Gm.); *verrucosus*, Burm. (nec Cab.) — Magellan, îles Malouines.

11.691. ?EUMEGETHES, Phil., *Arch. f. Naturg.*, 1899, p. 173. — Chili.

Digitized by Google

11.692. ?PROMAUCANUS, Phil., *Arch. f. Naturg.*, 1899, p. 173. — Chili.

11.693. VARIUS (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 576; Bull., *B. N. Zeal.*, ed. 2, II, p. 149, pl. 38; Schl., *l. c.*, p. 20; *fuscescens*, Vieill.; *pica*, Forst., *Icon. ined.*, pl. 106; *fucosus*, Peale; *hypoleucus*, Cass. (nec Brandt); *leucogaster*, Cass. (nec Vieill.); ? *huttoni*, Bull. — Nouvelle-Zélande.

11.694. HYPOLEUCUS (Brandt), *Bull. Ac. St.-Pét.*, 1837, p. 55; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 68; Grant, *Cat.*, p. 397, f. 9 (tête); *varius*, auct. plur. (nec Gm.) — Australie W.

3242. *Var.* GOULDI (Salvad.), *Orn. Pap.* III, p. 413; Grant, *Cat.*, p. 396, f. 8 (tête); *leucogaster*, Gould et auct. plur. (nec Vieill.); Gould, *B. Austr.* VII, pl. 69; Schl., *l. c.*, p. 20. — Australie E. et S., Tasmanie, archipel de Louisiade.

11.695. MELANOLEUCUS (Vieill.), *N. Dict.* VIII, p. 88; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 70; Schl., *l. c.*, p. 15; *dimidiatus*, Less.; *flavirhynchus*, Gould; *flavirostris*, Gray; *melanurus*, Bernst. — Australie, Nouv.-Zélande, Nouv.-Guinée, Moluques, petites îles de la Sonde.

11.696. BREVIROSTRIS, Gould, *P. Z. S.*, 1837, p. 26; Bull., *Man. B. N. Zeal.*, p. 94, pl. 34, f. 2; *melanoleucus*, Gr. (nec V.); *flavagula*, Peale; *carboides*, Ellm.; *finschii*, Sharpe, *Voy. Ereb. and Terr., B., App.*, p. 34. — Nouvelle-Zélande et îles Chatham.

11.697. JAVANICUS (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.*, 1822, p. 197; Jerd., *B. Ind.* II, 2, p. 863; *africanus*, Less. (nec Gm.); *pygmæus*, Gray, *Ill. Ind. Zool.* II, pl. 56 (nec Gm.); Schl., *l. c.*, p. 15; *melanognathos*, *nudigula*, Brandt; *indicus*, Rchb.; *niger*, Bp. — Inde, Ceylan, Indo-Chine, Malacca, Java, Bornéo, Sumatra.

11.698. PYGMÆUS (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 574; Shell., *B. Egypt.*, p. 295; Dress., *B. Eur.* VI, p. 173, pl. 391 (pt.); *algiriensis*, Rchb.; *niepcii*, Malh.; *pumilio*, Bp. — Europe centr. et méridion., Afrique N., Asie S.-W. et centr.

11.699. AFRICANUS (Gm.), *S. N.* I, 2, p. 577; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 1495; Dress., *B. Eur.* VI, p. 169, pl. 390; *africanoides*, Smith; *longicaudus*, Sw.; *coronatus*, Wahlb. — Afrique, Madagascar.

### 1881. NANNOPTERUM

*Phalacrocorax* (pt.), Rothsch.; *Nannopterum*, Sharpe (1899).

11.700. HARRISI (Rothsch.), *Bull. B. O. Club*, VII, 1898, p. 52; id., *Ibis*, 1898, p. 436; Sharpe, *Handlist*, I, p. 235. — Ile Narborough (Galapagos).

## SUBF. II. — PLOTINÆ

### 1882. PLOTUS

*Anhinga*, Briss. (1760); *Plotus*, Lin. (1766).

11.701. RUFUS, Lacép. et Daud., in *Buff.*, *Hist. nat.*, 1799, — Afrique jusque vers le

Digitized by Google

*Ois.* XVII, p. 81; Grant, *Cat.*, p. 412; *congensis*, Cranch; *levaillantii*, Licht.; Tem., *Pl. Col.* 120; *melanogaster*, Childr. (nec Gm.); *capensis*, Lay.; *chantrei*, Oust. — 20° lat. N., Madagascar, Syrie N. (lac Antioch).

11.702. MELANOGASTER, Gm., *S. N.* I, 2, p. 580; Schl., *Mus. P.-B.*, *Pelec.*, p. 26; Legge, *B. Ceyl.* III, p. 1194; *levaillanti*, Griff. (nec Licht.); *novæ-hollandiæ*, Gray, *Gen. B.* III, pl. 184 (nec Gould). — Mésopotamie, Inde, Ceylan, Indo-Chine, Malacca, Bornéo, Célèbes, Philippin.

11.703. NOVÆ-HOLLANDIÆ, Gould, *P. Z. S.*, 1847, p. 34; id., *B. Austr.* VII, pl. 75; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 406; *melanogaster*, Schl. (nec Gm.) — Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Guinée S.-E.

11.704. ANHINGA, Lin.; Audub., *Orn. Biogr.* IV, p. 136, pl. 316; id., *B. Am.* VII, p. 134, pl. 420; Tacz., *Orn. Pérou*, III, 434; *melanogaster*, Wils. (nec Gm.); *leucogaster*, Vieill. — Amérique tropicale et subtropicale.

## FAM. IV. — SULIDÆ

### 1883. SULA

*Sula*, Briss. (1760); *Dysporus*, Ill. (1811); *Plaucus*, *Sularius*, Rafin. (1815); *Moris*, Leach (1816); *Morus*, Vieill. (1817); *Piscatrix*, Rchb. (1850); *Abeltera*, Heine (1890).

11.705. BASSANA (Lin.); Dress., *Birds. Eur.* VII, p. 181, pl. 392; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 324, pl. 276; *maculatus*, Gm.; *major*, *vulgaris*, Lacép. et Daud.; *alba*, Mey. et W.; *melanura*, Gould, *B. Eur.* V, pl. 413; *americana*, Bp.; *lefevrii*, Bald. — Côtes de l'Atlantique jusqu'au 70° l. N., en hiver le golfe du Mex., le N. de l'Afr., Madeire, Canaries.

11.706. SERRATOR, Gray, *Voy. Ereb. and Terr.*, *B.*, p. 19; Schl., *l. c.*, p. 38; *australis*, Gould (nec Steph.); id., *B. Austr.* VII, pl. 76; *plumigula*, Natt. — Côtes de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande.

11.707. CAPENSIS (Licht.), *Verz. Doubl.*, p. 86; Schl., *l. c.*, p. 39; Fsch. et Hartl., *Vög. Ost-Afr.*, p. 842; *melanura*, Macg. (nec Gould.) — Afrique S. jusqu'à Zanzibar à l'Est et le Loango à l'O. (côtes).

11.708. CYANOPS (Sundev.), *Physiogr. Sällsk. Tidsk.* I, p. 218; Bp., *Consp. Avium*, II, p. 166; Schl., *l. c.*, p. 39; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 416; ? *dactylatra*, Less.; *personata*, Gould; id., *B. Austr.* VII, pl. 77; *bassana*, Newb. (nec L.); *elegans*, Bryant; *melanops*, Heugl. — Mers australes tropicales.

3243. *Var.* ABBOTTI, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1893, p. 599; *cyanops* (pt.), Grant. — Iles de l'Assomption et Christm. (Oc. Ind.).

11.709. PISCATRIX (Lin.); Rchb., *Natat.*, pl. 29c, ff. 2294-5; Schl., *l. c.*, p. 40; Seeb., *B. Jap.*, p. 213; *piscator*, L.; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 79; *fiber*, L.; *candida*, Steph.; *erythrorhyncha*, Less.; *rubripes*, — Atlantique tropical et subtropical, Océan Indien, Océanie.



Digitized by Google

Gould; *rubripeda*, Peale; *brasiliensis*, Rchb. (nec Spix); *hernandezi*, Gundl.; *coryi*, Mayn.

11.710. WEBSTERI, Rothsch., *Bull. B. O. Club*, VII, p. 53; *Ibis*, 1898, p. 437. — Ile Clarion (Galapagos).

11.711. ?NESIOTES, Hell. et Snodg., *Condor*, III, p. 75. — Ile Clipperton.

11.712. VARIEGATA (Tschudi), *Faun. Per.*, p. 313; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 433; *cyanops*, Rchb. (nec Sund.) — Côtes du Chili et du Pérou.

11.713. NEBOUXI, M.-Edw., *Ann. Sc. Nat.* XIII, 1882, art. 4, p. 37, pl. 14; Grant, *Cat.*, p. 435; *gossi*, Goss (ex Ridgw.), *Auk*, 1888, p. 241; Rchw. et Schal., *J. f. O.*, 1883, p. 400. — Côtes de l'Amérique occidentale, de la Basse-Californie au Chili.

11.714. LEUCOGASTRA (Bodd.), *Tabl.*, p. 57; *Pl. Enl.* 973; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1878, p. 651; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 421; *sula*, L.; Grant, *Cat.*, p. 436; *parvus*, Gm.; *brasiliensis*, Spix, *Av. Bras.* II, p. 83, pl. 107; *fusca*, Vieill.; *australis*, Steph.; *fulica*, Less.; *fiber*, auct. plur. (nec Lin.); *sinicadvena*, Swinh. — Côtes des mers tropicales et subtropicales, excepté les côtes américaines du Pacifique.

3244. *Var.* BREWSTERI, Goss, *Auk*, 1888, p. 242; Grant, *Cat.*, p. 440; *leucogastra* (pt.), auct. plur. — Des côtes de la Californ. aux îles Galapagos.

## FAM. V. — FREGATIDÆ

### 1884. FREGATA

*Fregata*, Briss. (1760); *Tachypetes*, Vieill. (1816); *Attagen*, Kp. (1829).

11.715. AQUILA (Lin.); Vieill., *Gal. Ois.* II. p. 187, pl. 274; Audub., *B. Am.* VII, p. 169, pl. 421; *minor*, *leucocephalus* et *palmerstoni*, Gm.; *caroliniana*, Less.; *strumosa*, Kittl. — Mers tropicales et subtropicales.

11.716. ARIEL (Gould), in *Gray's Gen. B.* III, p. 669, pl. 184; id., *B. Austr.* VII, pl. 72; *minor*, auct. plur. (nec Gm.); Schl., *l. c.*, p. 3; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 404; *chambeyroni*, Montr. — Océans Indien et Pacifique tropicaux et subtropic.

# ORD. XVI. — GAVIÆ (1)

## FAM. I. — STERNIDÆ

### SUBF. I. — STERNINÆ

### 1885. HYDROCHELIDON

*Hydrochelidon*, Boie (1822); *Viralva*, Steph. (1826); *Pelodes*, Kaup (1829).

11.717. LEUCOPTERA (Meisn. et Schinz), *Vög. der Schweiz*, p. 264, pl.; Dress., *B. Eur.* VIII, p. 321, pl. 590, — Europe centr. et mérid. jusqu'au 53° l. N.;

(1) Voy.: How. Saunders, *Catalogue of the Birds Brit. Mus.* XXV, pp. 1-334 (1896).

Digitized by Google

591; Dubois, *Fne. Ill. Vert. Belg., Ois.* II, p. 568, pl. 287; *fissipes*, Pall. (nec L.); *grisea*, Horsf.; *nigra*, auct. plur. (nec Lin.); *subleucoptera*, Brm.; *javanica*, Swinh. (nec Horsf.); *hybridus*, Tacz. (nec Pall.) — Asie centr. jusqu'en Chine, Australie, Nouv.-Zélande et l'Afrique en hiver.

11.718. HYBRIDA (Pall.), *Zoogr. Rosso-As.* II, p. 338; Dress., *l. c.*, p. 315, pl. 588, 589; Dubois, *l. c.*, p. 571, pl. 288; *leucopareia*, Tem.; *javanica*, Horsf.; *delamotta*, Vieill.; *indica*, Steph.; *similis*, Gray; *fluviatilis*, Gould, *B. Austr.* VII, pl. 31; *similis*, *leucogenys*, Boie; *marginata*, Blyth; *meridionalis*, *nilotica*, Brm.; *delalandii*, Bp.; *innotata*, Beav.; *melanogastra*, Salvad. — Europe et Asie centrale et méridionale jusque vers le 55° latitude N., Archipel Indien, Australie, Afrique.

11.719. NIGRA (Lin.); Dress., *l. c.*, p. 327, pl. 592; Dubois, *l. c.*, p. 565, pl. 286; *nævia*, *fissipes*, L.; *merulinus*, Scop.; *nubilosa*, Sparrm.; *boysii*, Lath.; *obscura*, *nigricans*, *pallida*, Brm.; *minuta*, Feild. — Europe et Asie occid. jusqu'au 60° l. N.; en hiver, l'Afrique jusqu'au 25° l. N.

3245. *Var.* SURINAMENSIS (Gm.), *S. N.* I, p. 604; Bd., Brew. et Rid., *Water-B. N. Am.* II, p. 318; *plumbea*, Wils., *Am. Orn.* VII, p. 83, pl. 60, f. 3; *nigra*, auct. plur. (nec L.); *exilis*, Tsch.; *frenata*, Salv.; *fissipes*, auct. plur.; *lariformis*, Coues, *B. N.-West*, p. 704. — États-Unis, Amérique centrale et méridionale jusqu'au 40° latitude S.

## 1886. PHAËTHUSA

*Phaëtusa*, Wagl. (1832); *Thalassites*, Sw. (1837).

11.720. MAGNIROSTRIS (Licht.), *Verz. Doubl.*, p. 81; Spix, *Av. Bras.* II, p. 81, pl. 104; Schl., *Mus. P.-B.*, *Stern.*, p. 12; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 438; ?*simplex*, Gm.; ?*chloripoda* et ?*brevirostris*, Vieill.; *speculifera*, Less.; *albifrons*, Cuv. — Amérique méridionale tropicale.

## 1887. GELOCHELIDON

*Gelochelidon*, Brm. (1831); *Laropis*, Wagl. (1832).

11.721. ANGLICA (Mont.), *Orn. Dict. Suppl.*, 1813; Dress., *l. c.*, p. 295, pl. 585; Dubois, *l. c.* II, p. 545, pl. 280; ?*nilotica*, Gm.; *aranea*, Wils., *Am. Orn.* VIII, p. 143, pl. 72, f. 6; *affinis*, Horsf.; *risoria*, *meridionalis*, *balthica*, *agraria*, Brm.; *macrotarsa*, Gould, *B. Austr., Suppl.*, pl. 81; *palustris*, Macg.; *nuttalli*, Boie; *nilotica*, auct. plur. — Europe et Asie jusqu'au 55° l. N., Archip. Indien, Australie, Afrique N., côtes occident. de l'Amérique du 50° l. N. au 40° l. S.

Digitized by Google

## 1888. HYDROPROGNE

*Thalasseus* (pt.), Boie (1822); *Hydroprogne*, Kp. (1829); *Sylochelidon*, Brm. (1831); *Helopus*, Wagl. (1832).

11.722. CASPIA (Pall.), *Nov. Comm. Petrop.* XIV, 1, p. 582, pl. 22; Dress., *l. c.*, p. 289, pl. 584; Dubois, *l. c.*, p. 541, pl. 279; *tschegrava*, Lep.; *atricilla*, S. G. Gm.; *caspica*, Sparrm.; *megarhynchos*, Mey. et Wolf.; *schillingi*, Brm.; *melanotis*, Sw.; *macrorhyncha*, Boie; *strenuus*, Gould; *cayana*, Rich.; *major*, Ellm.; *imperator*, Coues. — Europe et Asie jusqu'au 60° l. N., Malaisie, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique, Amérique septentr. et centr. jusqu'au 60°.

## 1889. SEENA

*Seena*, Blyth (1849); *Potamochelidon*, Heine (1890).

11.723. AURANTIA, J. E. Gray, *Hardw. Ill. Ind. Zool.* I, pl. 69, f. 2; Blyth, *Cat. B. Mus. As. Soc.*, 1849, p. 291; Jerd., *B. Ind.* III, p. 838; *Sterna seena*, Syk., *P. Z. S.*, 1832, p. 171; Legge, *B. Ceyl.*, p. 1005; *brevirostris*, Gray, *l. c.*, pl. 69, f. 1; *roseata*, Hodgs. — Inde, Ceylan, Indo-Chine, Malacca.

## 1890. STERNA

*Sterna*, Lin. (1766); *Thalasseus* (pt.) et *Sternula*, Boie (1822); *Actochelidon*, *Thalassæa*, Kp. (1829); *Pelecanopus*, *Onychoprion*, *Planetis*, *Haliplana*, Wagl. (1832); *Hydrocecropis* (pt.), Boie (1844); *Thalassipora*, Rüpp. (1845).

11.724. MELANOGASTER, Tem., *Pl. Col.* 434; Schl., *l. c.*, p. 21; Gould, *B. Asia*, VII, pl. 70; *javanica*, Horsf.; *acuticauda*, Gray; *minuta*, *jerdoni*, Beav. — Afghanistan, Inde, Indo-Chine.

11.725. FORSTERI, Nutt., *Man. Orn.* II, p. 274; Bd., Brew. et Rid., *Water-B. N. Am.* II, p. 292; *hirundo*, Sw. et Rich. (nec L.); *havelli*, Aud., *B. N. Am.* VIII, p. 103, pl. 434. — Amérique septentrionale et centrale.

11.726. ALBISTRIATA (Gray), *Voy. Ereb. and Terr.*, *B.*, p. 19, pl. 21; Saund., *Cat.*, p. 48; *antarctica*, Wagl. (nec Less.); Bull., *B. N. Zeal.*, ed. 2, II, p. 70, pl. 30; *cinerea*, Ellm.; *breviunguis*, Pelz. — Nouvelle-Zélande, île Norfolk.

11.727. VIRGATA, Cab., *J. f. O.*, 1875, p. 449; Saund., *P. Z. S.*, 1876, p. 646; id., *Cat.*, p. 50; ?*australis*, Gm.; *macrura* (pt.), Gray; *meridionalis*, Lay. (nec Brm.); *vittata*, Coues (nec Gm.) — Iles Kerguelen, Crozet.

11.728. VITTATA, Gm., *S. N.* I, p. 609; Saund., *Cat.*, p. 51; *coronata*, Bonn.; *macrura*, Gr. (pt.); *melanorhyncha*, Gould (pt.); *sancti-pauli*, Gould; *melanoptera*, Vél. — Iles du S. de l'Atlantique (St-Paul, Amsterdam, Kerguelen, etc.)

Digitized by Google

11.729. HIRUNDINACEA, Less., *Traité*, p. 621; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 440; *hirundo*, Max; *acutirostris*, Tsch.; *antarctica*, Peale (nec Less.); *wilsoni*, Burm.; *meridionalis*, Cass. (nec Brm.); Schl., *l. c.*, p. 15; *cassinii*, Scl., *P. Z. S.*, 1860, p. 391. — Amérique méridionale.

11.730. FLUVIATILIS, Naum., *Isis*, 1819, p. 1847; Dress., *B. Eur.* VIII, p. 265, pl. 580; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 554, pl. 284; *hirundo* (pt.), Lin. et auct. plur.; *bicolor*, *sterna*, Scop.; *nitzschii*, Kp.; *pomarina*, Brm.; *marina*, Eyt; *senegalensis*, Sw.; *wilsoni*, Bp.; ?*nilotica*, Rüpp.; *blasii*, Brm.; *macrodactyla* et *macroptera*, Blas.; *dougalli*, Lay.; *major*, Ol.-Gal. — Europe, Asie tempérée W. et Amér. jusq. Texas à l'Ouest; en hiver: Inde, Ceylan, Afrique et l'Amér. mér. jusqu'à Bahia (pas du côté du Pacifique).

3246. *Var.* TIBETANA, Saund., *P. Z. S.*, 1876, p. 649; Hume, *Str. Feath.*, 1877, p. 483, 1879, p. 158. — Asie centrale jusqu'en Mandchourie; Malacca en hiver.

11.731. PARADISEA, Brünn., *Orn. Bor.*, p. 46 (1764); Schl., *Mus. P.-B., Stern.*, p. 15; Dubois, *l. c.* II, p. 551, pl. 282; *hirundo* (pt.), Lin. et auct. plur.; Dress., *l. c.*, p. 255, pl. 579; *macrura*, Naum.; *arctica*, Tem.; *argentata*, Brm.; *brachytarsa*, Graba; *brachypus*, Sw.; *coccineirostris*, Rchb.; *pikei*, Lawr.; *longipennis*, Coues; *portlandica*, Ridgw.; ?*atrofasciata*, Phil. et Landb. — Zone arctique (côtes) jusqu'au 82° l. N.; descend en hiver dans l'Atlantique jusqu'au 35° l. S., et dans le Pacifique jusqu'au Chili.

11.732. LONGIPENNIS, Nordm., in *Erm. Verz. v. Th. u. Pfl.*, p. 17; Middend., *Reis. Sib., Zool.*, p. 246, pl. 25, f. 4; Dav. et Oust., *Ois. Ch.*, p. 526; ?*camtschatica*, Pall.; *glacialis*, Kittl.; *melanorhyncha*, Fsch. — Asie orientale, Kamtschatka, Japon, Chine jusqu'à la Nouv.-Guin. en hiv.

11.733. ALBIGENA, Licht., *Nomencl. Av.*, p. 98; Schl., *l. c.*, p. 20; Fsch. et Hartl., *Vög. Ost-Afr.*, p. 834, pl. 10, f. 2; *senegalensis*, Heugl. (nec Sw.) — Mer Rouge, Mékran, Laccadives, Malabar (côtes).

11.734. DOUGALLI, Mont., *Orn. Dict. Suppl.*; Dress., *l. c.* VIII, p. 273, pl. 581; Dubois, *l. c.* II, p. 558, pl. 285; *paradisea*, auct. plur. (nec Brünn); *macdougalli*, Macg.; *bicuspis*, *tenuirostris*, Licht.; *douglasii*, Schl., *l. c.*, p. 24; *melanorhyncha*, E. Newt.; *korustes*, Hume. — Côtes et îles de l'Eur. W. jusqu'au 57° lat. N., de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique N.-E. et des Antilles.

3247. *Var.* GRACILIS, Gould, *P. Z. S.*, 1845, p. 76; id., *B. Austr.* VII, pl. 27; Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1896, p. 113; *dougalli* (pt.), Saund. — Côtes de l'Australie.

11.735. CANTIACA, Gm., *S. N.* I, p. 606; Dress., *l. c.* VIII, p. 301, pl. 586; Dubois, *l. c.* II, p. 548, pl. 281; *sandvicensis*, *boysii*, Lath.; *stubberica*, Bechst.; ?*columbina*, Schr.; *canescens*, Mey. et W.; *candicans*, Brm.; *acuflavida*, Cabot. — Côtes de l'Atlant. jusque vers le 60° l. N., au Sud jusqu'au cap de B.-Esp. et le Honduras; Méditerr., mers Noire, Casp. et Rouge, golfe Persiq.

Digitized by Google

11.736. MAXIMA, Bodd., *Tabl.*, p. 58; *Pl. Enl.* 988; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1871, p. 567; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 439; Scl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 195; *cayana*, Lath.; Audub., *B. Am.* VII, p. 76, pl. 429; *cayennensis*, Gm.; *galericulata*, Licht.; Schl., *l. c.*, p. 7; *erythrorhynchos*, Max.; *cristata*, Sw., *B. W. Afr.* II, p. 247, pl. 30; *regia*, Gamb.; *bergii*, Hartl.; *elegans*, Léot. — Amérique septentrionale jusqu'au 50° l. N. et Antilles; en hiver jusqu'au Brésil et l'Afrique occidentale jusqu'à l'Angola.

11.737. ELEGANS, Gamb., *Pr. Philad. Ac.*, 1848, p. 129; Bd., Cass. et Lawr., *B. N. Amer.*, p. 860 et ed. 1860, *Atl.*, pl. 94; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 442; ?*gayi*, Bp.; *comata*, Phil. et Landb.; *galericulata*, auct. plur. (nec Licht.) — Côtes américaines du Pacifique, de Californie au Chili, et côte du Texas.

11.738. EURYGNATHA, Saund, *P. Z. S.*, 1876, p. 654; id., *Cat.*, p. 85; *cayennensis* (pt.), Gray; *galericulata* (pt.), Pelz.; *elegans* (pt.), H. et Rchw. — Côtes améric. de l'Atlantique du Vénézuéla au 47°30′ l. S.

11.739. MEDIA, Horsf., *Tr. Linn. Soc.*, 1820, p. 198; Fsch. et Hartl., *Vög. Ost-Afr.*, p. 850; Dress., *l. c.* VIII, p. 285, pl. 583; *affinis*, Cretzs., in *Rüpp. Atl.*, p. 23, pl. 14; *bengalensis*, Less.; *arabica*, Ehrenb.; *torresii*, Gould; id., *B. Austr.* VII, pl. 25; *maxuriensis*, Licht. — Côtes de la Méditerranée, de l'Afrique et du Sud de l'Asie jusqu'à Célèbes et l'Australie.

11.740. BERGII, Licht., *Verz. Doubl.*, p. 80; Schl., *l. c.*, p. 11; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 432; *novæhollandiæ*, *cristata*, Steph.; *velox*, Cretzs., in *Rüpp. Atl.*, p. 21, pl. 13; *pelecanoides*, King.; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 23; Schl., *l. c.*, p. 9; *longirostris*, Less.; *poliocerca*, Gould; Schl., *l. c.*, p. 12; *rectirostris*, Peale; *nigripennis*, Bp.; *bergeri*, Rams. — Côtes de l'Afrique (E. et W.), du Sud de l'Asie jusque Chine et Japon, Australie, Polynésie et les îles du Pacifique jusqu'aux îles Sandwich.

11.741. BERNSTEINI, Schl., *Mus. P.-B.*, *Stern.*, p. 9; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 433; Saund., *Cat.*, p. 96; *maxima*, M.-Edw. et Grand. (nec Bodd.) — Iles Mascareigne, Seychelles, Bornéo N., Halmahera.

11.742. FRONTALIS, Gray, *Zool. Voy. Ereb. and Terr.*, p. 19, pl. 20; Bull., *B. New Zeal.*, ed. 2, II, p. 68, pl. 30, f. 2; ?*striata*, Gm.; *albifrons*, Peale; *melanorhyncha*, Gould, *B. Austr.* VII, pl. 26; *atripes*, Ellm.; *longipennis* (pt.), Fsch. et Hartl. — Nouvelle-Zélande, Australie.

11.743. ALEUTICA, Baird, *Trans. Chicago Acad.*, 1869, p. 321, pl. 31, f. 1; Saund., *Cat.*, p. 98; *camtschatica*, Fsch. (nec Pall.) — Alaska, détroit de Behring jusqu'au Japon.

11.744. LUNATA, Peale, *U. S. Expl. Exp.*, *B.*, p. 277; Schl., *l. c.*, p. 27; Fsch. et Hartl., *Faun. Centralpolyn.*, p. 231, pl. 13, f. 3; Rothsch., *Avif. Laysan*, I, p. 37, pl. — Iles du Pacifique jusqu'aux Moluques.

11.745. ANÆSTHETA, Scop., *Del Faun. et Fl. Ins.* I, p. 92; — Antilles, golfe du Mexi-

Digitized by Google

Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 449; M.-Edw. et Gr., *H. N. Madag., Ois.*, p. 658; *panayensis*, Gm.; Schl., *l. c.*, p. 26; *panaya*, Lath.; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 33; *antarctica*, Less.; *melanoptera*, Sw.; ?*keri*, Boie; *fuligula*, Licht.; *infuscata*, Heugl. (nec Licht.); *discolor*, Coues; *nubilosa*, Sund. (nec Sparrm.) — que, Afrique, Madagascar, Asie S. jusqu'au Japon, Moluques, Australie N. et îles du Pacifique.

11.746. FULIGINOSA, Gm., *S. N.* I, p. 605; Audub., *B. N. Am.* VII, p. 90, pl. 432; Dress., *B. Eur.* VIII, p. 307, pl. 587; ?*fuscata*, L.; *spadicea*, Gm.; *infuscata*, Licht.; *oahuensis*, Blox.; *serrata*, *guttatus*, Wagl.; *melanura*, Gould; *herminieri*, Less.; *gouldi*, Rchb.; *luctuosa*, Phil. et Landb.; *somalensis*, Heugl. — Côtes de toutes les mers tropicales et subtropicales (accidentellement Europe et Amérique septentr.)

3248. *Var.* CRISSALIS, Baird, *Pr. Bost. Soc. N. H.*, 1871, pp. 285, 301; Lawr., *Mem. Bost. Soc. N. H.*, 1874, p. 318; *fuliginosa* (pt.), Saund. — Tres Marias, Socorro, Mexique W.

11.747. BALÆNARUM (Strickl.), *Contr. Orn.*, 1852, p. 160; Boc., *Orn. Angola*, p. 490; Saund., *Cat.*, p. 111. — Sud de l'Afrique.

11.748. NEREIS (Gould), *P. Z. S.*, 1842, p. 140; id., *B. Austr.* VII, pl. 29; *parva*, Ellm.; *minuta*, Fsch. (nec L.); *alba*, Potts; *placens*, Lay. (nec Gd.) — Nouvelle-Zélande, Australie, Nouvelle-Calédonie.

11.749. SINENSIS, Gm., *S. N.* I, p. 608; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 527; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 445; *minuta*, auct. plur. (nec L.); *pusilla*, Tem.; *placens*, Gould; id., *B. New Guin.* V, pl. 72; *inconspicua*, Mast. — Golfe du Bengale, mer de Chine, Japon, Archipel Indien jusqu'à l'Australie.

11.750. MINUTA, Lin.; Dress., *l. c.* VIII, p. 279, pl. 582; Dubois, *l. c.* II, p. 561, pl. 285; *metopoleucos*, S. Gm.; *fissipes*, *pomarina*, *danica*, etc., Brm.; *orientalis*, Licht.; *gouldi*, Hume (nec Rchb.) — Europe jusq. 60° l. N., Asie centr. jusq. N. de l'Inde; en hiver, Birm., Java, Afr.

3249. *Var.* SAUNDERSI, Hume, *Str. Feath.*, 1877, p. 324; Legge, *B. Ceyl.*, p. 1023; *minuta*, auct. plur. (nec L.); *sumatrana*, Saund. (nec Raffl.); *balænarum*, E. Newt. (nec Strickl.); ?*novella*, Hartl. — Mer Rouge, Afrique E. jusq. Natal, Madag., Mascar., Seychelles, golfe Persique, Inde, Ceylan, Birmanie.

3250. *Var.* INNOMINATA, Jar. et Loud., *Orn. Mon.*, 1902, p. 150. — Béloutchistan.

11.751. ANTILLARUM (Less.), *Descr. Mam. et Ois.*, p. 256; Coues, *Pr. Phil. Acad.*, 1862, p. 552; Saund., *Cat.*, p. 122; *minuta*, auct. plur. (nec L.); Audub., *B. Am.* VII, p. 119, pl. 439; *argentea*, Nutt. (nec Max.); *melanorhyncha*, Less.; *frenata*, Gamb.; *superciliaris*, Cab. (nec Vieill.); *minuta americana*, Sund. — Amérique septentrionale et centrale, au N. jusqu'à Terre-Neuve et Labrador; Antilles, Afrique W. en hiver.

3251. *Var.* AUSTRALIS (Licht.), *Nomencl. Av.*, p. 98; — Afrique S.

Digitized by Google

Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1896, p. 113; *antillarum* (pt.), Saund.

11.752. SUPERCILIARIS, Vieill., *N. Dict.* XXXII, p. 126; Tacz., *Orn. Pérou*, III, p. 444; Scl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 197; *maculata*, V.; *argentea*, Max.; Burm., *Th. Bras.* III, p. 542. — Amérique méridionale.

11.753. LORATA, Phil. et Landb., *Arch. f. Naturg.*, 1863, 1, p. 124; Saund., *Cat.*, p. 126; *exilis*, Scl. (nec Tschudi), *P. Z. S.*, 1867, pp. 336, 344, 1871, p. 572; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 445; *loricata*, Gray. — Côtes du Chili et du Pérou.

11.754. MELANAUCHEN, Tem., *Pl. Col.* 427; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 28; *marginata*, Blyth; *decorata*, Hartl.; *sumatranus*, Salvad.; *cinereus*, Layard. — Iles Mascar., Seychell., Nicobar, Andaman, Ténassér., Malacca, Australie N., îles du Pacif. jusq. Liu-Kiu.

11.755. TRUDEAUI, Audub., *Orn. Biogr.* V, p. 125; id., *B. N. Am.* VII, p. 105, pl. 435; Schl., *l. c.*, p. 29; Tacz., *Orn. Pérou*, III, p. 445; *sellovii*, Licht.; *frobeenii*, Phil. et Landb.; ? *chloropoda*, Heine et Rchw. — Amérique méridionale.

## 1891. NÆNIA

*Nænia*, Boie (1844); *Sternolophota*, Less. (teste Gray, 1871); *Larosterna*, Blyth (1849); *Inca*, Jard. (1850).

11.756. INCA (Less.), *Voy. Coquille*, p. 731, *Atl.*, pl. 47; Tacz., *l. c.* III, p. 446; Saund., *Cat.*, p. 132; *mystacalis*, Jard., *Contr. Orn.*, 1850, p. 33. — Côtes du Pérou et du Chili.

## 1892. ANOUS

*Anous*, Steph. (1826); *Megalopterus*, Boie (1826); *Stolida*, Less. (1831); *Gavia*, Sw. (1837); *Aganaphron*, Glog. (1842); *Procelsterna*, Lafr. (1842); *Micranous*, Saund. (1895).

11.757. STOLIDUS (Lin.); Gould, *B. Eur.* V, pl. 421; Degl. et Gerbe, *Orn. Eur.* II, p. 445; *senex*, Leach; *niger*, Steph.; *tenuirostris*, Boie (nec Tem.); *unicolor*, Nordm.; *leucoceps*, Sw.; *superciliosus* et *plumbeigularis*, Sharpe. — Les mers tropicales et subtropicales de l'Atlantique.

3252. *Var.* PILEATA (Scop.), *Del Faun. et Flor. Insubr.* II, p. 92; Hart., *Novit. Zool.* VII, p. 9; *stolidus* (pt.), auct. plur.; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 34; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 529; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 453; *philippina*, Lath.; *rousseaui*, Hartl., *Beitr. Orn. Madag.*, — Mers tropicales et subtropicales du Pacifique et de l'Océan Indien.

Digitized by Google

p. 86; *frater*, Coues; *stolidus rousseaui*, Ridgw. (1).

3253. *Var.* RIDGWAYI, Anth., *Auk*, 1898, p. 36. — Iles Cocos et Socorro.

11.758. GALAPAGENSIS, Sharpe, *Phil. Tr.* CLXVIII, p. 469; Salv., *P. Z. S.*, 1883, p. 430; Saund., *Cat.*, p. 143. — Iles Galapagos.

11.759. CÆRULEUS (F. D. Benn.), *Narr. Whaling-Voy.* I, p. 385, II, p. 248; Saund., *P. Z. S.*, 1876, p. 671, 1878, p. 211; *teretirostris*, Lafr.; *teretricollis*, Lafr., *Mag. de Zool.*, 1842, p. et pl. 29; *cinerea*, Néb., *Voy. Vénus, Atl.*, pl. 9; *parvulus*, Gould; *plumbeus*, Peale; *tephrodes*, Rchb.; *cinereus*, Prév. et Des M. (nec Gould). — Iles Paumotu, Marquises, Société, Ellice, Phœnix et Fannigs (Polynésie centr.)

11.760. CINEREUS, Gould, *P. Z. S.*, 1845, p. 104; id., *B. Austr.* VII, pl. 37; Schl., *l. c.*, p. 38; *pelecanoides*, Gr. (nec King); *albivitta*, Bp.; *albivittatus*, Fsch.; *cæruleus* (pt.), Saund. (1876), Rams. et Tristr. — Australie, Nouvelle-Zélande, îles Lord Howe, Norfolk, Kermadec; Ambrosio (non loin du Chili).

11.761. PULLUS, Bangs., *Bull. Mus. Harvard*, XXXVI, p. 258. — Iles Liu-Kiu.

11.762. TENUIROSTRIS (Tem.), *Pl. Col.* 202; Schl., *l. c.*, p. 37; Saund., *P. Z. S.*, 1876, p. 670, pl. 61, f. 1; id., *Cat.*, p. 144; *melanops*, Gould; id., *B. Austr.* VII, pl. 35; *senex*, Bp. (nec Leach). — Seychelles, Madagascar, Mascareignes, Australie W., détroit de Torres.

11.763. LEUCOCAPILLUS, Gould, *P. Z. S.*, 1845, p. 105; id., *B. Austr.* VII, pl. pl. 36; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 457; *tenuirostris*, auct. plur. (nec Tem.); *melanogenys*, Gray, *Gen. B.* III, p. 661, pl. 182; *leucocephalus*, Rchb.; *senex*, Hume (nec Leach); *atrofuscus*, Stone. — Mer des Antilles, Afrique S., Océan Indien jusqu'au Nord de l'Australie et les îles de la Société.

11.764. DIAMESUS (Hell. et Snodg.), *Condor*, III, p. 76. — Il. Cocos et Clipperton.

11.765. HAWAIIENSIS, Rothsch., *Bull. Br. Orn. Club*, n° X, 1893, p. 17; id., *Ibis*, 1893, p. 571; id., *Avif. Laysan*, pt. I, p. 43, pl.; *tenuirostris*, Gr. (nec Tem.); *melanogenys*, Stejn. (nec Gr.) — Iles Sandwich ou Hawaï.

## 1893. GYGIS

*Gygis*, Wagl. (1832).

11.766. ALBA (Sparrm.), *Mus. Carls.* II, fasc. 1, n° 11; Schl., *l. c.*, p. 35; Hartl., *Vög. Madag.*, p. 389; *candida*, Gm.; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 30; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 529; *semi-alba*, Bonn.; *pacifica*, Less.; *nivea*, F. D. Benn. — Iles du S. de l'Atlantique, Océan Indien jusqu'à l'Australie et les îles du Pacifique.

(1) La plupart des auteurs ont confondu la var. *Pileata* et son type *stolidus*. D'après M. Hartert, la var. *Pileata* a la queue plus longue et plus étagée, le dessus de la tête plus gris, le plumage général plus fuligineux et moins brun, les rémiges généralement plus longues.



Digitized by Google

3254. *Var.* KITTLITZI, Hart., *Katal. Vogelsam. Senck.*, p. 257; id., *Nov. Zool.* V, p. 67; *candida* (pt.), Saund. — Iles Carolines.

11.767. MICRORHYNCHA, Saund., *P. Z. S.*, 1876, p. 668; id., *Cat.*, p. 152. — Iles Marquises.

## SUBF. II. — RHYNCHOPINÆ

### 1894. RHYNCHOPS

*Rynchops*, Lin. (1758); *Rhynchopsalia*, Briss. (1760); *Psalidoramphos*, *Anisoramphos*, Dumt. (1826).

11.768. NIGRA, Lin.; *Pl. Enl.* 357; Audub., *B. N. Am.* VII, p. 67, pl. 428; Ridgw., *Man. N. Amer. B.*, p. 49; ?*fulva*, Lin.; *borealis*, Sw. — Amérique septentrionale et centrale, Antilles.

3255. *Var.* INTERCEDENS, Saund., *Bull. Br. Orn. Club*, n° XXV, p. 26 (1895); id., *Cat.*, p. 155; *nigra* (pt.), auct. plur. (nec L.); *melanura*, Scl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 193 (nec Sw.) — Côtes orientales de l'Amérique méridionale entre le 20° et le 40° l. S.

3256. *Var.* MELANURA, Sw., *Classif. B.* II, p. 373; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 437; *nigra* (pt.), auct. plur. (nec L.); *cinerascens* et *brevirostris*, Spix, *Av. Bras.* II, p. 80, pl. 102, 103. — Amérique méridionale et centrale jusqu'au Yucatan.

11.769. FLAVIROSTRIS, Vieill., *N. Dict.* III, p. 383; id., *Gal. Ois.* II, p. 257, pl. 291; Schl., *l. c.*, p. 40; Fsch. et Hartl., *Vög. Ostafr.*, p. 837; *albirostris*, Licht.; *orientalis*, Cretzschm., in *Rüpp. Atlas*, p. 37, pl. 24. — Afrique, au N. jusqu'à l'Égypte et la Mer Rouge.

11.770. ALBICOLLIS, Sw., *An. in Menag.*, p. 360; Gray, *Gen. B.* III, pl. 181; Schl., *l. c.*, p. 40; Legge, *B. Ceyl.*, p. 1004; *nigra*, Burg. (nec L.) — Inde, Ceylan, Birmanie.

## FAM. II. — LARIDÆ

### 1895. XEMA

*Xema*, Leach (1819); *Creagrus*, Bp. (1854); *Chema*, Rchw. (1889).

11.771. SABINEI (J. Sab.), *Trans. Linn. Soc.*, 1818, p. 520, pl. 29; Audub., *B. N. Am.* VII, p. 127, pl. 441; Dress, *B. Eur.* VIII, p. 337, pl. 595; *collaris*, Sab.; *minutus*, Bolsm. — Amérique arctique, Sibérie E.; en hiver jusqu'au Pérou.

11.772. FURCATA (Néboux), *Voy. Venus*, pl. 10; Bruch, *J. f. O.*, 1855, p. 105; Saund., *P. Z. S.*, 1878, p. 213, 1882, p. 523, pl. 34; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 457; *furcatus* et *furcatum* suivant les auteurs. — Des îles Galapagos au Pérou.

Digitized by Google

## 1896. RHODOSTETHIA

*Rossia*, Bp. (1838, nec Owen 1835); *Rhodostethia*, Macg. (1842); *Rhodestethia*, Tacz. (1893).

11.773. ROSEA (Macg.), *Mem. Wern. Soc.* V, 1824, p. 249; Jard. et Sel., *Ill. Orn.* I, pl. 14; Dress., *B. Eur.* VIII, p. 343, pl. 594; *rossii*, Rich.; *richardsoni*, Less. — Régions arctiques.

## 1897. LARUS

*Larus*, Lin. (1766); *Gavia*, Gm. (1770); *Leucus*, *Hydrocolœus*, *Ichthyaëtus*, Kp. (1829); *Laroides*, Brm. (1850); *Chroicocephalus*, Eyt. (1837); *Plautus*, Rchb. (1852); *Glaucus*, *Dominicanus*, *Adelarus*, *Blasipus*, Bruch (1853); *Gavina*, *Gelastes*, *Atricilla*, *Melagavia*, *Cirrhocephala*, Bp. (1854); *Bruchigavia*, *Clupeilarus*, Bp. (1857); *Lambruschinia*, Salvad. (1864); *Adelolarus*, *Einalia*, *Melanolarus*, *Epitelolarus*, Heine et Rchw. (1890).

11.774. MINUTUS, Pall., *Reise Russ. Reichs*, III, p. 702; Dress., *B. Eur.* VIII, p. 373, pl. 599; Dubois, *Faune Ill.*, *Ois.* II, p. 602, pl. 296; *atricilloides*, Falck.; *d'orbignyi*, Audouin, *H. N. de l'Égypte*, pl. 9, f. 3; *nigrotis*, Less.; *pygmœus*, Gr. — Europe et Sibér. jusq. 62°1.N.environ(pas en Scandin.); Turkest., côtes des mers Casp. et Méditerr.

11.775. ICHTHYAËTUS, Pall., *Reise Russ. Reichs*, II, p. 713; Dress., *l. c.* VIII, p. 369, pl. 598; Shell., *B. Egypt*, p. 307, pl. 13; *ridibunda phœnicopos*, S. Gm.; *leucomelas*, Less. (nec V.); *kroicocephalus*, James.; *pallasi*, Bp.; *minor*, Schl., *Mus. P.-B.*, *Lari*, p. 34; *innominatus*, Hume; *affinis*, Bidd. — Europe S.-E., Méditerranée E., Asie centrale jusqu'au Koko-nor; en hiver l'Inde.

11.776. MELANOCEPHALUS, Natt., *Isis*, 1818, p. 816; Schl., *l. c.*, p. 43; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* II, p. 1407; Dress., *l. c.* VIII, p. 365, pl. 597, f. 2; *atricilla*, Natt. (nec L.); *plumbiceps*, Kp.; *caniceps*, Brm.; *michahelli*, *leucophthalmus*, v. d. Mühle; *affinis*, Nardo. — Côtes de la Mer Noire, de la Méditerranée et du S.-W. de l'Europe.

11.777. SAUNDERSI (Swinh.), *P. Z. S.*, 1871, pp. 273, 421; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 522; Saund., *P. Z. S.*, 1878, p. 205; *kittlitzii*, Swinh. (1860, nec Bruch); *schimperi*, Schl., *l. c.*, p. 40 (nec Bruch). — Corée, Chine N., Mongolie, Japon.

11.778. PHILADELPHIA (Ord.), in *Guthrie's Geogr.*, 2e ed. *Amer.* II, p. 319; Baird., Cass. et Lawr., *B. N. Amer.*, p. 852; Gould, *B. Gr. Brit.* V, pl. 65; *minutus*, Sab. (nec Pall.); *capistratus*, Bp. (nec Tem.); *melanorhynchus*, Tem., *Pl. Col.* 504; *bonapartii*, Sw. et Rich.; Audub., *B. Am.* VII, p. 131, pl. 442; *subulirostris*, Bruch. — Amérique du Nord.

Digitized by Google

11.779. SERRANUS, Tsch., *Arch. f. Naturg.*, 1844, 1, p. 314; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 452; Saund., *Cat.*, p. 188; *cirrhocephalus*, Peale (nec Vieill.); *personatus*, Bruch; *glaucotes*, Cass. (nec Meyen). — Ecuador, Pérou, Chili.

11.780. FRANKLINI, Swains. et Rich., *Faun. Bor.-Am., B.*, p. 424, pl. 71; Audub., *B. Amer.* VII, p. 145; Schl., *l. c.*, p. 36; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 451; *pipixcan*, Wagl.; *cucullatus*, Rchb.; *kittlitzii*, Bruch (nec Swinh.); *schimperi*, Bruch (nec Schl.); *cinereo-caudatus*, Phil. et Landb. — Amérique septentrionale et centrale; en hiver longe les côtes américc. du Pacifique jusqu'au Chili.

11.781. ATRICILLA, Lin.; Audub., *Orn. Biogr.* IV, p. 118, pl. 314; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 450; *ridibundus*, Wils. (nec L.); *catesbyi*, *megalopterus*, *micropterus*, Bruch; *catesbæi*, *macroptera*, *minor*, Bp. — Amérique septentr. et centr., Antilles; en hiver jusqu'au Brésil et Pérou.

11.782. CIRRHOCEPHALUS, Vieill., *N. Dict.* XXI, p. 502; id., *Gal. Ois.* II, p. 223, pl. 289; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 453; *poliocephalus*, Tem.; *poiocephalus*, Sw.; *phœocephala*, Strickl.; *plumbiceps*, Bruch; *major*, Bp.; *maculipennis*, Burm. (nec Licht.); *polionotus*, Pelz.; ? *hartlaubi*, Rochebr. — Amérique méridionale, Afrique.

11.783. MACULIPENNIS, Licht., *Verz. Doubl.*, p. 83; Bruch, *J. f. O.*, 1853, p. 105; Scl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 198; Saund., *Cat.*, p. 200; *cirrhocephalus* (pt.), auct. plur. (nec V.); *serranus*, Burm. (nec Tschudi); *glaucodes* (pt.), Saund. — Amérique méridionale.

11.784. GLAUCODES, Meyen, *Nov. Act. Acad. Cæs. Leop.* XVI, p. 115, pl. 24; id., *Beitr. Zool.*, p. 259, pl. 34; Saund., *Cat.*, p. 203; *ridibundus*, King (nec L.); *albipennis*, Gr. (nec Licht.); *roseiventris*, Gould; *cirrhocephalus* (pt.), auct. plur. (nec V.) — Du Cap Horn au 38° l.S., îles Malouines.

11.785. RIDIBUNDUS, Lin.; Naum., *Vög. Deutschl.* X, p. 264, pl. 260; Dress., *l. c.* VIII, p. 557, pl. 596 et 597, f. 1; Dubois, *l. c.* II, p. 598, pl. 295; ? *cinerarius*, L.; *erythropus*, Gm.; *atricilla*, Retz. (nec L.); *canescens*, Bechst.; *nævius*, Pall.; *capistratus*, Tem.; *pileatum*, Brm.; *minor*, Schl.; *pallida*, Hodgs.; *brunneicephalus*, Gray (pt.); *cahiricus* et *cahirinus*, Saund. — Europe, Asie et Afrique entre le 60° et le 10° latitude N., Philippines, Japon.

11.786. BRUNNEICEPHALUS, Jerd., *Madr. Journ.*, 1840, p. 25; Schl., *Mus. P.-B., Lari*, p. 35; Legge, *B. Ceyl.*, p. 1049; Hume et Henders., *Lahore to York*, p. 300, pl. 32; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 521; *brunneiceps*, Cab.; *lacrymosus*, Licht.; *tibetanus*, Gould. — Asie centrale, du Turkestan au Thibet et Mongolie; en hiver Inde, Ceylan et Indo-Chine W.

11.787. LEUCOPHTHALMUS, Tem., *Pl. Col.* 366; Schl., *l. c.*, p. 32; Shell., *B. Egypt*, p. 308; *masauanus*, Heugl. — Europe S.-E., côtes de la Mer Rouge.

Digitized by Google

11.788. HEMPRICHI (Bruch), *J. f. O.*, 1853, p. 106, 1855, p. 278; Schl., *l. c.*, p. 32; Finsch, *Tr. Zool. Soc.* VII, p. 302, pl. 27; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* II, 2, p. 1399, pl. 36, f. 2; Saund., *Cat.*, p. 221; *crassirostris*, Boie (nec V.) — Côtes de la Mer Rouge, de l'Afrique E., du Béloutchistan et de l'Inde.

11.789. FULIGINOSUS, Gould, in *Darw. Voy. Beagle, B.*, p. 141; Salv., *Tr. Zool. Soc.* IX, p. 305, pl. 87; Saund., *Cat.*, p. 222; *neptunus*, Bp.; *belcheri*, Blas. (pt., nec Vig.); *heermanni* (pt.), Gr. — Iles Galapagos.

11.790. MODESTUS, Tschudi, *Arch. f. Naturg.*, 1843, 1, p. 389; id., *Faun. Per.*, pp. 53, 306, pl. 35; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 449; *bridgesi*, Fras.; id., *Zool. Typ.*, pl. 69; *polios*, Natt. — Côtes du Chili et du Pérou.

11.791. HEERMANNI, Cass., *Pr. Phil. Acad.*, 1852, p. 187; id., *B. Calif.*, p. 28, pl. 5; Bd., Brew. et Ridgw., *Water-B. N. Am.* II, p. 252; *belcheri*, Scl. (nec Vig.) — Amérique N.-W. de l'île Vancouver à la Basse-Calif., en hiv. jusqu'au Guatémala.

11.792. BELCHERI, Vig., *Zool. Journ.*, 1829, p. 358; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 448; *melanurus*, Licht. (nec Tem.); *fuliginosus*, Cass. (nec Gd.); *frobeenii*, Phil. et Landb. — Côtes du Chili et du Pérou jusqu'au 12° latitude S.

11.793. CRASSIROSTRIS, Vieill., *N. Dict.* XXI, p. 508; Schl., *l. c.*, p. 8; David et Oust., *Ois. Chine*, p. 519; *melanurus*, Tem., *Pl. Col.* 459; T. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 132, pl. 88; *fuscus*, Pelz. (nec L.) — Côtes des mers de Chine et du Japon.

11.794. GELASTES, Thien., *Fortpflanz. Vög. Eur.*, pt. V, p. 22; Shell., *B. Egypt.*, p. 306; Dress., *l. c.* VIII, p. 389, pl. 601, f. 2; *genei*, Brème; *leucocephalus*, Boiss.; *tenuirostris*, Tem.; *lambruschini*, Bp.; *columbinus*, Golow.; *rubriventris*, Bp.; *subroseus*, *brehmi*, Heugl.; *arabicus*, Hempr. et Ehr. — Méditerranée, mers Noire, Caspienne et Rouge, et Nord de l'Océan Indien.

11.795. BULLERI, Hutt., *Cat. B. N. Zeal.*, p. 41; Bull., *B. N. Zeal.*, ed. 2, II, p. 58, pl. 29, f. 1; Saund., *Cat.*, p. 253; *pomare*, Bruch (1855, nec 1853); *melanorhynchus*, Bull. (nec Tem.) — Nouvelle-Zélande.

11.796. NOVÆ-HOLLANDIÆ, Steph., *Gen. Zool.* XIII, pt. 1, p. 196; Saund., *l. c.*, p. 235; *scopulinus, var. major*, Forst.; *jamesoni*, J. Wils., *Ill. Zool.*, pl. 23; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 20; *pomare*, Bruch (1853); *andersonii*, Bruch; *gouldi*, *coralinus*, Bp.; *longirostris*, Mast. — Australie, Tasmanie, Nouvelle-Calédonie.

11.797. SCOPULINUS, Gray, in *Dieffenb. N. Zeal.* II, *App.*, p. 200; Schl., *l. c.*, p. 28; Bull., *B. N. Zeal.*, ed. 2, II, p. 55, pl. 29, f. 2; *novæ-hollandiæ*, auct. plur. (nec Steph.); *jamesoni* et *andersoni* (pt.), Gray. — Nouvelle-Zélande, îles Chatham et Auckland.

Digitized by Google

11.798. HARTLAUBI (Bruch), *J. f. O.*, 1853, p. 102, 1855, p. 286; Saund., *P. Z. S.*, 1874, p. 293, 1878, p. 188; *poiocephalus*, Lay. (nec Sw.); *cirrhocephalus*, Hartl. (nec V.); *ridibundus*, Schl. et Pol. (nec L.), *Faune Madag., Ois.*, p. 146. — Afrique S. du Cap au Natal, Madagascar.

11.799. MARINUS, Lin.; Dress., *l. c.* VIII, p. 427, pl. 604; Dubois, *l. c.* II, p. 583, pl. 291; *nævius*, L.; *maculatus*, Bodd.; *giganteus*, Ben.; *maximus*, Leach; *mülleri*, *fabricii*, Brm.; *nigripallus*, C. Dub., *Pl. Col. Ois. Belg.* III, p. et pl. 240. — Côtes de l'Eur. N. et W. jusq. Cap Nord et la Petschora, Islande, Groenl., Amér. N.-E. jusq. Flor., en hiv. Canar. et Méditerr.

3257. *Var.* SCHISTISAGA, Stejneg., *Auk*, 1884, p. 231 (*schistisagus*); id., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 119, pl. 8, f. 1 (rémiges); *argentatus* (pt.), Midd.; *cachinnans*, Kittl. (nec Pall.); *marinus* (pt.), auct. plur.; *pelagicus*, Tacz. (nec Bruch); *marinus schistisagus*, Seeb., *B. Jap.*, p. 291. — Mers de Behring, d'Okhotsk, N. du Pacifique, îles Kouriles, Japon N.

11.800. DOMINICANUS, Licht., *Verz. Doubl.*, p. 82; Gray, *Gen. B.* III, pl. 180; Schl., *l. c.*, p. 12; Bull., *B. N. Zeal.*, p. 270, pl. 28, f. 1; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 205; *marinus*, Lath. (pt., nec L.); *fuscus* (pt.), auct. plur. (nec L.); *littoreus*, Forst.; *antipodus*, Gr.; *pelagicus*, *vetula*, *vociferus*, *fritzei*, Bruch; *verreauxi*, *azaræ*, Bp.; *antarcticus*, Ellm.; *pacificus*, Lay. — Afrique S., Amérique méridionale du 10° latitude S. aux régions antarctiques, îles Kerguelen, Nouvelle-Zélande.

11.801. FUSCUS, Lin.; Dress., *l. c.*, p. 421, pl. 603; Dubois, *l. c.* II, p. 587, pl. 292; *flavipes*, Mey. et W.; *melanotus*, *harengorum*, *graellsii*, Brm.; *fuscescens*, Bruch (part.) — Europe occid. jusqu'au Cap N. et mer Blanche; Méditerranée, Mer Rouge.

11.802. AFFINIS, Reinh., *Vidensk. Meddel.*, 1853, p. 78; id., *Ibis*, 1861, p. 17; Saund., *P. Z. S.*, 1878, p. 171; Dress., *l. c.* VIII, p. 417; *fuscus* (pt.), auct. plur. (nec L.); *cachinnans*, auct. plur. (nec Pall.); *rufescens*, *fuscescens*, Bp.; *leucophæus*, Heugl. (nec Licht.); *occidentalis*, Hume (nec Audub.) — Russie N., Sibérie W. jusqu'au Jenissei; en hiver l'Océan Indien et les côtes E. et N.-E. de l'Afrique.

11.803. OCCIDENTALIS, Audub., *Orn. Biogr.* V, p. 320; id., *B. N. Amer.* VII, p. 161; Schl., *l. c.*, p. 15; Ell., *New and Unfig. B. N. Am.* II, pl. 52; *argentatus*, *var. occidentalis*, Coues. — Côtes de l'Amérique N.-W. de l'État de Washington à la Basse-Californie.

11.804. ARGENTATUS, Brünn., *Orn. bor.*, p. 44; Dress., *l. c.* VIII, p. 399, pl. 602, f. 2; Dubois, *l. c.* II, p. 590, pl. 293; *varius*, Brünn.; *fuscus*, Pen. (nec L.); *glaucus*, Retz. (nec Brünn., nec Fabr.); *argenteus*, Boie; *argentatoides*, *americanus*, etc., Brm.; *marinus*, Lemb. (nec L.) — Europe, Amér. N.-E.

Digitized by Google

3258. *Var.* SMITHSONIANA, Coues, *Key N. Am. B.*, p. 312; Ridgm., *Man. N. Amer. B.*, p. 31; *argentatus* (pt.), Saund. — Sud des États-Unis, Basse-Californie, golfe du Mexique.

3259. *Var.* CACHINNANS, Pall., *Zoogr. Rosso-As.* II, p. 318; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* II, 2, p. 1392; *argentatus* (pt.), auct. plur.; *leucophæus*, Licht., *Nomencl. Av.*, p. 99; Dress., *l. c.* VIII, p. 411, pl. 602, f. 1; *michahellesii*, Bruch; *epargyrus*, Licht.; *fuscescens*, Scl. — Europe S., Mer Noire jusqu'au lac Baïkal, Afrique W., Mer Rouge jusqu'au N.-W. de l'Inde.

3260. *Var.* VEGÆ, Palm., *Vega Exped., Vetensk.* V, p. 370; Stejn., *Auk*, 1888, p. 310; *argentatus* et *cachinnans* (pt.), auct. plur.; ? *borealis*, Bruch, Bp., Baird; *occidentalis*, Swinh. (nec Audub.); Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 520. — Sibérie arctique, mer de Behring, en hiver jusqu'aux côtes de Chine.

11.805. AUDOUINI, Payraud., *Ann. Sc. Nat.* VIII, 1826, p. 462; Gould, *B. Eur.* V, pl. 438; Dress., *l. c.* VIII, p. 395, pl. 601, f. 1; *atricilla* (pt.), Tem. (1820); *payraudei*, Vieill. — Méditerranée W.

11.806. DELAWARENSIS, Ord, *Guthr. Geogr.*, 2e amer. ed. II, p. 319; Bd., Br. et Ridgw., *Water-B. N. Am.* II, p. 244; Saund., *Cat.*, p. 273; *argentatoides*, Bp. (nec Brm.); *zonorhynchus*, Rich. et Sw., *Faun. Bor.-Am., B.*, p. 421; Audub., *B. N. Am.* VII, p. 152, pl. 446; *occidentatis*, Bruch (nec Aud.); *bruchi*, *mexicanus*, Bp. — Amérique septentr., en hiver le Mexique et la Basse-Californie (accid. Cuba et Bermude.)

11.807. CALIFORNICUS, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* VI, 1854, p. 79; Ell., *New and Unfig. B. N. Am.* II, pl. 52; Coues, *Key N. Am. B.*, p. 313. — Amérique N.-W., en hiver Mexique W.

11.808. CANUS, Lin. (1758); Dress., *l. c.* VIII, p. 381, pl. 600; Dubois, *Faune Ill. Ois.* II, p. 594, pl. 294; *cinereus*, Scop.; *hybernus*, Tunst.; *procellosus*, Bechst.; *cyanorhynchus*, Mey. et W.; *niveus*, Pall. (nec Bodd.); *major*, Midd., *Reis. Sib., Zool.*, p. 243, pl. 24, f. 4; *lacrymosus*, Bruch (nec Licht.); *heinei*, Hom.; *kamtchatchensis*, *farroensis*, *islandicus*, Bp.; *suckleyi*, Schl. (nec Lawr.); *audouini* (pt.), Tristr. — Europe jusqu'au Cap N. et l'Islande, en Asie jusqu'au 65° l. N., en hiver la Méditer., le N. de l'Afr. jusqu'au golfe Persiq., la Chine et le Japon.

11.809. BRACHYRHYNCHUS, Rich., *F. Bor. Am., B.*, p. 422; Ell., *New and Unfig. B. N. Am.* II, pl. 53; *canus*, Rich. et Sw. (nec L.); *suckleyi*, Lawr.; *septentrionalis*, Lawr., *var. brachyrhynchus*, Coues. — Amérique W. arct. et subarct., en hiver les côtes du Pacifique jusqu'en Californie.

11.810. GLAUCESCENS, Naum., *Vög. Deutschl.* X, p. 351; Coues, *B. N.-West*, p. 622; Seeb., *B. Japan. Emp.*, p. 290; ? *glaucopterus*, Kittl.; *chalcopterus*, Bd., Cass. et Lawr. (nec Licht.) — Nord du Pacifique, en hiver Japon et Californie S.

11.811. NELSONI, Hensh., *Auk*, 1884, p. 250; Ridgw., *Man.* — Amérique N.-W.,

Digitized by Google

*N. Am. B.*, p. 27; Saund., *Cat.*, p. 287; *chalcopterus*, Bp.; *glaucescens* (pt.), Gr. — Alaska.

3261. *Var.* KUMLIENI, Brewst., *Bull. Nutt. Orn. Club*, 1883, p. 216; Baird, Br. et Ridgw., *W.-B. N. Am.* II, p. 219; *glaucescens*, Kuml. — Amérique N.-E., en hiver Terre-Neuve jusqu'à New-York.

11.812. GLAUCUS, Brünn., *Orn. Bor.*, p. 44; Fabr., *Faun. Groenl.*, p. 100; Dress., *l. c.* VIII, p. 433, pl. 605; Dubois, *l. c.* II, p. 577, pl. 289; *hyperboreus*, Gunn.; *maximus*, O'Reil. (nec Leach); *consul*, Boie; *islandicus*, Edm.; *leucopterus*, auct. plur. (nec Fab.); *glacialis*, Brm.; *hutchinsi*, Rich.; *barrovianus*, Ridgw.; *glaucescens*, Tacz. (nec Naum.) — Zone arctique, en hiver les côtes jusqu'au 40° l. N.

11.813. LEUCOPTERUS, Faber, *Prodr. Isl. Orn.*, p. 91; Dress., *l. c.* VIII, p. 439, pl. 606; Dubois, *l. c.* II, p. 580, pl. 290; *glaucoides*, Mey.; *arcticus*, Macg.; *islandicus*, Edm. (pt.); *minor*, *subleucopterus*, Brm.; *glacialis*, Bruch; *chalcopterus*, Licht. — Ile Jean Mayen, Groenland, Amér. N.-E., Islande, Europe W. (rare au S. du 60° l. N.)

## 1898. GABIANUS

*Gabianus*, Bruch (1853).

11.814. PACIFICUS (Lath.), *Ind. Orn.*, *Suppl.*, p. 68; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 19; Schl., *l. c.*, p. 7; *frontalis*, *leucomelas*, Vieill.; *bathyrinchus*, Macg.; *georgii*, King. — Australie, Tasmanie.

## 1899. LEUCOPHÆUS

*Leucophæus*, Bruch (1853); *Procellarus*, *Epitelarus*, Bp. (1854).

11.815. SCORESBYI (Traill.), *Mem. Wern. Soc.* IV, p. 514; Schl., *l. c.*, p. 33; Oust., *Miss. Sc. Cap Horn*, VI, p. 179, pl. 3; *hæmatorhynchus*, Vig.; Jard. et Sel., *Ill. Orn.* II, pl. 106; *neglectus*, Bp. — Patagonie, Magellan, Cap Horn, Malouines, île Chiloë.

## 1900. PAGOPHILA

*Pagophila*, Kaup (1829); *Cetosparactes*, Macg. (1842); *Catosparactes*, Gray (1846); *Gavia* (pt.), auct. plur.

11.816. EBURNEA (Phipps), *Voy. N. Pole, App.*, p. 187; Dress., *l. c.* VIII, p. 549, pl. 595; Dubois, *l. c.* II, p. 610, pl. 299; *candidus*, Müll.; *niveus*, Bodd.; *albus*, Schäff.; *brachytarsus*, Holb. — Zone arctique, Europe N.-W. et Amérique N.-E.

Digitized by Google

### 1901. RISSA

*Rissa*, Steph. (1826); *Cheimonea*, Kp. (1829); *Laroides*, Brm. (1830).

11.817. TRIDACTYLA (Lin.); Dress., *l. c.* VIII, p. 447, pl. 593; Dubois, *l. c.* II, p. 606, pl. 298; *L. rissa* et *nævius*, L.; *riga*, Gm.; *torquatus*, *gavia*, Pall.; *brunnichii*, Steph.; *minor*, *borealis*, Brm.; *cinerea*, Eyt.; *kotzebui*, Bp.; *pollicaris*, Stejn. — Zone arctique jusqu'au 80° l. N., descend en hiver jusqu'au 30° l. N.

11.818. BREVIROSTRIS (Bruch), *J. f. O.*, 1855, p. 103; Baird, Br. et Ridgw., *Water-B. N. Am.* II, p. 207; *brachyrhynchus*, Gould (nec Rich.); *nivea*, Gr. (nec L., nec Pall.); Ell., *New and Unf. B. N. Am.* II, pl. 54; *citrirostris*, Bruch; *warnecki*, Coinde. — Mer de Behring, Kamtschatka, îles Aléoutes et Prybiloff.

## FAM. III. — STERCORARIIDÆ

### 1902. MEGALESTRIS

*Catharacta*, Brünn. (1764, nec Moehr., 1752); *Lestris* (pt.), Illig. (1811); *Catâractes*, Flem. (1822); *Megalestris*, Bp. (1856); *Buphagus*, Coues (1863).

11.819. SKUA (Brünn.), *Orn. Bor.*, p. 33; Coues, *B. N.-West.*, p. 604; *fuscus*, Briss.; *catarrhactes*, L.; Dress., *B. Eur.* VIII, p. 457, pl. 609; Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* II, p. 611, pl. 300; *vulgaris*, Flem.; *pomarinus*, Vieill. (nec Tem.); *minor*, Brm. — Europe N.-W., Islande, Groenland, Amérique N.-E.

11.820. CHILENSIS (Bp.), *Consp. Av.* II, p. 207; Saund., *P. Z. S.*, 1876, p. 323, pl. 24; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 458; *antarcticus*, Gay (nec Less.); *catarractes*, Licht. (nec L.) — Côtes de l'Amér. mér., de Rio-de-Janeiro à Magellan et de là au Pérou.

11.821. ANTARCTICA (Less.), *Traité d'Orn.*, p. 616; Bull., *B. N. Zeal.*, ed. 2, II, p. 65; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag.*, *Ois.*, p. 643; *catarrhactes*, auct. plur. (nec L.); Gould, *B. Austr.* VII, pl. 21. — Iles de l'océan antarct.: des Malouines aux Kerguelen et Nouv.-Zél., Madagascar.

3262. *Var.* MACCORMICKI, Saund., *Bull. Br. Orn. Club*, III, 1893, p. 12; id., *Cat.*, p. 321, pl. 1. — Zone antarctique du 71° au 76° l. S.

### 1903. STERCORARIUS

*Stercorarius*, Briss. (1760); *Lestris* (pt.), Illig. (1811); *Labbus*, Rafin. (1815); *Prædatrix*, Vieill. (1816); *Oceanus*, Kaup (1816); *Coprotheres*, Rchb. (1852).

11.822. POMARINUS (Tem.), *Man. d'Orn.*, p. 514 (1815); Dubois, *l. c.* II, p. 615, pl. 301; *parasiticus*, Mey. et W. (nec L.); *parasita*, *var. camtschatica*, Pall.; *sphæriuros*, Brm.; *striatus*, Eyt.; *pomatorhinus*, Scl., *Ibis*, 1862, p. 297; Dress., *l. c.* VIII, p. 463, pl. 595; *pomarhinus*, Prey. — Zone pol. arct. jusqu'au 82° l. N.; en hiver sur presque toutes les côtes jusqu'au Pérou, l'Afrique et l'Australie.



Digitized by Google

11.823. CEPPHUS (Brünn.), *Orn. Bor.*, p. 36 (1764); *coprotheres*, Brünn., *l. c.*, p. 38; *crepidatus*, Banks; Dress., *l. c.* VIII, p. 471, pl. 596 et 597, f. 2; Dubois, *l. c.*, II, p. 619, pl. 302; *parasiticus*, Bodd. et auct. plur. (nec L.); *boji*, *schleepi*, *benickii*, Brm.; *richardsoni*, Sw.; Audub., *B. N. Am.* VII, p. 190, pl. 452; *spinicauda*, Hardy; *thuliaca*, Prey.; *tephras*, Malmgr.; *asiaticus*, Hume. — Zone pol. arct. jusqu'au 82° l. N.; en hiver jusque sur les côtes du Brésil, du S. de l'Afrique et de la Nouvelle-Zélande.

11.824. PARASITICUS, Lin. (1758); Dress., *Birds Eur.* VIII, p. 481, pl. 97, f. 1; *longicauda*, Briss., *Orn.* VI, p. 155 (1760); Dubois, *l. c.* II, p. 622, pl. 303; *cepphus*, auct. plur. (nec Brünn.); *buffonii*, Boie; *microrhynchos*, Brm.; *lessoni*, Less.; *longicaudata*, Rchb.; *hardyi*, Bp. — Zone pol. arct. jusqu'au 80° l. N.; dépasse rarement en hiver le 40° l. N.

# ORD. XVII. — TUBINARES (1)

## FAM. I. — PROCELLARIIDÆ

### 1904. PROCELLARIA

*Procellaria*, Lin. (1758); *Hydrobates*, Boie (1822); *Thalassidroma*, Vig. (1825).

11.825. PELAGICA, Lin.; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 658, pl. 305; Dress., *B. Eur.* VIII, p. 491, pl. 599, f. 1; *pelagina*, Kuhl; *foeroensis*, Brm.; *melitensis*, Schembri; *lugubris*, Natt.; *minor*, Kjærb.; *tenuirostris* et *albifasciata*, Brm. — Europe N.-W. jusqu'au 69° l. N. et vers le S. jusqu'à la Méditerranée et l'Afrique occid.

11.826. TETHYS, Bonap., *J. f. O.*, 1855, p. 47; id., *Consp.* II, p. 197; Salv., *Trans. Z. S.* IX, p. 507, pl. 88, f. 2; id., *Cat.*, p. 346. — Iles Galapagos et côtes occid. de l'Amérique méridionale.

### 1905. HALOCYPTENA

*Halocyptena*, Coues (1864).

11.827. MICROSOMA, Coues, *Pr. Ac. Philad.*, 1864, pp. 79, 90; Ell., *B. of N. Amer.* II, pl. 61, f. 2; Salv., *Cat.*, p. 346. — Amérique W., de la Basse-Californie à Panama.

### 1906. OCEANODROMA

*Oceanodroma*, Rchb. (1852); *Cymochorea*, Coues (1864).

11.828. LEUCORRHOA (Vieill.), *N. Dict.* XXV, p. 422; Schl., *Mus. P.-B.*, *Procellariæ*, p. 3; Dress., *l. c.* VIII, — Mers de l'hémisphère boréale.

(1) Voy. : Osb. Salvin, *Catalogue of the Birds Brit. Mus.* XXV, pp. 340-458 (1896).

Digitized by Google

p. 497, pl. 399, f. 2; Dubois, *l. c.* II, p. 642, pl. 306; *leachi*, Tem.; Gould, *B. Eur.* V, pl. 447; *bullocki*, Flem.; *scapulata*, Kittl.

3263. *Var.* KAEDINGI, Anth., *Auk*, 1898, p. 37. — Iles Socorro, Clarion, Basse-Californie.

11.829. CASTRO (Harc.), *A Sketch of Madeira*, pp. 123, 166 (1851); id., *Ann. Mag. N. H.*, 1855, p. 456; Grant, *Ibis*, 1898, p. 314; *cryptoleucura*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1882, p. 537; Salv., *Cat.*, p. 550. — Iles du Cap Vert, S. de l'Atlantique jusqu'à Madeire, Galapagos et iles Sandwich.

11.830. MACRODACTYLA, Bryant, *Bull. Calif. Ac. Sc.* II, p. 276; Salv., *Cat.*, p. 551. — Ile Guadalupe, Basse-Californie.

11.831. SOCORROENSIS, Towns., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1890, p. 134; Salv., *l. c.*, p. 552. — Ile Socorro (Mexique).

11.832. FULIGINOSA (Gm.), *S. N.* I, p. 562; Stejn., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1893, p. 620; Salv., *l. c.*, p. 552. — Mers du Japon.

11.833. MELANIA (Bonap.), *C. R.* XXXVIII, p. 662; id., *Consp.* II, p. 196; Ell., *B. N. Am.* II, pl. 61, f. 1; *townsendi*, Ridgw. — Californie.

11.834. MARKHAMI (Salv.), *P. Z. S.*, 1883, p. 430; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 462; Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 71. — Pérou.

11.835. TRISTRAMI, Stejn., *MS.*; Salv., *Cat. Birds*, p. 554; *melania*, Seeb. (nec Bp.), *B. Jap. Emp.*, p. 270; *markhami*, Stejn., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1893, p. 621 (nec Salv.) — Japon.

11.836. HOMOCHROA (Coues), *Pr. Ac. Philad.*, 1864, pp. 77, 90; Baird., Br. et Ridgw., *Water-B. N. Am.* II, p. 411; *melania*, Lawr. — Californie.

11.837. MONORHIS (Swinh.), *Ibis*, 1867, p. 386, 1869, p. 348; David et Oust., *Ois. Chine*, p. 515; Salv., *Cat.*, p. 556, pl. 2. — Chine et Japon.

11.838. HORNBYI (Gray), *P. Z. S.*, 1855, p. 62; Bp., *Consp.* II, p. 195; Salv., *Cat.*, p. 556, pl. 3. — Amérique N.-W.

11.839. FURCATA (Gm.), *S. N.* I, p. 561; Gould, *Zool. Voy. Sulphur*, p. 50, pl. 33; Gray, *Gen. B.* III, pl. 178; Schl., *l. c.*, p. 3; *orientalis*, Pall. — N. du Pacifique, au S. jusqu'à l'Orégon.

## 1907. OCEANITES

*Oceanites*, Keys. et Blas. (1840); *Garrodia*, Forb. (1884).

11.840. OCEANICUS (Kuhl), *Beitr.*, p. 136; Bp., *Consp.* II, p. 199; Dress., *l. c.* VIII, p. 505, pl. 614; *wilsoni*, Bp.; Audub., *B. N. Am.* VIII, p. 106, pl. 460; Dub., *Ois. Eur.* II, p. et pl. 164. — Océans Atlantique et Indien jusqu'aux mers antarct., Australie, Nouv.-Zél.

Digitized by Google

11.841. GRACILIS (Ell.), *Ibis*, 1859, p. 391; Coues, *Pr. Ac. Phil.*, 1864, p. 85; *wilsoni*, Gigl. (nec Bp.) — Côtes occid. de l'Amérique méridionale.

11.842. NEREIS (Gould), *P. Z. S.*, 1840, p. 178; id., *B. Austr.* VII, pl. 64; Cab., *J. f. O.*, 1875, p. 449. — Des îles Kerguelen à la Nouv.-Zélande et les îles Malouines.

### 1908. PELAGODROMA

*Pelagodroma*, Rchb. (1852); *Pealea*, Ridgw. (1886).

11.843. MARINA (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 826; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 250, pl. 292; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 61; *hypoleuca*, Moq.-Tand.; *fregata*, Bp.; Schl., *l. c.*, pp. 5, 6; *æquorea*, Sol. — Mers australes au N. jusqu'aux Canaries (accid. Gr. Bret. et Massachusetts.)

11.844. LINEATA (Peale), *U. S. Expl. Exp.* VIII, pp. 293, 337, pl. 79 (1848); Cass., *Op. cit.*, ed. 2, p. 403, pl. 59; Salv., *Cat.*, p. 364. — Upolu (îles Samoa).

### 1909. FREGETTA

*Fregetta*, Bonap. (1855); *Cymodroma*, Ridgw. (1884).

11.845. MELANOGASTER (Gould), *Ann. and Mag. N. H.*, 1844, XIII, p. 367; id., *B. Austr.* VII, pl. 62; Bp., *Consp.* II, p. 198; *tropica*, Gould, *Ann. Mag. N. H.*, 1844, p. 366. — Mers australes, dans l'Atlantique jusqu'au 10° l. N.

11.846. GRALLARIA (Vieill.), *N. Dict.* XXV, p. 418; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 459; *fregetta*, Gray; *leucogaster*, Gould, *B. Austr.* VII, pl. 63; *segethi*, Phil. et Landb.; ? *fregata*, L.; ? *lawrencii*, Bp. — Mers australes, au N. jusqu'en Floride.

11.847. ALBIGULARIS (Finsch), *P. Z. S.*, 1877, p. 722; Salv., *P. Z. S.*, 1879, p. 130; *tropica*, Bp. (nec Gould); *torquata*, Gray (nec Macg.) — S. du Pacifique (Nouv.-Hébrides, Phœnix, etc.)

11.848. MOESTISSIMA, Salv., *P. Z. S.*, 1879, p. 130; id., *Cat.*, p. 367. — Iles Samoa.

## FAM. II. — PUFFINIDÆ

## SUBF. I. — PUFFININÆ

### 1910. PUFFINUS

*Puffinus*, Briss. (1760); *Nectris*, Kuhl (1820); *Thyellas*, Glog. (1827); *Thiellus*, Gray (1840); *Cymotomus*, Macg. (1842); *Ardenna*, Rchb. (1852); *Thyellodroma*, Stejn. (1888); *Zalias*, Heine (1890).

11.849. LEUCOMELAS, Tem., *Pl. Col.* 587; Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 131, pl. 85; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 461. — Côtes du Japon, Corée, Philipp., Moluques, Bornéo, Austral. N.

Digitized by Google

11.850. CUNEATUS, Salv., *Ibis*, 1888, p. 353; Seeb., *Ibis*, 1891, p. 191; *knudseni*, Stejn., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1888, p. 93. — N. du Pacif., des Sandwich au S. du Japon.

11.851. BULLERI, Salv., *Ibis*, 1888, p. 354; Bull., *B. N. Zeal.*, ed. 2, II, p. 240, pl. 41, f. 2; *zealandicus*, Sand. — Nouv.-Zélande.

11.852. CHLORORHYNCHUS, Less., *Tr. d'Orn.*, p. 612; M.-Edw. et Grand., *H. Mag., Ois.*, p. 680, pl. 297, 298; *sphenurus*, Gould; id., *B. Austr.* VII, pl. 58; *gama*, Bp.; *carneipes*, Cheesem. (nec Gould). — Océan Indien, Austr., N.-Zél. jusqu'aux îles Société, Pacifique centr.

11.853. GRAVIS (O'Reil.), *Voy. to Greenl.*, etc., p. 140, pl. 12, f. 1 (1818); Salv., *Cat.*, p. 373; *major*, Fab.; Gould, *B. Gr. Brit.* V, pl. 88; Dress., *B. Eur.* VIII, p. 527, pl. 616, f. 2; *cinereus*, Nutt.; Audub., *B. N. Am.* VII, p. 212, pl. 456. — Océan Atlantique, des îles Fœroé et Groenland au Cap Bonne-Espér., Malouines.

11.854. KUHLI (Boie), *Isis*, 1835, p. 257; Bp., *Consp.* II, p. 202; Dress., *l. c.* VIII, p. 513, pl. 615, f. 2; *cinereus*, Gould, *B. Eur.*, pl. 445; *flavirostris*, Gould; *macrorhyncha*, Heugl. — Méditerranée, océan Atlant., de Madeire aux Canaries, îles Kerguelen.

3264. *Var.* BOREALIS, Cory, *Bull. Nutt. Orn. Club*, 1881, p. 84; Bd., Br. et Ridgw., *Water-B. N. Am.* II, p. 379; *kuhli* (pt.), Salv. — Nouv.-Angleterre.

3265. *Var.* MARIÆ, Alex., *Ibis*, 1898, p. 93. — Iles du Cap Vert.

11.855. CREATOPUS, Coues, *Pr. Ac. Phil.*, 1864, pp. 131, 144; Bd., Br. et Ridgw., *Water-B. N. Am.* II, p. 383; Salv., *Cat.*, p. 376. — Amérique W. de Californie au Chili.

11.856. ANGLORUM, Briss. (1760); Tem. (1820); Dress., *l. c.* VIII, p. 517, pl. 613, f. 1; Dubois, *l. c.* II, p. 643, pl. 307; *arcticus*, Faber. — Atlantique, depuis l'Islande jusqu'au Brésil.

3266. *Var.* YELKOUANA, Salv., *Cat.*, p. 379; *yelkouan*, Acerbi, *Bibl. Ital.*, 1827, p. 294; Bp., *Consp.* II, p. 205; Degl. et Gerbe, *Orn. Eur.* II, p. 379; *anglorum* (pt.), auct. plur. — Méditerran. jusqu'aux côtes Britanniques.

11.857. OPISTHOMELAS, Coues, *Pr. Ac. Phil.*, 1864, pp. 139, 144; id., *Key N. Am. B.*, p. 331; Salv., *Cat.*, p. 380; *gavia*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1880, pp. 12, 230. — Basse-Californie, île Santa-Barbara.

11.858. AURICULARIS, Towns., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1890, p. 133; Salv., *Cat.*, p. 380. — Ile Clarion (Mex. W.)

11.859. NEWELLI, Hensh., *Auk*, 1900, p. 246. — Iles Sandwich.

11.860. GAVIA (Forst.), *Descr. An.*, p. 148; Hutt., *Ibis*, 1867, p. 189; Bull., *B. New-Zeal.*, ed. 2, II, p. 236; Salv., *Cat.*, p. 381. — Côtes de Nouv.-Zél. et d'Australie.

11.861. OBSCURUS (Gm.), *S. N.* I, p. 559; Salv., *Cat.*, p. 382 (pt.); Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.* VI, p. 194; *dichrous*, Hartl. et Fsch., *P. Z. S.*, 1872, p. 108; *opisthomelas, var. minor*, Hartl., *P. Z. S.*, 1867, — Océan Pacifique centr.: îles Fanning, Christmas, Pelew, Carolines (? Nouv.-Hé-

Digitized by Google

p.382; *tenebrosus*, Pelz. (ex Natt.), *Ibis*, 1873, p. 47. — brides et Samoa).

3267. *Var.* Subalaris, Ridgw. (ex Towns., *MS.*), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1896, p. 650; Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.* VI, p. 194; *tenebrosus*, Towns. (nec Pelz.); *obscurus* (pt.), Salv. — Iles Galapagos.

3268. *Var.* Auduboni, Fsch., *P.Z.S.*, 1872, p. 111; Bd., Br. et Ridgw., *Water-B. N. Am.* II, p. 386; *obscurus* (pt.), auct. plur.; Audub., *B. N. Am.* VII, p. 99, pl. 458. — Amérique N.-E., de Nouv.-Jersey à la Floride, Antilles, Bermudes.

3269. *Var.* Bailloni, Bp., *C. R. Ac. Sc.* XLII, p. 769; id., *Consp.* II, p. 205; *obscurus* (pt.), auct. plur.; *gama*, Hartl. (nec Bp.); *assimilis* (pt.), Salv. (nec Gould); *elegans*, Gigl. et Salvad., *Ibis*, 1869, p. 67; Salv., *l. c.*, p. 385; id., in *Rowl. Orn. Mis.* I, p. 256, pl. 54. — Côtes d'Afrique, îles Madeire, Canaries, du Cap Vert, Madagascar, Seychelles, Maurice, etc.

3270. *Var.* Assimilis, Gould, *P. Z. S.*, 1837, p. 156; id., *B. Austr.* VII, pl. 59; *nugax*, Bp. — Nouv.-Zélande, Australie.

11.862. persicus, Hume, *Stray F.* I, p. 5, V, p. 292, VIII, p. 115; Salv., *Cat.*, p. 381, pl. 4. — Golfe Persique.

11.863. carneipes, Gould, *P. Z. S.*, 1844, p. 57; id., *B. Austr.* VII, pl. 57; Bull., *B. New-Zeal.*, ed. 2, II, p. 234; Salv., *l. c.*, p. 385. — Nouv.-Zélande, Australie jusqu'au Japon.

11.864. griseus (Gm.), *S. N.* I, p. 564; Finsch, *J. f. O.*, 1874, p. 209; Dress., *B. Eur.* VIII, p. 523, pl. 616; *tristis*, Forst.; *fuliginosus* et *chilensis*, Bp.; *carneipes*, Schl. (nec Gould); *amaurosoma*, Coues. — Atlantique et Pacifique, au S. jusqu'à l'Australie et Magellan.

3271. *Var.* Fuliginosa, Strickl., *P. Z. S.*, 1852, p. 129; Degl. et Gerbe, *Orn. Eur.* II, p. 381; *stricklaudi*, Ridgw.; *griseus* (pt.), Salv. — Nord de l'Atlantique.

11.865. tenuirostris (Tem.), texte de la *Pl. Col.* 587; T. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 131, pl. 86; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 462; *brevicaudus*, Brandt; *curilicus*, Bp.; *brevicaudatus*, Fsch. — Austral. et Nouv.-Zél., au N. jusqu'au Japon et Alaska; Samoa.

3272. *Var.* Nativitatis (Streets), *Bull. U. S. Nat. Mus.*, n° 7, p. 29; Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 62; List., *P. Z. S.*, 1891, pp. 295, 300. — Pacifique centr. N., de Christmas aux îles Krusenst. et Phœnix

11.866. ? munda, Kuhl, *Beitr. Zool. Procel.*, p. 148; Bp., *Consp.* II, p. 205; Banks, *Icon.*, pl. 24. — Océan Pacifique.

## 1911. PRIOFINUS

*Priofinus*, Hombr. et Jacq. (1844); *Adamastor*, Bp. (1855).

11.867. cinereus (Gm.), *S. N.* I, p. 563; Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, *Aves*, pl. 56; ? *gelida*, Gm.; *melanura*, Vieill.; *hæsitata*, Forst. (nec Kuhl); Gould, *B. Austr.* VII, pl. 47; *typus*, Bp.; *kuhli*, Cass.; *adamastor*, Schl., *Mus. P.-B.*, *Procel.*, p. 23. — Mers australes.

Digitized by Google

### 1912. THALASSOECA

*Thalassœca*, Rchb. (1852) ; *Aeipetes*, Forb. (1882).

11.868. ANTARCTICA (Gm.), *S. N.* I, p. 565 ; Schl., *l. c.*, p. 15 ; Bull., *B. N.-Zeal.*, ed. 2, II, p. 229 ; Sharpe, *Voy. Ereb. and Terr.*, *Birds*, *App.*, p. 57, pl. 33. — Mers australes.

### 1913. PRIOCELLA

*Priocella*, Hombr. et Jacq. (1844).

11.869. GLACIALOIDES (Smith), *Ill Zool. S. Afr.*, *Av.*, pl. 51 ; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 48 ; *glacialis*, *var.* β, Gm. ; *antarcticus*, Steph. (nec Gm.) ; *tenuirostris*, Audub. (nec Tem.) ; *garnoti*, Hombr. et J., *Voy. Pôle S.* III, p. 148, pl. 32 ; *polaris*, Bp. ; *smithi*, Schl., *l. c.*, p. 22. — Mers australes, dans le Pacifique jusqu'aux côtes N.-W. des États-Unis.

### 1914. MAJAQUEUS

*Majaqueus*, Rchb. (1852) ; *Cymatobulus*, Heine (1890).

11.870. ÆQUINOCTIALIS (Lin.) ; Burm., *S. U. Thiere Bras.* III, p. 445 ; Schl., *l. c.*, p. 18 ; M.-Edw. et Grand., *H. Madag.*, *Ois.*, p. 671 ; *nigra*, Forst. — Mers australes, au N. jusqu'au 30° l. S. environ.

3273. *Var.* CONSPICILLATA (Gould), *Ann. Mag. N. H.*, 1844, p. 362 ; id., *B. Austr.* VII, pl. 46 ; Schl., *l. c.*, p. 20 ; *æquinoctialis* (pt.), Salv. — Mers australes.

11.871. PARKINSONI (Gray), *Ibis*, 1862, p. 245 ; Coues, *Pr. Ac. Phil.*, 1866, p. 192 ; Salv., *Cat.*, p. 397, pl. 5. — Mers de la Nouv.-Zélande.

### 1915. OESTRELATA

*Æstrelata*, *Cookilaria*, *Pterodroma*, Bonap. (1855) ; *OEstrelata*, Newt. (1870).

11.872. MACROPTERA (Smith), *Ill. Zool. S. Afr.*, *Av.*, pl. 52 ; Coues, *Pr. Ac. Phil.*, 1866, pp. 155, 171 ; *fuliginosa*, Kuhl et auct. plur. (nec Gm.) ; Schl., *l. c.*, p. 8 ; *atlantica*, Gd. ; *pacificus*, Gray ; *gouldi*, Hutt. — Mers australes.

11.873. ATERRIMA (Bp.), *C. R.* XLII, p. 768 ; id., *Consp. Av.* II, p. 191 ; Schl., *l. c.*, p. 9 ; Coues, *l. c.*, pp. 158, 171. — Iles Mascareignes (océan Indien W.)

11.874. LESSONI (Garnot), *Ann. Sc. Nat.*, 1826, p. 54, pl. 4 ; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 49 ; *sericeus*, Less. ; *leucocephala*, Forst. — Côtes de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande.

11.875. HÆSITATA (Kuhl), *Beitr.*, p. 142 ; Tem., *Pl. Col.* 416 ; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 47 ; *diabolica*, Lafr. ; *meridionalis*, Lawr. ; *rubritarsi*, Gould. — Mer des Antilles.

Digitized by Google

11.876. JAMAICENSIS (Bancr.), *Zool. Journ.*, 1826, p. 81; Newt., *Handb. Jamaica*, p. 117; *caribbæa*, Carte, *P. Z. S.*, 1866, p. 93, pl. 10; Gigl. et Salvad., *Ibis*, 1869, p. 66. — Jamaïque.

11.877. ROSTRATA (Peale), *U. S. Expl. Exp.* VIII, pp. 296, 338, pl. 82; Bp., *Consp.* II, p. 189; Salv., *Cat.*, p. 404. — Pacifique central (Tahiti).

11.878. PARVIROSTRIS (Peale), *U. S. Expl. Exp.* VIII, pp. 298, 338, pl. 83; Coues, *Pr. Ac. Phil.*, 1866, pp. 146, 170; Salv., *l. c.*, p. 405. — Pacifique central (Phœnix).

11.879. INCERTA (Schl.), *Mus. P.-B., Procel.*, p. 9; Coues, *l. c.*, pp. 147, 170; Bull., *B. New Zeal.*, ed. 2, II, p. 220; *inexpectata*, Bp. (nec Forst.) — Sud de l'Atlantique (Cap Bonne-Espér.)

11.880. MOLLIS (Gould), *Ann. Mag. N. H.*, 1844, p. 363; id., *B. Austr.* VII, pl. 50; *philippi*, Saund. (nec Gray); ?*melanopus*, Gm. — Mers australes, au N. de l'Atlant. jusqu'à Madeire.

3274. *Var.* FEÆ, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* XX (1899), p. 305; id., *Ibis*, 1900, p. 302. — Iles du Cap Vert.

11.881. MAGENTÆ, Gigl. et Salvad., *Ibis*, 1869, pp. 61, 66; Salv., in *Rowl. Orn. Misc.* I, p. 251, pl. 30; id., *Cat.*, p. 407. — Sud du Pacifique.

3275. *Var.* WORTHENI, Rothsch., *Bull. B. O. Club*, XII, p. 62. — Pacifique (Galapagos).

11.882. PHÆOPYGIA, Salv., *Trans. Zool. Soc.* IX, p. 507, pl. 88, f. 1; id., *Cat.*, p. 407; ?*alba*, Bloxh.; ?*rostrata*, Mosel.; *sandwichensis*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1886, p. 95. — Pacifique, des îles Galapagos aux Sandwich.

11.883. BREVIPES (Peale), *U. S. Expl. Exp.* VIII, pp. 294, 337, pl. 80; Stejn., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1893, p. 617; *torquata*, Macg.; *cooki*, Cass.; *desolata*, Schl., *l. c.*, p. 13; *aneiteimensis*, Gray; *leucoptera*, Salv., *Ibis*, 1876, p. 393; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 466. — Pacifique W.: Nouv.-Hébrides, Fidji jusqu'au 68° lat. S. (accid. Europe).

3276. *Var.* HYPOLEUCA, Salv., *Ibis*, 1888, p. 359; id., *Cat.*, p. 409; Seeb., *B. Japan. Emp.*, p. 269. — N. du Pacif. (îles Bonin, Krusenst., Japon).

11.884. NIGRIPENNIS, Rothsch., *Bull. B. O. Club*, 1893, p. 57; id., *Ibis*, 1893, p. 371; Salv., *Cat.*, p. 409; *cooki*, Cheesem. (nec Gray). — Sud du Pacifique (îles Kermadec).

11.885. BREVIROSTRIS (Less.), *Tr. d'Orn.*, p. 611; Salv., in *Rowl. Orn. Misc.* I, p. 235; *lugens*, Banks (apud Kuhl); *grisea*, Kuhl (nec Gm.); Schl., *l. c.*, p. 12; *unicolor*, *macroptera*, Bp. (nec Smith); *kidderi*, Coues; *mollis*, Cab. et Rchw. (nec Gould). — Sud de l'Atlantique et de l'océan Indien.

11.886. SOLANDERI (Gould), *P. Z. S.*, 1844, p. 57; id., *Handb. B. Austr.* II, p. 450; Salv., *Cat.*, p. 410; *melanopus*, Natt. (nec Gm.) — Côtes de l'Australie.

Digitized by Google

11.887. EXTERNA, Salv., *Ibis*, 1875, p. 373; id., *Cat.*, p. 411; Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 68. — Côtes du Chili (île Masafuera).

3277. *Var.* CERVICALIS, Salv., *Ibis*, 1891, p. 192; id., *Cat.*, p. 411, pl. 6. — Sud du Pacifique (îles Kermadek).

11.888. NEGLECTA (Schl.), *Mus. P.-B., Procel.*, p. 10; Coues, *l. c.*, pp. 147, 170; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 465; ? *alba*, Gm.; ? *grisea*, ? *variegata*, Bonn.; *raoulensis*, Bp. (*descr. nulla*); *philippi*, Gray; *mollis*, Finsch (nec Gould); *leucophrys*, Hutt., *P. Z. S.*, 1895, p. 752, pl. 65. — Sud du Pacifique (îles Kermadek, Juan Fernandez).

11.889. ARMINJONIANA, Gigl. et Salvad., *Ibis*, 1869, pp. 62, 66; Salv., in *Rowl. Orn. Misc.* I, pp. 234, 252, pl. 31; *sandaliata*, Sol.; *mollis*, Saund. (nec Gould). — Sud de l'Atlantique (île Trinidad).

3278. *Var.* WILSONI, Shpe. *Bull. B. O. Club*, XII, p. 49. — S. de l'Atl. (Trinidad).

11.890. TRINITATIS, Gigl. et Salvad., *Ibis*, 1869, p. 65; Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 67; Salv., in *Rowl. Orn. Misc.* I, p. 253, pl. 32. — Sud de l'Atlantique (Trinidad).

11.891. HERALDICA, Salv., *Ibis*, 1888, p. 357; id., *Cat.*, p. 414; *leucoptera*, Schl. (nec Gould); *philippi*, Gray (1871, nec 1862). — Pacifique W. (îles Chesterfield).

11.892. GULARIS (Peale), *U. S. Expl. Exp.*, p. 299; Bp., *C. R.* XLII, p. 768; *mollis*, Cass. (nec Gd).; *affinis*, Bull.; id., *B. New Zeal.*, ed. 2, II, p. 225, pl. 41. — Mers australes (Nouv.-Zélande).

11.893. FISHERI, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1882, p. 656; id., *Auk*, 1895, p. 319, pl. 4; Salv., *l. c.*, p. 415. — Nord du Pacifique (Alaska).

3279. ? *Var.* SCALARIS, Brewst., *Auk*, 1886, p. 390, Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 68; *gularis*, Brewst. (1881). — ? (accid. New-York.)

11.894. LEUCOPTERA (Gould), *P. Z. S.*, 1844, p. 57; id., *Handb. B. Austr.* II, p. 454; *cooki*, Gould, *B. Austr.* VII, pl. 51 (nec Gr.) — Australie E.

3280. *Var.* DEFILIPPIANA, Gigl. et Salvad., *Ibis*, 1869, pp. 65, 66; Salv., in *Rowl. Orn. Misc.* I, p. 255, pl. 33. — Pacifique (côtes du Chili).

11.895. COOKI (Gray), in *Dieffenb. N. Zeal.* II, p. 99; id., *Voy. Ereb. and Terr.* I, *Birds*, p. 17, pl. 35; Bull., *B. New-Zeal.*, p. 307; *velox*, Bp. — Nouv.-Zélande.

11.896. LONGIROSTRIS, Stejn., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1895, p. 618; Salv., *l. c.*, p. 418; *leucoptera*, Stejn. (1891). — Pacifique N. (Japon).

11.897. AXILLARIS, Salv., *Ibis*, 1893, p. 264; id., *Cat.*, p. 418, pl. 7. — Iles Chatham.

## 1916. PAGODROMA

*Pagodroma*, Bonap. (1855).

11.898. NIVEA (Gm.), *S. N.* I, p. 562; Bp., *Consp. Av.* II, — Mers australes.



Digitized by Google

p. 192; Sharpe, *Voy. Ereb. and Terr.* I, *Birds, App.*, p. 37, pl. 34; *candida*, Peale; *major, minor* et *nævia*, Bp.; *novægeorgica*, Stein.

### 1917. BULWERIA

*Bulweria*, Bonap. (1842).

11.899. COLUMBINA (Webb et Berth.), *H. N. Canar.* II, p. 44, pl. 4, f. 2; Dress., *B. Eur.* VIII, p. 551, pl. 614; *bulweri*, Jard. et Sel., *Ill. Orn.* II, pl. 65. — Zone tempérée bor. de l'Atlantique et du Pacifique.

11.900. MACGILLIVRAYI (Gray), *Cat. B. trop. Is. Pac.*, p. 56; Fsch. et Hartl., *Faun. Centralpol.*, p. 242. — Océan Pacifique centr. (Fidji).

## SUBF. II. — FULMARINÆ

### 1918. OSSIFRAGA

*Ossifraga*, Hombr. et Jacq. (1844).

11.901. GIGANTEA (Gm.), *S. N.* I, p. 563; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 45; Schl., *l. c.*, p. 18; *ossifraga*, Forst. — Mers australes, au N. jusqu'au 30° l. S.

### 1919. FULMARUS

*Fulmarus*, Steph. (1826); *Rhantistes*, Kp. (1829); *Wagellus*, Gray (1840).

11.902. GLACIALIS (Lin.); Dress., *l. c.* VIII, p. 535, pl. 617; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 653, pl. 304; *hiemalis, borealis*, Brm.; *minor*, Bp. — Atlantique du 80° au 50° l. N.

3281. *Var.* COLUMBA, Anth., *Auk*, 1895, p. 105. — Côtes de Californie.

3282. *Var.* GLUPISCHA, Stejn., *Auk*, 1884, p. 234; id., *Bull. U. S. Nat. Mus.*, n° 29, p. 91, pl. 6, ff. 1, 2; *glacialis*, Pall. (nec L.); *pacifica*, Aud. et auct. plur. (nec Gm.) — Nord du Pacifique, au S. jusqu'aux côtes occid. du Mexique.

3283. *Var.* RODGERSI, Cass., *Pr. Ac. Phil.*, 1862, p. 290; Baird, *Trans. Chic. Ac. Sc.*, 1869, p. 323, pl. 34, f. 1; Coues, *Check-l. N. Am. B.*, p. 125; Nels., *Rep. N. H. Alaska*, p. 62, pl. 2, f. 2. — Nord du Pacifique jusqu'au détroit de Béhring.

### 1920. DAPTION

*Daption*, Steph. (1826); *Calopetes*, Sund. (1872); *Daptrion*, Tacz. (1886).

11.903. CAPENSIS (Lin.); Gould, *B. Austr.* VII, pl. 53; Schl., *l. c.*, p. 14; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 465; *punctata*, Ellm. — Mers australes (accid. Ceylan et Pérou).

Digitized by Google

### 1921. HALOBÆNA

*Halobæna*, Is. Geoffr. St-Hil. (1836); *Zaprium*, Coues (1875).

11.904. CÆRULEA (Gm.), *S. N.* I, p. 560; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 52; Bp., *C. R.* XLII, p. 768; *forsteri*, Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 54 (nec Lath.); *similis*, Forst.; *typica*, Bp. — Mers australes, du 40° au 60° l. S.

### 1922. PRION

*Prion*, Lacép. (1801); *Pachyptila*, Illig. (1811); *Priamphus*, Rafinesq. (1815); *Pseudoprion*, Coues (1866).

11.905. VITTATUS (Gm.), *S. N.* I, p. 560; Schl., *l. c.*, p. 16; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 55; *forsteri*, Lath.; *latirostris*, Bonn.; *magnirostris*, Gould; *australis*, Potts. — Mers australes du 60° au 42° l. S.

11.906. BANKSI, Gould, *Ann. Mag. N. H.*, 1844, p. 366; Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 55; Schl., *l. c.*, p. 17; *rossii*, Gray. — Mers australes jusque près de l'Équateur.

11.907. DESOLATUS (Gm.), *S. N.* I, p. 562; Salv., *P. Z. S.*, 1878, p. 738; *turtur*, Banks; Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 54; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 54; *fasciata*, Bonn. — Mers australes entre le 35° et le 66° l. S.

11.908. ARIEL, Gould, *Ann. Mag. N. H.*, 1844, p. 366; id., *Handb. B. Austr.* II, p. 473; Schl., *l. c.*, p. 18; *brevirostris*, Gould, *P. Z. S.*, 1855, p. 88, pl. 93. — Mers australes du 35° au 66° l. S. (accid. Madeire).

## FAM. II. — HALODROMIDÆ

### 1923. HALODROMA

*Pelecanoides!*, Lacép. (1801); *Haladroma*, Illig. (1811); *Puffinuria*, Less. (1826); *Halodroma*, Sund (1872).

11.909. URINATRIX (Gm.), *S. N.* I, p. 560; Schl., *l. c.*, p. 37; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 60; *berardi*, Tem., *Pl. Col.* 517; *tenuirostris*, Eyt.; *tridactyla*, Forst. — Australie, Nouv.-Zélande, Malouines, cap Horn (côtes).

3284. *Var.* EXSUL (Salv.), *Cat.*, p. 439; *urinatrix* (pt.), auct. plur. — Sud de l'océan Indien (des îles Crozettes aux Kerguelen).

11.910. GARNOTI (Less.), *Voy. Coquille*, I, 2, p. 730, pl. 46; Tschudi, *Faun. Per., Orn.*, p. 54; Schl., *l. c.*, p. 37; Tacz., *Orn. Pérou*, III, p. 465. — S.-E. du Pacifique (Pérou, Chili).

Digitized by Google

## FAM. III. — DIOMEDEIDÆ

### 1924. DIOMEDEA

*Diomedea*, Lin. (1766); *Phabastria, Thalassarche*, Rchb. (1852); *Thalassogeron*, Ridgw. (1884).

11.911. EXULANS, Lin.; *Pl. Enl.* 237; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 254, pl. 295; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 627, pl. 305[b]; *spadacea*, Gm.; *epomophera*, Less.; *albatros*, Forst.; *adusta*, Tsch. — Mers australes (accid. au N. de l'Équateur, Belgique).

3285. *Var.* REGIA, Bull., *Trans. N. Zeal. Inst.*, 1891, p. 250; *exulans* (pt.), Bull. (1890). — Sud du Pacifique (Nouv.-Zélande).

3286. *Var.* CHIONOPTERA, Salv., *Cat.*, p. 445; Hall, *Ibis*, 1900, p. 12; *exulans* (pt.), auct. plur. — S. de l'Océan Ind. (îles Marion et Kerguel.)

11.912. ALBATRUS, Pall., *Spic. Zool.* V, p. 28; id., *Zoogr.* II, p. 308; *Pl. Enl.* 963; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 516; *chinensis*, Tem.; *brachyura*, Tem., *Pl. Col.* 554; Schl., *l. c.*, p. 32; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 59; *derogata*, Swinh., *P. Z. S.*, 1873, p. 786. — Nord du Pacifique.

11.913. IRRORATA, Salv., *P. Z. S.*, 1885, p. 450; id., *Cat.*, p. 445, pl. 8; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 461. — Côtes du Pérou et des Galapagos.

11.914. NIGRIPES, Audub., *Orn. Biogr.* V, p. 327; id., *B. Amer.* VII, p. 198; Cass., *B. Calif., Tex.*, p. 210, pl. 59; Schl., *l. c.*, p. 33; *brachyura*, auct. plur. (nec Tem.); *chinensis*, Rothsch. (nec Tem.) — N. du Pacifique (île Laysan, Basse-Californie).

11.915. IMMUTABILIS, Rothsch., *Bull. Br. Orn. Club*, I, p. 48; id., *Ibis*, 1893, p. 448; id., *Avif. of Laysan*, etc., p. 57, pl. — Ile Laysan et îles voisines.

11.916. MELANOPHRYS, Tem., *Pl. Col.* 456; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 43; Schl., *l. c.*, p. 33; *gilliana*, Coues. — Mers australes (accid. N. de l'Atlantique).

11.917. BULLERI, Rothsch., *Bull. Br. Orn. Club*, I, p. 58; id., *Ibis*, 1893, p. 572; Salv., *Cat.*, p. 448; *culminata*, Bull. (nec Gould). — Côtes de la Nouvelle-Zélande.

11.918. PLATEI, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1898, p. 190; id., *J. f. O.*, 1899, p. 119. — Côtes du Chili.

11.919. CAUTA, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 177; id., *B. Austr.* VII, pl. 40; Schl., *l. c.*, p. 34; Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 53. — Côtes de Tasmanie.

3287. *Var.* SALVINI (Rothsch.), *Bull. Br. Orn. Club*, I, p. 58; id., *Ibis*, 1893, p. 572; *cauta*, Bull. (nec Gould). — Côtes de la Nouvelle-Zélande.

3288. *Var.* LAYARDI (Salv.), *Cat. B. Br. Mus.* XXV, p. 450. — Cap Bonne-Espérance.

11.920. CULMINATA, Gould, *Ann. Mag. N. H.*, 1844, p. 361; id., *B. Austr.* VII, pl. 41; Schl., *l. c.*, p. 35; *chlororhynchos*, Audub. (nec Gm.) — Mers australes jusqu'aux côtes de l'Amér. centr. W.

Digitized by Google

11.921. CHLORORHYNCHA, Gm., *Syst. Nat.* I, p. 568; Tem., *Pl. Col.* 468; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 42; *chrysostoma*, Forst.; *olivaceorhyncha*, Gould; *olivaceirostris*, Bp., *profuga*, Gray. — Mers australes.

3289. *Var.* EXIMIA (Verrill), *Tr. Connect. Ac.*, 1895, p. 440, pl. 8, ff. 1, 2. — Sud de l'Atlantique (île Gough).

### 1925. PHOEBETRIA

*Phœbetria*, Rchb. (1852).

11.922. FULIGINOSA (Gm.), *S. N.* I, p. 568; Tem., *Pl. Col.* 469; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 44; *spadacea*, Less.; *fusca*, Audub.; *palpebrata*, Forst.; *var. cornicoides*, Hutt.; *antarctica*, Sol. (1). — Mers australes.

# ORD. XVIII. — PYGOPODES (2)

## FAM. I. — COLYMBIDÆ

### 1926. COLYMBUS

*Colymbus*, Lin. (pt., 1758); *Gavia*, Forst. (1788, nec Gm., 1770); *Urinator*, Cuv. (1799); *Eudytes*, Ill. (1811).

11.923. SEPTENTRIONALIS, Lin.; Dress., *B. Eur.* VIII, p. 621, pl. 628; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 678, pl. 315; *lumme*, Gunn.; *borealis* et *stellatus*, Brünn.; *claudicans*, Scop.; *nævia*, Tunst.; *striatus*, *bailloni*, Lac. et Daud.; *rufogularis*, Mey. et Wolf.; *microrhynchus*, Brm. — Zone polaire arctique, en hiver jusqu'au 35° latit. N.

11.924. ARCTICUS, Lin. (1758); Dress., *l. c.* VIII, p. 615, pl. 627; Dubois, *l. c.* II, p. 674, pl. 314; *ignotus*, *leucopus*, Bechst.; *atrogularis*, Mey. et Wolf; *balthicus*, Horn. et Schil.; *macrorhynchus*, Brm. — Nord de l'Europe et de l'Asie jusqu'au 70°, dépasse rarement en hiver le 50° l. N.

3290. *Var.* PACIFICA, Lawr., in *Baird, B. N. Am.*, p. 889; Ross, *Nat. Hist. Rev.*, 1862, p. 289; *arcticus* (pt.), auct. plur.; *striatus*, Bonn. — Amér. N. et N.-W., en hiver jusqu'en Californie (acc. Japon).

11.925. GLACIALIS, Lin.; Dress., *l. c.*, p. 609, pl. 626; Dubois, *l. c.* II, p. 671, pl. 313; *imber*, Gunn.; *immer*, Lin.; *torquatus*, Brünn.; *hyemalis*, *maximus*, Brm. — Amérique N., Groenl., Islande, Fœroé, Eur. N.-W. dét. de Behr.

(1) Les Procellariens suivants sont douteux : *Procellaria brasiliana*, Gm., *S. N.* I, p. 564; *Thalassidroma fasciolata* et *dubia*, Tsch., *J. f. O.*, 1856, pp. 180, 190; *Puffinus bicolor*, Tsch., *l. c.*, p. 187; *Procellaria nigra*, *lugubris*, *maculata*, Tsch., *l. c.*, pp. 185, 190; *Diomedea gibbosa*, Gould, *Ann. Mag. N. H.*, 1844, p. 361; *D. leptorhyncha*, Coues, *Pr. Ac. Phil.*, 1866, p. 178.

(2) Voy. : Og.-Grant, *Cat. Birds Brit. Mus.* XXVI, pp. 485-558 (1898).

Digitized by Google

3291. *Var.* ADAMSI, Gray, *P. Z.S.*, 1859, p. 167; Coll., *Ibis*, 1894, p. 269, pl. 8; Dress., *l. c.* IX, *Suppl.*, p. 413, pl. 721. — Amér. et Asie polaires, en hiver Japon N. (accid. Norwège).

## FAM. II. — PODICIPEDIDÆ

### 1927. PODICIPES (1)

*Podicipes*, Salerne (1767); *Podiceps*, Lath. (1787); *Dytes*, *Pedetaithya*, *Proctopus*, *Lophaithyia*, Kaup (1829); *Dasyptilus*, Sw. (1837); *Poliocephalus*, Selby; *Pedeaithyia*, Gr. (1846); *Tachybaptus*, *Otodytes*, Rchb. (1852); *Calipareus*, Bp. (1855); *Rollandia*, Bp. (1856); *Centropelma*, Sel. et Salv. (1869); *Colymbetes*, Heine (1890).

11.926. FLUVIATILIS (Tunst.), *Orn. Brit.*, p. 3 (1771); Dress., *B. Eur.* VIII, p. 659, pl. 635; *minutus*, *hebridalis*, Lath.; *minor*, Gm. (ex Briss.); Dubois, *Fne. Ill.*, *Ois.* II, p. 698, pl. 320; *hebridicus*, Gm.; *erythrocephalus*, Herm.; *pygmæus*, *pallidus*, Brm.; *europæus*, Macg.; *philippensis*, Swinh. (nec Bonn.); *nigricans*, Stejn. — Europe mérid. et centr. jusqu'au 62° lat. N., Asie centr., Japon.

3292. *Var.* PHILIPPENSIS (Bonn.), *Tabl. Encycl. Méth.* I, p. 58, pl. 46; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 512; *minor* et *fluviatilis* (pt.), auct. plur.; *noctivagus*, Tem. — Chine S., Birmanie, Formose, Haïnan, Bornéo, Philipp.

3293. *Var.* CAPENSIS, Licht., *Nomencl.*, p. 104; Grant, *Cat.*, p. 515, pl. 7 et 8; *pandubia*, Hodgs.; *philippensis*, *minor* et *fluviatilis* (pt.), auct. plur.; *albipennis*, Sharpe. — Afrique, Madagascar, Asie S.-W., Inde, Ceylan, Birmanie.

3294. *Var.* TRICOLOR, Gray, *P. Z.S.*, 1860, p. 366; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 915; *minor*, Wald., Rosenb. et Mey. (nec Gm.); *gularis*, Rosenb. (nec Gd.) — Nouv.-Guinée, Arou, Moluques, Célèbes, Flores, Timor.

11.927. ALBESCENS, Blanf., *Str. F.*, 1877, p. 486; id., *Faun. Br. Ind. B.* IV, p. 476; Grant, *Cat.*, p. 518. — Sikhim.

11.928. PELZELNI, Hartl., *Orn. Madag.*, p. 85; Schl. et Pol., *Rech. Madag.* II, pp. 151, 160, pl. 40; Grant, *l. c.*, p. 518. — Madagascar.

11.929. NOVÆ-HOLLANDIÆ, Steph., *Gen. Zool.* XIII, 1, p. 18; *gularis*, Gould; id., *B. Austr.* VII, pl. 81; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 917. — Austr., Tasm., Nouv.-Caléd., Nouv.-Guin., Sangi, Talaut, Java.

11.930. DOMINICUS (Lin.); Spix, *Av. Bras.* II, p. 78, pl. 101; Baird, *B. N. Am.*, pl. 99, f. 1; Schl., *Mus. P.-B.*, *Urinat.*, p. 47; *dominicensis*, D'Orb. — Amérique centr. et mérid. jusqu'en Patagonie, Antilles.

(1) *Podiceps* est une contraction vicieuse du mot *Podicipes* (pieds au derrière), de *podex*, *podicis* et de *pes*.

Digitized by Google

3295. *Var.* Brachyrhyncha, Chapm., *Bull. Amer. Mus.* XII, p. 255. — Matto Grosso (Brésil).

3296. *Var.* Brachyptera, Chapm., *Bull. Am. Mus.* XII, p. 256. — Texas.

11.931. poliocephalus, Jard. et Sel., *Ill. Orn.* I, p. 13, pl. 13; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 82; *nestor*, Gould. — Australie, Tasmanie.

11.932. rupipectus, Gray, in *Dieff., Trav. N. Z. App.*, p. 198; id., *Voy. Ereb. and Terr., B.*, p. 16, pl. 19; Bull., *B. N. Zeal.*, ed. 2, II, p. 280. — Nouv.-Zélande.

11.933. americanus, Garn., *Voy. Coquille, Zool.* I, p. 599; Schl., *l. c.*, p. 42; *chiliensis*, Garn., *l. c.*, p. 601; *albicollis*, Less.; *rollandi*, auct. plur. (nec Q. et G.); Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 494; Scl. et Huds., *Arg. Orn.* II, p. 204; *micra*, Bp.; *leucotis*, Tacz. — Pérou, Chili, Paraguay, Argentine jusqu'au détroit de Magellan.

3297. *Var.* Rollandi, Gould (pt., ex Q. et G.); Quoy et Gaim., *Voy. Uranie*, p. 153, pl. 36; Gould, *Voy. Beagle*, III, p. 137 (pt.); Schl., *l. c.*, p. 42. — Iles Malouines ou Falkland.

11.934. calipareus, Less., *Voy. Coq., Zool.* I, p. 727, pl. 45; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 495; *occipitalis*, Less. — Du Pérou et Argentine au détroit de Magellan; Malouines.

3298. *Var.* Juninensis, Berl. et Stolzm., *Ibis*, 1894, p. 112; Grant, *Cat.*, p. 538. — Pérou central et S.

3299. *Var.* Taczanowskii, Berl. et Stolzm., *Ibis*, 1894, p. 109. — Pérou central.

11.935. auritus (Lin.); Dress., *l. c.* VIII, p. 645, pl. 631; *nigricans*, Scop.; *duplicatus*, Müll.; *cornutus*, Gm. (ex Briss.); Dubois, *l. c.* II, p. 695, pl. 319; *obscurus, caspicus*, Gm.; *comosus*, Bonn.; *arcticus*, Boie; *ambiguus*, Less.; *bicornis*, Brm.; *sclavus*, Bp.; *korejevi*, Zarud. et Har. — Europe, Asie et Amérique sept., entre le 65° et le 40° latit. N. environ.

11.936. nigricollis, Brm., *Handb. Vög. Deutschl.*, p. 963; Dress., *l. c.* VIII, p. 651, pl. 632; Dubois, *l. c.* II, p. 692, pl. 318; *auritus*, auct. plur. (nec Lin.); *recurvirostris*, Brm. — Europe centr. et mér., Asie centr. jusqu'au Japon; l'Afr. en hiv.

3300. *Var.* Californica, Heerm., *Pr. Ac. Phil.*, 1854, p. 179; Baird, *B. N. Am.*, p. 896; Ell., *B. N. Am.* II, pl. 64; *auritus*, Aud. (nec L.), *B. Am.* VII, p. 322, pl. 482. — Amér. N.-W. jusqu'au 60° l. N.; en hiver Mexique, Guatémal.

11.937. micropterus, Gould, *P. Z. S.*, 1868, p. 220; *micropterum*, Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 189, pl. 95; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 497. — Pérou S. (lac Titicaca).

11.938. cristatus (Lin.); Dress., *l. c.* VIII, p. 629, pl. 619; Dubois, *l. c.* II, p. 683, pl. 316; *urinator*, L.; *cornutus*, Bonn. (nec Gm.); *mitratus, patagiatus*, Brm.; *australis*, Gould; id., *B. Austr.* VII, pl. 80; *hectori*, Bull.; *widhalmi*, Goeb.; *rostratus*, Mans.-Pley.; *infuscatus*, Salvad. — Europe et Asie centr., jusqu'au Japon sans dépasser le 63° l. N., Afrique, Australie, Tasmanie, Nouv.-Zélande.

Digitized by Google

11.939. GRISEIGENA (Bodd.), *Tabl. Pl. Enl.*, p. 55; Dress., *l. c.* VIII, p. 639, pl. 620; Dubois, *l. c.* II, p. 688, pl. 317; *subcristatus*, Jacquin; *parotis*, Sparrm.; *ruficollis*, Lath.; *rubricollis*, Gm.; *longirostris*, Bonn.; *cucullatus*, *nævius*, Pall.; *canogularis*, Brm. — Europe et Asie W. jusqu'au cercle arct.; au S. jusqu'au N. de l'Afrique et les mers Noire et Caspienne.

3301. *Var.* HOLBOELLI, Reinh., *Vidensk. Meddel.*, 1853, p. 76; id., *Ibis*, 1861, p. 14; *cristatus* et *rubricollis* (pt.), auct. plur. amer.; *cucullatus* (pt.), Pall.; *major*, Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 122, pl. 78[b]; *subcristatus*, Schr., *Reis. Amurl.*, p. 493, pl. 15, f. 3; *griseigena*, Baird (nec Bodd.); *cooperi*, Lawr.; *affinis*, Salvad.; *occidentalis*, Tristr. (nec Lawr.) — Amérique septentr. et Groenland jusqu'au Cercle arct., Sibérie E., Japon, au S. jusque vers le 42° latit. N.

### 1928. ÆCHMOPHORUS

*Æchmophorus*, Coues (1862).

11.940. MAJOR (Bodd.), *Tabl. Pl. Enl.*, p. 24; Schl., *l. c.*, p. 38; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 492; Scl. et Huds., *Arg. Orn.* II, p. 202; *cayennensis*, Gm.; *cayanus*, Lath.; *bicornis*, Licht.; *leucopterus*, King.; Jard. et S., *Ill. Orn.*, pl. 107; *longirostris*, Bp.; *salvadorii*, Stejn. — Amérique mérid., du N. du Pérou à Magellan.

11.941. OCCIDENTALIS (Lawr.), in *Baird's B. N. Am.*, p. 894; Coop. et Suckl., *N. H. Wash. Terr.*, p. 281, pl. 38; Coues, *Pr. Ac. Phil.*, 1862, p. 229; *clarkii*, Lawr. — Amérique N.-W. au S. jusqu'au Mexique.

### 1929. PODILYMBUS

*Podilymbus*, Less. (1831); *Sylbeocyclus*, Bp. (1832); *Hydroka*, Nutt. (1834); *Nexiteles*, Glog. (1842).

11.942. PODICEPS (Lin.); Baird, *B. N. Am.*, p. 898; *ludovicianus*, Bodd.; *thomensis*, Gm.; *carolinensis*, Lath.; Spix, *Av. Bras.* II, p. 78, pl. 100; Aud., *B. Am.* VII, p. 324, pl. 483; *antarcticus*, Less.; *brevirostris*, Gr.; *anisodactylus*, Rchb.; *lineatus* Heerm. — Amérique sept., centr. et mérid., Antilles.

## FAM. III. — ALCIDÆ (1)

## SUBF. I. — ALCINÆ

### 1930. ALCA

*Alca*, Lin. (1758); *Plautus*, Brünn. (1772); *Pinguinus*, Bonn. (1790); *Torda*,

(1) Voy.: Og.-Grant, *Cat. Birds Brit. Mus.* XXVI, pp. 559-622 (1898).

Digitized by Google

Dumér. (1806); *Utamania*, Leach (1816); *Chenalopex*, Vieill. (1819); *Matæoptera*, Glog. (1842); *Gyralca*, Steenstr. (1855).

11.943. IMPENNIS, Lin.; Gould, *B. Eur.* V, pl. 400; id., *B. Gr. Brit.* V, pl. 46; Dress., *B. Eur.* VIII, p. 563, pl. 620; *borealis*, Forst.; *major*, Merr. — Nord de l'Atlantique (*éteint*).

11.944. TORDA, Lin.; Dress., *l. c.* VIII, p. 557, pl. 619; Dubois, *Fne. Ill., Ois.* II, p. 662, pl. 311; *unisulcata*, *balthica*, Brünn.; *pica*, L.; *glacialis*, *islandica*, *microrhynchos*, Brm. — Europe W., du Cap N. à la Méditerranée, Islande, Groenland, Amér. N.-E. (côtes).

## 1931. MERGULUS

*Alle!* Link (1806); *Mergulus*, Vieill. (1816, ex Ray, 1713); *Arctica*, Gray (1844).

11.945. ALLE (Lin.); Dress., *l. c.* VIII, p. 591, pl. 624; Dubois, *l. c.* II, p. 659, pl. 310; *alce*, Gm.; *nigricans*, Link; *melanoleucos*, Leach; *minor*, Merr.; *arcticus*, Brm. — N. de l'Atlant. jusqu'au 81° l. N., dépasse rarement en hiver vers le S. le 55°.

## 1932. URIA

*Uria*, Briss. (1760); *Cepphus*, Pall. (1769); *Grylle*, Leach (1819); *Lomvia*, Brandt (1837); *Cataractes*, Gray (1841); *Pseuduria*, Sharpe (1899).

11.946. TROILE (Lin.); Dress., *l. c.* VIII, p. 567, pl. 621; Dubois, *l. c.* II, p. 655, pl[e] 309 et 309[b]; *minor*, Tunst.; *ringvia* et *alga*, Brünn.; *lomvia*, auct. plur. (nec Pall.); *leucophthalmos*, Fab.; *lacrimans*, Valenc.; *leucopsis* et *norwegica*, Brm.; *intermedia*, Nilss.; *leucotis*, C. Dub. — Eur. jusqu'au cap N., Islande, Groenland, Amér. N.-E., descend vers le Sud en hiver jusque vers le 40° l. N.

3302. *Var.* CALIFORNICA (Bryant), *Pr. Bost. Soc.* VIII, p. 142, ff. 3, 5; Bd., Brew. et Ridgw., *Water-B. N. Am.* II, p. 483. — Amérique N.-W., en hiver Californie.

11.947. LOMVIA (Pall.), *Zoogr., Rosso-As.* II, p. 345; *svarbag*, Brünn.; *brunnichi*, Sab., *Tr. Linn. Soc.*, 1817, p. 538; Aud., *B. Am.* VII, p. 265, pl. 472; Dress., *l. c.* VIII, p. 575, pl. 622; *francsii*, Leach; *polaris*, Brm. — Mers arctiques, Nord de l'Atlantique.

3303. *Var.* ARRA (Pall.), *Zoogr.* II, p. 347; Naum., *Vög. Deutschl.* XII, p. 535, pl. 333; *lomvia* (pt.), Grant. — Nord de l'Océan Pacifique.

11.948. GRYLLE (Lin.); Dress., *l. c.* VIII, p. 581, pl. 623; Dubois, *l. c.* II, p. 651, pl. 308; *grylloides*, *balthica*, Brünn.; *lacteolus*, Pall.; *gryllus*, Müll.; *nivea*, Bonn.; *leucoptera*, Vieill.; *arctica*, Brm.; — Nord de l'Atlantique, descend en hiver jusque sur les côtes du N. de la France



Digitized by Google

| | | |
|---|---|---|
| | *motzfeldi*, Benick.; *unicolor*, Faber; *scapularis*, Steph.; *groenlandicus*, Gray; *variegata*, Rchb.; *carbo*, Newt. (nec Pall.); *columba*, Fitz. (nec Pall.); *mansfeldi*, Seeb. | et du Massachusetts. |
| 3304. | *Var.* MANDTI, Licht., in *Mandt, Observat., etc.*, p. 30; Dress., *l. c.* VIII, p. 587; *glacialis*, Brm.; ?*meisneri*, Brm.; *grylle* (pt.), auct. plur. (nec L.) | Terres entourant le Pôle arctique. |
| 11.949. | COLUMBA (Pall.), *Zoogr.* II, p. 348; Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 17; Baird, *B. N. Am.*, p. 912, pl. 96, f. 1; *grylle*, Kittl. (nec L.) | Nord du Pacifique, du détr. de Behring et des îles Aléoutes à la Californ., Sibérie E. |
| 3305. | *Var.* SNOWI (Stejn.), *Auk*, 1897, p. 201; *columba* (pt.), auct. plur. (nec Pall.) | Iles Kouriles, Kamtschatka, Japon. |
| 11.950. | CARBO (Pall.), *Zoogr.* II, p. 350, pl. 79; Gould, *B. Asia*, VII, pl. 71; Baird, *B. N. Am.*, p. 913, pl. 97; Schl., *l. c.*, p. 17. | Nord du Pacifique jusqu'au Japon au S. |

## 1933. BRACHYRHAMPHUS

*Brachyramphus, Apobapton*, Brandt (1837); *Anobapton*, Bp. (1856).

| | | |
|---|---|---|
| 11.951. | MARMORATUS (Gm.), *S. N.* I, p. 583; Brandt, *Bull. Acad. St-Pétersb.*, 1837, p. 346; *wrangelii*, Brandt, *l. c.*; *townsendi*, Aud., *Orn. Biogr.* V, p. 251, pl. 429; id., *B. Am.* VII, p. 278, pl. 475. | Côtes de l'Amérique N.-W., de l'Alaska à la Californie. |
| 11.952. | PERDIX (Pall.), *Zoogr.* II, p. 351, pl. 80; Stejn., *Zeitschr. ges. Orn.* III, p. 215, pl. 7; *marmoratus* et *wrangelii* (pt.), auct. plur.; *kittlitzi*, Swinh. (nec Brandt). | Côtes du N.-E. de l'Asie, Kouriles, Kamtschat., Japon. |
| 11.953. | BREVIROSTRIS (Vig.), *Zool. Journ.* IV, p. 357; Stejn., *Zeitschr. ges. Orn.* III, p. 211; Seeb., *B. Jap.*, p. 279; *kittlitzii*, Brandt; Nels., *Rep. N. H. Alaska*, p. 44, pl. 1; *antiqua*, Aud. (nec Gm.), *Orn. Biogr.* V, pl. 402, f. 2. | Nord du Pacifique : détroit de Behring, Kamtschatka, Aléoutes, Japon. |

## 1934. ENDOMYCHURA

*Micruria*, Grant (1898, nec Reit., 1875); *Endomychura*, Oberh. (1899).

| | | |
|---|---|---|
| 11.954. | HYPOLEUCUS (Xantus), *Pr. Ac. Phil.*, 1859, p. 299; Ell., *B. N. Am.* II, pl. 72; Oberh., *Pr. Ac. Phil.*, 1899, p. 201. | Basse-Californie. |
| 11.955. | ?CRAVERI (Salvad.), *Atti Soc. Ital.* VIII, 1865, p. 387; Bd., Br. et Ridgw., *Water-B. N. Am.* II, p. 502. | Basse-Californie. |

Digitized by Google

### 1955. SYNTHLIBORHAMPHUS

*Synthliboramphus*, Brandt (1837).

11.956. ANTIQUUS (Gm.) *S. N.* I, p. 554; Aud., *Orn. Biogr.* V, p. 100, pl. 402, f. 1; Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 124, pl. 80; Brandt, *Bull. Ac. St. Pétersb.*, 1837, p. 347; *senicula*, Pall.; *brachypterus*, Brt.; *cirrhocephalus*, Vig.; *cana*, Kittl.; *temmincki*, Coop. et Suckl. (nec Brt.) — Nord du Pacifique : Asie N.-E., Amérique N.-W., Japon

11.957. WUMIZUSUME (Tem.), *Pl. Col.* 121; *umizusume*, Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 123, pl. 79; *temminckii*, Brt.; Ell., *B. N. Am.* II, pl. 71. — Côtes du Japon.

## SUBF. II. — FRATERCULINÆ

### 1956. PTYCHORHAMPHUS

*Ptychoramphus*, Brandt (1837).

11.958. ALEUTICUS (Pall.), *Zoogr.* II, p. 370; Brt., *Bull. Ac. St-Pétersb.*, 1837, p. 347; Ell., *B. N. Am.* II, pl. 69; *cassini*, Gamb. — Côtes de l'Am. N.-W., des îles Aléoutes à la Basse-Californie.

### 1957. SIMORHYNCHUS

*Simorhynchus*, Ersch. et Grub. (1819); *Tyloramphus*, Brand (1837); *Ciceronia*, Rchb. (1852).

11.959. CRISTATELLUS (Pall.), *Spicil. Zool.*, fasc. V, p. 18, pl. 3 et 5, ff. 7-9; id., *Zoogr.* II, p. 370, pl. 86; Aud., *Orn. Biogr.* V, p. 102, pl. 402; id., *B. Am.* VII, pl. 467; Schl., *Mus. P.-B. Urinat.*, p. 25; *tetracula*, *dubia*, Pall.; *cristata*, Müll.; *superciliosa*, Bp.; *superciliata*, Aud. — Nord du Pacifique : détroit de Behring, Alaska, Kamtschatka, Kouriles, Japon.

11.960. PYGMÆUS (Gm.), *S. N.* I, p. 555; Brt., *Mél. Biol.* VII, p. 228; *kamtschatica*, Lepech.; Baird, *B. N. Am.*, p. 908; Schl., *l. c.*, p. 25; *crinita*, *mystacea*, Pall.; *cristatella*, auct. plur. (nec Pall.); Tem., *Pl. Col.* 122; *superciliosa*, Licht. (nec Bp.); *cassini*, Coues. — Nord du Pacifique : détroit de Behring, Alaska, Kamtschatka, Japon, etc.

11.961. PUSILLUS (Pall.), *Zoogr.* II, p. 373, pl. 90; Ell., *B. N. Amer.* II, pl. 68; *corniculatus*, Esch.; *microceros*, Brt.; *occidentalis*, Vig.; *nodirostris*, Bp.; *pygmæus*, Schl. (nec Gm.), *l. c.*, p. 25. — Nord du Pacifique : Alaska, Kamtschatka, Japon, etc.

Digitized by Google

## 1938. PHALERIS

*Phaleris*, Tem. (1820); *Cyclorrhynchus*, Kp. (1829); *Ombria*, Eschs. (1831).

11.962. PSITTACULA (Pall.), *Spicil. Zool.*, fasc. V, p. 13, pl. 2 et 5, ff. 4-6; id., *Zoogr.* II, p. 366, pl. 84; Schl., *l. c.*, p. 24; Dub., *Ois. Eur.* II, p. et pl. 175. — Nord du Pacifique : des Kouriles à l'Alaska.

## 1939. CERATORHYNCHA

*Cerorhinca*, Bp. (1826); *Chimerina*, Eschs. (1829); *Ceratorrhina*, Bp. (1830); *Cerorhina*, Brt. (1837); *Ceratorhyncha* et *Cerorhynca*, Bp. (1838).

11.963. MONOCERATA (Pall.), *Zoogr.* II, p. 362; Cass., in *Perry Exped. Jap.* II, p. 233; Schl., *l. c.*, p. 26; *Cerorhyncha occidentalis*, Bp.; Aud., *B. Am.* VII, p. 264, pl. 471; *cornuta*, Eschs.; *orientalis*, Brt.; *suckleyi*, Cass. — Nord du Pacifique : du dét. de Behring et Japon, etc., à la Basse-Californie en hiver.

## 1940. LUNDA

*Lunda*, Pall. (1811); *Gymnoblepharum*, Brt. (1837); *Sagmatorrhina*, Bp. (1851); *Cheniscus*, Gray (1871).

11.964. CIRRHATA (Pall.), *Spicil. Zool.*, fasc. V, p. 7; id., *Zoogr.* II, p. 363, pl. 82; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 240, pl. 296; Schl., *l. c.*, p. 27; *carinata*, Vig.; *lathami*, Bp.; *labradoria*, Cass. — Nord du Pacifique : Kamtsch., Alaska jusqu. Basse-Calif., Japon, etc., Groenl. (accid. Maine).

## 1941. FRATERCULA

*Fratercula*, Briss. (1760); *Mormon*, Ill. (1811); *Larva*, Vieill. (1816); *Ceratoblepharum*, Brandt (1837).

11.965. ARCTICA (Lin., 1758); Dress., *l. c.* VIII, p. 399, pl. 625; Dubois, *l. c.* II, p. 666, pl. 312; *deleta*, Brünn.; *labradorica*, Gm.; *labradora*, Lath.; *canogularis*, Mey. et Wolf.; *polaris* et *gravæ*, Brm. — Nord de l'Atlantique : Europe N. et W., Amér. N.-E., Groenland, Islande.

3306. *Var.* GLACIALIS (Naum.), *Isis*, 1821, p. 782, pl. 7, f. 2; Elliot, *B. N. Am.* II, pl. 65; *arcticus*, Malmgr. (nec L.); *corniculata*, Degl. et Gerbe (nec Naum.) — Zone polaire jusqu'au 80° l. N., Spitzberg, Nouv.-Zemble, etc.

11.966. CORNICULATA (Naum.), *Isis*, 1821, p. 782, pl. 7, ff. 3, 4; Gray, *Gen. B.* III, pl. 174; Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 11; Seeb., *B. Japan*, p. 280; *arctica*, Pall. (nec L.); *septentrionale*, Kittl.; *glacialis*, auct. plur. (nec Naum.); Gould, *B. Eur.* V, pl. 404. — Nord du Pacifique, en hiver Japon et Colombie anglaise.

Digitized by Google

# ORD. XIX. — IMPENNES (1)

## FAM. SPHENISCIDÆ

### 1942. APTENODYTES

*Aptenodytes*, Forst. (1781); *Apterodita*, Scop. (1786); *Pinguinaria*, Shaw (1792).

11.967. PATAGONICA, Forst., *Comment. Gotting.* III, p. 137, pl. 2; id., *Icon. ined.*, pl. 81 *(patachonica)*; *longirostris*, Scop.; Bull., *B. N. Zeal.*, ed. 2, II, p. 306; *pennantii*, Gray; id., *Voy. Ereb. and Terr.*, *B.*, pl. 32; *rex*, Bp.; *forsteri*, Scl. (pt.) — Magellan, îles Malouines, Géorgie du S., Marion, Kerguelen, Macquarie, Snares et Stewart.

11.968. FORSTERI, Gray, *Ann. Mag. N. H.*, 1844, p. 315; id., *Gen. B.* III, pl. 176, f. 2; id., *Voy. Ereb. and Terr.*, *B.*, pl. 31; *imperator*, Bp.; *patagonicus*, Schl., Coues (nec Forst.) — Mers antarctiques.

### 1943. PYGOSCELIS

*Pygoscelis*, Wagl. (1832); *Dasyrhamphus*, Hombr. et Jacq. (1853); *Pygoscelys*, Bp. (1856).

11.969. PAPUA (Forst.), *Comment. Gotting.* III, p. 140, pl. 3; Rchb., *Natat.*, pl. 2, f. 738; Gray, *Voy. Ereb. and Terr.*, *B.*, pl. 25; Schl., *l. c.*, p. 5; *tæniata*, Peale; *wagleri*, Sclat. — Iles Malouines, Géorgie du S., Marion, Kerguelen, Heard, Macquarie, etc.

11.970. ADELIÆ (Hombr. et Jacq.), *Ann. Sc. Nat.*, 1841, p. 320; id., *Voy. Pôle Sud, Zool.* III, p. 155, pl. 33, f. 1; Gray, *Voy. Ereb. and Terr.*, *B.*, pl. 28; Schl., *l. c.*, p. 4; *brevirostris*, Gray; *longicaudata*, Peale, *Zool. U. S. Expl. Exp.*, *B.*, p. 261, pl. 70, f. 2; *herculis*, Finsch. — Terres antarctiques.

11.971. ANTARCTICA (Forst.), *Comment. Gotting.* III, p. 141, pl. 4; id., *Icon. ined.*, pl. 82; Gray, *Voy. Ereb. and Terr.*, *B.*, pl. 26; Schl., *l. c.*, p. 5. — Iles Malouines, Weddell, Géorgie du S., Seymour.

### 1944. CATARRHACTES

*Catarractes*, Briss. (1760); *Eudyptes*, Vieill. (1816); *Chrysocoma*, Steph. (1825); *Microdyptes*, M.-Edw. (1880).

11.972. CHRYSOCOME (Forst.), *Comment. Gotting.* III, p. 135, pl. 1; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 245, pl. 298; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 83; *demersus*, L. (nec *Diom. demersa*); *catarractes*, Forst.; *gorfua*, Bonn.; *cirrhata*, *cristata*, Shaw; *saltator*, Steph.; *chryso-* — Terre de Feu, Malouines, Géorgie du S. et îles voisines, Cap B.-Esp., Austr. S., Tasmanie, Nouv.-

(1) Voy.: Ogilvie-Grant, *Catalogue of Birds Brit. Mus.* XXVI, pp. 623-653 (1898).

Digitized by Google

*lopha*, Rchb.; *nigrivestis*, Gould; *filholi*, Hutt.; *serresiana*, Oust. — Zélande.

11.973. PACHYRHYNCHUS (Gray), *Voy. Ereb. and Terr., B.*, p. 17; id., *Gen. B.* III, pl. 176; Bull., *B. N. Zeal.*, ed. 2, II, p. 287; *chrysocome* (pt.), auct. plur. (nec Forst.); *atrata*, Hutt. (mélanisme); ? *novæ-hollandiæ*, Steph. — Nouvelle-Zélande, îles Snares, Bounty, Chatham.

3507. *Var.* VITTATA (Finsch), *Ibis*, 1875, p. 112; Bull., *B. N. Zeal.*, ed. 2, II, p. 299. — Nouvelle-Zélande (île Sud).

3508. *Var.* SCLATERI (Bull.), *B. N. Zeal.*, ed. 2, II, p. 289; id., *P. Z. S.*, 1889, p. 82, pl. 9, f. 1. — Iles Campbell, Auckland, Antipodes et Bounty.

11.974. CHRYSOLOPHUS, Brandt, *Bull. Acad. St-Pétersb.*, 1837, p. 315; Gray, *Gen. B.* III, pl. 176, f. 1; Scl. et Salv., *Voy. Chall., Zool., B.*, p. 127, pl. 29; ? *diadematus*, Gould, *P. Z. S.*, 1860, p. 419. — Iles Malouines, Géorgie du S., Prince Edward, Marion, Kerguelen, Heard.

11.975. SCHLEGELI (Finsch), *Trans. N. Zeal. Inst.* VIII, 1876, p. 204; Bull., *B. N. Zeal.*, ed. 2, II, p. 298; *diadematus*, Schl., *Mus. P.-B., Urinat.*, p. 8 (pt., nec Gould?); *chrysolophus*, Fsch. (1872, nec Brt.); *albigularis*, M.-Edw., *Ann. Sc. Nat.*, 1880, art. 9, p. 55, pl. 19. — Nouv.-Zélande : îles Macquarie et Campbell.

## 1945. MEGADYPTES

*Catarrhactes*, Hombr. et Jacq. (1841, nec Briss., 1760); *Megadyptes*, M.-Edw. (1882).

11.976. ANTIPODUM (H. et J.), *Ann. Sc. Nat.*, 1841, p. 320 *(antipodes)*; Gray, *Voy. Ereb. and Terr., B.*, p. 17, pl. 27; Bull., *B. N. Zeal.*, ed. 2, II, p. 294, pl. 46, f. 1; *flavilarvata*, Peale. — Nouv.-Zélande, îles Auckland, Stewart, Chatham, Campbell.

## 1946. EUDYPTULA

*Eudyptula*, Bonap. (1856).

11.977. MINOR (Forst.), *Comment. Gotting.* III, p. 147; id., *Icon. ined.*, pl. 84, 85; Gould, *B. Austr.* VII, pl. 84; *undina*, Gould, *l. c.*, pl. 85. — Australie S., Tasmanie, Nouv.-Zélande, îles Chatham.

3509. *Var.* ALBOSIGNATA, Finsch, *P. Z. S.*, 1874, p. 207; id., *J. f. O.*, 1874, pp. 174, 219; *minor*, Bull. (pt.) — Nouv.-Zélande.

## 1947. SPHENISCUS

*Spheniscus*, Briss. (1760); *Dypsicles*, Glog. (1842).

11.978. DEMERSUS (Lin.); *Pl. Enl.* 58; Steph., *Gen. Zool.* XIII, 1, p. 64, pl. 9; Schl., *l. c.*, p. 10; Scl. et — Côtes S. et S.-W. de l'Afrique.

Digitized by Google

Salv., *Voy. Chall., Zool., B.*, p. 124, pl. 27; *palpebrata*, Licht.; *fuscirostris*, Illig.; ?? *torquata*, Forst. (aberr.?); ?*platirhingos*, Scop.

11.979. HUMBOLDTI, Meyen, *Nov. Act. Acad. Caes. Leop.-Car.* XVI, *Suppl.*, p. 21; Tschudi, *Faun. Per.*, p. 315; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 499; *demersus* (pt.), Schleg.; ?*chilensis*, Mol.; ?*molinæ*, Lath. — Côtes du Pérou et du Chili.

11.980. MAGELLANICUS (Forst.), *Comment. Gotting.* III, p. 143, pl. 5; id., *Icon. ined.*, pl. 85; Scl. et Salv., *Voy. Chall., Zool. B.*, p. 125, pl. 28; *brasiliensis*, Licht.; *magnirostris*, Peale; *demersus* (pt.), auct. plur. (nec L.); *trifasciatus*, Philip.; ?*modestus* et *flavipes*, Philip., *Arch. f. Naturg.*, 1899, p. 171. — Côtes de l'Amérique mérid., de Magellan au Chili et au Rio-Grande do Sul, îles Malouines et de Géorgie du S.

11.981. MENDICULUS, Sundev., *P. Z. S.*, 1871, p. 126; Salv., *Trans. Zool. Soc.* IX, pl. 89; Grant, *Cat.*, p. 655. — Iles Galapagos.

# SUBCL. III. — RATITÆ [1]

## ORD. XX. — APTERYGES

### FAM. APTERYGIDÆ

#### 1948. APTERYX

*Apteryx*, Shaw (1813); *Apternyx*, Sw. (1837).

11.982. AUSTRALIS, Shaw, *Nat. Misc.* XXIV, pl. 1057, 1058; Gray, *Gen. B.* III, pl. 159; Bull., *Hist. B. N. Zeal.*, ed. 2, II, p. 322; *novæ-zelandiæ*, Less.; *fusca*, Potts. — Nouvelle-Zélande (île Sud).

11.983. LAWRYI, Rothsch., *Ibis*, 1893, pp. 575-76; *maxima*, Bull. (nec Bp.), *Tr. N. Z. Inst.*, 1890, p. 602. — Nouvelle-Zélande (île Stewart).

11.984. MANTELLI, Bartl., *P. Z. S.*, 1850, p. 275, pl. 50, ff. 3, 4, pl. 51, f. 2; Bull., *B. N. Zeal.*, p. 337, pl. 33; *australis*, auct. plur. (nec Shaw); Gould, *B. Austr.* VI, pl. 2; *bulleri*, Sharpe. — Nouvelle-Zélande (partie or. de l'île Nord).

11.985. OWENI, Gould, *P. Z. S.*, 1847, p. 94; id., *B. Austr.* VI, pl. 3; id., *Tr. Z. S.* III, p. 379, pl. 57; *mantelli*, juv., Schl.; *mollis*, Potts; *fuscus*, Rowl. (nec Potts). — Nouvelle-Zélande (île Sud).

3310. *Var.* OCCIDENTALIS, Rothsch., *Bull. Br. Orn. Cl.* X, p. 59; *Ibis*, 1893, pp. 575, 576; *oweni*, Finsch (nec Gould). — Nouv.-Zélande (partie occid. des îles Nord et Sud).

11.986. HAASTI, Potts, *Tr. N. Z. Inst.*, 1871, p. 204; id., — Nouvelle-Zélande (île

(1) Voy.: Salvadori, *Catalogue of Birds Brit. Mus.* XXVII, pp. 570-612 (1895).

Digitized by Google

*Ibis*, 1872, p. 35; Rowl., *Orn. Misc.* I, pp. 3-17, pl. 1; ? *maxima*, Bp. (*descr. nulla*); ? *major*, Ellm.; *australis*, Haast (nec Shaw). — Sud centr. et partie occid. de l'île Nord)

# ORD. XXI. — CASUARII

## FAM. I. — DROMÆIDÆ

### 1949. DROMÆUS

*Dromaius*, Vieill. (1816); *Dromæus*, Ranz. (1821); *Tachea*, Flem. (1822); *Dromiceus*, Sw. (1837); *Dromeicus*, A. Newt. (1893).

11.987. NOVÆ-HOLLANDIÆ (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 665; Gould, *B. Austr.* VI, pl. 1; Schl., *Mus. P.-B., Struthiones*, p. 7; *emu*, Steph.; *australis*, Sw. — Australie E., Tasmanie.

11.988. ATER, Vieill., *N. Dict.* X, p. 212; id., *Gal. Ois.* II, p. 79, pl. 226; ?*parvulus*, Gould. — Ile Decrès ou Kangaroo (*éteint*).

11.989. IRRORATUS, Bartl., *P. Z. S.*, 1839, p. 295; Schl., *l. c.*, p. 7; Salvad., *Cat.*, p. 589. — Australie W.

## FAM. II. — CASUARIIDÆ (1)

### 1950. CASUARIUS

*Casuarius*, Briss. (1760); *Hippalectryo*, Glog. (1842).

11.990. EMEU, Lath., *Ind. Orn.* II, p. 664; Schl., *l. c.*, p. 9; *galeatus*, Bonn.; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 77, pl. 225; *casuarius*, Lin.; Rothsch., *Tr. Z. S.* XV, p. 113, pl. 22; *indicus*, Glog.; *orientalis*, S. Müll.; *javanensis!* Gulliv.; *beccarii*, Pelz. (nec Scl.) — Céram.

3311. *Var.* BECCARII, Sclat., *P. Z. S.*, 1875, p. 87, ff. 1, 2; Rothsch., *l. c.*, p. 116, pl. 23; *bicarunculatus*, Becc. (nec Scl.) — Ile Vokan (Arou).

3312. *Var.* SCLATERI, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* XII, 1878, p. 422; *beccarii*, Scl., *P. Z. S.*, 1875, p. 527, pl. 58 (nec Scl., p. 87); Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 484 (pt.) — Nouv.-Guinée S.

3313. *Var.* SALVADORII, Oust., *Bull. Assoc. Sc. de France*, Bull., n° 539, 1878, p. 350; Rothsch., *l. c.*, p. 120, pl. 24; Salvad., *Cat.*, p. 595; *tricarunculatus*, Salvad. (pt.) — Nouv.-Guinée N.-W.

3314. *Var.* ALTIJUGUS, Scl., *Nature*, 1878, p. 375; Rothsch., *J. f. O.*, 1901, p. 361; *intensus*, Rothsch., *Bull. B. O. Club*, 1898, VIII, — Wandammen (Nouv.-Guinée).

(1) Voy. aussi : W. Rothschild, *A Monograph of the genus Casuarius (Trans. of the Zool. Soc. of London*, XV, pt. 5 (1900).

Digitized by Google

pp. 21, 55; id., *Monogr.*, p. 121, pl. 27; *salvadorii* (pt.), Rothsch., *l. c.*, p. 120.

3315. *Var.* VIOLICOLLIS, Rothsch., *Bull. B. O. C.* VIII, pp. 27, 55; id., *Monogr.*, p. 122, pl. 26. — ? Ile Trangan (Arou).

3316. *Var.* AUSTRALIS, Wall., *Sydn. Heral*, 1854; Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 269; id., *B. Austr.*, *Suppl.*, pl. 70, 71; Rothsch, *l. c.*, p. 123, pl. 25; *johnsonii*, F. Müll.; ?*regalis*, Rosenb. — Queensland N. (Australie).

11.991. BICARUNCULATUS, Scl., *P. Z. S.*, 1860, pp. 211, 248; Schl., *Mus. P.-B.*, *Struth.*, p. 10; Rothsch., *l. c.*, p. 129, pl. 28; *aruensis*, Schl.; *galeatus*, Rosenb. (nec V.) — Iles Wammer et Kabroor (Arou).

11.992. UNAPPENDICULATUS, Blyth, *Journ. As. Soc. Beng.*, 1860, p. 112; Benn., *Ibis*, 1860, p. 403, pl. 14; Schl., *l. c.*, p. 10; Salvad., *Mém. R. Ac. Sc. Tor.*, 1881, p. 205, pl. 2, f. 6; Rothsch., *l. c.*, p. 132 (pt.); *kaupi*, Rosenb. — Salwatti.

3317. *Var.* ROTHSCHILDI, Matsch., *Journ. f. Orn.*, 1901, p. 268; *unappendiculatus* (pt.), Rothsch., *l. c.*, p. 132, pl. 29, 30. — Presqu'île Beran (N.-Guinée N.-W.)

3318. *Var.* OCCIPITALIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 718 (note), 1878, p. 423; Oust., *Arch. Mus.* VIII, 1896, p. 264, pl. 14; Rothsch., *l. c.*, p. 135, pl. 31; *westermanni*, Rey (nec Scl.); *laglaizei*, Oust., *Bull. Soc. Philom.*, 1893, n° 9, pp. 1-3 (aberr.), id., *Nouv. Arch. Mus.*, 1896, VIII, p. 265, pl. 15. — Ile Jobi.

3319. *Var.* AURANTIACA, Rothsch., *Bull. B. O. Club*, VIII, p. 1; id., *Monogr.*, p. 136, pl. 32. — Nouv.-Guinée allemande.

3320. *Var.* RUFOTINCTA, Rothsch., *Monogr.*, p. 137. — ?

11.993. PHILIPI, Rothsch., *Nov. Zool.* V, p. 418; id., *Monogr.*, p. 138, pl. 33. — ? Nouv.-Guinée E.

11.994. PAPUANUS, Schleg., *Ned. Tijdschr. Dierk.* IV, 1871, p. 54; id., *Mus. P.-B.*, *Str.*, p. 11; Rothsch., *l. c.*, p. 139, pl. 34; *kaupi*, Scl. (nec Rosenb.); *papuensis*, Scl.; *westermanni*, Scl. — Nouv.-Guinée N.-W.

3321. *Var.* EDWARDSI, Oust., *P. Z. S.*, 1878, p. 389, pl. 21; Rothsch., *l. c.*, p. 141, pl. 35; *papuanus* (pt.), Salvad., *Cat.*, p. 600. — Nouv.-Guinée allem. N.-W

11.995. LORIÆ, Rothsch., *Nov. Zool.*, 1898, p. 513; id., *Monogr.*, p. 142, pl. 38; *picticollis*, Salvad. (nec Scl.) — Nouv.-Guinée S.-E.

11.996. PICTICOLLIS, Scl., *Rep. Brit. Assoc.*, 1874, p. 138; id., *P. Z. S.*, 1875, p. 84, pl. 18; Rothsch., *l. c.*, p. 143, pl. 36. — Nouv.-Guin. anglaise.

3322. *Var.* HECKI, Rothsch., *Bull. B. O. C.* VIII, p. 49; id., *Monogr.*, p. 144, pl. 37. — Nouv.-Guinée allem.



Digitized by Google

11.997. BENNETTI, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 269, pl. 129; id., *B. Austr.*, *Suppl.*, pl. 72, 73; Schl., *l. c.*, p. 4; Rothsch., *l. c.*, p. 145, pl. 39. — Nouv.-Bretagne.

3325. *Var.* MACULATA, Rothsch., *Monogr. Cas.*, p. 148. — ?

# ORD. XXII. — RHEÆ

## FAM. RHEIDÆ

### 1951. — RHEA

*Rhea*, Lath. (1790); *Toujou*, Lacép. (1801); *Tujus*, Rafin. (1815); *Pterocnemia*, Gray (1871); *Pterocnemys*, Scl. et Salv. (1873).

11.998. AMERICANA (Lin.); Lath., *Ind. Orn.* II, p. 665; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 74, pl. 224; *nandu*, Less.; *albescens*, Arrib. (aberr.) — Brésil centr., Bolivie, Paraguay, Urug., Argentine.

3324. *Var.* MACRORHYNCHA, Scl., *P. Z. S.*, 1860, p. 207; id., *Tr. Z. S.* IV, p. 356, pl. 69; Salvad., *Cat.*, p. 581; *americana* (pt.), auct. plur. (nec L.) — Brésil N.-E.

11.999. DARWINI, Gould, *P. Z. S.*, 1837, p. 35; id., *Voy. Beagle*, *B.*, p. 123, pl. 47; Gray, *Gen. B.* III, pl. 138; *pennata*, D'Orb. — Chili, Argentine, Patagonie.

# ORD. XXIII. — STRUTHIONES

## FAM. STRUTHIONIDÆ

### 1952. STRUTHIO

*Struthio*, Lin. (1758).

12.000. CAMELUS, Lin.; Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 70, pl. 223; Salvad., *Cat.*, p. 572. — Soudan, Arabie, Palestine.

3325. *Var.* MOLYBDOPHANES, Rchw., *Mitth. Orn. Ver. Wien*, 1883, p. 203, pl.; id., *Journ. f. Orn.*, 1883, p. 399; Salvad., *Cat.*, p. 574; *camelus* (pt.), auct. plur. — Somaliland.

3326. *Var.* AUSTRALIS, Gurn., *Ibis*, 1868, p. 253; Anderss., *B. Damaral.*, p. 251; Salvad., *Cat.*, p. 575; *camelus* (pt.), auct. plur.; *meridionalis*, Scl. — Afrique S.

3327. *Var.* MASSAICA, O. Neum., *J. f. O.*, 1898, p. 243. — Massaïland.

Digitized by Google

# SUPPLÉMENT

## ADDITIONS ET CORRECTIONS (1)

### PSITTACI

**3.** *Microglossa salvadorii*, Mey. = M. ATERRIMUS, juv.

**11.** (Gen.) Au lieu de *Chrysotis* il faut : AMAZONA, Less. (1831, nec 1847).

**34.** *Amazona imperialis*, Richm., *Auk*, 1899, p. 186 = A. AUGUSTA (Vig.)

1. AMAZONA SCHMIDTI, Ihering, *Rev. Mus. Paulista*, III, p. 321. Brésil central.

**48.** Au lieu de *levaillanti* il faut : ORATRIX, Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 587.

1. AMAZONA ORATRIX, *var.* TRESMARIÆ, Nels., *Auk*, 1900, p. 256. Tres Marias.
2. — ALBIFRONS, *var.* SALTUENSIS, Nels., *Pr. Biol. Soc. Wash.* XIII, p. 26. Mexique N.-W.

**12.** (Gen.) Au lieu de *Pachynus*, Rchw. (1881, nec Stål., 1866) il faut : GRAYDIDASCALUS, Bp. (1854).

**24.** *Var. Lacera*, Heine = PIONUS MAXIMILIANI (Kuhl).

2. POICEPHALUS SATURATUS, Shpe, *Bull. B. O. C.* XII, p. 67. Ankole N. (Afr. éq.)
3. — KINTAMPOENSIS, Alex., *Bull. B. O. C.* XII, p. 10. Côte d'Or, Hinterland.

**36.** *Var. Erythreæ*, Neum. = P. MEYERI (Rüpp.)

**37.** *Var. Transvaalensis*, Neum. = P. MEYERI.

**130.** (p. 11.) Au lieu de *Texas* lisez *Arizona* S.

4. PYRRHURA HYPOXANTHA, Salvad., *Boll. Mus. Torino*, XIV, n° 363, p. 1 ; id., *Ibis*, 1900, pl. 14. Matto-Grosso (Brésil).
5. — GRISEIPECTUS, Salvad., *Ibis*, 1900, p. 672. Hab. ?

**191**, pt. PSITTACULA PALLIDA, Brewst., *Auk*, 1889, p. 85, est une *var.* du P. CYANOPYGIA. Senora.

**191**, pt. — INSULARIS, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 541, est une espèce distincte. Tres Marias.

**193**, pt. — DELICIOSA, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 545, est une espèce distincte. Bas-Amazone.

(1) Les numéros imprimés en caractères gras se rapportent aux dénominations indiquées antérieurement dans le *Synopsis avium;* pour les additions, le numérotage recommence par le n° 1, aussi bien pour les espèces que pour les variétés nouvelles.

Digitized by Google

3. Eclectus pectoralis, *var.* Aruensis (Gray), *P. Z. S.*, 1858, p. 182; Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.* III, p. 535. — Iles Arou.
4. — pectoralis, *var.* Solomonensis, Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 82. — Iles Salomon.
5. Geoffroyus personatus, *var.* Explorator, Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 4. — Goram.
6. — personatus, *var.* ?Lansbergi, Finsch, *Notes Leyd. Mus.* XX, p. 225. (N'est-ce pas le *sumbavensis*, Salvad.?) — Sumbawa.
7. — personatus, *var.* Cyanicarpus, Hart., *Nov. Zool.* VI, p. 81. — Ile Rossel.

6. Prioniturus mada, Hart., *Nov. Zool.* VII, p. 250. — Ile Bourou.
8. Tanygnathus megalorhynchus, *var.* Viridipennis, Hart., *Nov. Zool.* X, p. 22. — Ile Tukang-Besi (au S.-E. de Célèbes).
9. Palæornis alexandri, *var.* Major, Richm., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1902, p. 188. — Sumatra W.

7. Psittinus abbotti, Richm., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1902, p. 188. — Ile Simalur (Sumatra W.)

8. Nasiterna viridifrons, Rothsch. et Hart., *Orn. Mon.*, 1899, p. 138. — Nouv.-Hanovre.

9. — tristrami, Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 589. — Ile Kulambangra (Salomon).
10. — pusio, *var.* Salvadorii, Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 81. — Nouv.-Guinée N.-W.

10. — orientalis, De Vis, *Ann. Rep. Brit. New Guin.*, 1898, *App.*, p. 81. — Nouv.-Guinée S.-E.

11. ?Platycercus paradiseus, Russ., *J. f. O.*, 1871, p. 236. — Hab. ?

12. — macgillivrayi, North, *Victor. Natural.* VII, 1900, pp. 91, 113; Sclat., *Ibis*, 1902, p. 610, pl. 15. — Queensland N.

13. Barnardius occidentalis, North, *Rec. Austr. Mus.* II, p. 83. — Australie N.-W.

14. Psephotus dissimilis, Coll., *P. Z. S.*, 1898, p. 356. — Australie N.

15. Pezoporus fairchildi, Hect., *Tr. N. Z. Inst.*, 1895, p. 285. — Ile Antipode.

16. Nestor septentrionalis, Lorenz., *Verh. z.-b. Ges. Wien*, 1896, p. 198. — Nouv.-Zélande, île N.

**365**. Au lieu de *Eos riciniata* il faut : E. variegata (Gm.), qui a priorité.

11. Eos variegata, *var.* Obiensis, Rothsch., *Bull. B. O. C.*, 1899, p. 16; id., *Ibis*, 1900, p. 191. — Ile Obi (Moluques).
12. Lorius lory, *var.* Major, Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 66. — Waigiou.
13. Trichoglossus hæmatodes, *var.* Intermedia, Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 70. — Nouv.-Guinée allem.

17. Trichoglossus alorensis, Finsch, *Notes Leyd. Mus.* XX, p. 226. — Ile Alor.

Digitized by Google

14. Trichoglossus novæ-hollandiæ, *var.* Septentrionalis, Rob., *Bull. Liverp. Mus.* II, 1900, p. 115. — Queensland N.
18. Hypocharmosyna meeki, Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 187. — Kulambangra (Salom.)
19. Charmosyna bella (De Vis), *Ann. Queensl. Mus.*, n° 5, p. 12, pl. 8. — N^lle-Guin., Wharton.
20. Oreopsittacus frontalis, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 186. — Nouv.-Guinée S.-E.

**415.** — *chlorigaster*, Sharpe, *Zool. Rec.*, 1898, *Aves*, p. 43 = O. grandis, Grant.

## SCANSORES ZYGODACTYLÆ

**436.** Indicator major, Steph. — Afr. N.-E., E., S.-E. et Sénégambie.
21. — barianus, Heugl., *Syst. Uebers.*, p. 48; *böhmi*, Rchw. — **436**, pt. et var. **142**. — Afrique équator. jusqu'au Zambèze.
22. — willcocksi, Alex., *Bull. B. O. C.* XII, p. 11; id., *Ibis*, 1902, p. 364, pl. 8. — Côte d'Or.
23. — poensis, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, p. 33. — Fernando Po.
15. — minor, *var.* Teitensis, Neum., *J. f. O.*, 1900, p. 195. — Teita (Afrique E.)
24. — lovati, Grant, *Bull. B. O. C.* X, 1900, p. 39. — Abyssinie.
25. — feæ, Salvad., *Ann Mus. Gen.* XX, 1901, p. 783. — Guinée portug.
26. — ussheri, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XII, p. 80. — Fantée.
27. Prodotiscus peasei, Grant, *Bull. B. O. C.* XI, p. 67; id., *Ibis*, 1901, p. 667, pl. 13. — Abyssinie.
28. — ellenbecki, Erl., *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 182. — Arrussi (Afrique N.-E.)

80^bis (Gen.) Lybius, Herm. (1883); ce genre comprend les *Pogonorhynchus*, n^os 449 à 461 (pp. 35, 36), formant le g. *Melanobucco* de Shelley.

29. Lybius thiogaster, Neum., *Orn. Monatsb.*, 1903, p. 59; *undatus* (pt.), auct. — Abyssinie N.
30. — leucogenys (Blund. et Lovat), *Bull. B. O. C.* X, p. 21. — Konduro (Abyssinie).
**148.** Tricholæma hirsutum, *var.* Flavipunctata, Verr.; *gabonense*, Shell. — Gabon, Caméron.
**149.** *Tr. hirsutum, var. Stictilæma*, Rchw. = 147, *var.* Ansorgii, Shell. — Uganda.
31. Tricholæma nigrifrons, Rchw., *J. f. O.*, 1899, p. 418. — Afrique E. allem.
32. Gymnobucco peli, Hartl. (**473**, pt.), est une espèce distincte. — Afrique W.

**83** (Gen.) *Smilorhis* = Stactolæma (**85**, p. 38).

**496.** Stactolæma leucomystax, Sharpe, est un Barbatula.

33. — bocagei (Souza), *Jorn. Lisb.*, 1886, p. 158. — Benguela.
34. Barbatula xanthosticta, Blund. et Lovat, *Bull. B. O. C.* X, p. 21. — Abyssinie S.
35. — centralis, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 40. — Ndussuma (Afrique E).

Digitized by Google

36. Barbatula kandti, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1903, p. 23. Lac Kiwu, Kandt.

**87** (Gen.) *Thereiceryx*, Blanf., *Ibis*, 1893, p. 234 = Megalæma.

37. Xantholæma robustirostris, Stuart Bak., *J. Bomb. N. H. Soc.* X, 1896, p. 556. Cachar N.

16. Capito auratus, *var.* Intermedia, Berl. et Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 98. Nericagua.

17. — — *var.* Aurantiicincta, Dalm., *Bull. Soc. Zool. de France*, 1900, p. 177. Caura.

18. — shellevi, Dalm., *l. c.*, p. 179. Ecuador.

**92** (Gen.) Au lieu de *Tetragonops*, Jard. (nec Gaerst), il faut : Semnornis, Richm., *Auk*, 1900, p. 179; *Pan*, Richm. (nec Oken), *Auk*, 1899, p. 77.

38. Rhamphastos hæmatorhynchus, Berl. et Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 99. Caura, Orénoque.

39. Aulacorhamphus lautus, Bangs, *Pr. Biol. Soc. Wash.* XII, p. 163. Colombie.

19. Galbula ruficauda, *var.* Pallens, Bangs, *l. c.* XII, p. 133. Santa Martha (Col.)

**630**. Au lieu de *Jac. grandis*, Gm. ; il faut : Jacamerops aureus (P. L. S. Müll.).

**685**. Supprimez dans la syn. : *vagans*, Müll. et *nisicolor*, Hodgs. (p. 50).

40. Hierococcyx nisicolor (Hodgs.); Blanf., *Faun. Br. Ind.*, *B.* III, p. 214; Finsch, *Notes Leyd. Mus.*, 1901, p. 98; *varius* (pt.), Schl. ; *fugax* (pt.), Shell. Népaul.

**686**. Hierococcyx vagans (Müll.), *Ver. Nat. Gesch. Land- en Volk.*, 1839-44, p. 253; *varius* (pt.), Schl. ; *nanus*, Hume. Ténasserim, Salanga, Born. N.-W., Java.

41. Cuculus concretus, S. Müll., *Verh. Nat. Gesch. Land- en Volk.*, 1839-44, p. 256 (**688**, pt.) est une espèce distincte. Malacca, Sumatra, Java et Bornéo.

**698**. Au lieu de *C. pallidus*, auct. plur. (nec Lath.), il faut : C. variegatus, Vieill.

42. Cuculus jacksoni, Shpe. *Bull. B. O. C.* XIII, 1903, p 7. Toro, Ruwenzori.

43. Cacomantis addendus, Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.*, 1901, p. 185. Kulambangra (îles Salomon).

44. — wersteri, Hart., *Trough New Guin.*, p. 370; id., *Orn. Monatsb.*, 1899, p. 138. Nouv.-Hanovre.

45. — schistaceigularis, Sharpe, *Ibis*, 1900, p. 358. Nouv.-Hébrides.

46. — weiskei, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 186. Nouv.-Guinée S.-E.

47. — meeki, Rothsch. et Hartl., *Nov. Zool.*, 1902, p. 586. Ile Isabelle (Salomon).

48. Chrysococcyx rufomerus, Hart., *Nov. Zool.*, 1900, p. 21. Ile Dammer.

49. — innominatus (Finsch), *Notes Leyd. Mus.* XII, p. 94. Ile Kisser, Timor.

50. — nieuwenhuisi, Vorderm., *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.* LVIII, 1898, p. 196. Halmahera.

51. Coccyzus euleri, Cab., *J. f. O.*, 1873, p. 73; Stone, *Ibis*, 1899, p. 476; *americanus* (pt.), auct. plur. (nec L.); *lindeni*, Allen (**729**, pt.) Amazone, Guyane, Brésil.

52. — abbotti, Stone, *Pr. Philad. Acad.*, 1899, p. 501. Ile St-Andrews.

Digitized by Google

20. EUDYNAMIS ORIENTALIS, *var.* SALVADORII, Hart., *Nov. Zool.*, 1900, p. 252. — Nouv.-Irlande, Nouv.-Bretagne.
21. — CYANOCEPHALA, *var.* EVERETTI, Hart., *l.c.*, p. 251. — Alor, Sumba, Tim., Key.
22. — MELANORHYNCHA, *var.* FACIALIS, Wall., *P. Z. S.*, 1862, p. 339; Hart., *Nov. Zool.*, 1898, p. 127; *melanorhyncha* (pt.), Shell. A biffer au n° **739** : *socialis* et îles Soula. — Iles Soula.
23. CENTROPUS NIGRORUFUS, *var.* THIERRYI, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1899, p. 190. — Togo (Afrique N.-W.)
24. RHAMPHOCOCCYX CALORHYNCHUS, *var.* MERIDIONALIS (Mey. et Wg.), *B. Cel.* I, p. 227. — Célèbes S. et W.
25. — — *var.* RUFILORIS (Hart.), *Nov. Zool.*, 1903, p. 24. — Ile Buton.

**840**. COLAPTES AURATUS, Lin. — États-Unis S.-E.
26. — — *var.* LUTEA, Bangs (**840**, pt.) — Amérique N.-W., de l'Alaska au Texas).

**842**. — MEXICANUS, Sw. — Mexique.
27. — — *var.* COLLARIS, Vig.; Nels., *Auk*, 1900, p. 125 (**842**, pt.) — De la Colombie angl. à la Californie.
28. — — *var.* SATURATIOR, Ridgw., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1884, p. 90. — Colomb. angl., Alaska.
29. — — *var.* RUFIPILEUS, Ridgw., *Bull. U. S. Geol. Surv.*, 1876, n° 2, p. 191 (**842**, pt.) — Ile Guadelupe.

**844**. — AYRESI est un hybride, à supprimer de la liste.

53. GECINUS RABIERI, Oust., *Bull. Mus. Paris*, 1898, p. 12; id., *Arch. Mus. Paris* (4) I, pl. 7. — Tonkin.
54. — HAINANUS, Grant, *Ibis*, 1899, p. 584. — Haïnan.
55. — CITRINOCRISTATUS, Rick., *Bull. B. O. C.* XI, 1901, p. 46. — Chine S.
56. CHLORONERPES LITÆ, Rothsch., *Bull. B. O. C.* XI, 1901, p. 70. — Ecuador N.
57. — RUBRIPILEUS, Salvad. et Festa, *Boll. Mus. Torino*, XV, n° 368, p. 14. — Ecuador.
58. CAMPOTHERA NIGRA (Neum.), *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 9. — Ethiopie S.
59. — MALIIERBEI (Cass.); *imberbis*, Sund. (**890**, pt.) — Zanzibar.
30. — — *var.* NYANSÆ (Neum.), *J. f. O.*, 1900, p. 204. — Nyansa (Afrique E.)
31. — — *var.* FÜLLEBORNI (Neum.), *l. c.* — Région du lac Nyassa.
60. — HAUSBURGI, Sharpe, *Bull. B. O. C.* X, 1900, p. 36. — Mt Kenya (Afr. équat.)
32. — PERMISTA, *var.* KAFFENSIS (Neum.), *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 9. — Kaffa (Ethiopie S.)
33. — CAROLI, *var.* ARIZELA (Oberh.), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1900, p. 29. — Libéria.
61. — POENSIS, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, 1903, p. 33. — Fernando Po.
62. CHRYSOPHLEGMA STYANI, Grant, *Ibis*, 1899, p. 585. — Haïnan.
34. CENTURUS DUBIUS, *var.* VERÆCRUCIS (Nels.), *Auk*, 1900, p. 259. — Vera-Cruz, Tabasco.

Digitized by Google

**938.** Au lieu de *C. tricolor* il faut : CENTURUS SUBELEGANS, Bp., *P. Z. S.*, 1837, p. 109 (**938** et **940**, pt.) — Vénézuéla, Tobago.

35. CENTURUS SUBELEGANS, *var.* WAGLERI (Salv. et Godm.), *Biol. Centr. Am.* II, p. 416; *tricolor*, Wagl. (nec Gm.), **938**, pt. — Chiriqui, Panama, Colombie N.

36. — — *var.* SEDUCTA (Bangs), *Auk*, 1901, p. 26. — Ile San-Miguel.

37. — — *var.* NEGLECTA (Richm). — Bogota.

38. — — *var.* SANCTÆ MARTÆ, Bangs, *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1898, pp. 131-44. — S. Martha (Colombie).

63. — FRONTALIS (Nels.), *Auk*, 1900, p. 257. — Chiapas, Mexique.

39. — AURIFRONS, *var.* FUMOSA (Nels.), *Auk*, 1900, p. 258. — Chiapas, Guatémala.

40. SPHYROPICUS VARIUS, *var.* DAGGETTI, Grinn., *Condor*, III, p 12. — Californie S.

41. PICUS MAJOR, *var.* ANGLICA (Hart.), *Nov. Zool.*, 1900, p. 528. — Angleterre.

42. — CABANISI, *var.* LUCIANI, Malh. (**951**, pt.) — Mongolie W., Chine N.

43. — VILLOSUS, *var.* HYLOSCOPA (Cab. et H.), *Mus. Hein.* IV, p. 68 (**238**, pt.) — Arizona, Californie, Basse-Californie.

44. — — *var.* INTERMEDIA (Nels.), *Auk*, 1900, p. 259. — Mexique.

**962.** — PUBESCENS, L. ; *meridionalis*, SW. — Sud des États-Unis.

45. — — *var.* MEDIANA, SW. (**962**, pt.) — Ét.-Unis centr. et sept.

Supprimez la *var. Meridionalis* (243) qui est remplacé par :

**243.** — — *var.* OREOECA, Batch., *Auk*, 1889, p. 253. — Montagnes Rocheuses.

**980.** Au lieu de *tridactylus* il faut : HIRSUTA, Steph., *Gen. Zool.* IX, p. 219, pl. 38.

46. TRIDACTYLIA HIRSUTA, *var.* ALBIDIOR, Stejn., *Bull. U. S. Nat. Mus.*, n° 29, 1885, pp. 321, 338, 342; id., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1888, p. 168. — Kamtschatka.

**981.** — DORSALIS, Baird, est une var. de AMERICANA, Brm.

**255.** *Var.* ALASCENSIS = T. AMERICANA.

47. TRIDACTYLIA AMERICANA, *var.* BACATA (Bangs), *Auk*, 1900, p. 136. — Amérique N.-E.

48. — — *var.* LABRADORIA (Bangs), *Auk*, 1900, p. 138. — Labrador.

49. — ARCTICUS, *var.* TENUIROSTRIS (Bangs), *Auk*, 1900, p. 131. — Sierra Nevada de Californie.

**986.** DENDROPICUS GUINEENSIS (Scop.), a priorité sur *D. cardinalis* (Gm.)

**256.** — — *var.* HARTLAUBI, Malh. = *Zanzibari*, Malh.

50. — — *var.* MASSAICA, Neum., *J. f. O.*, 1900, p. 206. — Massaïland N.

51. — — *var.* CENTRALIS, Neum., *l. c.* — Nyassa N., Uhehe.

64. — NANDENSIS, Neum., *Orn. Mon.*, 1901, p. 184. — Nandi.

**991.** — *simoni*, Grant, *Bull. B. O. C.* X, 1900, p. 38 = D. LEPIDUS (Cab. et H.)

65. — STIERLINGI, Rchw., *Orn. Mon.*, 1901, p. 166. — Nyassa N.

Digitized by Google

**995.** Denbropicus lacuum, Rchw. = reichenowi, Sjöst. (**996**).

52. — obsoletus, *var.* Ingens (Hart.), *Nov. Zool.* VII, p. 33. — Nairobe (Afr. E. angl.)

**169** (Gen.) Veniliornis, Bonap. (1854), au lieu de *Eleopicus*, Bp. (1854).

**265**. Au lieu de *var. Peruviana*, Tacz. (1886), il faut: *var.* Major, Tacz. (1883).

66. Veniliornis neglectus, Bangs, *P. New Engl. Zool. Club*, II, p. 99. — Chiriqui.

67. — orenocensis, Berl. et Hart., *Nov. Zool.* IX, 1902, p. 93. — Orénoque.

Répartition géographique à rectifier de la manière suivante :

**1045.** Mesopicus goertan (S. Müll.) — Sénégambie.

**267.** — — *var.* Poliocephala (Sw). — De la Gambie au Loango (Afrique W.)

53. — — *var.* Abessinica, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 58. — Abyssinie, Kordofan, Sennaar.

54. — — *var.* Centralis, Rchw., *l. c.*, p. 59. — Du Niam-Niam au fl. des Gazelles.

**1046.** — spodocephalus (Bp.) — Choa, Ethiop. S., Harar.

53. — — *var.* Rhodeogaster, Fisch. et Rchw., *J. f. O.*, 1884, p. 180; Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 183; (**1046**, pl.) — Montagnes Mau, Kenia et Maeru.

68. Mesopicus ruwensorii, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XIII, 1903, p. 8. — Ruwenzori.

69. Blythipicus hainanus (Grant), *Ibis*, 1899, p. 583. — Haïnan.

**1069.** Tiga javanensis (Ljung). — Malacca, Sumatra, Java, Bornéo.

56. — — *var.* Intermedia (Blyth), *J. A. S. B.*, 1845, p. 195 (**1069**, pl.) — Ténass. jusqu'au Bengale et le S. de l'Inde.

57. — — *var. Exsul*, Hart., *Nov. Zool.* VIII, 1901, p. 51. — Bali.

58. Campophilus guatemalensis, *var.* Buxans, Bangs, *Auk*, 1901, p. 360. — Chiriqui.

**182** (Gen.) Au lieu de *Hemilophus*, Sw. (1837, nec Serville, 1835), il faut : Mulleripicus, Bp. (1854).

59. Thripanax javensis, *var.* Parva, Richm., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1902, p. 189. — Ile Simalur (Sumat. W.)

70. Picumnus macconnelli, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XII, 1901, p. 4. — Guyane angl.

71. — stellæ, Berl. et Hart., *Nov. Zool.* IX, 1902, p. 96. — Orénoque.

**187** (Gen.) *Blacops*, Richm., 1899 = Verreauxia.

60. Sasia abnormis, *var.* Magnirostris, Hart., *Nov. Zool.* VIII, 1901, p. 41 ; (**1177**, pl.) — Ile Nias.

## HETERODACTYLÆ

72. Pharomacrus festatus, Bangs, *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1899, p. 92. — Sierra Nevada de Sta-Marta (Colombie).



Digitized by Google

73. Trogon virginalis, Cab. et H., *Mus. Hein.* IV, p. 173; Salvad. et Festa, *Boll. Mus. Tor.*, n° 364, p. 17; (**1191**, *collaris*, pt.) — Ecuador.

61. Trogon ambiguus, *var.* Goldmanni, Nels., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1898, p. 8. — Tres Marias.

**195** (Gen.) *Heterotrogon*, Richm. (1894) = Hapaloderma.

62. Hapaloderma narina, *var.* Æquatorialis, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XII, 1901, p. 3. — Cameron.

**196** (Gen.) Pyrotrogon, Bp. (1854) au lieu de *Harpactes*, Sw. (1837, nec Templet., 1834).

74. Pyrotrogon neglectus, Forb. et Rob., *Bull. Liverp. Mus.* II, 1899, p. 34. — Malacca, Sumatra.

63. — erythrocephalus, *var.* Yamakanensis (Grt.), *Bull. B. O. C.* VIII, 1899, p. 48. — Fo-kien (Chine S.)

75. — hainanus (Grant), *Ibis*, 1900, p. 371; id., *P. Z. S.*, 1900, p. 485. — Haïnan.

## AMPHIBOLÆ

64. Turacus emini, *var.* Finschi, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1899, p. 190. — Niam-Niam.

65. — livingstoni, *var.* Hybrida, Rchw., *J. f. O.*, 1898, p. 814. — Nyassaland, Uhehe.

76. — donaldsoni, Sharpe, *Ibis*, 1895, p. 381. — Somalil. W. jusqu'au S. de l'Abyssinie.

77. Gallirex johnstoni, Sharpe, *Bull. B. O. C.*, 1901, p. 57; id., *Ibis*, 1902, p. 112, pl. 5. — Afrique équator

66. Schizorhis concolor, *var.* Pallidiceps (Neum.), *J. f. O.*, 1899, p. 66. — Angola, Benguela.

67. Colius leucotis, *var.* Berlepschi, Hart., in *Ansorges Afr. Sun*, p. 334; id., *Nov. Zool.* VII, p. 31. — Afrique E. allem.

68. — capensis, *var.* Damarensis, Rchw., *J. f. O.*, 1899, p. 418. — Damara.

69. — macrourus, *var.* Pulchra, Neum., *J. f. O.*, 1900, p. 190. — Teita, Taweta (Afr. E.)

## ANISODACTYLÆ

70. Coracias garrula, *var.* Loquax, Licht. (**1269**, pt.), Rchw., *Orn. Mon.*, 1899, p. 191. — Afrique tropic. et S.

**1270**. — abyssinica, Bodd. — Rectifiez l'habitat : — Abyssinie, Arabie.

71. — — *var.* Senegalensis, Gm. (**1270**, pt.); Rchw., *l. c.* — Sénégambie.

72. — spatulata, *var.* Dispar, Boc., *Jorn. Lisb.*, 1880, p. 227; Rchw., *l. c.*; (**1273**, pt.) — Benguela.

Digitized by Google

73. Coracias nævius, *var.* Sharpei, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1899, p. 192. — Afrique E. allem.

78. Eurystomus neohanoveranus, Hart., *Nov. Zool.* VIII, 1901, p. 185; *solomonensis*, Hart. (1899, nec Sharpe). — Nouv.-Hanovre.

**213** (Gen.) Prionornis, Salv. et Godm. (1895), au lieu de *Prionirhynchus*, Scl. (1857, nec Jacq. et Luc., 1854).

74. Momotus æquatorialis, *var.* Chlorolæma, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1902, II, p. 35. — Pérou centr.

75. — lessoni, *var.* Goldmani, Nels., *Auk*, 1900, p. 256. — Vera-Cruz, Oaxaca.

**1306**. *Melittophagus ocularis*, Rchw., *Orn. Mon.*, 1900, p. 87 = M. pusillus.

76. Melittophagus pusillus, *var.* Sharpei, Hart., *Nov. Zool.* VII, 1900, p. 398. — Somaliland, Abyssinie, Choa.

**315**. — — *var. Cyanosticta*, Cab., *J. f. O.*, 1875, p. 340; Finsch, *Not. Leyd. Mus.*, 1901, p. 4; *minutus* (pl.), Finsch (1870); *erythropterus*, Heugl. (nec Gm.); *meridionalis*, Sharpe (voir **314**). — Afr. S.-W., S. et S.-E., du Loango au Dam. et du Pangani au Natal.

79. Merops northcotti, Sharpe, *Bull. B. O. C.* X, 1900, p. 49. — Côte-d'Or.

80. — merionis, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, 1903, p. 33. — Fernando Po.

81. — batesianus, Sharpe, *Bull. B. O. C.* X, 1900, p. 48. — Congo français.

82. — sumbaensis, A. B. Mey., *Sitz. Ges. Isis, Dresden*, 1884. pp. 6, 19; Hart., *Nov. Zool.*, 1896, pp. 570, 586. — Sumba.

77. Irrisor viridis, *var.* Guineensis, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1902, pp. 78, 79. — De la Guinée portug. au Niger.

78. — — *var.* Damarensis, Grant, *Bull. B. O. C.* XII, 1901, p. 37; id., *Ibis*, 1902, p. 434, pl. 10, f. 1. — Damara, Afrique E. et Afrique E. angl.

79. — — *var.* Melanorhyncha (Licht.); *senegalensis*, Vieill.; *erythrorhynchus* (pt.), Salv. (**322**, pt.) — Afrique N.-E. et Sénégambie.

80. — — *var.* Somaliensis, Grant, *Bull. B. O. C.* XII, 1901, p. 38; id., *Ibis*, 1902, p. 435, pl. 10, f. 2. — Somaliland.

81. Rhinopomastus cyanomelas, *var.* Schalowi, Neum., *J. f. O.*, 1900, p. 221. — Afrique tropicale E.

82. Upupa epops, *var.* Pallida, Erl., *J. f. O.*, 1900, p. 15. — Tunisie.

83. — somalensis, *var.* Intermedia, Grant et Reid, *Ibis*, 1901, p. 674. — Abyssinie S.

83. Pholidophalus kethullei, Dubois, *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 69. — Haut-Congo.

**243** (Gen.) *Rhabdotorrhinus*, Mey. et Wg. (1898) = Hydrocissa.

Digitized by Google

**245** (Gen.) *Horizocerus*, Oberh. (1900) = ALOPHIUS.
**339**. *Alophius sibbensis* (Sharpe) = A. DECKENI (**1397**).
**1404**. DACELO GIGAS (Bodd.); *minor*, Robins.
84. HALCYON BADIUS, *var.* LOPEZI, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, 1903, p. 55. — Fernando Po.
**1437**. — *semicæruleus* (Forsk.); supprimez dans la syn. *actæon*, Less. et *rufiventer*, Sw. — Afrique N.-E.
85. — — *var.* HYACINTHINA, Rchw., *J. f. O.*, 1900, p. 249. — Zanzibar, Useguha.
86. — — *var.* RUFIVENTRIS, Sw. — Afrique W.
**356**. — — *var.* ACTÆON, Less.; Oust., 3e *Congrès Orn.*, p. 228; *erythrogastra*, Gd.; *jagoensis*, Bolle. — Iles du Cap Vert.
84. — FARQUHARI, Sharpe, *Bull. B. O. C.* X, 1899, p. 29. — Nouv.-Hébrides.
85. — ELISABETHÆ, Heine, *J. f. O.*, 1885, p. 222; Berl., *l. c.*, 1897, p. 90. — Nouv.-Guinée allem.
87. — AUSTRALASIÆ, *var.* DAMMERIANA, Hart., *Nov. Zool.* VII, p. 19. — Ile Dammer.
**371**. — *var.* PACHYRHYNCHA, Rchw. = H. TRISTRAMI, Layard (**1464**).
88. — CHLORIS, *var.* NUSÆ, Heinr., *J. f. O.*, 1902, p. 457, pl. 8, f. 2. — Nouv.-Hanov., Nouv.-Mecklenb.
86. — MATTHIÆ, Heinr., *J. f. O.*, 1902, p. 458, pl. 8, f. 1. — Ile St-Matthias.
89. SYMA TOROTORO, *var.* MEEKI, Rothsch., *Nov. Zool.* VIII, p. 147. — Nouv.-Guinée N.-E.
90. — — *var.* OCHRACEA, Rothsch., *l. c.*, p. 145. — Iles D'Entrecasteaux.
**1482**. — *weiskei*, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 186 = S. MEGARHYNCHA (fem.)
**1489**. CEYCOPSIS FALLAX (Schl.) — Célèbes.
91. — — *var.* SANGHIRENSIS, Mey. et Wg., *B. Celebes*, p. 278, pl. 10, ff. 2, 3. — Sanghir.
92. CEYX LEPIDA, *var.* COLLECTORIS, Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 376. — Guadalcanar.
**1499**. — — *var.* SACERDOTIS, Rams.
87. — MEEKI, Rothsch., *Bull. B. O. C.* XII, 1901, p. 23; id., *Nov. Zool.*, IX, p. 585, pl. 11, f. 1. — Ile Ysabelle (Salomon).
88. — LÆTA, De Vis, *Rep. Orn. Spec. N. Guin.*, 1894, p. 2. — Nouv.-Guinée S.-E.
89. — SAMARENSIS, Steere, *List B. Mam. Philipp.*, p. 10; *melanura* (pl.) (**1494**). — Samar, Leyte.
**1506**. *Alcedo spatzi*, Kg., *J. f. O.*, 1892, p. 367 = A. ISPIDA.
90. CORYTHORNIS THOMENSIS, Salvad., *Ibis*, 1902, p. 568, pl. 13. — Ile St-Thomas (Afrique W.)
93. ALCYONE AZUREA, *var.* YAMDENÆ, Rothsch., *Bull. B. O. C.* XI, p. 65. — Timor-Laut.
**402**. *Pelargopsis sasak*, Vorderm. = P. FLORESIANA, Sharpe.
**1527**. CERYLE LUGUBRIS (Tem.) pour habitat : — Japon.
94. — — *var.* GUTTULATA, Stejn., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1892, p. 294; *continentalis*, Hart., *Nov. Zool.* VII, p. 334. — Himalaya, Birmanie, Chine, Corée.

Digitized by Google

## MACROCHIRES

91. Ægothieles rufa, Hall., *Vict. Natural.* XVIII, p. 89; *rufescens*, Hall., *l. c.*, p. 60 (nec Salvad.)

92. Podargus inexpectatus, Hart., *Bull. B. O. C.* XII, p. 24; id., *Nov. Zool.* IX, p. 585. — Ile Ysabelle (Salomon).

93. Nyctibius jamaicensis, *var.* Mexicana, Nels., *Auk*, 1900, p. 260. — Mexique.

95. Lyncornis elegans, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1899, p. 130. — Nouv.-Guinée allem.

**1593**. Scotornis climacurus (Vieill). — Sénégambie, Nigeria, Soudan, Nubie.

96. — — *var.* Nigricans, Salvad.; id., *Ann. Mus. Civ. Gen.* (2) VI, p. 226, note; (**1593**, pt.) — Du Nil Blanc au Choa.

97. Nyctidromus albicollis, *var.* Insularis, Nels., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1898, p. 9. — Tres Marias.

98. — — *var.* Yucatanensis, Nels., *l. c.*, 1901, p. 171. — Yucatan.

99. — — *var.* Gilva, Bangs, *Pr. New Eng. Zool. Club*, 1902, p. 82. — ? (1)

100. Phalænoptilus nuttalli, *var.* Californica, Ridgw. (**1605**, pt.) — Californie.

*Nyctagreus*, Nels. (1901) = Antrostomus.

94. Antrostomus chiapensis, Nels., *Auk*, 1900, p. 261. — Chiapas (Mexique S.)

95. — goldmani, Nels., *Pr. Biol. Soc. Wash.* XIII, 1901, p. 26. — Mazatlan.

96. — oaxacæ, Nels., *Auk*, 1900, p. 260. — Oaxaca (Mexique S.)

101. Caprimulgus ruficollis, *var.* Desertorum, Erl., *J. f. O.*, 1899, p. 521, pl. 11, f. 1. — Tunisie.

**1629**. — trimaculatus (Sw.) a priorité sur *C. tristigma*, Rüpp.

97. — sharpei, Alex., *Bull. B. O. C.* XII, p. 29. — Côte-d'Or (Hinterland).

**1630**. — macrourus, Horsf.; *schlegeli*, Gr. (**436**, pt.); *salvadori*, Sharpe, appartiennent à la même forme dont voici l'habitat : — Gr. îles de la Sonde, Palaw., îles Papous jusqu'au N.-E. de l'Australie.

**436** (pt.) — — *var.* Ambigua, Hart. — Himal. E., Indo-Ch., Malac., Sum. N.-E.

98. — stellatus, Weld-Blund. et Lov., *Bull. B. O. C.* X, p. 21; Grant, *Ibis*, 1900, p. 511, pl. 4. — Abyssinie.

99. — fulleborni, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 98. — Nouv.-Helgoland (Afr. E. allem.)

100. — jonesi, Grant et Forb., *Bull. Liverp. Mus.*, 1899, p. 3. — Ile Sokotra.

102. — ægyptius, *var.* Saharæ, Erl., *J. f. O.*, 1899, p. 525, pl. 12, f. 1. — Tunisie.

(1) Cette variété m'a été indiquée par M. Oberholzer, mais sans indication d'habitat.

Digitized by Google

A corriger la synonymie et l'habitat du :

**1658.** Cypselus apus (Lin.) — Europe, Afrique N.

**442.** — — *var.* Acuticauda, Jerd. — Inde.

103. — — *var.* Pekinensis, Swinh., *P. Z. S.*, 1870, p. 435; (**442**, pl.) — La majeure partie de l'Asie continentale.

**443.** — — *var.* Murina, Brm. — Égypte jusqu'au golfe Persique.

104. — — *var.* Brehmorum, Hart., in *Naum. Vög. Deut.* IV (1901), p. 253; id., *Nov. Zool.* VIII, p. 326. — Madeire, Canaries, Afrique N.-W.

105. — — *var.* Shelleyi, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1888, p. 227 (**1658**, pt.) — Afrique N.-E.

106. — unicolor, *var.* Alexandri, Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 328. — Iles du Cap Vert.

107. — — *var.* Poensis, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, 1903, p. 33. — Fernando Po.

101. — alfredi, Shell., *B. Afr.* II, p. 345. — Mbara (Afrique équat.)

108. — affinis, *var.* Galilegensis, Ant., *Naum.*, 1855, p. 307, pl. 5, ff. 1, 2; Hart., *Tierreich*, p. 88; (**1666**, pt.) — Palestine.

102. Chætura andrei, Berl. et Hart., *Nov. Zool.* IX, 1902, p. 91. — Orén. centr. (Cumana).

103. — thomensis, Hart., *Bull. B. O. C.* X, 1900, p. 53; id., *Nov. Zool.* VIII, p. 425, pl. 7, f. 1. — Ile St-Thomas (Afr. W).

109. Nephoecetes brunneitorques, *var.* Griseifrons (Nels.), *Auk*, 1900, p. 262. — Tepic, Jalisco, Zacatecas W., Durango S. (Mexique).

104. Collocalia gigas, Hart. et Butl., *Bull. B. O. C.* XI, p. 65; Finsch, *l. c.* XII, p. 30. — Malacca, Java.

110. Glaucis hirsuta, *var.* Columbiana, Bouc., *Humm. B.*, p. 402 (**1736**, pt.) — Rio Dagua (Col. W.)

111. — — *var.* Affinis, Lawr.; Oberh., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1902, p. 311 (**1736**, pt.) — Ecuador E.

**1748.** Phaethornis superciliosus (Lin.); Less., *H. N. Colibris*, p. 35, pl. 6; *affinis*, Pelz.; *fraterculus*, Gould, *Monogr. Troch.* I, pl. 18. — Guyane fr., Brésil N.

112. — — *var.* Malaris (Nordm.), in *Erm. Reise*, pp. 2, 16; Hart., *Thierr.*, p. 20; *superciliosus*, Gd., *Mon. Troch.* I, pl. 17; (**1748**, pt.) — Guyane fr.

113. — longirostris, *var.* Susurra, Bangs, *P. New Engl. Zool. Club*, II, p. 64. — Sta-Marta (Colombie).

105. — fuliginosus, Simon, *IIIe Congr. Orn., C. R.*, p. 201. — Colombie.

106. — hyalinus, Bangs, *Auk*, 1901, p. 27. — Ile S.-Miguel (Panama.)

107. — viridicaudatus, Gd., *Mon. Troch.* I, pl. 33; Hart., *Thierr.*, p. 26 (**1763**, pt.) — Brésil S. et centr.

Digitized by Google

**1769.** Phaethornis rufigaster (Vieill.) a priorité sur *pygmæus* (Spix); *rufiventris*, Cab. et H.

114. — — *var.* Longipennis, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1902, II, p. 19. — Pérou centr.

108. — caurensis, Sim. et Dalm., *III^e Congr. Orn.*, *C. R.*, p. 208. — Caura (Vénézuéla).

**1771.** Eutoxeres aquila (Bourc.) — Colombie et Ecuador.

**468.** — — *var. Salvini*, Gd. = *var.* Heterura. — Costa-Rica, Panama, Colombie, Ecuador.

115. — condaminei, *var.* Gracilis, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1902, II, p. 19. — Pérou centr.

**1785.** Florisuga *sallei*, Bouc. = mellivora (Lin.)

116. Aphantochroa cuvieri, *var.* Saturatior, Hart., *Bull. B. O. C.* XII, p. 35. — Ile Coiba (Panama).

109. Leucippus baeri, Simon, *III^e Congr. Orn.*, *C. R.*, p. 202. — Pérou N.-W.

**1798.** Doit être remplacé par :

Agyrtria viridissima (Less.), *H. N. Ois.-Mouches*, p. 207, pl. 75; Hart., *Thierr.*, p. 45; ?*maculatus*, V.; *viridipectus*, Rchb.; *linnæi*, Gd., *Mon. Troch.* V, pl. 302; *malvinæ*, Rchb. — Vénézuéla, Trinidad, Guyane, Bas-Amaz.

117. — — *var.* Maculicauda (Gd.), *Intr. Troch.*, p. 154. — Guyane angl.

**475.** — *var. Terpna*, Heine = viridissima (Less.)

118. — fluviatilis, *var.* Laeta, Hart., *J. f. O.*, 1900, p. 360. — Pérou E.

119. — leucogaster, *var.* Bahiæ, Hart., *Orn. Monatsb.*, 1899, p. 140. — Bahia.

**1816.** — salvini, Brewst. appartient au genre Amazilia.

110. — tenebrosa, Hart., *Bull. B. O. C.* X, 1899, p. 15. — Colombie.

111. Saucerottea warscewiczi (Cab. et H.), *Mus. Hein.* III, p. 38; Salv., *Cat.*, p. 222; (**1829**, pt.) — Colombie N.

120. — — *var.* Braccata (Heine), *J. f. O.*, 1863, p. 195; (**1829**, pt.) — Andes du Vénézuéla.

**1829.** — sophiæ (Bourc. et Muls.); Gd., *Mon. Troch.*, pl. 322; *caligatus*, Gd.; *hoffmanni*, Cab. et H. — Costa-Rica.

**481.** — erythronota, *var.* Wellsi, Bouc. = ? *tobaci*, Gm.

121. — — *var.* Caurensis, Berl. et Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 84. — Caura (Orénoque).

**1843.** Amazilia fuscicaudata (Fras.), *P. Z. S.*, 1840, p. 17, a priorité sur *riefferi* (Bourc., 1843). — Andes de Vénézuéla, Colomb. et Ecuad., au N. jusq. Panama.

122. — — *var.* Jacunda (Heine), *J. f. O.*, 1863, p. 188; (**1843**, pt.) — Ecuad. W., Col. S.-W.

123. — — *var.* Dubusi (Bourc. et Muls.), *Ann. Soc. Agr. Lyon*, IV, 1852, p. 141; (**1843**, pt.) — Du Mexique au Costa-Rica.

Digitized by Google

124. Amazilia cinnamomea, *var.* Saturata, Nels., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1898, p. 63. — Mexique S., Guatémala.

**1870.** Hylocharis cyanea (Vieill.) — Brésil.

125. — — *var.* Rostrata, Bouc., *Gen. Hum. B.*, 1894, p. 400. — Pérou E., Bolivie.

**486.** — — *var.* Viridiventris, Berl. — Guyane, Vénézuéla.

126. — sapphirina, *var.* Guianensis, Bouc., *Gen. Hum. B.*, 1891, p. 52; (**1869**, pt.) — Guyane, Vénézuéla.

127. Chrysuronia oenone, *var.* Intermedia, Hart., *Nov. Zool.* V, p. 519. — Haut-Amazone.

**487.** — — *var.* Josephinæ (Bourc. et Muls.) au lieu de *Neera* (*nom. nud.*) — Bolivie.

128. — — *var.* Longirostris, Berl., *J. f. O.*, 1887, p. 533; (**1871**, pt.) — Andes de Colombie.

**489.** Chlorestes, *var. Subcærulea* (Elliot) = C. hypocyaneus (Gould).

**1876.** Chlorostilbon aureiventris (D'Orb. et Lafr.) — Bolivie, Paraguay, Argentine N.

129. — — *var.* Egregia, Heine, *J. f. O.*, 1863, p. 197; (**1877**, pt.) — Brésil S.-E.

**1877.** — — *var.* Pucherani (Bourc. et Muls.) — Brésil centr. et E.

130. — auriceps, *var.* Forficata, Ridgw.; (**1878**, pt.) — Iles Cozumel, Mugeres, Holbox (baie de Yuc.)

**1881.** — haeberlini (Rchb.) au lieu de *haberlini*.

**1886.** — carribæus, Lawr. — Iles Aruba, Cur., Bon., Margarita et Trinid.

131. — — *var.* Lessoni, Sim. et Dalm., *III^e Congr. Orn., C. R.*, p. 212. — Vénézuéla N.

132. — — *var.* Nana, Berl. et Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 86. — Orénoque.

133. Sporadinus ricordi, *var.* Æneoviridis (Palm. et Ril.), *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1902, p. 34. — Abaco (Bahama).

**331** (Gen.) Au lieu de *Timolia* il faut : Augasma, Gould (1860).

**1914** (pt.) Thalurania fannyi (Del. et Bourc.), *Rev. Zool.*, 1846, p. 310. — Colombie.

134. — — *var.* Verticeps, Gould, *Contr. Orn.*, 1851, pl. 71; id., *Mon. Troch.*, pl. 107. — Ecuador.

**498.** — hypochlora, Gd., est une espèce distincte.

112. — ridgwayi, Nels., *Auk*, 1900, p. 262. — Jalisco (Mexique).

135. — furcata, *var.* Fissilis, Berl. et Hart., *Novit. Zool.* IX, p. 87. — Caura (Vénézuéla).

**340** (Gen.) *Crinis*, Muls. (1875) = Chrysolampis, Boie.

**1952.** Polytmus theresiæ (Da Silva), au lieu de *viridissimus*, V. (nec Gm.)

113. Aithurus scitilus, Brewst. et Bangs, *P. New Engl. Zool. Club*, II, p. 49. — Jamaïque.

136. Topaza pella, *var.* Pamprepta, Oberh., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1902, p. 321. — Rio Napo (Ecuador).

Digitized by Google

137. EUGENES SPECTABILIS, *var.* CHIRIQUENSIS, Nehrk., *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 132. — Chiriqui.

138. HELIODOXA LEADBEATERI, *var.* PARVULA, Berl., *J. f. O.*, 1887, p. 320. — Andes de Colombie et de Vénézuéla.

**1987.** — JACULA, Gd. a pour habitat : — Colombie.

**1986.** — — *var.* JAMESONI (Bourc.) — Ecuador.

139. — — *var.* HENRYI, Lawr., *Ann. Lyc. N. York*, 1867, p. 402 (**1987**, pt.); *berlepschi*, Bouc. — Costa-Rica, Panama.

**362** (Gen.) *Leucuria*, Bangs (1898) = HELIANTHEA (p. 150).

114. HELIANTHEA HAMILTONI, Goodf., *Bull. B. O. C.* X, p. 48. — Ecuador E.

**2006.** — IRIS, Gd. a pour habitat : — Pér. N., Boliv. N.-W.

140. — — *var.* BUCKLEYI, Berl., *Ibis*, 1887, p. 295; (**2006**, pt.) — Ecuador.

115. — PHALERATA (Bangs), *Pr. Biol. Soc. Wash.* 1898, p. 474. — Colombie N.

141. LAFRESNAYA SAULÆ, *var.* RECTIROSTRIS, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1902, II, p. 24. — Pérou centr.

142. LAMPROPYGIA COLUMBIANA, *var.* OBSCURA, Berl. et Stolzm, *l. c.*, p. 23. — Pérou centr.

**2021.** AGLÆACTIS CUPREIPENNIS (Bourc. et Muls.) — Colombie.

143. — — *var.* ÆQUATORIALIS, Cab. et Hein. ; (**2021**, pt.) — Ecuador.

144. PANOPLITES FLAVESCENS, *var.* TINOCHLORA (Oberh.), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1902, p. 329. — Ecuador W.

**2050.** ERIOCNEMIS AURELIÆ (B. et M.) a pour habitat : — Colombie.

145. — — *var.* RUSSATA, Gd., *P. Z. S.*, 1871, p. 505; (**2050**, pt.) — Ecuador.

146. PHILOGOPHILUS HARTERTI, Berl. et Stolzm., *Ibis*, 1901, p. 717. — Pérou S.-E.

**2056.** ADELOMYIA MELANOGENYS (Fras.), *P. Z. S.*, 1840, p. 18. — Colombie, Ecuador E.

146. — — *var.* MACULATA, Gd.; **2056**, pt. — Ecuador W.

147. — — *var.* CHLOROSPILA, Gd., *Ann. N. H.*, 1872, p. 432; (**2056**, pt.) — Pérou.

**516.** — — *var.* CERVINA, Gd. — Colombie.

**2057.** — — *var.* ÆNEOTINCTA, E. Simon. — Vénézuéla.

148. HELIANGELUS EXORTIS, *var.* SODERSTROMI, Oberh., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1902, p. 334. — Corazon (Ecuador).

117. METALLURA THERESIÆ, Simon, *Nov. Zool.* IX, p. 181. — Pataz (Pérou).

118. — DISTRICTA, Bangs, *Pr. Biol. Soc. Wash.* XIII, 1899, p. 94. — Colombie.

**2101.** PSALIDOPRYMNA VICTORIÆ (Bourc. et Muls.) — Colombie.

149. — — *var.* ÆQUATORIALIS (Bouc.), *Humm. B.*, 1893, p. 6 (**2101**, pt.) — Ecuador.

119. — PALLIDIVENTRIS, Simon, *Nov. Zool.* IX, p. 182. — Cojabamba (Pérou).



Digitized by Google

120. Zodalia thaumasta, Oberh., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1902, p. 338. — Chillo (Ecuador).

**2120.** Heliothrix barroti (Bourc. et Muls.) — Colombie, Ecuador.

150. — — *var.* Alincia, Oberh., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1902, p. 339. — Amérique centr.

**396** (Gen.) Anthoscenus, Richm. (1902), au lieu de *Floricola*, Ell. (1878, nec Gist., 1848).

**2126.** — superbus (Shaw., 1802), a priorité sur *longirostris* (Vieill., 1817).

**533.** — — *var.* Stewartæ (Lawr.) au lieu de *Stuartæ*, Gray (err.)

**2127.** — constanti (Del.) a pour habitat : — De Costa-Rica au Guat.

151. — — *var.* Leocadiæ (Bourc. et Muls.); *leocardiæ*, Salv., *Cat.*, p. 252; (**2127**, pt.) — Mexique.

121. Selasphorus alleni, Hensh., *Bull. Nutt. Orn. Club*, 1877, p. 54; (**2152**, pt.) — Californie (1).

122. Polyxemus harterti, Simon, *IIIe Congrès Orn.*, *C. R.*, p. 202. — Colombie W.

152. Lophornis verreauxi, *var.* Klagesi, Berl. et Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 89. — Caura (Vénézuéla).

**420** (Gen.) Popelairea, Rchb. (1854), au lieu de *Prymnacantha*, Cab. (1860).

**2189.** — trichlophra, Rchb. au lieu de *popelairei*, devenu terme générique.

**2191.** — conversi (Bourc. et Muls.) — Col., Pan., Costa-Rica.

153. — — *var.* Æquatorialis (Berl. et Tacz.), *P. Z. S.*, 1883, p. 567. — Ecuador.

## PASSERES TRACHEOPHONÆ

123. Scytalopus latebricola, Bangs, *Pr. Biol. Soc. Wash.* XIII, 1899, p. 101. — Colombie.

154. — femoralis, *var.* Macropus, Berl. et Stolzm.; (**2205**, pt.) — Pérou.

155. Corythopis anthoides, *var.* Humivagans, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, pp. 136, 531; id., *Orn. Pér.* II, p. 91; (**2223**, pt.) — Pérou centr.

124. Conopophaga browni, Bangs, *Pr. Biol. Soc. Wash.* XIII, p. 100. — Colombie.

**2233.** — rusbyi, Allen, au lieu de *rushyi*.

125. Grallaricula cumanensis, Hart., *Bull. B. O. C.* XI, 1900, p. 37. — Cumana (Vénézuéla).

126. Grallaria periophthalmica, Salvad. et Festa, *Boll. Mus. Tor.* 1898, n° 330, p. 2. — Ecuador W.

127. — bangsi, Allen, *Bull. Amer. Mus. N. H.*, 1900, p. 159. — Ste-Marta (Colombie).

(1) Dans la note, à la p. 162, j'ai suivi M. E. Simon, pour qui le *S. alleni* n'est qu'un plumage de saison. M. H. C. Oberholzer m'écrit que c'est une erreur, que le *S. alleni* est une espèce parfaitement distincte; M. Hartert est également de cet avis (voy. Hartert, *Trochilidæ* in *Das Tierreich*, Berlin, 1900).

Digitized by Google

128. Grallaria paramb.æ, Rothsch., *Bull. B. O. C.* XI, 1900, p. 36. — Ecuador N.

129. — sororia, Berl. et Stolzm., *III^e Congrès Orn.*, *C. R.*, p. 194. — Pérou centr. E.

130. Pittasoma rufopileatum, Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 370. — Ecuador N.-W.

**2277-78.** Au lieu de *F. colma* et *nigrifrons*, il faut :

**2277.** Formicarius ruficeps (Spix), *Av. Bras.* I, p. 72, pl. 72, f. 1; Hellm., *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 34; ? *fuscicapilla*, Vieill.; *colma*, auct. plur. (nec Gm.) — Brésil E., de Bahia à St-Paul.

156. — — *var.* Amazonica, Hellm., *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 34. — Bas-Amazone.

**2278.** — — *var.* Cayennensis (Bodd.); *Pl. Enl.* 821; *colma*, Gm.; *nigrifrons*, Gould; *glaucopectus*, Ridgw. — Guyane, Amazone, Colombie.

**2288.** Philogopsis nigromaculata, *var.* Notata, Allen.

157. Gymnopithys bicolor, *var.* Æquatorialis (Hellm.), *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 35. — Ecuador N.

**443** (Gen.) *Manikup*, Richm. (1900, nec Desm.) = Pithys. — M. Richmond a pris la dénomination française de *Manikup* pour un terme générique latin.

131. Pithys salvini, Berl., *J. f. O.*, 1901, p. 98. — Bolivie N.

132. Hypocnemis margaritifera, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 88, 165; (**2313**, pt.) — Haut-Amazone.

**2330.** Heterocnemis hypoleuca, Ridgw., appartient au genre Hypocnemis.

**2317.** Myrmeciza swainsoni, Berl., *Ibis*, 1888, p. 130, au lieu de *longipes*, auct. (nec Vieill.)

158. — — *var.* Griseipectus, Berl. et Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 76. — Orénoque et Guyane anglaise.

**2321.** — *marginata*, Salvad., *Atti Soc. Ital. S. N.* VII, p. 158 = M. ruficauda (Max.)

**446** (Gen.) Au lieu de *Heterocnemis*, Scl. (1855, nec Albers, 1852), il faut : Sclateria, Oberh., *Pr. Ac. N. Sc. Philad.*, 1899, p. 209.

133. Sclateria albiventris (Pelz.), *Orn. Bras.*, p. 161. — Brésil centr., H^t-Amaz.

450^bis (Gen.) Rhopornis, Richm. (1902); *Rhopocichla*, Allen (1891, nec Oat., 1889).

134. Rhopornis ardesiaca (Max.), *Beitr. Nat. Bras.* III, p. 1055; Allen, *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.* III, p. 199; *myiotherina* (pt.), auct. plur. (nec Spix). — Brésil.

159. Cercomacra tyrannina, *var.* crepera, Bangs, *Auk*, 1901, p. 365. — Nicaragua, Chiriqui.

160. Rhamphocænus rufiventris, *var.* Sanctæmarthæ, Scl.; (**2348**, pt.) — Ste-Marta (Colombie).

135. Terenura xanthonota, Chapm., *Bull. Amer. Mus. N. H.*, 1901, p. 228. — Inca Mine (Pérou S.-E).

136. — sharpei, Berl., *J. f. O.*, 1901, p. 97. — Bolivie E.

Digitized by Google

**2360.** Formicivora rufa (Max., 1831) a priorité sur *rufatra* (Lafr. et D'Orb. 1837).

137. — tobagensis, de Dalm., *Mém. Soc. Zool. de France*, 1900, p. 141. — Ile Tobago.

**2362.** — speciosa, Salv.; id., *Nov. Zool.* IV, pl. 1, f. 3, et

**2363.** — subspeciosa (Salvad. et F.), sont tous deux des Synallaxis.

138. Myrmotherula cherriei, Berl. et Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 92. — Orénoque et Guyane française.

139. — guayabambæ, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XI, 1900, p. 2. — Guayabamba (Pérou).

140. — boliviana, Berl., *J. f. O.*, 1901, p. 96. — Bolivie N.

141. — sanctæ-martæ, Allen, *Bull. Amer. Mus. N. H.*, 1900, p. 160. — Sta-Marta (Colombie).

**2411.** *Thamnistes affinis*, Salvad., *Atti Soc. Ital. S. N.* VII, p. 154 = Thamnomanes glaucus.

142. Dysithamnus flemmingi, Hart., *Bull. B. O. C.* XI, 1900, p. 58. — Ecuador N.

**2435.** Au lieu *M. corvinus*, Lawr. il faut :

**2435.** Myrmelastes lawrencei, Salv. et Godm., *Biol. C.-A. Aves*, II, p. 226; *corvinus*, Lawr. (nec Gd.) — Nicaragua, Véragua.

143. — ceterus, Bangs, *Pr. New Engl. Zool. Club*, 1900, p. 25; *corvinus*, pt., Lawr. — Panama.

144. ? Thamnophilus nigrescens, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1867, p. 469. — Vénézuéla.

161. — doliatus, *var.* Fratercula, Berl. et Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 70. — Vénézuéla.

162. — cærulescens, *var.* Ochra, Oberh., *Pr. Biol. Soc. Wash.* XIV, p. 188. — Paraguay.

163. — nævius, *var.* Albiventris, Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 9; (**2462**, pt.) — Pérou.

145. — ? stictocephalus, Pelz., *Orn. Bras.*, p. 146. — Brésil centr.

146. — virgatus, Lawr.; Salv. et Godm., *Biol. C.-A. Aves*, II, p. 199. — Panama.

**2492.** — jani, Phil. = nævius (Gm.)

164. Dendrocolaptes certhia, *var.* Obsoleta, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 527; (**2499**, pt.) — Bas-Amazone.

147. Dendrocincla phæochroa, Berl. et Hart., *Novit. Zool.* IX, p. 67. — Orénoque et Caura.

**2512.** — *anguina*, Bangs, *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1898, p. 138 = D. lafresnayei.

165. — fuliginosa, *var.* Rufo-olivacea, Ridgw.; (**2513**, pt.) — Diamantina (Bas-Amazone.

148. Xiphorhynchus venezuelensis, Chapm., *Bull. Am. Mus. N. H.* II, 1889, p. 156. — Vénézuéla.

149. ? Picolaptes obtectus, Allen, *Bull. Am. Mus. N. H.*, 1889, p. 94. — ?

166. — tenuirostris, *var.* Apotheta, Oberh., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1901, p. 188. — Paraguay.

Digitized by Google

**2540.** *Picolaptes gracilis*, Ridgw. = P. COMPRESSUS, Cab. (**2538**).
150. ? — LINEATICEPS, Lafr., *Rev. Zool.*, 1850, p. 277. ?
167. XIPHOCOLAPTES ALBICOLLIS, *var.* ARGENTINA, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1889, p. 5. Argentine.
**2546.** — EMIGRANS, Scl. et Salv. (**2546**, pt.) Guatémala.
168. — — *var.* SCLATERI, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1889, p. 6. Mexique S.
169. — — *var.* COSTARICENSIS, Ridgw., *l. c.*, 1888, p. 541. Costa-Rica.
151. — COMPRESSIROSTRIS, Tacz., *P. Z. S.*, 1882, p. 28; id., *Orn. Pér.* II, p. 172; Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1889, p. 13; (**2548**, pt.) Ecuador S., Pérou N.
152. — ORENOCENSIS, Berl. et Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 65. Orénoque.
153. ? DENDREXETASTES CAPITOIDES, Eyt., *Contr. Orn.*, 1851, p. 76; Forb., *Nature*, 1895, p. 619; (**2554**, pt.) ?
170. DENDRORNIS ROSTRIPALLENS, *var.* SORORIA, Berl. et Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 65. Orénoque.
**2564.** — FLAVIGASTER (Sw., 1827) au lieu de *eburneirostris* (Less., 1843). Du Mexique au Costa-Rica.
171. — — *var.* MEGARYNCHA, Nels., *Auk*, 1900, p. 265. Mexique S.-W.
154. — STRIATIGULARIS, Richm., *Pr. U. S. Nat. Mus.* XXII, p. 317.
172. — TRIANGULARIS, *var.* PUNCTIGULA, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1888, p. 544; (**618**, pt., p. 189). Costa-Rica, Panama.
**2568.** — *fratercula*, Ridgw. = SUSURRANS (Jard.), **2567**.
155. — OBSOLETA (Licht.), *Abh. Akad. Berl.*, 1820, p. 265; *notatus*, Eyt., *Contr. Orn.*, 1852, p. 26; *similis*, Pelz.; (**2575**, pt.) Brésil.
173. SITTASOMUS ERITHACUS, *var.* JALISCENSIS, Nels., *Auk*, 1900, p. 264. Jalisco (Mexique).
156. MARGARORNIS STICTONOTA, Berl., *J. f. O.*, 1901, p. 95. Bolivie W.
174. SCLERURUS ALBIGULARIS, *var.* PROPINQUA, Bangs, *Pr. Biol. Soc. Wash.* XIII, p. 99. Sta-Marta (Colombie).
175. — MEXICANUS, *var.* OBSCURIOR, Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 370. Ecuador N.-W.
176. — CAUDACUTUS, *var.* OLIVACENS, Cab., *J. f. O.*, 1873, p. 67; (**628**, pt.) Pérou W.
157. — FUSCUS (Max.), *Beitr.* III, p. 1106 (mas., nec fem.); Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1889, p. 28. Haut-Amazone.
177. — GUATEMALENSIS, *var.* LAWRENCEI, Ridgw., *l. c.*, p. 29. Bahia?
158. XENOPS HETERURUS, Cab. et H., *Mus. Hein.* II, p. 33; Salvad. et Festa, *Boll. Mus. Torino*, 1899, nº 362, p. 23. Ecuador, Pérou.

Digitized by Google

159. Xenops tenuirostris, Pelz., *S. B. K. Akad. Wien*, XXXIV, p. 112; id., *Orn. Bras.*, p. 41. — Rio Madeira (Brésil).

178. Anabazenops rufo-superciliatus, *var.* Cabanisi, Tacz. (**2599**, pt.) — Pérou.

179. — — — *var.* Acrita, Oberh., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1901, p. 187. — Paraguay.

160. — auxius (Bangs), *Pr. New Engl. Zool. Club*, 1902, p. 83. — ? (1).

180. Philydor consobrinus, *var.* Rufipileata (Pelz.), *Sitzber. Acad. Wien*, 1859, p. 109; id., *Orn. Bras.*, p. 41. — Para, Vénézuéla, Colombie.

161. — euophrys, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1896, p. 375. — Pérou centr.

162. Automolus exsertus, Bangs, *Auk*, 1901, p. 367. — Chiriqui.

181. — pallidigularis, *var.* Albidior, Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 369. — Ecuador N.-W.

182. — sclateri, *var.* Paraensis, Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 61. — Para (Brésil).

**493** (Gen.) Pseudoseisura, Rchb. (1853) au lieu de *Homorus*, Rchb. (1853, nec Albers, 1850).

163. Thripophaga cherriei, Berl. et Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 60, pl. 12, f. 2. — Orénoque.

**499** (Gen.) Thryolegus, Orberh., *Pr. Ac. Sc. Phil.*, 1899, p. 210, au lieu de *Limnophyes*, Scl. (1889, nec Eaton, 1875).

183. Synallaxis albescens, *var.* Nesiotis, Clark, *Auk*, 1902, p. 264. — Ile Margarita.

164. — omissa, Hart., *Bull. B. O. C.* XI, p. 71. — Para (Brésil).

165. Siptornis ottonis, Berl., *III^e Congrès Orn., C. R.*, p. 197. — Pérou centr.

184. — modesta, *var.* Sajamæ, Berl., *J. f. O.*, 1901, p. 94. — Sajama (Bolivie).

185. — — *var.* Rostrata, Berl., *J. f. O.*, 1901, p. 94. — Bolivie E.

166. — heterura, Berl., *J. f. O.*, 1901, p. 93. — Bolivie W.

167. — punensis, Berl., *Ibis*, 1901, p. 718. — Pérou S.-E.

168. — maculicauda, Berl., *J. f. O.*, 1901, p. 92. — Iquico (Bolivie W.)

**2744.** — singularis (Berl. et Tacz.) appartient au genre xenerpestes (Voy. Berl., *Ibis*, 1903, p. 106).

169. Schizoeaca harterti, Berl., *J. f. O.*, 1901, p. 91. — Bolivie N. et W.

**509** (Gen.) Aphrastura, Oberh., *l. c.* (1899) au lieu de *Oxyurus*, Sw. (1827, nec Rafines.. 1810).

170. Henicornis wallisi, Scott, *Bull. B. O. C.* X, 1900, p. 63. — Patagonie.

**650.** Cinclodes *sparsimstriatus*, Scott, *l. c.* = *var.* taczanowskii.

(1) Cette espèce m'est signalée par M. Oberholzer sans indication d'habitat, et je n'ai pas pu consulter les *Proceedings* en question.

Digitized by Google

171. Cinclodes oustaleti, Scott, *l. c.*, p. 62. — Chili S.
172. — molitor, Scott, *l. c.*, p. 62. — Chili centr.
**651.** — fuscus, *var.* Minor (Cab.) = *rivularis*, Cab. — Pérou, Bolivie, Chili.
186. — — *var.* Albiventris, Scl., *P. Z. S.*, 1860, p. 77; (**651**, pt.) — Ecuador, Colombie, Venézuéla.
173. — oreobates, Scott, *Bull. B. O. C.* X, 1900, p. 62. — Colombie (Andes).
174. — longipennis (Ridgw.), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1889, p. 133. — Détroit de Magellan.
175. Upocerthia darwini, Scott, *Bull. B. O. C.* X, 1900, p. 63. — Mendoza (Argentine).
176. — saturatior, Scott, *l. c.* — Chili.
177. — fitzgeraldi, Scott, *l. c.* — Argentine W.
178. Geositta brevirostris, Scott, *l. c.* — Chili centr., Patagonie.
179. — fortis, Berl. et Stolzm., *III^e Congrès Orn.*, *C. R.*, p. 194. — Pérou W.

## PASSERES OLIGOMYODÆ

**2815.** Cymborhynchus macrorhynchus (Gm.) — Ténass., Siam, Camb.
187. — — *var.* Malaccensis, Salvad., *Atti R. Ac. Sc. Tor.* IX, p. 425; (**2815**, pt.) — Malacca, Sumatra, Bornéo.
180. Pitta longipennis, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 117; Sharpe, *Ibis*, 1903, p. 91, pl. 4, f. 2. — Niassa.
181. — reichenowi, Madar., *Orn. Mon.*, 1901, p. 133; Sharpe, *Ibis*, 1903, p. 92, pl. 4, f. 1. — Congo centr.
**2849.** — granatina, Tem. a pour habitat : — Bornéo.
188. — — *var.* Coccinea, Eyt., *P. Z. S.*, 1839, p. 104; Gd., *B. As.* V, pl. 68; (**2849**, pt.) — Malacca, Ténassérim.
182. — anerythra, Rothsch., *Bull. B. O. C.* XII, 1901, p. 22. — Ile Ysabelle (Salomon).
189. — mackloti, *var.* Kuehni, Rothsch., *Bull. B. O. C.*, 1899, p. 3; id., *Nov. Zool.* VIII, p. 3. — Iles Key.
190. — — *var.* Aruensis, Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 63. — Wokan (îles Arou).
183. Coracocichla gigantea (Rothsch.), *Orn. Monatsb.*, 1899, p. 157. — Nouvelle-Guinée N.
**537** (Gen.) Platypsaris, Scl. (1857) au lieu de *Hadrostomus*, Cab. et H. (1859).
191. — aglaiæ, *var.* Albiventris, Lawr., *Ann. L. N. Y.* VIII, p. 475; Scl., *Cat. B. Br. Mus.* XIV, p. 335; (**2894**, pt.) — Mexique W. et S., Arizona.
192. — — *var.* Insularis, Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 382; (**2894**, pt.) — Iles Tres Marias.
184. Pachyrhamphus notius, Brewst. et Bangs, *Pr. N. Engl. Zool. Club*, II, 1901, p. 53. — Argentine, Bas-Uruguay.
193. — major, *var.* Itzensis, Nels., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1901, p. 173. — Yucatan N.
**675.** — albogriseus, *var.* Salvini, Richm. (1899), Dub. (1900).

Digitized by Google

194. Lathria unirufa, *var.* Castaneotincta, Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 610. Ecuadar.

185. Aulia tertia, Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 609. Ecuador N.

195. Attila brasiliensis, *var.* Parambæ, Hart., *Bull. B. O. C.*, 1900, p. 39. Ecuador N.

186. — mexicanus, Nels., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1901, p. 172. Tabasco (Mexique E.)

187. — parvirostris, Allen, *Bull. Am. Mus. N. H.*, 1900, p. 153. S^ta^-Marta (Colombie).

188. — rufipectus, Allen, *l. c.*, 1900, p. 153. S^ta^-Marta (Colombie).

189. — — phœnicurus, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 96, 177. Brésil.

196. Pipreola aureipectus, *var.* Decora, Bangs, *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1899, p. 98. S^ta^-Marta (Colombie).

**562** (Gen.) Calvifrons, Daud. (1804), au lieu de *Gymnocephalus*, Géof. S^t^-Hil. (1809, nec Bloch et Schn., 1801); *Perissocephalus*, Oberh. (1899).

190. Xenopipo subalaris, Godm., *Bull. B. O. C.*, 1899, p. 27; id., *Ibis*, 1900, p. 365. Pérou N.

**570** (Gen.) Antilophia, Rchb. (1850), au lieu de *Metopia*, Sw. (1832, nec Meigen, 1803).

197. Masius chrysopterus, *var.* Bella, Hellm., *Orn. Monatsb.*, 1903, p. 35. Colombie.

**572** (Gen.) Metopothrix. — Ce genre doit venir dans la famille des *Dendrocolaptidæ*, près du genre *Xenerpestes* (Berl., *Ibis*, 1903, p. 108).

198. Pipra mentalis, *var.* Ignifera, Bangs, *Auk*, 1901, p. 363. Chiriqui.

191. ? — dubia, Madar., *Zeitschr. Ges. Orn.*, 1886, p. 270, pl. 9. ?

199. Chiroxiphia pareola, *var.* Atlantica, de Dalm., *Mém. Soc. Zool. de Fr.*, 1900, p. 139. Ile Tobago.

**577**. Manacus, Briss. (1760), au lieu de *Chiromachæris*, Cab. (1847).

**3037**. — edwardsi, Bp., *Consp.* I, p. 117, au lieu de *manacus* devenu terme générique.

200. — — *var.* Abditiva (Bangs), *Pr. New Engl. Zool. Cl.* I, p. 35. Colombie.

201. — — *var.* Pura (Bangs), *l. c.*, p. 36. Bas-Amazone.

**579**. Scotothorus, Oberh. (1899), au lieu de *Heteropelma*, Bp. (1854, nec Wesm., 1849).

579^bis^ (Gen.) Sapayoa, Hart. (1903), *gen. nov.*

192. Sapayoa ænigma, Hart., *Nov. Zool.* X, p. 171. Ecuador N.-W.

202. Agriornis maritima, *var.* Leucura, Gould; (**3064**, pt.) Patagonie.

193. — poliosoma, Scott, *Bull. B. O. C.*, 1900, p. 55. Patagonie.

194. ? — albicauda, Ph. et Landb., *Arch. f. Naturg.*, 1863, 1, p. 152. Pérou W.

195. Ochthodiæta pernix, Bangs, *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1899, p. 95. S^ta^-Marta (Colombie).

Digitized by Google

PULSATRIX MAXIMILIANI

Digitized by Google

Digitized by Google

# Publications de M. Alph. DUBOIS

## en vente à la librairie de Henri LAMERTIN, 20, rue du Marché-au-Bois, à Bruxelles.

---

**Faune illustrée des Vertébrés de la Belgique**, *Oiseaux*. — 4 vol. in 4° avec 427 pl. coloriées à la main et cartes (1876-1893). — *Il ne reste plus qu'un exemplaire, dont les 3 planches manquantes sont remplacées par des aquarelles peintes par l'auteur* . . . fr. 400

**Le même ouvrage**, avec cartes mais sans atlas, 2 vol. in-4° . . 75

**Les Lépidoptères de la Belgique**, leurs chenilles et leurs chrysalides, décrits et figurés d'après nature sur l'une des plantes nourricières. 3 vol. in-4° avec 431 pl. coloriées à la main (1861-1884) . 275

**Revue des derniers systèmes ornithologiques et nouvelle Classification proposée pour les Oiseaux.** Broch. in-8°, Paris, 1891 . . . . . 1 25

**Histoire populaire des animaux utiles de la Belgique.** Nouvelle édition illustrée, revue et augmentée, — 1 vol. in-12, Bruxelles, 1889 . . . . . 1 75

**Les Animaux nuisibles de la Belgique** *(Vertébrés)*. — 1 vol. in-12, illustré. *Avec la liste de tous les Vertébrés observés en Belgique.* Bruxelles 1895 . . . . . 2

**Tableau synoptique des oiseaux insectivores** qu'il est défendu de prendre en tout temps. — Nouveau tirage en chromo . . . 2 50

**Revue critique des oiseaux de la famille des Bucérotidés**, broch. in-8°, avec 2 pl. col., Bruxelles, 1884 . . . . . 2

**Manuel de zoologie**, *conforme aux progrès de la science*, 1 vol. in-12, avec 177 gravures intercalées dans le texte. Bruxelles 1882 . . 6

**Aperçu du Règne animal** ou premières notions de zoologie, 1 vol. in-12, avec 166 gravures. (Ouvrage adopté pour l'Enseignement moyen.) — Bruxelles 1882 . . . . . 3

**Conspectus systematicus et geographicus avium Europæarum**, broch. in-8°, Bruxelles 1871 . . . . . 2

**Archives cosmologiques.** *Revue des sciences naturelles*. 1 vol. in-8°, avec 13 pl. — Bruxelles 1867 . . . . . 8

**Traité d'Entomologie horticole, agricole et forestière.** 1 vol. in-8°, avec 4 pl. col. *(Ouvrage couronné.)* — Gand, 1865 *(Épuisé.)*

---

Aug. Lameere, **Manuel de la Faune de Belgique** (Animaux non insectes). Tome I, in-18 avec figures dans le texte. Bruxelles, 1895. 5 50
Tome II (Insectes inférieurs), in-18, 858 pages et 721 figures dans le texte. 1900. Cart., toile anglaise . . . . . 7 00

---

Bruxelles. — Polleunis & Ceuterick, imprimeurs, rue des Ursulines, 37.

SYNOPSIS AVIUM

# NOUVEAU
# MANUEL D'ORNITHOLOGIE

PAR

**Alphonse DUBOIS**

Docteur en sciences naturelles,
Conservateur au Musée Royal d'Histoire naturelle de Belgique,
Officier de l'Ordre de Léopold,
Membre du Comité international et permanent d'Ornithologie,
de la Commission permanente d'étude des collections du Musée de l'État Indépendant du Congo
Membre honoraire, correspondant ou effectif de plusieurs Sociétés savantes.

**Fascicule XV**

**SUPPLÉMENT (fin), TABLE ALPHABÉTIQUE DES GENRES**

BRUXELLES
H. LAMERTIN, éditeur
20, RUE DU MARCHÉ-AU-BOIS

1903

# AVIS

Le présent fascicule contient la fin du supplément et la table alphabétique des genres. Le prochain et dernier fascicule contiendra la table alphabétique des espèces et des variétés, la table systématique du tome II et les titres. Le collationnement de cette table étant très long, nous prévenons nos honorables souscripteurs que le dernier fascicule ne pourra paraître que vers le mois d'avril 1904.

Le prix du fascicule restera fixé à 6 francs pour tous les abonnés qui se feront inscrire avant la fin de la publication.

---

## ON SOUSCRIT à

BRUXELLES, chez l'éditeur, **M. H. Lamertin**, 20, rue du Marché-au-Bois.
AMSTERDAM, chez MM. **Feikema, Caarelsen & Cie**.
BERLIN, chez M. **R. Friedländer & Sohn**, Carlstr. 11, N. W.
LONDRES, chez MM. **William & Norgate**, 14, Henrietta street.
MADRID, chez M. **Romo y Fussel**.
MILAN, chez M. **Ulrico Hœpli**, 37, Corso Vittorio Emanuele.
OXFORD, chez M. **James Parker & Cie**, 27, Broad street.
PARIS, chez M. **P. Klincksieck**, 3, rue Corneille.
NEW-YORK, chez M. **G.-E. Stechert**, 9 East 16th street.

**3089.** Ochthoeca frontalis, Lafr., *Rev. Zool.*, 1847, p. 67; Stone, *Auk*, 1899, p. 78; a priorité sur : *citrinifrons*, Scl. (voir p. 226).
196. — olivacea, Allen, *Bull. Amer. Mus. N. H.*, 1900, p. 52. — Sta-Marta (Colombie).
197. — jesupi, Allen, *l. c.*, p. 51. — Sta-Marta (Colombie).
198. — keaysi, Chapm., *l. c.*, 1901, p. 227. — Pérou.
199. Mecocerculus nigriceps, Chapm., *l. c.*, 1899, p. 154. — Vénézuéla.
200. — uricii, Chapm., *l. c.*, 1899, p. 155. — Vénézuéla.
203. Sayornis saya, *var.* Yukonensis, Bish., *Auk*, 1900, p. 115. — Alaska.
**3108.** — nigricans (Sw.) a pour habitat : — Arizona, Texas, Nouv.-Mexique, Mexique.
204. — — *var.* Semiatra (Vig.), *Zool. Beech. Voy.*, p. 17; Nels., *Auk*, 1900, p. 124; (**3108**, pt.) — Mex. W., Ét.-Unis de Colima à l'Oregon.
**3109.** — — *var.* Aquatica, Scl. (voir p. 227).
201. Lichenops andina, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1879, p. 483. — Bolivie S.-E., Chili, Patagonie.
**3131.** — perspicillata (Gm.) a pour habitat : — Uruguay, Paraguay, Brésil S.-E.
202. Muscisaxicola hatcheri, Scott, *Bull. B. O. C.*, 1900, p. 55. — Patagonie.
203. — occipitalis, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 450. — Titicaca (Pérou).
**3146.** — *garretti*, Scott, *Bull. B. O. C.*, 1900, p. 55 = M. capistrata (Burm.)
204. Platyrhynchus bifasciatus, Allen, *Bull. Am. Mus. N. H.*, 1889, p. 141. — Matto Grosso.
205. — insularis, Allen, *l. c.*, p. 143. — Ile Tobago.
606bis (Gen.) Tæniotriccus, Berl. et Hart. (1902). — *Gen. nov.*
206. — andrei, Berl. et Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 58. — Orénoque (Vénézuéla).
207. Euscarthmus spodiops, Berl., *J. f. O.*, 1901, p. 87. — Bolivie W.
208. — ochropterus, Allen, *Bull. Am. Mus. N. H.* II, 1889, p. 143. — Brésil.
209. Cænotriccus simplex, Berl., *J. f. O.*, 1901, p. 88. — Bolivie.
210. Lophotriccus zeledoni, Cherr., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1891, p. 357. — Costa Rica.
211. Hemitriccus flammulatus, Berl., *J. f. O.*, 1901, p. 87. — Bolivie N.
212. Hapalocercus paulus, Bangs, *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1899, p. 96. — Sta-Marta (Colombie).
213. Pogonotriccus ottonis, Berl., *J. f. O.*, 1901, p. 89. — Bolivie W.
205. Serphophaga cinerea, *var.* Grisea, Lawr., *Ann. L. N. Y.*, X, p. 139 (**3229**, pt.) — Costa Rica.
214. — orenocensis, Berl. et Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 40. — Orénoque.
206. Mionectes oleagineus, *var.* Parca, Bangs, *Pr. N. Engl. Z. C.*, 1900, p. 20. — Panama.
207. — — *var.* Galbina, Bangs, *l. c.*, 1902, p. 85.



Digitized by Google

**731.** Mionectes assimilis, Scl., est une espèce distincte (p. 237).

208. — — *var.* Dyscola, Bangs, *Auk*, 1901, p. 362. — Chiriqui.

209. Leptopogon amaurocephalus, *var.* Incasta, Oberh., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1901, p. 187. — Paraguay.

215. Phyllomyias sclateri, Berl., *J. f. O.*, 1901, p. 90. — Bolivie N. et E.

216. — venezuelensis, Hart., *Bull. B. O. C.*, 1900, p. 39. — Cumana (Vénézuéla).

**3261.** — cristata, Berl. (nec Cab.) — Brésil S. et S.-E.

**3264.** — incanescens (Max.), *Beitr. Nat. Bras.* III, 2, p. 286; *berlepschi*, Scl.

**630** (Gen.) Phæomyias, Berl. (1902), au lieu de *Myiopatis*, Cab. et H. = *Ornithion*.

**3310.** — incomta (Cab. et H.); Berl., *Nov. Zool.* IX, 1902, p. 41; *semifusca*, Scl. (**3265**). — Vénéz., Guyane, Col., Bolivie, Brésil E.

217. — montensis (Bangs), *Pr. Biol. Soc. Wash.* XIII, 1899, p. 97. — Sta-Marta (Colombie).

**3271.** Ornithion cinerascens (Max.), *Beitr. z. Nat. Bras.* III, p. 725; *obsoleta*, Tem., *Pl. Col.* 275, f. 1; *incanescens*, Cab. et H. (nec Max.) — Brésil S. et E.

**3270.** — imberbe (Scl.) a pour habitat : — Tex., Am. centr., Mex. E. jusq. Nicaragua.

210. — — *var.* Sclateri, Berl. et T.; (**3270**, pt.) — Ecuador W.

211. — — *var.* Ridgwayi, Brewst., *Bull. Nutt. Orn. Cl.* VII, p. 208; (**3270**, pt.) — Arizona S.-E. jusqu'au Mexique.

**742.** *Tyrannulus semiflavus, var. brunneicapilla*, est une espèce distincte du genre précédent, et doit donc prendre le nom de : Ornithion brunneicapillum (Lawr.); Hart., *Nov. Zool.* V, p. 487.

**3281.** *Tyranniscus acer*, Salv. et Godm., est également un Ornithion (O. acer).

**3282.** — griseiceps, Scl. et Salv., appartient au genre Phyllomyias.

218. Elainea cristata, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 107, 177; Berl. et Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 43; (**3290**, pt.) — Vénézuéla, Brésil N.

212. — albiceps, *var.* Parvirostris, Pelz., *l. c.*, pp. 107, 178; Berl. et Hart., *l. c.*, p. 44; (**3290**, pt.) — Brésil N., Orénoque.

213. — viridicata, *var.* Jaliscensis (Nels.), *Auk*, 1900, p. 264. — Mex. W., Tres Marias.

214. — — *var.* Minima (Nels.), *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1898, p. 9. — Mexique W.

219. — yucatanensis (Nels.), *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1901, p. 172. — Yucatan (Mexique).

215. — gaimardi, *var.* Macilvaini, Lawr., *Ann. L. N. Y.* X, p. 10; Salv. et Godm., *Biol. C.-A., Aves*, II, p. 27. — Panama.

**3314.** — *cinerascens*, Ridgw. = E. martinica (Lin.)

**3311.** *Arenarum* (Salv.) = Sublegatus glaber Scl. et Salv., **3322**; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am., Aves*, II, p. 37. — Costa-Rica, Colombie, Vénézuéla.

Digitized by Google

220. Myiozetetes virescens (Allen), *Bull. Amer. Mus. N. H.* II, p. 149. — Matto Grosso (Brésil).

**639** (Gen.) *Craspedoprion*, Hart. (1902) = Rhynchocyclus.

216. Rhynchocyclus sulphurescens, *var.* Margi-nata, Lawr., *Pr. Ac. Philad.*, 1868, p. 428; (**3333**, pt.) — Panama.

**754.** — peruvianus, Tacz. (p. 242); id., *Orn. Pér.* II, p. 281. Est une espèce distincte. — Pérou, Ecuador.

217. — — *var.* Æquatorialis, Berl. et Tacz., *P. Z. S.*, 1883, p. 556, 1885, p. 90; (**754**, pt.) — Ecuador.

218. — cinereiceps, *var.* Flavo-olivacea, Lawr., *Ann. L. N. Y.* VIII, p. 8; (**3334**, pt.) — Panama.

219. — megacephalus, *var.* Flavotecta, Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 608. — Ecuador N.-W.

**762.** *Myiodynastes var. nobilis*, Scl. et *insolens*, Ridgw., *Man.*, p. 132 = M. audax (Gm.)

**645** (Gen.) Onychorhynchus, Fischer (1813), au lieu de *Muscivora*, Cuv. (1800, nec Lacép., 1799).

**3357.** — regius (Gm.), *S. N.* I, p. 445, au lieu de *regia*.

**3358.** — mexicanus (Scl.), au lieu de *mexicana*.

**766.** *Cnipodectes var. minor*, Scl. = C. subbrunneus, Scl.

**3365.** Myiobius sulphureipygius, Scl., au lieu de *sulphureipygia*.

221. — assimilis, Allen, *Bull. Am. Mus.* XIII, p. 144. — St^a-Marta (Colombie).

222. — litæ, Hart., *Bull. B. O. C.* XI, 1901, p. 40. — Ecuador N.-W.

220. Pyrocephalus rubineus, *var.* Saturata, Berl. et Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 34. — Orénoque, Cumana (Vénézuéla).

**3383.** — nanus, Gd.; supprimez dans la syn. : *dubius*, Gd. et *minimus*, Ridgw.

221. — — *var.* Dubia, Gd., in *Zool. Voy. Beagle*, III, p. 46; *minimus*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1890, p. 113. — Ile Chatham (Galapagos).

**779.** Empidochanes vireoninus, Ridgw., *Ibis*, 1886, p. 461; *canescens*, Chapm. (1894).

223. Mitrephanes berlepschi, Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 608. — Ecuador N.-W.

**3394.** Empidonax fulvifrons (Gir.) a pour habitat : — Mexique N. et E.

222. — — *var.* Pygmæa, Coues, *Ibis*, 1865, p. 537. — Nouv.-Mexique, Arizona S., Mex. W.

223. — — *var.* Rubicunda, Cab. et H., *Mus. Hein.* II, p. 70. — Mexique S.

224. — albigularis, *var.* Timida, Nels., *Auk*, 1900, p. 263. — Durango (Mexique).

224. — lawrencei, Allen, *Bull. Am. Mus. N. H.* II, p. 150; *Octhæca flaviventris*, Lawr. (nec Baird.) — ?

**786.** — *pusillus, var. Trailli* (Audub.) = pusillus (Sw. et Rich.) — Ecuador.

**786** (pt.) — — *var.* Alnorum, Brewst., *Auk*, 1895, p. 61. — Amér. N.-E. et centr.

Digitized by Google

225. EMPIDONAX MINIMUS, *var.* GRACILIS, Ridgw., *Pr. Biol. Soc. Wash.* III, p. 23. — Ile Cozumel.

**3401.** — *virescens,* Vieill. = ACADICUS (Gm.)

**788.** — BAIRDI, *var. occidentalis,* Nels. = BAIRDI, Scl. — Mexique S.

226. — — *var.* INSULICOLA, Oberh. (**3403**, pt.) — Ile Ste-Barbara (Calif.)

227. — — *var.* PERPLEXA, Nels., *Auk,* 1900, p. 263. — Oaxaca (Mexique).

228. — FLAVIVENTRIS, *var.* DIFFICILIS, Baird, *B. N. Am.,* p. 198. — Amérique N.-W. jusqu'à l'Ecuador W.

225. — TREPIDUS, Nels., *Auk,* 1901, p. 47. — Chiapas et Guatémala.

226. — GRISEUS, Brewst., *Auk,* 1889, p. 87. — Basse-Californie.

**655** (Gen.) NUTTALLORNIS, Ridgw. (1887), au lieu de *Contopus,* Cab. (1855, nec de Mars.); *Syrichta,* Bp., nec *Syrichtus,* Boisd.; *Horizopus,* Oberh. (1899).

**3410.** — MUSICUS (Sw.), a priorité sur *pertinax,* Cab. et H.; Salv. et Godm., *Biol. C.-A., Aves,* II, p. 81.

229. — VIRENS, *var.* SATURATA, Bishop, *Auk,* 1900, p. 116. — Alaska.

**3416** (pt.) — BRACHYTARSUS (Scl.) a pour habitat : — Am. cent. jusq. Panama.

230. — — *var.* PUNENSIS (Lawr.), *Ann. L. N. Y.* IX, p. 237. — Ile Puna (Ecuador).

231. — — *var.* ANDINA (Tacz.), *P. Z. S.,* 1874, p. 539; *depressirostris,* Ridgw. (**3418**). — Du Nicaragua au Pérou.

227. BLACICUS FLAVIVENTRIS, Lawr., *Pr. U. S. Nat. Mus.,* 1886, p. 617; Oberh., *Auk,* 1899, p. 335. — Grenada (Antilles).

**657.** (Gen.) *Planchesia,* Bp. = MYIOCHANES, Cab. et H.

228. MYIARCHUS MEXICANUS (Kaup), *P. Z. S.,* 1851, p. 51. — Texas, Mexique E. jusqu'à l'Honduras.

**3434-35.** — FEROX (Gm.); *swainsoni,* Cab. et H. et *venezuelensis,* Lawr. (**3435**). — Amérique méridionale jusqu'à l'Argentine.

232. — — *var.* PANAMENSIS, Lawr.; Allen, *Bull. Am. Mus. N. H.,* 1892, p. 347. — Veragua, Panama.

**808.** — — *var.* CEPHALOTES, Tacz. (voy. p. 250).

**809.** — — *var.* PELZELNI, Berl. (voy. p. 251).

**3440** (pt.) — LAWRENCEI (Gir.) a pour habitat : — Mexique E.

233. — — *var.* OLIVASCENS, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.,* 1899, p. 607. — Arizona, Mexique W.

234. — — *var.* NIGRICAPILLA, Ridgw., *l. c.,* 1883, pp. 384, 393. — Amérique centr.

235. — — *var.* PLATYRHYNCHA, Ridgw., *Pr. Biol. Soc. Wash.* III, p. 23. — Ile Cozumel.

**811.** — *coalei,* Ridgw., *P. U. S. N. M.,* 1886, p. 520 = TRICOLOR, Pelz.

## OSCINES

236. HIRUNDO RUSTICA, *var.* UNALASCHKENSIS (Gm.), Allen, *Auk,* 1901, p. 176. — Alaska.

Digitized by Google

**825**. *Hirundo rufula, var. Togoensis,* Rchw. = *var.* Domicella (**830**).
237. — semirufa, *var.* Neumanni, Rchw., *J. f. O.*, 1901, p. 282. — Massaïland.
229. Tachycineta lepida, Mearns, *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1902, p. 31. — Amér. N.-W. de l'Alaska au Costa-Rica.
**666** (Gen.) Chelidonaria, Rchw., au lieu de *Chelidon,* Boie (nec Forst.)
238. Chelidonaria urbica, *var.* Orientalis, Somow, *Orn. Faun. Gouv. Charkow,* 1897, p. 650; Härms, *O. M.*, 1899, p. 95. — Charkow (Russie).
**667** (Gen.) Clivicola, Forst. (1817) a priorité sur *Cotyle,* Boie (1822).
239. Clivicola paludicola, *var.* Mauritanica, (Meade-Waldo), *Bull. Br. O. C.* XII, p. 27. — Maroc.
240. — fuligula, *var.* Anderssoni, Sharpe et Wyatt., *Mon. Hirund.* I, p. 119. — Damaraland.
230. — pembertoni (Hart.), *Bull. B. O. C.* XII, p. 76. — Angola.
241. Petrochelidon fulva, *var.* Pallida, Nels., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1902, p. 211. — Mexique N.-E.
242. Progne purpurea, *var.* Cryptoleuca, Baird, *Rev. Am. B.*, p. 277; (**3530**, pt.) — Floride, Cuba.
243. — — ? *var.* Floridana (Mearns), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1902, p. 918. — Floride S.
231. Psalidoprocne fuliginosa, Shell., *P. Z. S.*, 1887, p. 123. — Caméron.
232. — poensis, Alex., *Bull. B. O. C.*, 1903, p. 34. — Fernando Po (Afr. W.)
233. — blanfordi, Weld-Bl., *Ibis,* 1900, pp. 178, 193. — Bilo (Abyssinie).
234. Stelgidopteryx ridgwayi, Nels., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1901, p. 174. — Yucatan, Mex. S.-E.
244. — ruficollis, *var.* Æqualis, Bangs, *Pr. New Engl. Zool. Cl.* II, p. 58. — Sta-Marta (Colombie).
**3560**. Hemichelidon sibirica (Gm.); Dav. et Oust., *Ois. Chine,* p. 122; *fuscedula,* Pall. — Altaï, Sibérie E., Chine, Japon.
245. — — *var.* Fuliginosa, Hodgs., *P. Z. S.*, 1845, p. 32; Hume et Hend, *Lahore to Yark,* p. 184, pl. 4; (**3560**, pt.) — Asie mérid., Malacca, Bornéo, Palawan.
**3563**. Butalis griseosticta, Swinh. et sa var. Pallens, Stejn. (**848**) appartiennent au genre Hemichelidon.
**3562**. Butalis grisola (Lin.) — Europe, Afrique.
246. — — *var.* Sibirica, Neum., *J. f. O.*, 1900, p. 359. — Sibérie, Asie centr., Afrique E.
**3566**. — *ussheri* (Sharpe) = Sylvia hortensis (Gm.), voy. p. 374.
235. — fülleborni (Rchw.), *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 122. — Nyassaland.
— torquensis (Hart.), *Nov. Zool.* VII, p. 37. — Toru (Afrique équat.)
236. — infulata (Hartl.), *P. Z. S.*, 1880, p. 626; id., *J. f. O.*, 1882, p. 224. — Afrique centr.
247. Muscicapa atricapilla, *var.* Speculigera, Bp.; (**3573**, pt.); Erl., *J. f. O.*, 1899, p. 506. — Tunisie.

Digitized by Google

248. Microeca flavigastra, *var.* Læta, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.*, 1878, p. 323; (**3582**, pt.) — Wandammen (Nouv.-Guinée).

237. — addita, Hart., *Nov. Zool.* VII, p. 234. — Ile Bourou.

238. Alseonax gambagæ, Alex., *Bull. B. O. C.* XII, p. 11. — Côte-d'Or (hinterland).

**3599**. *Batis orientalis minor*, Erl., *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 181 = B. orientalis.

**3601**. — *bella* (Ell.) = B. orientalis (Heugl.); Grant, *Ibis*, 1902, p. 662.

249. — minulla, *var.* Poensis, Alex., *Bull. B. O.* XIII, p. 34. — Fernando Po.

693bis (Gen.) Muscitrea, Blyth (1847).

259. — cinerea, Blyth, *Journ. As. Soc. Beng.*, 1847, p. 122; Oates, *Faun. Br. Ind.* II, p. 31. — Indo-Chine, Malacca, Andaman.

240. Erythromyias riedeli, Büttik., *Not. Leyd. Mus.*, 1886, p. 62, pl. 3, f. 1. — Ile Ténimber.

241. Gerygone tenkatei, Büttik., *Not. Leyd. Mus.*, 1892, p. 195. — Flores.

242. — kühni, Hart., *Nov. Zool.* VII, p. 15. — Ile Dammer.

243. — insularis, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1878, p. 117. — Ile Lord Howe.

244. — ramuensis, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1897, p. 26. — Nouv.-Guinée allem.

245. — placida, Madar., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 3. — Nouv.-Guinée allem.

246. — inconspicua, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1878, p. 116. — Nouv.-Guinée S.-E.

247. — giulianetti, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1896, p. 81. — Nouv.-Guinée S.-E.

248. — tenebrosa (Hall.), *Vict. Natural.* XIII, p. 79. — Australie N.-W.

**699** (Gen.) *Eugerygone*, Finsch (1900) = Gerygone.

**861**. Chasiempis *dolei*, Stejn. = *var.* sclateri, Ridgw. (**864**).

**862**. — *ridgwayi*, Stejn. = sandwichensis (Gm., **3699**).

**865**. — *ibidis*, Stejn. = sandwichensis (Gm.)

250. Poecilodryas cyana, *var.* cyanopsis, Sharpe, *H.-l. B.* III, p. 235; *salvadorii*, Roth. et Hart., *B. B. O. C.* XI, p. 26 (nec Madar.) — Nouv.-Guinée S.-E.

249. — pachydemas, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 5. — Nouv.-Guinée S.-E.

**3723**. — armiti, De Vis; *Pachycephalopsis armiti*, Salvad., est un Heteromyias (Sharpe, *Bull. B. O. C.* XI, p. 60).

**3727**. — papuana, A. B. Mey.; *viridiflava*, Rothsch. et Hart., *Bull. B. O. C.*, 1900, pp. 26, 40, est un Microeca.

707bis (Gen.) Pholia, Rchw. (1900), *gen. nov.*

250. — hirundinea, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 99. — Rungwe (Nyassal. N.)

**868**. Hyliota *marginalis*, Rchw. = H. barbozæ, Hartl. (**3737**). — Benguéla, Nyassaland.

251. ? Xanthopygia owstoni, Bangs, *Bull. Mus. Harvard*, XXXVI, p. 265. — Iles Liu-Kiu.

**712** (Gen.) Lioptilus, Cab.; *Alcippe*, Shell. (nec Blyth).

**3755**. — abyssinicus (Rüpp.), *Neue Wirb.*, p. 108, pl. 40, f. 2; *kilimensis*, Shell. (**4910**). — Afrique N.-E.

Digitized by Google

252. LIOPTILUS CLAUDEI, Alex., *Bull. B. O. C.*, 1903, p. 34. Ile Fernando-Po.
**3756.** — GALINIERI (Guér.), *Rev. Zool.*, 1843, p. 162; *frontalis*, Rüpp.; *melodus*, Heugl. Abyssinie, Choa.
251. PARISOMA SUBCÆRULEUM, *var.* CINERASCENS, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 77. Damaraland.
253. — LUGENS (Rüpp.), *Neue Wirb., Vög.*, p. 113, pl. 44, f. 2. Abyssinie.
254. — JACKSONI, Sharpe, *Bull. B. O. C.* X, p. 28. Mt Elgon (Afr. équat.)
**5317.** — BLANFORDI (Seeb.); Grant, *Ibis*, 1900, p. 154; id., *Nov. Zool.* VII, p. 253. Abyssinie, Somaliland.
252. CHLOROPETA NATALENSIS, *var.* UMBRINICEPS, Neum., *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 10. Ethiopie S.
253. — — *var.* KENYA, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XII, p. 35. Mont Kenya (Afr. E.)
255. HYPOTHYMIS ABBOTTI, Richm., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1902, p. 189. Pulo Babi (Sum. W.)
256. — CONSOBRINA, Richm., *l. c.* Ile Simalur (Sum. W.)
257. — ERYTHROCERCUS HOLOCHLORUS, Erl., *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 181. Juba inférieur (Afrique N.-E.)
**3797.** RHIPIDURA DEVISI, North, *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1898, p. 444; Dubois (1900).
254. — ALBICOLLIS, *var.* ATRATA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* 1879, p. 203; *schlegeli*, Sharpe; *vidua*, Schl. (nec Salvad.); (**3804**, pt.) Mt Singalan (Sumatra).
258. — REICHENOWI, Finsch, *Notes Leyd. Mus.* XXII, p. 237, pl. 4, f. 3. Babber (Moluques).
255. — RUFIFRONS, *var.* TORRIDA, Wall., *P. Z. S.*, 1865, p. 477, pl. 28; (**3824**, pt.) Ternate (Moluques).
**3807.** — *castaneothorax*, Rams. = HYPERYTHRA, Gr.
259. — ALBINA, Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.*, 1901, p. 183. Kulambangra (Salom.)
260. — MATTHIÆ, Heinr., *J. f. O.*, 1902, p. 457, pl. 9, f. 2. St-Matthias.
**3802.** — *fallax*, Rams. = ATRA, Salvad. (**3803**); Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1896, p. 78.
**878.** — *var. meyeri*, Büttik. = ATRA; Salvad., *l. c.*
**3834.** — *cinnamomea*, Mey. = ATRA; Salvad., *l. c.*
**3852.** — *hoedti*, Büttik. = BUETTIKOFERI, Sharpe (**3855**); Fsch., *Notes Leyd. Mus.* XXII, p. 256.
**3858.** — *finschi*, Salvad. = SETOSA (Q. et G.), **3854**.
261. TERPSIPHONE SMITHII (Fraser), *P. Z. S.*, 1843, p. 34; Sharpe, *P. Z. S.*, 1881, p. 788. Afrique W.
262. — MELANURA (Rchw.), *J. f. O.*, 1901, p. 285. Duki (Afrique équat.)
263. — IGNEA (Rchw.), *l. c.* Benguéla.
264. — ILLEX, Bangs, *Bull. Mus. Harvard*, XXXVI, p. 264. Liu-Kiu.
**3898.** *Muscicapa infuscata*, Blyth, *Ibis*, 1870, p. 165 = RHINOMYIAS PECTORALIS (Salvad.)

Digitized by Google

**897.** Culicicapa, *var. Panayensis*, Sharpe = C. helianthea (Wall.)
**3912.** Myiagra *nupta*, Hart., *Nov. Zool.* V, p. 526 = nitida, Gould.
**3913.** — novæpomeraniæ au lieu de *novæ-pomeranæ* (laps.)
**3923.** — *pallida*, Rams. = femelle du ferrocyanea, Rams. (**3922**).
256. — caledonica, *var.* Viridinitens, Gray, *P. Z. S.*, 1859, p. 162 (**3918**, pt.) — Iles Loyalty.
265. — perspicillata, Gray, *P. Z. S.*, 1859, p. 161 (**3918**, pt.) — Nouvelle-Calédonie.
**3924.** — latirostris, Gould; *ruficollis*, Salvad. (nec Vieill.)
**3925.** — ruficollis (Vieill.), *N. Dict.* XXVII, p. 21; *rufigula*, Wall.; Oust., *Bull. Soc. Philom.*, 1881, p. 71. — Timor, Sumba, Bonerate, Djampea, Kalao.
266. — freycineti, Oust., *Bull. Soc. Philom.*, 1881, p. 73. — Iles Mariannes.
267. — feminina, Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.* VIII, pp. 183, 375. — Ile Kulambangra (Salomon)
**6720.** Megabias atrilatus (Cass.); *flammulatus*, Verr. (**3934**); Sharpe, *H. l.* III, p. 247 (note).
268. Smithornis zenkeri, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1903, p. 41. — Caméron.
269. — sharpei, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, 1903, p. 34. — Fernando Po.
270. Cryptolopha kinabaluensis, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XI, 1901, p. 60. — Bornéo N.-W.
271. — burmanica, Berez. et Bianchi, *Aves Exped. Potan.*, p. 75. — Pégou, Ténassérim.
257. — xanthoschista, *var.* Jerdoni, Brooks, *Str. F.*, 1871, p. 248, 1875, p. 245. — Népaul, Assam, Monts Khasi, Manipour.
272. — dorcadichroa, Rchw. et Neum., *Orn. Monatsb.*, 1895, p. 76. — Kilimanjaro (Afr. E.)
258. — schisticeps, *var.* Ripponi (Sharpe), *Bull. B. O. C.* XIII, 1903, p. 11. — Yun-nan W.
273. — læta, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XIII, 1903, p. 9. — Ruwenzori.
274. — herberti, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, p. 35. — Fernando Po.
**3968.** — davisoni, et non *davinsoni* (laps.)
740bis (Gen.) Dammeria, Hart. (1899), *gen nov.*
275. — henrici, Hart., *Ibis*, 1899, p. 646; id., *Nov. Zool.*, VII, p. 14, VIII, pl. 6, ff. 1, 2. — Ile Dammer (mer de Banda).
276. Dioptrornis trothæ, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 5. — Rungwe (Afrique E.)
**3993.** Bradyornis *woodwardi*, Sharpe = Sylvia hortensis ou *simplex* (**5305**).
**3994.** — *traversi*, Gigl. = B. chocolatinus (Rüpp.)
277. — reichenowi (Neum.), *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 10. — Budda (Ethiopie S.)
**3997.** — *oatesi*, Sharpe = B. murinus, H. et F. (**3990**).
743bis (Gen.) Empidornis, Rchw. (1901), *gen. nov.*
**3986.** — semipartitus (Rüpp.), etc.
278. — kavirondensis (Neum.), *J. f. O.*, 1900, p. 257. — Kavirondo (Afr. équat.)
743ter (Gen.) Myopornis, Rchw., *J. f. O.*, 1901, p. 285 (*gen. nov.*)

Digitized by Google

**3998.** Myopornis boehmi (Rchw.)
**3999.** — sharpei (Bocage).
**4008.** Arses *batantæ*, Sharpe = A. telescophthalmus (Garn.), **4003.**
**4011.** — *terræ-reginæ*, Gamb. = A. kaupi, Gould (**4009**).
**910.** Monarcha, *var. Commutata*, Brügg. = M. inornatus (Garn.); Finsch, *Notes Leyd. Mus.* XXII, p. 258.
**911.** — *var.* Kisserensis, Mey. = M. inornatus (**4016**); Finsch, *l. c.*
**4026.** — morotensis (Sharpe) = M. bimaculatus, Gr. (**4025**); Finsch, *l. c.*, p. 205.
279. — albiventris, Gould, (**912**, pt. p. 289). Australie N.-E.
280. — kulambangræ, Roth. et Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 183. Kulambangra (Salom.)
259. — brodiei, *var.* Floridana, Roth. et Hart., *l. c.*, p. 182. Florida (Salomon).
281. — menckei, Heinr., *J. f. O.*, 1902, p. 451, pl. 9, f. 1. Ile St-Matthias.
**4060.** — fuscescens, Mey. = M. inornatus (**4016**); Sharpe, *H.-l.*, p. 283.
**4061.** — geelvinkianus, Mey. = M. inornatus (**4016**); Sharpe, *l. c.*
748bis (Gen.) Heteranax, Sharpe (1885).
**4029.** — mundus (Scl.); Sharpe, in *Gd. B. New. Guin.* II, pl. 39. — Appartiendrait, d'après Finsch, aux *Laniidæ*.
260. Peltops blainvillei, *var.* Minor, De Vis, *Ann. Rep. Br. New Guin.*, 1894, *App.*, p. 100. Nouv.-Guinée S.-E.
282. Pomarea rufocastanea, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1879, p. 79; (**4065**, pt.) San Cristoval (Salomon).
**752** (Gen.) *Pomareopsis*, Oust. = *Grallina* (**1176**).
**4070.** — *semi-atra*, Oust. = Grallina bruijnii, Salvad. (**6806**).
**4083.** *Siphia enganensis*, Grant = mâle du S. herioti (Rams.), **4090**; Sharpe, *Bull. B. O. C.* XI, p. 60.
283. Siphia ruecki (Oust.), *Bull. Soc. Philom.*, 1881, p. 78. Malacca.
284. — hainana (Grant), *P. Z. S.*, 1900, p. 480. Haïnan.
285. — brevirostris (Bingh.), *Ann. N. H.*, 1900, p. 359. Siam.
**4093.** — banyumas (Horsf.); Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 53. Java.
261. — — *var.* Rufigastra, Raffl.; (**4093**, pt.) Malac., Born., Lingga.
**919.** — — *var. Philippinensis*, Sharpe = *var.* Simplex, Blyth, *Ibis*, 1870, p. 165. Philippines.
286. — rufifrons (Wall.); **4096**, pt.; Finsch, *Notes Leyd. Mus.*, 1901, p. 45.
287. — hosei (Finsch), *Notes Leyd. Mus.*, 1901, p. 48. Bornéo.
**4099.** — *turcosa* (Brügg.) = femelle de S. elegans (**4089**).
**4106.** — *vordermani*, Shpe. = femelle de Erythromyias dumetoria (Wall.), **3637.**
**4916.** Muscicapula basilanica (Sharpe) = *M. mindanensis*, W. Blas. **4115.**
**4111.** Anthipes leucops (Sharpe), *P. Z. S.*, 1888, p. 246 = *albifrons*, Sharpe (*nom. nud.*), **4126.** Monts Khasi, Manipour, Karen-nee.
**4129.** Siphia vivida (Swinh.) au lieu de *Nitalva vivida*.
**758** (Gen.) Stizorhina, Oberh. (1899) au lieu de *Cassinia*, Hartl. (1860, nec Rafin., 1815).
**4141.** Graucalus *purus*, Sharpe, = G. cæsius (Licht.), **4140**; Grant, *Ibis*, 1900, p. 171.



Digitized by Google

288. Graucalus cæruleus, Oust., *Ann. Sc. Nat.*, 1884, art. 8, p. 1. — Bas-Congo.

**4146.** — *pusillus*, Rams. = G. solomonis, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1879, p. 314.

289. — cornix, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 187. — Nouv.-Guinée S.-E.

**4147.** — holopolius (Sharpe) appartient au genre Edolisoma; Roth. et Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 374.

**4148.** — *elegans*, Rams. = G. hypoleucus, Gd. (**4161**).

**4149.** — *lettiensis*, Mey. = G. personatus (S. Müll.), **4183**; Finsch, *Notes Leyd. Mus.* XXII, p. 249.

**4162.** — *timorlaoensis*, Mey. = G. hypoleucus, Gd. (**4161**); Finsch, *l. c.*, p. 250.

290. — vordermani, Hart., *Bull. B. O. C.* XII, 1901, p. 32. — Ile Kangean.

**4214.** Edolisoma tristrami, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1882, p. 22; *salomonis*, Tristr. (nec Rams.) — Guadalcanar (îles Salomon).

262. — erythropygium, *var.* Saturatia, Roth. et Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 582. — Iles Ysabelle, Kulambangra et Shortland (Salomon).

291. Campochæra flaviceps, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1879, p. 38. — Nouv.-Guinée S.-E.

**938.** Campophaga, *var. Intermedia* (Hume) = C. melanoptera (Rüpp.), **4244**.

**939.** — *var. Saturata* (Swinh.) = C. melanoptera.

**4246** (pt.) — *innominata*, Oates = C. melanoptera.

**4248** (pt.) Pericrocotus *elegans* (Mc Clell.) = P. speciosus (Lath.); **4247**. — Himalaya, Inde, Birm.

**4248** (pt.) — fraterculus, Swinh.; Oates, *Faun. Br. Ind.*, *B.* I, p. 481. — Indo-Chine.

**4259.** — montanus, Salvad. a pour habitat : — Sum., Bornéo N.-W.

292. — wrayi, Sharpe (**4259**, pt.) — Pérak (Malacca).

293. — croceus, Sharpe, *P. Z. S.*, 1888, p. 269; (**4259**, pt.) — Pérak (Malacca).

**4271.** — *immodestus*, Hume = P. cantonensis (**4270**). — Ch.S., Haïnan, Ténass.

**768** (Gen.) Diaphoropterus, Oberh. (1899), au lieu de *Symmorphus*, Gd. (1837, nec Wesm., 1833).

772bis (Gen.) Hapalopteron, Bonap. (1854).

294. — familiare (Kittl.), *Mém. Ac. St. Pétersb. des sav. étr.*, I, 1831, p. 235, pl. 13; Bp., *C. R.* XXXIX, p. 59; Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* VI, p. 120 (note). — Ile Bonin (mer du Japon).

263. Pycnonotus tricolor, *var.* Minor, Hengl., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 398; (**4316**, pt.) — Afrique N.-E.

264. — xanthopygus, *var.* Reichenowi, Lor. et Hellm., *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 30. — Arabie S.

265. Lædurosa simplex, *var.* Prillwitzi (Hart.), *Nov. Zool.* IX, p. 561, — Pahang (Malacca E.)

**781** (Gen.) *Pinarocichla* = Eupthlosus (**782**).

Digitized by Google

**792** (Gen.) Euptilosus, Rchb. (1857) au lieu de *Poliolophus*, Sharpe (1876).
**4345.** — entylotus (Eyt.), *P. Z. S.*, 1839, p. 103, au lieu de *euptilosus*, devenu terme générique.
295. — nieuwenhuisi (Finsch), *Notes Leyd. Mus.* XXIII, 1901, p. 95. — Bornéo centr.
**4353.** Ixidia cyaniventris (Blyth), a pour habitat : — Ténassérim S., Malacca, Sumatra.
266. — — *var.* Paroticalis (Sharpe); **4353**, pt. — Bornéo.
296. Brachypodius baweanus, Finsch, *Notes Leyd. Mus.* XXII, p. 209. — Ile Bawean (Java).
788bis (Gen.) Pyrrhurus, Cass. (1859); *Trichites*, Heine (1860); *Ptyrticus*, Hartl. (1883); *Xenocichla* (pt.), *Syn. Av.*, **789.** — Ce genre comprend :
297. Pyrrhurus turdinus (Hartl.), *J. f. O.*, 1883, p. 425; id., *Zool. Jahrb.*, 1887, p. 315, pl. 11, f. 1. — Afrique équat. E.
**4375.** — scandens (Sw.)
**948.** — — *var.* Orientalis (Hartl.)
**4376.** — multicolor (Bocage).
**4407.** — tricolor (Cass.)
**953.** — — *var.* Cabanisi (Sharpe).
**4377.** — serinus (Verr.)
267. Xenocichla albigularis, *var.* Leucolæma, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XIII, 1902, p. 10. — Toro (Ruwenzori).
268. — tephrolæma, *var.* Kakamegæ, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XI, p. 29. — Kakamega.
269. — flavicollis, *var.* Shelleyi, Neum., *J. f. O.*, 1900, p. 292. — Muansa (Afrique E.)
**790** (Gen.) *Alophoixus*, Oates (1889) = Criniger.
270. Criniger griseiceps, *var.* Burmanica, Oat., *Faun. Br. Ind. B.* I, p. 256; (**4394**, pt.) — Birmanie.
298. — salangæ, Sharpe, *Hand-list*, III, p. 316; *cabanisi*, A. Müll., *J. f. O.*, 1882, p. 384 (nec Sharpe). — Salanga (Malacca N.)
**4398.** — tephrogenys (Jard. et Sel.), *Ill. Orn.*, pl. 127; *gutturalis*, Bp.; etc.
**4404.** — *olivaceiceps*, Shell. = Xenocichla striifacies, Rchw. (**4374**).
299. — sordidus, Richm., *Pr. U. S. Nat. Mus.* XXII, p. 320. — Bas-Siam.
300. — conradi, Finsch, *Verh. z.-b. Ges. Wien*, 1873, p. 9. — Siam.
301. Iole nicobariensis, Moore, in *Horsf. et M., Cat. B. Mus. E. I. Co.* I, p. 237. — Iles Nicobar.
302. — lucasi (Hart.), *Nov. Zool.* X, 1903, p. 13. — Ile Obi Major.
**4421.** — *guimarasensis*, Steere = J. philippensis (Gm.), **4420.**
**793** (Gen.) *Eurillas*, Oberh. (1899) = Andropadus.
**794** (Gen.) *Stelgidillas*, Oberh. (1899) = Chlorocichla.
303. Chlorocichla poensis (Alex.), *Bull. B. O. C.* XIII, p. 35. — Fernando Po.
304. — marchei, Oust., *N. Arch. Mus.* II, 1879, p. 100. — Gabon.
**4451.** Phyllostrophus capensis, Sw. = *Ph. terrestris*, Sw., *B. W. Afr.* I, p. 270.

Digitized by Google

271. Phyllostrophus strepitans, *var.* Placida, Shell., *P. Z. S.*, 1889, p. 363. — Kilima Ndjaro.
272. — — *var.* Sharpei, Shell. (**4452**, pt.) — Afrique E. angl.
273. — — *var.* Poensis, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, 1903, p. 35. — Fernando Po.
305. Macrosphenus poensis, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, 1903, p. 36. — Fernando Po.
306. — zenkeri (Rchw.), *Orn. Monatsb.*, 1898, p. 23; (**4460**, pt.) — Jaunde (Afrique W.)
**4475**. Hemixus striolatus (S. Müll.), *Bp. Consp.* I, p. 262; *sumatranus*, Rams. — Sumatra.
**4476**. — malaccensis (Blyth). Supprimez Tr. *striolatus*, Bp. — Indo-Chine, Bornéo.
802bis (Gen.) Cerasophila, Bingh. (1900). *Gen. Nov.*
307. — thompsoni, Bingh., *Ann. N. H.*, 1900, p. 358. — Siam.
274. Hypsipetes amaurotis, *var.* Hensoni, Stejn. (**4484**, pt.) — Japon.
275. — — *var.* Pryeri, Stejn. (var. **963**, pt.) — Iles Liu-Kiu.
276. Chloropsis viridis, *var.* Viriditecta, Hart., *Nov. Zool.* IX, pp. 212, 557. — Bornéo.
**5505**. — zosterops, Vig. est une var. de C. viridis (Horsf.) — Sumatra.
277. Eupetes castanonotus, *var.* Pulchra, Sharpe; **4526**, pt.; Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1896, p. 100. — Nouv.-Guinée S.-E.
308. Trochalopteron ripponi, Oates, *Bull. B. O. C.* XI, 1900, p. 10. — Siam S.
309. — sharpei, Ripp., *Bull. B. O. C.* XII, 1901, p. 13. — Kauri-Kachin.
**4586**. *Ianthocincla cinereiceps* (Styan) = Trochalopteron ningpoense, Dav. et Oust. (**4548**); *Bull. Mus. Paris*, 1898, n° 6, p. 254. — Nouv.-Guinée.
310. Gampsorhynchus saturatior, Sharpe, *P. Z. S.*, 1888, p. 273. — Perak (Malacca).
278. Argya rubiginosa, *var.* Sharpei, Gr. et Reid, *Ibis*, 1901, p. 662; *rubiginosa* (pt.), Sharpe, *P. Z. S.*, 1895, p. 488. — Schebeli (Somaliland).
311. Melanocichla peninsularis, Sharpe, *Pr. Zool. Soc.*, 1888, p. 274. — Perak (Malacca).
312. Garrulax schistochlamys, Sharpe, *Ibis*, 1888, p. 479. — Kina Balu (Bornéo).
313. Dryonastes kaurensis, Ripp., *Bull. B. O. C.* XII, 1901, p. 13. — Kauri-Kachin.
314. Crateropus hindei, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XI, 1900, p. 29. — Athi (Afrique E.)
315. — stictilæma, Alex., *Bull. B. O. C.* XII, 1901, p. 10. — De la Côte d'Or au Niger.
316. Bathmocercus jacksoni, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XIII, 1902, p. 10. — Kibero (Ruwenzori).
317. Turdinulus humei, Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 564. — Pahang (Malacca E.)
318. — granti, Richm., *Pr. U.S. Nat. Mus.* XXII, p. 320. — Bas-Siam.

Digitized by Google

319. TURDINULUS SQUAMATUS (Pak.), *J. Bombay Soc.* XIII, p. 403. — Cachar.

**4739**. MALACOCINCLA ABBOTTI, Blyth; supprimez *Bornéo* de l'habitat.

320. — BÜTTIKOFERI, Finsch, *Notes Leyd. Mus.* XXII, p. 218; *abbotti* (pt.), auct. plur. (nec Blyth). — Bornéo.

321. CRATEROSCELIS PECTORALIS, Rothsch. et Hart., *Bull. B. O. C.* XI, 1900, p. 25. — Caméron.

322. — RUFOBRUNNEA, Rothsch. et Hart., *l. c.* = ?*Sericornis salvadorii*, Rchw., *Orn. Mon.*, 1901, p. 4. — Nouv.-Guinée allem.

**851** (Gen.) AETHOSTOMA, Sharpe (1902), au lieu de *Trichostoma*, Blyth (1842, nec Pictet, 1834).

323. DRYMOCATAPHUS CINNAMOMEUS, Ripp., *Bull. B. O. C.* XI, p. 12. — Siam.

324. ANDROPHILUS DISTURBANS, Hart., *Nov. Zool.* VII, p. 258. — Ile Bourou.

325. ILLADOPSIS ATRICEPS (Sharpe), *Bull. B. O. C.* XIII, 1902, p. 10. — Ruwenzori (Afr. W.)

326. — JACKSONI (Sharpe), *l. c.* XI, p. 29. — Nandi.

327. — BATESI (Sharpe), *l. c.* XII, 1901, p. 2; *Ibis*, 1902, p. 94, pl. 4, f. 2. — Caméron, Bas-Congo.

328. — CERVINIVENTRIS, *l. c.*, p. 3. — B.-Congo, Gabon, Cam.

329. — BOCAGEI (Salvad.), *Boll. Mus. Tor.*, 1903, n° 442, p. 1; id., *Mem. R. Acc. Sc. di Tor.*, 1903, p. 110. — Fernando Po.

330. — PUVELI (Salvad.), *Ann. Mus. Gen.* XX, 1901, p. 767. — Guinée portugaise.

331. MALACOPTERON NOTATUM, Richm., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1902, p. 190. — Ile Banjak (Sum. W.)

**870** (Gen.) NESOBATES, Sharpe (1902) au lieu de *Oxylabes*, Sharpe (1870, nec Forst., 1856).

279. STRACHYRHIS MACULATA, *var.* BANJAKENSIS, Richm., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1902, p. 190. — Banjak (Sumatra W.)

**4824** (pt.) TIMALIA PILEATA, Horsf. a pour habitat : — Java.

280. — — *var.* JERDONI, Wald., *Ann. Mag. N. H.*, 1872, p. 61; (**8424**, pt.) — Indo-Chine, Malacca.

281. — — *var.* BENGALENSIS, Godw.-Aust., *J. A. S. Beng.*, 1872, pt. 2, p. 143; (**8424**, pt.) — Himalaya, Assam, Cachar.

**4828**. PYCTORHIS GRACILIS, Styan = MOUPINIA POECILOTIS (Verr.), **4915**.

332. MIXORNIS FRIGIDA (Hartl.); *Heleia frigida*, Hartl., *J. f. O.*, 1865, p. 27; *Zosterops frigida*, Gad., *Cat. B.* IX, p. 203. — Sumatra.

333. — PRILLWITZI, Hart., *Bull. B. O. C.* XII, p. 32; id., *Nov. Zool.* IX, p. 436, pl. 13, f. 1. — Ile Kangean (mer de Java).

**883** (Gen.) Syn. : *Drymochares*, Gd. (1868, nec Muls., 1847); *Heteroxenicus*, Sharpe (1902), *Bull. B. O. C.* XII, p. 55.

334. BRACHYPTERYX FLORIS, Hart., *Nov. Zool.* IV, pp. 170, 516. — Flores.

Digitized by Google

335. Cyanoderma sulphurea (Ripp.), *Bull. B. O. C.* XI, p. 11. Siam S.

336. — davidi (Oust.), *Bull. Mus. Paris*, 1899, n° 3, p. 119. Setchuen.

337. — chrysops (Richm.), *Pr. B. S. Wash.*, 1902, p. 157. Trong (Bas-Siam).

**884**bis (Gen.) Pseudoxenicus, Finsch, *Not. Leyd. Mus.* XXII, 1900, p. 213; *Gen. nov.; Orthnocichla* (pt.), Hart.

**4874.** Pseudoxenicus superciliaris (Bp.); *leptura*, Kuhl. Java.

— everetti (Hart.); *Orthnocichla everetti*, Hart., *Nov. Zool.* IV, p. 170. Flores.

**886** (Gen.) Syn. : *Sittiparus*, Oat. (1899, nec de Selys, 1884); *Pseudominla*, Oat. (1894); *Semiparus*, Hellm. (1901).

338. Minla intermedia (Ripp.); *Schœniparus intermedius*, Ripp., *Bull. B. O. C.* XI, 1900, p. 11. Nanoi (Siam S.)

339. Alcippe fratercula, Ripp., *Bull. B. O. C.* XI, 1900, p. 11. Siam S.

**4908**bis. — *variegatus* (Styan) = A. genestieri, Oust. (**4908**).

**892** (Gen.) *Dendrobiastes* = Muscicapula, **755** (p. 294).

**4916.** Muscicapula basilanica a pour syn. *M. mindanensis*, Blas., **4115**.

282. Yuhina gularis, *var.* Yangpiensis, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XIII, 1902, p. 12. Yang-pi (Yunnan).

340. — ampelina, Ripp., *Bull. B. O. C.* XI, p. 12. Warar Bum (Siam).

283. Siva strigula, *var.* Malayana, Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 567. Pahang (Malacca E.)

284. — cyanuroptera, *var.* Sordidior, Sharpe, *P. Z. S.*, 1888, p. 276; *sordida*, Sharpe (1887, nec Hume.) Pérak (Malacca).

285. Cutia nipalensis, *var.* Cervinicrissa, Sharpe, *P. Z. S.*, 1888, p. 276. Pérak (Malacca).

**905** (Gen.) Diaphorillas, Oberh. (1899), *Pr. Ac. Phil.*, p. 219, au lieu *Amytis*, Less. (1831, nec Savig., 1826).

341. ? Diaphorillas gigantura (Millig.), *Victorian Natural.*, XVIII, p. 27. Australie W.

**906**bis (Gen.) Eremiornis, North (1900), *Gen. nov.*

342. — carteri, North, *Victorian Natural.* XVII, 1900, pp. 78, 93; Sclat., *Ibis*, 1902, p. 608, pl. 14. Australie.

**907** (Gen.) Cryptillas, Oberh., *l. c.*, 1899, au lieu de *Phlexis*, Hartl. (1866, nec Erichs., 1841).

343. — ruffescens (Sharpe), *Bull. B. O. C.* XIII, 1902, p. 9. Ruwenzori.

286. — — *var.* Lopezi, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, p. 48. Fernando Po.

287. Bradypterus cinnamomeus, *var.* Salvadorii, Neum., *J. f. O.*, 1900, p. 304. Gurui, Kilima Ndjaro.

**912** (Gen.) Nesillas, Oberh., *l. c.*, 1899, p. 211, au lieu de *Ellisia*, Hartl. (1860, nec Forb. et Goods., 1840).

288. Megalurus macrurus, *var.* Interscapularis, Scl.; Roth. et Hart., *Orn. Monatsb.*, 1899, p. 139 (**4967**, pt.) Nouv.-Hanovre.

Digitized by Google

**4971.** *Megalurus punctatus*, De Vis, est probablement le jeune du M. MACRURUS; Roth. et Hart., *l. c.*

344. CALAMOCICHLA POENSIS, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, 1903, p. 37. — Fernando Po.

289. — LEPTORHYNCHA, *var.* JACKSONI, Neum., *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 185. — Uganda.

345. CALAMONASTES STIERLINGI, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 39. — Rowuma (Afrique E. allemande).

346. APALIS LOPEZI, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, 1903, p. 35. — Fernando Po.

290. — CINEREA, *var.* SCLATERI, Alex., *l. c.*, p. 36. — Fernando Po.

920bis (Gen.) UROLAIS, Alex. (1903), *l. c.*, p. 35. (*Gen. nov.*)

347. — MARIÆ, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, 1903, p. 35. — Fernando Po.

**1026.** CHLORODYTA FLAVIDA, *var.* FLORISUGA (Rchw.), *J. f. O.*, 1898, p. 314; *neglecta*, Alex.; Jack., *Ibis*, 1901, p. 67. — Afrique S.-E.

291. — BINOTATA, *var.* PERSONATA (Sharpe), *Bull. B. O. C.* XIII, 1902, p. 9. — Ruwenzori.

924 (Gen.) NEOMIXIS, Sharpe (1881) au lieu de *Eroessa*, Hartl. (1866, nec Doubled., 1847)

348. SYLVIELLA GAIKWARI, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XI, 1901, p. 47. — Somaliland.

925bis (Gen.) POLIOLAIS, Alex. (1903). *Gen. nov.*

349. — ELEONORÆ, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, 1903, p. 36. — Fernando Po.

292. CAMAROPTERA BREVICAUDATA, *var.* CHRYSOCNEMIS (Licht.), *Nom. Av. Berol.*, p. 33 (**5055**, pt.); Grant, *Ibis*, 1901, p. 648. — Abyssinie S., Choa.

**1035.** Pour M. O. Grant, la *var.* TINCTA (Cass.,) serait synonyme de *Chrysocnemis*, *l. c.*

293. CAMAROPTERA CONCOLOR, *var.* GRANTI, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, 1903, p. 36. — Fernando Po.

**5061.** — *dorcadichroa*, Rchw. et Neum. serait synonyme de CRYPTOLOPHA MACKENZIANA, Sharpe, *Ibis*, 1892, p. 153; 1901, p. 91, pl. 3, f. 1 (**905**, p. 286).

350. HYLIA POENSIS, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, 1903, p. 36. — Fernando Po.

351. SUYA WATERSTRADTI, Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 568. — Pahang (Malacca E.)

352. BURNESIA BRUNNEICEPS, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 122. — Rupira (Nyassa).

353. SCOTOCERCA INQUIETA, *var.* BURYI, Grant, *Bull. B. O. C.* XIII, p. 22. — Arabie S.

354. CALAMANTHUS RUBIGINOSUS, Campb., *Victorian Natural.* XVI, p. 3. — Australie N.-W.

355. CISTICOLA LAVENDULÆ, Grant et Reid, *Ibis*, 1901, p. 650. — Somaliland.

356. — ARIDULA, Witherby, *Bull. B. O. C.* XI, p. 13; Rothsch. et Woll., *Ibis*, 1902, p. 16, pl. 1. — Soudan.

294. — NUCHALIS, *var.* AMBIGUA, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XI, p. 28. — Mau (Afrique E. anglaise).

Digitized by Google

357. Cisticola prinioides, Neum., *J. f. O.*, 1900, p. 304. — Mau (Afrique E.)
358. — neumanni, Hart., *Bull. B. O. C.* XII, p. 13; *procera*, Jacks. (nec Pet.) — Kenya.
359. Acanthiza tenuirostris, Zietz, *Tr. R. Soc. S. Austr.* XXIV, p. 112. — Victoria (Australie).
360. — marsterai, North, *Agr. Gaz. N. S. W.* XII, p. 1425. — Australie W.
361. ? Sericornis salvadorii, Rchw, *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 4 = ? *Crateroscelis rufobrunnea*, Roth. et Hart. — Nouv.-Guinée S.-E.
295. Malurus cyaneus, *var.* Elizabethæ, Campb., *Ibis*, 1901, p. 10. — Tasmanie.
362. — assimilis, North, *Victorian Natural.* XVIII, p. 29. — Australie.
363. — edouardi, Camb., *Vict. Nat.* XVII, p. 253. — Australie N.-W.
364. Acrocephalus celebensis, Heinr., *J. f. O.*, 1903, p. 125. — Makassar (Célèbes).
365. — inexpectatus, Berez. et Bianchi, *Ann. Mus. St. Pétersb.* V, p. 210. — Chine W.
366. — vaughani (Sh.); *Tatare vaughani*, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XI, p. 2. — Ile Pitcairn (Pacifique).
**5244**. — *concinnens* (Swinh), *P. Z. S.*, 1870, p. 432 = A. agricola (Jerd.)
367. Lusciniola brevipennis (Verr.), *Nouv. Arch. Mus.*, 1871, *Bull.* VII, p. 65; Dav. et Oust, *Ois. Chine*, p. 245; La Touche, *Ibis*, 1900, p. 51. — Chine centr. et E.
368. — bianchii (Sharpe), *Zool. Rec.*, 1900, *Aves*, p. 54; *davidi*, Ber. et Bianchi, *Ann. Mus. St. Pét.* V, p. 211 (nec Swinh). — Chine W.
**5265**. — abyssinica, Weld-Bl. et Lovat. (nec Grant, *err.*)
369. Cettia bivittata, Finsch, *Notes Leyd. Mus.* XXII, p. 209. — Timor.
296. Sylvia hortensis, *var.* Claræ, Kleinschm., *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 167. — Tunisie.
297. — conspicillata *bella*, Tschusi, *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 130 = conspicillata; Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 318 (note). — Madeire, etc.
**1071**. — atricapilla *obscura*, Tschusi, *l. c.*, p. 129 = *var.* Heinekeni (Jard.)
**5313**. — — *gularis*, Alex., *Ibis*, 1899, pp. 81, 279 = atricapilla (aberr.) — Iles du Cap Vert.
**5317**. *Melizophilus blanfordi* (Seeb.) est un Parisoma (voy. p. 1081 du supplément).
298. Melizophilus melanocephalus, *var.* Leucogastra (Ledru), *Voy. Ténér.*, etc. I p. 182; Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 318. — Iles Canaries.
370. — rothschildi, Madar., *Termes. Fuzetek*, XXIV, p. 351. — Palestine.

Digitized by Google

299. ACANTHOPNEUSTE EVERETTI, *var.* WATERSTRADTI (Hart.), *Nov. Zool.* X, 1903, p. 9 (1). — Batjan et Obi Major.

300. PHYLLOSCOPUS SIBILATRIX, *var.* FLAVESCENS, Erl., *J. f. O.*, 1899, p. 254, pl. 5, f. 1. — Tunisie, Maroc.

**5347.** — RUFUS, *var.* CANARIENSIS (Hartw.), *J. f. O.*, 1886, p. 486; *fortunatus*, Tristr. (1889). — Iles Canaries.

**1076.** REGULUS SATRAPA, *var.* OLIVACEA, Baird au lieu de *olivascens*, Bd.

371. — OBSCURUS, Ridgw., *Bull. U. S. Geol. and Geog. Surv. Terr.* II, n° 2, 1876, p. 184. — Ile Guadalupe (Basse-Californie).

301. POIJOPTILA CÆRULEA, *var.* OBSCURA, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1882, p. 535. — Arizona, Calif., Basse-Calif., Mexique W.

302. — — *var.* MEXICANA, Bp. (**5372**, pt.); Nels., *Auk*, 1898, p. 160. — Mexique S., ? Yucatan.

303. — DUMICOLA, *var.* BERLEPSCHI, Hellm., *Nov. Zool.* VIII, p. 356; *dumicola*, Pelz. (nec V.); *boliviana*, auct. plur. (nec Scl.) — Matto-Grosso.

372. — PLUMBICEPS, Lawr., *Pr. Ac. Sc. Phil.*, 1865, p. 37; Rob. et Richm., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1895, p. 681. — Vénézuéla.

**5379.** — NIGRICEPS, *var.* SCLATERI, Sharpe. — Sta-Marta (Colombie), Vénézuéla N.-W.

304. — — *var.* ANTEOCULARIS, Hellm., *Nov. Zool.* VII, p. 538. — Colombie (Bogota).

305. — — *var.* MAJOR, Hellm., *l. c.* — Pérou.

**5378.** — — *var.* PARVIROSTRIS, Sharpe. — Haut-Amazone.

306. — BUFFONI, *var.* INNOTATA, Hellm., *Nov. Zool.* VIII, p. 359. — Brésil N., Guyane anglaise.

**5397.** ACCENTOR COLLARIS *reiseri*, Tschusi, *Orn. Mon.*, 1901, p. 131 = COLLARIS.

307. — — *var.* CAUCASICA, Tschusi, *l. c.*, 1902, p. 186. — Caucase.

308. ERITHACUS RUBECULA, *var.* MELOPHILA, Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 317. — Iles Britanniques.

**5427.** *Tarsiger guttifer*, Rchw. = ORIENTALIS, Fisch. et Rchw. (**5426**) et remplacé sous le même n° par :

**5427.** TARSIGER INTENSUS, Shpe, *Bull. B. O. C.* XI, 1901, p. 67. — Uganda.

**1097.** RUTICILLA PHOENICURA, *var.* MESOLEUCA (H. et E.) — Asie Min., Arabie E.

309. — — *var.* BONAPARTEI, v. Müll.; (**1097**, pt.); Neum., *J. f. O.*, 1902, p. 133. — Abyssinie.

310. — RUFIVENTRIS, *var.* PLESKEI, Schal., *J. f. O.*, 1901, p. 454; *rufiventris*, pt., auct. plur. (nec V.) — Chine.

311. SIALIA SIALIS, *var.* BERMUDENSIS, Verrill, *Am. J. Sc.* XII, p. 65. — Iles Bermudes.

(1) M. E. Hartert place aujourd'hui l'*A. everetti* et sa variété dans le genre *Cryptolopha* (*Nov. Zool.* X, p. 9, note).



Digitized by Google

312. Sialia mexicana, *var.* Bairdi, Ridgw., *Auk*, 1894, pp. 151, 157. — Montagnes Rocheuses du Mexique.
313. — — *var.* Anabelæ, Anth., *Pr. Cal. Ac. Sc.* 1889, p. 79; Ridgw., *Auk*, 1894, p. 159. — Basse-Californie.
314. Pratincola rubetra, *var.* Spatzi, Erl., *J. f. O.*, 1900, p. 101. — Tunisie.

**986** (Gen.) *Diplootocus*, Hart., *Nov. Zool.* IX, 1902, p. 324 = Pinarochroa.

**5478**. *Saxicola somalica*, Sharpe = S. vittata (H. et E.), juv. (**5497**); Grant, *Ibis*, 1901, p. 658.

**1109**. — *oreophila*, Oberh., *Pr. U. S. Nat. Mus.* XXII, p. 221 = Montana, Gd.
315. Saxicola galtoni, *var.* Lübberti, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 77. — Damaraland.
373. — semenowi, Bianchi et Zar., *Ann. Mus. St. Pétersb.* V, 1900, p. 187. — Perse E.
316. — oenanthe, *var.* Leucorhoa, Gm.; Stejn., *Auk*, 1901, p. 186; (**5495**, pt.) — Groenland, Europe W., Afrique.
317. — *pileata albinotata*, Neum., *J. f. O.*, 1900, p. 313 = pileata; Jacks., *Ibis*, 1901, p. 77.

**1113**. — — *var. Livingstonii*, Tristr. = pileata (Gm.); Jacks., *l. c.*

374. Thamnolæa coronata, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 157. — Togoland.

**5536**. Catharus fuscater (Lafr.), à rectifier l'habitat : — Colombie.

**1119**. — — *var.* Berlepschi, Ridgw. — Ecuador W., Pérou N. et centr.

**5537**. — — *var.* Mentalis, Scl. et Salv. — Bolivie.
318. — — *var.* Hellmayeri, Berl., *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 69; *fuscater*, pt., auct. plur. (nec Lafr.) — Véragua, Costa-Rica.
319. — melpomene, *var.* Costaricensis, Hellm., *J. f. O.*, 1902, p. 45; **5541**, pt. (supprimez : Costa-Rica.) — Costa-Rica.

**1121**. — — *var.* Clara (Gouy). — Mexique W.

**5551**. Merula nigra, Leach.; rectifiez l'habitat : — Europe.
320. — — *var.* Cabreræ (Hart.), *Nov. Zool.* VIII, p. 313. — Canaries, ? Madeire.
321. — — *var.* Mauritanica (Hart.), *l. c.* X, p. 323. — Afrique N. et N.-W.
322. — — *var.* Syriaca (Hemp. et Ehr.), *Symb. Phys.*; Hart., *l. c.* IX, p. 324. — Syrie, Palestine.
323. — fuscatra, *var.* Amoena (Hellm.), *J. f. O.*, 1902, p. 68. — Mendoza.
324. — gigas, *var.* Pallidiventris, Berl., *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 71. — Vénézuéla (Andes).

**1136**. — flavipes, *var. Polionota* (Sharpe) = *var.* Venezuelensis (**1135**). — Vénézuéla, Guyane anglaise, Trinidad.

**1137**. — — *var. Melanopleura*, Sharpe = *var.* Venezuelensis, Sharpe; (**1135**); Hellm., *J. f. O.*, 1902, p. 67.

Digitized by Google

325. TURDUS ILIACUS, *var.* COBURNI, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XII, p. 28. — Islande.

326. — OLIVACEOFUSCUS, *var.* XANTHORHYNCHA, Salvad., *Boll. Mus. Zool. Torino*, XVI, n° 414, 1901, p. 2. — Ile Principe.

327. — — *var.* POENSIS, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, 1903, p. 37. — Fernando Po.

328. — MIGRATORIUS, *var.* ACHRUSTERA, Batch., *Pr. N. Engl. Zool. Club*, I, p. 107; Allen, *Auk*, 1901, p. 178. — Caroline, Géorgie.

**5643.** — GRAYI, Bp. a pour habitat : — Amérique centr.

**1156.** — — *var.* TAMAULIPENSIS, Nels. — Mex.E., Yucatan, Cozumel, Mugeres, Meco.

329. — — *var.* LURIDA, Bp., *C. R.*, 1854, p. 4; (**5643**, pt.) *incompta*, Bangs, *Pr. Biol. Soc. Wash.* V, 1898, p. 144. — Colombie N.-E.

330. — ALBIVENTER, *var.* FUSCA, Bangs, *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1899, p. 107. — Colombie N.-E.

331. — OBSOLETUS, *var.* COLUMBIANA, Hart. et Hellm., *Nov. Zool.* VIII, p. 492. — Colombie W.

332. — PLEBEIUS, *var.* DIFFERENS (Nels.), *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1901, p. 175. — Chiapas S. (Mexique.)

333. — GYMNOPHTHALMUS, *var.* CARRIBÆA, Lawr., *Pr. U.S. Nat. Mus.*, 1878, p. 267 (**5651**, pt.)

334. — TRISTIS, *var.* ASSIMILIS, Cab.; (**5654**, pt.) — Xalapa (Mexique).

335. — MACULIROSTRIS, *var.* AMAUROCHALINA, Cab., *Mus. Hein.* V, p. 5; (**5650**, pt.); *leucomelas*, pt., auct. plur.; *crotopezus*, Burm. (nec Licht.); *albicollis*, Eul. (nec V.); *rufiventris* et *chochi*, D'Orb.; *albiventris*, pt., auct. plur. (nec Spix); Hellm., *J. f. O.*, 1902, p. 58. — Bolivie, Brésil S. et centr., Paraguay, Uruguay, Argentine.

336. — IGNOBILIS, *var.* GOODFELLOWI, Hart. et Hellm., *Nov. Zool.* VIII, p. 492. — Vallée du Cauca (Colombie).

337. — — *var.* DEBILIS, Hellm., *J. f. O.*, 1902, p. 56 (1). — Ecuador E., Pérou, Rio Madeira.

338. — CROTOPEZUS, *var.* CONTEMPTA, Hellm., *l. c.*, p. 61; *crotopezus*, pt, auct. plur. (nec Licht.) — Bolivie, Pérou.

**1161.** — PHÆOPYGUS, *var.* PHÆOPYGOIDES a pour habitat : — Trinidad, Tobago.

339. — MINOR, *var.* FULIGINOSA (Howe), *Auk*, 1900, p. 271. — Terre-Neuve.

340. — SWAINSONI, *var.* ALMÆ, Oberh., *Auk*, 1898, p. 304. — Mexes Roch. des États-Unis, en hiver Mex.

(1) M. C. E. Ellmayr admet trois espèces distinctes : 1° *leucomelas*; 2° *ignobilis* avec ses var. *Goodfellowi*, *debilis* et *murina*; 3° *maculirostris* et sa var. *Amaurochalina* (*J. f. O.*, 1902, pp. 53, 60). Il y a donc lieu de rectifier dans ce sens les nos **1157** et **1158** (p. 401).

Digitized by Google

341. TURDUS SWAINSONI *var.* OËDICA, Oberh., *Auk*, 1899, p. 23. — Californie, Orégon, Arizona, Mexique.
342. — AONALASCHKÆ, *var.* SLEVINI, Grinn., *Auk*, 1901, p. 258. — Californie.
**5661.** — *verecunda*, Osg., *Auk*, 1901, p. 183 = T. AONALASCHKÆ.
343. OREOCINCLA MALAYANA, *var.* AFFINIS, Richm., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1902, p. 158. — Bas-Siam.
**1002** (Gen.) *Ixoreus*, Bp. (1854) = *Hesperocichla*, Bd. = GEOCICHLA, Kuhl.
344. GEOCICHLA GUTTATA, *var.* FISCHERI (Hellm.), *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 54. — Afrique E.
345. — GURNEYI, *var.* KILIMENSIS, Neum., *J. f. O.*, 1901, p. 310. — Kilima Ndjaro.
**1172.** — *peronii*, *var. Audacis*, Hart. = PERONII; Finsch, *Notes Leyd. Mus.* XXII, p. 265. — Timor, Flores, Wetter, Babber, Dammer.
375. — FRONTALIS, Madar., *Termész. Füzetek*, XXII, 1899, p. 111, pl. 8. — Célèbes.
376. — DUMASI, Rothsch., *Ibis*, 1899, p. 309. — Ile Bourou.
346. — NÆVIA, *var.* MERULOIDES (Sw.), *Faun. Bor.-Am.*, p. 187; Grinn., *Auk*, 1901, p. 143; (**5698**, pt.) — Alaska N., en hiver Californie.
347. MYIADECTES OBSCURUS, *var.* OCCIDENTALIS, Stejn., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1881, p. 372. — S.-W. du Mexique et du Guatémala.
348. — — *var.* INSULARIS, Stejn., *l. c.*, p. 373. — Iles Tres Marias.
**5719.** — CORACINUS, Berl.; Goodf., *Ibis*, 1901, p. 311, pl. 8. — Colombie, Ecuador.
377. CALLENE CYORNITHOPSIS, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XII, p. 4; id., *Ibis*, 1902, p. 95, pl. 4, f. 1. — Caméron.
349. — — *var.* ROBERTI, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, 1903, p. 37. — Fernando Po.
378. — POENSIS, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, 1903, p. 37. — Fernando Po.
**1184.** *Cossypha caffra mawensis*, Neum., *J. f. O*, 1900, p. 309 = *var.* IOLÆMA, Rchw.; Jack., *Ibis*, 1901, p. 71.
350. — ALBICAPILLA, *var.* OMOENSIS, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XI, p. 28. — Omo (Afrique équat.)
379. ALETHE POLIOPHRYS, Sharpe, *l. c.* XIII, 1903, p. 10. — Ruwenzori.
351. — POLIOCEPHALA, *var.* ALEXANDRI, Sharpe, *l. c.* XII, 1901, p. 4. — Caméron.
380. — MOORI, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, 1903, p. 37. — Fernando Po.
352. CICHLADUSA GUTTATA, *var.* RUFIPENNIS, Sharpe, *l. c.* XII, 1901, p. 35. — Afrique E. (côtes).
381. — ARCHERI (Sharpe), *l. c.* XIII, 1902, p. 9. — Ruwenzori.
382. ERYTHROPYGIA UKAMBENSIS, Sharpe, *l. c.* XI, p. 28. — Ukambani (Afrique E. anglaise).
383. — GRISEISTRIATA (Sharpe), *l. c.* XIII, p. 8. — Ruwenzori.
**5799.** CITTOCINCLA MACRURUS (Gm.) et ses var. à rectifier l'habitat : — Indo-Chine S., Malacca, Sumatra.
353. — — *var.* TRICOLOR (Vieill.), *N. Dict.* XX, p. 291 (**5799**, pt.) — Inde, Ceylan, Birmanie.

Digitized by Google

| | | |
|---|---|---|
| **1197.** | CITTOCINCLA MACRURUS, *var.* SUAVIS, Scl. | Bornéo. |
| 354. | — — *var.* OMISSA, Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 572. | Java. |
| 355. | — — *var.* MINOR, Swinh. (**5799**, pt.) | Haïnan. |
| 356. | GALEOSCOPTES CAROLINENSIS, *var.* BERMUDIANA, Bangs et Brad., *Auk*, 1901, p. 253. | Bermuda. |
| 357. | MIMUS GILVUS, *var.* MELANOPTERA, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* V, p. 35, pl. 2; *columbianus*, Cab. (**5831**, pt.) | Rio Négro, Colombie, Trinidad. |
| 358. | — — *var.* GRACILIS, Cab., *Mus. Hein.* I, p. 83. | Guatémala, Honduras. |
| 359. | — — *var.* TOBAGENSIS, Dalm., *Mém. Soc. Zool. de France*, 1900, p. 134. | Tobago. |
| 360. | NESOMIMUS MELANOTIS, *var.* DIERYTHRA, Hell., et Snodg., *Condor*, III, p. 74. | Indéfatigable et Seymour (Galapagos). |
| 361. | HARPORHYNCHUS CURVIROSTRIS, *var.* MACULATA, Nels., *Auk*, 1900, p. 269. | Mexique. |
| 362. | RHODINOCICHLA ROSEA, *var.* EXIMIA, Ridgw., *Bull. 50, U. S. Nat. Mus.* 1902, p. 770. | De Panama au Costa-Rica. |
| 363. | CINCLUS AQUATICUS, *var.* OLYMPICA, Madar., *Orn. Monatsb.*, 1903, p. 6. | Chypre. |
| 364. | CAMPYLORHYNCHUS ZONATUS, *var.* RESTRICTA, Nels., *Auk*, 1901, p. 49. | Tabasco (Mexique). |
| **5879.** | — BRUNNEICAPILLUS, *var.* COUESI, Sharpe. | Texas, Mexique. |
| 365. | — — *var.* AFFINIS; Xant. (**5881**, pt.) | Basse-Californie S. |
| **1235.** | — — *var.* BRYANTI (Anth.) | Calif. S., B^se^-Calif. N. |
| 366. | — — *var.* ANTHONI, Mearns, *Auk*, 1902, p. 143. | Ét.-Unis S.-W., Mexique N., B^se^-Calif. N. |
| 367. | ODONTORHYNCHUS BRANICKII, *var.* MINOR, Hart., *Bull. B. O. C.* XI, p. 40. | Ecuador N. |
| 368. | THRYOPHILUS LEUCOTIS, *var.* TÆNIOPTERA, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 518. | Bas-Amazone. |
| 384. | — ALBIPECTUS (Cab.), in *Schomb. Reis. Guian.* III, p. 673. | Guyane, Orénoque. |
| 369. | — — *var.* HYPOLEUCA, Berl. et Hart., *Bull. B. O. C.* XII, p. 12; id., *Nov. Zool.* IX, p. 6. | Orénoque centr. |
| 370. | — — *var.* BOGOTENSIS, Hellm., *Ver. Zool.-Bot. Gesel. Wien*, 1901, p. 774. | Bogota. |
| 371. | THRYOTHORUS FELIX, *var.* GRANDIS, Nels., *Auk*, 1900, p. 269. | Puebla, Morelos, Guerrero. |
| 372. | — AMAZONICUS, *var.* CAURENSIS, Berl. et Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 7. | Caura (Orénoque). |
| 373. | — EUOPHRYS, *var.* GOODFELLOWI, Sclat., *Bull. B. O. C.* IX, p. 47. | Ecuador W. |
| 374. | CISTOTHORUS PALUSTRIS, *var.* DISSAEPTA, Bangs, *Auk*, 1902, p. 352. | États-Unis E., Canada. |
| 375. | — POLYGLOTTUS, *var.* ELEGANS, Scl. (**5939**, pt.). | Amérique centr. |

Digitized by Google

**1277.** Troglodytes domesticus, *var.* Marianæ, Scott. = *var.* Azteca (**1278**).

385. — peninsularis, Nels., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1901, p. 174. — Yucatan N.

376. — musculus, *var.* Clara, Berl. et Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 8. — Guyane anglaise, Orénoque.

377. — solstitialis, *var.* Macroura, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1902, II, p. 55. — Pérou centr.

**1052** (Gen.) *Olbiorchilus*, Oberh., *Auk*, 1902, p. 177 = Anorthura.

**5963.** *Anorthura bergensis*, Stejn., *Zeit. ges. Orn.*, 1884, p. 9 = troglodytes.

378. Anorthura troglodytes, *var.* Cypriotes, Bate, *Bull. B. O. C.* XIII, 1903, p. 51. — Chypre.

379. — hiemalis, *var.* Helleri, Osg., *Auk*, 1901, p. 181. — Ile Kadiak (Alaska).

**5965.** — fumigata (Tem.), à rectifier pour les var. et hab.: — Japon.

**1301.** — — *var.* Kurilensis, Stejn. — Iles Kouriles et Japon.

**1297.** — — *var.* Daurica, Dyb. et Tacz. — Sib.E., Mong., Chine N.

**5966.** — — *var.* Nipalensis (Blyth). — Himalaya, Chine.

380. — — *var.* Talifuensis, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XIII, 1902, p. 11. — Tali-fu (Yunnan).

**5967.** — — *var.* Neglecta (Brooks). — Du Cachemire à Gilgit.

**1295.** — pallescens, Ridgw. est une espèce distincte, d'après Oberh., *Auk*, 1902, p. 178, de même que les deux suivantes :

**1299.** — meligera, Oberh.

**1298.** — alascensis (Baird).

381. Catherpes mexicanus, *var.* Polioptila, Oberh., *Auk*, 1903, p. 197. — Ét.-Unis S.-W., Mex. N.-W., Basse-Calif.

382. — — *var.* Punctulata, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1882, p. 343. — Californie.

386. Microcerculus caurensis, Berl. et Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 5. — Caura (Orénoque).

387. — pectoralis, Rob. et Richm., *Pr. U. S. Nat. Mus.* 1902, p. 178. — Vénézuéla.

1061[bis] (Gen.) Catharopeza, Scl. (1880). *Gen. nov.*

**6003.** — bishopi (Lawr.); Scl., *Ibis*, 1880, pp. 40, 73, pl. 1. — Ile Saint-Vincent.

383. Helminthophaga ruficapilla, *var.* Gutturalis, Ridgw. in Bd., Br. et Ridgw., *H. N. Am. B.* I, p. 191. — États-Unis W.

**1314.** — celata, *var. Obscura*, Ridgw. = H. celata.

**6021.** Parula americana (L.). — Pour habitat : — États-Unis E.

384. — — Ramalinæ, Ridgw., *B. N. and Middle Amer.* II, p. 486 (1902); *americana*, pt. auct. — États-Unis S., Mexique, Guatémala.

385. — pitiayumi, *var.* Speciosa (Ridgw.), *Auk*, 1902, p. 69. — Nicaragua à Chiriqui.

**6026.** Dendroeca æstiva, *var.* Dugesi, Coale.

**6027.** — ruficapilla (Gm.) — Guadeloupe, Dominica.

Digitized by Google

386. Dendroeca ruficapilla, *var.* rufivertex, Ridgw., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1885, p. 21 (**6028**, pt.) — Ile Cozumel (Yucatan).

**1330.** — — *var.* Flavida, Cory.

**6031.** — — *var.* Rufopileata, Ridgw.

**6030.** — — *var.* Capitalis, Lawr.

387. — petechia, *var.* Bartholemica, Sundev., *Ofv. K. Vet.-Ak. Stockh.*, 1870, p. 607; *cruciana*, Sund. (**6027**, pt.) — Porto-Rico et petites Antilles.

**6033.** — erithachorides, Baird (1858) a priorité sur *vieilloti*, Cass. (1860).

388. — — *var.* Castaneiceps, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1885, p. 350. — Mexique W., Amérique centr. W.

**6044.** — gracilæ, *var.* Decora, Ridgw. — Mex.S.,Guat.,Hondur.

**1336.** — *coronota, var. Hooveri*, Mc Greg. = coronota (L.)

**6051.** — auduboni, *var.* Nigrifrons, Brewst. — Arizona, Mexique N.

**6052.** — — *var.* Goldmani, Nels. — Guatémala.

389. — pinus, *var.* Achrustera, Bangs, *Auk*, 1900, p. 292; *bahamensis*, Mayn. (nec Cory). — Nouvelle-Providence (Bahama).

390. — — *var.* Abacoensis, Ridgw., *Auk*, 1902, p. 69. — Abaco (Bahama).

**1340.** Peucedramus olivaceus, *var.* Aurantiaca, Ridgw. = P. olivaceus.

**1070** (Gen.) *Exochocichla*, Van der H. (1852-56) = Henicocichla.

**6068.** Henicocichla nævia (Bodd.); *noveboracensis* (Gm.); a pour habitat : — Amér. N.-E., Antilles, Amer. centr. et N. de l'Amér. mér.

391. — — *var.* Notabilis, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1880, p. 12. — Amér. N.-W., Amér. centr. et Colombie.

**1071** (Gen.) Oporornis. — Ajoutez aux deux espèces de ce genre :

**6087.** — macgillivrayi (Aud.); *tolmiei*, Towns.

**6088.** — philadelphia (Wils.); *agilis*, Wools. (nec Wils).

**1072** (Gen.) Microligea, Cory (1884) au lieu de *Ligea*, Cory (1884, nec Dyb., 1876); *Ligia*, Sharpe (1885, nec Fabr., 1798).

**6072.** Geothlypis trichas (L.); ajoutez à l'habitat : — Canada, Terre-Neuve, Labrad. et îles vois.

392. — — *var.* Modesta, Nels., *Auk*, 1900, p. 269. — Mexique W. et centr.

393. — — *var.* Sinuosa, Grinn., *Condor*, 1901, p. 65. — Baie San-Francisco (Californie).

**6074.** — — *var.* Melanops, Bd.

394. — — *var. Scirpicola*, Grinn., *Cond.*, 1901, p. 65 = *var.* Arizela, Oberh.

395. — rostrata, *var.* Maynardi, Bangs, *Auk*, 1900, p. 290. — Nouvelle-Providence (Bahama).

396. — — *var.* Incompta, Ridgw., *Birds N. and Midd. Am.* II, p. 677. — Abaco (Bahama).

397. — - *var.* Exigua, Ridgw., *l. c.*, p. 677. — Andros (Bahama).

398. — — *var.* Flavida, Ridgw., *l. c.*, p. 678. — Nouv.-Provid. (Bah.)

Digitized by Google

399. Geothlypis semiflava, *var.* Bairdi, Nutt., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1884, p. 398; (**6079**, pl.) — Honduras, Nicaragua E., Costa-Rica.

**6080.** — nelsoni, Richm., *Auk*, 1900, p. 197; *cucullata*, Salv. et God. (nec Lath.) — Mexique.

400. — — *var.* Microrhyncha, Ridgw., *Birds N. and midd. Am.* II, p. 685. — Mexique S.-E.

401. — poliocephala, *var.* Palpebralis, Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 526. — Mexique S.-E.

**1348.** — — *var. Icterotis*, Ridgw. = *var.* Caninucha, Ridgw. — Du Guatémala à Chiriqui.

**1073** (Gen.) *Chamæthlypis*, Ridgw. (1887) = Geothlypis.

402. Basileuterus culicivorus, *var.* Brasheri, Gir. (**6101**, pl.) — Mexique N.

403. — — *var.* Flavescens, Ridgw., *Birds N. and midd. Am.* II, p. 755. — Mexique S.-W.

**6109.** — *conspicillatus*, Salv. et Godm. = cinereicollis, Scl. (**6100**); Allen, *Bull. Am. Mus.* XIII, p. 175.

**6116.** — belli (Gir.), a pour habitat le — S.-E. du Mexique.

404. — — *var.* Scitula, Nels., *Auk*, 1900, p. 268. — Chiapas et Guatémala (Montagnes).

405. — *var.* Clara, Ridgw., *Birds N. and midd. Am.* II, p. 745. — Mexique S.-W.

406. — leucoblepharus, *var.* Cala, Oberh., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1901, p. 188. — Paraguay.

388. ?Myiodioctes microcephalus, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1885, p. 354; *minuta*, Wils. (nec Gm.), *Am. Orn.* VI, p. 62, pl. 50, f. 5; *pumilia*, Nutt. (nec Vieill.) — Pennsylvanie, New-Jersey, Kentucky.

407. — pusillus, *var.* Chryseola, Ridgw., *Birds N. and midd. Am.* II, p. 714. — Colombie anglaise, États-Unis W.

389. Motacilla subpersonata, Mead-Waldo, *Bull. B. O. C.* XII, p. 27. — Maroc.

408. — boarula, *var.* Schmitzi, Tochusi, *Orn. Jahrb.* XI, p. 223. — Ile Madeire.

409. — — *var.* Canariensis, Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 322. — Iles Canaries.

**6184.** Anthus infuscatus (Bl.). — Supprimez la syn. *Kiangsinensis*, Dav. et Oust. qui se rapporte au **6209**.

410. — rufulus, *var.* Camaroonensis, Shell., *B. Afr.* II, p. 320. — Caméron (Montagn.)

**6235.** *Otocorys transcaspica*, Flör. et *iranica*, Zarud. et Härms = O. penicillata.

**1401.** Otocorys penicillata, *var.* Oreodrama, Oberh., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1902, p. 876; *pallida*, Sharpe (pt., nec Dwight.); *diluta*, Sharpe (pt.) — Pamir, Ferghana, Turkestan W.

411. — — *var.* Diluta, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* XIII, p. 670; Oberh., *l. c.*, p. 877. — Turkestan E.

Digitized by Google

412. Otocorys longirostris, *var.* Elwesi (Blanf.), *J. As. Soc. Beng.*, 1872, p. 62; *nigrifrons* et *teleschowi*, Prejw. (**1403**, pt.) — Thibet, Sikhim.

413. — — *var.* Perissa, Oberh., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1902, p. 869. — Ladak (Asie centr.)

414. — — *var.* Argalea, Oberh., *l. c.*, p. 871. — S.-W. du Turkest. or.

415. — alpestris, *var.* Arcticola, Oberh., *l. c.*, p. 816; *leucolæma*, Hensh. (nec Coues). — De l'Alaska aux États-Unis W.

416. — — *var.* Enthymia, Oberh., *l. c.*, p. 817. — Amérique anglaise, en hiver États-Unis.

**1409.** — — *var. Arenicola*, Hensh. = *var.* Leucolæma (**1405**). — États-Unis W.

417. — — *var.* Diaphora, Oberh., *l. c.*, p. 829. — Miquihuana, Tamaulipas (Mexique).

418. — — *var.* Merrilli, Dwight, *Auk*, 1890, p. 153; (**1415**, pt.) — Colombie anglaise S., États-Unis W.

419. — — *var.* Insularis, Towns., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1890, p. 140. — Ile San Clemente (Californie).

**1412.** — — *var.* Chrysolæma (Wagl.); *minor*, Gir. (**1407**, pt.) — Mexique.

420. — — *var.* Actia, Oberh., *l. c.*, p. 845; *rufa*, Audub. (nec Gm.); *rubeus*, Hensh. (pt.); *pallida*, Dw. (pt.) — Californie, N. de la Basse-Californie.

421. — — *var.* Ammophila, Oberh., *l. c.*, p. 849. — Calif. S. E., Mex. N.-W.

422. — — *var.* Occidentalis, Mc Call, *Pr. Ac. N. Sc. Phil.*, 1851, p. 218. — Nouv.-Mex., Arizona, Texas, Mex. N.-E.

**1411.** — — *var.* Adusta, Dw. — Arizona S., Mex. N.

423. — — *var.* Aphrasta, Oberh., *l. c.*, p. 860. — Arizona S.-E., Nouv.-Mexique, Sonora.

424. — — *var.* Leucansiptila, Oberh., *l. c.*, p. 864. — Calif. S., Ariz. S.-W., Basse-Californie.

425. Calandrella pispoletta, *var.* rufescens (Vieill.), *Tabl. Encyc. et Méth.* I, p. 522; Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 525; *tigrina*, M. S., *Mus. Paris*; Puch., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1854, p. 64; *brachydactyla* (err.), auct. plur.; *canariensis*, Hart., *Bull. B. O. C.* XI, p. 64. — Iles Canaries.

1098bis (Gen.) Aëthocorys, Sharpe (*gen. nov.*), *Bull. B. O. C.* XII, p. 62 (1902).

**6254.** — personata (Sharpe).

**6271.** *Mirafra marginata*, Hawk. = M. cantillans, Blyth (**6288**).

390. Mirafra woodwardi, Millig., *Victorian Natural.* XVIII, p. 25. — Australie W.

**1102** (Gen.) *Corydus*, Dress. (1900) = Galerida, Boie.

426. Galerida cristata, *var.* Cyrenaica, Whitak., *Bull. B. O. C.* XIII, 1903, p. 17. — Tripoli.



Digitized by Google

427. Galerida arborea, *var.* Pallida (Zarud.), *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 54. — Transcaspie.
428. Ammomanes cinctura, *var.* Assabensis, Salvad., *Boll. Mus. Zool. Torino*, 1902, n° 425, p. 2. — Assab.
429. — — *var.* Zarudnyi, Hart., *Bull. B. O. C.* XII, p. 43. — Perse E.

391. — heterura, Madar., *Orn. Monatsb.*, 1905, p. 91 (= *zarudnyi*?). — Perse E.

**6306**bis. *Pyrrhulauda harrisoni*, Grt. = signata, Oust. (**6309**), qui est bien une espèce distincte.

392. Pyrrhulauda otoleuca (Tem.), *Pl. Col.* 269, f. 23; Grant, *Bull. B. O. C.* XII, p. 14; *melanocephala*, Licht.; (**6308**, pt.) — Sennaar.

**6308**. — leucotis (Stanl.) a pour hab. : — Afrique N.-E.
430. — — *var.* Madaraszi, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 78. — Afrique E.

**1107** (Gen.) *Penthornis*, Hellm. (1901) = Melanoparus.

**1108** (Gen.) *Sittiparus, Periparus*, de Sélys (1884) et *Proparoides*!, Bianchi (1902) = Parus.
431. Parus major, *var.* Corsa, Kleinschm., *Orn. Monatsb.*, 1903, p. 6. — Corse.
432. — — *var.* Exelsa, Brm.; Buvry, *J. f. O.*, 1856, p. 197. — Afrique N., Espagne, Grèce.
433. — — *var.* Blanfordi, Praz., *Orn. Jahrb.*, 1894, p. 240; *newtoni*, Praz., *l. c.*, p. 239. — Perse, Palestine.
434. — — *var.* Aphrodita, Madar., *Thermes. Fuzetek*, XXIV, p. 272. — Chypre.
435. — afer, *var.* Damarensis, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 77. — Damara.

393. — moltchanovi, Menzb., *Bull. B. O. C.* XIII, 1903, p. 49. — Monts Yaïla (Taurus).

394. — atlas, Meade-Waldo, *Bull. B. O. C.* XII, 1901, p. 27; id., *Ibis*, 1903, p. 207, pl. 6. — Atlas (Maroc).

**6341**. — *kleinschmidti, tschusii* et *italicus*, Hellm. = palustris, L.
436. — palustris, *var.* Korejewi, Zarud. et Härms, *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 54. — Turkestan.

395. — nigriloris, Hellm., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 139. — Iles Liu-Kiu.

396. — stejnegeri, Bangs, *Bull. Mus. Harvard*, XXXVI, p. 237 (1). — Iles Liu-Kiu.
437. — lugubris, *var.* Græca, Reis., *Orn. Jahrb.* XII, p. 216. — Presqu'île des Balcans.
438. — cinctus, *var.* Alascensis, Praz.; (**1498**, pt.) — Alaska.
439. — gambeli, *var.* Thayeri, Birtw., *Auk*, 1901, p. 166. — Albuquerque (Rio-Grande).

(1) Les *P. nigriloris*, Hellm. et *stejnegeri*, Bangs, ne seraient-ils pas une seule et même espèce?

Digitized by Google

440. Parus rufescens, *var.* Neglecta, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1878, p. 485. — Californie (côtes).
441. — — *var.* Barlowi, Grinn., *Condor*, 1900, p. 127; *Auk*, 1981, p. 178. — Californie S.-W.
442. — cæruleus, *var.* Degenera, Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 309; (**1511**, pt.) — Fortaventura et Lanzerota (Canaries).
**1511**. — — *var.* ultramarina (Bp.) — Maroc, Algérie, Tunis.
**1516**. — *pallescens*, Hellm. = *var.* Pleskii, Cab.
443. Lophophanes rufonuchalis, *var.* Poecilopsis, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XIII, 1902, p. 11. — Yun-nan W.
444. — inornatus, *var.* Ridgwayi, Richm., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1902, p. 155; *griseus*, Ridgw. (nec Müll.) — États-Unis centr.
**6372**. Psaltriparus melanotis, *var.* Lloydi, Senn. — Arizona S., Texas W.
**1527**. — *var. Helviventris* (Cab.) = P. melanotis (**6369**).
**1528**. — *var. Santaritæ*, Ridgw. = *var.* Lloydi.
**1526**. — *var.* Plumbea (Baird) est une espèce distincte.
397. Acredula pulchella (Ripp.), *Bull. B. O. C.* XI, 1900, p. 11. — Siam S.
445. — caudata, *var.* Taurica (Menzb.), *Bull. B. O. C.* XIII, p. 49. — Monts Yaïla (Taurus).
446. — tephronota, *var.* Sicula (Whitak.), *l. c.* XI, 1901, p. 52; id., *Ibis*, 1902, p. 54, pl. 2; (**1535**, pt.) — Sicile.
**1115** (Gen.) *Ægithospiza*, Hellm. (1901) = Ægithalus, Boie.
**1117** (Gen.) Aphelocephala, Oberh. (1899) au lieu de *Xerophila*, Gd. (1840, nec Held., 1837).
**1119** (Gen.) *Phyllodytes*, Finsch (nec Wagl., 1830) et *Finschia*, Hutton (1903) = Certhiparus.
447. Chamæa fasciata, *var.* Intermedia, Grinn., *Condor*, 1900, p. 86. — Baie de San Francisco.
1125bis. Scæorhynchus, Oat. (1889); *Suthora*, pt. (Sharpe, 1883); *Heteromorpha*, pt. (**1125**).
**6411**. — gularis (Gray), a pour habitat : — Sikhim, Buthan.
448. — — *var.* Transfluvialis, Hart., *Nov. Zool.* VII, p. 548. — Cachar, Monts Khasia, ? Karennée.
449. — — *var.* Fokiensis (David), *Ann. Sc. Nat.*, 1874, art. n° 9; id. et Oust., *Ois. Chine*, p. 206, pl. 61 (**6411**, pt.) — Fokien (Chine).
**6412**. — ruficeps (Blyth), a pour habitat : — Sikhim, Buthan.
450. — — *var.* Bakeri, Hart., *Nov. Zool.* VII, p. 548. — Cachar, Assam jusqu'au Ténassérim.
398. Suthora craddocki, Bingh., *Bull. B. O. C.* XIII, 1903, p. 54. — Vallée du Mékong.
451. — brunnea, *var.* Styani, Ripp., *l. c.*, p. 54. — Yun-nan.

Digitized by Google

452. Vireo calidris, *var.* Barbadensis, Bd., Br. et Ridgw., *N. Am. B.* I, p. 359; (**6429**, pt.) — Iles Barbades.
453. — olivaceus, *var.* Agilis Licht.), *Verz. Doubl.*, p. 526; Baird, *Rev. Am. B.*, p. 338. — Brésil, Santa-Marta (Colombie).
454. — amauronotus, ? *var.* Strenua, Nels., *Auk*, 1900, p. 268. — Chiapas (Mexique).
455. — noveboracensis, *var.* Perquisitor, Nels., *l. c.*, p. 267. — Vera-Cruz N.
456. — — *var.* Bermudiana, Bangs et Brad., *Auk*, 1901, p. 252. — Iles Bermudes.
457. — — *var.* Flavescens, Ridgw. (**1560**, pt.) — Nassau (Bahama).
**1565**. — huttoni, *var. Insularis*, Rh. = *var.* Obscura (**1564**).
**6459**. Hylophilus thoracicus, Tem., a pour habitat : — Matto Grosso, Amaz.
458. — — *var.* Griseiventris, Berl. et Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 11. — Vénézuéla, Guyane anglaise, Colombie.
**1568**. — pectoralis, Scl., est espèce distincte et a pour habitat : — Matto Grosso, Amaz., Guyane anglaise.
399. — bulunensis, Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 617. — Ecuador N.-W.
400. — brunneus, Allen, *Bull. Am. Mus. N. H.* XIII, p. 171. — Sta-Marta (Colombie).
459. — flavipes, *var.* Acuticauda, Lawr., *Pr. Ac. N. Sc. Philad.*, 1865, p. 37; (**6468**, pt.) — Vénézuéla.
401. Vireolanius bolivianus, Berl., *J. f. O.*, 1901, p. 82. — Bolivie N.-E.
402. Cyclorhis coibæ, Hart., *Bull. B. O. C.* XII, 1901, p. 53. — Ile Coiba (Panama).
460. Pachycephala melanura, *var.* Dahli, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1897, p. 178; (**6498**, pt.) — Archipel Bismarck.
**6543**. — rufinucha, *var.* Gamblei, Rothsch.
403. — morokæ, Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.* X, 1903, p. 107. — Moroka (Nouv.-Guinée anglaise).
**6547**. — hyperythra, *var.* Salvadorii, Rothsch.
404. — johni, Hart., *Nov. Zool.* X, 1903, p. 12. — Ile Obi Major.
461. — leucogastra, *var.* Tianduana, Hart., *Bull. B. O. C.* XI, p. 53. — Tiandu (îles Key).
**6573**. — — *var.* Arctitorquis, Scl.
462. Pachycephalopsis fortis, *var.* Discolor, De Vis, *Rep. on New Guin.*, 1889, *Birds*, p. 3 (**6579**, pt.) — Ile Sudest.
**1600**. Lanius *sibiricus*, *europæus* et *asiaticus*, Bogd. = *var.* Major (**1599**).
463. — elegans, *var.* Hemileucura, Fsch. et Hartl. (**6604**, pt.) — Algérie, Tunisie.
464. — — *var.* Dealbata, De Fil. (**6604**, pt.); *leuconotus*, Brm.; *leucopygus*, H. et Ehr.; *pallens*, Cass.; *grimmi*, Bogd. (**1604**). — S. de l'Algérie et de la Tunisie, Afr. N.-E. Asie centr. jusqu'à l'Amour.
465. — — *var.* Assimilis, Brm., *J. f. O.*, 1854, p. 146. — Afr. N.-E., Asie S.-W.

Digitized by Google

**1605**. LANIUS ELEGANS, *var.* PALLIDIROSTRIS, Cass., *Pr. Ac. Phil.*, 1851, p. 244; *orbitalis*, Licht.; *pallidus*, Ant.; *fallax*, Finsch (**1605**); *dodsoni*, Whitak. (**1602**); *burgi*, Lor. et Hellm. — Afrique N. et N.-E., Palest., Asie S.-W. jusqu'au N.-W. de l'Inde.

405. — LÜBBERTI, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 76. — Damaraland.

**1603**. — LAHTORA (Syk.) est une espèce distincte.

**6606**. — LUDOVICIANUS, L. a pour habitat : — Canada, Ét.-Unis, Mex.

**1607**. — — *var. Excubitoroides*, Sw. = L. LUDOVICIANUS.

**1608**. — — *var. Gambeli*, Ridgw. = L. LUDOVICIANUS.

**1609**. — — *var. Anthonyi*, Mearn. = L. LUDOVICIANUS.

**1610**. — — *var. Migrans*, Palm. = L. LUDOVICIANUS.

**6603**. — *algeriensis kænigi*, Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 309 = L. ALGERIENSIS, Less.

**1602**. — — *var. Dodsoni*, Whit. = *var.* PALLIDIROSTRIS, Cass.

**6609**. — *shalowi*, Böhm. = L. EXCUBITORIUS, Des M.

406. — MARWITZI, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 90. — Ngomingi (Uhehe W.)

**1614** — *subcoronatus*, *var. Capelli* (Boc.) = L. SUBCORONATUS, Smith.

**6623**. — NIGRICEPS (Frankl.) a pour habitat : — Inde, Indo-Chine W.

466. — — *var.* LONGICAUDATA, Gould, *P. Z. S.*, 1859, p. 151. — Siam.

467. — — *var.* NASUTA, Scop., *Del Fl. Faun. Insubr.* II, p. 85; *antiguanus*, Gm. (**6623**, pt.) — Philippines, Bornéo.

**6624**. — *cephalomelas*, Bp. = *var.* NASUTA, Scop.

**1617**. ENNEOCTONUS *isabellinus*, *var. Speculigera* (Tacz.) = E. ISABELLINUS.

**1619**. — — *var. Karelini* (Bogd.) = *var.* PHOENICUROIDES (Severtz.)

**1620**. — — *var. Romanovi* (Bogd.) = *var.* PHOENICUROIDES.

**6630**. — *varius* (Zrdn.), *varia* (err.) = *var.* PHOENICUROIDES.

**1621**. — RUFUS, *var. Rutilans* (Tem.) = L. RUFUS ou POMERANUS (Sparrm.)

**6635**. — *reichenowi* (Shell.); *affinis*, F. et Rchw. = L. COLLURIO (L.)

**6638**. — *elæagni* (Suschk.) = L. BOGDANOWI (Bianchi).

407. — RADDEI (Dress.), *P. Z. S.*, 1888, p. 291; id., *B. Eur.* IX, p. 171, pl. 669; (**6637**, pt.); *infuscatus*, Suschk. — Transcaspie jusqu'au lac Zaïssan.

**6639**. — *dichrourus* (Mensb.) = L. RADDEI (Dress.)

408. — DARWINI (Severtz.), *Tashkent-Zapiski*, I, 1, p. 51 (1879). — Turkestan (1).

409. PTERYTHRIUS TAHANENSIS, Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 576. — Pahang (Malacca E.)

410. ANTICHROMUS POTTERI, Oust., *Bull. Mus. Paris*, 1900, p. 225. — Haut-Nil.

**6667**. MALACONOTUS CRUENTUS, *var.* GABONENSIS, Shell.

**6668**. — *hæmatothorax*, Neum. = *var.* GABONENSIS.

**6670**. — POLIOCEPHALUS, *var.* MONTEIRI (Sharpe).

**6671**. — — *var.* CATHAROXANTHA, Nehm.

**6674**. — — *var.* APPROXIMANS (Cab.) — Afr. E. allem. et angl.

(1) Voy. : Og.-Grant, *A review of Shrikes*, etc. (*Nov. Zool.* IX, pp. 449-486).

Digitized by Google

468. MALACONOTUS POLIOCEPHALUS, *var.* BLANCHOTI, Steph., *Gen. Zool.* XIII, p. 161 ; (**6672**, pl.) — Afrique S. et S.-E. jusqu'au Vict. Nyansa.
469. — — *var.* SCHOANA, Neum., *Orn. Monatsb.*, 1903, p. 89. — Choa.
411. COSMOPHONEUS DOHERTYI (Rothsch.), *Bull. B. O. C.* XI, p. 52 ; Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 633, pl. 9. — Nandi (Afr. E. angl.)
470. LANIARIUS RUFICEPS, *var.* KISMAYENSIS (Erl.), *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 182. — Kismayu (Afrique E.)
**6698.** — — *var.* RUFINUCHALIS (Sharpe).
412. — POENSIS (Alex.), *Bull. B. O. C.* XIII, 1902, p. 37. — Fernando Po.
413. — MURINUS (Rchw.), *Orn. Monatsb*, 1901, p. 101. — Muhanga.
414. DRYOSCOPUS JACKSONI, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XI, p. 37. — Mt Elgon (Afr. équat.)
**6720.** — *atrialatus*, Cass. = MEGABIAS FLAMMULATUS, Verr. (**3934**).
471. RHECTES CIRRHOCEPHALUS, *var.* DOHERTYI (Rothsch. et Hart.), *Nov. Zool.* X, 1903, p. 95. — Ile Ron (baie Geelvink).
415. — MEYERI (Rothsch. et Hart.), *Nov. Zool.* X, 1903, p. 96. — Nouv.-Guinée N.
472. COLLURICINCLA MEGARHYNCHA, *var.* ARUENSIS (Gray), *P. Z. S.*, 1858, pp. 180, 193 ; (**6758**, pl.) — Iles Arou.
**6761.** — — *var.* TAPPENBECKI, Rchw. ; *dissimilis*, Madar., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 2.
473. — — *var.* MADARASZI (Rothsch. et Hart.), *Nov. Zool.* X, p. 100. — Nouv.-Guinée allem.
474. — — *var.* DESPECTA (Rothsch. et Hart.), *l. c.* — Nouv.-Guinée angl.
**6760.** — — *var.* RUFOGASTRA, Gould.
**6762.** — — *var.* AFFINIS (Gray).
**1164** (Gen.) HORIZORHINUS, Oberh., *l. c.*, 1899, p. 216, au lieu de *Cuphopterus*, Hart. (juin 1866, nec Moraw., janv. 1866).
475. PRIONOPS POLIOCEPHALUS, *var.* MARTENSI, Rchw., *Arch. f. Nat.*, 1901, p. 330 ; id., *J. f. O.*, 1902, p. 33. — Caméron E.
416. — MELANOPTERUS, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XI, 1901, p. 46. — Somaliland.
417. — INTERMEDIUS, Sharpe, *l. c.*, p. 47. — Afrique E. angl.
476. CORVUS CORAX, *var.* CANARIENSIS, Hart. et Kleinschm., *Nov. Zool.* VIII, p. 45. — Iles Canaries.
477. — — *var.* HISPANA, Hart. et Kleinschm., *l. c.* — Espagne.
478. — — *var.* LEPTONYX, Pael. ; *tingitanus*, Irby (**6835**). — Algérie, Tun., Maroc.
**6832.** — — *var.* Umbrina, Sundev.
**6833.** — — *var.* RUFICOLLIS, Less.
**6831.** — — *var.* LAWRENCEI, Hume. — De Palestine au N.-W. de l'Inde.
**6846.** — — *var.* EDITHÆ, Phillips. — Somaliland.
479. — — *var.* CLARIONENSIS, Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 381. — Clarion (Galapagos).

Digitized by Google

418. Corvus bennetti, North, *Victorian Natural.*, 1901, p. 170. — Nouv.-Galles du S.

480. — cornix, *var.* Sharpei, Oat., *Faun. Br. Ind.* I, p. 20; Schal., *J. f. O.*, 1901, p. 432. — Sibérie, Afghanistan, Turkestan.

481. — orru, *var.* Insularis, Heinr., *J. f. O.*, 1903, p. 69. — Presq.-Gazelle, Arch. Bism., Waig., Cél.N.

419. — unicolor (Rothsch. et Hart.), *Bull. B. O. C.* XI, p. 29. — Banggai (îles Soula).

**1187** (Gen.) *Eupodoces* et *Pseudopodoces*, Zar. et Loud., *O. M.*, 1902, p. 185 = Podoces, Fisch.

482. Perisoreus obscurus, *var.* Grisea, Ridgw. (**6932**, pt.) — Colombie angl. jusqu'à Californie N.

483. Cyanocitta cristata, *var.* Florincola, Coues, *Key N. A. Birds*, 1884, p. 421. — Floride, Louisiane.

484. — stelleri, *var.* Carbonacea, Grinn., *Condor*, II, p. 127; Allen, *Auk*, 1901, p. 174. — Orégon, Californie (côtes).

485. — — *var.* Carlottæ, Osg., *Bull. U. S. Dep. Agr. Biol.*, n° 51, p. 46. — Ile Reine Charlotte.

486. — — *var.* Borealis, Chapm., *Bull. Am. Mus. N. H.*, 1902, p. 240. — Alaska.

487. Aphelocoma californica, *var.* Immanis, Grinn., *Auk*, 1901, p. 188. — Orégon.

488. — — *var.* Texana, Ridgw., *Auk*, 1902, p. 70. — Texas S.-W.

489. Xanthoura luxuosa, *var.* Speciosa, Nels., *Auk*, 1900, p. 265. — Jalisco W., Sinaloa S., Tepic.

420. Paradisea mirabilis, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 188 (hybride?); *J. f. O.*, 1902, pl. 1. — Nouv.-Guinée allem.

421. Cicinnurus lyogyrus, Curr., *Pr. U. S. Nat. Mus.* XXII, 1900, p. 497, pl. 17, f. 2. — Nouv.-Guinée.

1235bis (Gen.) Loborhamphus, Rothsch. (1901). *Gen. nov.*

— nobilis, Rothsch., *Bull. B. O. C.* XII, 1901, p. 34; id., *Nov. Zool.* X, p. 72, pl. 1. — Nouv.-Guinée allem.

422. Oriolus szalayi (Madar.), *Termes. Fuzetek*, XXIV, p. 76. — Nouv.-Guinée allem.

490. — broderipi, *var.* Oscillans, Hart., *Nov. Zool.* X, p. 32. — Iles Tukang-Besi (Célèbes S.-E.)

**7062.** — — *var.* Bonneratensis, Mey. et Wg.

**7087.** — *meneliki*, Weld-Bl. et Lov. = O. monachus, Gm. (**7085**); Salvad., *Ibis*, 1900, p. 398.

423. Dicrurus kühni, Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 170. — Ténimber.

424. — meeki, Rothsch. et Hart., *l. c.* X, 1903, p. 110. — Guadalcanar (Salom.)

425. — suluensis, Hart., *l. c.* IX, p. 441. — Iles Soulou.

426. — dohertyi, Hart., *l. c.* IX, p. 441. — Obi Major.

491. Dissemurus paradiseus, *var.* Johni, Hart., *l. c.* IX, p. 380. — Haïnan.

427. Aplonis maxwelli, Forb., *Bull. Liverp. Mus.* II, p. 116. — Santa-Cruz (Nouv.-Hébrides).

Digitized by Google

428. Amydrus canolimbatus, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 99. — Afrique E. allem.

**7274.** — (*Pilorhinus*) *hadramauticus*, Hellm., *l.c.*, 1901, p. 30 = A. tristrami, Scl.

429. Lamprocolius chubbi, Alex, *Bull. B. O. C.* XIII, 1903, p. 48. — Fernando Po.

430. — massaicus, Neum., *J. f. O.*, 1900, p. 280. — Massaïland.

492. Zarhynchus wagleri, *var.* Mexicana, Ridgw., *Bull. U. S. Nat. Mus.*, n° 50, II, p. 178. — Mexique S., Guatémala.

**7338.** Cassidix oryzivora (Gm.) a pour habitat : — Amér. mér. de Guyane au Paraguay.

493. — — *var.* Violea, Bangs, *Pr. New Engl. Zool. Cl.*, 1900, p. 11. — Colombie, Panama.

494. — — *var.* Mexicana (Less.), *Traité*, p. 433 ; Bangs, *l. c.* — Mexique S., Amérique centr.

495. Molothrus æneus, *var.* Assimilis, Nels., *Auk*, 1900, p. 266. — Mexique W.

496. — — *var.* Robusta, Cab. (**7341**, pt.) — Mexique.

**1311** (Gen.) *Pseudogelæus*, Ridgw. (1901) = Agelæus.

497. Agelæus phœniceus, *var.* Fortis, Ridgw., *Pr. Wash. Ac. Sc.* III, 1901, p. 153. — États-Unis W.

498. — — *var.* Floridana, Mayn., *B. East. N. Am.*, ed. II, pt. 40, pl. 689. — Floride.

499. — — *var.* Neutralis, Ridgw., *l. c.* — De la Colombie angl. à la Californie.

500. — — *var.* Caurina, Ridgw., *l. c.* — De la Colombie angl. au N. de la Californ.

**1312** (Gen.) *Xanthopsar*, Ridgw. (1901) = Xanthosomus, Cab.

501. Sturnella magna, *var.* Alticola, Nels., *Auk*, 1900, p. 266. — Mexique W.

502. — — *var.* Argutula, Bangs, *Pr. New Engl. Zool. Cl.* I, 1899, p. 28 ; Allen, *Auk*, 1901, p. 174. — Floride.

503. — — *var.* Paralios, Bangs, *Pr. New Engl. Zool. Cl.* II, p. 55. — San Sebastian (Col.)

**7390.** *Pendulinus mexicanus* (Ridgw.), *Pr. Wash. Ac. Sc.*, 1901, p. 151 = P. wagleri (Scl.)

**1844.** — *wagleri*, *var. Castaneopectus* (Brewst.) = P. wagleri.

504. Pendulinus cucullatus, *var.* Sennetti (Ridgw.), *Pr. Wash. Ac. Sc.*, 1901, p. 152. — Rio-Grande (Texas).

505. — — *var.* Duplexa (Nels.), *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1901, p. 172. — Ile Mujeres (Yucatan).

506. — — *var.* Cozumelæ (Nels.), *l. c.* — Ile Cozumel (Yucatan).

507. — mesomelas, *var.* Taczanowskii (Ridgw.), *Pr. Wash. Ac. Sc.* III, 1901, p. 153. — Ecuador W.

508. — — *var.* Salvini (Cass.), *Pr. Ac. Sc. Phil.*, 1867, p. 51. — Nicaragua, Colombie, Vénézuéla.

Digitized by Google

509. PENDULINUS XANTHORNUS, *var.* HELIOEIDES, Clark, *Auk*, 1902, p. 265. — Ile Margarita.

510. ICTERUS VULGARIS, *var.* RIDGWAYI (Hart.), *Nov. Zool.* IX, p. 299. — Aruba, Curaçao.

511. — GULARIS, *var.* TAMAULIPENSIS, Ridgw., *Pr. Wash. Ac. Sc.* III, 1901, p. 152. — Tamaulipas (Mex. E.)

Lisez à la page 559 : Subf. V. — QUISCALINÆ au lieu de *Quisqualinæ*.

512. QUISCALUS MAJOR, *var.* NELSONI, Ridgw., *Pr. Wash. Ac. Sc.*, 1901, p. 151. — Mexique N.-W.

513. — MACRURUS, *var.* OBSCURA, Nels., *Auk*, 1900, p. 267. — Mexique S.-W.

514. — INFLEXIROSTRIS, *var.* MARTINICENSIS, Ridgw., *Pr. Wash. Ac. Sc.*, 1901, p. 151. — Martinique.

**1331** (Gen.) AAPTUS, Richm., *Pr. B. S. W.*, 1902, p. 85, au lieu de *Aphobus*, Cab. (1851, nec Gist., 1848).

515. HYPHANTORNIS VITELLINUS, *var.* ULUENSIS, Neum., *J. f. O.*, 1900, p. 282. — Ulu (Afrique E.)

516. — VELATUS, *var.* FINSCHI (Rchw.), *Orn. Monatsb.*, 1903, p. 23. — Mossamedes.

517. — CABANISI, *var.* LÜBBERTI (Rchw.), *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 77. — Damaraland.

431. — SCHILLINGSI (Rchw.), *l. c.*, 1902, p. 158. — Afrique E. allem.

432. — ORPHNOCEPHALUS (Erl.), *l. c.*, 1903, p. 23. — Somaliland S.

433. SITAGRA ALIENA, Shpe, *Bull. B. O. C.* XIII, 1902, p. 21. — Ruwenzori.

1334bis (Gen.) BRACHYCOPE, Rchw. (1900). *Gen. nov.*

434. — ANOMALA, Rchw., *J. f. O.*, 1900, p. 249. — Afrique E.

435. HETERHYPHANTES ZAPHIROI (Grt.), *Bull. B. O. C.* XIII, p. 22. — Abyssinie S.

436. SYCOBROTUS POENSIS, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, p. 58. — Fernando Po.

518. PLOCEUS BAYA, *var.* MEGARHYNCHA, Hume, *Ibis*, 1869, p. 357 ; Finn, *Ibis*, 1901, p. 32, pl. 1 ; (**7521**, pt.) — Naini Tal (Subhimal.)

519. — — *var.* INFORTUNATA, Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 578. — Birm., Ténass., Malacca, Sumatra.

**7521.** — — *var.* ATRIGULA, Hodgs., a pour habitat : — Inde N.-E., du Bengale au Ténassérim.

**7524.** — RUTLEDGH, Finn = *var.* MEGARHYNCHA.

437. MELANOPTERYX MAXWELLI, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, 1903, p. 54. — Fernando Po.

520. ANAPLECTES MELANOTIS, *var.* RUFIGENA, Shell., *Birds Afr.* II, p. 341. — Nyassaland.

**1349** (Gen.) *Neospiza*, Salvad. = AMBLYOSPIZA, Sundev.

521. AMBLYOSPIZA ÆTHIOPICA, Neum., *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 9. — Ethiopie S.

1353bis (Gen.) ANOMALOSPIZA, Shell., *Bull. B. O. C.* XII, 1901, p. 29. (*Gen. nov.*)

**7899.** — RENDALLI (Tristr.), *Ibis*, 1895, p. 130 (voy. p. 600). — Transvaal.



Digitized by Google

522. Pyromelana franciscana, *var.* Pusilla, Hart., *Bull. B. O. C.* XI, p. 71. — Somaliland.

438. — xanthochlamys, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XIII, 1903, p. 10. — Hoima (Ruwenzori).

523. — taha, *var.* Intercedens, Erl., *Orn. Monatsb.*, 1903, p. 23. — Arrussigallaland.

524. Urobrachya phoenicea, *var.* Quanzæ, Hart., *Bull. B. O. C.* XIII, 1903, p. 56. — Angola.

525. — — *var.* Media, Sharpe, *Ibis*, 1902, p. 118. — Ankole W. (Afr. trop.)

526. Penthietria macrocerca, *var.* Humeralis (Sharpe), *Bull. B. O. C.* XI, p. 57. — Mont Elgon.

527. Hypochæra funerea, *var.* Wilsoni, Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 342. — Niger.

Rectifiez l'habitat des suivants :

**7609.** Hypochæra funerea (De Tar.) — Du Natal au Zambèze.

**7610.** — nigerrima, Sharpe. — De l'Angola au Congo.

528. Nigrita emiliæ, *var.* Dohertyi, Hart., *Bull. B. O. C.* XII, p. 12. — Afrique E. angl.

529. — bicolor, *var.* Brunnescens, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 173. — Caméron, Gabon, île Principe.

530. — — *var.* Saturatior, Rchw., *l. c.* — Haut-Congo, Uwamba.

531. Cryptospiza reichenovi, *var.* Ocularis, Shpe, *Bull. B. O. C.* XIII, p. 8. — Ruwenzori.

532. — — *var.* Elizæ, Alex., *l. c.*, p. 38. — Fernando Po.

439. — shelleyi, Sharpe, *l. c.*, p. 21. — Ruwenzori.

440. — jacksoni, Sharpe, *l. c.*, p. 8. — Ruwenzori.

533. Spermestes nigriceps, *var.* Minor, Erl., *Orn. Monatsb.*, 1903, p. 22. — Somaliland S.

1364bis (Gen.) Nesocharis, Alex. (1903), *Gen. nov.*

441. — shelleyi, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, 1903, p. 48. — Fernando Po.

534. Lagonosticta senegala, *var.* Ruberrima (Rchw.), *Orn. Monatsb.*, 1903, p. 24. — Victoria Niansa.

442. Coccopygia bocagei, Shell., *Bull. B. O. C.* XIII, 1903, p. 56. — Benguela.

**7680.** *Sporæginthus margaritæ*, Weld-Bl. = Estrelda ochrogaster, Salvad. (**7691**); Grt., *Ibis*, 1900, p. 304 (note); Salvad., *l. c.*, p. 399.

535. Estrelda astrild, *var.* Damarensis, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 173. — Damara.

536. — — *var.* angolensis, Rchw., *l. c.* — Angola, Loango.

443. — kandti, Rchw., *l. c.*, p. 184. — Kandt (lac Kiwu).

444. — poliopareia, Rchw., *l. c.*, p. 185. — Congo.

445. — elizæ, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, 1903, p. 54. — Fernando Po.

**7737.** *Aidemosyne orientalis*, Lor. et Hellm., *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 39 = A. cantans (Gm.); Grt., *Ibis*, 1901, pp. 519, 618.

537. Cannabina brevirostris, *var.* Pygmæa (Stol.), *Journ. As. Soc. Beng.*, 1868, pt. 2, p. 62; — Du Turkestan au Pamir.

Digitized by Google

Oberh., *Pr. U. S. Nat. Mus.* XXII, p. 226.

558. CANNABINA LINOTA, *var.* NANA (Tschusi), *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 130. — Madeire.

559. — — *var.* MEADEWALDOI, Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 323; (= *nana?*) — Ténérife (Canaries).

540. CARDUELIS ELEGANS, *var.* PARVA (Tschusi), *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 131. — Madeire.

446. MONTIFRINGILLA KADIAKA (McGreg.), *Condor*, III, n° 1. — Ile Kadiak (Alasca).

447. RHYNCHOSTRUTHUS PERCIVALI, Grt., *Bull. B. O. C.*, 1900, p. 30; Lor. et Hellm., *J. f. O.*, 1901, p. 234. — Arabie S.

541. PETRONIA STULTA, *var.* INTERMEDIA (Hart.), *Nov. Zool.* VIII, p. 324. — Cachemire, Kandahar.

542. PASSER DOMESTICUS, *var.* BURYI, Lor. et Hellm., *J. f. O.*, 1901, p. 233. — Arabie S.

543. — — *var.* RUFIDORSALIS, Brm., *Naumannia*, 1856, p. 376; Witherby, *Ibis*, 1901, p. 246. — Soudan.

**1964.** — HISPANIOLENSIS (Tem.) doit être considéré comme espèce distincte.

544. — — *var.* TRANSCASPICA, Tschusi, *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 96. — Transcaucasie.

545. — — *var.* MALTÆ, Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 332. — Ile de Malte.

546. — ARCUATUS, *var.* DAMARENSIS, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 77. — Damaraland.

547. — DIFFUSUS, *var.* GONGONENSIS (Oust.), *Natural.*, 1890; Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 43. — Gongoni, Witu, Lamu, Nairobe (Afr. E.)

**7875.** — — *var.* SWAINSONI (Rüpp.)

**7877.** — *ammodendri korejewi*, Zar. et Härms, *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 53 = P. AMMODENDRI, Severtz.

**1408** (Gen.) *Pseudostruthus*, Oust. (1890) = PASSER.

**7899.** *Serinus rendalli* (Tristr.) est un Plocéide. (Voy. ANOMALOSPIZA RENDALLI, p. 1107.)

448. SERINUS SHARPEI, Neum., *J. f. O.*, 1900, p. 287. — Kilima Ndjaro.

449. — SIMPLEX, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 184. — Afrique E. allem.

450. — MADARASZI, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 8. — Niassa N.

451. — ROTHSCHILDI, Grant, *Bull. B. O. C.* XIII, 1902, p. 21. — Arabie S.

**1412** (Gen.) *Serinopsis*, Ridgw. (1898) = SYCALIS, Boie.

452. CARPODACUS RIPPONI (Shpe), *Bull. B. O. C.* XIII, p. 11. — Yun-nan W.

548. PYRRHOSPIZA OLIVACEA, *var.* CAMERUNENSIS, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, p. 38. — Caméron.

453. — KILIMENSIS (Rchw. et Neum.), *Orn. Monatsb.*, 1895, p. 74; Neum., *J. f. O.*, 1900, p. 289, pl. 2, f. 3. — Kilima Ndjaro.

**1416** (Gen.) *Hyphantospiza*, Rchw. et Neum. (1895) = PYRRHOSPIZA, Hodgs.

549. LOXIA CURVIROSTRA, *var.* GUILLEMARDI, Madar., *Orn. Monatsb.*, 1903, p. 5. — Ile de Chypre.

**1422** (Gen.) TELESPIZA au lieu de *Telespyza*.

454. PYRRHULA WATERSTRADTI, Hart., *Bull. B. O. C.* XII, p. 69. — Pahang N. (Malac. E.)

Digitized by Google

550. Geospiza strenua, *var.* Pachyrhyncha, Ridgw. (**7972**, pt.) — Ile Tower (Galapagos).

**7973.** — conirostris, *var.* Darwini, R. et H.

551. — fortis, *var.* Platyrhyncha, Hell. et Snod., *Condor*, III, p. 175. — Galapagos.

455. — heliobates, Snodgr. et Hell., *Condor*, III, p. 96. — Albem., Narborough.

456. — harterti, Ridgw., *Bull. U. S. Nat. Mus.*, 1901, p. 507. — Chatham (Galapagos).

552. — scandens, *var.* Brevirostris, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1889, p. 108. — Chatham.

553. — — *var.* Rothschildi, Hell. et Snodgr., *Condor*, III, p. 75. — Bindloe (Galapagos).

554. Hedymeles melanocephalus, *var.* Microrhyncha, Grinn., *Condor*, II, p. 128; Allen, *Auk*, 1901, p. 176. — États-Unis W. (côtes).

**1439** (Gen.) ? *Goniaphea*, Bowd (1825) et *Cyanocompsa*, Cab. (1861) = Guiraca.

555. Guiraca cyanea, *var.* Sterea, Oberh., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1911, p. 188 (1). — Paraguay.

**1141** (Gen.) *Melanospiza*, Ridgw. (dans la syn.) = Melospiza, Baird (Gen. **1177**).

556. Cardinalis ruber, *var.* Somersii, Verrill, *Am. J. Sc.*, 1901, p. 65. — Iles Bahama.

**8093.** — — *var.* Bermudiana, Bangs et Brad.

457. Emberiza yunnanensis, Shpe, *Bull. B. O. C.* XIII, p. 12. — Tali-fu (Yun-nan W.)

557. Fringillaria tahapisi, *var.* Arabica, Lor. et Hellm., *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 55. — Arabie S.

458. — dthalæ, Grant, *Bull. B. O. C.* XII, p. 80. — Dthala (Arabie S.-W.)

459. Zonotrichia macconnelli, Sharpe, *Tr. Linn. Soc. London, Zool.*, 1900, p. 53, pl. 4, f. 1. — Roraima (Guyane anglaise).

558. Amphispiza bilineata, *var.* Pacifica, Nels., *Auk*, 1900, p. 267. — Sonora S., Sinaloa N. (côtes).

559. Passerculus sandwichensis, *var.* Xanthophrys, Grinn., *Condor*, III, p. 21. — Ile Kadiak.

**1176** (Gen.) *Myospiza*, Ridgw. (1898) = Ammodramus, Sw. (et non *Ammodromus*).

560. Ammodramus caudacutus, *var.* Diversa, Bishop, *Auk*, 1901, p. 269. — Ile Roanoke (Carol. N.)

561. — savannarum, *var.* Floridana, Mearns, *Auk*, 1902, p. 915. — Floride.

562. — — *var.* Caribæa, Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 298. — Iles Bonaire et Curaç.

563. Melospiza fasciata, *var. Cleonensis* (Mc Greg.), *Bull. Coop. Orn. Club*, 1899, p. 87; Allen, *Auk*, 1901, p. 175. — Mendocino (Californ.)

564. — — ? *var.* Santæcrucis, Grinn., *Condor*, III, p. 92. — Santa-Cruz (Californ.)

(1) A la p. 613, après le genre 1440, on a repris par erreur le n° 1141 et suivants. Le numérotage des genres est donc à rectifier.

Digitized by Google

565. Melospiza fasciata, *var.* Coronatorum, Grinn. et Dagg., *Auk*, 1903, p. 34. — Ile Coronados (Basse-Californie).

566. — cinerea, *var.* Sanaka, Mc Greg., *Condor*, III, p. 8; Allen, *Auk*, 1901, p. 175. — Ile Sanak (Alaska).

567. Pipilo maculatus, *var.* Falcifer, Mc Greg., *Condor*, II, p. 45; Allen, *Auk*, 1901, p. 176. — Baie San-Francisco (Californie).

460. ?Paroaria humberti, Angel., *Avicula* V, p. 142; *Boll. Soc. Zool. Ital.*, 1901, II, p. 17. — ?

568. Saltator magnoides, *var.* Mediana, Ridgw., *Bull. U. S. Nat. Mus.*, 1901, p. 666. — Guatémala, Costa-Rica.

569. Arremon polionotus, *var.* Callista, Oberh., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1901, p. 188. — Paraguay.

461. Buarremon simonsi, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XI, p. 2. — Loja (Ecuador).

462. — pallidiceps, Sharpe, *l. c.* — Oña (Ecuador).

463. Chlorospingus albitemporalis, *var.* fulvigularis, Berl., *J. f. O.*, 1901, p. 86. — Bolivie E.

570. — ophthalmicus, *var.* Sumichrasti, Ridgw., *Pr. Wash. Ac. Sc.*, 1901, p. 150; id., *Bull. 50, U. S. Nat. Mus.* II, p. 162. — Mexique S.-E.

**1227** (Gen.) *Mitrospingus*, Ridgw. (1898) = Eucometis.

464. Malacothraupis gustavi, Berl., *J. f. O.*, 1901, p. 85. — Bolivie W.

**2226.** Phoenicothraupis salvini, Berl., est une espèce distincte qui a pour habitat : — Mexique S., Guatém., Honduras N.

571. — — *var.* Discolor, Ridgw., *Pr. Wash. Ac. Sc.*, 1901, p. 150. — Hondur. S., Nicarag.

572. — — *var.* Peninsularis, Ridgw., *l. c.*; *salvini* (pt.), Berl. — Yucatan.

573. — rubicoides, *var.* Nelsoni, Ridgw., *Bull. 50, U. S. Nat. Mus.* II, p. 145. — Yucatan.

**8513.** Pyranga flammea, Ridgw., est une var. du P. rubentata, Sw.

574. — roseigularis, *var.* Cozumelæ, Ridgw., *Pr. Wash. Ac. Sc.*, 1901, p. 149. — Ile Cozumel.

**2233.** — *var.* Latifasciata, Ridgw., est une var. du P. erythromelæna, Scl., et non de l'*ardens*.

575. Rhamphocelus dimidiatus, *var.* Isthmica, Ridgw., *Pr. Wash. Ac. Sc.*, 1901, p. 150; id., *Bull. 50, U. S. Nat. Mus.* II, p. 118. — Panama.

576. — — *var.* Limata, Bangs, *Auk*, 1901, p. 31; Ridgw., *l. c.*, p. 119. — Ile San-Miguel (Panama).

**2239.** Spindalis zena, *var. Stejnegeri*, Cory, = S. zena.

**2248.** Buthraupis arcæi, *var.* Cæruleigularis, Cherrie (nec Ridgw., err.)

**1249** (Gen.) Calospiza, Gray (1840), au lieu de *Calliste*, Boie (1826, nec Poli, 1791); *Aglaia*, Sw. (1827, nec Reh., 1804).

**8593.** Calospiza cyanocephala (Müll., nec V.) a priorité sur *festiva* (Shaw).

577. — — *var.* Corallina, Berl., *Orn. Monatsb.*, 1903, p. 18. — Bahia.

Digitized by Google

578. Calospiza florida, *var.* Arcæi, Ridgw., *Pr. Wash. Ac. Sc.*, 1901, p. 149. — Véragua.
579. — pulchra, *var.* Sophiæ, Berl., *J. f. O.*, 1901, p. 83. — Bolivie W.
465. — emiliæ (Dalm.), *Bull. B. O. C.* XI, p. 35; Scl., *Ibis*, 1901, p. 595, pl. 12, f. 1. — Colomb., Ecuad. N.-W.
466. — johannæ (Dalm.), *l. c.*, p. 56; Scl., *l. c.*, pl. 12, f. 2. — Colomb., Ecuad. N.-W.
580. — flaviventris, *var.* Media (Berl. et Hart.), *Nov. Zool.* IX, p. 19. — Orénoque.
Euphonia fulvicrissa, *var.* Purpurascens, Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 570. — Ecuador N.-W.
467. Dicæum kühni, Hart., *Nov. Zool.* X, 1903, p. 28. — Ile Tukang-Besi (Célèbes S.-E.)
468. — arfakianum, Finsch, *Not. Leyd. Mus.* XXII, p. 70. — Mts Arfak (Nouv.-Guin.)
469. — ? sollicitans, Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 52. — Java.
581. Sitta europæa, *var.* Britannica, Hart., *Nov. Zool.* VII, p. 526. — Angleterre, Écosse.
582. — carolinensis, *var.* Nelsoni, Mearns, *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1902, p. 923. — États-Unis S.-W.
583. Certhia familiaris, *var.* Zelotes, Osg., *Auk*, 1901, p. 182. — Orég., Sierra-Nevada.
**2306.** — *rhenana*, Kleinschm. = *var.* Brachydactyla, Brm.
470. — yunnanensis, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XIII, p. 11. — Yun-nan.
**8846.** Remplacez ce qui est sous ce n° par :
**8846.** Climacteris picumnus, Tem., *Pl. Col.* 281, f. 1; Finsch, *Notes Leyd. Mus.* XXIII, p. 60; *scandens*, Gd (nec Tem.), *B. Austr.* IV, pl. 95; *leucophæa*, Gad. (nec Lath.) — Le *Certhia leucophæa*, Lath., se rapporte à un *Meliphaga* qui ne peut être identifié. — Australie N.-E., E. et S.
471. Conirostrum lugens, Berl., *J. f. O.*, 1901, p. 82. — Bolivie E.
**1283** (Gen.) *Iridophanes*, Ridgw. (1901) = Dacnis, Cuv.
584. Arbelorhina cærulea, *var.* Microrhyncha (Berl.), *J. f. O.*, 1884, p. 287; (**8904**, pt.) — Colombie.
585. — — *var.* Cherriei (Berl. et Hart.), *Nov. Zool.* IX, p. 16. — Orénoque.
586. Coereba caboti, *var.* Sharpei (Cory), *Auk*, 1886, p. 497. — Iles Cayman (Antilles).
472. — cerinoclunis, Bangs, *Pr. New-Engl. Zool. Club*, 1901, p. 52. — San-Miguel (Panama).
**8946.** *Hedydipna muelleri* (Lor. et Hellm.) = H. metallica (Licht.)
**8985.** Cinnyris purpureiventris, Rchw., appartient au genre Nectarinia et a pour synonyme *Nect. barakæ*, Shpe, *Bull. B. O. C.* XIII, pp. 8, 50, de — Ruwenzori.
473. Chalcomitra boothii, Rchw., *Orn. Mon.*, 1902, p. 8. — Niassa.
474. — doggetti (Sharpe), *Ibis*, 1902, p. 116. — Ravine (Afr. équat.)

Digitized by Google

475. Cyanomitra poensis, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, p. 38. Fernando-Po.
476. — ursulæ, Alex., *l. c.* Fernando-Po.
587. Cyrtostomus frenata, *var.* Flava (Heinr.), *J. f. O.*, 1903, p. 85. Nouv.-Poméranie.
477. — infrenata (Hart.), *Nov. Zool.* X, p. 29. Ile Tukang-Besi.
**9077.** Anthreptes malaccensis (Scop.) a pour habitat : Ténass., Malac., Sum., Bornéo, Java.
588. — — *var.* Celebensis, Shell., *Monogr. Nect.*, pl. 103, f. 3; (**9077**, pt.) Célèbes.
589. — — *var.* Rhodolæma, Shell., *l. c.*, pl. 101, f. 1; (**9077**, pt.) Malacca, Sumatra.
590. — — *var.* Wiglesworthi, Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 209. Iles Soulou.
591. Arachnothera longirostris, *var.* Prillwitzi, Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 51. Java.
592. — robusta, *var.* Uropygialis, Gray, *Gen. B.* I, pl. 33; Hart., *l. c.*, p. 52; (**9086**, pt.) Java.
**9099.** *Zosterops arabs*, Hellm. = Z. Abyssinica, Guér.
478. Zosterops floridana, Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 180. Ile Florida (Salomon).
593. — senegalensis, *var.* Smithi, Neum., *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 139; *flavilateralis*, Sharpe (nec Rchw.) Somaliland.
479. — kulambangræ, Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 180. Kulambangra (Salom.)
480. — flavissima, Hart., *Nov. Zool.* X, 1903, p. 29. Ile Tukang-Besi.
481. — feæ, Salvad., *Boll. Mus. Zool. Torino*, 1901, n° 414, p. 1; *ficedulina*, Sousa (nec Hartl.) Ile St-Thomé.
482. — brunnea (Salvad.), *Boll. Mus. Zool. Torino*, n° 442, 1903, p. 1; id., *Mem. R. Acc. Sc. Tor.*, 1903, p. 106. Fernando-Po.
483. Myzomela batjanensis, Hart., *Nov. Zool.* X, 1903, p. 56. Batjan.
484. — kuehni, Rothsch., *Bull. B. O. C.* XIII, 1903, p. 42. Ile Wetter.
485. — eichhorni, Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 181. Kulambangra (Salom.)
**9377.** Philemon cineraceus (Bp. ex S. Müll.), *Consp.* I, p. 390; Finsch, *Notes Leyd. Mus.* XXII, p. 272; *kisserensis*, Mey.; *inornatus* (pt.), Gad. (nec Gray); **9376**, pt. Iles Kisser, Letti, Timor.

Il faut à la p. 729 : Fam. Atrichornithidæ au lieu de Atrichiidæ.

**1355** (Gen.) Atrichornis, Stejn. (1885) au lieu de *Atrichia*, Gould (1844, nec Schrank).

Digitized by Google

## COLUMBÆ

486. Sphenocercus medioximus, Bangs, *Bull. Mus. Harvard*, XXXVI, p. 261. — Ile Liu-Kiu.

**9497.** *Ptilopus biroi*, Madar. = P. iozonus, Gr. (**9498**).

594. Ptilopus melanocephalus, *var.* Aurescentior, Hart., *Nov. Zool.* X, 1903, p. 33. — Iles Tukang-Besi, Buton.

595. — — *var.* Talautensis, Hart., *l. c.*, p. 34. — Ile Talaut.

596. Gymnophaps albertisii, *var.* Exsul (Hart.), *l. c.*, p. 60. — Batjan.

597. Columba guinea, *var.* Longipennis, Rchw., *Vög. Afr.* I, p. 402, pl. 2. — Afrique E.

598. — vinacea, *var.* Purpureotincta, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 594 (**9651**, pt.) — Guyane anglaise.

487. — goodsoni, Hart., *Bull. B. O. C.* XII, p. 42. — Ecuador N.-W.

**9664.** Macropygia magna, Wall.

**9665.** — — *var.* Timorlaoensis, Mey.

**9666.** — — *var.* Macassariensis, Wall.

**9669.** — phasianella, *var.* Tenuirostris, Bp.

**2557.** — *amboinensis*, *var. Goldiei*, Salvad. = *var.* Cinereiceps, Tristr. (**2553**).

599. — ruficeps, *var.* Assimilis, Hume (**9672**, pt.)

600. — — *var.* Simalurensis, Richm., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1902, p. 187. — Sumatra W.

601. Reinwardtoenas reinwardti, *var.* Albida, Hart., *Nov. Zool.* VII, p. 240. — Ile Bourou.

602. Zenaidura carolinensis, *var.* Bella (Palm. et Ril.), *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1902, p. 35. — Cuba.

603. Turtur communis, *var.* Gregorjewi, Zarud. et Loud., *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 149. — Beloutchistan.

604. — capicola, *var.* Tropica, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 159. — Afrique E.

488. Gymnopelia morenoi, Shpe, *Bull. B. O. C.* XII, p. 54. — Salta (Argentine).

605. Columbigallina passerina, *var.* Aflavida, Palm. et Ril., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, 1902, p. 33. — Cuba.

606. — rufipennis, *var.* Eluta, Bangs, *Auk*, 1901, p. 258. — Sinaloa (Mexique).

**2591.** Chalcopelia afra, *var.* Chalcospilos (Wagl.) a pour habitat : — Afrique E.

607. — — *var.* Erlangeri, Rchw., *J. f. O.*, 1902, p. 134. — Angola.

608. — — *var.* Volkmanni, Rchw., *l. c.* — Damaraland.

609. — — *var.* Caffra, Rchw., *l. c.* — Afrique S.-E.

610. — — *var.* Abyssinica, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XII, p. 83. — Bogosland.

Digitized by Google

611. Chalcopelia afra, *var.* Delicatula, Sharpe, *l. c.*, p. 84. — Région du Nil Blanc.
612. Haplopelia principalis, *var.* Poensis, Alex., *l. c.* XIII, p. 33. — Fernando-Po.
489. — hypoleuca, Salvad., *Mem. R. Accad. Sc. Torrino*, 1903, p. 96. — Ile Anno-Bom (Afr. W.)
490. Leptoptila battyi, Rothsch., *Bull. B. O. C.* XII, p. 33. — Ile Coiba (Panama).

**9835.** *Goura cinerea*, Hart. = coronata (aberr.); Hart., *Nov. Zool.* VIII, p. 134.
**9832.** Goura cheepmakeri, Finsch, a pour habitat : — Nouv.-Guinée S.-E.
**9830.** — — *var.* Sclateri, Salvad. — Nouv.-Guin. (Riv. Fly et Kataw).
**9834.** — victoria, *var.* Beccarii, Salvad. — N.-Guin. (golfe Huon).

## CRYPTURI

491. Nothoprocta oustaleti, Berl. et Stolzm., *III^e Congrès Orn., C. R.*, p. 191. — Pérou W.
492. — kalinowskii, Berl. et Stolzm., *l. c.*, p. 192. — Pérou central.

## GALLINÆ

**9944.** Megapodius duperreyi, *var.* Forsteni, Gray. — Moluques méridion.
**9945.** — — *var.* Brunneiventris, Mey.
**9946.** — — *var.* Eremita, Hartl.
**9947.** — — *var.* Macgillivrayi, Gray.
**9950.** — freycineti, *var.* Geelvinkianus, Mey.; Hart., *Nov Zool.* VIII, p. 135-138.
**9964.** *Crax sulcirostris*, Goeldi = pinima, Pelz. (fem.)
613. Penelope sclateri, *var.* Plumosa, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1902, II, p. 45. — Pérou central.
614. Rheinardtius ocellatus, *var.* Nigrescens, Rothsch., *Bull. B. O. C.* XII, p. 55. — Ulu Pahang (Malac. E.)
493. Chalcurus inopinatus, Roth., *l. c.* XIII, 1905, p. 41. — Ulu Pahang.
494. Gennæus davisoni, Grt., *Cat. B. B. M.* XXII, p. 304; Oat., *Ibis*, 1903, p. 105; *andersoni*, pt., **10.062.** — Bahmo N.-E.

**10.064.** — *turneri*, Finn., *Journ. As. Soc. Beng.*, 1901, p. 146 = williamsi, Oat. — *crawfurdi*, Hume et Dav. (**10.062**, pt.) = Sharpei, Oat.
495. — nisbetti, Oat., *Ibis*, 1903, p. 99. — Mts Kachin (Birmanie).
496. — jonesi, Oat., *Ibis*, 1903, p. 97. — Siana, Yun-nan.

**10.082.** Phasianus brandti, Rothsch., *Bull. B. O. C.* XII, p. 20, au lieu de *mongolicus*, Brandt (nec Pal.)
**10.084.** — torquatus, Gm., a pour habitat : — Chine S.
615. — — *var.* Mongolicus, Pall. (nec Brandt). — Mong. N.-E., Amour, Corée.



Digitized by Google

616. Phasianus torquatus, *var.* Hagenbecki, Roth, *Bull. B. O. C.* XII, p. 20. — Mongolie N.-W.

497. — berezowskyi, Rothsch., *Bull. B. O. C.* XII, p. 20. — Chine N.-W.

617. Caccabis rufa, *var.* Australis, Tristr. (**10.129**, pl.) — Gr. Canarie, l'Açores.

618. Francolinus coqui, *var.* Angolensis, Roth., *Bull. B. O. C.* XII, p. 76. — Angola.

619. — bicalcaratus, *var.* Thornei, Grant, *Bull. B. O. C.* XIII, p. 22. — Sierra-Leone.

**2724**. *Lophortyx gambeli, var. Fulvipectus,* Nels. = gambeli, Nutt.

620. Lagopus leucurus, *var.* Peninsularis, Chapm., *Bull. Am. Mus. N. H.*, 1902, p. 256. — Mte Kenai (Alaska).

**2760**. — — *var. Altipetens,* Osg. = leucurus, Sw. et Rich.

## ACCIPITRES

621. Pseudogyps africanus, *var.* Schillingsi, Erl., *Orn. Monatsb.*, 1903, p. 22. — Afrique E. allemande.

622. — — *var.* Fülleborni, Erl., *l. c.* — Nyassa, Angola.

623. — — *var.* Zechi, Erl., *l. c.* — Togo (Côte-d'Or).

624. Neophron percnopterus, *var.* Rubripersonata, Zar. et Härms, *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 52. — Beloutchist. persan S.

625. Gymnogenys typicus, *var.* Pectoralis (Shpe), *Bull. B. O. C.* XIII, 1903, p. 50. — Caméron.

626. Astur tachiro, *var.* Nyansæ, Neum., *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 158. — Victoria-Nyansa N. et W.

627. — toussenelii, *var.* Lopezi, Alex., *Bull. B. O. C.* XIII, p. 49. — Fernando-Po.

**2796**. Urospizias *woodfordi* (Sharpe) = albigularis (**10.419**).

498. — rufoschistaceus (Rothsch. et Hart.), *Nov. Zool.* IX, p. 590. — Ile Ysabel (Salomon).

628. — griseigularis, *var.* Obiensis, Hart., *l. c.* X, 1903, p. 3. — Ile Obi.

499. Accipiter sharpei, Rchw., *Vög. Afr.* I, p. 564, pl. 2.

629. — hartlaubi, *var.* Batesi, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XIII, p. 50. — Caméron.

**2836**. *Buteo borealis, var. Lucasana,* Ridgw. = *var.* Calurus (**2834**).

630. — — *var.* Umbrina, Bangs, *Pr. New Engl. Zool. Club,* II, p. 68. — Floride.

631. Falco Feldeggii, *var.* Erlangeri, Kleinschm., *Aquila*, VIII, p. 35, pl. 1, f. 3. — Tunisie.

500. Pseudoptynx solomonensis, Hart., *Bull. B. O. C.* XII, p. 25; id., *Nov. Zool.* IX, p. 591. — Ile Ysabel (Salomon).

Digitized by Google

632. Scops giu, *var.* Cypria, Madar., *Thermes. Fuzet.* XXIV, p. 272. — Chypre.
633. — — *var.* Feæ, Salvad., *Mem. R. Accad. Sc. Torino,* 1903, p. 95. — Ile Anno-Bom (Afr. W.)
634. — brucei, *var.* Semenowi, Zar. et Härms, *Orn. Monatsb.,* 1902, p. 49. — Beloutchistan persan.
635. — menadensis, *var.* Kalidupæ (Hart.), *Nov. Zool.* X, p. 21. — Kalidupa (Célèbes S.)
**2939.** — — *var. Albiventris,* Sharpe = Menadensis (Q. et G.)
501. — holerythra, Sharpe, *Bull. B. O. C.* XII, 1901, p. 3. — Caméron.
502. — balia (Rchw.), *Orn. Monatsb.,* 1903, p. 40. — Caméron.
503. Pulsatrix sharpei, Berl., *Bull. B. O. C.* XII, p. 6; *melanonota* (pt.), auct. plur. (nec Tsch.) — Brésil E.
504. Ciccaba hylophila (Tem.), *Pl. Col.* 373; Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* II, p. 269 (pt.) — Brésil.
505. — albitarsus (Gray), *Cat. Accipitr.,* 1848, p. 103 (nom. nud.); Scl., *Trans. Z. S.* IV, 1862, p. 263, pl. 9; Hart., *Bull. B. O. C.* XII, p. 68; *hylophilum* (pt.), Sharpe, *l. c.* — Colombie, Vénézuéla.
**1638** (Gen.) *Cryptoglaux,* Richm. (1901) = Nyctala, Brm.
636. Nyctala acadica, *var.* Scotæa, Osg., *Bull. U. S. Dep. Agr. Biol.,* n° 21, p. 44. — Ile reine Charlotte.
637. Athene noctua, *var.* Chiaradiæ, Gigl., *Avicula,* IV, 1900, p. 57; id., *Ibis,* 1903, p. 1, pl. 1; (**10.862**, pt.) — Udine (Alpes ital.)
638. Speotyto cunicularia, *var.* Becki, Rothsch. et Hart., *Nov. Zool.* IX, p. 405. — Guadeloupe.
506. Glaucidium albiventer, Alex., *Bull. B. O. C.* XII, p. 10; id., *Ibis,* 1902, p. 371, pl. 9. — Côte-d'Or (Hinterl.)

## HERODIONES

507. Dissoura mortoni, Grant, *Bull. B. O. C.* XIII, p. 26; id., *Ibis,* 1903, p. 146, pl. 5; *episcopus* (pt.), Sharpe. — Sarawak (Bornéo).
639. Ardea herodias, *var.* Fannini, Chapm., *Bull. Amer. Mus.* XIV, p. 87. — Colombie anglaise.

## GRALLATORES

640. Eurypyga major, *var.* Meridionalis, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.,* 1902, II, p. 50. — Pérou central.
508. Ægialitis alticola, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.,* 1902, II, p. 51; *occidentalis* (pt.), Sharpe. — Pérou central.

Digitized by Google

641. Rallus nigricans, *var.* Humilis, Berl. et Stolzm., *l. c.*, p. 48. — Pérou central E.

509. Hypotænidia kuehni, Rothsch., *Bull. B. O. C.* XII, p. 75. — Ile Tukan-Bessi (Cél. S.-E.

**11.427**. Crecisous viridis (Müll., 1776) a priorité sur *cayanensis* (Bodd., 1783).

642. — — *var.* Subrufescens, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1902, II, p. 49. — Pérou central E.

## STEGANOPODES

510. Sula granti, Rothsch., *Bull. B. O. C.* XIII, p. 7; *variegata* (pt.), Grt. — Iles Galapagos.

Digitized by Google

# TABLE ALPHABÉTIQUE DES GENRES


Aaptus, 1107.
*Abdimia* = Ciconia, 905.
Abeillia, 164.
*Abeltera* = Sula, 1011.
*Abrornis* = Gryptolopha, 285.
Aburria, 794.
*Acalanthe* = Erythrura, 583.
Acanthidops, 593.
Acanthidositta, 206.
*Acanthinotus* = Lalage, 302.
*Acanthiparus* = Acredula, 466.
*Acanthis* = Carduelis, 591.
Acanthiza, 366, 1090.
*Acanthochæra* = Anthochæra, 724.
Acanthogenys, 724.
Acanthopneuste, 376, 1091.
Acanthoptila, 322.
Acanthorhynchus, 716
Acanthornis, 367.
*Acanthylis* = Chætura, 127.
Accentor, 381, 1091.
Accipiter, 844, 1116.
*Acentetus* = Taccocua, 58.
Aceros, 102.
Acestrura, 163.
*Acetinornis* = Lagopus, 826.
*Acis* = Pericrocotus, 301.
*Acmonorhynchus* = Prionochilus, 674.
*Acnemis* = Scops, 882.
Acomus, 798.
*Acontistes* = Rhamphocœnus, 176.
*Actia* = Tringa, 950.
*Actidurus* = Bartramia, 949.
Actinodura, 330.
Actitis, 948.
*Actiturus* = Bartramia, 949.
*Actochelidon* = Sterna, 1014.
*Actodromas* = Tringa, 950.
Actophilus, 958.
Acredula, 466, 1101.
*Acridiornis* = Locustella, 370.
Acridotheres, 537.
Acrocephalus, 368, 1090.
*Acrocompsa* = Chlorophonia, 670.
*Acroleptes* = Euphonia, 671.
Acropternis, 168.
*Acrulocercus* = Moho, 727.
Acryllium, 805.
*Ada* = Cuipolegus, 228.
*Adamastor* = Priofinus, 1032.
*Adelarus* = Larus, 1021.
*Adelinus* = Elæocerthia, 702.
*Adelisca* = Adelomyia, 154.
*Adelolarus* = Larus, 1021.
Adelomyia, 154, 1067.
*Adelonetta* = Querquedula, 992.
*Adelura* = Ruticilla, 385.
*Adophoneus* = Sylvia, 374.
*Adornis* = Sylvia, 374.
Æchmophorus, 1042.
*Æchmoptila* = Leptoptila, 768.
*Æchmorhynchus* = Phegornis, 956.
Aëdon, 382.
Aëdonopsis, 412.
Ægialeus, 939.
Ægialitis, 939, 1117.
*Ægialodes* = Totanus, 946.
*Ægialophilus* = Ægialitis, 939.
Ægintha, 583.
*Ægiotus* = Cannabina, 589.
*Ægithaliscus* = Acredula, 466.
*Ægithalopsis* = Parisoma, 273.
Ægithalus, 467.
Ægithina, 341.
*Ægithospiza* = Ægithalus, 1101.
*Ægolius* = Nyctala, 893.
Ægotheles, 116, 1063.
*Ægypius* = Tinnunculus, 870.
*Ægypius* = Vultur, 829.
*Aeipetes* = Thalassoeca, 1033.
Ælurœdus, 522.
Æpypodius, 788.
Aëronautes, 126.
*Aerops* = Merops, 96.
*Æsalon* = Hypotriorchis, 872.
*Æstrelata* = Œstrelata, 1033.


Digitized by Google

*Aetenoides* = Halcyon, 106.
*Æthiops* = Nigrita, 575.
Æthocichla, 330.
Æthocorys, 1099.
Æthomyias, 274.
Æthopyga, 695.
Æthorhynchus, 341.
Aethostoma, 1087.
Æthyia, 996.
*Aetriorchis* = Ibycter, 832.
Æx, 982.
Afrotis, 924.
*Agaclyta* = Psalidoprymna, 158.
*Agamia* = Ardea, 909.
*Aganaphron* = Anous, 1018.
*Aganus* = Trogon, 86.
Agapeta, 149.
Agapornis, 22.
*Agathopus* = Scytalopus, 166.
Aglæus, 553, 1106.
*Agelaioides* = Molothrus, 552.
*Agelaius* = Agelæus, 553.
Agelastes, 804.
*Agelasticus* = Agelæus, 553.
Aglæactis, 152, 1067.
*Aglaia* = Calliste, 665.
Agricola, 288.
*Agrilorhinus* = Diglossa, 685.
*Agriocharis* = Meleagris, 796.
Agrionis, 224.
*Agriospiza* = Cannabina, 589.
*Agripicus* = Geocolaptes, 62.
Agrobates, 374.
*Agrodroma* = Anthus, 445.
*Agromyias* = Diaphorophyia, 265.
*Agrophilus* = Ploceipasser, 569.
Agyrtria, 135, 1065.
*Aibryas* = Bubo, 880.
*Aidemonia* = Cinnyris, 697.
Aidemosyne, 585, 1108.
*Ailurœdus* = Ælurœdus, 522.
*Aimophila* = Hæmophila, 633.
Aithurus, 147, 1066.
*Aix* = Æx, 982.
Ajaja, 905.
*Ajax* = Cinclosoma, 318.
Alæmon, 450.
*Alario* = Crithologus, 599.
Alauda, 454.
*Alaudula* = Calandrella, 453.
Alca, 1042.
Alcedo, 112, 1062.
*Alcemerops* = Nyctiornis, 97.
*Alcidius* = Oreotrochilus, 147.
Alcippe, 345, 1088.
*Alcopus* = Sibia, 324.
Alcurus, 307.
Alcyone, 113, 1062.
*Alcyonides* = Gabalcyorhynchus, 46.
*Alecthelia* = Sarothrura, 969.
*Alecthelia* = Megapodius, 786.
*Alecto* = Textor, 569.
*Alector* = Gallus, 803.
*Alectoris* = Caccabis, 806.
*Alectoræas* = Alectroenas, 742.
*Alectorops* = Phoenicophaës, 59.
Alectroenas, 742.
*Alectrophasis* = Gennæus, 800.
*Alectrornis* = Textor, 569.
*Alectrorura* = Catheturus, 788.
Alectrurus, 228.
*Alectryon* = Acomus, 798.
*Alectura* = Catheturus, 788.
Alethe, 410, 1094.
*Alle* = Mergulus, 1043.
Allocotops, 326.
*Allocoturus* = Henicurus, 449.
*Allotrius* = Pterythrius, 487.
Alopecœnas, 773.
Alophus, 103, 1062.
*Alophoixus* = Criniger, 1085.
*Alophonerpes* = Hemilophus, 81.
Alopochen, 988.
*Alosia* = Panoplites, 152.
*Alsæcus* = Sylvia, 374.
Alsekonax, 264, 1080.
*Alsocomus* = Columba, 748.
*Aluco* = Strix, 898.
*Aluco* = Syrnium, 890.
Amadina, 579.
*Amalusia* = Doricha, 162.
*Amandava* = Sporæginthus, 581.
*Amathusia* = Doricha, 162.
Amatocichla, 406.
*Amauresthes* = Spermestes, 576.
*Amaurocichla* = Crateroscelis, 333.
*Amaurodryas* = Petroeca, 266.
*Amaurolimnas* = Porzana, 967.
Amaurornis, 972.
Amaurospiza, 619.
Amazilia, 138, 1065.
Amazona, 4, 1053.
*Amazonis* = Ceryle, 114.
Amblycercus, 551.
*Amblycorax* = Corvus, 502.
*Amblynura* = Erythura, 583.
Amblyornis, 525.
Amblyospiza, 570, 1107.
*Amblypterus* = Heleothreptus, 120.
Amblyrhamphus, 554.

Digitized by Google

*Amblyrhynchus* = Amblyrhamphus, 554.
*Amelous* = Megapodius, 786.
*Ametrornis* = Phaethornis, 131.
Ammodramus, 631, 1110.
Ammomanes, 458, 1100.
Ammoperdix, 807.
*Ammoptila* = Pluvianus, 930.
Ampeliceps, 540.
Ampelion, 215.
Ampelis, 260.
*Amphibolura* = Phibalura, 215.
Amphispiza, 627, 1110.
Amydrus, 545, 1106.
Amytis, 349.
*Anabasilla* = Margarornis, 191.
*Anabates* = Synallaxis, 197.
*Anabatoides* = Anabatoxenops, 192.
Anabatoxenops, 192.
Anabazenops, 192.
*Anactoria* = Heliangelus, 155.
*Anadænus* = Rhinortha, 59.
Anærretes, 236.
*Anaimos* = Prionochilus, 674.
Analcipus, 528.
Anaplectes, 568, 1107.
Anarhynchus, 942.
Anas, 989.
*Anassus* = Anas, 989.
Anastomus, 906.
Ancistrops, 193.
*Ancylocheilus* = Tringa, 950.
Andigena, 43.
*Andriopsar* = Icterus, 558.
Androdon, 131.
*Androglossa* = Psittacus, 3.
*Androglossus* = Chrysotis, 4.
Andropadus, 313.
Androphilus, 335, 1087.
Anellobia, 724.
*Anepsia* = Ixocincla, 316.
*Angaladiana* = Cinnyris, 697.
*Anhima* = Palamedea, 979.
*Anhinga* = Plotus, 1010.
*Ania* = Œdemia, 999.
*Anisognathus* = Pœcilothraupis, 664.
*Anisoramphos* = Rhynchops, 1020.
*Anisoterus* = Phaethornis, 131.
*Anobapton* = Brachyrhamphus, 1044.
Anodorhynchus, 9.
*Anomalocorax* = Corvus, 502.
*Anomalophrys* = Sarciophorus, 933.
Anomalospiza, 1107.
*Anoplops* = Gymnopithys, 173.
Anorrhinus, 102.
Anorthura, 427, 1096.
Anous, 1018.
Anser, 982.
Anseranas, 979.
*Anserella* = Nettopus, 981.
*Anseria* = Anser, 982.
*Antenor* = Parabuteo, 858.
Anthipes, 294, 1083.
Anthobaphes, 695.
Anthocephala, 146.
Anthochæra, 724.
Anthocincla, 206.
*Anthodiæta* = Anthreptes, 703.
*Anthomiza* = Anthornis, 723.
Anthornis, 723.
Anthoscenus, 1068.
*Anthoscopus* = Ægithalus, 467.
*Anthothreptes* = Anthreptes, 703.
Anthracocerus, 100.
*Anthracothorax* = Lampornis, 145.
Anthreptes, 703, 1113.
*Anthrobaphes* = Anthobaphes, 695.
*Anthropoïdes* = Tetrapteryx, 923.
Anthus, 445, 1098.
Antichromus, 489, 1103.
*Anticorys* = Masius, 220.
*Antigone* = Grus, 921.
Antilophia, 1074.
*Antimimus* = Harporhynchus, 417.
*Antisianus* = Pharomacrus, 85.
Antrostomus, 122, 1063.
Anumbius, 197.
*Anura* = Pnoepyga, 430.
*Anurolimnas* = Porzana, 967.
Anuropsis, 333.
Apalis, 352, 1089.
*Aphalharpactes* = Hapalarpactes, 88.
*Aphalus* = Microparra, 958.
*Aphanolimnas* = Pennula, 969.
Aphantochroa, 134, 1065.
Aphelocephala, 1101.
Aphelocoma, 512, 1105.
Aphobus, 561.
Aphrastura, 1072.
Aphriza, 949.
Aplonis, 541, 1105.
*Aplopelia* = Haplopelia, 768.
*Apobapton* = Brachyrhamphus, 1044.
*Apolites* = Pitangus, 243.
*Aporophantes* = Pendulinus, 556.
Aprosmictus, 20.
Aptenodytes, 1047.
*Apternus* = Tridactylia, 72.
*Apternyx* = Apteryx, 1049.
*Apterodita* = Aptenodytes, 1047.
Apteryx, 1049.

Digitized by Google

*Apus* = Cypselus, 125.
*Aquatilis* = Cinclus, 418.
Aquila, 851.
*Aquilastur* = Eutolmaëtus, 850.
Ara, 10.
*Aracari* = Pteroglossus, 43.
*Arachnechthra* = Cinnyris, 697.
*Arachnocestra* = Arachnothera, 705.
*Arachnophila* = Anthreptes, 703.
*Arachnoraphis* = Arachnothera, 705.
Arachnothera, 705, 1113.
*Araclanga* = Ara, 10.
Aramides, 963.
Aramidopsis, 963.
Aramus, 920.
*Arapunga* = Chasmorhynchus, 219.
*Aratinga* = Conurus, 11.
Arbelorhina, 689, 1112.
Arboricola, 813.
*Arborophila* = Arboricola, 813.
*Arceuthornis* = Turdus, 399.
Archibuteo, 854.
*Archicorax* = Corvultur, 591.
*Archilochus* = Trochilus, 162.
*Archimerops* = Merops, 96.
*Archolestes* = Malaconotus, 489.
*Arctica* = Mergulus, 1043.
*Arctonetta* = Lampronetta, 1000.
Ardea, 909, 1117.
Ardeiralla, 915.
*Ardenna* = Puffinus, 1030.
Ardeola, 913, 1117.
*Ardeomega* = Ardea, 909.
Ardetta, 914.
Arenaria, 949.
*Areortyx* = Turnix, 778.
*Areoturnix* = Turnix, 778.
*Argala* = Leptoptilus, 907.
*Argicus* = Bucco, 46.
*Argurocitta* = Uroleuca, 515.
*Argus* = Argusianus, 795.
*Argusa* = Argusianus, 795.
Argusianus, 795.
*Argusinius* = Argusianus, 795.
Argya, 323, 1086.
*Ariana* = Amazilia, 138.
*Ariana* = Saucerottea, 137.
*Arinia* = Polyerata, 136.
*Aristonetta* = Æthyia, 996.
*Arquatella* = Tringa, 950.
Arremon, 646, 1111.
*Arremonops* = Embernagra, 638.
*Arrenga* = Myiophoneus, 407.
Arses, 288, 1083.
Artamia, 498.
*Artamides* = Graucalus, 295.
Artamus, 533.
Artomyias, 265.
*Arundinaceus* = Acrocephalus, 368.
*Arundinax* = Lusciniola, 371.
Arundinicola, 228.
*Asarcia* = Parra, 958.
Asarcornis, 981.
*Ascalaphia* = Bubo, 880.
*Ascalopax* = Limnocryptes, 955.
*Asilus* = Phylloscopus, 377.
Asio, 877.
*Aspasia* = Heliodoxa, 149.
Aspatha, 95.
*Astacophilus* = Halcyon, 106.
*Asthenes* = Siptornis, 199.
*Asthenurus* = Picumnus, 83.
*Astragalinus* = Chrysomitris, 591.
Astrapia, 519.
*Astrarchia* = Astrapia, 519.
*Astrilda* = Estrelda, 581.
Astur, 839, 1116.
Asturina, 859.
Asturinula, 839.
*Asturisca* = Asturina, 859.
Asyndesmus, 68.
*Atalochrous* = Malimbus, 568.
*Ateleodacnis* = Dacnis, 687.
*Ateleopsar* = Pendulinus, 556.
Atelornis, 92.
Athene, 894, 1117.
Atlapetes, 636.
*Atopornis* = Nigrita, 575.
*Atraphornis* = Scotocerca, 300.
*Atrophornis* = Sylvia, 374.
Atrichia, 729, 1113.
Atrichornis, 1113.
*Atricilla* = Larus, 1021.
*Attagen* = Fregata, 1012.
*Attagen* = Lagopus, 826.
*Attagen* = Francolinus, 807.
Attagis, 780.
Atthis, 163.
Atticora, 257.
Attila, 214, 1074.
*Auchmalea* = Lessonia, 230.
*Audubonia* = Ardea, 909.
Augasma, 1066.
Augastes, 159.
Aulacorhamphus, 44, 1056.
*Aulacorhynchus* = Aulacorhamphus, 44.
*Aulanax* = Sayornis, 227.
Aulia, 213, 1074.
*Aurinia* = Lophornis, 165.
Auriparus, 468.

Digitized by Google

*Auripasser* = Passer, 597.
*Australasia* = Trichoglossus, 30.
AUTOMOLUS, 194, 1072.
*Avicida* = Baza, 866.
*Avocetta* = Recurvirostra, 943.
*Avocettinus* = Avocettula, 145.
*Avocettinus* = Opisthoprora, 156.
AVOCETTULA, 145.
*Aythia* = Æthyia, 996.
BABAX, 320.
*Bæocerca* = Sylviella, 354.
*Bæolophus* = Lophophanes, 465.
*Bæopipo* = Yungipicus, 74.
*Bæopogon* = Xenocichla, 309.
*Bæoscelis* = Eremomela, 355.
*Bahila* = Liothrix, 347.
*Bainopus* = Niltava, 294.
BALÆNICEPS, 909.
*Balbuzardus* = Pandion, 877.
BALEARICA, 923.
*Balicassius* = Dicrurus, 529.
BAMBUSICOLA, 817.
*Bananivorus* = Pendulinus, 556.
*Banksianus* = Calyptorhynchus, 1.
BARBATULA, 37, 1055.
*Barita* = Cracticus, 500.
BARNARDIUS, 25, 1054.
*Barrabandius* = Polytelis, 20.
BARTRAMIA, 949.
*Baruffius* = Oriolus, 525.
*Baryphonus* = Momotus, 94.
BARYPHTHENGUS, 95.
*Basanistes* = Urolestes, 482.
BASILEORNIS, 538.
BASILEUTERUS, 438, 1098.
BASILINNA, 139.
*Basilornis* = Basileornis, 538.
BATARA, 184.
BATHILDA, 585.
*Bathmidura* = Leptasthenura, 201.
*Bathmidurus* = Pachyrhamphus, 212.
BATHMISTRMA, 291.
BATHMOCERCUS, 331, 1086.
*Bathyrhynchus* = Paradoxornis, 470.
BATIS, 264, 1080.
BATRACHOSTOMUS, 116.
*Baucis* = Abeillia, 164.
BAZA, 866.
*Beauharnaisius* = Pteroglossus, 43.
BEBRORNIS, 349.
*Bellatrix* = Lophornis, 165.
*Bellona* = Orthorhynchus, 164.
*Belocercus* = Palæornis, 18.
BELONOPTERUS, 935.
*Belurus* = Palæornis, 18.
*Berenicornis* = Anorrhinus, 102.
BERLEPSCHIA, 196.
*Beruicla* = Branta, 984.
BERNIERIA, 314.
*Bessethera* = Drymocataphus, 334.
BESSONORNIS, 410.
*Bessonornis* = Irania, 383.
*Bessornis* = Bessonornis, 410.
*Bethylus* = Cissopis, 644.
BHIRINGA, 532.
BIAS, 265.
BIATAS, 181.
*Biastes* = Biatas, 181.
*Biblis* = Cotyle, 256.
*Bidens* = Harpagus, 868.
*Biensis* = Rallus, 959.
BIZIURA, 1002.
BLACICUS, 249, 1078.
*Blacops* = Verreauxia, 1059.
*Blagrus* = Haliaëtus, 853.
*Blanfordius* = Suya, 358.
*Blasipus* = Larus, 1021.
*Blax* = Verreauxia, 84.
*Blechropus* = Tænioptera, 225.
*Bleda* = Xenocichla, 309.
*Blepharomerops* = Merops, 96.
BLYTHIPICUS, 77, 1059.
*Bocagia* = Antichromus, 489.
*Boissonneaua* = Panoplites, 152.
*Boissonneauxia* = Panoplites, 152.
BOLBOPSITTACUS, 22.
BOLBORHYNCHUS, 14.
*Bombycilla* = Ampelis, 260.
*Bombycistomas* = Batrachostomus, 116.
*Bombycivora* = Ampelis, 260.
*Bombylonax* = Merops, 96.
BONAPARTIA, 307.
BONASA, 823.
*Boschas* = Anas, 989.
*Boscis* = Pastor, 537.
BOSTRYCHIA, 901.
BOSTRYCHOLOPHUS, 304.
BOTAURUS, 918.
BOURCIERIA, 151.
BOWDLERIA, 337.
*Brachonyx* = Mirafra, 455.
*Brachycex* = Brachygalba, 45.
BRACHYCOPE, 1107.
BRACHYGALBA, 45.
*Brachylophus* = Gecinus, 63.
*Brachyotus* = Asio, 877.
BRACHYPODIUS, 308, 1085.
*Brachyprorus* = Struthidea, 515.
BRACHYPTERACIAS, 92.
*Brachypternopicus* = Brachypternus, 78.



Digitized by Google

BRACHYPTERNUS, 78.
*Brachypterus* = Micrastur, 837.
BRACHYPTERYX, 342, 1087.
*Brachyptrallus* = Tribonyx, 973.
*Brachypus* = Cypselus, 125.
*Brachypus* = Pycnonotus, 305.
*Brachypus* = Rubigula, 308.
BRACHYRHAMPHUS, 1044.
*Brachyspiza* = Zonotrichia, 625.
*Brachystoma* = Struthidea, 515.
*Brachyurus* = Pitta, 207.
*Bradybates* = Hodgsonius, 384.
BRADYORNIS, 287, 1082.
BRADYPTERUS, 359, 1088.
*Bradypterus* = Hodgsonius, 384.
*Brahmapicus* = Brachypternus, 78.
BRANTA, 984.
*Branta* = Netta, 996.
*Breuthus* = Branta, 984.
*Brissonia* = Philepitta, 210.
*Broderipus* = Oriolus, 525.
BROTOGERYS, 15.
*Bruchigavia* = Larus, 1021.
*Brunhilda* = Estrelda, 581.
BUARREMON, 647, 1111.
*Bubalornis* = Textor, 569.
BUBO, 880.
*Bubotus* = Bubo, 880.
BUBULCUS, 913.
*Bubutus* = Rhinortha, 59.
*Bucanetes* = Erythrospiza, 596.
*Buccanodon* = Barbatula, 37.
BUCCO, 46.
*Buccotrogon* = Psilopogon, 40.
*Bucephala* = Clangula, 998.
BUCEROS, 100.
*Bucerotarus* = Rhinoplax, 99.
*Buchanga* = Dicrurus, 529.
*Bucia* = Nyctiornis, 97.
*Bucorax* = Bucorvus, 99.
BUCORVUS, 99.
*Buddinghia* = Philepitta, 210.
*Budytes* = Motacilla, 442.
BUGERANUS, 922.
*Buglodytes* = Campylorhynchus, 419.
*Bulaca* = Syrnium, 890.
*Bulestes* = Cracticus, 500.
BULWERIA, 1036.
BUPHAGA, 519.
*Buphagus* = Megalestris, 1027.
*Buphus* = Ardeola, 913.
BURHINUS, 928.
*Burhynchus* = Rhamphastos, 42.
BURNESIA, 359, 1089.
*Burtonia* = Callacanthis, 593.
BUSARELLUS, 862
*Buscarla* = Emberiza, 620.
*Buserinus* = Serinus, 599.
*Bustamentia* = Catamblyrhynchus, 618.
*Butaëtes* = Archibuteo, 854.
*Butaëtus* = Eutolmaëtus, 850.
BUTALIS, 262, 1079.
*Butaquila* = Buteo, 855.
BUTASTUR, 859.
BUTEO, 855, 1116.
BUTEOGALLUS, 861.
BUTEOLA, 858.
BUTHRAUPIS, 663, 1111.
*Butio* = Gorsachius, 918.
*Butor* = Botaurus, 918.
BUTORIDES, 915.
BUTREON, 732.
BYCANISTES, 101.
*Byrseus* = Loxops, 594.
*Bythoncssa* = Erismatura, 1001.
CABALUS, 962.
*Cabanisia* = Hemipus, 497.
*Cacangelus* = Surniculus, 50.
CACATUA, 2.
CACCABIS, 806, 1116.
*Cachinna* = Herpetotheres, 833.
CACOMANTIS, 52, 1056.
*Cacopitta* = Turdinus, 331.
*Cactocraugus* = Melanerpes, 68.
*Cactornis* = Geospiza, 608.
*Cactospiza* = Geospiza, 608.
*Cælebs* = Fringilla, 589.
CÆNOTRICCUS, 233, 1075.
*Cæsarornis* = Porphyrio, 975.
CAICA, 8.
CAIRINA, 980.
*Calamanthella* = Cisticola, 363.
CALAMANTHUS, 360, 1089.
CALAMOCICHLA, 352, 1089.
*Calamodromus* = Rougetius, 965.
*Calamodus* = Acrocephalus, 368.
*Calamodyta* = Acrocephalus, 368.
*Calamoherpe* = Acrocephalus, 368.
CALAMONASTES, 352, 1089.
*Calamophilus* = Panurus, 469.
CALAMOSPIZA, 625.
*Calandra* = Melanocorypha, 452.
CALANDRELLA, 453, 1099.
*Calandrina* = Melanocorypha, 452.
*Calandritis* = Calandrella, 453.
*Calao* = Rhytidoceros, 101.
CALCARIUS, 625.
CALENDULA, 458.
*Calendulauda* = Alæmon, 450.
*Calherodius* = Nycticorax, 917.

Digitized by Google

Calicalicus, 487.
Calidris, 950.
*Caliparcus* = Podicipes, 1010.
*Calipyga* = Liothrix, 347.
*Calisitta* = Dendrophila, 681.
Callacanthis, 593.
*Callæas* = Glaucopis, 516.
Callæops, 288.
Callene, 408, 1094.
*Callialcyon* = Halcyon, 106.
*Callichelidon* = Tachycineta, 255.
*Callichen* = Netta, 996.
*Callidera* = Chlamydera, 523.
*Callidice* = Panoplites, 152.
Calliechthrus, 50.
*Calligenia* = Helianthea, 150.
*Calliænas* = Calænas, 774.
Calliope, 383.
*Calliornis* = Lamprocorax, 542.
*Calliparæa* = Chlorochrysa, 669.
Callipepla, 818.
*Calliperidia* = Heliomaster, 160.
*Callipharus* = Eupherusa, 144.
Calliphlox, 161.
*Callipicus* = Eleopicus, 75.
*Callipsittacus* = Calopsitta, 3.
*Calliptilus* = Phigys, 30.
*Callirhynchus* = Neorhynchus, 614.
Calliste, 665.
*Callithorax* = Calothorax, 160.
*Callithraupis* = Orthogonys, 658.
Callocephalon, 2.
*Callopsaris* = Pachyrhamphus, 212.
*Callothrus* = Molothrus, 552.
*Calobates* = Motacilla, 442.
Calochætes, 659.
Calocitta, 509.
*Calocitta* = Urocissa, 507.
*Calodera* = Chlamydera, 523.
*Calodromas* = Calopezus, 786.
Calænas, 774.
*Calopelia* = Chalcopelia, 765.
Caloperdix, 814.
*Calopetes* = Daption, 1036.
Calopezus, 786.
*Calophasis* = Phasianus, 801.
*Calopicus* = Chrysophlegma, 67.
Calopsitta, 3.
Calorhamphus, 38.
*Calornis* = Lamprocorax, 542.
Calospiza, 1111.
*Calospiza* = Calliste, 665, 1111.
Calothorax, 160.
*Caturus* = Pharomacrus, 85.
Calvifrons, 1074.
Calypte, 163.
Calyptomena, 204.
*Calyptomenænas* = Drepanoptila, 741.
Calyptophilus, 652.
Calyptorhynchus, 1.
*Calyptrophorus* = Paroaria, 642.
Calyptura, 218.
*Camarophagus* = Tachyphonus, 655.
Camaroptera, 356, 1089.
*Camarhynchus* = Geospiza, 608.
*Campias* = Eleopicus, 75.
*Campicola* = Saxicola, 388.
Campochæra, 299, 1084.
*Camponomus* = Mesopicus, 76.
Campophaga, 300, 1084.
Campophilus, 80, 1059.
Campothera, 65, 1057.
Camptolæmus, 1000.
*Camptolophus* = Cacatua, 2.
*Camptostoma* = Ornithion, 238.
*Campylops* = Diglossa, 685.
Campylopterus, 133.
Campylorhynchus, 419, 1095.
*Canace* = Falcipennis, 825.
*Canachites* = Falcipennis, 825.
*Cancroma* = Cochlearius, 920.
*Cancrophaga* = Halcyon, 106.
Caniballus, 965.
Cannabina, 589, 1108.
*Cannitus* = Tringa, 950.
Capito, 41, 1056.
*Capnopicus* = Eleopicus, 75.
Caprimulgus, 122, 1063.
Capsiempis, 237.
*Caracara* = Polyborus, 832.
*Carbo* = Phalacrocorax, 1006.
*Carbonarius* = Dryocopus, 83.
*Carbonarius* = Phalacrocorax, 1006.
Carcineutes, 110.
Cardellina, 440.
Cardinalis, 619, 1110.
Carduelis, 591, 1109.
*Carenochrous* = Pipilopsis, 648.
Cariama, 924.
*Caricicola* = Acrocephalus, 368.
*Caridagrus* = Halcyon, 106.
*Caridonax* = Monachalcyon, 105.
*Carino* = Cairina, 980.
*Carine* = Athene, 894.
*Carmelita* = Chalcomitra, 701.
*Carnifex* = Micrastur, 837.
*Carphibis* = Ibis, 900.
Carpococcyx, 61.
Carpodacus, 602, 1109.
Carpodectes, 217.

Digitized by Google

CARPOPHAGA, 743-44.
*Carpornis* = Ampelion, 215.
*Carpospiza* = Petronia, 596.
*Carvanaca* = Esacus, 928.
*Caryocatactes* = Nucifraga, 506.
*Caryothraustes* = Pitylus, 643.
CASARCA, 989.
CASIORNIS, 214.
*Casmarhynchos* = Chasmorhynchus, 219.
*Casmerodius* = Herodias, 912.
CASSICULUS, 551.
CASSICUS, 550.
*Cassiculoides* = Pendulinus, 556.
CASSIDIX, 551, 1106.
*Cassidix* = Cranorrhinus, 99.
CASSINIA, 295.
*Castanolimnas* = Rallina, 965.
CASUARIUS, 1050.
CATAMBLYRHYNCHUS, 618.
CATAMENIA, 617.
CATAPONERA, 328.
*Cataractes* = Megalestris, 1027.
*Cataractes* = Uria, 1013.
CATARRHACTES, 1047.
*Catharacta* = Megalestris, 1027.
CATHARISTA, 828.
*Catharistes* = Catharista, 828.
CATHARMA, 161.
CATHAROPEZA, 1096.
CATHARTES, 828.
CATHARUS, 393, 1092.
CATHERPES, 428, 1096.
CATHETURUS, 788.
*Catoptropelicanus* = Pelecanus, 1005.
*Catoptrophus* = Symphemia, 946.
*Catosparactes* = Pagophila, 1026.
CATREUS, 801.
*Catriscus* = Schoenicola, 349.
*Canax* = Jacamaralcyon, 46.
*Cancalias* = Galbula, 45.
*Canecias* = Gabalcyorhynchus, 46.
*Caulodromus* = Rimator, 332.
*Ceblepyris* = Graucalus, 295.
*Cecropis* = Hirundo, 253.
*Celeopicus* = Celeus, 79.
CELEUS, 79.
*Cenchramus* = Meleagris, 796.
*Centrites* = Lessonia, 230.
CENTROCERCUS, 824.
*Centrococcyx* = Centropus, 55.
*Centrolophus* = Bostrycholophus, 304.
*Centronyx* = Passerculus, 631.
*Centropelma* = Podicipes, 1040.
*Centrophanes* = Lessonia, 230.
*Centrophanes* = Calcarius, 625.
CENTROPUS, 55, 1057.
*Centrourus* = Nestor, 27.
CENTURUS, 69, 1057.
CEOPHLŒUS, 82.
*Cephalanius* = Conopias, 242.
*Cephallepis* = Cephalolepis, 164.
CEPHALOLEPIS, 164.
*Cephalophoneus* = Lanius, 483.
CEPHALOPTERUS, 218.
*Cephaloptynx* = Ninox, 887.
*Cephalopyrus* = Ægithalus, 467.
*Cepphus* = Scopus, 909.
*Cepphus* = Uria, 1013.
CERASOPHILA, 1086.
*Ceratoblepharum* = Fratercula, 1046.
CERATOGYMNA, 101.
CERATOPIPRA, 220.
CERATORHYNCHA, 1046.
*Ceratornis* = Tragopan, 797.
*Ceratorrhina* = Ceratorhyncha, 1046.
CERATOTRICCUS, 233.
*Cerchneipicus* = Celeus, 79.
*Cerchneis* = Tinnunculus, 870.
CERCIBIS, 903.
CERCOCOCCYX, 51.
CERCOMACRA, 176, 1069.
CERCOMELA, 391.
*Cerconectes* = Erismatura, 1001.
*Cercophæna* = Chloroxiphia, 222.
*Cercoronus* = Corcorax, 517.
CERCOTRICHAS, 413.
CEREOPSIS, 980.
*Ceriornis* = Tragopan, 797.
*Ceropia* = Turnagra, 329.
*Cerorhina* = Ceratorhyncha, 1046.
*Cerorhinca* = Ceratorhyncha, 1046.
CERTHIA, 683, 1112.
CERTHIDEA, 688.
CERTHILAUDA, 450.
*Certhiola* = Cœreba, 690.
CERTHIONYX, 719.
CERTHIPARUS, 469.
*Cervinipitta* = Pitta, 207.
CERYLE, 114, 1062.
*Cetosparactes* = Pagophila, 1026.
CETTIA, 372, 1090.
CEUTHMOCHARES, 59.
*Ceycis* = Ceyx, 111.
CEYCOPSIS, 111, 1062.
CEYX, 111, 1062.
*Chacura* = Caccalbis, 806.
*Chæmepelia* = Columbigallina, 763.
*Chænorhamphe* = Anastomus, 906.
*Chætoblemma* = Eurocephalus, 494.
CHÆTOCERCUS, 163.

Digitized by Google

Chætops, 320.
Chætoptila, 725.
*Chætopus* = Francolinus, 807.
Chætorhynchus, 531.
Chætornis, 352.
Chætura, 127, 1064.
Chætusia, 936.
*Chaimarrhornis* = Chimarrhornis, 386.
*Chaitaris* = Niltava, 294.
*Chalcites* = Chrysococcyx, 52.
*Chalcococcyx* = Chrysococcyx, 52.
Chalcomitra, 701, 1112.
*Chalcoparia* = Anthreptes, 703.
Chalcopelia, 765, 1114.
*Chalcophanus* = Quiscalus, 559.
Chalcophaps, 766.
*Chalcophasis* = Lophophorus, 797.
*Chalcopsar* = Lamprotornis, 514.
Chalcopsitta, 28.
*Chalcopsittacus* = Chalcopsitta, 28.
*Chalcopterus* = Rhinoptilus, 931.
Chalcostetha, 695.
Chalcostigma, 156.
*Chalcothraupis* = Calliste, 665.
Chalcurus, 795, 1115.
*Chalybeus* = Phonygammus, 517.
Chalybura, 144.
Chamæa, 469, 1101.
Chamæospiza, 635.
Chamæpetes, 794.
*Chamæthlypis* = Geothlypis, 1098.
*Chamætylas* = Geocichla, 404.
Chamæza, 171.
*Chamepelia* = Columbigallina, 763.
Chaptia, 532.
Charadrius, 937.
*Charidhylas* = Xanthopygia, 272.
*Chariessa* = Cœligena, 148.
*Charitonetta* = Clangula, 998.
Charitornis, 544.
Charmosyna, 32, 1055.
*Charmosynopsis* = Charmosyna, 32.
Chasiempis, 270, 1080.
Chasmorhynchus, 219.
*Chatorhæa* = Argya, 323.
Chaulelasmus, 991.
*Chauliodes* = Chaulelasmus, 991.
*Chauliodus* = Chaulelasmus, 991.
Chauna, 979.
Chaunoproctus, 610.
Chaunonotus, 493.
*Chaunornis* = Bucco, 46.
*Chauraria* = Chauna, 979.
*Cheilodromas* = Pluvianus, 930.
*Cheimonea* = Rissa, 1027.
*Chelictinia* = Nauclerus, 863.
*Chelicutia* = Halcyon, 106.
*Chelidis* = Phibalura, 215.
Chelidon, 256, 1079.
Chelidonaria, 1079.
*Chelidonaria* = Chelidon, 256, 1079.
*Chelidonia* = Macropteryx, 130.
Chelidoptera, 49.
*Chelidopteryx* = Nauclerus, 863.
Chelidorhynx, 274.
*Chema* = Xema, 1020.
Chen, 982.
*Chenalopex* = Alca, 1043.
*Chenalopex* = Alopochen, 988.
*Cheniscus* = Lunda, 1046.
*Cheniscus* = Nettopus, 981.
Chenonetta, 986.
Chenopis, 987.
Chenorhamphus, 275.
*Chenorhamphus* = Anastomus, 906.
*Chera* = Diatropura, 573.
Cheramoeca, 258.
*Chersomanes* = Certhilauda, 450.
*Chersophilus* = Certhilauda, 450.
*Chibia* = Dicrurus, 529,
*Chicquera* = Hypotriorchis, 872.
Chimarrhornis, 386.
*Chimerina* = Ceratorhyncha, 1046.
Chionarchus, 780.
Chionis, 780.
*Chionochen* = Chen, 982.
*Chionospiza* = Montifringilla, 594.
Chirocylla, 213.
Chiromachæris, 222.
*Chiroprion* = Chiroxiphia, 222.
Chiroxiphia, 222, 1074.
Chlamydera, 523.
Chlamydochlæra, 299.
*Chlamydochen* = Chenonetta, 986.
*Chlamydodera* = Chlamydera, 523.
*Chlamydæna* = Alectrœnas, 742.
*Chlamydotis* = Houbara, 926.
*Chleuasicus* = Suthora, 470.
*Chloanges* = Chlorostilbon, 141.
*Chloebia* = Poephila, 584.
Chloëphaga, 985.
*Chloëtrophus* = Chloëphaga, 985.
*Chloophaga* = Chloëphaga, 985.
Chlorestes, 140, 1066.
Chloridops, 606.
*Chloris* = Ligurinus, 609.
*Chloris* = Parula, 432.
*Chloroceryle* = Ceryle, 114.
*Chlorocharis* = Zosterops, 705.
Chlorochrysa, 669.

Digitized by Google

CHLOROCICHLA, 313, 1085.
CHLORODREPANIS, 692.
CHLORODYTA, 353, 1089.
*Chloræmas* = Columba, 748.
*Chlorolampis* = Chlorostilbon, 141.
*Chloromyias* = Oreocharis, 674.
CHLORONERPES, 64, 1057.
CHLOROPETA, 274, 1081.
CHLOROPHANES, 689.
CHLOROPHONEUS, 490.
CHLOROPHONIA, 670.
*Chloropicoides* = Tiga, 78.
*Chloropicos* = Chrysophlegma, 67.
*Chloropicus* = Gecinus, 63.
CHLOROPIPO, 219.
*Chloropsaris* = Pachyrhamphus, 212.
CHLOROPSIS, 317, 1086.
*Chloroptila* = Chrysomitris, 591.
*Chloropygia* = Brachypteracias, 92.
*Chlorornis* = Psittospiza, 646.
*Chlorosima* = Cissa, 508.
CHLOROSPINGUS, 650, 1111.
*Chlorospiza* = Ligurinus, 609.
CHLOROSTILBON, 141, 1066.
CHLOROTHRAUPIS, 657.
CHLOROTRERON, 739.
CHLORURA, 584.
*Chlorura* = Atlapetes, 636.
CHOLORNIS, 470.
CHONDESTES, 625.
*Chondrohierax* = Gampsonyx, 864.
CHORDEILES, 118.
CHORIOTIS, 927.
*Choristopus* = Anseranas, 979.
*Chotorhea* = Megalæma, 38.
*Choucaleyon* = Dacelo, 104.
*Chourtka* = Tetraogallus, 806.
*Chroicocephalus* = Larus, 1021.
*Chromatophora* = Cinnyris, 697.
*Chrysauchæna* = Geopelia, 762.
*Chrysobronchus* = Polytmus, 146.
CHRYSOCOCCYX, 52, 1056.
CHRYSOCOLAPTES, 80.
*Chrysocoma* = Catarrhactes, 1047.
CHRYSOENAS, 741.
CHRYSOLAMPIS, 146.
CHRYSOLOPHUS, 803.
*Chrysolophus* = Machetornis, 229.
*Chrysomiros* = Chlorostilbon, 141.
CHRYSOMITRIDOPS, 594.
CHRYSOMITRIS, 591.
*Chrysomma* = Pyctorhis, 340.
*Chrysomus* = Xanthosomus, 553.
*Chrysonotus* = Tiga, 78.
CHRYSOPHLEGMA, 67, 1057.
*Chrysopicos* = Campothera, 65.
*Chrysopicus* = Chloronerpes, 64.
*Chrysopicus* = Chrysoptilus, 66.
*Chrysopoga* = Buarremon, 647.
*Chrysopteryx* = Tijuca, 215.
CHRYSOPTILUS, 66.
*Chrysospiza* = Passer, 597.
*Chrysothraupis* = Calliste, 665.
CHRYSOTIS, 4, 1053.
*Chrysotreron* = Chrysœnas, 741.
*Chrysurisca* = Chrysuronia, 140.
CHRYSURONIA, 140, 1066.
CHTHONICOLA, 366.
*Chunga* = Cariama, 924.
*Chunnia* = Cariama, 924.
*Cia* = Emberiza, 620.
CICCABA, 893, 1117.
*Ciceronia* = Simorhynchus, 1045.
CICHLADUSA, 411, 1094.
*Cichlalopia* = Cichlherminia, 403.
*Cichlalopia* = Rhodinocichla, 418.
CICHLHERMINIA, 403.
*Cichlerminia* = Margarops, 414.
*Cichlocolaptes* = Anabazenops, 192.
*Cichlocolaptes* = Automolus, 194.
*Cichloides* = Merula, 394.
CICHLOPASSER, 406.
*Cichlops* = Anthus, 445.
CICHLOPSIS, 407.
*Cichloselys* = Merula, 394.
CICINNURUS, 519, 1105.
CICONIA, 905.
*Cillurus* = Cinclodes, 202.
*Cinaidium* = Anthus, 445.
*Cinclidia* = Pellorneum, 336.
*Cinclidium* = Callene, 468.
CINCLOCERTHIA, 414.
CINCLODES, 202, 1072.
*Cinclops* = Rhamphocinclus, 414.
CINCLORHAMPHUS, 361.
CINCLOSOMA, 318.
CINCLUS, 418, 1095.
*Cinclus* = Arenaria, 949.
*Cinnamolegus* = Falcinellus, 520
CINNAMOPTERUS, 545.
CINNAMOPTERYX, 561.
CINNICERTHIA, 419.
*Cinnyricinclus* = Anthreptes, 703.
*Cinnyricinclus* = Pholidauges, 541.
CINNYRIS, 697, 1112.
CIRCAËTUS, 833.
*Circe* = Phæoptila, 139.
*Circinnurus* = Cicinnurus, 519.
CIRCUS, 835.
CIRIDOPS, 693.

Digitized by Google

*Cirlus* = Emberiza, 620.
*Cirrepidesmus* = Charadrius, 937.
Cirrhipipra, 220.
*Cirrhocephala* = Larus, 1021.
Cissa, 508.
*Cissomela* = Myzomela, 714.
*Cissolopha* = Cyanolyca, 513.
Cissopis, 614.
*Cissurus* = Pitylus, 643.
Cisticola, 363, 1089.
*Cistodyta* = Cisticola, 363.
Cistothorus, 421, 1095.
*Citrinella* = Chrysomitris, 591.
*Citrinella* = Emberiza, 620.
*Citta* = Cissa, 508.
*Citta* = Pitta, 207.
Cittocincla, 413, 1094.
*Cittocincla* = Cossypha, 409.
Cittura, 105.
Cladorhynchus, 943.
*Cladoscopus* = Dendrexelastes, 188.
*Cladoscopus* = Sphyropicus, 69.
*Cladurus* = Barbatula, 37.
*Clais* = Klais, 164.
*Clamator* = Francolinus, 807.
Clangula, 998.
Claravis, 764.
Claudia, 127.
*Cleptes* = Pica, 506.
Cleptornis, 722.
Clibanornis, 202.
*Climacocercus* = Micrastur, 837.
Climacteris, 684, 1112.
Clitonyx, 469.
Clivicola, 1079.
*Clivicola* = Cotyle, 256, 1079.
*Clorhynchus* = Ibidorhynchus, 944.
*Clotho* = Eupherusa, 144.
*Clupeilarus* = Larus, 1021.
*Clypeata* = Spatula, 995.
Clypeicterus, 549.
Clytoceyx, 104.
Clytoctantes, 180.
Clytolæma, 149.
Clytomyias, 275.
Clytorhynchus, 499.
Clytospiza, 570.
Cnemophilus, 524.
Cnipodectes, 245, 1077.
Cnipolegus, 228.
*Cnipotheres* = Campothera, 65.
*Coccoborus* = Guiraca, 612.
*Coccolarynx* = Melittophagus, 96.
*Coccopsis* = Paroaria, 642.
Coccopygia, 580, 1108.
Coccothraustes, 610.
Coccycolius, 547.
*Coccycua* = Piaya, 58.
*Coccygius* = Coccyzus, 53.
*Coccygon* = Coccyzus, 53.
*Coccygus* = Coccyzus, 53.
Coccystes, 49.
*Coccyzœnas* = Reinwardtœnas, 756.
*Coccyzura* = Macropygia, 754.
Coccyzus, 53, 1056.
*Coccyzusa* = Piaya, 58.
Cochlearius, 920.
*Cochlothraustes* = Coua, 60.
Cochoa, 284.
Cocornis, 609.
*Codonistris* = Grallaria, 169.
Coeligena, 148.
*Coelotreron* = Columba, 748.
*Cœnocorypha* = Gallinago, 952.
Cœreba, 690, 1112.
*Cœreba* = Arbelorhina, 689.
Colæus, 505.
Colaptes, 62, 1057.
*Colaris* = Eurystomus, 93.
*Coleorhamphus* = Chionis, 780.
*Colinia* = Colinus, 820.
Colinus, 820.
*Coliostruthus* = Penthetria, 573.
Colius, 90, 1060.
*Coliuspasser* = Penthetria, 573.
Collocalia, 129, 1064.
Colluricincla, 495, 1104.
*Colluricisoma* = Colluricincla, 495.
*Collurio* = Lanius, 483.
*Colluriocincla* = Colluricincla, 495.
*Collurisoma* = Colluricincla, 495.
*Colobathris* = Grallaria, 169.
*Coloburis* = Pitta, 207.
*Colophimus* = Schizorhis, 90.
*Colopterus* = Colopteryx, 234.
Colopteryx, 234.
*Colorhamphus* = Serphophaga, 235.
Columba, 748, 1114.
Columbigallina, 763, 1114.
*Columbigallus* = Alectrœnas, 742.
*Columbina* = Columbula, 763.
*Columbipicus* = Melanerpes, 68.
Columbula, 763.
*Colymbetes* = Podicipes, 1040.
Colymbus, 1039.
*Comatibis* = Geronticus, 901.
*Comatotis* = Sypheotis, 926.
*Comeris* = Sasia, 85.
*Cometes* = Dicrurus, 529.
*Cometes* = Lesbia, 158.

Digitized by Google

Compsocoma, 663.
*Compsohalieus* = Phalacrocorax, 1006.
*Compsortyx* = Excalfactoria, 816.
Compsospiza, 628.
*Compsothlypis* = Parula, 432.
*Compsotis* = Afrotis, 924.
Conirostrum, 686, 1112.
Conopias, 242.
Conopophaga, 168, 1068.
*Conopophila* = Entomophila, 219.
Conostoma, 470.
Conothraupis, 646.
*Conradinia* = Bourcieria, 151.
Contopus, 248, 1078.
*Conuropsis* = Conurus, 11.
Conurus, 11.
*Cookilaria* = Estrelata, 1033.
Cooperastur, 814.
*Coporhamphus* = Todirhamphus, 110.
*Coprotheres* = Stercorarius, 1027.
*Coprotretis* = Upucerthia, 203.
*Copsichus* = Merula, 394.
Copsychus, 411.
Copurus, 229.
*Coracia* = Fregilus, 516.
Coracias, 92, 1060.
*Coracina* = Graucalus, 295.
*Coracina* = Pyroderus, 218.
*Coraciura* = Coracias, 92.
Coracocichla, 210, 1073.
*Coracopitta* = Coracocichla, 210.
Coracopsis, 4.
*Coragyps* = Catharista, 828.
*Coraphidea* = Calandrella, 453.
*Coraphites* = Pyrrhulauda, 459.
*Corapica* = Cissa, 508.
*Corapipo* = Pipra, 220.
*Corapitta* = Atelornis, 92.
Corcorax, 517.
*Corethrura* = Sarothrura, 969.
*Corethruropsis* = Rallicula, 970
Coriphilus, 30.
*Cormoranus* = Phalacrocorax, 1006.
*Cornopio* = Eurystomus, 93.
*Corone* = Corvus, 502.
*Coronica* = Strepera, 501.
*Coronideus* = Cyanocorax, 513.
*Coronis* = Gymnoderus, 219.
*Corospiza* = Passer, 597.
*Corthylio* = Regulus, 379.
Corvinella, 482.
Corvultur, 501.
Corvus, 502, 1104.
*Corydalla* = Anthus, 445.
*Corydallina* = Calamospiza, 625.
Corydon, 205.
*Corydon* = Melanocorypha, 452.
*Corydonyx* = Centropus, 55.
*Corydospiza* = Phrygilus, 640.
*Corydus* = Galerida, 1099.
*Corylis* = Loriculus, 22.
*Corypha* = Mirafra, 455.
*Coryphegnathus* = Amblyospiza, 570.
Coryphistera, 197.
Coryphœnas, 756.
Coryphospingus, 642.
Coryphospiza, 638.
*Corys* = Galerida, 457.
Corythæola, 90.
*Corythaix* = Turacus, 88.
*Corythaixoides* = Schizorhis, 90.
*Corythocichla* = Turdinulus, 332.
*Corythophilus* = Coriphilus, 30.
Corythopis, 168, 1068.
Corythornis, 113, 1062.
*Corythrix* = Turacus, 88.
*Corythus* = Pinicola, 606.
Coscoroba, 987.
*Cosmærops* = Merops, 96
*Cosmetcira* = Myzomela, 714.
*Cosmetornis* = Macrodipteryx, 120.
*Cosmonessa* = Æx, 982.
*Cosmonessa* = Histrionicus, 999.
*Cosmonetta* = Histrionicus, 999.
*Cosmopelia* = Phaps, 767.
Cosmophoneus, 490, 1104.
Cosmopsarus, 544.
*Cosmurus* = Pharomacrus, 85.
Cossypha, 409, 1094.
*Cossypha* = Irania, 383.
Cotinga, 216.
Coturnicops, 970.
*Coturniculus* = Ammodromus, 631.
Coturnix, 815.
Cotyle, 256, 1079.
Coua, 60.
*Cracticornis* = Numenius, 944.
Cracticus, 500.
*Craniolenca* = Siptornis, 199.
*Cranoceros* = Rhinoplax, 99.
*Cranoperlargus* = Leptoptilus, 907.
Cranorrhinus, 99.
*Craptocephalus* = Ibis, 900.
*Craspedophora* = Ptilorhis, 521.
Craspedoprion, 1077.
*Crataionyx* = Melanichlora, 460.
Crateropus, 329, 1086.
Crateroscelis, 333, 1087.
*Craugasus* = Chloronerpes, 64.
*Craugiscus* = Picumnus, 83.

Digitized by Google

Crax, 789, 1115.
*Craxirex* = Buteo, 855.
Creadion, 516.
*Creadion* = Antochæra, 724.
*Creagrius* = Gallus, 803.
*Creagrus* = Xema, 1020.
Creciscus, 971, 1118.
*Crecopsis* = Crex, 966.
Creurgops, 655.
*Creurgus* = Tephrodornis, 493.
Crex, 966.
Criniger, 310, 1085.
*Criniger* = Chlorocichla, 313.
*Crinis* = Chrysolampis, 1066.
*Crinis* = Lampornis, 145.
*Crithagra* = Serinus, 599
Crithologus, 599.
*Crithophaga* = Miliaria, 623.
*Crocias* = Laniellus, 483.
*Crocomorphus* = Celeus, 79.
Crocopsis, 306.
Crocopus, 732.
*Crombus* = Leptosoma, 91.
Crossleyia, 338.
*Crossodera* = Psarisomus, 205.
*Crossolaryngus* = Crax, 789.
*Crossophthalmus* = Columba, 748.
Crossoptilon, 799.
Crotophaga, 62.
*Crucirostra* = Loxia, 604.
*Crymonessa* = Harelda, 999.
Crymophilus, 956.
Cryptsirhina, 508.
*Crypticus* = Prionirhynchus, 94.
Cryptillas, 1088.
*Cryptoglaux* = Nyctala, 1117.
Cryptolopha, 285, 1082.
*Cryptolopha* = Culicicapa, 282.
*Cryptonyx* = Rollulus, 815.
Cryptophaps, 746.
Cryptorhina, 507.
Cryptospiza, 576, 1108.
*Cryptura* = Tinamus, 781.
Cryptures, 782, 1056.
*Ctenoglaux* = Ninox, 887.
*Ctenorhynchus* = Chaulelasmus, 991.
Cuculus, 51, 1056.
*Cucupicus* = Colaptes, 62.
*Cucupicus* = Trachyphonus, 40.
*Cuiparchus* = Campephilus, 80.
Culicicapa, 282.
*Culicipeta* = Cryptolopha, 285.
Culicivora, 235.
*Cultrides* = Neomorphus, 61.
*Cultrunguis* = Ketupa, 879.
Cumana, 793.
*Cncuman* = Haliaëtus, 853.
Cuphopterus, 496.
*Cupidonia* = Tympanuchus, 824.
Curleus, 555.
*Cureus* = Coccyzus, 53.
*Curotreron* = Ptilopus, 735.
*Curruca* = Pratincola, 387.
*Curruca* = Sylvia, 374.
*Cursor* = Cursorius, 930.
Cursorius, 930.
*Curucujus* = Trogon, 86.
*Curvirostra* = Loxia, 604.
Cutia, 348, 1088.
*Cyanalcyon* = Halcyon, 106.
Cyanecula, 383.
*Cyanerpes* = Arbelorhina, 689.
*Cyanicterus* = Orthogonys, 658.
*Cyanistes* = Parus, 461.
*Cyanocephalus* = Gymnokitta, 515.
Cyanochen, 986.
*Cyanochloris* = Chalybura, 144.
*Cyanocincla* = Monticola, 392.
Cyanocitta, 511, 1105.
*Cyanocitta* = Cyanolyca, 513.
*Cyanocompsa* = Guiraca, 1110.
Cyanocorax, 513.
*Cyanodacnis* = Dacnis, 687.
Cyanoderma, 342, 1088.
*Cyanodiglossa* = Diglossa, 685.
*Cyanogarrulus* = Cyanocitta, 511.
*Cyanograucalus* = Graucalus, 295.
*Cyanolanius* = Artamia, 498.
Cyanolesbia, 157.
*Cyanolestes* = Artamia, 498.
*Cyanoliseus* = Conurus, 11.
Cyanolyca, 513.
Cyanomitra, 702, 1112.
Cyanomyia, 138.
*Cyanomyias* = Hypothymis, 274.
Cyanophaia, 137.
*Cyanophonia* = Euphonia, 671.
Cyanopica, 507.
*Cyanopitta* = Pitta, 207.
*Cyanopolius* = Cyanopica, 507.
*Cyanops* = Megalæma, 38.
*Cyanopsitta* = Anodorhynchus, 9.
*Cyanopsittaceus* = Anodorhynchus, 9.
*Cyanopterus* = Querquedula, 992.
Cyanoptila, 272.
Cyanorhamphus, 26.
Cyanospiza, 626.
*Cyanothrus* = Molothrus, 552.
Cyanotis, 236.
Cyanotreron, 738.



Digitized by Google

*Cyanura* = Cyanocitta, 511.
*Cyanurus* = Calocitta, 509.
CYBERNETES, 228.
CYCLOPSITTA, 33.
*Cyclopsittacus* = Cyclopsitta, 33.
*Cyclopterops* = Zosterops, 705.
CYCLORHIS, 475, 1102.
*Cyclorhynchus* = Rhynchocyclus, 242.
*Cyclorhynchus* = Phaleris, 1046.
CYGNOPSIS, 984.
CYGNUS, 986.
*Cymatobulus* = Majaqueus, 1033.
CYMBILANIUS, 185.
*Cymbops* = Cochlearius, 920.
CYMBORHYNCHUS, 206, 1073.
*Cymindis* = Leptodon, 866.
*Cymochorea* = Oceanodroma, 1028.
*Cymodroma* = Fregetta, 1030.
*Cymotomus* = Puffinus, 1030.
*Cynanthus* = Cyanolesbia, 157.
*Cynanthus* = Trochilus, 162.
*Cynchramus* = Emberiza, 620.
*Cynura* = Ephthianura, 376.
*Cyornis* = Siphia, 292.
CYPHORHINUS, 429.
*Cyphos* = Bucco, 46.
*Cypseloides* = Nephœcetes, 129.
*Cypselopteryx* = Nauclerus, 863.
CYPSELUS, 125, 1064.
*Cypsiurus* = Tachornis, 126.
CYPSNAGRA, 654.
*Cyrtes* = Campophaga, 300.
CYRTONYX, 821.
*Cyrtopelicanus* = Pelecanus, 1005.
CYRTOSTOMUS, 703, 1113.
DACELO, 104, 1062.
*Dacnidea* = Chlorospingus, 650.
DACNIS, 687.
*Dacryophorus* = Picolaptes, 187.
DACTYLORTYX, 821.
*Dactylostrix* = Strix, 898.
*Dædalion* = Astur, 839.
*Dædalion* = Henicopernis, 866.
DAFILA, 994.
*Dafilula* = Dafila, 994.
*Dahila* = Copsychus, 411.
*Damia* = Eroessa, 354.
DAMMERIA, 1082.
DAMOPHILA, 140.
*Damophila* = Polyerata, 136.
*Dandalus* = Erithacus, 382.
DAPHŒNOSITTA, 682.
DAPTION, 1036.
*Daptrion* = Daption, 1036.
*Daptrius* = Ibycter, 832.
*Daseocharis* = Prinia, 358.
*Dasycephala* = Attila, 214.
DASYCROTOPHA, 338.
DASYLOPHUS, 60.
*Dasyncetopa* = Pipra, 220.
*Dasyopsis* = Attila, 214.
*Dasyornis* = Sphenura, 349.
*Dasyptilops* = Pithys, 173.
DASYPTILUS, 4.
*Dasyptilus* = Podicipes, 1040.
*Dasyrhamphus* = Pygoscelis, 1047.
*Dasyrrhinus* = Microsittace, 13.
*Daulias* = Aëdon, 382.
DECOXYCHURA, 190.
*Decurus* = Suya, 358.
*Defilippia* = Chætusia, 936.
*Delattria* = Cœligena, 148.
*Delichon* = Chelidon, 256.
*Delopygia* = Tringa, 950.
DELOTHRAUPIS, 664.
*Deltarhynchus* = Myiarchus, 250.
*Demiegretta* = Ardea, 909.
DENDRAGAPUS, 824.
DENDREXETASTES, 188, 1071.
*Dendrobates* = Eleopicus, 75.
DENDROBIASTES, 346, 1088.
*Dendrochelidon* = Macropteryx, 130.
DENDROCINCLA, 186, 1070.
DENDROCITTA, 508.
DENDROCOLAPTES, 185, 1070.
*Dendrocopos* = Picus, 70.
*Dendrocops* = Dendrocolaptes, 185.
*Dendrocoptes* = Picus, 70.
*Dendrocopus* = Dendrocolaptes, 185.
DENDROCYGNA, 987.
*Dendrodramus* = Pygarrhichus, 190.
*Dendrodromas* = Picus, 70.
DENDROECA, 433, 1096-97.
*Dendrofalco* = Hypotriorchis, 872.
*Dendroica* = Dendroeca, 433.
*Dendroma* = Philydor, 193.
*Dendromanes* = Dendrocincla, 186.
*Dendromus* = Campothera, 65.
*Dendronanthus* = Anthus, 445.
*Dendronessa* = Æx, 982.
*Dendronessa* = Dendrocygna, 987.
*Dendrophaps* = Phabotreron, 734.
*Dendrophassa* = Osmotreron, 733.
DENDROPHILA, 681.
DENDROPICUS, 73, 1058.
DENDROPLEX, 189.
DENDRORNIS, 189, 1071.
DENDRORTYX, 818.
*Dendrotreron* = Columba, 748.
*Dendrotypes* = Picus, 70.

Digitized by Google

*Dentiger* = Haliastur, 862.
*Dentophorus* = Odontophorus, 822.
*Derbyomyia* = Engyete, 153.
*Dermophrys* = Munia, 586.
DEROPTYUS, 7.
*Derotypus* = Deroptyus, 7.
*Dertroides* = Textor, 569.
*Despotes* = Milvulus, 252.
*Despotina* = Myiarchus, 250.
*Diachmura* = Munia, 586.
*Dialia* = Lophornis, 165.
*Diallactes* = Thamnophilus, 182.
DIAPHORILLAS, 1038.
DIAPHOROPHYIA, 265.
DIAPHOROPTERUS, 1084.
DIARDIGALLUS, 799.
DIATROPURA, 573.
DICÆUM, 676, 1112.
DICHOCEROS, 100.
*Dicholophus* = Cariama, 924.
*Dichrognathus* = Psittinus, 21.
*Dichromanassa* = Ardea, 909.
*Dichrozona* = Myrmotherula, 178.
DICRANOSTREPTUS, 532.
DICROCERCUS, 95.
*Dicruropsis* = Dicrurus, 529.
DICRURUS, 529, 1105.
*Dictyopipo* = Picus, 70.
DIDUNCULUS, 775.
*Didymacis* = Francolinus, 807.
*Digenea* = Anthipes, 294.
*Digenea* = Siphia, 292.
DIGLOSSA, 685.
DIGLOSSOPIS, 686.
*Dilobus* = Sarciophorus, 933.
*Dilophus* = Perissornis, 536.
*Dimorpha* = Siphia, 292.
DINEMELLIA, 570.
*Diodon* = Harpagus, 868.
DIOMEDEA, 1038.
DIOPTRORNIS, 287, 1082.
*Diotima* = Heliangelus, 155.
DIPHYLLODES, 519.
*Diplectron* = Polyplectron, 795.
*Diplectropus* = Polyplectron, 795.
*Diplocercus* = Dissoura, 906.
*Diplodon* = Harpagus, 868.
*Diplootocus* = Pinarochroa, 1092.
DIPLOPTERUS, 61.
*Discosura* = Discura, 166.
DISCURA, 166.
*Dissemuroides* = Dissemuropsis, 532.
DISSEMUROPSIS, 532.
DISSEMURUS, 532, 1105.
DISSODECTES, 869.
DISSOURA, 906, 1117.
*Dissura* = Dissoura, 906.
DIUCA, 641.
DIUCOPIS, 646.
*Diva* = Procnopis, 669.
DIVES, 559.
*Diziphia* = Pipra, 220.
*Dnophera* = Threneles, 131.
DOCIMASTES, 152.
*Dolerisca* = Leucippus, 135.
*Doleromyia* = Leucippus, 135.
DOLICHONYX, 552.
DOLIORNIS, 217.
*Dolometis* = Cyanopica, 507.
DOLOSPINGUS, 617.
*Domicella* = Lorius, 29.
*Dominicanus* = Larus, 1021.
*Donacias* = Hypotænidia, 961.
*Donacicola* = Munia, 586.
DONACOBIUS, 418.
*Donacola* = Munia, 586.
*Donacophilus* = Crecisscus, 971.
*Donacospiza* = Coryphospiza, 638.
DORICHA, 162.
*Doriponus* = Ardea, 909.
*Doryfera* = Hemistephania, 130.
*Doryphora* = Hemistephania, 130.
*Doryphorus* = Ardea, 909
*Drepananax* = Drepanornis, 520.
DREPANIS, 691.
*Drepanophorus* = Drepanornis, 520.
*Drepanoplectes* = Penthetria, 573.
*Drepanoptera* = Drepanoptila, 741.
DREPANOPTILA, 741.
*Drepanorhamphus* = Drepanis, 691.
*Drepanorhynchus* = Nectarinia, 694.
*Drepanorhynchus* = Spermophilopsis, 614.
DREPANORNIS, 520.
*Drimoica* = Cisticola, 363.
*Drimoica* = Prinia, 358.
DROMÆOCERCUS, 348.
DROMÆUS, 1050.
*Dromaius* = Dromæus, 1050.
DROMAS, 929.
*Dromeicus* = Dromæus, 1050.
*Dromicens* = Dromæus, 1050.
*Dromicus* = Oreophilus, 933.
*Dromochelidon* = Glareola, 929.
DROMOCOCCYX, 62.
*Dromodendron* = Pygarrhichus, 190.
*Dromolæa* = Saxicola, 388.
*Dromolestes* = Buteo, 855.
*Drymœdus* = Drymoedus, 319.
DRYMOCATAPHUS, 334, 1087.
DRYMOCHÆRA, 334.

Digitized by Google

*Drymochares* = Brachypteryx, 342, 1087.
*Drymocichla* = Eminia, 353.
*Drymodes* = Drymoedus, 319.
*Drymodyta* = Cisticola, 363.
*Drymœca* = Prinia, 358.
Drymoedus, 319.
*Drymoica* = Dryodromas, 354.
*Drymoipus* = Prinia, 358.
*Drymonax* = Tyrannus, 252.
*Drymophila* = Myrmeciza, 174.
Drymornis, 187.
*Drymos* = Drymoedus, 319.
*Drymoterpe* = Apalis, 352.
*Dryobates* = Picus, 70.
*Dryococcyx* = Rhamphococcyx, 59.
Dryocopus, 83.
*Dryocopus* = Dendrocincla, 186.
Dryodromas, 354.
*Dryolimnas* = Rougetius, 965.
Dryonastes, 328, 1086.
*Dryopicus* = Dryocopus, 83.
Dryoscopus, 492, 1104.
*Dryospiza* = Serinus, 599.
*Dryotomus* = Dryocopus, 83.
Dryotriorchis, 835.
Dubusia, 663.
*Ducorpsius* = Cacatua, 2.
Ducula, 746.
Dulus, 261.
Dumetia, 340.
*Dumeticola* = Lusciniola, 371.
*Dupetor* = Ardeiralla, 915.
*Duraucelius* = Harpactes, 88.
Dybowskia, 359.
*Dyctiopicus* = Picus, 70.
*Dynamene* = Eudynamis, 54.
*Dypsicles* = Spheniscus, 1048.
*Dyrinia* = Mellisuga, 164.
Dysithamnus, 180, 1070.
*Dysornithia* = Perisoreus, 511.
*Dysporus* = Sula, 1011.
*Dytes* = Podicipes, 1040.
*Ebucco* = Capito, 41.
Eclectus, 16, 1054.
Ectopistes, 756.
*Edela* = Orthotomus, 361.
Edolisoma, 298, 1084.
*Edolius* = Dicrurus, 529.
*Egolia* = Philodice, 161.
*Egretta* = Herodias, 912.
*Eidopsarus* = Melithreptus, 714.
*Einalia* = Larus, 1021.
*Elachura* = Anorthura, 427.
*Elænia* = Elainea, 239.
Elæocertihia, 702.
Elaïnea, 239, 1076.
*Elanoides* = Elasas, 863.
Elanus, 864.
Elaphornis, 335.
Elasas, 863.
*Elasmonetta* = Anas, 989.
*Eleophonus* = Hypolais, 373.
Eleopicus, 75.
*Elisa* = Doricha, 162.
*Ellipura* = Formicivora, 177.
Ellisia, 351.
Elminia, 281.
*Elceira* = Eupherusa, 144.
Emarginata, 391.
Emberiza, 620, 1110.
*Emberizoides* = Tardivola, 639.
Embernagra, 638.
Emblema, 580.
*Emilia* = Cyanophaia, 137.
Eminia, 353.
*Emphania* = Polyplectron, 795.
*Empharis* = Anastomus, 906.
Empidagra, 241.
Empidias, 251.
*Empidivora* = Stenostira, 273.
Empidochanes, 246, 1077.
Empidonax, 247, 1077.
Empidonomus, 252.
Empidornis, 1082.
*Empidothera* = Culicicapa, 282.
Endomychura, 1044.
Engyete, 153.
*Engyptila* = Leptoptila, 768.
*Enicocichla* = Henicocichla, 436.
*Eniconetta* = Somateria, 1000.
*Enicurus* = Henicurus, 419.
Enneoctonus, 485, 1103.
Enodes, 548.
*Entima* = Lafresnaya, 151.
*Entomedestes* = Myiadectes, 406.
*Entomobio* = Halcyon, 106.
*Entomoletes* = Chaptia, 532.
*Entomophagus* = Fluvicola, 227.
Entomophila, 719.
*Entomophila* = Æthomyias, 274.
*Entomothera* = Halcyon, 106.
Entomyza, 725.
*Enucleator* = Pinicola, 606.
*Enygrothreres* = Phalacrocorax, 1006.
*Eolophus* = Cacatua, 2.
Eophona, 610.
Eopsaltria, 481.
Eos, 28.
*Eparnetes* = Acrocephalus, 368.
*Ephialtes* = Scops, 882.

Digitized by Google

EPHIPPIORHYNCHUS, 907.
EPITHIANURA, 376.
*Epilais* = Sylvia, 374.
*Epimachus* = Falcinellus, 520.
*Epitelarus* = Leucophæus, 1026.
*Epitelolarus* = Larus, 1021.
*Epomia* = Chrysolophus, 803.
*Erana* = Calendula, 458.
*Eranna* = Amazilia, 138.
*Erasmia* = Sporadinus, 142.
*Erasuria* = Saucerottea, 137.
*Eratina* = Saucerottea, 137.
*Eratopsis* = Saucerottea, 137.
*Erator* = Tityra, 210.
*Erebenna* = Engyele, 153.
EREMIORNIS, 1088.
*Eremita* = Phaethornis, 131.
*Eremobius* = Henicornis, 202.
EREMOMELA, 355.
*Eremophila* = Otecorys, 451.
EREUNETES, 949.
ERGATICUS, 440.
*Eribates* = Myiarchus, 250.
ERIOCNEMIS, 153, 1067.
*Eriona* = Eriocnemis, 153.
*Erionetta* = Somateria, 1000.
*Erionotus* = Thamnophilus, 182.
*Eriopus* = Eriocnemis, 153.
ERISMATURA, 1001.
ERITHACUS, 382, 1091.
*Erodia* = Dromas, 929.
*Erodiscus* = Ardetta, 914.
EROESSA, 354.
*Erolia* = Tringa, 950.
*Erolla* = Peltops, 291.
*Erpornis* = Herpornis, 347.
*Erucivora* = Lalage, 302.
*Erythra* = Amaurornis, 972.
*Erythrauchæna* = Geopelia, 762.
*Erythrobucco* = Pogonorhynchus, 35.
ERYTHROCERCUS, 275, 1081.
ERYTHROCICHLA, 336.
*Erythrocnema* = Parabuteo, 858.
*Erythrocnus* = Ardeola, 913.
*Erythrodryas* = Petroeca, 266.
*Erythræna* = Alectrœnas, 742.
ERYTHROGONYS, 933.
*Erythrolæma* = Alectrœnas, 742.
*Erythrolanius* = Analcipus, 528.
*Erythroleuca* = Sylvia, 374.
*Erythrolimnas* = Crecisculs, 971.
ERYTHROMYIAS, 267, 1080.
*Erythronerpes* = Dendropicus, 73.
*Erythronota* = Saucerottea, 137.
*Erythrophoyx* = Ardeiralla, 915.
*Erythrophrys* = Coccyzus, 53.
*Erythropitta* = Pitta, 207.
*Erythrops* = Pyctorhis, 340.
*Erythropsar* = Xanthosomus, 553.
ERYTHROPUS, 872.
ERYTHROPYGIA, 412, 1094.
*Erythroscelis* = Totanus, 946.
ERYTHROSPIZA, 596.
*Erythrospizias* = Astur, 841.
*Erythrosterna* = Muscicapa, 262.
*Erythrostomus* = Tanygnathus, 18.
*Erythrothorax* = Carpodacus, 602.
*Erythrotreron* = Alectrœnas, 742.
ERYTHROTRIORCHIS, 847.
ERYTHRURA, 583.
ESACUS, 928.
ESTRELDA, 581, 1108.
*Etoglaux* = Huhua, 881.
*Eucapripodus* = Nyctidromus, 121.
EUCEPHALA, 139.
*Euchætes* = Calochætes, 659.
*Euchloridia* = Anthreptes, 703.
*Euchlorites* = Oriolus, 525.
*Euchlornis* = Pipreola, 216.
*Euchlorornis* = Pipreola, 216.
*Euchroura* = Urochroma, 8.
EUCICHLA, 209.
*Eucinetus* = Pionopsitta, 7.
*Euclosia* = Lafresnaya, 151.
*Eucnemidia* = Fraseria, 497.
EUCOMETIS, 654.
*Eucorax* = Manucodia, 518.
*Eucorystes* = Zarhynchus, 549.
*Eudacnis* = Dacnis, 687.
EUDOCIMUS, 904.
*Eudosia* = Helianthea, 150.
*Eudosia* = Myrtis, 161.
*Eudoxa* = Lampornis, 145.
*Eudrepanis* = Æthopyga, 695.
*Eudromia* = Calopezus, 786.
EUDROMIAS, 938.
EUDYNAMIS, 54, 1057.
*Eudyptes* = Catarrhactes, 1017.
EUDYPTULA, 1048.
*Eudytes* = Colymbus, 1039.
*Eutheia* = Phonipara, 618.
EUGENES, 148, 1067.
EUGENIA, 150.
*Eugerygone* = Gerygone, 1080.
*Euhyas* = Chætusia, 936.
*Eulabeia* = Anser, 982.
EULABEORNIS, 962.
*Eulabes* = Gracula, 539.
EULAMPIS, 146.
*Eulidia* = Myrtis, 161.

Digitized by Google

*Euliga* = Bartramia, 949.
*Eulipoa* = Megapodius, 786.
*Eulophus* = Pucrasia, 801.
*Eulopogon* = Chasmorhynchus, 219.
*Eumyias* = Stoparola, 291.
EUMOMOTA, 94.
EUNETTA, 991.
*Euodice* = Aidemosyne, 585.
*Euopsar* = Icterus, 558.
EUPETES, 319, 1086.
EUPETOMENA, 134.
*Euphagus* = Scolecophagus, 559.
EUPHEMA, 25.
EUPHERUSA, 144.
EUPHONIA, 671.
*Euplectes* = Pyromelana, 571.
*Euplocamus* = Gennæus. 800.
*Euplocomus* = Lophura, 798.
*Eupodes* = Sycobrotus, 565.
*Eupodoces* = Podoces, 1105.
EUPODOTIS, 927.
*Eupogonus* = Chalcostigma, 156.
*Euprepiste* = Calliste, 665.
*Euprinodes* = Apalis, 352.
*Eupsilostoma* = Pogonotriccus, 235.
*Eupsittaca* = Conurus, 11.
*Eupsittula* = Conurus, 11.
EUPSYCHORTYX, 819.
EURTILOSUS, 1085.
EURTILOTIS, 86.
EURHYNORHYNCHUS, 950.
*Eurillas* = Andropadus, 1085.
EUROCEPHALUS, 494.
*Eurostopodus* = Eurostopus, 119.
EUROSTOPUS, 119.
*Eurycercus* = Laticilla, 350.
EURYCEROS, 498.
EURYLÆMUS, 205.
*Eurhynchus* = Microglossus, 1.
*Eurypterus* = Chætusia, 936.
EURYTILA, 350.
EURYPYGA, 921, 1117.
EURYSTOMUS, 93, 1061.
*Euryzona* = Rallina, 965.
EUSCARTHMUS, 232, 1075.
*Euschemon* = Calliste, 665.
*Euspina* = Spiza, 639.
*Euspiza* = Spiza, 639.
EUSTEPHANUS, 157.
*Eustrinx* = Strix, 898.
EUTHLYPIS, 442.
*Euthraupis* = Iridornis, 664.
*Euthyrhynchus* = Timeliopsis, 727.
EUTOLMAETUS, 850.
EUTOXERES, 133, 1065.
EUTREREON, 738.
EUTRIORCHIS, 835.
EUTRYGON, 774.
EUXENURA, 906.
*Evopsitta* = Conurus, 11.
*Exanthemops* = Chen, 982.
EXCALFACTORIA, 816.
*Exetastus* = Tityra, 210.
*Exochocichla* = Henicocichla, 1097.
*Falcator* = Drepanis, 691.
FALCINELLUS, 520.
*Falcinellus* = Plegadis, 903.
*Falcinellus* = Tringa, 950.
FALCIPENNIS, 825.
*Falcirostra* = Ibidorhynchus, 944.
FALCO, 874, 1116.
*Falcula* = Tinnunculus, 870.
FALCULIA, 728.
FALCUNCULUS, 482.
*Fedoa* = Limosa, 945.
*Fedoa* = Œdicnemus, 927.
*Ficedula* = Muscicapa, 262.
*Ficedula* = Phylloscopus, 377.
*Figulus* = Furnarius, 203.
*Finschia* = Certhiparus, 1101.
*Fiscus* = Lanius, 483.
*Floresia* = Lampornis, 145.
FLORICOLA, 160.
*Florida* = Ardea, 909.
FLORISUGA, 134, 1065.
FLUVICOLA, 227.
FORMICARIUS, 171, 1069.
FORMICIVORA, 177, 1070.
FOUDIA, 566.
*Foulehaio* = Ptilotis, 719.
FRANCOLINUS, 807.
*Franklinia* = Cisticola, 363.
FRASERIA, 497.
FRATERCULA, 1046.
FREGATA, 1012.
FREGETTA, 1030.
FREGILUS, 516.
FREGILUPUS, 548.
FRINGILLA, 589.
FRINGILLARIA, 623.
*Fringillauda* = Montifringilla, 594.
*Fringilloparus* = Liothrix, 347.
*Fruticicola* = Pratincola, 387.
FULICA, 977.
FULIGULA, 997.
*Fulix* = Fuligula, 997.
FULMARUS, 1036.
FULVETTA, 346.
*Funingus* = Alectroenas, 742.
*Furcuria* = Liothrix, 347.

Digitized by Google

FURNARIUS, 203.
*Furningus* = Alectroenas, 742.
GABALCYORHYNCHUS, 46.
GABIANUS, 1026.
*Galachrysia* = Glareola, 929.
*Galactochrysea* = Glareola, 929.
GALBULA, 45, 1056.
*Galbulus* = Oriolus, 525.
*Galenia* = Panoplites, 152.
*Galeolimnas* = Porzana, 967.
GALEOPSAR, 546.
GALEOSCOPTES, 415, 1095.
GALERIDA, 457, 1099.
*Galerita* = Galerida, 457.
*Galgulus* = Coracias, 92.
*Galgulus* = Hypsipetes, 315.
*Galgulus* = Picathartes, 516.
GALLICREX, 974.
GALLINAGO, 952.
GALLINULA, 973.
*Gallinulopha* = Gallicrex, 974.
*Gallirallus* = Ocydromus, 964.
GALLIREX, 89, 1060.
*Gallita* = Alectrurus, 228.
*Gallopavo* = Meleagris, 796.
GALLOPERDIX, 817.
*Gallophasis* = Pucrasia, 801.
GALLUS, 803.
*Gambetta* = Totanus, 946.
GAMPSONYX, 864.
GAMPSORHYNCHUS, 323, 1086.
*Ganix* = Ortalida, 792.
*Ganza* = Somateria, 1000.
*Garrodia* = Oceanites, 1029.
GARRULAX, 327, 1086.
*Garrulaxis* = Garrulax, 327.
GARRULUS, 510.
*Garzetta* = Herodias, 912.
*Gauropicoides* = Mesospilus, 67.
*Gavia* = Anous, 1018.
*Gavia* = Colymbus, 1039.
*Gavia* = Larus, 1021.
*Gavina* = Larus, 1021.
*Gazzola* = Corvus, 502.
*Gecinisceus* = Gecinulus, 67.
GECINULUS, 67.
GECINUS, 63, 1057.
*Gelastes* = Larus, 1021.
GELOCHELIDON, 1013.
*Gennadas* = Falco, 874.
GENNÆUS, 800, 1115.
*Gennaia* = Falco, 874.
*Gennæochen* = Tadorna, 988.
*Geobamon* = Geositta, 204.
*Geobasileus* = Acanthiza, 366.
GEOBATES, 204.
GEOBIASTES, 92.
GEOCICHLA, 404, 1094.
GEOCOCCYX, 61.
GEOCOLAPTES, 62.
*Geocoraphus* = Mirafra, 455.
GEOFFROYUS, 16, 1054.
*Geopeleia* = Geopelia, 762.
GEOPELIA, 762.
GEOPHAPS, 767.
*Geophilus* = Calœnas, 774.
*Geopicus* = Colaptes, 62.
GEOPSITTACUS, 27.
GEOSITTA, 204, 1073.
GEOSPIZA, 608, 1110.
*Geospiza* = Montifringilla, 594.
*Geospizopsis* = Phrygilus, 640.
*Geotacco* = Dromococcyx, 62.
GEOTHLYPIS, 437, 1097-98.
GEOTRYGON, 770.
*Geranarchus* = Balearica, 923.
GERANOAËTUS, 860.
*Geranopus* = Geranospizias, 838.
GERANOSPIZIAS, 838.
*Geranus* = Tetrapteryx, 923.
GERONTICUS, 901.
*Gervaisia* = Copsychus, 411.
GERYGONE, 268, 1080.
GIGANTIPITTA, 207.
GISELLA, 893.
GLAREOLA, 929.
*Glandarius* = Garrulus, 510.
*Glaucerodius* = Ardea, 909.
*Glaucestes* = Porphyriola, 975.
GLAUCIDIUM, 896, 1117.
*Glaucion* = Clangula, 998.
*Glaucionetta* = Clangula, 998.
GLAUCIS, 131.
*Glaucococcyx* = Coua, 60.
*Glaucomyias* = Stoparola, 291.
GLAUCOPIS, 516.
*Glaucopis* = Dendrocitta, 508.
*Glaucopis* = Thalurania, 143.
*Glaucopteryx* = Circus, 835.
*Glaucus* = Larus, 1021.
*Glaux* = Strix, 898.
*Glenargus* = Platysmurus, 509.
*Gliciphila* = Glycyphila, 717.
GLOBICERA, 743.
GLOSSIPTILA, 689.
GLOSSOPSITTA, 31.
*Glossopsittacus* = Glossopsitta, 31.
*Glottis* = Totanus, 946.
*Glyciapina* = Emberiza, 620.
GLYCYCHÆRA, 717.

Digitized by Google

GLYCYPHILA, 717.
*Glyphidiura* = Strix, 898.
GLYPHORHYNCHUS, 190.
*Gmelinus* = Timolia, 143.
*Gnathodon* = Didunculus, 775.
*Gnathosittaca* = Conurus, 11.
GNATHOSPIZA, 602.
*Goldana* = Brachypteryx, 342.
*Goniaphea* = Guiraca, 1110.
GORSACHIUS, 918.
*Gorsakius* = Gorsachius, 918.
*Gouldia* = Prymnacantha, 165.
*Gouldomyia* = Prymnacantha, 165.
GOURA, 775, 1115.
GRACULA, 539.
*Gracalus* = Phalacrocorax, 1006.
GRACULIPICA, 537.
*Graculus* = Fregilus, 516.
*Graculus* = Phalacrocorax, 1006.
*Gracupica* = Graculipica, 537.
GRALLARIA, 169, 1068.
GRALLARICULA, 169, 1068.
GRALLINA, 500.
*Grallipes* = Grallina, 500.
GRAMINICOLA, 362.
*Grammarhynchus* = Pteroglossus, 43.
GRAMMATOPTILA, 329.
*Grammatoptilus* = Gennæus, 800.
*Grammicus* = Lophoceros, 103.
GRANATELLUS, 438.
*Granatina* = Uræginthus, 582.
*Granativora* = Emberiza, 620.
GRANDALA, 386.
*Grophephasianus* = Phasianus, 801.
GRAUCALUS, 295, 1083-84.
*Graucalus* = Phalacrocorax, 1006.
GRAYDIDASCALUS, 6, 1053.
*Gripens* = Phalacrocorax, 1006.
GRUS, 921.
*Grylle* = Uria, 1043.
*Gryllivora* = Copsychus, 411.
*Gryphus* = Sarcorhamphus, 827.
*Grypus* = Rhamphodon, 131.
*Guara* = Eudocimus, 904.
GUBERNATRIX, 620.
*Gubernetes* = Cybernetes, 228.
*Guimetia* = Klais, 164.
*Guinetta* = Actitis, 948.
GUIRA, 62.
GUIRACA, 612, 1110.
*Gulosus* = Phalacrocorax, 1006.
GUTTERA, 805.
*Guyornis* = Phaethornis, 131.
GYGIS, 1019.
GYMNASIO, 895.
*Gymnathus* = Cairina, 980.
*Gymnoblepharum* = Lunda, 1046.
GYMNOBUCCO, 37, 1055.
GYMNOCEPHALUS, 218, 1074.
GYMNOCICHLA, 175.
GYMNOCORAX, 505.
*Gymnocorvus* = Gymnocorax, 505.
*Gymnocranus* = Gymnobucco, 37.
GYMNOCREX, 963.
*Gymnocrotaphus* = Bonapartia, 307.
GYMNODERUS, 219.
GYMNOGENYS, 835, 1116.
*Gymnoglaux* = Gymnasio, 895.
GYMNOGYPS, 829.
GYMNOKITTA, 815.
*Gymnolæmus* = Anthracoceros, 100.
GYMNOMYSTAX, 556.
GYMNOPELIA, 763, 1114.
GYMNOPHAPS, 748, 1114.
*Gymnophrys* = Melithreptus, 714.
GYMNOPITHYS, 173, 1069.
*Gymnops* = Ibycter, 832.
*Gymnops* = Sarcops, 538.
*Gymnopus* = Cacomantis, 52.
GYMNORHINA, 500.
*Gymnorhinus* = Gymnokitta, 515.
*Gymnorhis* = Petronia, 596.
GYMNOSCHIZORHIS, 90.
GYMNOSCOPS, 887.
GYMNOSTINOPS, 549.
*Gymnura* = Erismatura, 1001.
GYPAËTUS, 831.
*Gypagus* = Cathartes, 828.
*Gyparchus* = Cathartes, 828.
*Gypiscus* = Neophron, 830.
*Gypogeranus* = Serpentarius, 827.
GYPOHIERAX, 831.
GYPOICTINIA, 863.
GYPOPSITTA, 8.
*Gypopsittacus* = Gypopsitta, 8.
GYPS, 829.
GYPSOPHILA, 338.
*Gyptus* = Gypaëtus, 831.
*Gyralca* = Alca, 1043.
*Gyrinorhynchus* = Spermophila, 614.
*Gyrola* = Callisle, 665.
*Habia* = Hedymeles, 612.
HABROPTILA, 964.
*Habropyga* = Estrelda, 581.
HABRURA, 234.
*Hadropezus* = Turdinus, 331.
HADROSTOMUS, 211.
HÆMATODERUS, 218.
*Hæmatops* = Melithreptus, 714.
HÆMATOPUS, 932.

Digitized by Google

*Hæmatornis* = Spilornis, 834.
HÆMATORTYX, 814.
*Hæmatospiza* = Carpodacus, 602.
HÆMOPHILA, 633
*Hæmorrhous* = Carpodacus, 602.
HAGEDASHIA, 902.
*Hagiopsar* = Amydrus, 545.
HALCYON, 106.
*Halia* = Chlorestes, 140.
HALIAËTUS, 853.
HALIASTUR, 862.
*Halietor* = Phalacrocorax, 1006.
*Halieus* = Phalacrocorax, 1006.
*Haliplana* = Sterna, 1014.
HALOBÆNA, 1037.
HALOCYPTENA, 1028.
HALODROMA, 1037.
*Hamirostrum* = Rosthramus, 864.
HAPALARPACTES, 88.
HAPALOCERCUS, 234, 1075.
HAPALODERMA, 87, 1060.
*Hapalophorus* = Trogon, 86.
HAPALOPTERON, 1084.
HAPALOPTILA, 48.
*Hapalura* = Culicivora, 235.
*Hapalurus* = Harpactes, 88.
*Haplænas* = Turacœna, 754.
HAPLOPELIA, 768, 1114.
*Haplopyga* = Estrelda, 581.
HAPLOSPIZA, 627.
HARELDA, 999.
*Harpa* = Nesihierax, 869.
HARPACTES, 88, 1060.
HARPAGUS, 868.
*Harpe* = Nesihierax, 869.
*Harpes* = Harporhynchus, 417.
HARPIPRION, 902.
*Harpolestes* = Telephonus, 488.
HARPORHYNCHUS, 417, 1095.
HARPYHALIAËTUS, 861.
*Harpyia* = Thrasaëtus, 848.
HARPYOPSIS, 848.
HARTLAUBIUS, 540.
HEDYDIPNA, 694, 1112.
*Hedyglossa* = Diuca, 641.
*Hedymela* = Muscicapa, 262.
HEDYMELES, 612, 1110.
*Heilicura* = Chiroxiphia, 222.
*Helaia* = Pseudozosterops, 713.
*Heleia* = Pseudozosterops, 713.
*Heleodytes* = Campylorhynchus, 419.
*Heleornis* = Hydrornis, 207.
HELEOTHREPTUS, 120.
HELIACTIN, 159.
*Heliactinia* = Heliactin, 159.
HELIANGELUS, 155, 1067.
HELIANTHEA, 150, 1067.
*Heliaptex* = Bubo, 880.
*Helias* = Eurypyga, 921.
*Helinaia* = Helmitherus, 431.
HELIOBLETUS, 193.
*Heliobucco* = Gymnobucco, 37.
HELIOCHERA, 217.
*Heliocorys* = Galerida, 459.
HELIODILUS, 898.
HELIODOXA, 149, 1067.
HELIOMASTER, 160.
HELIOPAIS, 978.
*Heliopædica* = Basilinna, 139.
*Heliopsitta* = Conurus, 11.
HELIORNIS, 978.
HELIOTHRIX, 159, 1068.
*Heliotrypha* = Heliangelus, 155.
*Helmintherus* = Helmitherus, 431.
HELMINTHOPHAGA, 431, 1096.
*Helminthophila* = Helminthophaga, 431.
*Helminthotherus* = Helmitherus, 431.
HELMITHERUS, 431.
*Helodromas* = Totanus, 946.
*Helonæa* = Helmitherus, 431.
*Helopus* = Hydroprogne, 1014.
*Helortyx* = Ortyxelus, 930.
*Helospiza* = Melospiza, 632.
HELOTARSUS, 835.
*Helotriorchis* = Ibycter, 832.
*Helymus* = Heliangelus, 155.
*Hemerodromus* = Rhinoptilus, 931.
*Hemiaëtus* = Archibuteo, 854.
*Hemicecrops* = Hirundo, 253.
HEMICERCUS, 81.
HEMICHELIDON, 262, 1079.
HEMIDACNIS, 687.
HEMIGNATHUS, 693.
*Hemigyps* = Otogyps, 829.
*Hemihierax* = Spiziapteryx, 869.
HEMILOPHUS, 81, 1059.
*Hemipalama* = Ereunetes, 949.
*Hemipalma* = Micropalama, 946.
*Hemiparra* = Chætusia, 936.
*Hemiparus* = Siva, 347.
*Hemipenthica* = Tænioptera, 225.
*Hemipipo* = Piprites, 219.
*Hemipodius* = Turnix, 778.
*Hemiprocne* = Chætura, 127.
*Hemipteron* = Pellorneum, 336.
*Hemipteryx* = Cisticola, 363.
HEMIPUS, 497.
*Hemirhynchus* = Heteromorpha, 470.
*Hemispingus* = Chlorospingus, 650.
HEMISTEPHANIA, 130.



Digitized by Google

*Hemistilbon* = Saucerottea, 137.
*Hemithylaca* = Saucerottea, 137.
*Hemithraupis* = Nemosia, 653.
*Hemithraupis* = Tanagra, 661.
Hemitriccus, 234, 1075.
*Hemiura* = Uropsila, 428.
Hemixus, 315, 1086.
Henicocichla, 436, 1097.
Henicognathus, 13.
Henicopernis, 866.
Henicophaps, 767.
Henicorhina, 428.
Henicornis, 202, 1072.
Henicurus, 449.
*Hepburnia* = Galloperdix, 817.
*Herbivocula* = Lusciniola, 371.
*Herbivox* = Cettia, 372.
*Herminierus* = Cinclocerthia, 414.
Hermotimia, 700.
Herodias, 912.
Herpetotheres, 833.
Herpornis, 347.
Herpsilochmus, 178.
*Herpystera* = Burnesia, 359.
Hesperiphona, 610.
*Hesperocichla* = Geocichla, 404.
*Hetærodes* = Prodotiscus, 35.
*Heteractitis* = Totanus, 946.
Heteralocha, 516.
Heteranax, 1083.
Heterhyphantes, 564, 1107.
*Heteroaëtus* = Geranoaëtus, 860.
Heterocercus, 224.
*Heteroclitus* = Syrrhaptes, 776.
Heterocnemis, 175, 1069.
*Heterocnus* = Tigrisoma, 919.
*Heterocorax* = Corvus, 502.
*Heterocorys* = Alæmon, 450.
Heteroglaux, 895.
Heteromorpha, 470.
Heteromyias, 271.
Heteronetta, 996.
Heterofelma, 223.
*Heterophasia* = Sibia, 324.
*Heteropoda* = Ereunetes, 949.
*Heterops* = Galerida, 457.
*Heteropsar* = Lamprocolius, 516.
*Heteropus* = Ictinaëtus, 850.
*Heteropygia* = Tringa, 950.
*Heterorhina* = Henicorhina, 428.
*Heterorhynchus* = Hemignathus, 693.
*Heterorhynchus* = Sphenocichla, 428.
*Heterornis* = Cutia, 348.
*Heterornis* = Sturnornis, 536.
*Heteroscelus* = Totanus, 946.
*Heteroscenes* = Cuculus, 51.
Heteroscops, 887.
*Heterospingus* = Tachyphonus, 655.
Heterospizias, 861.
Heterotetrax, 925.
*Heterotis* = Heterotetrax, 925.
*Heterotrogon* = Hapaloderma, 1060.
*Heteroxenicus* = Brachypteryx, 1087.
*Heterura* = Oreocorys, 449.
*Hians* = Anastomus, 906.
*Hiator* = Anastomus, 906.
Heracidea, 869.
*Hieracoglaux* = Ninox, 887.
*Hieraëtus* = Eutolmaëtus, 850.
*Hieraspiza* = Accipiter, 844.
*Hierax* = Microhierax, 868.
Hierococcyx, 50, 1056.
Herofalco, 875.
*Hierophasis* = Gennæus, 800.
*Himalia* = Spathura, 153.
*Himantellus* = Himantopus, 942.
Himatone, 692.
Himantopus, 942.
Himantornis, 965.
*Himelia* = Coeligena, 148.
*Hippalectryo* = Casuarius, 1050.
*Hirundapus* = Chætura, 127.
*Hirundinapus* = Chætura, 127.
Hirundinea, 244.
Hirundo, 253, 1078-79.
Histrionicus, 999.
*Histriophaps* = Phaps, 767.
Histurgops, 569.
Hodgsonius, 384.
*Hodites* = Symphemia, 946.
*Holocnemis* = Heterocnemis, 175.
*Holopodius* = Phalaropus, 957.
*Hologuiscalus* = Quiscalus, 559.
*Homochlamis* = Cettia, 372.
*Homopelia* = Turtur, 759.
*Homophania* = Lampropygia, 152.
*Homoptila* = Leptoptila, 768.
*Homoptilura* = Gallinago, 952.
Homorus, 195, 1072.
*Homraius* = Dichoceros, 100.
Hoplopterus, 935.
*Hoploxypterus* = Hoplopterus, 935.
*Horeites* = Cettia, 372.
*Horizocercus* = Alophius, 1062.
*Horizopus* = Nuttallornis, 1078.
Horizorhinus, 1104.
Horornis, 372.
Houbara, 926.
*Houbaropsis* = Sypheotis, 926.
*Houppifer* = Acomus, 798.

Digitized by Google

*Houppiferus* = Acomus, 798.
HUHUA, 881.
HUMBLOTIA, 284.
*Hyas* = Pluvianus, 930.
*Hybris* = Strix, 898.
*Hybristes* = Acrocephalus, 368.
HYDRALECTOR, 958.
*Hydranassa* = Ardea, 909.
*Hydrobata* = Cinclus, 418.
*Hydrobates* = Biziuru, 1002.
*Hydrobates* = Procellaria, 1028.
*Hydrocecropis* = Sterna, 1014.
HYDROCHELIDON, 1012.
*Hydrocicca* = Porphyriops, 974.
*Hydrocichla* = Henicurus, 449.
HYDROCISSA, 103.
*Hydrocolæus* = Larus, 1021.
*Hydrocopsicus* = Acrocephalus, 368.
HYDROCORAX, 100.
*Hydrocorax* = Phalacrocorax, 1006.
*Hydrogallina* = Gallinula, 973.
*Hydroictinia* = Milvus, 862.
*Hydroka* = Podilymbus, 1012.
HYDROPHASIANUS, 957.
*Hydrophasis* = Hydrophasianus, 957.
HYDROPROGNE, 1014.
HYDROPSALIS, 120.
*Hydrornia* = Porphyriola, 975.
HYDRORNIS, 207.
*Hyetoceryx* = Charadrius, 937.
*Hyetomantis* = Hyetornis, 57.
HYETORNIS, 57.
HYLACOLA, 320.
HYLACTES, 168.
*Hylæspiza* = Emberiza, 620.
*Hylatomus* = Dryocopus, 83.
*Hylcaon* = Pelargopsis, 114.
*Hylemathrous* = Troglodytes, 425.
HYLIA, 357, 1089.
HYLIOTA, 272, 1080.
*Hyliotis* = Hyliota, 272.
HYLOCHARIS, 139, 1066.
*Hylocharis* = Pachycephala, 476.
*Hylochelidon* = Petrochelidon, 258.
*Hylocichla* = Turdus, 399.
*Hylocosmia* = Cotinga, 216.
HYLOMANES, 95.
HYLONYMPHA, 150.
*Hyloperdix* = Arboricola, 813.
*Hylophila* = Pseudozosterops, 713.
HYLOPHILUS, 473, 1102.
*Hylophorba* = Calicalicus, 487.
*Hylorchilus* = Catherpes, 428.
*Hyloterpe* = Pachycephala, 476.
*Hylypsornis* = Salpornis, 684.
HYMENOLÆMUS, 1002.
*Hyonetta* = Cairina, 980.
*Hypædaleus* = Thamnophilus, 182.
HYPARGUS, 579.
*Hypenites* = Panurus, 469.
HYPERGERUS, 320.
*Hypermetra* = Patagona, 135.
*Hypermitres* = Myiodynastes, 243.
HYPHANTES, 556.
*Hyphantica* = Quelea, 591.
HYPHANTHORNIS, 561, 1107.
*Hyphantospiza* = Pyrrhospiza, 1109.
*Hyphanturgus* = Sitagra, 564.
*Hypherpes* = Hypositta, 683.
*Hypnelus* = Bucco, 46.
*Hypnodes* = Gallicrex, 974.
*Hypobletis* = Molothrus, 552.
*Hypocanthis* = Chrysomitris, 591.
*Hypocentor* = Emberiza, 620.
HYPOCHÆRA, 574, 1108.
HYPOCHARMOSYNA, 32, 1055.
*Hypochlorenus* = Hypergerus, 320.
*Hypochrysia* = Helianthea, 150.
HYPOCNEMIS, 173, 1069.
HYPOCOLIUS, 497.
*Hypogramma* = Anthreptes, 703.
HYPOLAIS, 373.
*Hypoleucus* = Phalacrocorax, 1006.
*Hypolia* = Heliodoxa, 149.
*Hypolia* = Montifringilla, 594.
*Hypolophus* = Thamnophilus, 182.
*Hypoloxias* = Loxops, 594.
*Hypomorphnus* = Urubitinga, 861.
HYPOPHÆA, 671.
*Hypophania* = Lampornis, 145.
HYPOPICUS, 70.
HYPOPTRRHUS, 561.
HYPOSITTA, 683.
HYPOTÆNIDIA, 961, 1118.
*Hypothlypis* = Tanagrella, 670.
HYPOTHYMIS, 274, 1081.
*Hypotrichas* = Criniger, 310.
HYPOTRIORCHIS, 872.
HYPOXANTHUS, 63.
*Hypsibates* = Himantopus, 942.
*Hypsibemon* = Grallaria, 169.
HYPSIPETES, 315, 1086.
*Hypsipus* = Lanioturdus, 270.
*Hypuropdila* = Chalybura, 144.
*Hytiopus* = Baza, 866.
*Iache* = Phæoptila, 139.
*Ianthia* = Tarsiger, 384.
IANTHOCINCLA, 322, 1086.
IBIDORHYNCHUS, 944.
IBIS, 900.

Digitized by Google

Ibycter, 832.
*Icoturus* = Erithacus, 382.
*Ichthierax* = Schizorhis, 90.
*Ichthyaëtus* = Larus, 1021.
*Ichthyaëtus* = Polioaëtus, 877.
*Ichthynomus* = Ceryle, 114.
*Ichthyoborus* = Busarellus, 862.
Icteria, 438.
*Icterioides* = Pendulinus, 556.
*Icteropsis* = Sitagra, 564.
Icterus, 558, 1107.
Ictinaetus, 850.
Ictinia, 864.
*Ictiniscus* = Muscipipra, 229.
*Ictinoaëtus* = Haliastur, 862.
*Idas* = Lophornis, 165.
*Idiococcyx* = Rhinortha, 59.
Idiopsar, 641.
*Idiotes* = Basileuterus, 438.
*Idopsarus* = Melithreptus, 714.
*Iduna* = Hypolais, 373.
*Ierapterhina* = Rhamphocorys, 451.
*Ierax* = Accipiter, 844.
Ifrita, 319.
*Iliacus* = Turdus, 399.
*Ilicura* = Chiroxiphia, 222.
*Iliolopha* = Euphonia, 671.
Illadopsis, 336, 1087.
*Ilyonetta* = Æthyia, 996.
*Impeyanus* = Lophophorus, 797.
*Inca* = Nænia, 1018.
*Incaspiza* = Hæmophila, 633.
Indicator, 34, 1055.
*Indopicus* = Chrysocolaptes, 80.
*Inocotis* = Ibis, 900.
Iodopleura, 217.
Iolæma, 150.
Iole, 312, 1085.
*Ionocicca* = Porphyriola, 975.
*Ionolaima* = Iolæma, 150.
*Ionornis* = Porphyriola, 975.
Ionotreron, 741.
*Iora* = Ægithina, 341.
*Ioropus* = Siva, 347.
*Ipagrus* = Campothera, 65.
*Ipnodomus* = Furnarius, 203.
*Ipoborus* = Automolus, 194.
*Ipocrantor* = Campephilus, 80.
*Ipoctonus* = Dendropicus, 73.
*Ipopatis* = Dendropicus, 73.
*Ipopulus* = Yungipicus, 74.
Irania, 383.
Irena, 317.
*Iridipitta* = Pitta, 207.
*Iridophanes* = Dacnis, 1112.
*Iridoprocne* = Tachycineta, 255.
Iridornis, 664.
*Iridosornis* = Iridornis, 664.
Irrison, 98, 1061.
*Ischnosceles* = Geranospizias, 838.
*Ischyropodus* = Crateropus, 329.
*Ischyrornis* = Chauna, 979.
*Ispida* = Ceryle, 114.
Ispidina, 111.
Ithagenes, 796.
*Ithaginis* = Ithagenes, 796.
Ixidia, 308, 1085.
*Ixocherus* = Microtarsus, 309.
Ixocincla, 316.
*Ixocossyphus* = Turdus, 399.
Ixonotus, 309.
*Ixops* = Actinodura, 330.
*Ixoreus* = Geocichla, 1094.
*Ixos* = Pycnonotus, 305.
*Ixothraupis* = Calliste, 665.
Ixulus, 344.
*Iyngipicus* = Yungipicus, 74.
*Iynx* = Yunx, 85.
Jacamaralcyon, 46.
*Jacamaralcyonides* = Gabalcyorynchus, 46.
Jacamerops, 46, 1056.
*Jacana* = Parra, 958.
*Jacapa* = Rhamphocœlus, 660.
*Jambotreron* = Ptilopus, 735.
*Janthœnas* = Columba, 748.
Janthothorax, 521.
*Jerdonia* = Hypolais, 373.
*Juida* = Lamprotornis, 544.
*Juliamyia* = Damophila, 140.
Junco, 629.
*Junco* = Acrocephalus, 368.
*Kamptorhynchus* = Camptolæmus, 1000.
*Kaupifalco* = Asturinula, 839.
*Kaupornis* = Myiarchus, 250.
Kelaartia, 307.
Kenopia, 338.
*Keron* = Lagopus, 826.
*Keropia* = Turnagra, 329.
*Keroula* = Tephrodornis, 493.
Ketupa, 879.
*Kieneria* = Pyrgisoma, 635.
*Kitta* = Cissa, 508.
*Kittacincla* = Cittocincla, 413.
*Kittosoma* = Grammatoptila, 329.
*Kittlitzia* = Pennula, 969.
Klais, 164.
*Knathodon* = Didunculus, 775.
*Kranocera* = Ptilopus, 735.
*Krimnochelidon* = Cotyle, 256.
*Ktinorhynchus* = Chaulelasmus, 991.

Digitized by Google

*Kurukuru* = Ptilopus, 735.
*Kurutreron* = Ptilopus, 735.
*Labbus* = Stercorarius, 1027.
*Lacedo* = Carcineutes, 110.
Lædorusa, 305, 1084.
Lafresnaya, 151, 1067.
*Lagenoplastes* = Petrochelidon, 258.
Lagonosticta, 577, 1108.
Lagopus, 826, 1116.
*Laimodon* = Pogonorhynchus, 35.
*Laiscopus* = Accentor, 381.
Lalage, 302.
Laletes, 475.
*Lambruschinia* = Larus, 1021.
Lampornis, 145.
Lampraster, 149.
Lampribis, 903.
*Lamprococcyx* = Chrysococcyx, 52.
Lamprocolius, 546, 1106.
Lamprocorax, 542.
Lamprolæma, 149.
Lamprolia, 392.
*Lampromorpha* = Chrysococcyx, 52.
*Lampronessa* = Æx, 982.
Lampronetta, 1000.
*Lampropicus* = Chloronerpes, 64.
*Lampropogon* = Chalcostigma, 156.
Lampropsar, 559.
Lamproptgia, 152, 1067.
Lamprospiza, 644.
Lamprotes, 652.
Lamprothorax, 521.
*Lamprotila* = Jacamerops, 46.
Lamprotornis, 544.
Lamprotreron, 738.
*Lamprurus* = Augastes, 159.
*Laniagra* = Cyclorhis, 475.
Laniarius, 491, 1104.
*Lanicterus* = Campophaga, 300.
Laniellus, 483.
*Laniisoma* = Ptilochloris, 223.
Lanio, 656.
*Laniocera* = Aulia, 213.
Lanioturdinus, 332.
Lanioturdus, 270.
Lanius, 483, 1102-3.
*Lanivireo* = Vireo, 471.
*Lantzia* = Vanga, 499.
*Laomedontia* = Bugeranus, 922.
*Laphyctes* = Tyrannus, 252.
*Laroides* = Larus, 1021.
*Laroides* = Rissa, 1027.
*Laropis* = Gelochelidon, 1013.
*Larosterna* = Nænia, 1018.
Larus, 1021.
*Larva* = Fratercula, 1046.
Larvivora, 383.
*Laryngogramma* = Ptilopus, 735.
*Laterirallus* = Creciscus, 971.
*Lathamus* = Nanodes, 27.
Lathria, 213, 1074.
*Lathrisoma* = Aulia, 213.
Laticilla, 350.
*Lavinia* = Metallura, 155.
Lawrencia, 248.
*Lawrentius* = Eupherusa, 144.
*Layardia* = Argya, 323.
*Leadbeatera* = Heliodoxa, 149.
Lecythoplastes, 258.
Legatus, 241.
*Legriocinclus* = Rhamphocinclus, 414.
Leguatia, 978.
*Leimoniptila* = Anthus, 445.
*Leimonites* = Tringa, 950.
*Leiocincla* = Actinodura, 330.
*Leiopicus* = Picus, 70.
*Leioptila* = Lioptila, 413.
*Leiothrix* = Liothrix, 347.
*Leipoa* = Lipoa, 788.
Leistes, 554.
*Lempijius* = Scops, 882.
*Leobia* = Polyonomus, 157.
*Lepocestes* = Blythipicus, 77.
*Lepidocolaptes* = Picolaptes, 187.
*Lepidœnas* = Columba, 748.
*Lepidogenys* = Baza, 866.
Lepidogrammus, 60.
*Lepidolarynx* = Heliomaster, 160.
*Lepidopyga* = Cyanophaia, 137.
*Lepidopygia* = Spermestes, 576.
*Lepidoria* = Pterophanes, 152.
*Lepidothrix* = Pipra, 220.
*Lepterodas* = Ardea, 909.
*Lepterodius* = Ardea, 909.
Leptasthenura, 201.
*Leptocercus* = Hapalocercus, 234.
Leptocoma, 699.
*Leptodactylus* = Phegornis, 956.
Leptodon, 866.
*Leptoglossus* = Acanthorhynchus, 716.
*Leptolophus* = Calopsitta, 3.
*Leptonyx* = Coryphospiza, 638.
*Leptonyx* = Hylactes, 168.
*Leptopelia* = Columbigallina, 763.
*Leptopelicanus* = Pelecanus, 1005.
Leptopœcile, 379.
Leptopogon, 237, 1076.
*Leptopterus* = Artamia, 498.
*Leptopteryx* = Artamus, 533.
Leptoptila, 768, 1115.

Digitized by Google

LEPTOPTILUS, 907.
*Leptopus* = Phegornis, 956.
*Leptorhynchus* = Cladorhynchus, 943.
*Leptorhynchus* = Psilorhamphus, 177.
LEPTORNIS, 724.
*Leptoscelis* = Phegornis, 956.
LEPTOSITTACA, 12.
LEPTOSOMA, 91.
*Leptosoma* = Geococcyx, 61.
*Leptosomus* = Leptosoma, 91.
*Leptotarsis* = Dendrocygna, 987.
LEPTOTRICCUS, 235.
*Leptoxyura* = Synallaxis, 197.
*Leptuas* = Euptilotis, 86.
*Lepturus* = Hapalocercus, 234.
LERWA, 805.
LESBIA, 158.
LESSONIA, 230.
*Lestris* = Megalestris, 1027.
*Leucaria* = Calypte, 163.
*Leucerodia* = Platalea, 904.
*Leuchybris* = Nyctea, 894.
*Leucibus* = Eudocimus, 904.
LEUCIPPUS, 135, 1065.
*Leucoblepharon* = Branta, 984.
*Leucocarbo* = Phalacrocorax, 1006.
*Leucocerca* = Rhipidura, 276.
*Leucochloridia* = Cyanomitra, 702.
LEUCOCHLORIS, 147.
*Leucodioptron* = Trochalopteron, 321.
*Leucogeranus* = Grus, 921.
*Leucolia* = Agyrtria, 135.
*Leucomelæna* = Columba, 748.
*Leucometopon* = Enneoctonus, 485.
*Leucomimus* = Mimus, 415.
*Leuconerpes* = Melanerpes, 68.
*Leuconotopicus* = Picus, 70.
*Leucopareia* = Branta, 984.
LEUCOPEZA, 430.
LEUCOPHÆUS, 1026.
*Leucophantes* = Pœcilodryas, 271.
*Leucophoyx* = Herodias, 912.
*Leucophrys* = Ploceipasser, 569.
*Leucopitta* = Pitta, 207.
*Leucopolius* = Ægialitis, 939.
LEUCOPTERNIS, 860.
LEUCOSARCIA, 774.
LEUCOSPIZIAS, 841.
*Leucosticte* = Montifringilla, 594.
*Leucotænia* = Columba, 748.
LEUCOTRERON, 735.
*Leucuria* = Helianthea, 1067.
*Leucus* = Larus, 1021.
*Lewinia* = Hypotænidia, 961.
LICHENOPS, 229, 1075.
*Lichenostomus* = Ptilotis, 719.
*Lichmera* = Meliornis, 723.
*Lichtensteinipicus* = Hemilophus, 81.
LICMETIS, 3.
*Licmetulus* = Loriculus, 22.
LIGEA, 436.
*Ligia* = Ligea, 436.
*Lignobucco* = Barbatula, 37.
LIGURINUS, 609.
*Lillia* = Hirundo, 253.
LIMICOLA, 952.
*Limicola* = Totanus, 946.
*Limicula* = Limosa, 945.
*Limnaëtus* = Spizaëtus, 848.
*Limnetes* = Chætusia, 936.
*Limnobænus* = Rallina, 965.
*Limnocinclus* = Tringa, 950.
LIMNOCORAX, 972.
LIMNOCRYPTES, 955.
*Limnodromus* = Microrhamphus, 946.
*Limnogeranus* = Grus, 921.
*Limnopardalus* = Rallus, 959.
*Limnophalus* = Anthracoceros, 100.
LIMNOPHYES, 196.
LIMNORNIS, 196.
*Limnospiza* = Embernagra, 638.
*Limoneres* = Dinemellia, 570.
LIMONIDROMUS, 445.
LIMOSA, 945.
*Linacanthis* = Cannabina, 589.
*Linaria* = Cannabina, 589.
*Linnæipicus* = Melanerpes, 68.
*Linota* = Cannabina, 589.
*Linura* = Vidua, 574.
*Linurgus* = Pyrrhospiza, 604.
LIOCICHLA, 347.
*Lioparus* = Alcippe, 345.
*Liopipo* = Picus, 70.
LIOPTILA, 413.
LIOPTILUS, 273, 1080-81.
LIOSCELES, 167.
LIOTHRIX, 347.
LIPAUGUS, 213.
LIPOA, 788.
*Lipoceutrus* = Phœnicoparrus, 908.
*Liponyx* = Rollulus, 815.
*Lisoria* = Saucerottea, 137.
*Lissotis* = Otis, 925.
*Lithænas* = Columba, 748.
*Lithofalco* = Hypotriorchis, 872.
*Lithotentha* = Certhionyx, 719.
*Lobibyx* = Lobivanellus, 934.
LOBIOPHASIS, 799.
*Lobiospiza* = Erythrura, 583.
*Lobipes* = Phalaropus, 957.

Digitized by Google

*Lobipluvia* = Sarciophorus, 933.
Lobivanellus, 934.
Loboparadisea, 524.
*Lobopsis* = Paradigalla, 524.
Loborhamphus, 1105.
Lobornis, 357.
Lobospingus, 584.
Lobotus, 300.
*Lochites* = Thamnophilus, 182.
Lochmias, 202.
*Lochmophasis* = Pucrasia, 801.
Locustella, 370.
Loddigesia, 166.
*Loddigesiornis* = Loddigesia, 166.
*Loidorusa* = Lædorusa, 305.
*Lomvia* = Uria, 1043.
*Lonchura* = Uroloncha, 585.
*Londra* = Melanocorypha, 452.
*Lophaithya* = Podicipes, 1040.
*Lophalector* = Lophura, 798.
*Lophastur* = Baza, 866.
Lophoaetus, 850.
Lophoceros, 103.
*Lophocerus* = Pauxis, 790.
*Lophochroa* = Cacatua, 2.
*Lophocitta* = Platylophus, 509.
*Lophocorax* = Cyanocitta, 511.
*Lophocoryphus* = Gubernatrix, 620.
Lophodytes, 1003.
Lophogyps, 829.
*Lophoictinia* = Milvus, 862.
Lopholæmus, 748.
*Lopholaimus* = Lopholæmus, 748.
*Lophophalaris* = Fulica, 977.
Lophophanes, 465, 1101.
Lophophaps, 767.
*Lophophasianus* = Catreus, 801.
*Lophophera* = Lophophorus, 797.
Lophophorus, 797.
*Lophopsarus* = Fregilupus, 548.
Lophorhina, 522.
*Lophorhynchus* = Cariama, 924.
*Lophorhynchus* = Lopholæmus, 748.
*Lophorinus* = Lophornis, 165.
Lophornis, 165.
Lophortyx, 819, 1116.
*Lophospingus* = Coryphospingus, 642.
*Lophospiza* = Coryphospingus, 642.
*Lophospizias* = Astur, 840.
Lophostrix, 886.
*Lophotes* = Baza, 866.
*Lophotetrax* = Pucrasia, 801.
Lophotibis, 902.
*Lophotis* = Afrotis, 924.
Lophotriccus, 233, 1075.
Lophotriorchis, 849.
Lophozosterops, 713.
Lophura, 798.
*Lophyrus* = Goura, 775.
Loria, 524.
Loriculus, 22.
Lorius, 29, 1054.
Loxia, 604, 1109.
Loxigilla, 613.
Loximitris, 593.
Loxioides, 605.
*Loxipasser* = Loxigilla, 613.
Loxops, 594.
*Loxopterus* = Campylopterus, 133.
*Lucifer* = Calothorax, 160.
*Lucotoa* = Saxicola, 388.
*Lullula* = Galerida, 457.
Lunda, 1046.
*Lupha* = Fulica, 977.
Lurocalis, 118.
*Luscinia* = Aëdon, 382.
Lusciniola, 371, 1090.
*Lusciniopsis* = Locustella, 370.
*Lusciola* = Aëdon, 382.
*Lusciola* = Hypolais, 373.
Lybius, 1055.
*Lychnidospiza* = Lagonosticta, 577.
Lycocorax, 517.
*Lycornis* = Fulica, 977.
*Lycos* = Colæus, 505.
Lyncornis, 119, 1063.
*Lypornix* = Monasa, 48.
*Macabra* = Syrnium, 890.
*Macagua* = Herpetotheres, 833.
*Macartneya* = Lophura, 798.
*Maceranas* = Oedemia, 999.
Macgregoria, 524.
Machærhamphus, 865.
Machærirhynchus, 285.
Machæropterus, 221.
*Macheirhamphus* = Machærirhynchus, 285.
*Machetes* = Pavoncella, 948.
Machetornis, 229.
Machlolophus, 464.
Macragelæus, 561.
*Macroagelaius* = Macragelæus, 561.
*Macrocephalon* = Megacephalon, 789.
*Macrocercus* = Ara, 10.
*Macrocorax* = Corvus, 502.
Macrodipteryx, 120.
Macronus, 341.
Macronyx, 449.
*Macropicus* = Hemilophus, 81.
Macropsalis, 120.
Macropteryx, 130.

Digitized by Google

*Macropus* = Somateria, 1000.
MACROPTGIA, 754, 1114.
MACRORHAMPHUS, 946.
*Macrorhamphus* = Oedemia, 999.
MACROSPHENUS, 314, 1086.
*Macrotarsius* = Rhinoptilus, 931.
*Macrotarsus* = Himantopus, 942.
MACRUROPSAR, 543.
MAGALESTRIS, 1027.
*Maia* = Munia, 586.
*Maina* = Gracula, 539.
*Mainatus* = Gracula, 539.
MAJAQUEUS, 1033.
MALACIAS, 324.
*Malacocercus* = Acanthoptila, 322.
*Malacocercus* = Crateropus, 329.
*Malacocichla* = Cathiarus, 393.
MALACOCINCLA, 332, 1087.
MALACONOTUS, 489, 1103-4.
*Malacopterum* = Malacopteron, 337.
MALACOPTERON, 337, 1087.
MALACOPTILA, 47.
MALACORHYNCHUS, 995.
*Malacorhynchus* = Hymenolæmus, 1002.
*Malacorhynchus* = Merulaxis, 167.
*Malacortyx* = Ophrysia, 818.
MALACOTHRAUPIS, 655, 1111.
*Malacoturnix* = Ophrysia, 818.
*Malcirops* = Zosterops, 705.
*Malcoha* = Phoenicophaës, 59.
*Malcolmia* = Argya, 323.
*Malherbipicus* = Colaptes, 62.
MALIA, 342.
MALIMBUS, 568.
MALURUS, 367, 1090.
MANACUS, 1074.
*Manacus* = Chiromachæris, 222.
*Mangusia* = Anthreptes, 703.
*Manikup* = Pithys, 1069.
*Manilia* = Calothorax, 160.
MANORHINA, 723.
MANUCODIA, 518.
*Maracana* = Conurus, 11.
MARECA, 991.
*Margarochrysis* = Lampornis, 145.
MARGAROPERDIX, 812.
MARGAROPS, 414.
MARGARORNIS, 191, 1071.
*Marila* = Ethyia, 996.
*Marila* = Fuligula, 997.
*Marilochen* = Anser, 982.
*Mariposa* = Uræginthus, 582.
MARMARONETTA, 995.
*Marquetia* = Pytelia, 578.
*Marsyas* = Sporadinus, 142.
MASCARINUS, 18.
MASIUS, 220, 1074.
*Mataeoptera* = Alca, 1043.
*Mecistura* = Acredula, 466.
MECOCERCULUS, 227, 1075.
MEGABIAS, 284, 1082.
*Megacephala* = Megacephalon, 789.
MEGACEPHALON, 789.
*Megaceryle* = Ceryle, 114.
MEGACREX, 964.
MEGADYPTES, 1048.
MEGALÆMA, 38.
*Megalestes* = Pœcilodryas, 271.
*Megalonyx* = Hylactes, 168.
*Megaloperdix* = Tetraogallus, 806.
*Megalophonus* = Mirafra, 455.
*Megalophonus* = Tephrocorys, 454.
*Megalophus* = Muscivora, 244.
MEGALOPREPIA, 742.
*Megalopterus* = Anous, 1018.
*Megalopterus* = Lamprotornis, 544.
*Megalorhynchus* = Calorhamphus, 38.
*Megalornis* = Grus, 921.
*Megalotis* = Pyrrhulauda, 459.
MEGALURULUS, 324.
MEGALURUS, 351, 1088.
*Megapelia* = Goura, 775.
*Megapelia* = Scotopelia, 879.
*Megapicus* = Campephilus, 80.
MEGAPODIUS, 786, 1115.
*Megaptynx* = Bubo, 880.
*Megaquiscalus* = Quiscalus, 559.
MEGARHYNCHUS, 244.
*Megascops* = Scops, 882.
*Megastoma* = Megarhynchus, 244.
*Megastrix* = Strix, 898.
*Megatriorchis* = Erythrotriorchis, 847.
*Megerodius* = Ardea, 909.
*Meiglyptes* = Miglyptes, 77.
MELÆNORNIS, 286.
*Melagavia* = Larus, 1021.
*Melampicus* = Melanerpes, 68.
*Melampitta* = Coracocichla, 210.
MELANERPES, 68.
*Melanibyx* = Hæmatopus, 932.
MELANICHLORA, 460.
*Melanitta* = Oedemia, 999.
*Melanobucco* = Pogonorhynchus, 35.
*Melanocarbo* = Phalacrocorax, 1006.
MELANOCHARIS, 676.
MELANOCICHLA, 327, 1086.
MELANOCORYPHA, 452.
*Melanodera* = Phrygilus, 610.
*Melanodiglossa* = Diglossa, 685.
*Melanodryas* = Petroeca, 266.

Digitized by Google

*Melanolarus* = Larus, 1021.
*Melanomitris* = Chrysomitris, 591.
*Melanonetta* = Œdemia, 999.
*Melanonyx* = Anser, 982.
*Melanopareia* = Synallaxis, 197.
MELANOPARUS, 460.
*Melanopelargus* = Ciconia, 905.
*Melanopepla* = Melænornis, 286.
MELANOPERDIX, 815.
*Melanophoyx* = Ardea, 909.
*Melanopitta* = Pitta, 207.
*Melanopsar* = Pendulinus, 556.
MELANOPTERYX, 567, 1107.
MELANOPTILA, 414.
MELANOPYRRHUS, 540.
MELANORHECTES, 495.
*Melanospiza* = Loxigilla, 613.
MELANOTIS, 417.
*Melanotrochilus* = Florisuga, 134.
*Melasoma* = Melænornis, 286.
MELEAGRIS, 796.
*Meliarchus* = Philemon, 726.
*Melias* = Phoenicophaës, 59.
*Melichæra* = Anellobia, 724.
*Melicophila* = Certhionyx, 719.
MELIDECTES, 727.
*Melidipnus* = Melilestes, 718.
MELIDORA, 105.
MELIERAX, 838.
MELIGNOMON, 35.
*Meliguothes* = Indicator, 34.
MELILESTES, 718.
MELIORNIS, 723.
MELIPHAGA, 719.
MELIPOTES, 728.
MELIRRHOPHETES, 728.
*Melisseus* = Bhringa, 532.
*Melisyupotes* = Meliornis, 723.
MELITHREPTUS, 714.
MELITOGRAIS, 726.
*Melittarchus* = Tyrannus, 252.
*Melittias* = Melittophagus, 96.
MELITTOPHAGUS, 96, 1061.
*Melittophas* = Merops, 96.
*Melittotheres* = Merops, 96.
MELIZOPHILUS, 375, 1090.
MELLISUGA, 164.
MELOCICHLA, 362.
*Melodes* = Calliope, 383.
*Melonetta* = Harelda, 999.
*Melopeleia* = Melopelia, 758.
MELOPELIA, 758.
MELOPHUS, 624.
MELOPSITTACUS, 27.
MELOPYRRHA, 618.
MELOSPIZA, 632, 1110-11.
*Melozone* = Pyrgisoma, 635.
*Melpoda* = Sporæginthus, 581.
*Menetica* = Siphia, 292.
*Meniceros* = Buceros, 100.
MENURA, 729.
MERGANETTA, 1002.
MERGANSER, 1003.
*Mergellus* = Mergus, 1003.
*Mergoides* = Netta, 996.
MERGULUS, 1043.
MERGUS, 1003.
*Merion* = Chlorostilbon, 141.
*Meristes* = Malaconotus, 489.
*Meropicus* = Melanerpes, 68.
*Meropiscus* = Melittophagus, 96.
*Meropixus* = Ixidia, 308.
MEROPOGON, 97.
MEROPS, 96, 1061.
MERULA, 394, 1092.
MERULAXIS, 167.
*Merva* = Rimator, 332.
*Meseidus* = Syrnium, 890.
*Mesia* = Liothrix, 347.
*Mesites* = Mesoenas, 959.
*Mesitornis* = Mesœnas, 959.
*Mesobucco* = Xantholæma, 39.
MESOENAS, 959.
MESOLOPHUS, 308
*Mesomorpha* = Bubo, 880.
*Mesophila* = Phaethornis, 131.
*Mesophoyx* = Herodias, 912.
MESOPICUS, 76, 1059.
*Mesoscolopax* = Numenius, 944.
MESOSPILUS, 67.
METABOLUS, 271.
*Metallococcyx* = Chrysococcyx, 52.
METALLURA, 155, 1067.
*Methon* = Chalybura, 144.
METOPIA, 220.
METOPIANA, 996.
*Metopias* = Metopiana, 996.
METOPIDIUS, 957.
*Metoponia* = Serinus, 599.
METOPOTHRIX, 220, 1074.
METRIOPELIA, 765.
*Methriopterus* = Harporhynchus, 417.
MEZOTHERON, 736.
*Micranous* = Anous, 1018.
MICRASTUR, 837.
*Micrathene* = Micropallas, 898.
*Microbates* = Rhamphocœnus, 176.
*Microcarbo* = Phalacrocorax, 1006.
MICROCERCULUS, 429, 1096.
*Microcercus* = Oligura, 343.



Digitized by Google

*Microchelidon* = Atticora, 257.
*Microchelidon* = Dicæum, 676.
MICROCHERA, 164.
*Microcichla* = Henicurus, 449.
*Microcnus* = Zebrilus, 915.
*Microcolaptes* = Picumnus, 83.
*Microcolaptes* = Sasia, 85.
*Microcorax* = Corvus, 502.
*Microcygna* = Nettopus, 981.
*Microdactylus* = Cariama, 924.
MICRODYNAMIS, 55.
*Microdyptes* = Catarrhactes, 1047.
MICROECA, 263, 1080.
*Microglaux* = Glaucidium, 896.
MICROGLOSSUS, 1, 1053.
MICROHIERAX, 868.
MICROLESTES, 268.
MICROLIGEA, 1097.
MICROMONACHA, 48.
MICROPALAMA, 946.
MICROPALLAS, 898.
MICROPARRA, 958.
*Micropelia* = Scardafella, 762.
MICROPERDIX, 813.
*Micropicus* = Hemicercus, 81.
*Micropogon* = Capito, 41.
*Micropogon* = Trachyphonus, 40.
*Micropsilla* = Nasiterna, 23.
*Micropsites* = Nasiterna, 23.
*Microptera* = Philohela, 955.
MICROPTERNUS, 78.
*Micropterus* = Philohela, 955.
*Micropterus* = Tachyeres, 998.
*Microptynx* = Glaucidium, 896.
*Micropus* = Brachypodius, 308.
*Micropus* = Cypselus, 125.
*Microrhopias* = Formicivora, 177.
*Microsarcops* = Lobivanellus, 934.
*Microscelis* = Hypsipetes, 315.
MICROSITTACE, 13.
MICROSPINGUS, 650.
*Microstictus* = Hemilophus, 81.
MICROTARSUS, 309.
*Microtribonyx* = Tribonyx, 973.
*Microura* = Pnoepyga, 430.
*Microuria* = Endomychura, 1044.
MIGLYPTES, 77.
MILIARIA, 623.
*Milornis* = Phaethornis, 131.
MILVAGO, 833.
*Milvaquila* = Haliastur, 862.
MILVULUS, 252.
MILVUS, 862.
*Mimeta* = Oriolus, 525.
*Mimetes* = Mimus, 415.
*Mimetes* = Oriolus, 525.
MIMOCICHLA, 394.
*Mimocitta* = Mimocichla, 394.
*Mimokitta* = Mimocichla, 394.
MIMUS, 415, 1095.
MINLA, 313, 1088.
MINO, 540.
MIONECTES, 236, 1075-76.
MIRAFRA, 455, 1099.
MIRO, 270.
MISOCALIUS, 52.
MITREPHANES, 247, 1077.
*Mitrephorus* = Mitrephanes, 247.
*Mitrospingus* = Eucometis, 1111.
*Mitu* = Mitua, 790.
MITUA, 790.
*Mituporanga* = Crax, 789.
MIXORNIS, 310, 1087.
*Mixornis* = Zosterornis, 339.
MNIOTILTA, 432.
MOHO, 727.
*Mohoua* = Clitonyx, 469.
*Molobrus* = Molothrus, 552.
MOLOTHRUS, 552, 1106.
MOLPASTES, 304.
*Molybdophanes* = Harpiprion, 902.
MOMOTUS, 94, 1061.
*Momus* = Phaethornis, 131.
*Monacha* = Monarcha, 289.
*Monacha* = Monasa, 48.
MONACHALCYON, 105.
MONACHELLA, 271.
*Monachus* = Sylvia, 374.
MONARCHA, 289, 1083.
*Monarches* = Monarcha, 289.
MONASA, 48.
*Monastes* = Monasa, 48.
*Monaulus* = Lophophorus, 797.
*Monedula* = Colæus, 505.
*Monornis* = Chalcophaps, 766.
MONTICOLA, 392.
MONTIFRINGILLA, 594, 1109.
*Morinella* = Arenaria, 949.
*Marinellus* = Eudromias, 938.
*Moris* = Sula, 1011.
*Mormolycia* = Lagonosticta, 577.
*Mormon* = Fratercula, 1046.
MOROCOCCYX, 61.
MORPHINUS, 847.
*Morus* = Sula, 1011.
*Moschatus* = Cairina, 980.
MOTACILLA, 442, 1098.
MOUPINIA, 346.
MULLERIA, 335.
MULLERIPICUS, 1059.

Digitized by Google

*Mulleripicus* = Hemilophus, 81.
*Mulsantia* = Loddigesia, 166.
MUNIA = 586.
*Muscadivora* = Carpophaga, 743.
MUSCICAPA, 262, 1079, 1081.
MUSCICAPULA, 294, 1083.
MUSCIGRALLA, 230.
MUSCIPARUS, 267.
*Muscipeta* = Acrocephalus, 368.
*Muscipeta* = Muscivora, 244.
*Muscipeta* = Terpsiphone, 280.
MUSCIPIPRA, 229.
MUSCISAXICOLA, 230, 1075.
*Muscisylvia* = Notodela, 384.
MUSCITREA, 1080.
*Muscitrea* = Pachycephala, 476.
MUSCIVORA, 244, 1077.
*Muscivora* = Terpsiphone, 280.
MUSCYLVA, 270.
*Musicus* = Dicrurus, 529.
MUSOPHAGA, 90.
*Mustelirallus* = Porzana, 967.
*Myazanthe* = Dicæum, 676.
MYCEROBAS, 611.
MYCTERIA, 907.
*Myiabeillia* = Abeillia, 164.
*Myiacleptes* = Conopias, 242.
MYIADECTES, 406, 1094.
*Myiadestes* = Myiadectes, 406.
*Myiætina* = Eutoxeres, 133.
MYIAGRA, 282, 1082.
*Myiagroides* = Megabias, 284.
*Myialestes* = Culicicapa, 282.
MYIARCHUS, 250, 1078.
MYIOBIUS, 245, 1077.
*Myioborus* = Setophaga, 441.
MYIOCEYX, 111.
MYIOCHANES, 249.
*Myiocichla* = Cichlopsis, 407.
*Myioctonus* = Myiodioctes, 442.
MYIODIOCTES, 442, 1098.
MYIODYNASTES, 243, 1077.
*Myiolestes* = Hemipus, 497.
*Myiomela* = Notodela, 384.
*Myiomoira* = Petrœca, 266.
*Myionax* = Myiarchus, 250.
*Myiopagis* = Elaïnea, 239.
MYIOPATIS, 238, 1076.
*Myiophaga* = Myiophoneus, 407.
*Myiophila* = Diaphorophyia, 265.
*Myiophila* = Fluvicola, 227.
*Myiophobus* = Myiobius, 245.
MYIOPHONEUS, 407.
*Myiopsar* = Pœoptera, 546.
MYIOPSITTA, 14.
*Myiopsittacus* = Myiopsitta, 14.
*Myioscopus* = Miro, 270.
*Myiosobus* = Tricholestes, 315.
*Myiosympotes* = Hapalocercus, 234.
*Myiothera* = Formicarius, 171.
MYIOTHERETES, 225.
*Myiothlypis* = Basileuterus, 438.
*Myiotrichas* = Grallaria, 169.
*Myioturdus* = Grallaria, 169.
*Myiozeta* = Myiozetetes, 241.
MYIOZETETES, 241, 1077.
*Myletes* = Amazilia, 138.
*Myocincla* = Formicarius, 171.
*Myolestes* = Colluricincla, 495.
*Myoptila* = Colluricincla, 495.
MYOPORNIS, 1082.
*Myospiza* = Ammodramus, 1110.
*Myothera* = Pitta, 207.
MYRISTICIVORA, 747.
MYRMECIZA, 174, 1069.
MYRMECOCICHLA, 391.
MYRMELASTES, 181, 1070.
MYRMIA, 161.
*Myrmoborus* = Hypocnemis, 173.
MYRMOCHANES, 176.
*Myrmonax* = Myrmeciza, 174.
*Myrmophila* = Myrmotherula, 178.
*Myrmornis* = Formicarius, 171.
*Myrmoterium* = Myrmotherula, 178.
*Myrmothera* = Grallaria, 169.
MYRMOTHERULA, 178, 1070.
*Myrtha* = Syrnium, 890.
MYRTIS, 161.
*Mystacinus* = Panurus, 469.
MYSTACORNIS, 314.
*Mystrorhamphus* = Ajaja, 905.
*Mytinia* = Prymnacantha, 165.
MYZA, 724.
*Myzantha* = Manorhina, 723.
MYZOMELA, 714, 1113.
MYZORNIS, 347.
*Nabouroupus* = Amydrus, 545.
NÆNIA, 1018.
*Nandayus* = Conurus, 11.
*Nania* = Eriocnemis, 153.
NANNOCHORDEILES, 119.
*Nannocnus* = Ardetta, 914.
*Nannopipo* = Verreauxia, 84.
NANNOPTERUM, 1010.
*Nannothera* = Malacocincla, 332.
NANODES, 27.
*Napodes* = Timelia, 339.
*Napophila* = Nyctiornis, 97.
*Napothera* = Erythrocichla, 336.
*Napothera* = Trichixus, 409.

Digitized by Google

NASICA, 187.
NASITERNA, 23, 1054.
NAUCLERUS, 863.
*Necrosyrtes* = Neophron, 830.
NECTARINIA, 694.
*Nectarophila* = Leptocoma, 699.
*Nectris* = Puffinus, 1030.
NELICURVIUS, 567.
*Nematophora* = Seleucides, 520.
*Nematura* = Syrrhaptes, 776.
*Nemoricola* = Gallinago, 952.
*Nemoricola* = Limonidromus, 445.
*Nemoriraga* = Limonidromus, 445.
NEMOSIA, 653.
*Nemura* = Tarsiger, 384.
NENEBA, 719.
*Nengetus* = Tænioptera, 225.
*Neochelidon* = Atticora, 257.
NEOCHLOE, 473.
NEOCHMIA, 583.
NEOCICHLA, 412.
NEOCORYS, 448.
NEOCOSSYPHUS, 410.
*Neocrex* = Porzana, 967.
NEOCTANTES, 181.
NEODREPANIS, 694.
NEOLESBIA, 143.
NEOLESTES, 488.
NEOMIXIS, 1089.
*Neomixis* = Eroessa, 354.
*Neomorpha* = Heteralocha, 516.
NEOMORPHUS, 61.
*Neomyias* = Rhipidura, 276.
NEOPELMA, 223.
*Neophema* = Euphema, 25.
NEOPHRON, 830, 1116.
NEOPIPO, 221.
*Neops* = Neositta, 682.
*Neops* = Xenops, 192.
NEOPSITTACUS, 33.
*Neopus* = Ictinaëtus, 850.
NEORHYNCHUS, 614.
*Neornis* = Cettia, 372.
*Neornis* = Glossiptila, 689.
*Neoscolopax* = Scolopax, 955.
NEOSITTA, 682.
*Neospiza* = Amblyospiza, 1107.
*Neotis* = Otis, 925.
NEPHŒCETES, 129.
*Nertus* = Ictinia, 864.
*Nesacanthis* = Foudia, 566.
*Neshyphantes* = Foudia, 566.
*Nesierax* = Nesihierax, 869.
NESIHIERAX, 869.
NESILLAS, 1088.
NESOBATES, 1087.
NESOCELEUS, 79.
*Nesocentor* = Centropus, 55.
NESOCHARIS, 1108.
*Nesochen* = Branta, 984.
NESOCICHLA, 406.
*Nesococcyx* = Coccyzus, 53.
*Nesoctites* = Picumnus, 83.
NESŒNAS, 753.
*Nesolimnas* = Cabalus, 962.
NESOMIMUS, 416, 1095.
NESONETTA, 995.
NESOPELIA, 758.
NESOPSAR, 555.
NESOSPINGUS, 647.
NESOSPIZA, 640.
NESOTRICHUS, 251.
NESTOR, 27, 1054.
NETTA, 996.
*Nettalopex* = Casarca, 989.
*Nettarion* = FULIGULA, 997.
*Nettion* = Querquedula, 992.
NETTOPUS, 981.
NEWTONIA, 266.
*Nexiteles* = Podilymbus, 1042.
NICATOR, 493.
*Niche* = Eriocnemis, 153.
*Nicoclarius* = Cuculus, 51.
*Nigrilauda* = Melanocorypha, 452.
NIGRITA, 575, 1108.
NILAUS, 488.
NILTAVA, 294.
NINOX, 887.
*Niobe* = Penthetria, 573.
*Nipponia* = Ibis, 900.
*Nisaëtus* = Eutolmaëtus, 850.
*Nisastur* = Astur, 839.
*Nisius* = Thamnophilus, 182.
*Nisoria* = Sylvia, 374.
*Nisuella* = Asio, 877.
*Nisuella* = Bubo, 880.
*Nisus* = Accipiter, 844.
*Nitidula* = Tarsiger, 384.
*Nitiocorys* = Anthus, 445.
*Noethura* = Nothoprocta, 784.
*Noctua* = Athene, 894.
*Nodalia* = Heliangelus, 155.
*Nomadites* = Pastor, 537.
NOMONYX, 1001.
*Nomusia* = Chætusia, 936.
NONNULA, 48.
NOTAUGES, 548.
*Notharcus* = Bucco, 46
*Nothera* = Nothura, 785.
*Notherodius* = Aramus, 920.

Digitized by Google

Nothocercus, 782.
Nothocrax, 790.
Nothoprocta, 784, 1115.
*Nothriscus* = Bucco, 46.
*Nothrophrontes* = Thrasaetus, 848.
Nothura, 785.
*Nothurus* = Rhynchotus, 784.
*Notiochelidon* = Atticora, 257.
Notodela, 384.
*Notophoyx* = Ardea, 909.
Notornis, 976.
Nucifraga, 506.
Numenius, 944.
Numida, 804.
Nuttallornis, 1078.
*Nuttallornis* = Contopus, 248.
*Nyctaetus* = Bubo, 880.
*Nyctagreus* = Antrostomus, 1063.
Nyctala, 893, 1117.
*Nyctalops* = Asio, 877.
Nyctanassa, 918.
Nyctea, 894.
*Nycterodius* = Nyctanassa, 918.
*Nycterodius* = Nycticorax, 917.
*Nycthemerus* = Gennæus, 800.
*Nycthierax* = Surnia, 894.
*Nyctiardea* = Nycticorax, 917.
Nyctibius, 117, 1063.
*Nycticeyx* = Dacelo, 104.
*Nyctichelidon* = Caprimulgus, 122.
Nycticorax, 917.
Nyctidromus, 121, 1063.
*Nyctinomus* = Nyctiornis, 97.
Nyctiornis, 97.
*Nyctipetes* = Glaucidium, 896.
Nyctiprogne, 118.
*Nyctornis* = Nyctibius, 117.
*Nymphæus* = Rhyacornis, 273.
Nymphicus, 26.
*Nyroca* = Æthyia, 996.
*Nystactes* = Bucco, 46.
*Nystalus* = Bucco, 46.
*Nystastes* = Capito, 41.
Oceanites, 1029.
Oceanodroma, 1028.
*Oceanus* = Stercorarius, 1027.
*Ochetorhynchus* = Upucerthia, 203.
*Ochromela* = Siphia, 292.
*Ochthites* = Muscigralla, 230.
Ochthodiæta, 225, 1074.
*Ochthodromus* = Charadrius, 937.
Ochthoeca, 226, 1075.
Ochthornis, 227.
*Oceniscus* = Butorides, 915.
*Octopteryx* = Guira, 62.
Ocyalus, 549.
*Ocyceros* = Lophoceros, 103.
Ocydromus, 964.
*Ocypetes* = Thinocorus, 780.
Ocyphaps, 768.
*Ocypterus* = Artamus, 533.
*Ocyris* = Emberiza, 620.
*Odonterus* = Yuhina, 346.
Odontophorus, 822.
Odontorhynchus, 421, 1095.
*Odontriorchis* = Leptodon, 866.
Œdemia, 999.
Œdicnemus, 927.
Œdirhinus, 739.
Œdistoma, 718.
Œna, 765.
*Œnanthe* = Saxicola, 388.
*Œnas* = Pteroclurus, 776.
*Œnolimnas* = Amaurornis, 972.
*Œnops* = Rhinogryphus, 828.
Œstrelata, 1033.
*Ogonorhynchus* = Conurus, 11.
*Oidemia* = Œdemia, 999.
*Olbiorchilus* = Anorthura, 1096.
*Oligocercus* = Sylviella, 354.
*Oligomyodrus* = Cinnamopterus, 545.
Oligura, 343.
*Oligura* = Sylviella, 354.
*Ololygon* = Cacomantis, 52.
*Ombria* = Phaleris, 1046.
*Omeotreron* = Ptilopus, 735.
*Ommatornis* = Acropternis, 168.
Oncostoma, 232.
*Onochrus* = Chrysotis, 4.
*Onocrotalus* = Pelecanus, 1005.
*Onopopelia* = Turtur, 761.
*Onychaëtus* = Ictinaëtus, 850.
*Onychoprion* = Sterna, 1014.
*Onychopterus* = Myiarchus, 250.
Onychorhynchus, 1077.
*Onychorhynchus* = Muscivora, 244.
*Onychospina* = Emberiza, 620.
*Onychospiza* = Montifringilla, 594.
*Onychotes* = Buteo, 855.
Onycognathus, 545.
*Opæthus* = Turacus, 88.
*Opetioptila* = Aburria, 794.
*Opetiorhynchos* = Furnarius, 203.
*Ophiotheres* = Serpentarius, 827.
*Ophoaetus* = Spilornis, 834.
*Ophrydornis* = Malacopteron, 337.
Ophrysia, 818.
Opisthocomus, 794.
*Opistholophus* = Chauna, 979.
Opisthoprora, 156.

Digitized by Google

*Opopsitta* = Cyclopsitta, 33.
Oporornis, 436, 1097.
*Oræpithus* = Serinus, 599.
Orchesticus, 644.
Orchilus, 233.
*Oreas* = Cochoa, 284.
*Oreias* = Lagopus, 826.
Oreicola, 273.
Oreocharis, 674.
Oreocincla, 403, 1094.
Oreocorys, 449.
*Oreoctistes* = Lædorusa, 305.
Oreoica, 482.
Oreomanes, 686.
Oreomyza, 692.
Oreonympha, 159.
*Oreopeleia* = Geotrygon, 770.
*Oreoperdix* = Arboricola, 813.
Oreophasis, 791.
Oreophilus, 933.
*Oreopneuste* = Lusciniola, 371.
Oreopsittacus, 32, 1055.
Oreopyra, 148.
Oreortyx, 818.
Oreoscoptes, 415.
*Oreospiza* = Atlapetes, 636.
*Oreospiza* = Oreostruthus, 584.
*Oreosterops* = Zosterops, 705.
Oreostruthus, 584.
*Oreotetrax* = Tetraogallus, 806.
*Oreothlypis* = Parula, 432.
Oreothraupis, 644.
Oreotrochilus, 147.
*Orescius* = Harpactes, 88.
*Oreskios* = Harpactes, 88.
*Oressochen* = Chloëphaga, 985.
*Oricocercus* = Diphyllodes, 519.
Origma, 352.
Oriolia, 499.
*Oriolinus* = Hyphantornis, 561.
Oriolus, 525, 1105.
*Orites* = Acredula, 466.
*Orites* = Montifringilla, 594.
Ornithion, 238, 1076.
*Ornithomyia* = Heliomaster, 160.
*Orocetes* = Monticola, 392.
*Oropeleia* = Geotrygon, 770.
*Orospina* = Emberiza, 620.
*Orospina* = Pseudochloris, 639.
*Orpheus* = Hypsipetes, 315.
*Orpheus* = Mimus, 415.
*Orphryzone* = Arses, 288.
Ortalida, 792.
*Ortalis* = Ortalida, 792.
Orthnocichla, 430.
*Orthnocichla* = Pseudoxenicus, 1088.
*Orthocolaptes* = Dendrocolaptes, 185.
*Orthocorys* = Opisthocomus, 794.
Orthogonys, 658.
*Orthologhus* = Anorrhinus, 102.
Orthonyx, 729.
*Orthorhamphus* = Esacus, 928.
*Orthorhinus* = Pomatorhinus, 325
Orthorhynchus, 164.
*Orthornis* = Phaethornis, 131.
Orthotomus, 361.
*Ortygarchus* = Aramides, 963.
*Ortygia* = Colinus, 820.
*Ortygion* = Coturnix, 815.
*Ortygis* = Turnix, 778.
Ortygocichla, 335.
*Ortygodes* = Turnix, 778.
*Ortygometra* = Crex, 966.
*Ortygonax* = Rallus, 959.
*Ortygops* = Coturnicops, 970.
*Ortygornis* = Francolinus, 807.
Ortygospiza, 577.
*Ortyx* = Colinus, 820.
*Ortyx* = Turnix, 778.
Ortyxelus, 930.
*Orynx* = Pyromelana, 571.
*Oryx* = Pyromelana, 571.
Oryzoborus, 613.
*Oryzornis* = Padda, 588.
*Osalia* = Chætocercus, 163.
Osculatia, 770.
Osmotreron, 733.
Ossifraga, 1036.
*Osteorophea* = Leptoptilus, 907.
Ostinops, 550.
*Ostralega* = Hæmatopus, 932.
*Otagon* = Turnagra, 329.
*Othello* = Thamnophilus, 182.
*Othyphantes* = Heterhyphantes, 564.
Otidiphaps, 774.
*Otipne* = Pseudocolaptes, 196.
Otis, 925.
Otocompsa, 304.
Otocorys, 451, 1098-99.
*Otocoryx* = Otocorys, 451.
*Otodytes* = Podicipes, 1040.
Otogyps, 829.
*Otomela* = Enneoctonus, 485.
Otophanes, 121.
*Otostilus* = Parotia, 522.
*Otothrix* = Batrachostomus, 116.
*Otus* = Asio, 877.
*Ourax* = Pauxis, 790.
*Oxycerca* = Munia, 586.
Oxyechus, 939.

Digitized by Google

*Oxyglossus* = Mniotilta, 432.
Oxylabes, 338.
*Oxylophus* = Coccystes, 49.
*Oxynotus* = Lalage, 302.
Oxypelia, 764.
Oxypogon, 158.
*Oxypyga* = Sclerurus, 191.
Oxyrhamphus, 224.
*Oxyrhynchus* = Oxyrhamphus, 224.
*Oxystomus* = Creadion, 516.
*Oxytelus* = Ortyxelus, 930.
*Oxyura* = Erismatura, 1001.
Oxyurus, 201.
Pachycare, 481.
Pachycephala, 476, 1102.
Pachycephalixus, 306.
Pachycephalopsis, 481, 1102.
Pachycoccyx, 50.
*Pachyglossa* = Prionochilus, 674.
Pachynus, 6, 1053.
Pachyphantes, 567.
*Pachyprora* = Batis, 264.
*Pachyptila* = Prion, 1037.
*Pachyptynx* = Bubo, 880.
Pachyrhamphus, 212, 1073.
*Pachychynchus* = Pachyrhamphus, 212.
*Pachysylvia* = Hilophilus, 473.
Padda, 588.
Pagodroma, 1035.
*Pagonetta* = Harelda, 999.
Pagophila, 1026.
*Pagurothera* = Halcyon, 106.
*Paicles* = Philepitta, 210.
Palæornis, 18, 1054.
*Palæstra* = Macropteryx, 130.
Palamedea, 979.
*Paleiænas* = Turturœna, 753.
*Pallasia* = Melanocorypha, 452.
*Pallene* = Chætura, 127.
*Pallenura* = Motacilla, 442.
*Pallestre* = Macropteryx, 130.
Palmeria, 692.
*Paludicola* = Hydrornis, 207.
*Palumbœnas* = Columba, 748.
*Palumbus* = Columba, 748.
*Pampa* = Sphenoproctus, 133.
*Pampusana* = Phlogœnas, 772.
*Pan* = Semnornis, 1056.
*Panæola* = Nectarinia, 694.
*Pandicilla* = Cyanecula, 383.
Pandion, 877.
*Pannyschistes* = Erythropus, 872.
Panoplites, 152, 1067.
Panterpe, 142.
Panurus, 469.
*Panychlora* = Chlorostilbon, 141.
Panyptila, 126.
*Paphosia* = Lophornis, 165.
Parabuteo, 858.
*Paracus* = Ara, 10.
Paradigalla, 524.
Paradiska, 518, 1105.
*Paradisornis* = Paradisea, 518.
Paradoxornis, 470.
*Paralcyon* = Dacelo, 104.
Paramythia, 261.
Pardalotus, 674.
*Pardipicus* = Dendropicus, 73.
*Pardirallus* = Rallus, 959.
Pareudiastes, 973.
*Parinia* = Zosterops, 705.
Parisoma, 273, 1081.
*Parkinsonius* = Menura, 729.
Parmoptila, 357.
*Parnopia* = Locustella, 370.
*Parnopio* = Hagedashia, 902.
Paroaria, 642, 1111.
*Paroides* = Acredula, 466.
Parotia, 522.
Parra, 958.
Parula, 432, 1096.
*Parulus* = Synallaxis, 197.
Parus, 461, 1100.
Parypherphorus, 521.
*Parzudakia* = Heliangelus, 155.
Passer, 597, 1109.
Passerculus, 631, 1110.
Passerella, 635.
*Passerina* = Cyanospiza, 626.
Pastor, 537.
Patagona, 135.
*Patagiænas* = Columba, 748.
*Pauxi* = Pauxis, 790.
Pauxis, 790.
*Pavianus* = Pavo, 794.
Pavo, 794.
Pavoncella, 948.
*Paruncula* = Taoniscus, 785.
*Pealea* = Pelagodroma, 1030.
*Pecuarius* = Pastor, 537.
*Pedeaithya* = Podicipes, 1040.
*Pedetaithya* = Podicipes, 1040.
Pedilorhynchus, 266.
*Pedicorys* = Anthus, 445.
Pedioecetes, 823.
Pedionomus, 779.
*Pedopsaris* = Sturnella, 555.
Pelagodroma, 1030.
Pelargopsis, 114, 1062.
*Pelecanoides* = Halodroma, 1037.

Digitized by Google

*Pelecanopus* = Sterna, 1014.
PELECANUS, 1005.
PELICINIUS, 491.
*Pelidna* = Tringa. 950.
*Peliocichla* = Turdus, 399.
*Pelionetta* = Œdemia, 999.
PELLORNEUM, 336.
*Pellorneum* = Scotocichla, 334.
*Pelodes* = Hydrochelidon, 1012.
*Peloperdix* = Arboricola, 813.
*Pelorhynchus* = Gallinago, 952.
*Peltohyas* = Eudromias, 938.
PELTOPS, 291, 1083.
PENDULINUS, 556, 1106-7.
*Pendulinus* = Ægithalus. 467.
PENELOPE, 791, 1115.
PENELOPIDES, 102.
PENELOPINA, 792.
*Penelops* = Mareca, 991.
*Penelops* = Ortalida, 792.
PENNULA, 969.
*Pentheres* = Melanoparus, 460.
*Penthestes* = Melanoparus, 460.
PENTHETRIA, 573, 1108.
*Penthetriopsis* = Penthetria, 573.
*Penthoceryx* = Cuculus, 51.
*Penthodyta* = Pentholæa, 392.
PENTHOLÆA, 392.
*Penthornis* = Melanoparus, 1100.
*Pepoaza* = Tænioptera, 225.
*Peratus* = Heliangelus, 155.
*Percnopsis* = Nigrita, 575.
*Percnopterus* = Neophron, 830.
PERCNOSTOLA, 175.
*Perdicidens* = Francolinus, 807.
*Perdicopelia* = Starnœnas, 774.
PERDICULA, 813.
PERDIX, 812.
*Perdortyx* = Coturnix, 815.
PERICROCOTUS, 301, 1084.
*Periparus* = Parus, 1100.
*Periporphyrus* = Pitylus, 643.
PERISOREUS, 511, 1105.
PERISSOGLOSSA, 435.
PERISSORNIS, 536.
*Perissura* = Zenaidura, 757.
*Peristera* = Turtur, 758.
PERNIS, 865.
*Perspicilla* = Lichenops, 229.
PETASOPHORA, 144.
PETROCHELIDON, 258.
*Petrocincla* = Monticola, 392.
*Petrocossyphus* = Monticola, 392.
*Petrodroma* = Tichodroma, 684.
PETROECA, 266.
*Petrogallus* = Pitlopachys, 817.
*Petroica* = Petroeca, 266.
PETRONIA, 596, 1109.
PETROPHASSA, 767.
*Petrophila* = Monticola, 392.
*Peucæa* = Hæmophila, 633.
PEUCEDRAMUS, 436, 1097.
*Pezites* = Trupialis, 555.
PEZOPETES, 649.
PEZOPORUS, 27, 1054.
*Pezus* = Tinamus, 781.
*Phabalectryo* = Calœnas, 774.
*Phabisca* = Phabotreron, 734.
PHABOTRERON, 734.
*Phacelias* = Kelaartia, 307.
PHACELODOMUS, 196.
*Phænicoperdix* = Arboricola, 813.
PHÆNORHINA, 747.
*Phæochroa* = Aphantochroa, 134.
PHÆOLÆMA, 149.
PHÆOMYIAS, 1076.
*Phæoprogne* = Progne, 259.
PHÆOPTILA, 139.
*Phæopus* = Numenius, 944.
PHÆORNIS, 284.
PHAËTHORNIS, 131, 1064-65.
PHAËTON, 1004.
PHAËTHUSA, 1013.
PHAINOPEPLA, 261.
PHAINOPTILA, 261.
*Phaiolaima* = Phæolæma, 149.
*Phaiopicus* = Micropternus, 78.
PHALACROCORAX, 1006.
*Phalacrotreron* = Vinago, 731.
*Phalænopsis* = Glaucidium, 896.
PHALÆNOPTILUS, 121, 1063.
*Phalaria* = Fulica, 977.
*Phalaridion* = Porzana, 967.
*Phalaridium* = Porzana, 967.
PHALAROPUS, 957.
*Phalcobænus* = Ibycter, 832.
PHALERIS, 1046.
*Phapiscus* = Phabotreron, 734.
*Phapitreron* = Phabotreron, 734.
PHAPS, 767.
PHAROMACRUS, 85, 1059.
*Phasianurus* = Dafila, 994.
PHASIANUS, 801, 1115-16.
PHASIDUS, 804.
*Phasmoptynx* = Asio, 877.
*Phassa* = Ptilopus, 735.
PHEDINA, 259.
PHEGORNIS, 956.
*Phemonæ* = Eriocnemis, 153.
*Phene* = Gypaëtus, 831.

Digitized by Google

PHEUCTICUS, 611.
PHIBALURA, 215.
PHIGYS, 30.
*Philacantha* = Sylvia, 374.
PHILACTE, 984.
PHILÆTERUS, 575.
*Philagrus* = Ploceipasser, 569.
*Philamnus* = Otocorys, 451.
*Philedon* = Leptornis, 724.
PHILEMON, 726, 1113.
*Philemonopsis* = Philemon, 726.
PHILENTOMA, 281.
PHILEPITTA, 210.
*Phileremos* = Otocorys, 451.
*Philocalix* = Liothrix, 347.
PHILODICE, 161.
PHILOHELA, 955.
*Philolimnos* = Limnocryptes, 955.
*Philomachus* = Pavoncella, 948.
*Philomela* = Aëdon, 382.
*Philorchemon* = Tetrapteryx, 923.
PHILORTYX, 819.
PHILYDOR, 193, 1072.
PHIMOSUS, 902.
*Phimus* = Musophaga, 90.
*Phlœoceastes* = Campephilus, 80.
*Phlegœnas* = Phlogœnas, 772.
*Phlegopsis* = Phlogopsis, 172.
PHLEOCRYPTES, 201.
PHLEXIS, 349.
*Phlœotomus* = Dryocopus, 83.
PHLOGŒNAS, 772.
PHLOGOPHILUS, 154, 1067.
PHLOGOPSIS, 172, 1069.
PHLOGOTHRAUPIS, 659.
*Phlothrus* = Merops, 96.
*Phlyaconetta* = Histrionicus, 999.
PHODILUS, 898.
*Phœbastria* = Diomedea, 1038.
PHŒBETRIA, 1039.
PHŒNICOCERCUS, 215.
*Phœnicocichla* = Pitta, 207.
*Phœnicomanes* = Aethorhynchus, 341.
*Phœniconaias* = Phœnicopterus, 908.
*Phœnicoparra* = Phœnicoparrus, 908.
PHŒNICOPARRUS, 908.
PHŒNICOPHAËS, 59.
PHŒNICOPHILUS, 652.
PHŒNICOPTERUS, 908.
*Phœnicornis* = Pericrocotus, 301.
*Phœnicorodias* = Phœnicopterus, 908.
*Phœnicosoma* = Pyranga, 658.
*Phœnicospiza* = Carpodacus, 602.
PHŒNICOTHRAUPIS, 657, 1111.
*Phœnicura* = Ruticilla, 385.
*Phœnicurus* = Phaëton, 1004.
*Phœnisoma* = Pyranga, 658.
*Phœnorpes* = Eleopicus, 75.
*Pholeoptynx* = Speotyto, 895.
PHOLIA, 1080.
PHOLIDAUGES, 541.
*Pholidocoma* = Sporopipes, 570.
PHOLIDOPHALUS, 101, 1061.
PHOLIDORNIS, 357.
*Pholoë* = Eriocnemis, 153.
*Phonasca* = Euphonia, 671.
*Phoneus* = Enneoctonus, 485.
*Phoneutria* = Hirundinea, 244.
PHONIPARA, 618.
*Phonygama* = Phonygammus, 517.
PHONYGAMMUS, 517.
*Photodilus* = Phodilus, 898.
*Phoyx* = Ardea, 909.
*Phragamaticola* = Lusciniola, 371.
*Phrenopicus* = Picus, 70.
*Phrenotrix* = Crypsirhina, 508.
PHRYGILUS, 640.
*Phylaconetta* = Histrionicus, 999.
*Phylidonyris* = Meliornis, 723.
*Phylidonyris* = Myzomela, 714.
*Phyllastrephus* = Phyllostrophus, 314.
PHYLLERGATES, 362.
PHYLLOBASILEUS, 378.
*Phyllodytes* = Certhiparus, 1101.
PHYLLOLAIS, 354.
*Phyllomanes* = Vireo, 471.
PHYLLOMYIAS, 237, 1076.
*Phyllopezus* = Actophilus, 958.
*Phyllopneuste* = Phylloscopus, 377.
*Phyllopseuste* = Phylloscopus, 377.
*Phyllornis* = Chloropsis, 317.
PHYLLOSCARTES, 234.
PHYLLOSCOPUS, 377, 1091.
PHYLLOSTROPHUS, 314, 1085-86.
*Phymatoblepharus* = Melanerpes, 68.
*Physocorax* = Corvus, 502.
PHYTOTOMA, 210.
PIAYA, 58.
PICA, 506.
PICATHARTES, 516.
*Picazurus* = Columba, 748.
*Picerthia* = Lochmias, 202.
*Picicorvus* = Nucifraga, 506.
*Picnorhamphus* = Sphecotheres, 528.
*Picoides* = Tridactylia, 72.
PICOLAPTES, 187, 1070.
*Piculus* = Picumnus, 83.
*Piculus* = Picus, 70.
*Picumnoides* = Sasia, 85.
PICUMNUS, 83, 1059.



Digitized by Google

Picus, 70, 1058.
Piezorhina, 614.
*Piezorhynchus* = Monarcha, 289.
*Pilonia* = Lampropygia, 152.
Pilorhinus, 546.
Pinarochroa, 388.
Pinarocichla, 307, 1084.
*Pinarolæma* = Petasophora, 144.
*Pinarolestes* = Colluricincla, 495.
Pinaroloxias, 594.
Pinarornis, 324.
*Pindalus* = Cryptolopha, 285.
*Pinguinaria* = Aptenodytes, 1047.
*Pinguinus* = Alca, 1042.
Pinicola, 606.
*Pionias* = Pionus, 6.
*Pionites* = Caica, 8.
Pionopsitta, 7.
*Pionopsittacus* = Pionopsitta, 7.
Pionus, 6, 1053.
*Pipastes* = Anthus, 445.
*Piperivorus* = Selenidera, 44.
*Pipile* = Cumana, 793.
Pipilo, 636, 1111.
Pipilopsis, 648.
*Pipiscus* = Picumnus, 83.
*Pipodes* = Tridactylia, 72.
Pipra, 220, 1074.
*Pipræidea* = Pipridea, 669.
Piprakola, 216, 1074.
Pipridea, 669.
*Pipripicus* = Picus, 70.
*Piprisoma* = Prionochilus, 674.
Piprites, 219.
*Pipromorpha* = Mionectes, 236.
*Piscatrix* = Sula, 1011.
*Pisorhina* = Scops, 882.
*Pisynolimnas* = Amaurornis, 972.
Pitangus, 243.
Pithecophaga, 834.
Pithys, 173, 1069.
*Pitohui* = Rhectes, 494.
Pitta, 207, 1073.
Pittasoma, 171, 1069.
*Pituipicus* = Colaptes, 62.
Pitylus, 643.
Pityriasis, 501.
*Pityriopsis* = Pityriasis, 501.
*Placophorus* = Agapeta, 149.
*Plagiospiza* = Hæmophila, 633.
*Planchesia* = Myiochanes, 1078.
*Planesticus* = Turdus, 399.
*Planetis* = Sterna, 1014.
*Plangus* = Harpyhaliaëtus, 861.
Platalea, 904.
*Platibis* = Platalea, 904.
*Platurus* = Discura, 166.
Platycercus, 24, 1054.
*Platyceros* = Hydrocorax, 100.
Platycichla, 407.
*Platydipna* = Hedydipna, 694.
*Platygnathus* = Myiagra, 282.
Platylophus, 509.
Platypsaris, 1073.
*Platypsaris* = Hadrostomus, 211.
*Platypteræna* = Zenaida, 757.
*Platypus* = Somateria, 1000.
*Platyrhynchos* = Eurylæmus, 205.
Platyrhynchus, 231, 1075.
*Platyrhynchus* = Megarhynchus, 244.
*Platyrhynchus* = Myiobius, 245.
Plattysmurus, 509.
*Platyspiza* = Geospiza, 608.
Plattystira, 266.
*Platystomus* = Peltops, 291.
*Platystylopterus* = Campylopterus, 133.
*Platyurus* = Merulaxis, 167.
*Plaucus* = Sula, 1011.
*Plautus* = Alca, 1042.
*Plautus* = Larus, 1021.
*Plectolophus* = Nymphicus, 26.
*Plectorhamphus* = Plectrorhynchus, 714.
*Plectorhyncha* = Plectrorhynchus, 714.
*Plectrofringilla* = Montifringilla, 594.
*Plectroperdix* = Galloperdix, 817.
Plectrophanes, 624.
*Plectrophanes* = Plectropterus, 980.
*Plectrophenax* = Plectrophanes, 624.
*Plectrophorus* = Ithagenes, 796.
Plectropterus, 980.
*Plectropus* = Ithagenes, 796.
Plectrorhynchus, 714.
Plegadis, 903.
*Plegadornis* = Plegadis, 903.
*Pleiodus* = Didunculus, 775.
*Plinthopicus* = Blythipicus, 77.
*Plocealauda* = Mirafra, 455.
Plocella, 567.
Ploceipasser, 569.
Plocus, 566, 1107.
Plotus, 1010.
*Plumipeda* = Spizaëtus, 848.
*Pluvialis* = Charadrius, 937.
Pluvianellus, 941.
Pluvianus, 930.
*Pluviorhynchus* = Charadrius, 937.
*Plyctolophus* = Cacatua, 2.
*Pnigocichla* = Colluricincla, 495.
*Pnigohierax* = Hierofalco, 875.
Pnoepyga, 430.

Digitized by Google

PODAGER, 118.
PODARGUS, 117, 1063.
*Podasocys* = Charadrius, 937.
PODICA, 978.
*Podiceps* = Podicipes, 1040.
PODICIPES, 1040.
PODILYMBUS, 1042.
*Podoa* = Heliornis, 978.
PODOCES, 506.
*Podochætes* = Nyctiprogne, 118.
*Pœcile* = Parus, 461.
PŒCILODRYAS, 271, 1080.
*Pœcilonitta* = Dafila, 994.
*Pœcilopternis* = Buteo, 855.
*Pœcilopteryx* = Ictinia, 864.
*Pœcilornis* = Iridornis, 664.
*Pœcilornis* = Tinnunculus, 870.
PŒCILOTHRAUPIS, 664.
*Pœcilotreron* = Ptilopus, 735.
*Pœcilotriccus* = Todirostrum, 231.
*Pœkilis* = Parus, 461.
PŒOPTERA, 546.
POEPHILA, 584.
*Pogonias* = Pogonorhynchus, 35.
*Pogonocichla* = Tarsiger, 384.
*Pogonomerops* = Meropogon, 97.
*Pogonorhamphus* = Pogonorhynchus, 35.
POGONORHYNCHUS, 35.
POGONORNIS, 722.
*Pogonothraupis* = Lanio, 656.
POGONOTRICCUS, 235, 1075.
POICEPHALUS, 8, 1053.
*Polemistria* = Lophornis, 105.
*Polidacnis* = Dacnis, 687.
POLIOAËTUS, 877.
*Poliocephalus* = Podicipes, 1040.
*Poliococcyx* = Rhopodytes, 58.
POLIOHIERAX, 868.
POLIOLAIS, 1089.
*Poliolimnas* = Porzana, 967.
POLIOLOPHUS, 307.
*Poliomyias* = Muscicapa, 262.
*Polionetta* = Anas, 989.
*Poliopsar* = Pendulinus, 556.
*Poliopsar* = Spodiopsar, 535.
*Poliopsitta* = Agapornis, 22.
*Poliopsittacus* = Agapornis, 22.
POLIOPTILA, 380, 1091.
*Poliornis* = Butastur, 859.
POLIOSPIZA, 599.
*Polipicus* = Mesopicus, 76.
*Polophilus* = Centropus, 55.
*Polyæna* = Bourcieria, 151.
*Polyboroides* = Gymnogenys, 835.
POLYBORUS, 832.
*Polychlorus* = Eclectus, 16.
POLYERATA, 136.
*Polymitra* = Emberiza, 620.
*Polymnia* = Acestrura, 163.
*Polyodon* = Andropadus, 313.
*Polyodon* = Yuhina, 346.
POLYONOMUS, 157.
*Polypeira* = Copsychus, 411.
*Polyphasia* = Cacomantis, 52.
POLYPLANCTA, 150.
POLYPLECTRON, 795.
*Polypteryx* = Vultur, 829.
*Polysticta* = Somateria, 1000.
*Polysticte* = Trachyphonus, 40.
POLYTELIS, 20.
POLYTMUS, 146, 1066.
POLYXENUS, 163, 1068.
POMAREA, 291, 1083.
POMAREOPSIS, 291, 1083.
POMATORHINUS, 325.
*Pomatorhynchus* = Telephonus, 488.
*Pomatostomus* = Pomatorhinus, 325.
*Pontoaetus* = Haliaëtus, 853.
*Poœcetes* = Poocætes, 630.
POOCÆTES, 630.
*Poodytes* = Megalurus, 351.
POOSPIZA, 628.
POPELAIREA, 1068.
*Popelairea* = Prymnacantha, 165.
PORPHYRIO, 975.
PORPHYRIOLA, 975.
PORPHYRIOPS, 974.
PORPHYRIORNIS, 973.
PORPHYROCEPHALUS, 25.
*Porphyrolæma* = Cotinga, 216.
PORPHYROSPIZA, 627.
*Porphyrula* = Porphyriola, 975.
PORZANA, 967.
PORZANULA, 971.
*Potamochelidon* = Seena, 1014.
*Potamodus* = Locustella, 370.
*Potamopsar* = Lampropsar, 559.
*Pothinus* = Trogon, 86.
*Prædatrix* = Stercorarius, 1027.
*Prasitis* = Chlorostilbon, 141.
*Praticola* = Calamanthus, 360.
*Praticola* = Pratincola, 387.
PRATINCOLA, 387, 1092.
*Praxilla* = Petasophora, 144.
*Premnocopus* = Dendrocolaptes, 185.
*Premnoplex* = Margarornis, 191.
*Presbys* = Cinnicerthia, 419.
*Priamphus* = Prion, 1037.
*Primolius* = Ara, 10.
PRINIA, 358.

Digitized by Google

PRIOCELLA, 1033.
PRIOFINUS, 1032.
PRION, 1037.
PRIONIRHYNCHUS, 94.
*Prionites* = Momotus, 94.
PRIONITURUS, 17, 1054.
PRIONOCHILUS, 674.
PRIONODURA, 524.
PRIONOPS, 497, 1104.
PRIONORNIS, 1061.
PRIONOTELUS, 86.
*Priotelus* = Prionotelus, 86.
*Prister* = Mergansser, 1003.
PRISTORHAMPHUS, 676.
*Pristoptera* = Psalidoprocne, 259.
PROCARDUELIS, 590.
PROCELLARIA, 1028.
*Procellarus* = Leucophæus, 1026.
*Procelsterna* = Anous, 1018.
PROCNIAS, 670.
PROCNOPIS, 669.
*Proctopus* = Podicipes, 1040.
*Prodotes* = Indicator, 34.
PRODOTISCUS, 35, 1055.
PROGNE, 259, 1079.
*Prognornis* = Eupetomena, 134.
PROMEROPS, 727.
*Proparoides* = Parus, 1100.
*Proparus* = Alcippe, 345.
*Proparus* = Fulvetta, 346.
*Propasser* = Carpodacus, 602.
PROPYRRHULA, 607.
*Prosecusa* = Brachypodius, 308.
*Prosobonia* = Phegornis, 956.
*Prosopæa* = Pyrrhulopsis, 21.
*Prosorinia* = Cochoa, 284.
*Prospoietus* = Xenopsaris, 215.
PROSTHEMADERA, 723.
PROTONOTARIA, 432.
*Prunella* = Accentor, 381.
PRYMNACANTHA, 165.
*Prynorhamphus* = Smithornis, 285.
PSALIDOPROCNE, 259, 1079.
PSALIDOPRYMNA, 158, 1067.
*Psalidoramphos* = Rhynchops, 1020.
*Psalidura* = Alectrurus, 228.
PSALTRIA, 466.
PSALTRIPARUS, 466, 1101.
*Psaltrites* = Psaltriparus, 466.
*Psalurus* = Hydropsalis, 120.
PSAMATHIA, 348.
*Psammocrex* = Himantornis, 965.
*Psaris* = Tityra, 210.
PSARISOMUS, 205.
*Psarites* = Sturnopastor, 536.
*Psarocolius* = Ostinops, 550.
*Psaroglossa* = Saroglossa, 540.
*Psaroides* = Pastor, 537.
PSAROPHOLUS, 528.
*Pselliophorus* = Buarremon, 647.
PSEPHOTUS, 25, 1054.
*Pseudaëtus* = Eutolmaëtus, 850.
*Pseudalæmon* = Alæmon, 450.
*Pseudastur* = Leucopternis, 860.
*Pseudibis* = Ibis, 900.
PSEUDOBIAS, 284.
*Pseudobucco* = Psilopogon, 40.
PSEUDOCHELIDON, 534.
PSEUDOCHLORIS, 639.
PSEUDOCOLAPTES, 196.
PSEUDOCOSSYPHUS, 410.
*Pseudocycnus* = Coscoroba, 987.
PSEUDODACNIS, 665.
*Pseudofringilla* = Indicator, 34.
*Pseudogelæus* = Agelæus, 1106.
*Pseudogeranus* = Grus, 921.
*Pseudogerygone* = Gerygone, 268.
*Pseudoglottis* = Totanus, 946.
*Pseudogryphus* = Gymnogyps, 829.
PSEUDOGYPS, 830, 1116.
*Pseudolalage* = Lalage, 302.
PSEUDOLEISTES, 554.
*Pseudolor* = Coscoroba, 987.
*Pseudoluscinia* = Locustella, 370.
*Pseudominla* = Minla, 1088.
*Pseudomitris* = Chrysomitris, 591.
PSEUDOMYIOBIUS, 246.
PSEUDONESTOR, 606.
*Pseudopodoces* = Podoces, 1105.
*Pseudoprion* = Prion, 1037.
*Pseudoprocne* = Panyptila, 126.
*Pseudops* = Esacus, 928.
PSEUDOPTYNX, 882, 1116.
*Pseudorectes* = Rhectes, 494.
*Pseudornis* = Surniculus, 50.
*Pseudoscolopax* = Macrorhamphus, 946.
PSEUDOSCOPS, 879.
PSEUDOSEISURA, 1072.
*Pseudoseisura* = Homorus, 195.
*Pseudospingus* = Chlorospingus, 650.
*Pseudospiza* = Indicator, 34.
*Pseudostruthus* = Passer, 1109.
PSEUDOTANTALUS, 905.
PSEUDOTHARRHALEUS, 335.
*Pseudototanus* = Totanus, 946.
PSEUDOTRICCUS, 233.
PSEUDOXENICUS, 1058.
PSEUDOZOSTEROPS, 713.
*Pseuduria* = Uria, 1043.
*Psilocnemis* = Ortyxelus, 930.

Digitized by Google

*Psilomycter* = Polytmus, 146.
Psilopogon, 40.
*Psilopus* = Gerygone, 268.
Psilorhamphus, 177.
Psilorhinus, 515.
Psiloscops, 887.
*Psithyradus* = Locustella, 370.
*Psittacara* = Conurus, 11.
Psittacella, 21.
*Psittacirostra* = Psittirostra, 605.
*Psittacodis* = Eclectus, 16.
Psittacula, 15, 1053.
*Psittaculus* = Loriculus, 22.
Psittacus, 3.
*Psitteuteles* = Trichoglossus, 30.
Psittinus, 21, 1054.
Psittirostra, 605.
Psittospiza, 646.
*Psittovius* = Brotogerys, 15.
*Psittrichas* = Dasyptilus, 4.
Psophia, 923.
Psophocichla, 406.
Psophodes, 320.
*Ptenœdus* = Cinclorhamphus, 361.
Pteridophora, 521.
Pternistes, 810.
*Pternura* = Spizaëtus, 848.
*Pteroaëtus* = Aquila, 851.
*Pterochalinus* = Pernis, 865.
*Pterocircus* = Circus, 835.
Pterocles, 777.
Pteroclurus, 776.
*Pterocnemia* = Rhea, 1052.
*Pterocnemys* = Rhea, 1052.
*Pterocorax* = Corvus, 502.
*Pterocyanea* = Querquedula, 992.
*Pterocyclus* = Trochalopteron, 321.
*Pterodroma* = Œstrelata, 1033.
Pteroglossus, 43.
Pteronetta, 981.
Pterophanes, 152.
Pteropodocys, 300.
Pteroptochus, 167.
Pterorhinus, 320.
*Pteruthius* = Pterythrius, 487.
*Pterygocius* = Pteroclurus, 776.
Pterythrius, 487, 1103.
*Ptiladela* = Graucalus, 295.
*Ptilinopus* = Ptilopus, 735.
*Ptiliogonys* = Ptilogonys, 261.
*Ptilobaphus* = Melanichlora, 460.
Ptilocalpa, 745.
*Ptilocarpus* = Analcipus, 528.
Ptilochlorus, 223.
Ptilocichla, 331.
*Ptilocorys* = Galerida, 457.
*Ptilolæmus* = Anorrhinus, 102.
Ptilogonys, 261.
*Ptiloleptus* = Guira, 62.
Ptilonorhynchus, 522.
Ptilopachys, 817.
*Ptilophyrus* = Goura, 775.
Ptilopodiscus, 738.
*Ptilopsis* = Scops, 882.
Ptilopus, 735-36, 1114.
Ptilopyga, 332.
Ptilorhis, 521.
Ptilosclis, 935.
*Ptilosclera* = Trichoglossus, 30.
*Ptiloskelos* = Huhua, 881.
*Ptilostomus* = Cryptorhina, 507.
Ptilotis, 719.
*Ptilotreron* = Ptilopus, 735.
*Ptiloturus* = Promerops, 727.
*Ptilurus* = Promerops, 727.
*Ptionura* = Muscisaxicola, 230.
Ptistes, 20.
*Ptocas* = Branta, 984.
Ptochoptera, 142.
Ptychorhamphus, 1045.
*Ptynx* = Syrnium, 890.
*Ptyonoprogne* = Cotyle, 256.
*Ptyonornis* = Phaethornis, 131.
Pteraticus, 408.
*Pucherania* = Pachycephala, 476.
Pucrasia, 801.
*Puffinuria* = Halodromia, 1037.
Puffinus, 1030.
Pulsatrix, 892, 1117.
*Punanetta* = Querquedula, 992.
*Purpureicephalus* = Porphyrocephalus, 25.
*Purpureipitta* = Pitta, 207.
Pycnonotus, 305, 1084.
Pycnoptilus, 319.
Pycnopygius, 728.
Pycnorhamphus, 611.
*Pycnosphrys* = Cryptolopha, 285.
*Pyctes* = Caccabis, 806.
Pyctorhis, 340, 1087.
*Pygargus* = Circus, 835.
Pygarrhichus, 190.
*Pygmornis* = Phaethornis, 131.
*Pygochelidon* = Atticora, 257.
Pygoptila, 181.
*Pygornis* = Phaethornis, 131.
Pygosclis, 1047.
Pyranga, 658, 1111.
Pyrenestes, 576.
*Pyrgilauda* = Montifringilla, 594.
Pyrgisoma, 635.

Digitized by Google

*Pyrgita* = Passer, 597.
*Pyrgitænas* = Columbigallina, 763.
*Pyrgitopsis* = Passer, 597.
Pyriglena, 175.
*Pyrilia* = Pionopsitta, 7.
Pyrocephalus, 246, 1077.
Pyroderus, 218.
Pyromelana, 571, 1108.
*Pyrope* = Tænioptera, 225.
*Pyrophthalma* = Melizophilus, 375.
*Pyrosterna* = Pteroglossus, 43.
Pyrotrogon, 1060.
*Pyrotrogon* = Harpactes, 88.
*Pyroupicus* = Picus, 70.
*Pyrrherodias* = Ardea, 969.
*Pyrrhocentor* = Centropus, 55.
*Pyrrhococcyx* = Piaya, 58.
Pyrrhocoma, 654.
Pyrrhocorax, 517.
*Pyrrhodes* = Charmosyna, 32.
*Pyrrhodiglossa* = Diglossa, 685.
Pyrrholæmus, 366.
*Pyrrhomitris* = Chrysomitris, 591.
*Pyrrhomyias* = Myiobius, 245.
*Pyrrhophæna* = Amazilia, 138.
*Pyrrhopicus* = Blythipicus, 77.
Pyrrhoplectes, 602.
*Pyrrhorhynchus* = Pipreola, 216.
Pyrrhospiza, 604, 1109.
Pyrrhula, 607, 1109.
*Pyrrhulagra* = Loxigilla, 613.
Pyrrhulauda, 459, 1100.
*Pyrrhulinota* = Carpodacus, 602.
*Pyrrhuloides* = Pyrrhoplectes, 602.
Pyrrhulopsis, 21.
*Pyrrhulorhyncha* = Emberiza, 620.
Pyrrhuloxia, 619.
Pyrrhuphonia, 671.
Pyrrhura, 13, 1053.
Pyrrhurus, 1085.
*Pyrrhurus* = Xenocichla, 309.
*Pyrrocheira* = Amydrus, 545.
*Pyrrota* = Tachyphonus, 655.
Pytelia, 578.
*Pythis* = Pipra, 220.
Quelea, 571.
*Querelea* = Numida, 804.
Querquedula, 992.
Querula, 218.
*Quiscala* = Quiscalus, 559.
Quiscalus, 559, 1107.
*Racama* = Gypohierax, 831.
*Radjah* = Tadorna, 988.
Rallicula, 970.
Rallina, 965.
Rallus, 959, 1118.
*Ramphastoides* = Selenidera, 44.
*Ramphiculus* = Ptilopus, 735.
*Ramphocelus* = Rhamphocœlus, 660.
*Ramphodryas* = Rhamphastos, 42.
*Ramphomelus* = Andigena, 43.
*Ramphopis* = Rhamphocœlus, 660.
*Ramphotrigon* = Rhynchocyclus, 242.
*Ramphoxanthus* = Aulacorhamphus, 44.
*Raphipterus* = Merganetta, 1002.
*Raya* = Psarisomus, 205.
*Rectes* = Rhectes, 494.
*Rectirostrum* = Macrosphenus, 314.
Recurvirostra, 943.
*Regerhinus* = Leptodon, 866.
*Reguloides* = Phyllobasileus, 378.
Regulus, 379, 1091.
*Reinwardtipicus* = Chrysocolaptes, 80.
Reinwardtoenas, 756, 1114.
*Remiza* = Ægithalus, 467.
*Rhabdocolius* = Colius, 90.
Rhabdochlamys, 351.
*Rhabdoglaux* = Ninox, 887.
Rhabdornis, 685.
*Rhabdotorrhinus* = Hydrocissa, 1061.
*Rhamphalcyon* = Pelargopsis, 114.
Rhamphastos, 42, 1056.
Rhamphocænus, 176, 1069.
Rhamphocharis, 676.
Rhamphocinclus, 414.
Rhamphococcyx, 59, 1057.
Rhamphocœlus, 660, 1111.
Rhamphocorys, 451.
Rhamphodon, 131.
Rhamphomantis, 55.
Rhamphomicron, 158.
*Rhamphotreron* = Treron, 733.
*Rhantistes* = Fulmarus, 1036.
*Rhaphidornis* = Ægithalus, 467.
*Rhaphidura* = Chætura, 127.
Rhea, 1052.
Rhectes, 494, 1104.
*Rhegmatorhina* = Gymnopithys. 173.
*Rheinardius* = Rheinardtius, 795.
Rheinardtius, 795, 1115.
*Rhigelura* = Podica, 978.
*Rhimamphus* = Dendroeca, 433.
*Rhimphalea* = Stiltia, 929.
Rhinochetus, 921.
Rhinocichla, 327.
*Rhinococcyx* = Rhamphococcyx, 59.
*Rhinocorax* = Corvus, 502.
Rhinocrypta, 167.
Rhinogryphus, 828.
*Rhinomya* = Rhinocrypta, 167.

Digitized by Google

Rhinomyias, 282.
Rhinoplax, 99.
Rhinopomastus, 98, 1061.
Rhinoptilus, 931.
*Rhinoptynx* = Asio, 877.
*Rhinopus* = Carpophaga, 743.
Rhinortha, 59.
*Rhipidornis* = Diphyllodes, 519.
Rhipidura, 276, 1081.
Rhizothera, 811.
Rhodacanthis, 606.
Rhodinocichla, 418, 1095.
*Rhodocephalus* = Geoffroyus, 16.
*Rhodocichla* = Rhodinocichla, 418.
Rhodonessa, 981.
Rhodopechys, 596.
*Rhodophila* = Oreicola, 273.
*Rhodophoneus* = Pelicinius, 491.
Rhodopis, 160.
*Rhodopyga* = Lagonosticta, 577.
Rhodornis, 357.
Rhodospingus, 642.
*Rhodospiza* = Erythrospiza, 596.
Rhodostethia, 1021.
*Rhodurus* = Psittacus, 3.
*Rhombura* = Sphenocercus, 731.
*Rhondella* = Erithacus, 382.
*Rhopias* = Myrmotherula, 178.
*Rhopochares* = Thamnophilus, 182.
*Rhopocichla* = Alcippe, 345.
Rhopodytes, 58.
Rhopophilus, 350.
Rhopornis, 1069.
*Rhopospina* = Phrygilus, 640.
Rhopoterpe, 172.
*Rhyacophilus* = Totanus, 946.
Rhyacornis, 273.
Rhynchæa, 956.
*Rhynchasmus* = Spatula, 995.
*Rhynchaspis* = Spatula, 995.
*Rhynchoceros* = Lophoceros, 103.
Rhynchocyclus, 242, 1077.
*Rhynchænas* = Henicophaps, 767.
*Rhynchofalco* = Hypotriorchis, 872.
*Rhynchomegus* = Micrastur, 837.
*Rhynchophanes* = Plectrophanes, 624.
Rhynchops, 1020.
*Rhynchopsalia* = Rhynchops, 1020.
Rhynchopsitta, 11.
*Rhynchopsittacus* = Rhynchopsitta, 11.
*Rhynchortyx* = Odontophorus, 822.
*Rhynchosimus* = Terekia, 948.
*Rhynchospiza* = Hæmophila, 633.
Rhynchostruthus, 596, 1109.
*Rhynchotis* = Rhynchotus, 784.
Rhynchotus, 784.
Rhytidoceros, 101.
*Rhytipterna* = Lipaugus, 213.
*Ricordia* = Sporadinus, 142.
Rimator, 332.
Rissa, 1027.
*Rollandia* = Podicipes, 1040.
Rollulus, 815.
*Romeris* = Treron, 733.
*Rossia* = Rhodostethia, 1021.
Rosthramus, 864.
*Rostratula* = Rhynchæa, 956.
Rougetius, 965.
*Rubecula* = Erithacus, 382.
*Rubetra* = Pratincola, 387.
Rubigula, 308.
*Rufibrenta* = Branta, 984.
*Rufirallus* = Creciscus, 971.
Rupicola, 215.
*Rupicola* = Columba, 748.
Rupornis, 858.
*Rusticola* = Scolopax, 955.
Ruticilla, 385, 1091.
*Rynchoschasme* = Anastomus, 906.
*Sacfa* = Perdix, 812.
*Sæpiopterus* = Campylopterus, 133.
*Sagmatorrhina* = Lunda, 1046.
*Salangana* = Collocalia, 129.
*Salicaria* = Acrocephalus, 368.
*Salicipasser* = Passer, 597.
Salpinctes, 426.
*Salpiza* = Penelope, 791.
*Salpizusa* = Penelope, 791.
Salpornis, 684.
Saltator, 644, 1111.
Saltatricula, 636.
Salvadorina, 1002.
Sapayoa, 1074.
*Sapheopipo* = Blythipicus, 77.
*Sapphironia* = Hylocharis, 139.
Sappho, 158.
Sarcidiornis, 980.
Sarciophorus, 933.
*Sarcogeranus* = Grus, 921.
*Sarcogrammus* = Lobivanellus, 934.
Sarcophanops, 205.
Sarcops, 538.
Sarcorhamphus, 827.
Sarganura, 722.
*Sariama* = Cariama, 924.
*Sarochalinus* = Merulaxis, 167.
Saroglossa, 540.
Sarothrura, 969.
*Sasa* = Opisthocomus, 794.
Sasia, 85, 1059.

Digitized by Google

*Satellus* = Tyrannus, 252.
*Saturia* = Eugenia, 150.
*Satyra* = Tragopan, 797.
SAUCEROTTEA, 137, 1065.
*Sauloprocta* = Rhipidura, 276.
*Sauromarptis* = Dacelo, 104.
*Sauropatis* = Halcyon, 106.
*Saurophagus* = Pitangus, 243.
SAUROTHERA, 57.
SAXICOLA, 388, 1092.
*Saxicoloides* = Thamnobia, 410.
SAYORNIS, 227.
SCÆORHYNCHUS, 1101.
*Scæorhynchus* = Heteromorpha, 470.
*Scapaneus* = Campephilus, 80.
*Scaphidura* = Cassidix, 551.
*Scaphidurus* = Cassidix, 551.
*Scaphidurus* = Quiscalus, 559.
*Scaphorhynchus* = Megarhynchus, 244.
SCARDAFELLA, 762.
SCELOGLAUX, 887.
*Scelospizias* = Astur, 840.
*Scelostrix* = Strix, 898.
SCENOPŒETES, 523.
*Scenopœus* = Scenopœetes, 523.
*Schetba* = Lalage, 302.
SCHIFFORNIS, 223.
SCHISTES, 159.
SCHISTOCHLAMYS, 644.
*Schistospiza* = Coryphospingus, 642.
SCHIZÆACA, 201, 1072.
*Schizoptila* = Gymnocrex, 963.
SCHIZORHIS, 90, 1060.
*Schizura* = Sylviorthorhynchus, 201.
SCHLEGELIA, 519.
SCHŒNICOLA, 349.
*Schœnicola* = Emberiza, 620.
*Schœniclus* = Tringa, 950.
*Schœniparus* = Alcippe, 345.
*Schœniparus* = Minla, 343.
*Schwaneria* = Siphia, 292.
SCISSIROSTRUM, 548.
SCLATERIA, 1069.
*Scleroptera* = Francolinus, 807.
*Scleroptila* = Francolinus, 807.
SCLERURUS, 191, 1071.
SCOLECOPHAGUS, 559.
*Scolecotheres* = Mesopicus, 76.
*Scolopacinus* = Rhamphocænus, 176.
SCOLOPAX, 955.
SCOPS, 882, 1117.
SCOPTELUS, 98.
SCOPUS, 909.
*Scotæus* = Nycticorax, 917.
SCOTIAPTEX, 892.
SCOTOCERCA, 360, 1069.
*Scotocharis* = Monasa, 48.
SCOTOCICHLA, 334.
*Scotoglaux* = Scotopelia, 879.
SCOTOPELIA, 879.
*Scotophilus* = Nyctala, 893.
SCOTORNIS, 120, 1063.
*Scotospiza* = Loxigilla, 613.
*Scototheres* = Scops, 882.
SCOTOTHORUS, 1074.
SCYTALOPUS, 166, 1068.
SCYTHROPS, 55.
*Secretarius* = Serpentarius, 827.
SEENA, 1014.
*Seisura* = Sisura, 288.
*Sciurus* = Henicocichla, 436.
SELASPHORUS, 162, 1068.
SELENIDERA, 44.
SELEUCIDES, 520.
*Semeiophorus* = Macrodipteryx, 120.
SEMIOPTERA, 519.
*Semiparus* = Minla, 1088.
SEMNORNIS, 1056.
*Senex* = Ibycter, 832.
*Sephanoides* = Eustephanus, 157.
*Sericopeleia* = Haplopela, 768.
*Sericoptila* = Cnipolegus, 228.
SERICORNIS, 366, 1090.
*Sericornis* = Æthomyias, 274.
SERICOSSYPHA, 652.
*Sericotes* = Eulampis, 146.
SERICULUS, 525.
*Sericulus* = Melanopyrrhus, 540.
SERILOPHUS, 205.
*Serinopsis* = Sycalis, 1109.
SERINUS, 599, 1109.
*Serisomus* = Coua, 60.
SERPENTARIUS, 827.
SERPHOPHAGA, 235, 1075.
SERRESIUS, 743.
*Serrirostrum* = Diglossa, 685.
*Setaria* = Malacopteron, 337.
*Setaria* = Rhinomyias, 282.
SETOPHAGA, 441.
*Sharpia* = Anaplectes, 568.
SIALIA, 386, 1091-92.
*Sialis* = Sialia, 386.
SIBIA, 324.
*Sibilatrix* = Phylloscopus, 377.
*Sicalis* = Sycalis, 601.
*Sigelus* = Bradyornis, 287.
SIGMODUS, 498.
*Silphidæna* = Ptilopus, 735.
SIMORHYNCHUS, 1045.
*Simorhynchus* = Terekia, 948.

Digitized by Google

*Simornis* = Psarisomus, 205.
*Simotes* = Calliechthrus, 50.
*Sinius* = Psarisomus, 205.
Siphia, 292, 1083.
Siphonorhis, 121.
Siptornis, 199, 1072.
Sirystes, 243.
Sisopygis, 228.
Sisura, 288.
Sitagra, 564, 1107.
Sitta, 680, 1112.
*Sittace* = Ara, 10.
*Sittacilla* = Glyphorhynchus, 190.
Sittasomus, 190, 1071.
*Sittella* = Neositta, 682.
*Sittella* = Sitta, 680.
*Sittiparus* = Minla, 343, 1088.
*Sittiparus* = Parus, 1100.
*Siurus* = Henicocichla, 436.
Siva, 347, 1088.
*Skotiomimus* = Mimus, 415.
*Smaragdites* = Lampornis, 145.
Smaragdochrysis, 142.
Smicrornis, 267.
*Smilonyx* = Ketupa, 879.
Smilorhis, 37, 1055.
*Smithiglaux* = Tænioglaux, 897.
Smithornis, 285, 1082.
*Solenoglossus* = Microglossus, 1.
Somateria, 1000.
*Sorella* = Passer, 597.
*Soroplex* = Colaptes, 62.
*Spaniopicoides* = Gecinulus, 67.
*Sparganura* = Lesbia, 158.
*Sparvius* = Astur, 839.
*Spasornis* = Vanga, 499.
*Spatherodia* = Platalea, 904.
*Spathophorus* = Euimomota, 94.
Spathopterus, 20.
Spathura, 153.
Spatula, 995.
*Spatulea* = Spatula, 995.
*Speculipastor* = Pholidauges, 541.
*Speirops* = Zosterops, 705.
Spelæornis, 426.
*Spelectos* = Turacus, 88.
Speotyto, 895, 1117.
Spermestes, 576, 1108.
*Spermolegus* = Accentor, 381.
*Spermophaga* = Spermospiza, 571.
Spermophila, 614.
Spermophilopsis, 614.
Spermospiza, 571.
*Sphagolobus* = Ceratogymna, 101.
*Spheconax* = Melittophagus, 96.
*Sphecophobus* = Melittophagus, 96.
Sphecotheres, 528.
*Sphenæna* = Sphenocercus, 731.
Spheniscus, 1048.
Sphenocercus, 731, 1114.
Sphenocichla, 428.
Sphenœacus, 337.
Sphenoproctus, 133.
*Sphenopyga* = Anumbius, 197.
*Sphenorhynchus* = Ciconia, 905.
*Sphenorhynchus* = Glyphorhynchus, 190.
Sphenostoma, 469.
*Sphenotelus* = Ptilogonys, 261.
*Sphenotreron* = Sphenocercus, 731.
Sphenura, 349.
*Sphenurus* = Sphenocercus, 731.
*Sphærolaryngus* = Crax, 789.
Sphyropicus, 69, 1058.
*Spicifer* = Lophura, 798.
*Spiciferus* = Pavo, 794.
*Spilocircus* = Circus, 835.
Spilocorydon, 457.
*Spiloglaux* = Ninox, 887.
*Spilopelia* = Turtur, 761.
Spiloptila, 362.
Spilornis, 834.
Spilotreron, 740.
*Spilura* = Gallinago, 952.
*Spina* = Emberiza, 620.
Spindalis, 661, 1111.
*Spinites* = Spizella, 630.
*Spinus* = Chrysomitris, 591.
*Spipola* = Anthus, 445.
Spiza, 639.
*Spiza* = Cyanospiza, 626.
*Spizacercus* = Circus, 835.
Spizaëtus, 848.
*Spizampelis* = Spindalis, 661.
Spizella, 630.
Spiziapteryx, 869.
Spiziastur, 850.
*Spizigeranus* = Heterospizias, 861.
*Spizigeranus* = Urubitinga, 861.
*Spizilauda* = Galerida, 457.
Spizixus, 304.
Spizocorys, 454.
Spodiopsar, 535.
Spodiornis, 641.
*Sporadicus* = Sporadinus, 142.
Sporadinus, 142, 1066.
Sporæginthus, 581, 1108.
*Sporathraupis* = Tanagra, 661.
*Sporophila* = Spermophila, 614.
Sporopipes, 570.
*Sporothlastes* = Amadina, 579.



Digitized by Google

*Spreo* = Notauges, 548.
SQUATAROLA, 937.
*Stachyridopsis* = Cyanoderma, 342.
*Stachyrirhynchus* = Sphenocichla, 428.
*Stachyris* = Cyanoderma, 342.
*Stachyris* = Strachyrhis, 339.
*Stactocichla* = Garrulax, 327.
STACTOLÆMA, 38, 1055.
STAGANOPLEURA, 579.
*Stagnicola* = Gallinula, 973.
STAPHIDIA, 344.
*Starna* = Perdix, 812.
STARNŒNAS, 774.
STASIASTICUS, 335.
STEATORNIS, 115.
*Steganopus* = Phalaropus, 957.
*Steganura* = Vidua, 574.
*Steganurus* = Spathura, 153.
*Stegnolæma* = Penelope, 791.
*Stelgidillas* = Chlorocichla, 1085.
STELGIDOPTERYX, 260, 1079.
*Stelgidostomus* = Saltator, 644.
STELLULA, 163.
*Stellura* = Stellula, 163.
STENOPSIS, 121
*Stenorhynchus* = Cinclocerthia, 414.
STENOSTIRA, 273.
*Stenurrna* = Zenaida, 757.
STEPHANIBYX, 936.
STEPHANOPHORUS, 664.
*Stephanoxis* = Cephalolepis, 164.
STERCORARIUS, 1027.
STERNA, 1014.
STERNOCLYTA, 148.
*Sternœnas* = Starnœnas, 774.
*Sternolophata* = Nænia, 1018.
*Sternula* = Sterna, 1014.
*Sthenelides* = Cygnus, 986.
*Sthenelus* = Cygnus, 986.
*Stictocarbo* = Phalacrocorax, 1006.
*Stictocraugus* = Campothera, 65.
*Stictænas* = Columba, 748.
*Stictognathus* = Pachycephalixus, 306.
STICTOLIMNAS, 967.
STICTONETTA, 989.
*Stictopeleia* = Geopelia, 762.
*Stictopicus* = Campothera, 65.
*Stictoptera* = Stizoptera, 580.
STICTOSPIZA, 579.
*Stigmatopelia* = Turtur, 761.
STIGMATOPS, 718.
STIGMATURA, 235.
STILBOPSAR, 546.
STILTIA, 929.
STIPHRORNIS, 358.
STIPITURUS, 348.
STIZOPTERA, 580.
STIZORHINA, 1083.
*Stokesiella* = Eustephanus, 157.
*Stoliczkana* = Leptopœcile, 379.
*Stolida* = Anous, 1018.
*Stomioptera* = Ptilotis, 719.
STOPAROLA, 291.
*Stoparola* = Sylvia, 374.
STRACHYRHIS, 339, 1087.
*Streblorhamphus* = Avocettula, 145.
STREPERA, 501.
*Strepsilas* = Arenaria, 949.
*Streptocerylc* = Ceryle, 114.
STREPTOCITTA, 543.
*Streptopelia* = Turtur, 759.
*Stridula* = Strix, 898.
*Strigiceps* = Circus, 835.
*Strigops* = Stringops, 1.
*Strigopsis* = Stringops, 1.
*Stringonyx* = Machærhamphus, 865.
STRINGOPS, 1.
*Striphomyias* = Diaphorophyia, 265.
STRIX, 898.
*Strobilophaga* = Pinicola, 606.
*Strophiortyx* = Odontophorus, 822.
STRUTHIDEA, 515.
STRUTHIO, 1052.
*Struthus* = Fringilla, 589.
*Stugnopicus* = Miglytes, 77.
STURNELLA, 555, 1106.
STURNIA, 537.
*Sturnoides* = Aplonis, 541.
STURNOPASTOR, 536.
STURNORNIS, 536.
STURNUS, 534.
*Stylorhynchus* = Henicognathus, 13.
SUBLEGATUS, 241.
*Suiriri* = Empidagra, 241.
SULA, 1011, 1118.
*Sularius* = Sula, 1011.
SURNIA, 894.
SURNICULUS, 50.
SUTHORA, 470, 1101.
SUTORIA, 361.
SUYA, 358, 1039.
SYCALIS, 601.
*Sycalis* = Pseudochloris, 639.
*Sycobius* = Malimbus, 568.
SYCOBROTUS, 565, 1107.
*Sylbeocyclus* = Podilymbus, 1012.
*Sylochelidon* = Hydroprogne, 1014.
SYLPHITREON, 739.
*Sylvania* = Setophaga, 441.
SYLVIA, 374, 1090.

Digitized by Google

*Sylviaxis* = Scytalopus, 166.
*Sylvicola* = Columba, 748.
*Sylvicola* = Parula, 432.
*Sylvicola* = Phylloscopus, 377.
SYLVIELLA, 354, 1089.
*Sylvietta* = Sylviella, 354.
SYLVIORTHORHYNCHUS, 201.
SYLVIPARUS, 465.
SYMA, 110.
SYMMORPHUS, 303.
*Symplectes* = Sycobrotus, 565.
SYMPHEMIA, 946.
*Symposiachrus* = Monarcha, 289.
SYNALLAXIS, 197, 1072.
*Syncopta* = Camaroptera, 356.
SYNŒCUS, 816.
*Synoicus* = Synœcus, 816.
*Synornis* = Muscicapa, 262.
SYNTHLIBORHAMPHUS, 1045.
*Sypheotides* = Sypheotis, 926.
SYPHEOTIS, 926.
*Syrichta* = Contopus, 248.
*Syrichta* = Nuttallornis, 1078.
*Syricter* = Syrigma, 917.
SYRIGMA, 917.
*Syrmaticus* = Phasianus, 801.
SYRNIUM, 890.
SYRRHAPTES, 776.
TACCOCUA, 58.
*Tachea* = Dromæus, 1050.
TACHORNIS, 126.
*Tachuris* = Cyanotis, 236.
*Tachybaptus* = Podicipes, 1040.
TACHYCINETA, 255, 1079.
*Tachydromus* = Cursorius, 930.
TACHYERES, 993.
*Tachypetes* = Fregata, 1012.
TACHYPHONUS, 655.
*Tachyspizias* = Astur, 841.
*Tachytriorchis* = Buteo, 855.
TADORNA, 988.
*Tænidiestes* = Chloëphaga, 985.
TÆNIOGLAUX, 897.
TÆNIOPTERA, 225.
*Tænioptynx* = Glaucidium, 896.
TÆNIOPYGIA, 580.
TÆNIOTRICCUS, 1075.
*Tænipœnas* = Columba, 748.
*Taha* = Pyromelana, 571.
TALAPHORUS, 135.
TALEGALLUS, 788.
*Talpacotia* = Columbigallina, 763.
*Tamatia* = Bucco, 46.
*Tamatia* = Trachyphonus, 40.
*Tamnolanius* = Agriornis, 224.
TANAGRA, 661.
TANAGRELLA, 670.
*Tantalides* = Plegadis, 903.
*Tantalides* = Tantalus, 905.
*Tantalops* = Tantalus, 905.
TANTALUS, 905.
TANYGNATHUS, 18, 1054.
*Tanypeplus* = Pharomacrus, 85.
*Tanypus* = Grallina, 500.
TANYSIPTERA, 105.
TAONISCUS, 785.
*Taraba* = Thamnophilus, 182.
TARDIVOLA, 639.
TARSIGER, 384, 1091.
*Tatao* = Calliste, 665.
*Tatare* = Acrocephalus, 368.
*Tchitrea* = Terpsiphone, 280.
*Tectonornis* = Scenopœetes, 523.
*Telamon* = Lophornis, 165.
*Teleonema* = Cirrhipipra, 220.
TELEPHONUS, 488.
*Telesiella* = Petasophora, 144.
*Telesilla* = Petasophora, 144.
TELESPIZA, 606, 1109.
*Telmatias* = Gallinago, 952.
*Telmatodytes* = Cistothorus, 424.
*Telophonus* = Telephonus, 488.
*Telophorus* = Pelicinius, 491.
TEMENUCHUS, 537.
*Temnoris* = Suthora, 470.
TEMNOTROGON, 86.
TEMNURUS, 509.
*Tenthaca* = Tephrodornis, 493.
*Tenthera* = Tephrodornis, 493.
*Tephræropa* = Merops, 96.
*Tephras* = Zosterops, 705.
TEPHROCORYS, 454
*Tephrodiglossa* = Diglossa, 685.
TEPHRODORNIS, 493.
*Tephrolæma* = Anthreptes, 703.
*Tephrolanius* = Tephrodornis, 493.
*Tephrospiza* = Poliospiza, 599.
*Teraspiza* = Accipiter, 844.
*Terathopius* = Helotarsus, 835
TEREKIA, 948.
*Terenotreron* = Ptilopus, 735.
TERENURA, 177, 1069.
TERETISTRIS, 438.
TERPSIPHONE, 280, 1081.
*Tersa* = Procnias, 670.
*Tersina* = Procnias, 670.
*Tesia* = Oligura, 343.
*Tesia* = Pnoepyga, 430.
*Tetrænura* = Vidua, 574.
TETRAGONOPS, 42, 1056.

Digitized by Google

Tetrao, 825.
Tetraogallus, 806.
*Tetraoperdix* = Lerwa, 805.
Tetraophasis, 806.
Tetrapteryx, 923.
Tetrastes, 823.
*Tetrax* = Otis, 925.
Textor, 569.
*Thalassæa* = Sterna, 1014.
*Thalassarche* = Diomedea, 1038.
*Thalasseus* = Sterna, 1014.
*Thalassidroma* = Procellaria, 1028.
Thalassiornis, 1001.
*Thalassipora* = Sterna, 1014.
*Thalassites* = Phaëthusa, 1013.
Thalassoaëtus, 853.
Thalassoeca, 1033.
*Thalassogeron* = Diomedea, 1038.
Thalurania, 143, 1066.
*Thamnarchus* = Batara, 184.
Thamnistes, 181, 1070.
Thamnobia, 410.
Tamnocharis, 171.
*Thamnocichla* = Thamnolæa, 391.
*Thamnodus* = Melizophilus, 375.
Thamnolæa, 391, 1092.
Thamnomanes, 180, 1070.
Thamnophilus, 182, 1070.
Thamnornis, 362.
*Tharrhaleus* = Accentor, 381.
*Thaumalea* = Chrysolophus, 803.
*Thaumántoessa* = Loddigesia, 166.
*Thaumasius* = Talaphorus, 135.
*Thaumaste* = Eustephanus, 157.
Thaumastura, 160.
*Thaumatias* = Agyrtria, 135.
*Theiopicus* = Colaptes, 62.
*Thelydrias* = Cinnicerthia, 419.
*Thereiceryx* = Megalæma, 1056.
Theristicus, 902.
*Theromyias* = Sayornis, 227.
*Therosa* = Ceyx, 111.
*Thiellus* = Puffinus, 1030.
*Thilius* = Agelæus, 553.
Thinocorus, 780.
Thinornis, 941.
*Thinotretis* = Certhilauda, 450.
Thlypopsis, 653.
*Thoracocincla* = Merula, 394.
Thoracotreron, 739.
*Thoria* = Treron, 733.
*Thouarsitreron* = Ptilopus, 735.
Thrasaëtus, 848.
*Thraupis* = Tanagra, 661.
*Thremnophilus* = Pastor, 537.
Threnetes, 131.
*Threnetria* = Locustella, 370.
*Threnoëdus* = Querula, 218.
*Threnopipo* = Picus, 70.
*Threptia* = Eriocnemis, 153.
*Threskiornis* = Ibis, 900.
*Thringorhina* = Strachyrhis, 339.
Thripadectes, 193.
*Thripias* = Dendropicus, 73.
*Thripobrotus* = Picolaptes, 187.
Thriponax, 82, 1059.
Thripophaga, 195, 1072.
Thryolegus, 1072.
Thryomanes, 424.
Thryophilus, 421, 1095.
Thryothorus, 422, 1095.
*Thyellas* = Puffinus, 1030.
*Thyellodroma* = Puffinus, 1030.
Thyrorhina, 970.
Tiaris, 642.
Tichodroma, 684.
*Tichornis* = Tinnunculus, 870.
*Tickellia* = Cryptolopha, 285.
Tiga, 78, 1059.
Tigrisoma, 919.
*Tigrornis* = Tigrisoma, 919.
Tijuca, 215.
Tilmatura, 162.
*Timalia* = Timelia, 339.
Timelia, 339, 1087.
Timeliopsis, 727.
Timolia, 143, 1066.
*Tinactor* = Sclerurus, 191.
Tinamotis, 786.
Tinamus, 781.
Tinnunculus, 870.
*Tirica* = Brotogerys, 15.
Tityra, 210.
*Tmetoceros* = Bucorvus, 99.
Tmetothylacus, 448.
*Tmetotrogon* = Temnotrogon, 86.
*Tockus* = Alophius, 103.
Todirhamphus, 110.
Todirostrum, 231.
Todopsis, 275.
Todus, 95.
*Todus* = Muscivora, 244.
*Tolmaëtus* = Eutolmaëtus, 850.
*Tolmerus* = Hypotriorchis, 872.
*Tomopeleia* = Geopelia, 762.
Topaza, 147, 1066.
*Torda* = Alca, 1042.
*Torquilla* = Yunx, 85.
*Torticella* = Ortyxelus, 930.
Totanus, 946.

Digitized by Google

*Toujou* = Rhea, 1052.
*Toxocorys* = Certhilauda, 450.
*Toxostoma* = Harporhynchus, 417.
*Toxotreuches* = Phaethornis, 131.
*Trachelia* = Glareola, 929.
*Trachelonetta* = Dafila, 994.
*Trachelotis* = Otis, 925.
TRACHYCOMUS, 315.
*Trachylæmus* = Trachyphonus, 40.
*Trachypelmus* = Tinamus, 781.
TRACHYPHONUS, 40.
TRAGOPAN, 797.
*Tragopan* = Bucorvus, 99.
TRAVERSIA, 206.
*Treroläma* = Pitiopus, 735.
TRERON, 733.
TRIBONYX, 973.
*Tribura* = Lusciniola, 371.
*Triccus* = Todirostrum, 231.
*Trichas* = Criniger, 310.
*Trichas* = Geothlypis, 437.
*Trichites* = Xenocichla, 309.
TRICHIXUS, 409.
TRICHOCICHLA, 335.
TRICHOGLOSSUS, 30, 1054.
*Trichogramoptila* = Urolonchia, 585.
TRICHOLÆMA, 36, 1055.
*Tricholais* = Eremomela, 355
TRICHOLESTES, 315.
*Tricholimnas* = Eulabeornis, 962.
*Tricholopha* = Prymnacantha, 165.
*Trichometopus* = Dicrurus, 529.
*Trichoparadisea* = Paradisea, 518.
TRICHOPHOROPSIS, 315.
*Trichophorus* = Chlorocichla, 313.
*Trichophorus* = Criniger, 310.
*Trichopicus* = Melanerpes, 68.
TRICHOSTOMA, 333.
*Trichostoma* = Erythrocichla, 336.
TRICHOTHRAUPIS, 654.
TRICLARIA, 7.
TRIDACTYLIA, 72, 1058.
*Tridactylus* = Turnix, 778.
*Triglyphidia* = Chlorophonia, 670.
TRINGA, 950.
*Tringoides* = Actitis, 948.
*Triorches* = Pandion, 877.
*Triorchis* = Archibuteo, 854.
*Tripsurus* = Melanerpes, 68.
TRIPTORHINUS, 168.
*Trizusa* = Turturœna, 753.
*Trocaza* = Columba, 748.
TROCHALOPTERON, 321, 1086.
TROCHILUS, 162.
*Trochilus* = Phylloscopus, 377.
TROCHOCERCUS, 275.
*Troctes* = Trogon, 86.
TROGLODYTES, 425, 1096.
*Troglodytes* = Anorthura, 427.
TROGON, 86, 1060.
*Trogonurus* = Trogon, 86.
*Tropicoperdix* = Arboricola, 813.
*Tropicophilus* = Phaëton, 1004.
TROPIDORHYNCHUS, 725.
*Trugon* = Eutrygon, 774.
TRUPIALIS, 555.
*Trygon* = Ectopistes, 756.
*Trygon* = Eutrygon, 774.
TRYNGITES, 950.
TRYPANOCORAX, 505.
*Tryphæna* = Tilmatura, 162
*Tucains* = Rhamphastos, 42.
*Tucanus* = Rhamphastos, 42.
*Tujus* = Rhea, 1052.
TURACŒNA, 754.
TURACUS, 88, 1060.
TURDINULUS, 332, 1086-87.
TURDINUS, 331.
*Turdinus* = Illadopsis, 336.
*Turdirostris* = Trichixus, 409.
*Turdulus* = Geocichla, 404.
TURDUS, 399, 1093.
TURNAGRA, 329.
*Turnicigralla* = Pedionomus, 779.
TURNIX, 778.
TURTUR, 758, 1114.
TURTURŒNA, 753.
*Turumtia* = Hypotriorchis, 872.
*Tybo* = Syrnium, 890.
TYLAS, 316.
*Tylibyx* = Sarciophorus, 933.
*Tyloramphus* = Simorhynchus, 1045.
TYMPANISTRIA, 765.
TYMPANUCHUS, 824.
*Typhon* = Ardea, 909.
*Tyranneutes* = Pipra, 220.
TYRANNISCUS, 239, 1076.
*Tyrannula* = Myiobius, 245.
TYRANNULUS, 238, 1076.
TYRANNUS, 252.
*Ulula* = Syrnium, 890.
*Ulysses* = Eucephala, 139.
*Uncirostrum* = Diglossa, 685.
*Undina* = Erismatura, 1001.
UPUCERTHIA, 203, 1073.
UPUPA, 99, 1061.
URÆGINTHUS, 582.
URAGUS, 608.
*Uralcyon* = Tanysiptera, 105.
*Uralia* = Spathura, 153.

Digitized by Google

*Uranomitra* = Agyrtria, 135.
*Uranomitra* = Cyanomyia, 138.
*Uranornis* = Paradisea, 518.
Uratelornis, 92.
*Urauges* = Lamprotornis, 544.
*Urax* = Pauxis, 790.
Uria, 1043.
*Urile* = Phalacrocorax, 1006.
*Urinator* = Colymbus, 1039.
Uroaëtus, 853.
Urobrachya, 572, 1108.
*Urocex* = Urogalba, 45.
Urocharis, 675.
Urochroa, 148.
*Urochroa* = Urochroma, 8.
Urochroma, 8.
Urocichla, 426.
Urocissa, 507.
*Urococcyx* = Rhamphococcyx, 59.
*Urocolius* = Colius, 90.
Urocynchramus, 620.
*Urodiscus* = Prioniturus, 17.
*Urodrepanis* = Æthopyga, 695.
Urodynamis, 54.
Urogalba, 45.
*Urogallus* = Tetrao, 825.
*Urohipis* = Dryodromas, 354.
Urolais, 1089.
*Urolampra* = Metallura, 155.
Urolestes, 482.
Uroleuca, 515.
Uroloncha, 585.
*Uromitrus* = Hirundo, 253.
Uropelia, 764.
Uropsila, 428.
Urospatha, 93.
*Urosphena* = Horornis, 372.
Urospizias, 842, 1116.
*Urospizias* = Astur, 839.
*Urospizias* = Erythrotriorchis, 847.
Urostiche, 154.
Urothraupis, 650.
Urotriorchis, 838.
*Urrua* = Bubo, 880.
Urubitinga, 861.
*Urubitornis* = Harpyhaliaëtus, 861.
*Utamania* = Alca, 1043.
*Vaginalis* = Chionis, 780.
*Vagabunda* = Dendrocitta, 508.
Vanellus, 935.
Vanga, 499.
*Vaza* = Coracopsis, 4.
*Venilia* = Gecinus, 63.
Veniliornis, 1059.
*Vermivora* = Helmitherus, 431.
Verreauxia, 84.
Vestiaria, 692.
*Videstrelda* = Vidua, 574.
Vidua, 574.
*Vigorsia* = Coracopsis, 4.
Vinago, 731.
Vini, 30.
*Virago* = Querquedula, 992.
*Viralva* = Hydrochelidon, 1012.
Vireo, 471, 1102.
Vireolanius, 475, 1102.
*Vireonella* = Vireo, 471.
*Vireosylvia* = Vireo, 471.
Viridonia, 693.
*Vitia* = Drymochæra, 334.
*Vitiflora* = Saxicola, 388.
*Vivia* = Picumnus, 83.
Volatinia, 619.
*Volvicivora* = Campophaga, 300.
*Vulpanser* = Tadorna, 988.
Vultur, 829.
*Wagellus* = Fulmarus, 1036.
*Waldenia* = Hirundo, 253.
*Warzewiczia* = Heliangelus, 155.
*Wilsonia* = Myiodioctes, 442.
Xanthixus, 307.
*Xanthixus* = Pycnonotus, 305.
Xanthocephalus, 554.
*Xanthochlamys* = Amblyornis, 525.
*Xanthocitta* = Xanthoura, 514.
*Xanthocnus* = Ardeiralla, 915.
*Xanthocorys* = Anthus, 445.
*Xanthodira* = Petronia, 596.
*Xanthogenys* = Heliodoxa, 149.
Xantholæma, 39, 1056.
*Xantholestes* = Culicicapa, 282.
Xanthomelus, 524.
*Xanthomixis* = Bernieria, 314.
*Xanthomyza* = Meliphaga, 719.
*Xanthonotus* = Oriolus, 525.
*Xanthophilus* = Hyphantornis, 561.
*Xanthopicus* = Celeus, 79.
*Xanthopsar* = Xanthosomus, 1106.
Xanthoptgia, 272, 1080.
*Xanthornus* = Icterus, 558.
Xanthosomus, 553.
*Xanthotis* = Ptilotis, 719.
Xanthoura, 514, 1105.
Xema, 1020.
Xenerpestes, 200.
Xenocichla, 309, 1085.
*Xenicopsis* = Anabatoxenops, 192.
Xenicus, 206.
*Xenocrangus* = Xenopicus, 73.
Xenodacnis, 687.

Digitized by Google

*Xenogenys* = Cochoa, 284.
Xenopicus, 73.
Xenopipo, 220, 1074.
Xenopirostris, 499.
Xenops, 192, 1071-72.
Xenopsaris, 215.
Xenorhynchus, 907.
Xenospingus, 641.
*Xenotreron* = Ptilopus, 735.
*Xenurus* = Alectrurus, 228.
*Xenus* = Terekia, 948.
Xerophila, 468.
*Xilexetastes* = Dendrexetastes, 188.
Xiphidiopicus, 77.
*Xiphidiopterus* = Sarciophorus, 933.
*Xiphidiorhynchus* = Cladorhynchus, 943.
Xiphocolaptes, 188.
Xipholena, 217.
Xiphorhamphus, 326.
Xiphorhynchus, 186, 1070.
*Xiphorhynchus* = Xiphorhamphus, 326.
*Xolmis* = Tænioptera, 225.
*Xylobucco* = Barbatula, 37.
*Xylocopus* = Picus, 70.
*Xylocota* = Gallinago, 952.
*Xylolepes* = Chrysocolaptes, 80.
*Xylurgus* = Hypopicus, 70.
*Yetapa* = Alectrurus, 228.
*Yphantes* = Hyphantes, 556.
*Ypophæa* = Hypophæa, 671.
Yuhina, 346, 1088.
Yungipicus, 74.
Yunx, 85.
*Zalias* = Puffinus, 1030.
*Zamelodia* = Hedymeles, 612.
Zanclostomus, 58.
*Zanthomiza* = Meliphaga, 719.
*Zanthopygia* = Xanthopygia, 272.
*Zapornia* = Porzana, 967.
*Zaprium* = Halobæna, 1037.
*Zapterus* = Chætusia, 936.
Zarhynchus, 549, 1106.
*Zebrapicus* = Centurus, 69.
Zebrilus, 915.
Zeledonia, 167.
Zenaida, 757.
Zenaidura, 757, 1114.
*Zenædura* = Zenaidura, 757.
*Zenophasia* = Glyphorhynchus, 190.
Zeocephus, 280.
*Zephyritis* = Myrtis, 161.
*Zetetes* = Pachyrhamphus, 212.
Zodalia, 158, 1068.
Zonæginthus, 580.
Zonerodius, 920.
*Zonibyx* = Eudromias, 938.
*Zonifer* = Sarciophorus, 933.
Zonœnas, 746.
*Zonogastris* = Pytelia, 578.
Zonophaps, 745.
Zonotrichia, 625, 1110.
Zootherа, 404.
*Zosteropisylvia* = Zosterops, 705.
Zosterops, 705, 1113.
Zosternornis, 339.

Digitized by Google

SYNOPSIS AVIUM

# NOUVEAU
# MANUEL D'ORNITHOLOGIE

PAR

Alphonse DUBOIS

Docteur en sciences naturelles,
Conservateur au Musée Royal d'Histoire naturelle de Belgique,
Officier de l'Ordre de Léopold,
Membre du Comité international et permanent d'Ornithologie,
de la Commission permanente d'étude des collections du Musée de l'État Indépendant du Congo,
Membre honoraire, correspondant ou effectif de plusieurs Sociétés savantes.

## Fascicules XVI et XVII

TABLES ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES ET SYSTÉMATIQUE
DES ORDRES ET DES FAMILLES

BRUXELLES
H. LAMERTIN, éditeur
50, RUE DU MARCHÉ-AU-BOIS

1904

# POSTFACE

La rédaction du *Synopsis avium* a été arrêtée le 1er juin 1903, ne pouvant davantage retarder la mise sous presse du supplément, comprenant les additions et les corrections, paru encore la même année. Les espèces et les variétés nouvelles décrites depuis cette date, et même un peu avant, n'ont donc pu être signalées. Je suis cependant assez disposé à publier dans un an ou deux un second supplément, qui tiendra les Ornithologistes au courant des nouvelles découvertes ornithologiques.

Dans l'ensemble des deux volumes, j'ai signalé 12.509 espèces et 3969 variétés, soit en tout 16.478 espèces et sous-espèces ou variétés, le tout réparti dans 2252 genres (1). G. R. Gray, dans son « *Hand-list of genera and species of Birds* » ne mentionne que 11.162 espèces. Comme on le voit, les découvertes ont été nombreuses depuis 1871.

En écrivant ces lignes finales, je ne puis m'empêcher de remercier les honorables souscripteurs, dont le soutien m'a permis de mener à bonne fin ce grand et laborieux travail. Je remercie aussi la Presse scientifique, dont les encouragements ne m'ont pas fait défaut.

A. D.

*Bruxelles, juillet 1904.*

(1) Je dois faire remarquer qu'à partir de la page 613, le numérotage des genres est erroné, par suite d'une erreur typographique dont je me suis aperçu trop tard, et qui fait que ces numéros sont reculés de 300 unités.

Digitized by Google

# TABLE SYSTÉMATIQUE
# DES ORDRES ET DES FAMILLES


| | PAGES |
|---|---|
| Ord. VI. — Columbæ | 751 |
| *Fam. I. — Treronidæ* | 751 |
| Subf. 1. — Treroninæ | 751 |
| Subf. 2. — Ptilopodinæ | 755 |
| Subf. 3. — Carpophaginæ | 745 |
| *Fam. II. — Columbidæ* | 748 |
| Subf. 1. — Columbinæ | 748 |
| Subf. 2. — Macropygiinæ | 754 |
| Subf. 3. — Ectopistinæ | 756 |
| *Fam. III. — Peristeridæ* | 757 |
| Subf. 1. — Zenaidinæ | 757 |
| Subf. 2. — Turturinæ | 758 |
| Subf. 3. — Geopeliinæ | 762 |
| Subf. 4. — Chamepeliinæ | 765 |
| Subf. 5. — Phabinæ | 765 |
| Subf. 6. — Geotrygoninæ | 768 |
| Subf. 7. — Calœnadinæ | 774 |
| *Fam. IV. — Gouridæ* | 775 |
| *Fam. V. — Didunculidæ* | 775 |
| SUCL. II. — PTILOPÆDES | 776 |
| Ord. VII. — Heteroclitæ | 776 |
| *Fam. I. — Pteroclidæ* | 776 |
| *Fam. II. — Hemipodiidæ* | 778 |
| *Fam. III. — Thinocoridæ* | 780 |
| *Fam. IV. — Chionidæ* | 780 |
| Ord. VIII. — Crypturi | 781 |
| *Fam. I. — Tinamidæ* | 781 |
| Subf. 1. — Tinaminæ | 781 |
| Subf. 2. — Tinamotidinæ | 786 |
| Ord. IX. — Gallinæ | 786 |
| *Fam. I. — Megapodiidæ* | 786 |
| *Fam. II. — Cracidæ* | 789 |
| *Fam. III. — Opisthocomidæ* | 794 |
| *Fam. IV. — Phasianidæ* | 794 |
| Subf. 1. — Pavoninæ | 794 |
| Subf. 2. — Meleagrinæ | 796 |
| Subf. 3. — Phasianinæ | 796 |
| Subf. 4. — Numidinæ | 804 |
| Subf. 5. — Perdicinæ | 805 |
| *Fam. V. — Odontophoridæ* | 818 |
| *Fam. VI. — Tetraonidæ* | 825 |
| Ord. X. — Accipitres | 827 |
| *Fam. I. — Serpentariidæ* | 827 |
| *Fam. II. — Cathartidæ* | 827 |
| *Fam. III. — Vulturidæ* | 829 |
| *Fam. IV. — Falconidæ* | 831 |
| Subf. 1. — Gypaëtinæ | 831 |
| Subf. 2. — Gypohieracinæ | 831 |
| Subf. 3. — Polyborinæ | 832 |
| Subf. 4. — Circaëtinæ | 833 |
| Subf. 5. — Gymnogenynæ | 835 |
| Subf. 6. — Circinæ | 835 |
| Subf. 7. — Accipitrinæ | 837 |
| Subf. 8. — Aquilinæ | 847 |
| Subf. 9. — Buteoninæ | 854 |
| Subf. 10. — Milvinæ | 862 |
| Subf. 11. — Falconinæ | 868 |
| *Fam. V. — Pandionidæ* | 877 |
| *Fam. VI. — Asionidæ* | 877 |
| Subf. 1. — Asioninæ | 877 |
| Subf. 2. — Ketupinæ | 879 |
| Subf. 3. — Buboninæ | 880 |


Digitized by Google

PAGES

Subf. 4. — Syrniinæ . . . . 890
Subf. 5. — Surniinæ . . . . 895
Subf. 6. — Phodilinæ. . . . 898
*Fam. VII. — Strigidæ* . . . 898
Ord. XI. — Herodiones . . . 900
*Fam. I. — Ibididæ.* . . . . 900
*Fam. II. — Plataleidæ* . . . 904
*Fam. III. — Ciconiidæ* . . . 905
Subf. 1. — Tantalinæ. . . . 905
Subf. 2. — Ciconiinæ . . . . 905
*Fam. IV. — Phœnicopteridæ* . 908
*Fam. V. — Scopidæ* . . . . 909
*Fam. VI. — Balænicepidæ* . . 909
*Fam. VII. — Ardeidæ* . . . 909
Ord. XII. — Grallatores . . 920
Subord. I. — Alectorides . . 920
*Fam. I. — Aramidæ* . . . . 920
*Fam. II. — Eurypygidæ*. . . 921
*Fam. III. — Rhinochetidæ* . . 921
*Fam. IV. — Gruidæ* . . . . 921
*Fam. V. — Psophiidæ.* . . . 925
*Fam. VI. — Cariamidæ* . . . 924
*Fam. VII. — Otidæ* . . . . 924
Subord. II. — Limicolæ . . . 927
*Fam. VIII. — OEdicnemidæ* . 927
*Fam. IX. — Dromadidæ* . . . 929
*Fam. X. — Glareolidæ* . . . 929
*Fam. XI. — Cursoriidæ* . . . 930
*Fam. XII. — Charadriidæ* . . 932
Subf. 1. — Hæmatopodinæ . . 932
Subf. 2. — Charadriinæ . . . 933
*Fam. XIII. — Scolopacidæ* . . 942
Subf. 1. — Himantopodinæ . . 942
Subf. 2. — Totaninæ . . . . 944
Subf. 3. — Scolopacinæ . . . 949
Subf. 4. — Phalaropinæ . . . 956
Subord. III. — Fulicariæ . . 957
*Fam. XIV. — Parridæ* . . . 957
*Fam. XV. — Mesænatidæ* . . 959
*Fam. XVI. — Rallidæ* . . . 959
Subf. 1. — Ralliné . . . . 959
Subf. 2. — Gallinulinæ . . . 973
Subf. 3. — Fulicinæ . . . . 977
*Fam. XVII. — Heliornithidæ* . 978
Ord. XIII. — Palamedeæ. . . 979

PAGES

*Fam. — Palamedeidæ*. . . . 979
Ord. XIV. — Anseres. . . . 979
*Fam. I. — Anatidæ* . . . . 979
Subf. 1. — Anseranatinæ. . . 979
Subf. 2. — Cereopsinæ . . . 980
Subf. 3. — Plectropterinæ . . 980
Subf. 4. — Anserinæ . . . . 982
Subf. 5. — Chenonettinæ. . . 985
Subf. 6. — Cygninæ . . . . 986
Subf. 7. — Anatinæ . . . . 987
Subf. 8. — Fuligulinæ . . . 996
Subf. 9. — Erismaturinæ. . . 1001
Subf. 10. — Merganettinæ . . 1002
Subf. 11. — Merginæ. . . . 1003
Ord. XV. — Steganopodes . . 1004
*Fam. I. — Phaëthontidæ.* . . 1004
*Fam. II. — Pelecanidæ* . . . 1005
*Fam. III. — Phalacrocoracidæ*. 1006
Subf. 1. — Phalacrocoracinæ . 1006
Subf. 2. — Plotinæ . . . . 1010
*Fam. IV. — Sulidæ* . . . . 1011
*Fam. V. — Fregatidæ.* . . . 1012
Ord. XVI. — Gaviæ . . . . 1012
*Fam. I. — Sternidæ* . . . . 1012
Subf. 1. — Sterninæ . . . . 1012
Subf. 2. — Rhynchopinæ. . . 1020
*Fam. II. — Laridæ* . . . . 1020
*Fam. III. — Stercorariidæ* . . 1027
Ord. XVII. — Tubinares . . . 1028
*Fam. I. — Procellariidæ*. . . 1028
*Fam. II. — Puffiniidæ* . . . 1030
Subf. 1. — Puffiniinæ. . . . 1030
Subf. 2. — Fulmarinæ . . . 1036
*Fam. III. — Halodromidæ* . . 1037
*Fam. IV. — Diomedeidæ*. . . 1039
Ord. XVIII. — Pygopodes . . 1039
*Fam. I. — Colymbidæ* . . . 1039
*Fam. II. — Podicipedidæ* . . 1040
*Fam. III. — Alcidæ* . . . . 1042
Subf. 1. — Alcinæ. . . . . 1042
Subf. 2. — Fraterculinæ. . . 1045
Ord. XIX. — Impennes . . . 1047
*Fam. — Spheniscidæ* . . . . 1047
SUBCL. III. — RATITÆ. . . 1049
Ord. XX. — Apteryges . . . 1049

Digitized by Google

PAGES

*Fam. — Apterygidæ* . . . . 1049
Ord. XXI. — Casuarii. . . . 1050
*Fam. I. — Dromæidæ*. . . . 1050
*Fam. II. — Casuariidæ* . . . 1050
Ord. XXII. — Rheæ . . . . 1052
*Fam. — Rheidæ* . . . . . 1052
Ord. XXIII. — Struthiones . . 1052
*Fam. — Struthionidæ*. . . . 1052

**SUPPLÉMENT :**

*Psittaci* . . . . . 1055
*Zygodactylæ*. . . . . 1055

PAGES

*Heterodactylæ* . . . . . 1059
*Amphibolæ* . . . . . 1060
*Anisodactylæ*. . . . . 1060
*Macrochires* . . . . . 1063
*Passeres tracheophonæ*. . . . 1068
*Passeres oligomyodæ* . . . . 1075
*Passeres oscines* . . . . . 1078
*Crypturi* . . . . . 1115
*Gallinæ* . . . . . 1115
*Accipitres*. . . . . 1116
*Herodiones* . . . . . 1117
*Grallatores* . . . . . 1117
*Steganopodes*. . . . . 1118

Digitized by Google

# TABLE DES PLANCHES


Planche XIII. 1. Ptilopus ponapensis.
2. — pelewensis.
3. Globicera rufigula.
» XIV. 1. Carpophaga westermani.
2. Columba unicincta.
» XV. Lophura sumatrana.
» XVI. Pulsatrix maximiliani.


Digitized by Google

# TABLE ALPHABÉTIQUE

## DES ESPÈCES ET DES VARIÉTÉS (1)


abacoensis (Dendroeca), 1097.
abbas (Tanagra), 662.
abbotti (Cinnyris), 698.
— (Coccyzus), 1056.
— (Cosmophoneus), 490.
— (Cyanecula), 383.
— (Hypothymis), 1081.
— (Ibis), 901.
— (Malacocincla), 332, 1087.
*abbotti* (Pogonorhynchus), 35.
abbotti (Psittinus), 1054.
— (Sula), 1011.
— (Turtur), 759.
abbreviatus (Buteo), 857.
abdimii (Ciconia), 906.
abditiva (Manacus), 1074.
*abeillei* (Abeillia), 164.
abeillei (Arremon), 647.
— (Orchesticus), 644.
abeillii (Hesperiphona), 610.
— (Hyphantes), 556.
aberti (Anas), 990.
— (Pipilo), 637.
*abessinica* (Mesopicus), 1059.
abessinicus (Cinnyris), 697.
abieticola (Dryocopus), 83.
abingdoni (Campothera), 66.
— (Geospiza), 609.
*abnormis* (Hypotænidia), 961.
abnormis (Sasia), 85.
abrekiana (Merula), 397.
abyssinica (Chalcopelia), 1114.
— (Coracias), 92, 1060.
— (Halcyon), 109.
— (Lusciniola), 371, 1090.
— (Turdus), 399.
*abyssinica* (Vinago), 732.
abyssinica (Zosterops), 706, 1113.
abyssinicus (Bubo), 880.
— (Bucorvus), 99.
— (Dendropicus), 73.
— (Hyphantornis), 563).
— (Lioptilus), 273, 1080.
— (Pogonorhynchus), 36.
— (Rougetius), 965.
acaciæ (Argya), 324.
acadica (Nyctala), 894.
acadicus (Empidonax), 248, 1078.
accentor (Androphilus), 335.
accipitrinus (Asio), 878.
— (Deroptyus), 7.
*acclamator* (Scotiaptex), 892.
acer (Ornithion), 1076.
— (Tyranniscus), 239.
achrustera (Dendroeca), 1097.
— (Turdus), 1093.
acik (Chalcomitra), 701.
acis (Tanysiptera), 106.
acrita (Anabazenops), 1072.
acrorhynchus (Oriolus), 526.
actæon (Halcyon), 1062.
actia (Otocorys), 1099.
aculeata (Silta), 681.
acuminata (Hæmophila), 633.
— (Tringa), 952.
acunhæ (Nesospiza), 640.
acuta (Chætura), 128.
— (Dafila), 994.
aculicauda (Cypselus), 125, 1064.
— (Hylophilus), 1102.
— (Poephila), 584.
— (Uroloncha), 586.


(1) Les synonymes mentionnés dans l'ouvrage ne sont pas indiqués dans cette table, sauf quelques rares exceptions imprimées en italiques.



Digitized by Google

aculeicaudatus (Anumbius), 197.
— (Conurus), 11.
aculeicaudus (Lamprocolius), 547.
acutipennis (Chordeiles), 119.
— (Hapalocercus), 234.
acutirostris (Calandrella), 453.
— (Geospiza), 608.
— (Heteralocha), 516.
(Scytalopus), 166.
adamsi (Calandrella), 454.
— (Colymbus), 1040.
— (Montifringilla), 594.
— (Nesomimus), 416.
adansoni (Excalfactoria), 817.
addæ (Spathura), 153.
addendus (Cacomantis), 1056.
addita (Microeca), 1080.
adela (Oreotrochilus), 147.
adelaidæ (Dendroeca), 434.
— (Platycercus), 24.
adelberti (Aquila), 851.
— (Chalcomitra), 701.
adeliæ (Pygoscelis), 1047.
admiralitatis (Halcyon), 108.
adolphi (Phaetornis), 133.
adolphinæ (Myzomela), 715.
adorabilis (Lophornis), 165.
*adspersus* (Batrachostomus), 117.
adspersus (Crypturus), 783.
— (Francolinus), 809.
adusta (Otocorys), 452, 1099.
— (Synallaxis), 198.
aedon (Lusciniola), 371.
ægithaloides (Leptasthenura), 201.
*ægocephala* (Limosa), 945.
ægyptiaca (Alopochen), 988.
ægyptius (Caprimulgus), 124.
— (Milvus), 863.
— (Pluvianus), 930.
æmodia (Parus), 462.
æmodium (Conostoma), 470.
ænea (Carpophaga), 744.
— (Chaptia), 532.
*ænea* (Hypochæra), 574.
ænea (Quiscalus), 560.
*æneicauda* (Chalybura), 144.
æneicauda (Metallura), 156.
æneicaudus (Rhamphococcyx), 59.
æneotincta (Adelomyia), 155, 1067.
æneoviridis (Sporadinus), 1066.
æneum (Dicæum), 678.
*æneus* (Gallus), 803.
— (Lamprotornis), 544.
æneus (Molothrus), 552.
ænigma (Sapayoa), 1074.
ænobarbus (Pterythrius), 487.
*ænochroa* (Lagonosticta), 577.
ænops (Crecisculs), 971.
æqualis (Stelgidopteryx), 1079.
æquatorialis (Aglæactes), 1067.
— (Amaurospiza), 619.
— (Anærctes), 236.
— (Androdon), 131.
— (Calliste), 666.
— (Catamenia), 617.
— (Ceryle), 115.
— (Chalcomitra), 701.
— (Chlorodyta), 353.
*æquatorialis* (Cistothorus), 425.
æquatorialis (Cypselus), 125.
— (Dacnis), 688.
*æquatorialis* (Dendrornis), 189.
æquatorialis (Erismatura), 1001.
*æquatorialis* (Gallinago), 953.
æquatorialis (Gymnopithys), 1069.
— (Hapaloderma), 1060.
— (Herpsilochmus), 178.
*æquatorialis* (Hypoxanthus), 63.
æquatorialis (Malacoptila), 48.
— (Momotus), 94.
— (Phæolæma), 149.
— (Pogonorhynchus), 35.
— (Popelairea), 1068.
*æquatorialis* (Prymnacantha), 165.
æquatorialis (Psalidoprymna), 1067.
— (Rallus), 960.
— (Rhynchocyclus), 1077.
— (Sarcorhamphus), 828.
— (Sittasomus), 191.
— (Spermophila), 616.
— (Thamnistes), 181.
— (Tinnunculus), 871.
— (Urolestes), 482.
*æquatorialis* (Urospizias), 843.
æquatorialis (Yunx), 85.
æquinoctialis (Acrocephalus), 369.
— (Buteogallus), 861.
— (Geothlypis), 437.
— (Majaqueus), 1033.
— (Rhynchocyclus), 242.
æralatus (Pterythrius), 487.
aereus (Ceuthmochares), 60.
*æruginosus* (Cacomantis), 52.
æruginosus (Circus), 837.
— (Conurus), 12.
— (Chloronerpes), 65.
— (Prionochilus), 675.
æsalon (Hypotriorchis), 873.
æstiva (Chrysotis), 5.
— (Dendroeca), 433.


Digitized by Google

æstiva (Pyranga), 658.
æstivalis (Hæmophila), 634.
æthereus (Nyctibius), 118.
— (Phaeton), 1004.
æthiopica (Amblyospiza), 1107.
— (Hirundo), 254.
— (Ibis), 900.
— (Quelea), 571.
æthiopicus (Laniarius), 491.
æthiops (Asturina), 859.
— (Myrmecocichla), 391.
— (Pœcilodryas), 271.
— (Thamnophilus), 184.
*ætolius* (Milvus), 863.
afer (Cinnyris), 698.
— (Dicrurus), 529.
— (Eurystomus), 93.
— (Nilaus), 488.
— (Parus), 461.
— (Pternistes), 811.
affine (Malacopteron), 337.
— (Tricholæma), 36.
— (Trochalopteron), 321.
affinis (Accipiter), 846.
— (Aegotheles), 116.
— (Agyrtria), 136.
— (Alcyone), 113.
— (Anthracoceros), 101.
— (Arachnothera), 705.
— (Barbatula), 37.
*affinis* (Batis), 265.
affinis (Batrachostomus), 117.
— (Campylorhynchus), 1095.
— (Caprimulgus), 124.
— (Cinnyris), 698.
— (Colius), 91.
— (Colluricincla), 496, 1104.
— (Coracias), 92.
— (Corvinella), 482.
— (Corvus), 504.
*affinis* (Crateropus), 329.
affinis (Cryptolopha), 285.
— (Cyanocorax), 514.
— (Cymborhynchus), 206.
— (Cypselus), 126.
— (Dissemurus), 533.
— (Dryoscopus), 493.
— (Dysithamnus), 180.
— (Elaïnea), 240.
— (Eleopicus), 76.
— (Emberiza), 621.
— (Empidonax), 248.
*affinis* (Eriocnemis), 154.
affinis (Eucometis), 655.
— (Euphonia), 672.
affinis (Fuligula), 997.
— (Geococcyx), 61.
— (Geospiza), 609.
*affinis* (Gerygone), 269.
affinis (Hemignathus), 693.
— (Iole), 312.
— (Larus), 1024.
*affinis* (Lusciniola), 371.
affinis (Megapodius), 787.
— (Melilestes), 718.
— (Milvus), 863.
— (Mirafra), 457.
— (Monticola), 393.
— (Nesomimus), 416.
— (Nilaus), 488.
— (Ninox), 888.
— (Œdicnemus), 928.
*affinis* (Œstrelata), 1035.
affinis (Oreocincla), 1094.
— (Pachycephala), 477.
— (Pardalotus), 674.
— (Parus), 463.
— (Penelopides), 102.
— (Phœnicothraupis), 657.
— (Phylloscopus), 378.
— (Picolaptes), 187.
— (Porzana), 967.
— (Pycnorhamphus), 611.
— (Pytelia), 578.
— (Serinus), 600.
— (Sylvia), 374.
— (Symmorphus), 304.
— (Tanygnathus), 18.
— (Tephrodornis), 494.
— (Terpsiphone), 280.
*affinis* (Thamnistes), 1070.
aflavida (Columbigallina), 1114.
afra (Afrotis), 924.
— (Chalcopelia), 765, 1114.
— (Cryptorhina), 507.
— (Pyromelana), 572.
— (Pytelia), 578.
africana (Aëdon), 382.
— (Buphaga), 549.
— (Coturnix), 815.
— (Cypselus), 125.
— (Mirafra), 455.
— (Schizorhis), 90.
— (Upupa), 99.
— (Verreauxia), 84.
africanoides (Mirafra), 456.
africanus (Actophilus), 958.
— (Francolinus), 809.
— (Mesopicus), 77.
— (Phalacrocorax), 1010.

Digitized by Google

africanus (Pseudogyps), 830.
— (Sphenoeacus), 337.
afroides (Afrotis), 925.
agami (Ardea), 911.
agassizi (Coccornis), 609.
agilis (Anæretes), 236.
— (Chrysotis), 6.
— (Eleopicus), 76.
— (Oporornis), 436.
— (Parus), 463.
— (Vireo), 1102.
aglæa (Quiscalus), 560.
aglaiæ (Hadrostomus), 211.
agnata (Furnarius), 203.
*agrestis* (Geoffroyus), 17.
agricola (Acrocephalus), 369.
— (Colaptes), 63.
ahantensis (Francolinus), 810.
aignani (Zosterops), 710.
aikeni (Junco), 629.
— (Scops), 886.
*ajaja* (Ajaja), 905.
ajax (Cinclosoma), 319.
akahige (Erithacus), 382.
akeleyi (Ammomanes), 459.
akool (Amaurornis), 972.
alai (Fulica), 978.
alario (Crithologus), 599.
alascana (Haliaëtus), 853.
alascensis (Anorthura), 427, 1096.
— (Calcarius), 625.
*alascensis* (Parus), 463, 1100.
alascensis (Tridactylia), 73, 1058.
*alaschanica* (Ruticilla), 385.
alaudarius (Tinnunculus), 870.
alaudina (Coryphistera), 197.
— (Passerculus), 631.
alaudinus (Phrygilus), 641.
alaudipes (Alæmon), 450.
alba (Cacatua), 2.
— (Ciconia), 905.
— (Chionis), 780.
— (Gygis), 1019.
— (Herodias), 912.
— (Motacilla), 442.
— (Notornis), 976.
*alba* (Seleucides), 520.
— (Sula), 1011.
albaria (Ninox), 888.
albata (Neositta), 682.
albatrus (Diomedea), 1038.
*albatus* (Chen), 982.
albellus (Mergus), 1003.
*albemarlei* (Certhidea), 689.
albemarlei (Geospiza), 608.
albeola (Clangula), 998.
alberti (Crax), 790.
— (Menura), 729.
— (Pachycephala), 480.
— (Pteridophora), 521.
— (Ptilorhis), 521.
albertinæ (Calliste), 667.
— (Charitornis), 544.
albertisi (Aegotheles), 116.
— (Drepanornis), 520
albertisii (Goura), 775.
— (Gymnophaps), 748.
albescens (Certhia), 683.
— (Podicipes), 1040.
— (Synallaxis), 197.
albibrunneus (Campylorhynchus), 420.
albicans (Aquila), 852.
— (Saxicola), 390.
— (Thamnophilus), 182.
— (Troglodytes), 425.
albicapilla (Cossypha), 409.
— (Macropygia), 755.
— (Siptornis), 200.
albicapillus (Notauges), 548.
albicauda (Agriornis), 224, 1074.
— (Elminia), 281.
— (Mirafra), 456.
— (Pogonorhynchus), 35.
— (Rhipidura), 276.
albicaudata (Stoparola), 291.
albicaudatus (Buteo), 857.
albiceps (Elaïnea), 240.
— (Merula), 397.
— (Psalidoprocne), 260.
— (Sarciophorus), 934.
— (Siptornis), 200.
albicilla (Haliaëtus), 853.
— (Muscicapa), 263.
albicillus (Certhiparus), 469.
— (Halcyon), 108.
albicincta (Chætura), 127.
albicollis (Contopus), 249.
— (Corvultur), 501.
— (Eucometis), 654.
— (Legatus), 241.
— (Leucochloris), 147.
— (Leucopternis), 860.
— (Merops), 97.
*albicollis* (Muscicapa), 263.
albicollis (Nyctidromus), 121.
— (Phlogœnas), 773.
— (Porzana), 967.
— (Pteroptochus), 167.
— (Rhipidura), 277.
— (Rhynchops), 1020.

Digitized by Google

albicollis (Saltator), 646.
— (Streptocitta), 543.
*albicollis* (Theristicus), 902.
albicollis (Turdus), 401.
— (Xiphocolaptes), 188.
— (Zonotrichia), 625.
albicrissa (Floricola), 160.
— (Thamnophilus), 184.
albida (Spilornis), 834.
— (Reinwardtoenas), 1114.
albidiema (Ochthœca), 226.
albidior (Automolus), 1072.
— (Tridactylia), 1058
*albidipectus* (Ægialitis), 940.
albidiventris (Cinclodes), 1073.
albifacies (Geotrygon), 771.
— (Pœcilodryas), 272.
— (Sceloglaux), 887.
albifrenatus (Pipilopsis), 649.
albifrons (Amblyospiza), 570.
— (Anser), 983.
— (Anthipes), 294.
*albifrons* (Argya), 324.
albifrons (Catherpes), 428.
— (Chlorospingus), 650.
— (Chrysotis), 6.
— (Conirostrum), 687.
— (Coryphospiza), 638.
— (Ephthianura), 376.
— (Glycyphila), 717.
— (Henicophaps), 767.
*albifrons* (Leptoptila), 770.
albifrons (Machærirhynchus), 285.
— (Merula), 396.
— (Miro), 270.
— (Muscisaxicola), 230.
— (Neositta), 682.
*albifrons* (Notodela), 384.
albifrons (Pentholæa), 392.
— (Pericrocotus), 302.
— (Pithys), 173.
— (Platystira), 266.
— (Scytalopus), 166.
— (Serinus), 600.
— (Setophaga), 441.
— (Sitta), 680.
albifrontata (Gerygone), 269.
— (Rhipidura), 279.
albigena (Chelidon), 256.
— (Sterna), 1015.
albigula (Buteo), 858.
— (Myzomela), 716.
*albigula* (Otocorys), 451.
albigula (Pipilo), 637.
albigulare (Malacopteron), 337.
albigularis (Automolus), 195.
— (Brachygalba), 46.
— (Callene), 408.
*albigularis* (Catarrhactes), 1048.
— (Chlorodyta), 354.
albigularis (Ciccaba), 893.
— (Columba), 752.
— (Creciscus), 971.
— (Dumetia), 340.
— (Empidonax), 247.
— (Entomophila), 719.
— (Eurostopus), 119.
— (Fregetta), 1030.
— (Furnarius), 203.
— (Garrulax), 327.
— (Gerygone), 268.
— (Hirundo), 254.
*albigularis* (Hypotriorchis), 873.
albigularis (Ibycter), 832.
— (Melithreptus), 714.
— (Microcerculus), 429.
— (Nemosia), 654.
— (Pomatorhinus), 325.
— (Pygarrhichus), 190.
— (Rhinomyias), 282.
— (Sclerurus), 191.
— (Serinus), 600.
— (Spermophila), 614.
— (Suya), 358.
— (Thryothorus), 423.
— (Urospizias), 842.
— (Xenocichla), 309.
albilateralis (Diglossa), 686.
albilimbata (Rhipidura), 277.
albilinea (Columba), 751.
— (Tachycineta), 256.
albilora (Dendroeca), 434.
— (Synallaxis), 198.
albiloris (Grallaria), 170.
— (Oriolus), 527.
— (Polioptila), 380.
albina (Rhipidura), 1081.
albinotata (Pœcilodryas), 271.
albinucha (Actophilus), 958.
— (Buarremon), 648.
— (Melanopteryx), 567.
— (Thryothorus), 422
— (Tityra), 211.
— (Xenopsaris), 215.
albinuchalis (Thamnophilus), 183.
albipectus (Illadopsis), 336.
— (Thryophilus), 1095.
albipennis (Columba), 750
— (Entomyza), 725.
— (Nettopus), 982.

Digitized by Google

albipennis (Penelope), 792.
— (Petrophassa), 767.
*albipennis* (Podicipes), 1040.
albirostris (Cassicus), 551.
— (Galbula), 45.
— (Pilorhinus), 546.
— (Textor), 569.
albiscapa (Rhipidura), 276.
albiscapulata (Thamnolæa), 392.
albiscapulatus (Malurus), 368.
albispecularis (Pachycephala), 479.
albistriata (Sterna), 1014.
albitarsus (Ciccaba), 1117.
albitemporalis (Chlorospingus), 650.
albitorques (Columba), 749.
— (Philemon), 726.
— (Tityra), 211.
albitorquis (Spermophila), 616.
albiventer (Glaucidium), 1117.
— (Turdus), 401.
albiventris (Aramides), 964.
— (Callene), 408.
— (Cinnyris), 698.
— (Cittocincla), 413.
*albiventris* (Cryptolopha), 286.
albiventris (Elaïnea), 239.
— (Fluvicola), 227.
— (Halcyon), 107.
— (Hemidacnis), 687.
*albiventris* (Heterocnemis), 175.
albiventris (Melanoparus), 460.
*albiventris* (Monarcha), 289, 1083.
albiventris (Myiagra), 283.
— (Myrmeciza), 174.
— (Orchilus), 233.
— (Ortalida), 792.
— (Pachycephala), 480.
— (Phalacrocorax), 1009.
— (Platypsaris), 1073.
— (Pnoepyga), 430.
— (Rhamphocænus), 176.
— (Rhipidura), 278.
— (Sclateria), 1069.
— (Scops), 884, 1117.
— (Tachycineta), 255.
*albiventris* (Thamnophilus), 183, 1070.
albiventris (Thryothorus), 423.
— (Trochocercus), 276.
— (Turnix), 779.
— (Urospizias), 843.
— (Zosterops), 708.
*albivertex* (Elaïnea), 240.
*albivittatus* (Anous), 1019.
albivittatus (Aulacorhamphus), 44.
albo-auricularis (Stigmatops), 718.
albociliaris (Saltator), 645.
albocincta (Merula), 395.
albocinctus (Acridotheres), 538.
— (Ptilopus), 735.
albocinerea (Sirystes), 243.
albocoronata (Microchera), 164.
albocristata (Sericossypha), 652.
albocristatus (Anæretes), 236.
— (Anorrhinus), 102.
— (Gennæus), 800.
albofasciata (Certhilauda), 450.
— (Pratincola), 388.
— (Rhinoptilus), 931.
*albofasciatus* (Laniarius), 491.
albofrontata (Microeca), 264.
albogrisea (Serphophaga), 235.
albogriseus (Pachyrhamphus), 212.
— (Sirystes), 243.
albogularis (Cryptolopha), 286.
*albogularis* (Eriocnemis), 154.
albogularis (Francolinus), 808.
— (Geocichla), 405.
— (Platyrhynchus), 231.
*albogularis* (Prinia), 359.
albogularis (Querquedula), 993.
*albogularis* (Rhipidura), 277.
albogularis (Schistes), 159.
— (Tyrannus), 252.
— (Zosterops), 712.
albolarvatus (Xenopicus), 73.
albolimbata (Butorides), 916.
albolimbatus (Megalurus), 351.
albolineatus (Picolaptes), 187.
*albomaculata* (Ninox), 889.
alboniger (Spizaëtus), 849.
albonigra (Saxicola), 388.
albonotata (Caprimulgus), 123.
— (Penthetria), 573.
— (Ptilotis), 720.
*albonotatus* (Buteo), 857.
albonotatus (Coccystes), 50.
— (Halcyon), 108.
— (Trochocercus), 276.
*albo-olivacea* (*Cyornis*), 282.
albo-olivacea (Siphia), 293.
albo-punctatum (Dicæum), 678.
albosignata (Eudyptula), 1048.
albospecularis (Copsychus), 411.
albosquamatus (Picumnus), 84.
albostriatus (Rimator), 332.
albosuperciliaris (Cryptolopha), 286.
*albosuperciliaris* (Dryonastes), 328.
albosuperciliaris (Rhopophilus), 350.
*albotæniata* (Pœcilodryas), 271.
*alboterminata* (Melanocorypha), 452.

Digitized by Google

alboterminata (Stiphrornis), 358.
*alboterminatus* (Lophoceros), 103.
albotibialis (Bycanistes), 101.
albovittatus (Donacobius), 418.
— (Pitangus), 243.
albus (Eudocimus), 904.
— (Lagopus). 826.
alchatus (Pteroclurus), 776.
alcinus (Machærhamphus), 865.
alcocki (Dissemurus), 533.
alcyon (Ceryle), 115.
aldabrana (Dicrurus), 529.
— (Foudia), 566.
— (Rougetius), 965.
aldabranus (Turtur), 759.
aldabrensis (Caprimulgus), 123.
— (Cinnyris), 698.
— (Zosterops), 707.
*aldrovandi* (Hypotriorchis), 873.
aldunatei (Phrygilus), 640.
alecto (Microglossus), 1.
*alecto* (Monarcha), 290.
— (Textor), 569.
alector (Crax), 789.
aleutica (Sterna), 1016.
aleuticus (Ptychorhamphus), 1045.
alexandræ (Spathopterus), 20.
alexandri (Alethe), 1094.
— (Andropadus), 313.
— (Cypselus), 1064.
— (Lobornis), 357.
— (Palæornis), 19.
— (Trochilus), 162.
alexandrina (Ægialitis), 940.
alfari (Creciscus), 971.
alfaroana (Saucerottea), 137.
alfredi (Bradypterus), 350.
— (Cypselus), 1064.
*alfredi* (Halcyon), 108.
alfredi (Ostinops), 550.
— (Scops), 885.
— (Tylas), 316.
alfrediana (Graucalus), 297.
algeriensis (Ammomanes), 459.
— (Lanius), 484.
aliciæ (Aglæactis), 152.
— (Chlorostilbon), 142.
— (Saucerottea), 137.
— (Turdus), 402.
aliena (Rhodopechys), 596.
— (Sitagra), 1107.
alinæ (Engyete), 153.
alincia (Heliothrix), 1068.
alixi (Clytoctantes), 180.
alle (Mergulus), 1043.
alleni (Agyrtria), 136.
— (Buteo), 857.
— (Chrysomitris), 592.
— (Lagopus), 826.
— (Pipilo), 636.
— (Porphyriola), 975.
*alleni* (Selasphorus), 162, 1068.
alleni (Syrnium), 890.
— (Vireo), 473.
alligator (Ptilopus), 735.
almæ (Turdus), 1093.
alnorum (Empidonax), 1077.
*alopecias* (Synallaxis), 198.
alopex (Mirafra), 456.
— (Tinnunculus), 871.
alorensis (Trichoglossus), 1054.
alpestris (Merula), 395.
— (Otocorys), 452.
alphonsiana (Suthora), 471.
alpicola (Montifringilla), 594.
*alpina* (Accentor), 381.
alpina (Muscisaxicola), 230.
— (Tringa), 951.
*alpinus* (Cyanorhamphus), 26.
alpinus (Pyrrhocorax), 517.
altaica (Hierofalco), 876.
— (Montifringilla), 595.
altaicus (Accentor), 381.
— (Tetraogallus), 806.
altera (Edoliisoma), 298.
althea (Sylvia), 374.
alticola (Ægialitis), 1117.
— (Amazilia), 138.
— (Campylorhynchus), 420.
— (Catharus), 394.
— (Certhia), 683.
— (Chamæospiza), 635.
— (Cisticola), 363.
— (Cistothorus), 425.
— (Cyanotis), 236.
— (Junco), 629.
— (Poospiza), 628.
— (Sturnella), 1106.
— (Vireo), 472.
altijugus (Casuarius), 1050.
altipetens (Lagopus), 827, 1116.
altirostris (Dendrocolaptes), 185.
— (Empidonax), 247.
— (Lamprocorax), 543.
— (Pyctorhis), 340.
*altumi* (Francolinus), 810.
aluco (Syrnium), 890.
*amabilis* (Carcineutes), 110.
amabilis (Cotinga), 216.
— (Cyclopsitta), 34.

Digitized by Google

*amabilis* (Hypocharmosyna), 32.
amabilis (Loriculus), 23.
— (Malurus), 368.
— (Parus), 461.
— (Polyerata), 136.
*amabilis* (Zenaida), 757.
amæna (Copsychus), 411.
amandava (Sporæginthus), 581.
amathusia (Platycercus), 24.
amaura (Speotyto), 895.
amaurocephalus (Hylŏphilus), 474.
— (Leptopogon), 237.
— (Sycobrotus), 565.
amaurochalina (Turdus), 1093.
*amauronotus* (Heterhyphantes), 565.
amauronotus (Vireo), 472.
amanroptera (Pelargopsis), 114.
amauropteryx (Hypochæra), 575.
amaurotis (Anabazenops), 193.
— (Hypsipetes), 316.
amauroura (Argya), 324.
amaurus (Micrastur), 837.
amazona (Ceryle), 115.
— (Heteropelma), 223.
— (Sittasomus), 191.
amazonica (Chrysotis), 5.
— (Formicarius), 1069.
— (Spermophila), 617.
amazonicus (Thamnophilus), 183.
— (Thryothorus), 423.
amazonina (Pionopsitta), 7.
amazonum (Thlypopsis), 653.
— (Urogalba), 45.
ambigua (Ara), 10.
— (Caprimulgus), 1063.
— (Chrysomitris), 591.
— (Cisticola), 1089.
— (Turtur), 760.
*ambiguus* (Caprimulgus), 123.
ambiguus (Carpodacus), 604.
— (Thamnophilus), 183.
— (Trogon), 86.
— (Rhamphastos), 42
amboinense (Edoliisoma), 298.
amboinensis (Aprosmictus), 21.
— (Dicrurus), 531.
— (Macropygia), 755, 1114.
— (Megalurus), 351.
ambrynensis (Petroeca), 267.
ameliæ (Macronyx), 449.
americana (Æthyia), 996.
— (Certhia), 683.
— (Ceryle), 115.
— (Clangula), 998.
— (Fulica), 977.
americana (Grus), 922.
*americana* (Herodias), 912.
americana (Loxia), 605.
— (Mareca), 992.
— (Meleagris), 796.
— (Merganser), 1003.
— (Mycteria), 907.
— (Oedemia), 999.
— (Parula), 432, 1096.
— (Phaeton), 1004
— (Recurvirostra), 943.
— (Rhea), 1052.
— (Spiza), 639.
— (Tridactylia), 73.
— (Tympannchus), 824.
*americanus* (Charadrius), 937.
americanus (Coccyzus), 54.
— (Corvus), 503.
*americanus* (Cygnus), 986.
americanus (Ibycter), 832.
*americanus* (Nycticorax), 917.
— (Phœnicopterus), 908.
americanus (Podicipes), 1041.
— (Siphonorhis), 121.
amethysticollis (Heliangelus), 155.
amethystina (Calliphlox), 161.
— (Chalcomitra), 701.
— (Phabotreron), 734.
amethystoides (Calliphlox), 161.
amherstiæ (Chrysolophus), 803.
amicta (Nyctiornis), 98.
ammodendri (Passer), 598.
ammophila (Otocorys), 1099.
amœna (Cyanospiza), 626.
— (Merula), 1092.
ampelina (Yuhina), 1088.
ampelinus (Hypocolius), 497.
*amphilecta* (Cisticola), 365.
amphichroa (Newtonia), 266.
ampla (Carpodacus), 604.
amurensis (Aquila), 852.
— (Butorides), 916.
— (Erythropus), 872.
— (Loxia), 605.
— (Sitta), 680.
anabatina (Dendrocincla), 186.
anabatinus (Thamnistes), 181.
*anabatoides* (Anabatoxenops), 192.
anabelæ (Sialia), 1092.
anachoreta (Halcyon), 109.
anæstheta (Sterna), 1016.
anais (Melanopyrrhus), 540.
*anais* (Petasophora), 145.
anale (Edoliisoma), 299.
analis (Catamenia), 617.

Digitized by Google

analis (Dacnis), 688.
analis (Formicarius), 172.
— (Iridornis), 665.
— (Lædorusa), 305.
— (Picus), 72.
— (Scytalopus), 167.
analoga (Ptilotis), 720.
analoides (Catamenia), 617.
anatoliæ (Garrulus), 510.
anchietæ (Anthreptes), 704.
— (Autichromus), 489.
— (Chætura), 128.
*anchietæ* (Hirundo), 254.
anchietæ (Scoptelus), 98.
— (Stactolæma), 38.
andamanensis (Centropus), 57.
— (Copsychus), 411.
— (Dissemuropsis), 532.
— (Geocichla), 405.
— (Gracula), 539.
— (Oriolus), 526).
— (Pericrocotus), 301.
— (Picus), 72.
— (Spizaëtus), 849.
— (Spodiopsar), 536.
andamanica (Cyrtostomus), 703.
andamanicus (Caprimulgus), 123.
andecola (Agriornis), 224.
— (Atticora), 258.
anderssoni (Clivicola), 1079.
— (Gennæus), 800.
*anderssoni* (Graucalus), 296.
anderssoni (Machærhamphus), 865.
*anderssoni* (Oriolus), 525.
anderssoni (Tephrocorys), 454.
— (Zosterops), 709.
andicola (Bolborhynchus), 14.
— (Grallaria), 170.
— (Leptasthenura), 201.
— (Upucerthia), 203.
andicolus (Cypselus), 126.
andina (Gallinago), 954.
— (Lichenops), 1075.
— (Nuttallornis), 1078.
— (Polytmus), 147.
— (Recurvirostra), 943.
*andinus* (Contopus), 249.
andinus (Phoenicoparrus), 908.
andium (Querquedula), 993.
andrei (Chætura), 1064.
— (Tæniotriccus), 1075.
andria (Saurothera), 57.
andromeda (Zoothera), 404.
anerythra (Pitta), 1073.
*angaladiana* (Cinnyris), 697.
*angasizæ* (Zosterops), 709.
angelæ (Cyanolyca), 513.
angelica (Dacnis), 688.
anglica (Gelochelidon), 1013.
— (Picus), 1058.
anglorum (Puffinus), 1031.
angolensis (Anaplectes), 568.
*angolensis* (Anthus), 445.
angolensis (Chalcomitra), 701.
— (Cisticola), 365.
*angolensis* (Crex), 967.
angolensis (Estrelda), 1108.
— (Dryoscopus), 492.
— (Francolinus), 1116.
— (Gypohierax), 831.
— (Hirundo), 254.
— (Mirafra), 455.
— (Monticola), 393.
— (Pitta), 207.
— (Poicephalus), 9.
— (Serinus), 601.
— (Uræginthus), 582.
angosturæ (Heterocercus), 224.
*anguina* (Dendrocincla), 1070.
anguitimens (Eurocephalus), 494.
angulata (Gallinula), 974.
angusticauda (Cisticola), 363.
*angustifrons* (Graucalus), 296.
angustifrons (Melanerpes), 68.
— (Ostinops), 550.
angustipennis (Chlorostilbon), 141.
angustipluma (Chætoptila), 725.
angustirostris (Marmaronetta), 995.
— (Phytotoma), 210.
— (Picolaptes), 188.
— (Sayornis), 227.
anhinga (Plotus), 1011.
ani (Crotophaga), 62.
*anjuanensis* (Foudia), 566.
anjuanensis (Zosterops), 706.
anna (Ciridops), 693.
annabellæ (Myzomela), 715.
annæ (Artamia), 498.
— (Calypte), 163.
— (Euphonia), 673.
— (Prionochilus), 675.
— (Psamathia), 348.
— (Spathura), 153.
annamensis (Hydrornis), 207.
annectans (Dicrurus), 529.
— (Lioptila), 413.
annectens (Junco), 629.
— (Passerella), 635.
— (Pseudomyiobius), 246.
annulosa (Stizoptera), 580.



Digitized by Google

annulosa (Zosterops), 706.
anomala (Æthopyga), 695.
— (Callene), 408.
— (Zosterops), 707.
anomale (Brachycope), 1107.
anomalus (Heleothreptus), 120.
— (Hyphantornis), 564.
*anophrys* (Acredula), 466.
anoxantha (Loxigilla), 614.
anseli (Centropus), 56.
anserriensis (Chordeiles), 118.
ansorgei (Numida), 804.
— (Pyromelana), 572.
— (Pytelia), 578.
*ansorgii* (Cinnyris), 699.
ansorgii (Tricholæma), 36, 1055.
*antarctica* (Chloëphaga), 985.
antarctica (Megalestris), 1027.
— (Pygoscelis), 1047.
*antarctica* (Sterna), 1017.
antarctica (Thalassoeca), 1033.
antarcticus (Anthus), 448.
— (Cinclodes), 202.
— (Lopholæmus), 748.
— (Rallus), 960.
anteocularis (Polioptila), 1091.
anthina (Passerculus), 631.
anthoides (Corythopis), 168.
— (Siptornis), 200.
anthoni (Campylorhynchus), 1095.
anthonyi (Butorides), 916.
— (Lanius), 484.
*anthopeplus* (Polytelis), 20.
anthophilus (Phaethornis), 132.
anthracina (Urubitinga), 861.
anthracinus (Cnipolegus), 229.
antigone (Grus), 922.
antillarum (Myiarchus), 251.
— (Sterna), 1017.
antinorii (Cisticola), 363.
— (Lanius), 484.
— (Psalidoprocne), 260.
antipodum (Megadyptes), 1048.
*antiquorum* (Phœnicopterus), 908.
antiquus (Synthliborhamphus), 1045.
antisiensis (Pharomacrus), 85.
— (Siptornis), 199.
antoniæ (Carpodectes), 217.
— (Threnetes), 131.
aolæ (Nasiterna), 24.
aonalaschkæ (Turdus), 402.
aphanes (Cassicus), 551.
apheles (Phaethornis), 132.
aphrasta (Otocorys), 1099.
aphrodita (Parus), 1100.
apiaster (Merops), 97.
apiata (Mirafra), 455.
apicalis (Acanthiza), 366.
— (Agyrtria), 136.
*apicalis* (Ceratotriccus), 233.
apicalis (Loriculus), 23.
— (Moho), 727.
— (Myiarchus), 251.
— (Schœnicola), 349.
apicicauda (Sphenocercus), 731.
apivorus (Pernis), 865.
apoda (Paradisea), 518.
apolites (Tyrannus), 252.
*apophonica* (Chrysotis), 6.
apotheta (Picolaptes), 1070.
*apricarius* (Charadrius), 937.
approximans (Cercomacra), 176.
— (Circus), 836.
— (Malaconotus), 490.
*approximans* (Rhamphastos), 42.
approximans (Urospizias), 844.
— (Vireo), 473.
apus (Cypselus), 125, 1064.
aquatica (Butalis), 262.
— (Sayornis), 227, 1075.
*aquaticus* (Anthus), 447.
aquaticus (Acrocephalus), 369.
— (Cinclus), 418.
— (Rallus), 960.
aquila (Eutoxeres), 133, 1065.
— (Fregata), 1012.
arabica (Fringillaria), 1110.
arabs (Eupodotis), 927.
— (Zosterops), 711, 1113.
aracari (Pteroglossus), 43.
*aranea* (Gelochelidon), 1013.
ararauna (Ara), 10.
araucana (Columba), 751.
araucnan (Ortalida), 792.
arborea (Dendrocygna), 988.
— (Galerida), 458.
*arborea* (Petrochelidon), 258.
*arboreus* (Anthus), 445.
arcæi (Buthraupis), 663, 1111.
— (Calospiza), 1111.
archeri (Cichladusa), 1094.
archipelagicus (Indicator), 34.
arctica (Bubo), 881.
— (Fratercula), 1016.
— (Pipilo), 637.
— (Sialia), 386.
*arctica* (Sterna), 1015.
arctica (Tridactylia), 73.
arcticincta (Hirundo), 254.
Arcticola (Otocorys), 1099.

Digitized by Google

arcticus (Colymbus), 1039.
*arcticus* (Hierofalco), 876.
arctitorquis (Pachycephala), 481, 1102.
arctoa (Montifringilla), 595.
arcuata (Cichladusa), 411.
— (Dendrocygna), 988.
— (Pitta), 208.
arcuatus (Ampelion), 216.
— (Passer), 598.
ardens (Arboricola), 813.
— (Harpactes), 88.
— (Penthetria), 573.
*ardens* (Pericrocotus), 301.
ardens (Psaropholus), 528.
— (Pyranga), 659.
— (Selasphorus), 162.
— (Xanthomelus), 524.
ardeola (Dromas), 929.
ardesiaca (Ardea), 910.
— (Conopophaga), 169.
— (Fulica), 977.
— (Mimocichla), 394.
— (Platylophus), 509.
— (Rhopornis), 1069.
ardesiacea (Spermophila), 616.
ardesiacus (Cinclus), 419.
— (Contopus), 249.
— (Dissodectes), 869.
— (Dysithamnus), 180.
*arenacea* (Empidochanes), 247.
arenacea (Mimus), 416.
— (Spizella), 630.
arenaria (Calidris), 950.
arenarius (Pterocles), 777.
arenarum (Elaïnea), 240, 1076.
arenicola (Galerida), 458.
— (Harporhynchus), 417.
— (Otocorys), 452, 1099.
— (Turtur), 758.
arenicolor (Ammomanes), 459.
arequipæ (Siptornis), 200.
arfaki (Oreocharis), 674.
— (Oreopsittacus), 32.
— (Strix), 900.
arfakiana (Gerygone), 269.
— (Sericornis), 367.
arfakianum (Dicæum), 1112.
arfakianus (Ælurœdus), 523.
— (Æpypodius), 788.
*arfakianus* (Cacomantis), 52.
arfakianus (Microlestes), 268.
*argala* (Leptoptilus), 907.
argalea (Otocorys), 1099.
argentata (Ceyx), 112.
— (Thamnolæa), 392.
argentatus (Heterocnemis), 175.
— (Larus), 1024.
argentauris (Liothrix), 348.
— (Stigmatops), 718.
argentea (Calliste), 669.
argenteus (Cracticus), 500.
argenticeps (Tropidorhynchus), 725.
argenticincta (Momotus), 94.
argentifrons (Scytalopus), 167.
argentigula (Cyanolyca), 513.
argentina (Empidonax), 247.
— (Guiraca), 612.
— (Xiphocolaptes), 1071.
argoonda (Perdicula), 813.
argus (Argusianus), 795.
— (Eurostopus), 119.
arguta (Strepera), 501.
argutula (Sturnella), 555, 1106.
argyrophenges (Calliste), 669.
argyrotis (Penelope), 792.
aridula (Cisticola), 1089.
ariel (Fregata), 1012.
— (Petrochelidon), 259.
— (Prion), 1037.
— (Rhamphastos), 42.
arizela (Campothera), 1057.
— (Geothlypis), 437.
*arizonæ* (Antrostomus), 122.
arizonæ (Aphelocoma), 512.
— (Chrysomitris), 591.
— (Hæmophila), 634.
— (Picus), 71.
*armandi* (Ibis), 901.
armandi (Lusciniola), 371.
— (Pomatorhinus), 326.
armata (Merganetta), 1002.
armenti (Molothrus), 552.
armillaris (Megalæma), 39.
armillata (Cyanolyca), 513.
— (Fulica), 977.
armillatus (Myiadectes), 406.
arminjoniana (Œstrelata), 1035.
armiti (Heteromyias), 1080.
— (Pœcilodryas), 271.
armitiana (Poephila), 585.
armstrongi (Halcyon), 109.
arnaudi (Philæterus), 575.
arnotti (Thamnolæa), 392.
arolasi (Æthopyga), 696.
aromatica (Osmotreron), 733.
arquatrix (Columba), 750.
arquatus (Numenius), 944.
arra (Uria), 1043.
arremonops (Oreothraupis), 644.
arsinoe (Pycnonotus), 305.

Digitized by Google

artemisiæ (Ianthocincla), 322.
arthuri (Tinnunculus), 870.
arthusi (Calliste), 666.
arubensis (Conurus), 12.
aruense (Edoliisoma), 298.
aruensis (Ardea), 911.
— (Arses), 288.
*aruensis* (Casuarius), 1051.
aruensis (Centropus), 55.
— (Colluricincla), 1104.
— (Cyclopsitta), 33.
*aruensis* (Dacelo), 105.
aruensis (Eclectus), 1054.
— (Geoffroyus), 17.
— (Gerygone), 269.
— (Monarcha), 290.
*aruensis* (Nasiterna), 24.
aruensis (Ninox), 889.
— (Pitta), 1073.
— (Ptilotis), 722.
— (Rhectes), 494.
— (Tropidorhynchus), 725.
arundinaceus (Acrocephalus), 368.
*arundinaceus* (Cistothorus), 424.
arvensis (Alauda), 454.
— (Sycalis), 601.
ascalaphus (Bubo), 880.
asha (Ardea), 911.
*asio* (Asio), 878.
asio (Scops), 886.
aspasiæ (Hermotimia), 700.
aspasioides (Hermotimia), 700.
aspersa (Scops), 885.
aspersiventris (Thamnophilus), 182.
assabensis (Ammomanes), 1100.
assamensis (Drymocataphus), 334.
assamica (Mirafra), 456.
*asiatica* (Alcedo), 113.
asiatica (Megalæma), 39.
— (Perdicula), 813.
asiaticus (Caprimulgus), 124.
— (Charadrius), 938.
— (Cinclus), 418.
— (Cinnyris), 699.
*asiaticus* (Lanius), 1102.
— (Loriculus), 23.
asiaticus (Xenorhynchus), 907.
assimile (Dicæum), 678.
assimilis (Agelæus), 553.
— (Automolus), 194.
— (Buarremon), 647.
— (Chlorostilbon), 141.
— (Circus), 837.
— (Cyanoderma), 343.
*assimilis* (Dicrurus), 530.
assimilis (Eriocnemis), 154.
— (Furnarius), 203.
— (Lampropygia), 152.
— (Lanius), 1102.
— (Macropygia), 1114.
— (Malurus), 1090.
— (Megaloprepia), 742.
— (Microeca), 263.
— (Mionectes), 237, 1076.
— (Molothrus), 1106.
— (Myiobius), 1077.
— (Ninox), 889.
— (Oriolus), 527.
— (Pardalotus), 674.
— (Passer), 598.
— (Phodilus), 898.
— (Picus), 71.
— (Poospiza), 628.
— (Puffinus), 1032.
*assimilis* (Quiscalus), 560.
assimilis (Rhipidura), 279.
*assimilis* (Rhynchocyclus), 242.
assimilis (Turdus), 1093.
asterias (Picumnus), 84.
astigma (Muscicapula), 294.
astrapioides (Falcinellus), 520.
astrild (Estrelda), 581.
astrolabi (Pachycephala), 478.
— (Rhipidura), 277.
astur (Eutriorchis), 835.
asturinus (Spilornis), 834.
asymmetrura (Penthetria), 573.
atacamensis (Rhodopis), 160.
atacta (Dicrurus), 529.
*atala* (Chlorostilbon), 141.
ater (Buteo), 857.
— (Chalcopsitta), 28.
— (Dicrurus), 529.
— (Dromæus), 1050.
— (Ibycter), 832.
*ater* (Melænornis), 287.
ater (Parus), 462.
ateralbus (Centropus), 55.
aterrima (Diglossa), 686.
— (Œstrelata), 1033.
aterrimus (Cnipolegus), 228.
— (Curæus), 555.
— (Microglossus), 1.
— (Platysmurus), 509.
*aterrimus* (Rhinopomastus), 98.
aterrimus (Scoptelus), 98.
athensis (Spizocorys), 454.
athi (Mirafra), 456.
atkhensis (Lagopus), 827.
atkinsi (Sitta), 681.

Digitized by Google

atlantica (Chiroxiphia), 1074.
atlantis (Gypaëtus), 831.
atlas (Otocorys), 452.
— (Parus), 1100.
atmorei (Zosterops), 706.
atra (Fulica), 977.
— (Hæmatopus), 933.
*atra* (Lophorhina), 522.
atra (Manucodia), 518.
— (Myiagra), 283.
— (Pyriglena), 175.
— (Rhipidura), 277, 1081.
— (Schistochlamys), 644.
atrata (Catharista), 828.
— (Ceratogymna), 101.
— (Charmosyna), 32.
— (Chenopis), 987.
— (Chrysomitris), 592.
— (Cœreba), 691.
— (Montifringilla), 595.
— (Pterocles), 777.
— (Pipilo), 637.
— (Rhipidura), 1081.
atratus (Picus), 72.
atrialatus (Dryoscopus), 493.
atricapilla (Butorides), 915.
— (Calliste), 669.
*atricapilla* (Chlorophanes), 689.
atricapilla (Estrelda), 582.
*atricapilla* (Heteronetta), 996.
atricapilla (Munia), 588.
— (Muscicapa), 262.
*atricapilla* (Myiodioctes), 442.
atricapilla (Pitta), 208.
— (Scops), 885.
— (Sylvia), 375, 1090.
— (Zosterops), 710.
atricapillus (Astur), 839.
— (Buarremon), 648
— (Crypturus), 783.
— (Donacobius), 418.
— (Garrulus), 510.
— (Hadrostomus), 211.
— (Herpsilochmus), 178.
— (Lanio), 656.
*atricapillus* (Lorius), 29.
atricapillus (Molpastes), 305.
— (Orchilus), 234.
— (Pachyrhamphus), 213.
— (Parus), 463.
— (Philydor), 193.
— (Thamnophilus), 182.
— (Vireo), 472.
atricauda (Melocichla), 363.
— (Myiobius), 245.
atriceps (Alcippe), 345.
— (Chlorospingus), 650.
— (Chrysomitris), 591.
— (Colinus), 821.
— (Falco), 874.
— (Graucalus), 297.
— (Hypergerus), 320.
— (Hypoxanthus), 63.
— (Illadopsis), 1087.
— (Mitrephanes), 247.
— (Myiarchus), 251.
— (Phalacrocorax), 1009.
— (Phrygilus), 640.
— (Saltator), 644.
— (Zosterops), 711.
atrichalybea (Terpsiphone), 281.
atricilla (Larus), 1022.
*atricollis* (Ardea), 910.
atricollis (Chrysoptilus), 67.
— (Eremomela), 356.
— (Ortygospiza), 577.
— (Saltator), 645.
— (Trogon), 86.
atricrissa (Pœcilothraupis), 664.
atricristatus (Lophophanes), 465.
*atrifrons* (Myiodynastes), 244.
atrifrons (Odontophorus), 822.
— (Zosterops), 710.
atrifusca (Aplonis), 542.
atrigula (Ploceus), 566, 1107.
atrigularis (Accentor), 381.
— (Merula), 397.
— (Metallura), 156.
— (Orthotomus), 361.
*atrigularis* (Rhipidura), 277.
atrigularis (Spizella), 630.
— (Suya), 358.
— (Thryothorus), 423.
— (Turdinus), 331.
atrilatus (Dryoscopus), 493.
— (Megabias), 1082.
atrimentalis (Phaethornis), 133.
atrinucha (Thamnophilus), 183.
atripennis (Caprimulgus), 123.
— (Craterops), 330.
— (Dicrurus), 529.
— (Fluvicola), 228.
— (Saltator), 645.
atripileus (Chlorospingus), 651.
atrirostris (Cyclorhis), 476.
— (Dendrocincla), 186.
— (Oryzoborus), 613.
*atrirostris* (Sublegatus), 241.
atrocærulea (Hirundo), 254.
— (Procnopis), 669.

Digitized by Google

atrocæruleus (Dicrurus), 531.
atrococcineus (Laniarius), 492.
atrocroceus (Laniarius), 492.
atrocyaneum (Conirostrum), 687.
atroflavus (Laniarius), 492.
atrogularis (Arboricola), 813.
— (Aulacorhamphus), 44.
— (Myrmotherula), 179.
*atrogularis* (Pyrrhulopsis), 21,
atronitens (Aplonis), 541.
— (Melænornis), 287.
— (Molothrus), 552.
— (Xenopipo), 220.
atronuchalis (Lobivanellus), 934.
atropurpurea (Xipholena), 217.
atropygialis (Poephila), 585.
atrosericea (Merula), 395.
atrosericeus (Rhamphocœlus), 660.
atrothorax (Myrmeciza), 174.
atroviolaceus (Dives), 559.
atrovirens (Lalage), 302.
— (Ostinops), 550.
attertoni (Nyctiornis), 97.
attwateri (Tympanuchus), 824.
aubryana (Poicephalus), 9.
aubryanus (Leptornis), 725.
aucklandica (Cyanorhamphus), 26.
— (Geiygone), 268.
— (Gallinago), 954.
— (Nesonetta), 995.
audacis (Geocichla), 404, 1094.
audax (Hadrostomus), 211.
— (Myiodynastes), 243, 1077.
— (Troglodytes), 426.
— (Uroaëtus), 853.
audeberti (Pachycoccyx), 50.
audouini (Larus), 1025.
auduboni (Dendroeca), 435, 1097.
— (Pendulinus), 557.
— (Puffinus), 1032.
— (Turdus), 402.
augur (Buteo), 856.
auguralis (Buteo), 856.
augusta (Chrysotis), 4.
augustævictoriæ (Paradisea), 518.
augusti (Phaethornis), 131.
aura (Rhinogryphus), 828.
auranteiventris (Trogon), 86.
aurantia (Anthreptes), 704.
— (Carpophaga), 746.
— (Merula), 396.
— (Seena), 1014.
— (Strix), 900.
aurantiaca (Casuarius), 1051.
— (Chiromachæris), 222.
aurantiaca (Monarcha), 290.
— (Peucedramus), 436, 1097.
— (Pheucticus), 611.
— (Pyrrhula), 607.
— (Setophaga), 441.
aurantiacus (Metopothrix), 220.
aurantiicincta (Capito), 1056.
aurantiicollis (Capito), 41.
aurantiifrons (Hylophilus), 474.
— (Loriculus), 23.
— (Ptilopus), 739.
*aurantiigula* (Hyphantornis), 564.
aurantiigula (Macronyx), 449.
aurantiirostris (Arremon), 647.
— (Catharus), 394.
*aurantiirostris* (Cuculus), 51.
aurantiirostris (Saltator), 645.
aurantiiventris (Mitrephanes), 247.
— (Pachycephala), 478.
— (Yungipicus), 74.
aurantiivertex (Heterocercus), 224.
aurantio-atro-cristatus (Empidonomus), 252
aurantius (Brachypternus), 78.
— (Chætops), 320.
— (Hyphantornis), 563.
*aurantius* (Hypotriorchis), 873.
aurantius (Lanio), 656.
— (Trogon), 87.
aurata (Arachnothera), 705.
— (Geocichla), 405.
auratus (Capito), 41.
— (Colaptes), 62, 1057.
— (Oriolus), 525.
— (Pendulinus), 558.
aurea (Conurus), 12.
— (Lalage), 303.
— (Loxops), 594.
— (Pachycephala), 478.
— (Pyromelana), 572.
aureiloris (Zosterops), 710.
aureinucha (Dacnis), 688.
aureipectus (Pipreola), 216.
aureiventris (Chlorostilbon), 141, 1066.
— (Myiobius), 245.
— (Pheucticus), 611.
— (Pseudochloris), 639.
aureliæ (Eriocnemis), 154, 1067.
aureocincta (Hypocharmosyna), 32.
aureofastigata (Chalcostigma), 156.
aureoflavus (Hyphantornis), 563.
aureola (Dendroeca), 433.
— (Emberiza), 622.
— (Pipra), 220.
aureolimbatus (Prionochilus), 675.
aurescens (Polyplancta), 150.

Digitized by Google

aurescentior (Ptilopus), 1114.
*aureus* (Charadrius), 937.
aureus (Iole), 312.
— (Jacamerops), 1056.
— (Xanthomelus), 524.
auricapilla (Conurus), 11.
— (Dendroeca), 433.
— (Pipra), 221.
auricapillus (Pendulinus), 557.
auriceps (Chlorostilbon), 141.
— (Cyanorhamphus), 26.
— (Hermotimia), 700.
— (Pharomacrus), 85.
auricollis (Ara), 10.
auricomis (Ptilotis), 721.
auricomus (Sycobrotus), 566.
auricrissa (Tanagra), 662.
auricularis (Basileuterus), 439.
— (Chloronerpes), 65.
— (Chlorospingus), 651.
— (Geothlypis), 437.
— (Malacias), 324.
— (Orchilus), 233.
— (Otogyps), 829.
— (Porzana), 967.
— (Puffinus), 1031.
— (Rhipidura), 279.
— (Uropsila), 428.
auriculata (Ptilotis), 720.
*auriculata* (Zenaida), 757.
auriculatus (Heliothrix), 159.
aurifrons (Bolborhynchus), 14.
— (Centurus), 69.
— (Chloropsis), 317.
— (Ephthianura), 376.
— (Neopelma), 223.
— (Picumnus), 84.
aurigaster (Molpastes), 305.
aurita (Conopophaga), 168.
— (Spermophila), 617.
*aurita* (Sypheotis), 926.
auritus (Batrachostomus), 116.
— (Heliothrix), 159.
*auritus* (Leptopogon), 237.
auritus (Nettopus), 981.
— (Phalacrocorax), 1008.
— (Podicipes), 1041.
— (Turdus), 399.
— (Yungipicus), 75.
auritum (Crossoptilon), 799.
auriventer (Zosterops), 707.
aurivillii (Cuculus), 51.
*aurocapilla* (Basileuterus), 439.
aurocapilla (Henicocichla), 436.
aurora (Cyrtostomus), 703.
aurora (Helianthea), 151.
*aurora* (Iodopleura), 217.
auroræ (Carpophaga), 743.
aurorea (Ruticilla), 385.
auropalliata (Chrysotis), 5.
aurovirens (Capito), 41.
aurulenta (Calliste), 666.
*aurulenta* (Campochæra), 299.
aurulentus (Chloronerpes), 65.
austeni (Alcippe), 345.
— (Anorrhinus), 102.
*austeni* (Grammatoptila), 329.
— (Paradoxornis), 470.
austeni (Pomatorhinus), 325.
— (Trochalopteron), 321.
— (Zosterops), 708.
australasiæ (Halcyon), 108.
australasiana (Grus), 922.
— (Meliornis), 723.
australis (Acrocephalus), 369.
— (Æthyia), 997.
— (Alauda), 455.
— (Ammodromus), 632.
— (Anthus), 448.
— (Apteryx), 1049.
*australis* (Ardeiralla), 915.
— (Ardetta), 914.
— (Botaurus), 919.
australis (Caccabis), 1116.
— (Casuarius), 1051.
— (Ceuthmochares), 60.
— (Corvus), 503.
— (Cryptospiza), 576.
— (Eopsaltria), 481.
— (Erismatura), 1002.
— (Eudromias), 938.
— (Eupodotis), 927.
*australis* (Eurystomus), 93.
australis (Fulica), 977.
— (Gallinago), 954.
*australis* (Grallina), 500.
australis (Hæmophila), 634.
— (Hyliota), 272.
— (Ibycter), 832.
— (Lamprotornis), 544.
— (Melittophagus), 96.
— (Merganser), 1004.
— (Miro), 270.
— (Montifringilla), 595.
— (Nesilhierax), 869.
*australis* (Numenius), 944.
australis (Oeydromus), 964.
*australis* (Podicipes), 1041.
australis (Pyrrhulauda), 459.
— (Rhynchæa), 956.

Digitized by Google

*australis* (Sphenura), 349.
australis (Sterna), 1017.
australis (Struthio), 1052.
— (Synœcus), 816.
— (Telephonus), 488.
— (Vinago), 732
— (Vini), 30.
— (Xantholæma), 40.
*australis* (Xenorhynchus), 907.
autumnalis (Chrysotis), 5.
— (Dendrocygna), 988.
*autumnalis* (Himantopus), 942.
auxius (Anabazenops), 1072.
avensis (Geocichla), 405.
avocetta (Recurvirostra), 943.
awokera (Gecinus), 64.
*axillaris* (Amaurospiza), 619.
axillaris (Aramides), 963.
— (Arremon), 647.
— (Camaroptera), 357.
— (Dicrurus), 531.
— (Elanus), 864.
*axillaris* (Empidonax), 247.
axillaris (Graucalus), 295.
— (Herpsilochmus), 178.
— (Monarcha), 290.
— (Myrmotherula), 179.
— (Œstrelata), 1035.
— (Osmotreron), 733.
— (Pratincola), 387.
— (Urobrachya), 572.
aylmeri (Argya), 323.
aymara (Bolborhynchus), 14.
— (Metriopelia), 765.
ayresi (Colaptes), 63, 1057.
— (Coturnicops), 970.
*azaræ* (Ægialitis), 941.
— (Ara), 10.
azaræ (Pteroglossus), 43.
— (Pyranga), 658.
*azaræ* (Tænioptera), 225.
azorica (Regulus), 379.
aztec (Conurus), 12.
azteca (Cyanocitta), 512,
— (Regulus), 379.
— (Troglodytes), 425.
azurea (Alcyone), 113.
— (Calocitta), 509.
— (Cochoa), 284.
— (Dendrophila), 681.
— (Hypothymis), 274.
— (Sialia), 386.
azureicapilla (Myiagra), 283.
azureus (Eurystomus), 93.
— (Graucalus), 295.
babæcula (Euryptila), 350.
babelo (Zosterops), 707.
babylonicus (Falco), 875.
bacata (Tridactylia), 1058.
bacchus (Ardeola), 913.
bacha (Spilornis), 834.
bachmani (Hæmophila), 634.
— (Helminthophaga), 431.
bactriana (Athene), 894.
badia (Carpophaga), 746.
— (Enneoctonus), 486.
— (Hirundo), 255.
badiceps (Drymochæra), 334.
— (Eremomela), 356.
badiosus (Micropternus), 78.
badius (Astur), 840.
— (Halcyon), 106.
— (Hyphantornis), 562.
— (Molothrus), 552.
— (Phodilus), 898.
baeri (Æthyia), 997.
— (Leucippus), 1065.
bætica (Calandrella), 453.
bæticatus (Acrocephalus), 369.
baglafecht (Heterhyphantes), 565.
bahamensis (Blacicus), 249.
— (Butorides), 916.
— (Centurus), 69.
— (Chrysotis), 6.
— (Cœreba), 690.
— (Columbigallina), 764.
— (Dafila), 994.
— (Dendroeca), 435.
— (Loxigilla), 613.
— (Mimus), 415.
*bahamensis* (Philodice), 161.
bahamensis (Pitangus), 243.
— (Saurothera), 57.
*bahamensis* (Speotyto), 895.
bahiæ (Agyrtria), 1065.
— (Empidagra), 241.
— (Leptoptila), 769.
— (Tigrisoma), 919.
baicalensis (Motacilla), 442.
— (Parus), 462.
bailleui (Loxioides), 605.
bailloni (Andigena), 43.
*bailloni* (Porzana), 967.
bailloni (Puffinus), 1032.
bairdi (Acanthidops), 593.
— (Burnesia), 360.
— (Campophilus), 80.
— (Empidonax), 248, 1078.
— (Geothlypis), 1098.
— (Icterus), 559.

Digitized by Google

bairdi (Junco), 629.
— (Lanius), 484.
— (Myiodynastes), 244.
— (Oreomyza), 692.
— (Passerculus), 631.
*bairdi* (Phalacrocorax), 1008.
bairdi (Setophaga), 441.
— (Sialia), 1092.
— (Thryomanes), 424.
— (Tringa), 952.
— (Trogon), 87.
— (Vireo), 472.
bakeri (Scæorhynchus), 1101.
bakkamæna (Scops), 884.
*bakkamœna* (Strix), 898.
balænarum (Sterna), 1017.
balcanica (Otocorys), 451.
balfouri (Cyanomitra), 702.
balia (Campothera), 65.
— (Scops), 1117.
balicassius (Dicrurus), 529.
baliensis (Ptilopus), 735.
— (Rhinomyias), 282.
balli (Scops), 885.
balliviani (Odontophorus), 822.
balstoni (Crypturus), 783.
balteatus (Campylorhynchus), 420.
baltimore (Hyphantes), 556.
balzani (Thalurania), 143.
bambla (Microcerculus), 429.
bananivora (Cœreba), 691.
bangkana (Pitta), 208.
bangsi (Grallaria), 1068.
bangueyensis (Ptilopus), 740.
banjakensis (Strachyrhis), 1087.
banksi (Calyptorhynchus), 2.
— (Prion), 1037.
banksiana (Lalage), 303.
banyumas (Siphia), 292, 1083.
baraka (Sylviella), 354.
baramensis (Osmotreron), 734.
barbadensis (Cœreba), 691.
— (Elaïnea), 239.
— (Loxigilla), 614.
— (Vireo), 1102.
barbara (Petronia), 596.
— (Scops), 885.
barbarus (Falco), 875.
— (Laniarius), 492.
barbata (Caccabis), 807.
— (Chrysomitris), 592.
*barbata* (Drymocataphus), 334.
barbata (Erythropygia), 412.
*barbata* (Perdix), 812.
barbatula (Vireo), 471.
barbatus (Criniger), 311.
— (Cypselus), 125.
— (Dendrortyx), 818.
— (Gypaëtus), 831.
— (Myiobius), 245.
*barbatus* (Palæornis), 19.
— (Panurus), 469.
barbatus (Pycnonotus), 305.
barbirostris (Blacicus), 249.
barbozæ (Hyliota), 272, 1080.
bargei (Strix), 899.
barianus (Indicator), 1055.
baritula (Diglossa), 685.
baritus (Quiscalus), 560.
barklyi (Coracopsis), 4.
barlowi (Parus), 1101.
barnardi (Barnardius), 25.
barnesi (Saxicola), 388.
baroni (Eutoxeres), 133.
— (Metallura), 156.
— (Phaethornis), 132.
— (Pipilopsis), 649.
— (Siptornis), 199.
barrabandi (Pionopsitta), 8.
— (Polytelis), 20.
barrali (Heliangelis), 155.
barratti (Bradypterus), 350.
barringtoni (Nesomimus), 416.
barroti (Heliothrix), 159, 1068.
*barrowi* (Clangula), 998.
barrowi (Otis), 926.
barthelemyi (Aquila), 851.
bartholemica (Cœreba), 691.
— (Dendroeca), 1097.
bartletti (Agyrtria), 136.
— (Crypturus), 783.
— (Malimbus), 568.
— (Momotus), 94.
bartleloti (Cossypha), 409.
basalis (Chrysococcyx), 53.
basilanica (Ceyx), 111.
— (Dendrobiastes), 346.
— (Muscicapula), 1083.
— (Oriolus), 527.
— (Penelopides), 102.
— (Ptilocichla), 331.
*basilanica* (Yungipicus), 75.
basilanica (Zosterops), 707.
basilanicus (Poliolophus), 307.
basilica (Carpophaga), 746.
basilicus (Buarremon), 647.
bassana (Sula), 1011.
bassetti (Zosterops), 708.
batantæ (Arses), 288, 1083.
batassiensis (Tachornis), 126.



Digitized by Google

batchianensis (Macropygia), 755.
batesi (Accipiter), 1116.
— (Canirallus), 965.
— (Illadopsis), 1087.
— (Melirrhophetes), 728.
batesianus (Merops), 1061.
batjanensis (Myzomela), 1113.
batuensis (Gracula), 539.
battyi (Leptoptila), 1115.
bauri (Eucichla), 209.
baudini (Calyptorhynchus), 1.
baueri (Limosa), 945.
baumanni (Criniger), 311.
— (Eremomela), 356.
bauri (Geospiza), 608.
— (Nesomimus), 416.
baya (Ploceus), 566.
bayleyi (Dendrocitta), 508.
beani (Troglodytes), 425.
beaudouini (Circaetus), 833.
beauharnaisi (Pteroglossus), 43.
beavani (Alcedo), 113.
— (Lophophanes), 465.
— (Prinia), 359.
beccariana (Siphia), 293.
beccarii (Casuarius), 1050.
— (Cochoa), 284.
— (Drymoedus), 319.
— (Goura), 775, 1115.
— (Nasiterna), 24.
— (Phlogœnas), 772.
— (Scops), 884.
— (Sericornis), 367.
becki (Ammodromus), 632.
— (Certhidea), 689.
— (Speotyto), 1117.
beecheyi (Cyanolyca), 513.
behni (Myrmotherula), 179.
*behringianus* (Corvus), 502.
belangeri (Garrulax), 327.
belcheri (Larus), 1023.
beldingi (Geothlypis), 437.
— (Rallus), 959.
belfordi (Melirrhophetes), 728.
belgica (Limosa), 945.
beli (Gennæus), 800.
bella (Æthopyga), 696.
— (Batis), 265, 1080.
— (Charmosyna), 1055.
— (Masius), 1074.
— (Myiobius), 246.
*bella* (Sylvia), 1090.
bella (Zenaidura), 1114.
belli (Amphispiza), 627.
— (Basileuterus), 439, 1098.
belli (Vireo), 473.
bellicosa (Hirundinea), 245.
— (Trupialis), 555.
bellicosus (Spizaëtus), 848.
*bellulus* (Cybernetes), 228.
bellus (Porphyrio), 976.
— (Ptilopus), 740.
— (Zonæginthus), 580.
bemmeleni (Porphyrio), 975.
*bemmeleni* (Trichophoropsis), 315.
bendirei (Harporhynchus), 417.
— (Scops), 886.
benedicti (Spindalis), 661.
bengalensis (Alcedo), 112.
— (Bubo), 880.
— (Centropus), 56.
*bengalensis* (Crateropus), 330.
bengalensis (Graminicola), 362.
— (Palæornis), 19.
— (Ploceus), 566.
— (Pseudogyps), 830.
*bengalensis* (Sypheotis), 926.
bengalensis (Timalia), 1087.
benguelensis (Bradyornis), 287.
benguellensis (Pternistes), 811.
benjamini (Urosticte), 154.
bennetti (Aegotheles), 116.
— (Campothera), 66.
— (Casuarius), 1052.
— (Corvus), 1105.
bensbachi (Jantholhorax), 521.
bensoni (Lophortyx), 819.
bentet (Lanius), 485.
*berardi* (Halodroma), 1037.
berezowskii (Parus), 464.
*bergensis* (Anorthura), 1096.
bergii (Sterna), 1016.
berigora (Hieracidea), 869.
berlandieri (Thryothorus), 422.
berlepschi (Anthocephala), 146.
— (Calliste), 667.
— (Catharus), 393, 1092.
— (Chlorospingus), 652.
— (Colius), 1060.
— (Columba), 753.
— (Crypturus), 782.
— (Cyanolesbia), 157.
— (Dacnis), 688.
— (Eriocnemis), 154.
— (Mitrephanes), 1077.
— (Otocorys), 452.
— (Parotia), 522.
— (Phaethornis), 132.
— (Phyllomyias), 238.
— (Polioptila), 1091.

Digitized by Google

berlepschi (Polyxemus), 163.
— (Pyriglena), 176.
— (Pyrrhura), 13.
— (Tanagra), 661.
— (Thamnophilus), 182.
bermudensis (Sialia), 1091.
bermudiana (Cardinalis), 1110.
— (Columbigallina), 764.
— (Galeoscoptes), 1095.
— (Vireo), 1102.
bermudianus (Cardinalis), 620.
bernicla (Branta), 984.
*bernieri* (Gallinago), 953.
bernieri (Ibis), 901.
— (Oriolia), 499.
— (Querquedula), 993.
bernsteini (Centropus), 55.
— (Chalcopsitta), 28.
— (Megapodius), 787.
— (Monarcha), 289.
— (Sterna), 1016.
bertæ (Pitta), 207.
bertheloti (Anthus), 447.
berthemyi (Ianthocincla), 323.
bertrandi (Chlorophoneus), 491.
— (Hyphantornis), 562.
beryllina (Alcedo), 113.
— (Saucerottea), 138.
besti (Dicæum), 679.
*betulinus* (Tetrastes), 823.
bewicki (Cygnus), 986.
bewickii (Thryomanes), 424.
bewsheri (Turdus), 400.
bezerowskyi (Phasianus), 1116.
bianchii (Lusciniola), 1090.
biarcuatum (Pyrgisoma), 636.
biarmicus (Falco), 875.
— (Panurus), 469.
bicalcarata (Galloperdix), 817.
bicalcaratum (Polyplectron), 796.
bicalcaratus (Francolinus), 809.
bicarunculatus (Casuarius), 1051.
bichenovii (Stizoptera), 580.
bicincta (Osmotreron), 734.
bicinctus (Bucco), 47.
— (Charadrius), 937.
— (Pterocles), 777.
— (Rhinoptilus), 931.
bicknelli (Turdus), 402.
bicolor (Artamia), 499.
— (Calamospiza), 625.
— (Campylorhynchus), 419.
— (Chimarrhornis), 386.
*bicolor* (Columba), 753.
bicolor (Cooperastur), 844.
bicolor (Cossypha), 409.
— (Crateropus), 330.
— (Cyanoderma), 343.
*bicolor* (Dacnis), 688.
bicolor (Erythrocichla), 336.
— (Formicivora), 178.
— (Garrulax), 327.
— (Graucalus), 297.
— (Gymnopithys), 173.
— (Laniarius), 491.
— (Lophophanes), 465.
— (Melanocharis), 676.
— (Merops), 96.
— (Merula), 396.
— (Microcerculus), 430.
— (Myristicivora), 747.
— (Nigrita), 575.
— (Notauges), 548.
— (Petroeca), 267.
— (Pholidauges), 541.
— (Phonipara), 618.
— (Porzana), 968.
— (Pratincola), 388.
— (Prionochilus), 675.
— (Spermestes), 576.
— (Spermophila), 617.
— (Sycobrotus), 565.
— (Tachycineta), 256.
— (Timolia), 143.
— (Tympanistria), 765.
bicornis (Dichoceros), 100.
— (Otocorys), 451.
bicristatus (Phalacrocorax), 1007.
biddulphi (Podoces), 506.
— (Pucrasia), 801.
— (Syrnium), 890.
bidentata (Pyranga), 659.
bidentatus (Harpagus), 868.
— (Pogonorhynchus), 35.
bieti (Alcippe), 345.
— (Chrysomitris), 593.
— (Ianthocincla), 322.
*bifasciata* (Alæmon), 450.
bifasciata (Aquila), 852.
— (Certhidea), 689.
*bifasciata* (Cinnyris), 698.
bifasciata (Loxia), 605.
— (Myrmecocichla), 391.
bifasciatus (Cinclodes), 212.
— (Cinnyris), 697.
— (Gymnostinops), 550.
— (Platyrhynchus), 1075.
bifrontatus (Oxyechus), 939
bilineata (Amphispiza), 627.
— (Barbatula), 37.

Digitized by Google

bilineata (Polioptila), 380.
bilopha (Otocorys), 452.
bimaculata (Gerygone), 269.
— (Melanocorypha), 452.
— (Phlogœnas), 772.
— (Pœcilodryas), 271.
bimaculatus (Crocopsis), 306.
— (Empidonax), 247.
— (Monarcha), 289, 1083.
*bimaculatus* (Pa'æornis), 19.
bimaensis (Dicrurus), 531.
bindloei (Nesomimus), 416.
binotata (Chlorodyta), 354.
binotatus (Caprimulgus), 124.
bipunctata (Argusianus), 795.
birchalli (Catharus), 394.
biroi (Ptilopus), 739, 1114.
birostris (Lophoceros), 103.
biscutata (Chætura), 127.
bishopi (Catharopeza), 1096.
— (Leucopeza), 430.
— (Moho), 727.
bisignata (Rhinoptilus), 931.
bismarcki (Baza), 867.
bispecularis (Garrulus), 510.
— (Lamprocolius), 547.
bistriatus (Œdicnemus), 928.
bistrigiceps (Acrocephalus), 370.
bitorquatus (Pteroglossus), 43.
— (Turtur), 760.
— (Rhinoptilus), 931.
bivittata (Cettia), 1090.
— (Mulleria), 335.
— (Petroeca), 267.
*bivittata* (Pyranga), 659.
bivittatus (Basileuterus), 439.
— (Picolaptes), 188.
— (Trochocercus), 276.
blackburniæ (Dendroeca), 434.
blainvillei (Peltops), 291.
blakei (Centurus), 69.
blakistoni (Alauda), 454.
— (Anthus), 447.
— (Motacilla), 443.
— (Pseudoptynx), 882.
blanchoti (Malaconotus), 489, 1104.
blancoi (Blacicus), 249.
blandi (Tricholæma), 36.
blanfordi (Cisticola), 364.
— (Lædorusa), 306.
— (Melizophilus), 375, 1090.
— (Montifringilla), 595.
— (Parisoma), 1081.
— (Parus), 1100.
— (Prinia), 359.
blanfordi (Psalidoprogne), 1079.
— (Telephonus), 488.
— (Turnix), 778.
blasii (Hypothymis), 274.
— (Stigmatops), 719.
blewitti (Microperdix), 813.
— (Speotyto), 895.
blighi (Myiophoneus), 408.
blissetti (Diaphorophyia), 265.
*bloxami* (Phytotoma), 210.
blundelli (Anaplectes), 568.
blythi (Amydrus), 545.
— (Cyclopsitta), 33.
— (Spodiopsar), 536.
— (Suya), 358.
— (Tragopan), 797.
— (Trochalopteron), 321.
boarula (Motacilla), 444.
*bocagei* (Alophius), 103.
bocagei (Anthus), 447.
— (Chlorophoneus), 491.
— (Cichladusa), 412.
— (Coccopygia), 1108.
— (Crateroscelis), 333.
— (Cyanoderma), 343.
— (Illadopsis), 1087.
— (Nectarinia), 695.
— (Stactolæma), 1055.
— (Turdus), 400.
— (Urobrachya), 573.
boccharensis (Parus), 461.
bocki (Hierococcyx), 50.
bodini (Chrysotis), 6.
boehmi (Bradyornis), 288.
— (Chætura), 128.
— (Dinemellia), 570.
— (Merops), 97.
— (Myopornis), 1083.
— (Parisoma), 273.
— (Pternistes), 811.
— (Trachyphonus), 40.
bogdanowi (Enneoctonus), 487.
*bogoslulovi* (Cursorius), 931.
bogotensis (Anthus), 448.
— (Cinnicerthia), 419.
*bogotensis* (Dendrornis), 189.
bogotensis (Thryophilus), 1095.
*bogotensis* (Vireo), 472.
böhmi (Aedon), 382.
— (Indicator), 34, 1055.
*böhmii* (Musophaga), 90.
bohndorfii (Crateropus), 330.
*bohndorffi* (Cyanomitra), 702.
bohndorffi (Hyphantornis), 563.
*bohndorffi* (Poicephalus), 9.

Digitized by Google

bohndorffi (Syrnium), 891.
boiei (Myzomela), 715.
boissoneauti (Pseudocolaptes), 196.
bojeri (Hyphantornis), 564.
boleslavskii (Melittophagus), 96.
boliviana (Basileuterus), 440.
— (Calliste), 667.
— (Empidonax), 247.
— (Chiroxiphia), 222.
— (Chrysomitris), 592.
— (Lampropygia), 152.
— (Leptasthenura), 201.
— (Myrmotherula), 1070.
— (Nothura), 785.
— (Penelope), 791.
— (Pitangus), 243.
— (Polioptila), 380.
— (Poospiza), 628.
*boliviana* (Psalidoprymna), 158.
— (Thalurania), 143.
bolivianus (Attila), 214.
— (Oreotrochilus), 147.
— (Phaethornis), 132.
— (Scytalopus), 167.
— (Trogon), 87.
— (Tyranniscus), 239.
— (Vireolanius), 1102.
bollei (Columba), 751.
— (Irrisor), 98.
bombus (Polyxemus), 163.
bonana (Pendulinus), 556.
bonapartei (Gymnobucco), 37.
— (Helianthea), 151.
— (Loriculus), 23.
— (Nothocercus), 782.
— (Poospiza), 628.
— (Rhiticilla), 1091.
— (Sarothrura), 970.
— (Todopsis), 275.
— (Turdus), 399.
*bonapartii* (Larus), 1021.
— (Tringa), 952.
bonariensis (Molothrus), 552.
bonasia (Tetrastes), 823.
*bonasides* (Lyrurus), 826.
*bonasiotetrix* (Lyrurus), 826.
*bonellii* (Eutolmaëtus), 850.
bonellii (Phylloscopus), 377.
bonensis (Pachycephala), 479.
boneratensis (Oriolus), 526, 1105.
bonhami (Ammoperdix), 807.
bonita (Æthopyga), 696.
bonthaina (Pachycephala), 479.
— (Siphia), 293.
bonthainensis (Trichoglossus), 31.
bonvaloti (Acredula), 467.
— (Babax), 320.
— (Trochalopteron), 321.
boobook (Ninox), 888.
boothi (Chalcomitra), 1112.
boraquira (Nothura), 785.
borbæ (Picumnus), 84.
— (Thamnophilus), 184.
borbonica (Pratincola), 387.
— (Ixocincla), 316.
— (Phedina), 259.
— (Zosterops), 712.
borbonicus (Trochocercus), 276.
borea (Myiarchus), 250.
borealis (Acanthopneuste), 376.
— (Anorthura), 427.
— (Buteo), 856.
*borealis* (Cannabina), 590.
borealis (Contopus), 248.
— (Cyanocitta), 1105.
— (Lanius), 483.
— (Motacilla), 444.
— (Nephœcetes), 129.
— (Numenius), 945.
— (Parus), 462.
— (Picus), 71.
— (Puffinus), 1031.
— (Somateria), 1000.
borelli (Buarremon), 648.
borellii (Pyrrhura), 13.
*borneense* (Glaucidium), 897.
borneensis (Baza), 867.
— (Caloperdix), 814.
— (Chlorura), 584.
— (Dicrurus), 531.
— (Henicurus), 449.
*borneensis* (Lalage), 303.
— (Megalæma), 38.
borneensis (Myiophoneus), 408.
— (Ninox), 887.
— (Pitta), 208.
— (Pomathorinus), 325.
— (Rhopodytes), 58.
— (Strachyrhis), 339.
bornensis (Mixornis), 310.
*borneonensis* (Orthotomus), 361.
borneonensis (Tiga), 78.
boscas (Anas), 989.
boschi (Eucichla), 209.
bottæ (Saxicola), 390.
bottegi (Francolinus), 809.
botterii (Hæmophila), 634.
boucardi (Crypturus), 784.
— (Formicivora), 178.
— (Granatellus), 438.

Digitized by Google

boucardi (Hæmophila), 634.
— (Myrmeciza), 174.
— (Polyerata), 137.
bougainvillei (Phalacrocorax), 1009.
bougueri (Urochroa), 148.
boulboul (Merula), 396.
bouqueti (Chrysotis), 4.
bourcieri (Capito), 42.
— (Chlorochrysa), 669.
— (Geotrygon), 771.
— (Phaethornis), 132.
bourdilloni (Alcippe), 345.
*bourdilloni* (Lyncornis), 119.
bourdilloni (Merula), 396.
bourkei (Euphema), 25.
*bournsii* (Ceyx), 112.
bourneensis (Oriolus), 527.
— (Scops), 884.
— (Rhipidura), 279.
bouvieri (Cinnyris), 698.
— (Scotopelia), 879.
boweri (Colluricincla), 496.
bowmani (Phlogopsis), 172.
*bowmani* (Sylvia), 375.
boyciana (Ciconia), 906.
boyeri (Graucalus), 295.
braccata (Saucerottea), 1065.
braccatus (Moho), 727.
*bracchata* (Spizaëtus), 848.
brachydactyla (Calandrella), 453.
— (Certhia), 683, 1112.
— (Petronia), 597.
*brachyotus* (Asio), 878.
*brachyptera* (Cisticola), 363.
— (Leptoptila), 768.
brachyptera (Sitagra), 564.
— (Speotyto), 895.
— (Sphenura), 349.
*brachyptera* (Tachyeres), 998.
brachypterus (Bradypterus), 350.
— (Buteo), 855.
— (Ocydromus), 964.
— (Podicipes), 1041.
— (Quiscalus), 560.
brachypus (Hypotænidia), 961.
brachyrhyncha (Rhipidura), 278.
*brachyrhynchos* (Herodias), 912.
brachyrhynchus (Anser), 983.
— (Contopus), 248.
— (Larus), 1025.
— (Oriolus), 528.
— (Podicipes), 1041.
brachylarsus (Contopus), 249, 1078.
brachyura (Buteola), 858.
*brachyura* (Diomedea), 1038.
brachyura (Myiarchus), 250.
— (Pipra), 221.
— (Pitta), 207.
— (Pœcilodryas), 271.
— (Sylviella), 355.
brachyurus (Accipiter), 846.
*brachyurus* (Ægotheles), 116.
brachyurus (Anthus), 446.
— (Idiopsar), 641.
— (Micropternus), 78.
— (Pachynus), 6.
— (Rhamphocinclus), 414.
— (Troglodytes), 426.
bracteatus (Dicrurus), 531.
— (Nyctibius), 117.
*bradshawi* (Chalcomitra), 701.
brama (Athene), 895.
*brancoensis* (Passer), 598.
brandti (Garrulus), 510.
— (Montifringilla), 595.
— (Otocorys), 451.
— (Parus), 463.
— (Phasianus), 1115.
branickii (Lampraster), 149.
— (Leptosittaca), 12.
— (Nothoprocta), 785.
— (Odontorhynchus), 421.
— (Procnopis), 669.
— (Thalassoætus), 853.
— (Theristicus), 902.
brasheri (Basileuterus), 1098.
*brasieri* (Basileuterus), 439.
brasiliana (Scops), 885.
brasilianus (Merganser), 1004.
*brasilianus* (Phalacrocorax), 1008.
brasiliense (Tigrisoma), 919.
brasiliensis (Attila), 214.
— (Calliste), 667.
— (Chelidoptera), 49.
— (Chloronerpes), 65.
— (Chrysotis), 5.
— (Himantopus), 942.
— (Momotus), 94.
— (Pitylus), 643.
*brasiliensis* (Polyborus), 832.
brasiliensis (Querquedula), 994.
*brasiliensis* (Sycalis), 601.
— (Sula), 1012.
brasiliensis (Tachyphonus), 656.
*brasiliensis* (Tinamus), 781.
brasiliensis (Tityra), 211.
brasilius (Rhamphocœlus), 660.
brauniana (Chaptia), 532.
brazzæ (Phedina), 259.
*brazzæ* (Pachycoccyx), 50.

Digitized by Google

brehmeri (Chalcopelia), 766.
brehmi (Psittacella), 21.
brehmii (Monarcha), 290.
brehmorum (Cypselus), 1064.
brenchleyi (Carpophaga), 747.
brenchleyi (Megapodius), 787.
— (Rhipidura), 276.
*brenta* (Branta), 984.
brevicarinata (Rhamphastos), 42.
*brevicauda* (Burnesia), 360.
brevicauda (Chamæza), 171.
— (Cittocincla), 413.
— (Drymoedus), 319.
— (Grallaria), 170.
— (Muscigralla), 230.
— (Myrmotherula), 179.
*brevicauda* (Pitta), 208.
brevicauda (Thryomanes), 424.
brevicaudata (Camaroptera), 356.
— (Lamprotornis), 544.
brevicaudatus (Turdinulus), 332.
brevipennis (Calamocichla), 352.
— (Campylorhynchus), 421.
— (Lusciniola), 1090.
— (Myiarchus), 250.
— (Neochloe), 473.
— (Rhectes), 495.
— (Tinnunculus), 871.
brevipes (Arbelorhina), 690.
— (Astur), 841.
— (Butorides), 916.
— (Conurus), 12.
— (Monticola), 393.
— (Œstrelata), 1034.
— (Platycichla), 407.
— (Totanus), 947.
brevirostris (Agyrtria), 136.
— (Aplonis), 541.
— (Brachyrhamphus), 1044.
— (Campylorhynchus), 420.
— (Cannabina), 590.
— (Cinnyris), 699.
*brevirostris* (Cistothorus), 425.
brevirostris (Collocalia), 129.
— (Crypturus), 783.
— (Drymoedus), 319.
— (Empidagra), 241.
— (Geositta), 1073.
— (Geospiza), 1110.
— (Hypoxanthus), 63.
— (Melithreptus), 714.
— (Molothrus), 552.
*brevirostris* (Numenius), 945.
brevirostris (Œstrelata), 1034.
— (Pericrocotus), 301.
brevirostris (Petronia), 596.
— (Phabotreron), 734.
— (Phalacrocorax), 1010.
— (Phyllomyias), 237.
— (Rissa), 1027.
— (Rhynchocyclus), 242.
*brevirostris* (Schœnicola), 349.
brevirostris (Siphia), 1083.
— (Smicrornis), 267.
— (Thamnophilus), 184.
breviunguis (Alæmon), 451.
breweri (Merops), 97.
— (Spizella), 630.
brewsteri (Sula), 1012.
*briceni* (Thripadectes), 193.
bricenoi (Spathura), 153.
— (Thamnophilus), 182.
bridgesi (Drymornis), 187.
— (Pionus), 7.
— (Thamnophilus), 183.
— (Upucerthia), 203.
britannica (Certhia), 683.
— (Parus), 462.
— (Sitta), 1112.
*broadbenti* (Aprosmictus), 20.
broadbenti (Sphenura), 349.
broderipi (Oriolus), 526.
brodiei (Glaucidium), 897.
— (Monarcha), 290.
bronzina (Haplopelia), 768.
bronzinus (Cacomantis), 52.
*brookeanus* (Hemicercus), 81.
*brookei* (Falco), 875.
brookei (Scops), 884.
browni (Conopophaga), 1068.
— (Elaïnea), 241.
— (Malurus), 368.
— (Monarcha), 290.
— (Platycercus), 24.
— (Reinwardtœnas), 756.
— (Sycalis), 601.
bruante (Foudia), 566.
*brubru* (Nilaus), 488.
brucei (Scops), 883.
brunnea (Æthyia), 997.
— (Alcippe), 345.
— (Colluricincla), 495.
*brunnea* (Dendrocincla), 186.
brunnea (Dioptrornis), 287.
— (Eopsaltria), 482.
— (Gerygone), 269.
— (Larvivora), 383.
— (Muscisaxicola), 230.
— (Nesihierax), 869.
— (Nonnula), 48.

Digitized by Google

brunnea (Sclerurus), 192.
— (Suthora), 471.
— (Zosterops), 1113.
brunneata (Siphia), 293.
brunneicapilla (Tyrannulus), 239, 1076.
brunneicapillum (Ornithion), 1076.
brunneicapillus (Blacicus), 249.
— (Campylorhynchus), 420, 1095.
*brunneicauda* (Margarornis), 191.
brunneicauda (Minla), 344.
— (Newtonia), 266.
— (Pachycephala), 480.
— (Rhectes), 495.
— (Synallaxis), 197.
*brunneicauda* (Zosterops), 709.
*brunneicaudalis* (Synallaxis), 197.
brunneiceps (Brachypteryx), 342
— (Burnesia), 1089.
— (Cisticola), 364.
— (Cistothorus), 425.
— (Erythropygia), 412.
*brunneiceps* (Hemixus), 315.
brunneiceps (Hylophilus), 474.
— (Lagonosticta), 577.
— (Munia), 588.
— (Phabotreron), 734.
— (Rhectes), 495.
— (Setophaga), 441.
brunneifrons (Cettia), 372.
— (Euphonia), 672.
— (Ochthoeca), 226.
— (Picus), 72.
brunneicephalus (Larus), 1022.
brunneicollis (Troglodytes), 426.
brunneinucha (Buarremon), 648.
— (Conopophaga), 169.
— (Montifringilla), 595.
brunneipectus (Gerygone), 269.
brunneitorques (Nephœcetes), 129.
brunneiventris (Chlorura), 584.
*brunneiventris* (Crateroscelis), 333.
brunneiventris (Diglossa), 685.
— (Megapodius), 787, 1115.
brunneopectus (Arboricola), 814.
brunneopygius (Drymoedus), 319.
brunnescens (Aplonis), 541.
— (Butorides), 916.
— (Colaptes), 63.
— (Cyphorhinus), 429.
— (Herpornis), 347.
— (Margarornis), 191.
— (Nigrita), 1108.
— (Passerculus), 631.
brunneus (Dromæocercus), 348.
*brunneus* (Empidonax), 247.
brunneus (Hylophilus), 1102.
— (Pyrrholæmus), 366.
*brunneus* (Thryophilus), 422.
*brunnichi* (Uria), 1043.
brutus (Astur), 840.
bruijnii (Æpypodius), 788.
*bruijnii* (Chalcopsitta), 28.
bruijnii (Drepanornis), 520.
— (Grallina), 500, 1083.
— (Nasiterna), 23.
*bruijnii* (Ptilorhis), 521.
bryantæ (Philodice), 161.
bryanti (Agelæus), 553.
— (Campylorhynchus), 420, 1095.
— (Dendroeca), 433.
*bryanti* (Mimocichla), 394.
bryanti (Phonipara), 618.
buaensis (Ptilotis), 720.
*bubulcus* (Bubulcus), 913.
buccinator (Bycanistes), 101.
— (Cygnus), 986.
buccoides (Ælurœdus), 523.
bucephalus (Lanius), 485.
buceroides (Tropidorhynchus), 725.
*buchanani* (Acanthiza), 366.
buchanani (Cisticola), 363.
— (Emberiza), 622.
buckleyi (Columbigallina), 764.
*buckleyi* (Francolinus), 808.
— (Helianthea), 151, 1067.
buckleyi (Mirafra), 455.
— (Petasophora), 145.
— (Ptilochloris), 223.
— (Tityra), 211.
buditoides (Stigmatura), 235.
buensis (Collurlcincla), 496.
buettikoferi (Rhipidura), 279, 1081.
*buffoni* (Cacatua), 2.
buffoni (Chalybura), 144.
— (Picumnus), 84.
— (Polioptila), 380.
— (Turacus), 89.
bulgeri (Rhipidura), 276.
*bulleri* (Apteryx), 1049.
bulleri (Diomedea), 1038
— (Puffinus), 1031.
— (Larus), 1023.
*bullockii* (Calocitta), 509.
bullockii (Hyphantes), 556.
— (Melittophagus), 96.
bullockoides (Melittophagus), 96.
bulomachus (Suthora), 471.
bulunensis (Hylophilus), 1102.
*bulweri* (Bulweria), 1036.
bulweri (Lobiophasis), 799.

Digitized by Google

bungurensis (Graucalus), 297.
— (Malacopteron), 337.
burbidgei (Tanygnathus), 18.
burchelli (Centropus), 57.
— (Otis), 925.
burkii (Cryptolopha), 285.
burmanica (Cryptolopha), 1082.
— (Ninox), 887.
— (Pelargopsis), 114.
— (Phasianus), 803.
*burmanicus* (Criniger), 311, 1085.
burmanicus (Molpastes), 305.
— (Spodiopsar), 535.
burmeisteri (Cariama), 924.
— (Chætocercus), 163.
— (Phyllomyias), 238.
burnesi (Laticilla), 350.
burroviana (Rhinogryphus), 828.
*burrowsii* (Chætusia), 936.
burtoni (Callacanthis), 593.
— (Eustephanus), 157.
— (Serinus), 600.
buruensis (Aprosmictus), 21.
— (Erythromyias), 267.
— (Monarcha), 290.
— (Pachycephala), 476.
— (Zosterops), 709.
buryi (Passer), 1109.
— (Scotocerca), 1089.
*butleri* (Anthus), 445.
butleri (Asio), 878.
— (Astur), 840.
— (Cryptolopha), 286.
buttikoferi (Accipiter), 846.
— (Cyrtostomus), 703.
— (Malacocincla), 1087.
— (Œdicnemus), 928.
— (Trichostoma), 334.
*buttikoferi* (Turturœna), 754.
büttneri (Turacus), 89.
butyraceus (Serinus), 600.
buxans (Campophilus), 1059.
buxtoni (Crateropus), 329.
*buxtoni* (Trichostoma), 333.
*byroni* (Conurus), 11.
cabanidis (Petasophora), 145.
*cabanisi* (Anabazenops), 192, 1072.
cabanisi (Basileuterus), 439.
— (Calliste), 667.
— (Ceryle), 115.
— (Cnipolegus), 229.
— (Criniger), 311.
— (Emberiza), 621.
— (Empidochanes), 247.
— (Hyphantornis), 562.
cabanisi (Munia), 587.
— (Nigrita), 575.
*cabanisi* (Petasophora), 145.
cabanisi (Picus), 70.
— (Pyrgisoma), 636.
— (Rhinopomastus), 98.
— (Synallaxis), 197.
— (Tigrisoma), 919.
*cabanisi* (Turacus), 89.
cabanisi (Turdus), 399.
caboclinho (Spermophila), 616.
caboti (Cœreba), 690.
— (Eleopicus), 75.
*caboti* (Melospiza), 632.
caboti (Tragopan), 797.
cabræ (Strix), 900.
cabreræ (Merula), 1092.
cachabiensis (Thamnophilus), 183.
*cachariensis* (Siphia), 293.
cachaviensis (Geotrygon), 771.
cachinnans (Herpetotheres), 833.
— (Larus), 1025.
— (Trochalopteron), 322.
cacozela (Merula), 395.
cactorum (Conurus), 12.
— (Melanerpes), 68.
cælebs (Fringilla), 589.
cærulatra (Amaurospiza), 619.
cærulatus (Dryonastes), 329.
cærulea (Arbelorhina), 690.
— (Ardea), 910.
— (Campophaga), 300.
— (Cotinga), 216.
— (Coua), 60.
— (Dendroeca), 435.
— (Gigantipitta), 207.
— (Guiraca), 612.
— (Halobæna), 1037.
*cærulea* (Hypothymis), 274.
cærulea (Polioptila), 380.
*cærulea* (Procnias), 670.
cærulea (Urocissa), 507.
cæruleata (Siphia), 293.
cærulecula (Cyanecula), 383.
*cæruleiceps* (Chrysuronia), 140.
cæruleiceps (Momotus), 94.
— (Trichoglossus), 31.
cæruleicinctus (Aulacorhamphus), 44.
cæruleigaster (Chalybura), 144.
cæruleigularis (Aulacorhamphus), 44.
— (Buthraupis), 663, 1111.
— (Gyanophaia), 137.
cæruleirostris (Chrysomitridops), 594.
cæruleitorques (Pitta), 209.
*cæruleocapilla* (Myiagra), 283.



Digitized by Google

cæruleocapilla (Pipra), 221.
cæruleocephala (Calliste), 668.
*cæruleocephala* (Muscicapa), 263.
cæruleocephala (Xanthoura), 514.
cæruleogriseus (Graucalus), 297.
cæruleo-lavata (Thalurania), 143.
cærulescens (Butalis), 262.
— (Chen), 982.
— (Cercomacra), 176.
— (Chlorophanes), 689.
— (Dendroeca), 435.
— (Dicrurus), 530.
— (Diglossopis), 686.
— (Edoliisoma), 298.
— (Estrelda), 582.
— (Eupetes), 319.
— (Geranospizias), 838.
— (Harpiprion), 902.
— (Melanotis), 417.
— (Microhierax), 868.
— (Notornis), 976.
— (Otis), 926.
— (Rallus), 960.
— (Saltator), 645.
— (Spermophila), 616.
— (Thamnophilus), 183.
*cærulescens* (Zosterops), 712.
cæruleus (Anous), 1019.
— (Chlorestes), 140.
— (Cyanocorax), 514.
— (Elanus), 864.
— (Graucalus), 1084.
— (Myiophoneus), 408.
— (Parus), 464.
— (Porphyrio), 975.
*cæruligena* (Chrysotis), 5.
cærulocephala (Ruticilla), 386.
cæsar (Poospiza), 628.
cæsia (Emberiza), 622.
— (Sitta), 680.
cæsiogastra (Polioptila), 380.
cæsius (Graucalus), 295, 1083.
*cæsius* (Rallus), 961.
cæsius (Thamnomanes), 180.
cafer (Bucorvus), 99.
— (Coccystes), 49.
— (Promerops), 727.
— (Trachyphonus), 40.
caffer (Amydrus), 545.
— (Cypselus), 125.
*caffer* (Lophoceros), 103.
caffra (Chalcopelia), 1114.
— (Cossypha), 409, 1094.
— (Hyphantornis), 563.
— (Otis), 925.
caffrensis (Hagedashia), 902.
cagayanensis (Mixornis), 341.
*cahirica* (Hirundo), 253.
cahooni (Troglodytes), 426.
cairii (Ruticilla), 385.
cairnsi (Dendroeca), 435.
cajeli (Ceyx), 112.
cala (Basileuterus), 1098.
calandra (Melanocorypha), 452.
calcarata (Corythopis), 168.
*calcarata* (Motacilla), 444.
*calceolata* (Ardea), 910.
caledonica (Myiagra), 283.
— (Myzomela), 715.
— (Pachycephala), 478.
caledonicus (Graucalus), 297.
— (Nycticorax), 917.
calendula (Regulus), 379.
calidris (Totanus), 947.
— (Vireo), 472.
californianus (Gymnogyps), 829.
californica (Agelæus), 553.
— (Carpodacus), 603.
— (Glaucidium), 896.
*californica* (Herodias), 912.
californica (Phalænoptilus), 1063.
— (Pinicola), 606.
— (Podicipes), 1041.
— (Polioptila), 380.
— (Psaltriparus), 466.
— (Uria), 1043.
— (Vireo), 472.
californicus (Larus), 1025.
— (Lophortyx), 819.
— (Pelecanus), 1006.
*californicus* (Phalænoptilus), 121.
caligata (Hypolais), 373.
*caligatus* (Syrnium), 891.
caligatus (Trogon), 87.
calipareus (Podicipes), 1041.
calipyga (Liothrix), 348.
*calita* (Myiopsitta), 14.
callainus (Malurus), 367.
callauchen (Leptoptila), 769.
calliaudi (Campothera), 66.
callinota (Terenura), 177.
calliope (Stellula), 163.
— (Pachycephala), 478.
calliparæa (Chlorochrysa), 669.
calliptera (Pyrrhura), 13.
callista (Arremon), 1111.
callogenys (Conurus), 12.
callonotus (Eleopicus), 75.
callophrys (Chlorophonia), 671.
— (Tanagrella), 670.

Digitized by Google

calloptera (Aramides), 964.
calloptera (Aprosmictus), 20.
— (Chloronerpes), 65.
calolæma (Oreopyra), 149.
calonyx (Eurystomus), 93.
calophona (Thryomanes), 424.
calophrys (Chlorospingus), 651.
calopterum (Todirostrum), 231.
calopterus (Mecocerculus), 227.
calorhynchus (Aulacorhamphus), 44.
— (Rhamphococcyx), 59.
*calosoma* (Chrysolampis), 146.
calotropiphila (Ægithalus), 468.
calthorpæ (Anthus), 446.
calthropæ (Palæornis), 19.
calurus (Buteo), 856.
— (Criniger), 310.
*calurus* (Psalidoprymna), 158.
calva (Acredula), 467.
— (Vinago), 732.
calvus (Allocotops), 326.
— (Geronticus), 901.
— (Gymnobucco), 37.
— (Gymnocephalus), 218.
— (Otogyps), 829.
— (Porphyrio), 975.
— (Sarcops), 538.
camaroonensis (Ægithalus), 468.
— (Anthus), 1098.
cambaiensis (Thamnobia), 410.
cambayensis (Turtur), 762.
cambodianus (Spodiopsar), 535.
camburni (Hyphantornis), 564.
camelus (Struthio), 1052.
cameranoi (Pterythrius), 487.
cameronensis (Chlorocichla), 314.
camerunensis (Pedilorhynchus), 266.
— (Podica), 978.
— (Pyrrhospiza), 1109.
campbelli (Petroeca), 266.
— (Phalacrocorax), 1009.
campestris (Anthus), 446.
— (Calamanthus), 360.
— (Colaptes), 63.
— (Motacilla), 444.
— (Pediœcetes), 824.
— (Uropelia), 764.
*camtschatcensis* (Tridactylia), 73.
camtschatkensis (Calliope), 383.
*camtschatica* (Sterna), 1015.
camurus (Alophius), 104.
cana (Casarca), 989.
— (Tanagra), 662.
canadensis (Branta), 984.
— (Falcipennis), 825.
canadensis (Grus), 921.
— (Myiodioctes), 442.
— (Perisoreus), 511.
— (Pinicola), 606.
— (Sitta), 681.
*canadensis* (Thamnophilus), 182.
canagica (Philacte), 984.
canaria (Serinus), 601.
canariensis (Asio), 878.
— (Corvus), 1104.
— (Fringilla), 589.
— (Motacilla), 1098.
— (Phylloscopus), 1091.
— (Picus), 70.
— (Tinnunculus), 870.
cancellatus (Phegornis), 956.
— (Picus), 72.
*cancroma* (Platyrhynchus), 231.
cancrominus (Platyrhynchus), 231.
cancrophagus (Cochlearius), 920.
candæi (Chiromacheris), 222.
— (Synallaxis), 198.
candicans (Hierofalco), 876.
— (Stenopsis), 121.
candida (Agyrtria), 136.
— (Coscoroba), 987.
*candida* (Gygis), 1019.
candida (Strix), 900.
candidissima (Herodias), 912.
candidissimus (Astur), 839.
*candidus* (Himantopus), 942.
candidus (Melanerpes), 68.
*candidus* (Pagophila), 1026.
— (Phaeton), 1004.
canens (Embernagra), 638.
canente (Hemicercus), 81.
canescens (Centurus), 69.
— (Empidochanes), 247.
— (Empidonax), 248.
*canescens* (Eremomela), 356.
canescens (Merula), 397.
— (Monarcha), 289.
— (Vireo), 472.
canicapilla (Nigrita), 575.
— (Poliospiza), 599.
— (Xenocichla), 309.
— (Zonotrichia), 626.
canicapillum (Trichostoma), 334.
canicapillus (Yungipicus), 74.
canicauda (Cardinalis), 620.
caniceps (Carduelis), 591.
— (Elainea), 240.
— (Eremomela), 356.
— (Geotrygon), 771.
— (Junco), 629.

Digitized by Google

caniceps (Lanius), 485.
— (Megalæma), 39.
— (Munia), 587.
— (Palæornis), 19.
— (Phrygilus), 640.
— (Præcilodryas), 272.
— (Sigmodus), 498.
— (Sitta), 681.
— (Urolonchа), 586.
canicollis (Ortalida), 792.
— (Otis), 926.
— (Serinus), 599.
canicularis (Conurus), 12.
canifrons (Chrysotis), 5.
— (Phlogœnas), 772.
— (Spizixus), 304.
canigularis (Chlorospingus), 650.
— (Sclerurus), 191.
caninde (Ara), 10.
caninucha (Geothlypis), 437.
*canipalliata* (Chrysotis), 5.
canipennis (Hemixus), 315.
canipileus (Chlorospingus), 651.
caniveti (Chlorostilbon), 141.
canningi (Rallina), 966.
canobrunnea (Thryothorus), 423.
canolimbatus (Amydrus), 1106.
*canonicus* (Serinus), 601.
canora (Phonipara), 618.
*canorinus* (Cuculus), 51.
*canoroides* (Cuculus), 51.
canorum (Trochalopteron), 322.
canorus (Crateropus), 330.
— (Cuculus), 51.
— (Melierax), 838.
cantans (Aidemosyne), 585.
— (Cettia), 372.
— (Telespiza), 606.
cantarella (Alauda), 454.
cantator (Cryptolopha), 285.
— (Hypocnemis), 173.
— (Thryothorus), 423.
cantatrix (Psophia), 924.
*cantatrix* (Siphia), 292.
cantiaca (Sterna), 1015.
*cantianus* (Ægialitis), 940.
cantica (Cyclorhis), 475.
cantillans (Cettia), 372.
*cantillans* (Cinclorhamphus), 361.
cantillans (Mirafra), 456.
cantonensis (Pericrocotus), 302, 1084.
*cantor* (Lamprocorax), 543.
cantoroides (Lamprocorax), 542.
canturiens (Cettia), 372.
*canus* (Agapornis), 22.
canus (Gecinus), 64.
— (Larus), 1025.
canutus (Tringa), 950.
caparoch (Surnia), 894.
capella (Vanellus), 935.
capellana (Corvus), 503.
capellei (Butreron), 732.
capelli (Lanius), 485.
capensis (Ægithalus), 468.
— (Asio), 878.
— (Batis), 264.
— (Botaurus), 918.
— (Bubo), 880.
*capensis* (Bucco), 46.
capensis (Certhilauda), 450.
— (Colius), 91.
— (Corvus), 502.
— (Daption), 1036.
— (Francolinus), 810.
— (Fringillaria), 624.
— (Hæmatopus), 933.
— (Hyphantornis), 563.
— (Macronyx), 449.
— (Microparra), 958.
— (Motacilla), 443.
— (Nilaus), 488.
— (Œdicnemus), 928.
— (Œna), 765.
— (Phalacrocorax), 1007.
— (Phyllostrophus), 314, 1085.
— (Podicipes), 1040.
— (Pycnonotus), 305.
— (Pyromelana), 572.
— (Querquedula), 993.
— (Rhynchæa), 956.
— (Scops), 882.
— (Smithornis), 285.
— (Spatula), 995.
— (Strix), 900.
— (Sula), 1011.
— (Tænioglaux), 897.
*capensis* (Upupa), 99.
— (Zosterops), 706.
capicola (Turtur), 760.
capistrata (Malacias), 324.
— (Muscisaxicola), 230.
— (Pytelia), 578.
— (Saxicola), 388.
— (Schistochlamys), 644.
capistratoides (Drymocataphus), 334.
capistratus (Campylorhynchus), 420.
— (Chloronerpes), 65.
— (Drymocataphus), 334.
*capistratus* (Larus), 1022.
capistratus (Serinus), 600.


Digitized by Google

capistratus (Thamnophilus), 182.
capitalba (Amblyospiza), 570.
capitale (Todirostrum), 232.
capitalis (Chrysomitris), 592.
— (Dendroeca), 433, 1097.
— (Hedymeles), 612.
— (Hemipus), 497.
— (Hyphantornis), 562.
— (Leptoptila), 769.
— (Myiobius), 246.
— (Perisoreus), 511.
— (Pezopetes), 649.
— (Rhamphocœlus), 660.
— (Thamnophilus), 183.
— (Zosterornis), 339.
capitanea (Chrysomitris), 591.
capitata (Paroaria), 643.
capito (Pœcilodryas), 272.
capitoides (Dendrexetastes), 1071.
capnodes (Scops), 884.
caprata (Pratincola), 387.
capricorni (Campothera), 66.
capucinus (Monachalcyon), 105.
capueira (Odontophorus), 822.
cara (Æthopyga), 695.
caracco (Ortalida), 792.
*carbo* (Oedemia), 999.
carbo (Phalacrocorax), 1006.
— (Uria), 1044.
*carboides* (Phalacrocorax), 1007.
carbonacea (Cyanocitta), 1105.
carbonaria (Cercomacra), 176.
— (Diglossa), 685.
carbonarius (Dicrurus), 531.
— (Phrygilus), 640.
carbonata (Dendroeca), 435.
cardinalis (Dendropicus), 73, 1058.
— (Eclectus), 16.
— (Eos), 28.
— (Myzomela), 715.
— (Quelea), 571.
cardis (Merula), 397.
caribæa (Ammodramus), 1110.
— (Columba), 751.
— (Fulica), 977.
— (Rallus), 959.
*caribbæa* (Estrelata), 1034.
caribbæarum (Tinnunculus), 871.
caribæus (Blacicus), 249.
*carinata* (Monarcha), 289.
carinatus (Prionirhynchus), 94.
— (Rhamphastos), 42.
caripensis (Steatornis), 115.
carlottæ (Cyanocitta), 1105.
carmani (Pipilo), 637.
*carmioli* (Chalybura), 144.
carmioli (Chlorothraupis), 657.
— (Vireo), 473.
carnapi (Sylviella), 355.
carnea (Cardinalis), 620.
carneipes (Arbelorhina), 690.
— (Puffinus), 1032.
— (Pycnorhamphus), 611.
carneirostris (Anser), 983.
carnifex (Phœnicocercus), 215.
carnivora (Corvus), 502.
carola (Carpophaga), 745.
carolæ (Parotia), 522.
*carolæ* (Pipilo), 637.
caroli (Ægithalus), 468.
— (Campothera), 66.
— (Coccystes), 49.
— (Polyonomus), 157.
carolina (Porzana), 967.
carolinæ (Brachypteryx), 342.
— (Galerida), 457.
— (Tanysiptera), 106.
carolinensis (Antrostomus), 122.
— (Conurus), 11.
— (Galeoscoptes), 415.
*carolinensis* (Herodias), 912.
carolinensis (Junco), 629.
— (Pandion), 877.
— (Parus), 463.
*carolinensis* (Podilymbus), 1042.
carolinensis (Querquedula), 993.
— (Sitta), 681.
— (Tyrannus), 252.
— (Zenaidura), 757.
carolinus (Centurus), 69.
carpalis (Hæmophila), 635.
carri (Synallaxis), 198.
carribæa (Turdus), 1093.
carribæus (Chlorostilbon), 141, 1066.
carteretia (Macropygia), 756.
carteri (Eremiornis), 1088.
— (Ptilotis), 720.
carunculata (Aburria), 794.
— (Anthochæra), 724.
— (Bostrychia), 901.
*carunculata* (Chasmorhynchus), 219.
carunculata (Crax), 789.
— (Paradigalla), 524.
— (Ptilotis), 719.
— (Sarcidiornis), 981.
carunculatus (Bugeranus), 922.
— (Creadion), 516.
— (Ibycter), 832.
— (Perissornis), 536.
— (Phalacrocorax), 1009.

Digitized by Google

*caryeinurus* (Psittacus), 3.
caryocatactes (Nucifraga), 506.
caryophyllacea (Rhodonessa), 981.
cashmeriensis (Cinclus), 418.
cashmiriensis (Chelidon), 256.
cashmirensis (Sitta), 681.
casiotis (Columba), 751.
caspia (Garrulus), 510.
— (Hydroprogne), 1014.
*caspius* (Ægithalus), 467.
caspius (Tetraogallus), 806.
cassicus (Cracticus), 500.
cassidix (Cranorrhinus), 99.
— (Ptilotis), 721.
*cassini* (Aplonis), 541.
cassini (Butalis), 262.
— (Carpodacus), 603.
— (Chætura), 128.
— (Eleopicus), 76.
— (Eucometis), 655.
— (Falco), 874.
— (Gymnostinops), 549.
— (Hæmophila), 634.
— (Halcyon), 109.
— (Leptoptila), 770.
— (Malimbus), 568.
— (Molothrus), 552.
*cassini* (Numenius), 944
cassini (Pyrrhula), 607.
— (Scops), 886.
— (Vireo), 472.
castanea (Alethe), 410.
— (Dendroeca), 435.
— (Hapaloptila), 48.
— (Merula), 397.
— (Pucrasia), 801.
— (Querquedula), 993.
— (Synallaxis), 198.
— (Tænioglaux), 897.
castaneicapilla (Setophaga). 441.
*castaneicauda* (Basilinna), 139.
castaneicauda (Siva), 347.
castaneiceps (Basileuterus), 439.
— (Buarremon), 648.
— (Columba), 752.
— (Conopophaga), 169.
— (Cryptolopha), 286.
— (Dendroeca), 1097.
— (Emberiza), 623.
— (Hyphantornis), 563.
*castaneiceps* (Laniarius), 491.
castaneiceps (Malacothraupis), 655.
— (Minla), 344.
— (Momotus), 94.
— (Orthotomus), 361.
castaneiceps (Porzana), 968.
— (Scoptelus), 98.
— (Staphidia), 344.
— (Tinamus), 782.
castaneicollis (Chlorospingus), 651.
— (Francolinus), 809.
castaneifrons (Lophophanes), 465.
— (Pipilopsis), 649.
castaneigularis (Myiagra), 283.
castaneithorax (Munia), 587.
castaneiventris (Amazilia), 138.
— (Cacomantis), 52.
— (Chalcomitra), 702.
— (Delothraupis), 664.
— (Eulabeornis), 962
*castaneiventris* (Myiagra), 283.
— (Oreopyra), 148.
castaneiventris (Parus), 461.
— (Pomarea), 291.
— (Spermophila), 615.
castaneocoronata (Oligura), 343.
castaneofusca (Cinnamopteryx). 561.
castaneopectus (Pendulinus), 557. 1106.
*castaneosoma* (Cinnamopteryx), 561.
castaneothorax (Cinclosoma), 318.
*castaneothorax* (Rhipidura), 1031.
castaneotincta (Latiria), 1074.
castaneoventris (Sitta), 681.
castaneus (Ægithalus), 467.
— (Androphilus), 335.
*castaneus* (Batrachostomus), 117.
castaneus (Bradypterus), 350.
— (Celeus), 79.
— (Colinus), 821.
— (Crypturus), 782.
— (Hylactes), 168.
— (Myiophoneus), 408.
*castaneus* (Philepitta), 210.
— (Plegadis), 903.
castaneus (Thryophilus), 422.
castanilia (Astur), 841.
castanogastris (Callipepla), 818.
*castanonota* (Alethe), 411.
castanonota (Tænioglaux), 897.
— (Thryophilus), 421.
— (Turnix), 779.
castanonotum (Cinclosoma), 318.
castanonotus (Colius), 91.
— (Eupetes), 319.
— (Hemixus), 315.
castanops (Hyphantornis), 563.
— (Strix), 900.
*castanoptera* (Dendrocincla), 186
castanoptera (Tænioglaux), 897.
castanopterus (Malacias), 324.

Digitized by Google

castanopterus (Passer), 598.
castanotis (Dryonastes), 328.
— (Pteroglossus), 43.
— (Tæniopygia), 580.]
*castanurus* (Campylopterus), 134.
castelnaudi (Aglæactis), 152.
— (Glyphorhynchus), 190.
castelnaui (Picumnus), 83.
*castigatus* (Odontophorus), 822.
castor (Merganser), 1003.
castro (Oceanodroma), 1029.
castus (Monarcha), 290.
*casuarinus* (Bycanistes), 101.
catamene (Loriculus), 23.
*catarrhactes* (Megalestris), 1027.
caterinæ (Saxicola), 390.
catharina (Eriocnemis), 154.
catharoxanthus (Malaconotus), 489, 1103.
cathemagmenus (Pelicinius), 491.
cathœca (Dicrurus), 529.
cathpharius (Picus), 70.
catoleucum (Parisoma), 273.
caucasica (Accentor), 1091.
— (Acredula), 467.
— (Galerida), 458.
— (Sitta), 680.
— (Sturnus), 535.
caucasicus (Tetraogallus), 806.
caudacuta (Chætura), 127.
caudacutus (Ammodromus), 632.
— (Sclerurus), 191.
caudata (Acredula), 466.
— (Argya), 323.
— (Basileuterus), 439
— (Bowdleria), 338.
— (Capsiempis), 237.
— (Chiroxiphia), 222.
— (Coracias), 92.
— (Cyanolesbia), 157.
— (Formicivora), 178.
— (Pica), 506.
— (Pnoepyga), 430.
caudatus (Lamprotornis), 544.
— (Lanius), 484.
— (Pseudotharrhaleus), 335.
— (Ptilogonys), 261.
— (Theristicus), 902.
caudifasciatus (Pitangus), 243.
caumatonota (Aglæactis), 152.
caurensis (Microcerculus), 1096.
— (Phaethornis), 1065.
— (Saucerottea), 1065.
— (Thryothorus), 1095.
caurina (Agelæus), 1106.
— (Melospiza), 633.
caurina (Syrnium), 891.
caurinus (Corvus), 503.
cauta (Diomedea), 1038.
— (Hylacola), 320.
cavendishi (Estrelda), 581.
cavicola (Speotyto), 895.
cayana (Calliste), 666.
— (Cotinga), 216.
— (Dacnis), 687.
— (Euphonia), 673.
— (Piaya), 58.
— (Tityra), 210.
cayanea (Aramides), 963.
cayanensis (Capito), 41.
— (Crecisculus), 972.
— (Myiozetetes), 241.
— (Panyptila), 126.
— (Pendulinus), 556.
cayanus (Cyanocorax), 514.
— (Hoplopterus), 935.
cayelii (Strix), 900.
*cayennensis* (Æchmophorus), 1042.
— (Aramides), 963.
cayennensis (Belonopterus), 935.
— (Formicarius), 1069.
— (Harpiprion), 902.
— (Leptodon), 866.
— (Stenopsis), 121.
caymanensis (Centurus), 69.
— (Chrysotis), 6.
— (Quiscalus), 560.
— (Vireo), 473.
cearensis (Cyclorhis), 476.
cebuensis (Cittocincla), 413.
— (Cryptolopha), 286.
— (Graucalus), 297.
ceciliæ (Eleopicus), 76.
cedrorum (Ampelis), 260.
celæno (Pitylus), 643.
celænops (Merula), 398.
celata (Helminthophaga), 431, 1096.
celebense (Trichostoma), 333.
celebensis (Acrocephalus), 1090.
— (Anthreptes), 704, 1113.
*celebensis* (Artamus), 533.
celebensis (Basileornis), 538.
*celebensis* (Baza), 867.
celebensis (Caprimulgus), 123.
— (Centropus), 57.
— (Chætura), 127.
— (Hypotænidia), 962.
*celebensis* (Lalage), 302.
celebensis (Melilestes), 718.
*celebensis* (Merops), 97.
celebensis (Merula), 398.

Digitized by Google

celebensis (Oriolus), 526.
— (Pernis), 866.
— (Pitta), 209.
— (Rhipidura), 278.
celebicum (Dicæum), 677.
*cenchris* (Tinnunculus), 871.
cenchroides (Astur), 840.
— (Tinnunculus), 871.
centralis (Barbatula), 1055.
— (Chlorocichla), 313.
— (Dendropicus), 1058.
— (Malimbus), 568.
— (Mesopicus), 1059.
cephalomelas (Lanius), 485, 1103.
cephalotes (Myiarchus), 250, 1078.
cepphus (Stercorarius), 1028.
ceramense (Edoliisoma), 298.
ceramensis (Accipiter), 845.
*ceramensis* (Rhectes), 494.
cerinoclunis (Cœreba), 1112.
cerroensis (Thryomanes), 424.
certhia (Dendrocolaptes), 185.
certhiola (Locustella), 370.
cervicalis (Apalis), 353.
— (Cyclopsitta), 33.
— (Garrulus), 510.
— (Œstrelata), 1035.
— (Otidiphaps), 774.
— (Paroaria), 643.
— (Philydor), 194.
cervina (Adelomyia), 155, 1067.
— (Dacelo), 104.
— (Rhipidura), 276.
cervinicauda (Drepanornis), 520.
— (Myiagra), 283.
— (Threnetes), 131.
cerviniceps (Lyncornis), 119.
cervinicrissa (Cutia), 1088.
cervinigularis (Automolus), 195.
— (Phæolæma), 149.
cerviniventris (Amazilia), 138.
*cerviniventris* (Blacicus), 249.
cerviniventris (Chlamydera), 523.
— (Colluricincla), 496.
— (Crypturus), 782.
— (Eminia), 353.
— (Illadopsis), 1087.
— (Leptoptila), 770.
— (Pœcilodryas), 271.
— (Phyllostrophus), 314.
— (Rhectes), 495.
— (Siphia), 292.
— (Stoparola), 291.
cervinus (Acrocephalus), 370.
— (Anthus), 447.
ceterus (Myrmelastes), 1070.
cetti (Cettia), 372.
ceylonensis (Haza), 867.
— (Culicicapa), 282.
— (Dissemurus), 533.
*ceylonensis* (Hypothymis), 274.
ceylonensis (Ketupa), 879.
— (Oriolus), 527.
*ceylonensis* (Spizaëtus), 849.
— (Stoparola), 292.
ceylonensis (Zosterops), 706.
chabert (Artamia), 499.
chacuru (Bucco), 47.
*chalcauchenia* (Leptoptila), 769.
chalcocephalus (Brachypodius), 308.
chalcolophus (Turacus), 89.
chalconota (Amazilia), 138.
— (Carpophaga), 746.
chalconotus (Phalacrocorax), 1008.
chalcoptera (Phaps), 767.
*chalcopterus* (Larus), 1025.
chalcopterus (Pionus), 7.
*chalcopterus* (Plegadis), 903.
chalcopterus (Rhinoptilus), 931.
chalcospilos (Chalcopelia), 766, 1114.
chalcothorax (Galbula), 45.
chalcurus (Lamprocolius), 547.
chalibea (Centropus), 55.
*challayei* (Tetraogallus), 806.
challengeri (Eos), 28.
chalybæus (Lophornis), 165.
chalybea (Argya), 324.
— (Diaphorophyia), 265.
— (Hypophæa), 671.
— (Lamprocorax), 543.
— (Progne), 259.
— (Psalidoprocne), 260.
chalybeata (Manucodia), 518.
chalybeocephalus (Monarcha), 290.
chalybeus (Cinnyris), 699.
— (Lamprocolius), 547.
chalybura (Carpophaga), 744.
*chambanus* (Lophophorus), 798.
chapadensis (Sittasomus), 190.
chapmani (Chordeiles), 118.
— (Crax), 789.
— (Sycalis), 602.
charientura (Thryomanes), 424.
chariessa (Apalis), 353.
charltoni (Arboricola), 814.
charmosyna (Estrelda), 582.
chathamensis (Hemiphaga), 748.
— (Porphyrio), 976.
chavaria (Chauna), 979.
chazaliei (Loxigilla), 614.

Digitized by Google

cheela (Spilornis), 834.
cheeleensis (Calandrella), 453.
chelicuti (Halcyon), 107.
chendoola (Galerida), 458.
cheniana (Mirafra), 455.
cherina (Cisticola), 364.
cheriway (Polyborus), 832.
chermesina (Myzomela), 716.
cherriei (Arbelorhina), 1112.
— (Elaïnea), 240.
— (Myrmotherula), 1070.
— (Nephœcetes), 129.
— (Thripophaga), 1072.
*cherrug* (Hierofalco), 876.
chiapensis (Antrostomus), 1063.
— (Campylorhynchus), 419.
— (Dactylortyx), 821.
— (Guiraca), 612.
chiaradiæ (Athene), 1117.
chicquera (Hypotriorchis), 873.
chiguanco (Turdus), 400.
*chiguancoides* (Turdus), 400.
chii (Anthus), 448.
chilensis (Belonopterus), 935.
— (Cooperastur), 844.
*chilensis* (Creciscus), 971.
chilensis (Cyanocorax), 514.
— (Gallinago), 954.
— (Megalestris), 1027.
— (Phœnicopterus), 908.
— (Zonotrichia), 626.
*chiloensis* (Chloëphaga), 986.
— (Mareca), 992.
chimachima (Milvago), 833.
chimæra (Uratelornis), 92.
chimango (Milvago), 833.
chimborazo (Oreotrochilus), 147.
chimborazensis (Attagis), 780.
*chinensis* (Diomedea), 1038.
chinensis (Dryonastes), 328.
— (Excalfactoria), 816.
— (Francolinus), 808.
*chinensis* (Oriolus), 526.
chinensis (Picumnus), 84.
— (Turtur), 761.
chiniana (Cisticola), 365.
chinquis (Polyplectron), 795.
chionogaster (Accipiter, 846.
— (Leucippus), 135.
chionoptera (Diomedea), 1033.
chionura (Eupherusa), 144.
— (Trogon), 87.
chiricote (Aramides), 963.
chiripepe (Pyrrhura), 13.
*chiriquensis* (Elaïnea), 239.
chiriquensis (Eugenes), 1067.
— (Geothlypis), 437.
— (Geotrygon), 771.
chiroleuca (Gymnocichla), 175.
chirurgus (Hydrophasianus), 957.
chistochlamys (Garrulax), 1086.
chivi (Vireo), 472.
*chlorates* (Zosterops), 706.
chlorepiscia (Myiarchus), 250.
chlorigaster (Oreopsittacus), 1055.
chlorigula (Xenocichla), 310.
chlorion (Piprites), 219.
chloris (Acanthidositta), 206.
— (Anthus), 445.
— (Chlorodrepanis), 692.
— (Halcyon, 109-110.
— (Iole), 312.
— (Ligurinus), 609.
— (Nicator), 493.
— (Piprites), 219.
— (Stigmatops), 718.
— (Zosterops), 709.
chloroauchenia (Leptoptila), 769.
chlorocephala (Chloropsis), 318.
— (Saucerottea), 137.
*chlorocephalus* (Chloronerpes), 65.
chlorocephalus (Oriolus), 528.
chlorocercus (Lorius), 29.
— (Talaphorus), 135.
chlorochlamys (Gallirex), 90.
chlorogaster (Crocopus), 732.
— (Gecinus), 64.
chlorogastra (Anthreptes), 704.
chlorolæma (Eulampis), 146.
— (Momotus), 1061.
chlorolæmus (Chrysolampis), 146.
chlorolepidotus (Trichoglossus), 31.
chlorolophus (Gecinus), 64.
chloromeros (Pipra), 221,
chloronota (Camaroptera), 356.
— (Buthraupis), 663.
— (Chrysotis), 6.
— (Embernagra), 638.
— (Gerygone), 269.
— (Zosterops), 711.
chloronotus (Criniger), 310.
— (Orthotomus), 361.
— (Phrygilus), 640.
*chloronotus* (Phyllobasilens), 378.
— (Zosterops), 706.
chloropetoides (Thamnornis), 362.
chlorophæa (Rhinortha), 59.
chlorophana (Thalurania), 143.
chloropogon (Metallura), 156.
*chloroptera* (Ægithina), 341.



Digitized by Google

chloroptera (Ara), 10.
— (Chalcopsitta), 28.
— (Melanocharis), 676.
— (Myzomela), 715.
— (Osmotreron), 733.
chloropterus (Aprosmictus), 20.
— (Conurus), 12.
— (Lamprocolius), 547.
chloropus (Arboricola), 814.
— (Gallinula), 974.
chloropyga (Cœreba), 691.
chloropygius (Cinnyris), 699.
chlororhyncha (Diomedea), 1039.
chlororhynchus (Centropus), 56.
— (Puffinus), 1031.
chlorospila (Adelomyia), 1067.
chlorotica (Euphonia), 672.
— (Ligurinus), 609.
chlorotis (Anas), 991.
chlorura (Pachycephala), 477.
— (Psalidoprymna), 158.
chlorurus (Attapetes), 636.
cholmleyi (Ammoperdix), 807.
chocolatinus (Bradyornis), 287, 1082.
chopi (Aphobus), 561.
christophori (Pachycephala), 478.
chrysæa (Alcippe), 345.
— (Cyanoderma), 343.
chrysaëtus (Aquila), 851.
chryzæus (Tarsiger), 384.
chrysauchen (Melanerpes), 68.
chryseola (Myiodioctes), 1098.
chrysia (Geotrygon), 771.
chrysocarpa (Agelæus), 553.
chrysocaulosa (Colaptes), 63.
chrysocephalum (Heteropelma), 223.
chrysocephalus (Myiodynastes), 244.
— (Pendulinus), 556.
chrysochlora (Chalcophaps), 766.
chrysochlorus (Chloronerpes), 64.
chrysocnemis (Camaroptera), 1089.
chrysocoma (Barbatula), 37.
chrysocome (Catarrhactes), 1047.
*chrysogaster* (Basileuterus), 439.
chrysogaster (Chlorospingus), 651.
— (Pheucticus), 611.
— (Ptilopus), 737.
chrysogastra (Euphema), 26.
— (Gerygone), 269.
chrysogenys (Arachnothera), 705.
chrysoides (Colaptes), 63.
chrysolæma (Otocorys), 452, 1099.
— (Zosterops), 710.
chrysolaus (Merula), 398.
chrysolophus (Catarrhactes), 1048.
chrysolophus (Dendrocolaptes), 185.
chrysoma (Embernagra), 638.
chrysomelas (Chrysoptilus), 66.
— (Monarcha), 290.
— (Phasianus), 802.
— (Tachyphonus), 656,
— (Trogon), 87.
chrysonotus (Cassicus), 550.
— (Loriculus), 23.
— (Rhamphocœlus), 660.
chrysoparia (Dendroeca), 434.
chrysopasta (Euphonia), 673.
*chrysopelargus* (Balearica), 923.
chrysopepla (Pheucticus), 611.
chrysophrys (Chlorospingus), 651.
— (Conurus), 12.
— (Emberiza), 621.
chrysopis (Thlypopsis), 653.
*chrysopleurus* (Merula), 397.
chrysopogon (Megalæma), 38.
chrysops (Cyanocorax), 513.
— (Cyanoderma), 1088.
— (Ptilotis), 721.
— (Setophaga), 411.
— (Sycalis), 602.
— (Tyranniscus), 239.
chrysopsis (Megalæma), 38.
chrysoptera (Brotogerys), 16.
*chrysoptera* (Diphyllodes), 519.
chrysoptera (Helminthophaga), 431.
— (Neositta), 682.
chrysopterum (Trochalopteron), 321.
chrysopterus (Masius), 220.
— (Rhamphocœlus), 661.
chrysopterygius (Psephotus), 25.
chrysopyga (Barbatula), 37.
chrysopygia (Saxicola), 390.
chrysorama (Eriocnemis), 154.
chrysorrhoa (Acanthiza), 366.
— (Ptilopus), 740.
*chrysorrhœa* (Ptilogonys), 261.
chrysorrhœum (Dicæum), 679.
*chrysorrhoides* (Molpastes), 305.
chrysorrhous (Eopsaltria), 481.
chrysosema (Brotogerys), 16.
chrysotis (Calliste), 668.
— (Ptilotis), 721.
chrystianæ (Hermotimia), 700.
christinæ (Æthopyga), 696.
chubbi (Cisticola), 363.
— (Lamprocolius), 1106.
chukar (Caccabis), 807.
chuni (Turtur), 759.
cia (Emberiza), 623.
cinchoneti (Conopias), 242.

Digitized by Google

*cinchoneti* (Sisopygis), 228.
cincinata (Phalacrocorax), 1008.
cincinnatiensis (Helminthophaga), 431.
cinclorhyncha (Monticola), 393.
*cinclus* (Tringa), 951.
cincta (Cotinga), 216.
— (Cotyle), 257.
— (Poephila), 584.
— (Pogonornis), 722.
cinctura (Ammomanes), 459.
cinctus (Ampelion), 216.
— (Erythrogonys), 933.
— (Microcerculus), 429.
— (Odontophorus), 822.
— (Parus), 463.
— (Ptilopus), 735.
— (Rhinoptilus), 931.
cineracea (Carpophaga), 745.
*cineracea* (Grus), 921.
cineracea (Lophophanes), 465.
— (Myzomela), 716.
— (Nonnula), 48.
*cineracea* (Pyrrhula), 607.
cineracea (Sayornis), 227.
— (Scops), 886.
cineraceum (Trochalopteron), 321.
*cineraceus* (Circus), 836.
— (Dicrurus), 530.
cineraceus (Orthotomus), 361.
— (Philemon), 1113.
— (Spodiopsar), 535.
cinerarius (Circus), 836.
cinerascens (Aplonis), 541.
— (Bubo), 881.
— (Butalis), 262.
— (Cercomacra), 176.
— (Certhidea), 689.
— (Circaëtus), 834.
— (Cisticola), 363.
— (Dendrocitta), 508.
— (Elaïnea), 240, 1076.
— (Fraseria), 497.
— (Gerygone), 268.
— (Laticilla), 350.
*cinerascens* (Monarcha), 289.
cinerascens (Myiarchus), 250.
— (Nothoprocta), 784.
— (Ornithion), 1076.
— (Pachycephala), 480.
— (Parisoma), 1081.
*cinerascens* (Parus), 461.
cinerascens (Synallaxis), 198.
— (Turdus), 399.
cinerea (Alcippe), 345.
— (Amphispiza), 627.
cinerea (Apalis), 353.
— (Ardea), 910.
*cinerea* (Atticora), 258.
cinerea (Batara), 184.
— (Claravis), 764.
*cinerea* (Collocalia), 129.
cinerea (Cracticus), 501.
— (Elaïnea), 240.
— (Emarginata), 391.
— (Emberiza), 622.
— (Estrelda), 581.
— (Gallicrex), 974.
— (Geocichla), 405.
— (Gerygone), 269.
— (Glareola), 930.
— (Glaucopis), 516.
— (Goura), 775, 1115.
*cinerea* (Grus), 921.
cinerea (Lathria), 213.
— (Melospiza), 633.
— (Minla), 344.
— (Muscisaxicola), 230.
— (Muscitrea), 1080.
*cinerea* (Muscylva), 270.
cinerea (Myiadectes), 407.
— (Perdix), 812.
— (Piezorhina), 614.
*cinerea* (Pœcilodryas), 271.
cinerea (Poospiza), 628.
— (Porzana), 968.
— (Ptilotis), 722.
— (Rhipidura), 279.
— (Scotiaptex), 892.
— (Serphophaga), 236.
— (Struthidea), 515.
— (Sylvia), 374.
— (Tephrocorys), 454.
— (Terekia), 948.
— (Thryophilus), 422.
— (Zosterops), 713.
cinereicapilla (Phyllomyias), 238.
— (Rhinomyias), 282.
cinereicapillus (Colaptes), 63.
— (Spizixus), 304.
cinereicauda (Chætura), 128.
— (Oreopyra), 148.
cinereiceps (Anuropsis), 333.
— (Creciscus), 971.
— (Fulvetta), 346.
— (Gerygone), 269.
— (Gymnobucco), 37.
*cinereiceps* (Hemichelidon), 262.
cinereiceps (Ianthocincla), 323, 1086.
— (Iole), 312.
— (Macropygia), 755.

Digitized by Google

cinereiceps (Ortalida), 793.
— (Orthotomus), 361.
— (Oxylabes), 338.
— (Phabotreron), 734.
— (Rhynchocyclus), 242.
— (Thamnophilus), 183.
— (Tyranniscus), 239.
cinereicollis (Basileuterus), 439.
— (Phyllergates), 362.
cinereifrons (Elaïnea), 240.
— (Garrulax), 328.
— (Heteromyias), 271.
— (Lædorusa), 306.
cinereigula (Pericrocotus), 301.
cinereigulare (Dicæum), 679.
— (Oncostoma), 232.
cinereinucha (Thamnophilus), 183.
cinereiventris (Brachypodius), 308.
— (Chætura), 128.
— (Myrmotherula), 179.
— (Pachyrhamphus), 212.
— (Rhamphocænus), 176.
*cinereocapilla* (Culicicapa), 282.
cinereocapilla (Motacilla), 444.
— (Prinia), 359.
cinereocephalus (Chlorospingus), 651.
cinereogenys (Oriolus), 527.
*cinereola* (Butalis), 262.
cinereola (Cisticola), 363.
cinereo-niger (Thamnophilus), 183.
cinereovinacea (Estrelda), 582.
cinereum (Conirostrum), 687.
— (Malacopteron), 337.
— (Todirostrum), 231.
cinereus (Acridotheres), 538.
— (Anous), 1019.
*cinereus* (Anser), 982.
cinereus (Artamus), 534.
— (Attila), 214.
— (Calamonastes), 352.
— (Circaëtus), 833.
— (Circus), 836.
— (Cnipolegus), 229.
— (Coccyzus), 54.
— (Creciscus), 971.
— (Crypturus), 782.
— (Graucalus), 296.
— (Harporhynchus), 417.
— (Hemixus), 315.
— (Junco), 629.
*cinereus* (Larus), 1025.
cinereus (Leucospiza), 841.
— (Lobivanellus), 934.
— (Myiochanes), 249.
— (Odontorhynchus), 421.
cinereus (Pachyrhamphus), 212.
— (Parus), 461.
— (Pericrocotus), 302.
*cinereus* (Phalaropus), 957.
cinereus (Priofinus), 1032.
— (Pseudotantalus), 905.
— (Ptilogonys), 261.
*cinereus* (Puffinus), 1031.
cinereus (Tachyeres), 998.
cineritia (Empidonax), 248.
cingulata (Urochroma), 8.
cinnamomea (Amazilia), 138.
— (Ardetta), 914.
— (Macropygia), 754.
— (Myrmeciza), 174.
— (Neopipo), 221.
— (Rhipidura), 278, 1081.
— (Spermophila), 615.
— (Synallaxis), 198.
— (Zeocephus), 280.
cinnamomeiventris (Ochthoeca), 226.
— (Thamnolæa), 392.
— (Sitta), 681.
cinnamomeum (Cinclosoma), 318.
— (Trochalopteron), 322.
*cinnamomeus* (Anthus), 447.
cinnamomeus (Attila), 214.
— (Bradypterus), 350.
— (Crypturus), 784.
— (Drymocataphus), 1087.
— (Furnarius), 204.
— (Myiobius), 245.
— (Pachyrhamphus), 212.
— (Passer), 598.
— (Picumnus), 83.
*cinnamomeus* (Sarothrura), 969.
cinnamomeus (Xiphocolaptes), 188.
cinnamomina (Tinnunculus), 871.
cinnamominus (Halcyon), 108.
cioides (Emberiza), 623.
ciopsis (Emberiza), 623.
circia (Querquedula), 992.
circumcincta (Ægialitis), 941.
circumcinctus (Spiziapteryx), 869.
ciris (Cyanospiza), 626.
cirlus (Emberiza), 622.
cirrhata (Lunda), 1046.
*cirrhatus* (Phalacrocorax), 1009.
cirrhatus (Picumnus), 83.
— (Spizaëtus), 849.
*cirrhatus* (Thamnophilus), 182.
cirrhocephalus (Accipiter), 845.
— (Larus), 1022.
— (Rhectes), 494.
cirrhochloris (Aphantochroa), 134.

Digitized by Google

cirris (Picus), 72.
cisandina (Siptornis), 199.
cissa (Picus), 70.
citerior (Pytelia), 578.
citrea (Protonotaria), 432.
citreogularis (Philemon), 726.
— (Sericornis), 366.
citreola (Motacilla), 444.
citreolæmus (Rhamphastos), 42.
citreoloides (Motacilla), 444.
citreolus (Trogon), 87.
citreopygia (Celeus), 79.
citreopygius (Attila), 214.
citrina (Geocichla), 405.
— (Pseudochloris), 639.
citrinella (Chrysomitris), 593.
— (Emberiza), 622.
— (Zosterops), 707.
citrinelloides (Chrysomitris), 593.
citrinellus (Pipilopsis), 649.
citriniceps (Eremomela), 356.
citrinifrons (Catamblyrhynchus), 618.
— (Ochthœca), 226.
citriniventris (Attila), 214.
citrinocapillus (Poicephalus), 9.
citrinocristata (Cacatua), 2.
citrinocristatus (Gecinus), 1057.
*clamans* (Camaroptera), 356.
clamans (Spiloptila), 362.
— (Xenocichla), 309.
clamator (Asio), 878.
clamosa (Atrichia), 729.
clamosus (Cuculus), 51.
*clanga* (Aquila), 852.
clappertoni (Francolinus), 809.
clara (Basileuterus), 1098.
— (Caprimulgus), 124.
— (Catharus), 394, 1092.
— (Rhectes), 495.
— (Troglodytes), 1096.
*clara* (Zosterops), 711.
claræ (Arachnothera), 705.
— (Sylvia), 1090.
clarescens (Bathilda), 585.
clarionensis (Corvus), 1104.
— (Zenaidura), 757.
clarissæ (Heliangelus), 155.
clathratus (Trogon), 87.
claudei (Lioptilus), 1081.
claudiæ (Heliangelus), 155.
cleaveri (Alethe), 411.
clementæ (Melospiza), 633.
— (Pipilo), 637.
clementeæ (Amphispiza), 627.
clementiæ (Coeligena), 148.
clementis (Carpodacus), 604.
cleonensis (Melospiza), 1110.
clericalis (Pentholæa), 392.
climacocercus (Hydropsalis), 120.
climacura (Fluvicola), 228.
climacurus (Scotornis), 120, 1063.
clio (Pachycephala), 477.
clot-bey (Rhamphocorys), 451.
clypeata (Spatula), 995.
*coalei* (Myiarchus), 1078.
cobaltina (Pionus), 6.
cobanensis (Glaucidium), 896.
*cobanensis* (Vireo), 472.
coburni (Turdus), 1093.
*coccinea* (Ara), 10.
coccinea (Cardinalis), 619.
— (Loxops), 594.
— (Myzomela), 716.
— (Pitta), 1073.
*coccinea* (Pyranga), 658.
coccinea (Pyrenestes), 576.
*coccinea* (Pyrrhula), 607.
coccinea (Vestiaria), 692.
coccineicollaris (Pionopsitta), 7.
coccineifrons (Cicinnurus), 519.
*coccineifrons* (Cyclopsitta), 33.
coccineifrons (Trichoglossus), 31.
*coccineipes* (Amaurornis), 972.
coccineoptera (Ptistes), 20.
*coccineum* (Dicæum), 676.
coccineus (Calochætes), 659.
cochinchinensis (Chætura), 127.
*cochinchinensis* (Chloropsis), 318.
*cochlearia* (*Cancroma*), 920.
cockburniæ (Anthus), 446.
cockerelli (Philemon), 726.
— (Ptilotis), 721.
— (Rhipidura), 279.
cocoi (Ardea), 910.
cœlestis (Cyanolesbia), 157.
*cœlestis* (Gallinago), 953.
cœlestis (Hypothymis), 274.
— (Psittacula), 15.
— (Tanagra), 661.
cœlicolor (Calliste), 665.
— (Grandala), 386.
cœligena (Lampropygia), 152.
cœlivox (Alauda), 455.
cœrebicolor (Dacnis), 687.
coibæ (Cyclorhis), 1102.
*colardeaui* (Chætura), 128.
colchicus (Phasianus), 801.
colensoi (Phalacrocorax), 1009.
*colimæ* (Aphelocoma), 512.
*colius* (Colius), 91.

Digitized by Google

collaria (Chrysotis), 6.
— (Spermophila), 616.
collaris (Accentor), 381, 1091.
— (Accipiter), 845.
— (Anthreptes), 704.
— (Ægialitis), 940.
— (Bucco), 46.
— (Colæus), 505.
— (Colaptes), 1057.
— (Fuligula), 998.
*collaris* (Grus), 922.
collaris (Hyphantornis), 563.
— (Lanius), 484.
— (Leptoptila), 770.
*collaris* (Melidora), 105.
— (Melirrhophetes), 728.
— (Minla), 344.
collaris (Mirafra), 455.
— (Muscicapa), 263.
— (Pachycephala), 478.
— (Rhamphocænus), 177.
*collaris* (Thamnolæa), 392.
collaris (Trogon), 86.
collectoris (Ceyx), 1062.
colletti (Spodiopsar), 535.
colliei (Calocitta), 509.
collurio (Enneoctonus), 486.
*collurioceps* (Chætornis), 352.
collurioides (Enneoctonus), 487.
colma (Formicarius), 171.
colombiana (Porzana), 969.
colona (Halcyon), 109.
— (Myiagra), 283.
colonus (Buteo), 857.
— (Copurus), 229.
— (Rhinomyias), 282.
colorata (Calcarius), 625.
colubris (Trochilus), 162.
columba (Fulmarus), 1036.
— (Uria), 1044.
columbarius (Hypotriorchis), 874.
columbiæ (Troglodytes), 425.
columbiana (Chamæza), 171.
— (Chrysomitris), 592.
— (Cœreba), 690.
— (Lampropygia), 152.
— (Merganetta), 1002.
— (Nucifraga), 506.
— (Parus), 464.
— (Pediœcetes), 824.
— (Spermophila), 615.
— (Sycalis), 601.
— (Turdus), 1093.
columbianus (Crypturus), 781.
— (Cygnus), 986.
columbianus (Odontophorus), 822.
— (Philydor), 193.
*columbianus* (Theristicus), 902.
columbica (Thalurania), 143.
columbina (Bulweria), 1036.
columboides (Palæornis), 19.
comata (Macropteryx), 130.
— (Merganser), 1003.
— (Pipra), 221.
comatus (Anorrhinus), 102.
— (Cnipolegus), 228.
— (Geronticus), 901.
comeri (Porphyriornis), 973.
comice (Dicrurus), 531.
comitata (Alseonax), 264.
commixta (Parus), 461.
communis (Coturnix), 815.
*communis* (Falco), 874.
communis (Grus), 921.
— (Turtur), 758.
commutata (Monarcha), 289, 1083.
comorensis (Artamia), 499.
— (Cinnyris), 698.
— (Coracopsis), 4.
— (Terpsiphone), 280.
— (Turdus), 400.
— (Turtur), 759.
— (Zosterops), 706.
complexa (Pipilo), 637.
*comptus* (Chlorostilbon), 141.
comptus (Pipilopsis), 619.
compressirostris (Colluricincla), 496.
— (Xiphocolaptes), 188, 1071
compressus (Picolaptes), 187.
compsonota (Geocichla), 404.
comrii (Manucodia), 518.
concinna (Acredula), 466.
— (Carpophaga), 744.
— (Euphonia), 672.
— (Glossopsitta), 31.
*concinna* (Graucalus), 296.
concinna (Myiagra), 283.
— (Pitta), 207.
— (Rhipidura), 279.
*concinnens* (Acrocephalus), 1090.
concolor (Amaurospiza), 619.
— (Amblyospiza), 570.
— (Arachnothera), 705.
— (Camaroptera), 356.
— (Cotyle), 257.
— (Dendrocolaptes), 185.
— (Dicæum), 679.
*concolor* (Dissodectes), 869.
concolor (Hypotriorchis), 872.
— (Hypsipetes), 316.

Digitized by Google

concolor (Fenthetria), 573.
— (Porzana), 968.
— (Progne), 259.
— (Schizorhis), 90.
— (Xenospingus), 641.
concreta (Diaphorophyia), 265.
concreta (Guiraca), 612.
— (Siphia), 292.
concretus (Caprimulgus), 124.
— (Cuculus), 1056.
— (Halcyon), 110.
— (Hemicercus), 81.
condaminei (Eutoxeres), 133.
confinis (Oreortyx), 819.
— (Poocætes), 630.
— (Turdus), 401.
congener (Andropadus), 313.
congica (Camaroptera), 357.
— (Cotyle), 257.
— (Lagonosticta), 577.
— (Pogonorhynchus), 36.
*congicus* (Campothera), 66.
conirostris (Embernagra), 638.
— (Geospiza), 608.
— (Indicator), 34.
— (Spizocorys), 454
connectens (Hemixus), 315.
— (Junco), 629.
— (Rhamphocœlus), 660.
connivens (Ninox), 888.
conradi (Bourcieria), 151.
— (Criniger), 1085.
— (Turdus), 400.
consanguinea (Analcipus), 528.
consobrina (Ægithalus), 467.
— (Carpophaga), 744.
— (Formicivora), 178.
— (Hypothymis), 1081.
— (Oriolus), 527.
— (Phaethornis), 132.
— (Pipilo), 637.
*consobrinus* (Foudia), 566.
consobrinus (Mecocerculus), 227.
*consobrinus* (Odontophorus), 822.
consobrinus (Philydor), 193.
conspersa (Catherpes), 428.
conspicillata (Gerygone), 269.
— (Majaqueus), 1033.
— (Psittacula), 15.
— (Suthora), 471.
— (Sylvia), 375.
— (Zosterops), 711.
conspicillatus (Basileuterus), 439, 1098.
— (Pelecanus), 1006.
*conspicuus* (*Myiagroides*), 284.
constanti (Floricola), 160, 1068.
constantia (Hapaloderma), 57.
contempta (Pachycephala), 477.
— (Strix), 899.
— (Turdus), 1093.
*continentalis* (Ceryle), 1062.
contra (Sturnopastor), 536.
contrerasi (Cyclorhis), 476.
conversi (Prymnacantha), 165, 1068.
convexus (Anthracoceros), 100.
cooki (Cyanopica), 507.
— (Cyanorhamphus), 26.
— (Estrelata), 1035.
cooperi (Buteo), 856.
— (Cooperastur), 844.
— (Melospiza), 633.
— (Pyranga), 658.
— (Scops), 886.
coppingeri (Turtur), 759.
coquereli (Coua), 60.
— (Cinnyris), 698.
coqui (Francolinus), 808.
coquimbica (Nothoprocta), 784.
cora (Thaumastura), 160.
coracina (Pipra), 221.
coracinus (Myiadectes), 407, 1094.
— (Phrygilus), 640.
coralensis (Ptilopus), 737.
corallina (Calospiza), 1111.
corallinus (Pionus), 6.
corallipes (Dendrophila), 682.
corallirostris (Hypositta), 683.
corax (Corvus), 502.
coraya (Thryothorus), 423.
cordata (Hemicercus), 81.
cordofanica (Mirafra), 455.
coreensis (Galerida), 458.
corinnæ (Hermotimia), 700.
*cornelia* (Hermotimia), 700.
corneliæ (Eclectus), 16.
corniculata (Fratercula), 1046.
corniculatus (Tropidorhynchus), 725.
cornix (Corvus), 503.
— (Graucalus), 1084.
cornuta (Ceratopipra), 220.
— (Fulica), 977.
*cornuta* (Numida), 804.
cornuta (Nyctibius), 118.
*cornuta* (Otocorys), 452.
cornuta (Palamedea), 979.
— (Tadorna), 988.
cornutus (Heliactin), 159.
— (Nymphicus), 26.
*cornutus* (Podicipes), 1041.
*coromandeliana* (Anastomus), 906.

Digitized by Google

coromandelianus (Nettopus), 981.
coromandelica (Coturnix), 815.
coromandelicus (Cursorius), 931.
coromandus (Bubo), 881.
— (Bubulcus), 913.
— (Coccystes), 49.
— (Halcyon), 106.
coronatorum (Melospiza), 1110.
coronata (Acanthopneuste), 377.
— (Ægithalus), 467.
— (Chiromachæris), 222.
— (Cyanocitta), 511.
— (Dendroeca), 435, 1097.
— (Goura), 775.
— (Ifrita), 319.
— (Macropteryx), 130.
— (Numida), 804.
*coronata* (Pyrocephalus), 246.
coronata (Tænioptera), 225.
— (Thamnolæa), 1092.
— (Todopsis), 275.
— (Zeledonia), 167.
— (Zonotrichia), 625.
coronatus (Ampeliceps), 540.
— (Anthracoceros), 100.
— (Basileuterus), 439.
— (Harpyhaliaëtus), 861.
— (Malurus), 368.
*coronatus* (Oriolus), 526.
coronatus (Phyllergates), 362
— (Platylophus), 510.
— (Platyrhynchus), 231.
— (Pterocles), 777.
— (Spizaëtus), 848.
— (Stephanibyx), 936.
— (Tachyphonus), 656.
corone (Corvus), 503.
coronoides (Corvus), 503.
coronulata (Masius), 220.
coronulatus (Ptilopus), 738.
correndera (Anthus), 448.
corrugatus (Cranorrhinus), 100.
corsa (Parus), 1100.
corsica (Emberiza), 622.
*cortapau* (Antrostomus), 122.
coruscans (Neodrepanis), 694.
— (Petasophora), 145.
corvina (Corvinella), 482.
— (Megalæma), 38.
— (Spermophila), 617.
— (Terpsiphone), 281.
corvinus (Lamprocorax), 543.
— (Myrmelastes), 181.
*corydon* (Corydon), 205.
coryi (Geothlypis), 437.
coryi (Loxigilla), 614.
— (Phonipara), 618.
— (Rallus), 960.
— (Schizœaca), 201.
coryphæa (Aedonopsis), 412.
— (Barbatula), 38.
corythaix (Basileornis), 538.
— (Turacus), 89.
*coscoroba* (Coscoroba), 987.
costæ (Calypte), 163.
costaricensis (Buteo), 856.
— (Campylorhynchus), 420.
— (Catharus), 1092.
— (Geotrygon), 771.
*costaricensis* (Grallaricula), 169.
costaricensis (Malacoptila), 48.
*costaricensis* (Pharomacrus), 85.
costaricensis (Rhamphocœlus), 660.
— (Thryophilus), 422.
— (Xiphocolaptes), 1071.
cotta (Elainea), 240.
coturniculus (Crecisculs), 971.
couesi (Campylorhynchus), 420, 1095.
— (Chaulelasmus), 991.
— (Tringa), 951.
couloni (Ara), 10.
cowani (Cotyle), 257.
coxeni (Cyclopsitta), 33.
coyolcos (Colinus), 821.
cozumelæ (Attila), 214.
— (Pendulinus), 1106.
— (Pyranga), 1111.
craddocki (Suthora), 1101.
cranchi (Pternistes), 811.
*crassa* (*Corythocichla*), 332.
crassa (Poicephalus), 9.
*crassirostris* (Ælurœdus), 522.
crassirostris (Arachnothera), 705.
— (Buarremon), 648.
— (Calendula), 458.
— (Chætusia), 936.
*crassirostris* (Charadrius), 937.
crassirostris (Chrysococcyx), 53.
— (Corvultur), 502.
— (Coryphœnas), 756.
— (Dendrocolaptes), 185.
— (Embernagra), 638.
— (Eurystomus), 93.
— (Geositta), 204.
— (Geospiza), 609.
— (Hierococcyx), 50.
— (Ixocincla), 316.
— (Larus), 1023.
— (Nyctlcorax), 918.
— (Oriolus), 527.

Digitized by Google

crassirostris (Oryzoborus), 613.
— (Pitta), 208.
— (Pseudozosterops), 713.
— (Psittacula), 15.
— (Rallus), 959.
— (Rhamphocharis), 676.
— (Tringa), 951.
— (Turnagra), 329.
— (Tyrannus), 252.
— (Vinago), 732.
— (Vireo), 473.
— (Xiphocolaptes), 188.
crassus (Lamprocorax), 542.
— (Lanioturdinus), 332.
cratitia (Ptilotis), 721.
craveri (Endomychura), 1044.
crawshayi (Francolinus), 809.
creatopus (Puffinus), 1031.
crecca (Querquedula), 992.
*creccoides* (Querquedula), 993.
crenatus (Anthus), 445.
crepera (Cercomacra), 1069.
*crepidatus* (Stercorarius), 1028.
*crepitans* (Œdicnemus), 927.
crepitans (Psophia), 923.
— (Psophodes), 320.
— (Rallus), 959.
crinifrons (Aegotheles), 116.
criniger (Tricholestes), 315.
crinigera (Irena), 317.
— (Phlogœnas), 772.
— (Suya), 358.
crinitus (Myiarchus), 250.
crispifrons (Gypsophila), 338.
crispus (Pelecanus), 1005.
crissalis (Columba), 751.
— (Formicarius), 172.
— (Graucalus), 297.
— (Harporhynchus), 417.
— (Helminthophaga), 432.
— (Loxigilla), 613.
— (Pheucticus), 612.
— (Pipilo), 637.
— (Sterna), 1017.
— (Strepera), 501.
— (Zosterops), 708.
crissoleuca (Tridactylia), 73.
cristata (Anas), 991.
— (Calyptura), 218.
— (Cariama), 924.
— (Chauna), 979.
— (Corythæola), 90.
— (Corythornis), 113.
— (Coua), 60.
— (Cyanocitta), 511.
cristata (Elaïnea), 240, 1076.
— (Eucometis), 655.
— (Fulica), 977.
— (Fuligula), 998.
— (Galerida), 457.
*cristata* (Gallicrex), 974.
cristata (Geotrygon), 771.
— (Gubernatrix), 620.
— (Guttera), 805.
— (Lophostrix), 886.
— (Lophotibis), 902.
— (Oreoica), 482.
— (Penelope), 791.
*cristata* (Pernis), 865.
cristata (Phœnicothraupis), 657.
— (Phyllomyias), 238, 1076.
— (Pithys), 173.
— (Terpsiphone), 280.
cristatellus (Acridotheres), 538.
— (Coryphospingus), 642.
*cristatellus* (Serphophaga), 235.
cristatellus (Simorhynchus), 1045.
cristatum (Sphenostoma), 469.
cristatus (Bycanistes), 101.
*cristatus* (Cacatua), 2.
cristatus (Chrysoptilus), 66.
— (Enneoctonus), 485.
— (Eupsychortyx), 819.
— (Furnarius), 203.
— (Homorus), 195.
*cristatus* (Hydralector), 958.
cristatus (Lophophanes), 465.
— (Malimbus), 568.
*cristatus* (Merganser), 1003.
— (Opisthocomus), 794.
cristatus (Orthorhynchus), 164.
*cristatus* (Ostinops), 550.
cristatus (Pavo), 794.
*cristatus* (Phalacrocorax), 1008.
cristatus (Podicipes), 1041.
— (Prionops), 497.
— (Regulus), 379.
— (Rhectes), 495.
*cristatus* (Rollulus), 815.
cristatus (Tachyphonus), 656.
— (Thamnophilus), 182.
*cristatus* (Tyranniscus), 239.
— (Vanellus), 936.
crocea (Ephthianura), 376.
— (Rupicola), 215.
croceus (Macronyx), 449.
*croceus* (Pericrocotus), 301.
croconotus (Heterhyphantes), 565.
— (Icterus), 558.
crocopygius (Serinus), 600.



Digitized by Google

crossleyi (Atelornis), 92.
— (Geocichla), 401.
— (Mystacornis), 314.
crotopezus (Turdus), 401.
crozettensis (Chionarchus), 780.
*cruciger* (Pyrrhulauda), 459.
crudigularis (Arboricola), 813.
cruenta (Querula), 218.
— (Urospizias), 843.
cruentata (Chalcomitra), 701
— (Myzomela), 716.
— (Pyrrhura), 13.
cruentatum (Dicæum), 676.
cruentatus (Melanerpes), 68.
*cruentatus* (Picus), 70.
*cruentus* (Analcipus), 528.
cruentus (Ithagenes), 796.
— (Malaconotus), 489, 1103.
— (Pelicinius), 491.
— (Rhodospingus), 642.
crumeniferus (Leptoptilus), 907.
cruralis (Brachypteryx), 342.
— (Cinclorhamphus), 361.
cruziana (Columbigallina), 764.
crypta (Thryomanes), 424.
crypterythra (Myiobius), 246.
cryptoleuca (Myrmecocichla), 391.
— (Progne), 1079.
*cryptoleucura* (Oceanodroma), 1029.
cryptoleucus (Corvus), 502.
cryptolopha (Lathria), 213.
cryptopyrrha (Pœoptera), 546.
cryptopyrrhus (Turdus), 400.
cryptoxanthus (Myiobius), 246.
*cryptoxanthus* (Poicephalus), 9.
crysocrotaphum (Todirostrum), 231.
cubana (Rallus), 950.
cubanensis (Antrostomus), 122.
— (Colinus), 820.
*cubicularis* (Palæornis), 19.
cubla (Dryoscopus), 492.
cucullata (Ægialitis), 941.
— (Buthraupis), 663.
— (Calliste), 666.
— (Chrysomitris), 593.
— (Crypsirhina), 508.
— (Cyanolyca), 513.
— (Geothlypis), 437.
— (Grallaricula), 169.
— (Hirundo), 254.
*cucullata* (Nycticorax), 917.
cucullata (Paroaria), 642.
— (Pitta), 208.
— (Spermestes), 576.
*cucullata* (Spermophila), 616.
cucullatus (Ampelion), 215.
— (Andigena), 43.
— (Coryphospingus), 642.
— (Graucalus), 296.
— (Hyphantornis), 563.
— (Lobivanellus), 934.
— (Lophodytes), 1003.
— (Pendulinus), 557.
— (Phyllergates), 362.
cuculoides (Astur), 841.
— (Baza), 867.
— (Tænioglaux), 898.
culcui (Zosterops), 709.
cujubi (Cumana), 794.
culicivora (Gerygone), 269.
culicivorus (Basileuterus), 439.
culminata (Diomedea), 1038.
— (Lalage), 303.
culminatus (Corvus), 503.
— (Rhamphastos), 42
*cumanensis* (Cumana), 793.
cumanensis (Grallaricula), 1068.
cumingi (Lepidogrammus), 60.
— (Megapodius), 786.
cummingi (Saxicola), 389
cunctata (Macropygia), 755.
cuneata (Geopelia), 762.
— (Oreocincla), 403
cuneatus (Glyphorhynchus), 190.
— (Puffinus), 1031.
cuneicaudata (Strepera), 501.
cunicularia (Geositta), 204.
— (Speotyto), 895.
cupido (Tympanuchus), 824.
cuprea (Carpophaga), 746.
cupreicauda (Saucerottea), 137.
cupreicaudus (Centropus), 57.
— (Lamprocolius), 547.
cupreiceps (Eupherusa), 144.
cupreipennis (Aglæactis), 152, 1067.
cupreiventris (Eriocnemis), 154.
cupreonitens (Nectarinia), 694.
cupreus (Cinnyris), 697.
— (Chrysococcyx), 53
*curasoensis* (Pendulinus), 558.
*curonicus* (Ægialitis), 939.
curruca (Sylvia), 374.
cursitans (Cisticola), 364.
cursor (Coua), 60.
curtata (Siptornis), 199.
curvipennis (Sphenoproctus), 133.
curvirostra (Loxia), 605.
curvirostris (Andropadus), 313.
— (Campylorhynchus), 420.
— (Harporhynchus), 417.

Digitized by Google

curvirostris (Limnophyes), 196.
— (Nothoprocta), 785.
— (Rhamphococcyx), 59.
— (Vanga), 499.
cuvieri (Aphantochroa), 134.
— (Gennæus), 800.
— (Hypotriorchis), 872.
— (Rhamphastos), 42.
— (Rougetius), 965.
— (Talegallus), 788.
cyana (Monticola), 393.
— (Cyanopica), 507.
— (Pœcilodryas), 271.
cyanauchen (Lorius), 29.
cyanea (Arbelorhina), 689.
— (Cyanospiza), 626.
— (Eucichla), 209.
— (Guiraca), 612.
— (Hylocharis), 140, 1066.
— (Irena), 317.
— (Larvivora), 383.
*cyanea* (*Muscitrea*), 292.
cyanea (Platystira), 266.
*cyaneiceps* (Prioniturus), 17.
cyaneicollis (Agyrtria), 136.
— (Calliste), 668.
— (Galbula), 45.
cyaneifrons (Erythrura), 584.
cyaneiventris (Calliste), 665.
*cyanella* (Porphyrospiza), 627.
cyaneocapilla (Pipra), 221.
cyaneoviridis (Tachycineta), 256.
cyanescens (Calliste), 667.
— (Cinnyris), 698.
— (Guiraca), 612.
*cyanescens* (Halcyon), 107.
cyanescens (Zeocephus), 280.
cyaneum (Conirostrum), 686.
cyaneus (Circus), 835.
— (Myiophoneus), 408.
— (Malurus), 367.
— (Parus), 464.
cyanicarpus (Geoffroyus), 1054.
cyaniceps (Rhipidura), 278.
cyanicollis (Geoffroyus), 17.
cyanicterus (Orthogonys), 658.
cyanifrons (Saucerottea), 137.
cyanipectus (Sternoclyta), 148.
*cyanirostris* (Ardea), 911.
cyanirostris (Cnipolegus), 229.
cyaniventris (Halcyon), 107.
— (Ixidia), 308, 1085.
— (Oligura), 343.
cyanocampter (Cossypha), 409.
cyanocephala (Calospiza), 1111.
cyanocephala (Cyanomyia), 138.
— (Eudynamis), 54.
— (Palæornis), 19.
— (Starnœnas), 774.
— (Tanagra), 662.
— (Todopsis), 275.
— (Gymnokitta), 515.
*cyanocephalum* (Syrigma), 917.
cyanocephalus (Monachalcyon), 105
— (Nycticorax), 917.
— (Scolecophagus), 559
— (Uræginthus), 582.
cyanochlamys (Malurus), 367.
*cyanodorsalis* (*Euphonia*), 671.
cyanodorsalis (Xanthoura), 514
cyanogastra (Coracias), 93.
— (Irena), 317.
— (Triclaria), 7.
*cyanogastra* (Uræginthus), 582.
cyanogenys (Chlorestes), 140.
— (Eos), 28.
cyanogrammus (Trichoglossus), 30.
cyanoides (Guiraca), 612.
cyanolæma (Cyanomitra), 702.
cyanolæmus (Aulacorhamphus), 44.
— (Oxypogon), 159.
cyanoleuca (Atticora), 258.
— (Halcyon), 107.
— (Uroleuca), 515.
cyanolysea (Conurus), 11.
cyanomelas (Cyanocorax), 514.
— (Rhinopomastus), 98.
— (Tanagrella), 670.
— (Trochocercus), 275.
cyanomelæna (Cyanoptila), 272.
cyanonota (Buthraupis), 663.
— (Geocichla), 405.
— (Pitta), 209.
cyanonotum (Dicæum), 679.
cyanopectus (Ceyx), 112.
*cyanopectus* (Chenorhamphus), 275.
*cyanophrys* (Dacelo), 105.
cyanophrys (Merops), 97.
— (Suthora), 471.
cyanopis (Oxypelia), 764.
cyanopogon (Chloropsis), 318.
— (Cyanocorax), 514.
cyanops (Sula), 1011.
cyanopsis (Poecilodryas), 1080.
cyanoptera (Calliste), 669.
— (Compsocoma), 663.
— (Pitta), 207.
— (Querquedula), 992.
— (Tanagra), 662.
cyanopterus (Cyanochen), 986.

Digitized by Google

*cyanopterus* (Pyrrhura), 13.
cyanopus (Agelæus), 553.
— (Numenius), 944.
cyanopygia (Calliste), 668.
— (Psittacula), 15, 1053.
cyanopygius (Aprosmictus), 20.
cyanosticta (Melittophagus), 96, 1061.
cyanostigma (Corythornis), 113.
cyanotis (Aphelocoma), 512.
— (Calliste), 668.
— (Cittura), 105.
— (Entomyza), 725.
— (Petasophora), 145.
— (Xantholäema), 40.
cyanovirens (Erythrura), 583.
cyanura (Cyanorhamphus), 26.
— (Eucichla), 209.
— (Saucerottea), 138.
cyanuroptera (Siva), 347.
cyanurus (Tarsiger), 384.
cygnoides (Cygnopsis), 984.
cylindricus (Bycanistes), 101.
cyornithopsis (Callene), 1094.
*cypereti* (Rallus), 959.
cypria (Scops), 1117.
cypriotes (Anorthura), 1096.
— (Parus), 462.
cyrenaica (Galerida), 1099.
dabryi (Æthopyga), 696.
dacoliæ (Pratincola), 387.
*dactylisonans* (Coturnix), 815.
daflaensis (Actinodura), 331.
daggetti (Sphyropicus), 1058.
daguæ (Turdus), 401.
dahlii (Pachycephala), 476, 1102.
dahli (Rhipidura), 279.
dalhousiæ (Psarisomus), 205.
*damacensis* (Tringa), 951.
damascena (Perdix), 812.
damarensis (Alophius), 104.
— (Chalcomitra), 701.
— (Chlorodyta), 354.
— (Colius), 1060.
— (Estrelda), 1108.
— (Irrisor), 1061.
— (Mirafra), 456.
— (Parus), 1100.
— (Passer), 1109.
— (Poicephalus), 9.
— (Turtur), 760.
damii (Xenopirostris), 499.
dammeriana (Halcyon), 1062.
— (Pachycephala), 476.
dampieri (Urospizias), 842.
danæ (Tanysiptera), 105.
danfordi (Picus), 72.
dannefaerdi (Miro), 270.
daphanea (Aquila), 851.
daphne (Chlorostilbon), 141.
darnaudi (Trachyphonus), 41.
darwini (Enneoctonus), 1103.
— (Geospiza), 608, 1110.
— (Nothura), 785.
— (Pucrasia), 801.
— (Rhea), 1052.
— (Tanagra), 662.
— (Upocerthia), 1073.
dasypus (Chelidon), 256.
daubentoni (Crax), 790.
daulias (Microcerculus), 430.
dauma (Oreocincla), 403.
daurica (Anorthura), 427, 1096.
— (Hirundo), 255.
— (Perdix), 812.
*daurica* (Sturnia), 537.
dauricus (Colæus), 505.
davidi (Alcippe), 345.
— (Calliope), 383.
— (Cyanoderma), 1088.
— (Cygnus), 986.
*davidii* (Lusciniola), 371.
davidi (Parus), 463.
— (Pterorhinus), 320.
— (Syrnium), 890.
davidiana (Montifringilla), 595.
*davidiana* (Pucrasia), 801.
davidiana (Suthora), 471.
davisoni (Acanthopneuste), 377.
— (Crocopsis), 307.
— (Cryptolopha), 286, 1082.
— (Gennæus), 800, 1115.
— (Geocichla), 405.
*davisoni* (Gigantipitta), 207.
davisoni (Halcyon), 110.
— (Hemixus), 315.
— (Ibis), 901.
*davisoni* (Lioptila), 413.
davisoni (Megalæma), 39.
— (Spilornis), 834.
— (Strachyrhis), 339.
dea (Tanysiptera), 106.
dealbata (Ægialitis), 940.
— (Lanius), 1102.
debilirostris (Geospiza), 609.
debilis (Thamnophilus), 184.
— (Turdus), 1093.
— (Xenocichla), 310.
decipiens (Niltava), 295.
— (Oriolus), 527.
— (Rhectes), 494.

Digitized by Google

decipiens (Turtur), 760.
deckeni (Alophius), 103, 1062.
— (Turdus), 399.
*decollatus* (Megapodius), 787.
decollatus (Phasianus), 802.
decolor (Leptoptila), 769.
decora (Dendroeca), 434, 1097.
— (Paradisea), 518.
— (Pipreola), 1074.
— (Polyerata), 136.
decoratus (Pterocles), 777.
decumanus (Ostinops), 550.
decurtatus (Hylophilus), 474.
decussata (Stenopsis), 121.
dedekensi (Pomatorhinus), 326.
defilippiana (Œstrelata), 1035.
defilippii (Lamprocolius), 547.
— (Trupialis), 555.
degenera (Parus), 1101.
deglandi (Oedemia), 999.
deichleri (Galerida), 457.
— (Turdus), 399.
deiroleucus (Hypotriorchis), 873.
dejeani (Cryptolopha), 285.
— (Parus), 461.
— (Rhabdochlamys), 351.
delalandei (Cephalolepis), 164.
— (Goua), 60.
— (Vinago), 732.
delamerei (Alæmon), 451.
— (Estrelda), 582.
delattrei (Lophornis), 165.
— (Tachyphonus), 656.
delattrii (Basileuterus), 440.
delawarensis (Larus), 1025.
delegorguei (Coturnix), 816.
— (Turturoena), 753.
delesserti (Garrulax), 328.
delicata (Dendroeca), 434.
— (Gallinago), 953.
delicatula (Chalcopelia), 1115.
— (Strix), 899.
— (Zosterops), 710.
deliciosa (Psittacula), 1053.
deliciosus (Machæropterus), 222.
delphinæ (Petasophora), 145.
dellæ (Galerida), 458.
demersus (Spheniscus), 1048.
deminuta (Chalcomitra), 701.
*demissa* (Synallaxis), 197.
dendrocolaptoides (Clibanornis), 202
denhami (Otis), 925.
dennistouni (Zosterornis), 339.
densirostris (Margarops), 414.
densus (Dicrurus), 531.
dentata (Malacothraupis), 655.
— (Petronia), 597.
dentirostris (Geospiza), 608.
— (Scenopœetes), 523.
depressirostris (Contopus), 249.
*derbiana* (Chauna), 979.
derbianus (Aulacorhamphus), 44.
— (Oreophasis), 791.
— (Orthotomus), 361.
— (Pitangus), 243.
derbyana (Palæornis), 19.
derbyi (Engyete), 153.
deroepstorffi (Strix), 899.
deserti (Ammomanes), 459.
*deserti* (Rhopophilus), 350.
deserti (Saxicola), 389.
deserticola (Amphispiza), 627.
*deserticola* (Lophortyx), 819.
deserticola (Tinnunculus), 871.
deserticolor (Galerida), 458.
deserticolus (Melizophilus), 375.
desertorum (Alæmon), 450.
— (Buteo), 855.
— (Caprimulgus), 1063.
desgodinsi (Malacias), 325.
*desgodinsi* (Tetraophasis), 806.
desmaresti (Calliste), 667.
— (Cyclopsitta), 33.
— (Phalacrocorax), 1008.
desmursi (Sylviorthorhynchus), 201.
desolatus (Prion), 1037.
despecta (Colluricincla), 1104.
destructa (Formicarius), 172.
*destructor* (Cracticus), 501.
— (Turasaëtus), 848.
deva (Galerida), 458.
devillei (Arremon), 646.
— (Brotogerys), 15.
— (Dendrexetastes), 188.
— (Pyrrhura), 14.
— (Saucerottea), 138.
— (Spizaëtus), 848.
devisi (Rhipidura), 276, 1081.
devittata (Lorius), 29.
devius (Dactylortyx), 821.
devronis (Neorhynchus), 614.
diabolica (Nigrita), 575.
*diabolicus* (Melænornis, 287.
diadema (Catamblyrhynchus), 618.
*diadema* (Chrysotis), 5.
diadema (Ochthoeca), 226.
diademata (Alethe), 410.
— (Chrysotis), 5.
— (Cyanocitta), 511.
— (Glossopsitta), 31.

Digitized by Google

diademata (Pyromelana), 572.
— (Yuhina), 346.
diadematum (Tricholæma), 36.
*diadematus* (Catarrhactes), 1048.
— (Henicurus), 450.
diadematus (Monarcha), 289.
dialilæma (Siphia), 292.
diamesus (Anous), 1019.
diana (Notodela), 384.
diaphora (Otocorys), 1099.
*diardii* (Acomus), 798.
diardi (Criniger), 311.
*diardi* (Diardigallus), 799.
diardi (Garrulax), 327.
— (Harpactes), 88.
— (Rhopodytes), 58.
diazi (Anas), 990.
dickinsoni (Dissodectes), 869.
*dicksonii* (Lyrurus) 826.
dicolorus (Rhamphastos), 43.
dichroa (Lamprocorax), 543.
dichroides (Lophophanes), 465.
dichrorhyncha (Pelargopsis), 114.
dichroura (Helianthea), 151.
dichrourus (Enneoctonus), 487, 1103.
dichrous (Cyphorhinus), 429.
— (Lophophanes), 465.
— (Monarcha), 290.
*dichrous* (Puffinus), 1031.
dichrous (Rhectes), 494.
dicrocephalus (Hyphantornis), 563.
dicrorhynchus (Myiophoneus), 408.
dicruriformis (Dissemuropsis), 532.
didyma (Pteroglossus), 43.
dieffenbachi (Cabalus), 962.
diemenensis (Acanthiza), 366.
— (Rhipidura), 276.
dierythra (Nesomimus), 1095.
diesingi (Cyanocorax), 514.
differens (Turdus), 1093.
difficilis (Empidonax), 1078.
— (Geospiza), 608.
— (Graucalus), 297.
*diffusus* (Oriolus), 525.
diffusus (Passer), 598.
*digglesi* (Pitta), 209.
dignissima (Thamnocharis), 171.
dignus (Eleopicus), 76.
dilectissima (Urochroma), 8.
dillwynni (Ceyx), 111.
*dilophus* (Phalacrocorax), 1008.
diluta (Atlapetes), 636.
— (Cotyle), 257.
— (Otocorys), 1098.
— (Passer), 597.
diluta (Rhipidura), 278.
*diluta* (Saxicola), 389.
dilutior (Arachnothera), 705.
*dilutus* (Dendrortyx), 818.
dimidiata (Aulacorhamphus), 44.
— (Hirundo), 254.
*dimidiata* (Sarothrura), 970.
dimidiatus (Hyphantornis), 562.
— (Monarcha), 289.
— (Rhamphocœlus), 660.
dimorpha (Batis), 265.
— (Ninox), 888.
dinemelli (Dinemellia), 570.
diodon (Harpagus), 868.
diophthalma (Cyclopsitta), 33.
diops (Halcyon), 108.
— (Hemitriccus), 234.
— Ptilotis), 721.
discolor (Certhia), 684.
— (Cisticola), 364.
— (Colluricincla), 496.
— (Dendroeca), 434.
— (Dendrocygna), 988.
— (Leptosoma), 91.
— (Nanodes), 27.
— (Pachycephalopsis), 1102
— (Phœnicothraupis, 1111.
discors (Querquedula), 992.
discurus (Prioniturus), 17.
*dispar* (Chloëphaga), 985.
dispar (Cisticola), 363.
— (Coracias), 92, 1060.
— (Edoliisoma), 298.
— (Rubigula), 308.
*dispar* (Somateria), 1000.
dissaëpta (Cistothorus), 1095.
dissentiens (Cyrtostomus), 703.
dissimilis (Crypturus), 784.
— (Psephotus), 1054.
districta (Metallura), 1067.
disturbans (Androphilus), 1087.
divaga (Monarcha), 289.
diversa (Ammodramus), 1110.
dives (Grallaria), 170.
dixoni (Oreocincla), 404.
djampeana (Cacatua), 2.
— (Siphia), 293.
— (Trichoglossus), 30.
dobsoni (Graucalus), 298.
docilis (Palæornis), 19.
dodsoni (Cisticola), 365.
— (Lanius), 484, 1103.
— (Œdicnemus), 928.
— (Pycnonotus), 305.
doerriesi (Pseudoptynx, 882.

Digitized by Google

doerriesi (Yungipicus), 74.
doggetti (Chalcomitra), 1112.
dohertyi (Cosmophoneus), 1104.
— (Dicrurus), 1105.
— (Edoliisoma), 298.
— (Geocichla), 405.
— (Lophozosterops), 713.
— (Nigrita), 1108.
— (Pitta), 209.
— (Ptilopus),) 736.
— (Rhectes), 1104.
dohrni (Cuphopterus), 496.
— (Glaucis), 131.
dolei (Chasiempis), 270, 1080.
— (Palmeria), 692.
doliatus (Thamnophilus), 182.
*dombeyi* (Baryphthengus), 95.
domestica (Progne), 259.
domesticus (Passer), 597.
— (Troglodytes), 425, 1096.
domicella (Hirundo), 255, 1079.
— (Lorius), 29.
dominica (Dendroeca), 434.
*dominica* (Lalage), 302.
dominica (Mimus), 415.
dominicæ (Coccyzus), 54.
dominicana (Cœreba), 691.
— (Loxigilla), 613.
— (Myiadectes), 407.
— (Paroaria), 642.
— (Tænioptera), 225.
dominicanus (Larus), 1024.
*dominicensis* (Chrysotis), 6.
— (Ciccaba), 893.
dominicensis (Gichlherminia), 403.
— (Loximitris), 593.
— (Œdicnemus), 928.
— (Myiarchus), 251.
— (Pendulinus), 557.
— (Progne), 259.
— (Saurothera), 57.
— (Speotyto), 895.
— (Tinnunculus), 871.
— (Tyrannus), 252.
*dominicus* (Coccyzus), 54.
dominicus (Charadrius), 937.
— (Dulus), 261.
— (Lampornis), 146.
— (Nomonyx), 1001.
— (Podicipes), 1040.
donaldsoni (Caprimulgus), 123.
— (Colius), 91.
— (Cossypha), 409.
— (Ploceipasser), 569.
— (Serinus), 600.
donaldsoni (Turacus), 1060.
dorcadichroa (Camaroptera), 357, 1089.
— (Cryptolopha), 1082.
doreya (Macropygia), 755.
doriæ (Erythrotriorchis), 847.
doris (Tanysiptera), 106.
dorsalæ (Rhamphomicron), 158.
dorsale (Dicæum), 679.
dorsalis (Acredula), 467.
— (Aprosmictus), 21.
— (Automolus), 195.
— (Conopophaga), 169.
— (Geoffroyus), 17.
— (Gerygone), 268.
— (Gymnorhina), 500.
— (Junco), 629.
— (Lanius), 484.
— (Mimus), 415.
— (Phacelodomus), 196.
— (Philæterus), 575.
— (Rhamphocœlus), 660.
— (Tridactylia), 73, 1058.
*dorsalis* (Zosterops), 712.
dorsimaculatus (Herpsilochmus), 178.
dorsoimmaculatus (Xiphorhynchus), 186.
dorsomaculatus (Heterhyphantes), 565.
dorsostriatus (Serinus), 601.
doubledayi (Phæoptila), 139.
dougalli (Sterna), 1015.
douglasi (Lophortyx), 819.
douraca (Turtur), 761.
dowi (Calliste), 667.
*draschi* (*Rectes*), 299.
dresseri (Pipilopsis), 649.
— (Somateria), 1000.
drownei (Certhidea), 689.
dryas (Catharus), 394.
— (Halcyon), 107.
— (Rhipidura), 278.
drymœca (Thryomanes), 424.
dthalæ (Fringillaria), 1110.
dubia (Ægialitis), 939.
— (Cercomela), 391.
— (Dysithamnus), 180.
— (Gallinago), 951.
— (Geospiza), 608.
— (Gracula), 539.
*dubia* (Lophoceros), 103.
dubia (Minla), 314.
— (Motacilla), 444.
— (Pachycephala), 480.
— (Philentoma), 282.
— (Pipra), 1074.
— (Pyrocephalus), 1077.
dubiosus (Laniarius) 492.

Digitized by Google

dubium (Scissirostrum), 548
dubius (Aegotheles), 116.
— (Amydrus), 545.
— (Carpodacus), 604
— (Centurus), 69.
*dubius* (Heliangelus), 155.
dubius (Leptoptilus), 907.
*dubius* (Merula) 397.
dubius (Pogonorhynchus), 35.
*dubius* (*Proparus*), 344.
— (Pyrocephalus), 246.
duboisi (Hyphantornis), 562.
— (Mascarinus), 18.
dubusia (Iridornis), 664.
dubusi (Amazilia), 138, 1065.
dubusi (Pendulinus), 558.
*dubusii* (Chlorochrysa), 669.
duchaillui (Barbatula), 37.
ducorpsi (Cacatua), 3.
dufresneana (Chrysotis), 5.
dufresnii (Coccopygia), 580.
dugesi (Basileuterus), 439.
— (Dendroeca), 433, 1096.
dukhunensis (Calandrella), 453.
dulitensis (Harpactes), 88.
— (Rhizothera), 811.
dumasi (Geocichla), 1094.
— (Phyllergates), 362.
dumerili (Amazilia), 138.
dumetoria (Erythromyias), 267.
— (Upucerthia), 203.
dumetorum (Acrocephalus), 369.
dumicola (Polioptila), 380.
dumonti (Mino), 540.
dunstalli (Rhamphocœlus), 660.
duperreyi (Megapodius), 787.
dupetit-thouarsi (Ptilopus), 736
duplexa (Pendulinus), 1106.
duponti (Certhilauda), 450.
— (Tilmatura), 162.
durnfordi (Hæmatopus), 932.
dussumieri (Cyanomitra), 702.
— (Turnix), 778.
— (Turtur), 760.
duvauceli (Harpactes), 88
*duvauceli* (Pucrasia), 801.
duvauceli (Xantholæma), 39.
duyvenbodei (Æthopyga), 696.
— (Chalcopsitta), 28.
— (Parotia), 522.
— (Paryphephorus), 521.
dybowskii (Acrocephalus), 369.
— (Engyete), 153.
— (Francolinus), 810.
— (Hypargus), 579.
dybowskii (Otis), 925.
dyscola (Mionectes), 1076.
*dyselius* (Eriocnemis), 154.
dysoni (Bucco), 47.
*dytiscivorus* (Caprimulgus), 124
earlii (Argya), 323.
earli (Ocydramus) 964.
eatoni (Dafila) 994.
eburnea (Pagophila), 1026.
eburneirostris (Dendrornis), 189, 1071.
ecaudata (Pennula), 969.
ecaudatus (Helotarsus), 835.
— (Orchilus), 234.
eckloni (Sitta), 680.
eclipes (Argya), 323.
edela (Sutoria), 361.
edithæ (Corvus), 503, 1104.
edoliiformis (Dissemuropsis), 532.
edolioides (Melænornis), 286.
edouardi (Guttera), 805.
— (Malurus), 1090.
eduardi (Tylas), 316.
Edwardi (Saucerottea), 137.
edwardsi (Buthraupis), 663.
— (Carpodacus), 603.
— (Casuarius), 1051.
— (Cyclopsitta), 33.
*edwardsi* (Euphema), 26.
edwardsi (Eupodotis), 927.
— (Gennæus), 800.
— (Manacus), 1074.
— (Nilaus), 488.
— (Porphyrio), 976.
egertoni (Actinodura), 330.
egregia (Crex), 967.
— (Chlorostilbon) 1066.
— (Dacnis), 688.
— (Euphierusa), 144.
— (Pyrrhura), 13.
egretta (Herodias), 912.
eichhorni (Myzomela), 1113.
eimeensis (Phlogœnas), 773.
elæagni (Enneoctonus), 487, 1103.
elæoprorus (Pipilopsis), 649.
elaopteryx (Terenura), 177.
elata (Ceratogymna), 101.
elatus (Tyrannulus), 238.
elconensis (Francolinus), 809.
elegans (Alophius), 104.
*elegans* (Ardeola), 913.
elegans (Asturina), 859.
— (Buteo), 857.
— (Calopezus), 786.
— (Carduelis), 591.
— (Celeus), 79.

Digitized by Google

*elegans* (Cistothorus), 425, 1095.
elegans (Dendrornis), 190.
— (Emberiza), 621.
— (Eremomela), 356.
— (Euphema), 26.
— (Graucalus), 295, 1084.
— (Hypocnemis), 174.
*elegans* (Hypoxanthus), 63.
elegans (Lanius), 484, 1103.
— (Leptopœcile), 379.
— (Lyncornis). 1063.
— (Malurus), 368.
— (Mimus), 415.
— (Parus), 461.
— (Pericrocotus), 301, 1084.
— (Phaps), 767.
— (Phasianus), 802.
— (Pipreola), 216.
— (Platycercus), 24.
— (Psittospiza), 646.
*elegans* (Puffinus), 1032.
elegans (Rallus), 959.
— (Sarothrura), 969.
— (Saucerottea), 137.
— (Scops), 883.
— (Siphia), 292.
— (Sporadinus), 142.
— (Sterna), 1016.
— (Trogon), 86.
elegantior (Synallaxis). 197.
elegantissima (Euphonia), 672.
elegantula (Rhipidura), 277.
*eleonoræ* (Cacatua), 2.
eleonoræ (Hypotriorchis), 872.
— (Poliolais), 1089.
elgini (Spilornis), 834.
elgonensis (Amydrus), 545.
— (Trachyphonus), 41.
— (Turdus), 399.
eliciæ (Hylocharis), 140.
elisabethæ (Halcyon), 1062.
elizabethæ (Malurus), 1090.
— (Myiadectes), 407.
elizæ (Cryptospiza), 1108.
— (Doricha), 162.
— (Estrelda), 1108.
ellæ (Irena), 317.
ellenbecki (Prodotiscus), 1055.
ellioti (Atthis), 163.
— (Eucichla), 209.
— (Falcinellus), 520.
— (Galerida), 457.
— (Mesopicus), 77.
— (Phasianus), 803.
— (Porphyrio), 976.
ellioti (Tanysiptera), 106.
— (Trochalopteron), 321.
ellisia (Ellisia), 351.
ellisianus (Hemignathus), 693.
elongatus (Rhopodytes), 58
elopurensis (Siphia), 293.
elphinstonei (Columba), 752
eluta (Columbigallina), 1114.
elwesi (Otocorys), 1099.
emancipatum (Edoliisoma), 298.
emeria (Otocompsa), 304.
emeu (Casuarius), 1050.
emigrans (Xiphocolaptes), 188, 1071.
emiliæ (Calospiza), 1112.
— (Nigrita), 575.
— (Phaethornis), 132.
— (Tanysiptera), 106.
— (Zosterops), 713,
emiliana (Macropygia), 755.
emilii (Melidectes), 727.
eminentissima (Foudia), 566.
emini (Baza), 867.
— (Cisticola), 363.
*emini* (Excalfactoria), 817.
emini (Glareola), 930.
— (Heterhyphantes), 565.
— (Hirundo), 255.
— (Passer), 598.
— (Philæterus), 575.
— (Pytelia), 578.
— (Salpornis), 684.
— (Telephonus), 488.
— (Terpsiphone), 281.
— (Trachyphonus), 41.
— (Turacus), 89.
emma (Pyrrhura), 13.
emmæ (Cyanolesbia), 157.
— (Pratincola), 387.
— (Urochroma), 8.
*emphanum* (Polyplectron), 796.
emprichii (Alophius), 103.
enarratus (Caprimulgus), 124.
enca (Corvus), 504.
enganensis (Gracula), 539.
— (Graucalus), 297.
— (Lamprocorax), 543.
— (Siphia), 292, 1083.
ensiferus (Docimastes), 152.
ensipennis (Campylopterus), 134.
enthymia (Otocorys), 1099.
entylotus (Euptilosus), 1085.
enucleator (Pinicola), 606.
eoa (Dendroeca). 433.
*eogaster* (Pogonorhynchus), 35.
eos (Helianthea), 151.



Digitized by Google

epauletta (Pyrrhoplectes), 602.
*ephippiorhyncha* (Ephippiorhynchus), 907.
epichlora (Burnesia), 360.
epilepidotus (Turdinulus), 332.
epirhina (Lophoceros), 103.
*episcopalis* (Rhipidura), 278.
episcopus (Dissoura), 906.
— (Phaethornis), 133.
— (Tanagra), 661.
epomidis (Centropus), 56.
epops (Upupa), 99.
epulata (Alseonax), 264.
eques (Myzomela), 716.
— (Palæornis), 19.
— (Penthetria), 573.
erckeli (Francolinus), 810.
*eremita* (Geronticus), 901.
eremita (Megapodius), 787, 1115.
— (Nesocichla), 406.
eremophila (Thryomanes), 424.
eriphile (Thalurania), 143.
erithachorides (Dendroeca), 1097.
erithacus (Liosceles), 167.
— (Psittacus), 3.
— (Pyrrhula),) 607.
— (Siphia), 293.
— (Sittasomus), 190.
erlangeri (Chalcopelia), 1114.
— (Falco), 1116.
ermanni (Turtur), 762.
ernesti (Falco), 874.
— (Pinarochroa), 388.
— (Strix), 899.
erromangæ (Rhipidura), 276.
erubescens (Phaeton), 1004.
erythræa (Saxicola), 390.
*erythræus* (Phœnicopterus), 908.
erythrauchen (Accipiter), 846.
erythreæ (Dryoscopus), 492.
— (Poicephalus), 9, 1053.
erythrina (Myzomela), 716.
erythrinus (Carpodacus), 602.
erythrocampa (Scops), 884.
erythrocephala (Acredula), 466.
— (Amadina), 579.
— (Cisticola), 364.
*erythrocephala* (Foudia), 566.
erythrocephala (Myzomela), 715.
*erythrocephala* (Pipra), 221.
erythrocephala (Pyranga), 659.
— (Pyrrhula), 607.
erythrocephalum (Trochalopteron), 321.
erythrocephalus (Chrysocolaptes), 80
— (Harpactes), 88.
— (Melanerpes), 68.
erythrocephalus (Trachyphonus), 40.
erythrocercus (Philydor), 194.
erythroceria (Cinnyris), 698.
erythrochlamys (Ammomanes), 459.
erythrocnemis (Accipiter), 846.
— (Pomatorhinus), 326.
erythrogaster (Laniarius), 492.
— (Malimbus), 568.
erythrogastra (Halcyon), 107.
— (Hirundo), 253.
— (Monticola), 393.
*erythrogastra* (Petroeca), 266.
erythrogastra (Pitta), 208.
— (Ruticilla), 385.
erythrogenys (Cisticola), 365.
— (Conurus), 11.
— (Microhierax), 868.
— (Pomatorhinus), 326.
erythrogina (Brachypteryx), 342.
erythrognatha (Crax), 789.
erythrognathus (Aulacorhamphus), 44.
— (Rhamphococcyx), 59.
erythrolæma (Trochalopteron), 321.
erythroleuca (Grallaria), 170.
erythrolophus (Turacus), 89.
erythromelæna (Pyranga), 659.
erythromelas (Ardetta), 914.
— (Myzomela), 714.
— (Pitylus), 643.
erythromelon (Colius), 91.
erythronota (Barbatula), 37.
— (Estrelda), 582.
— (Geocichla), 404.
— (Myrmotherula), 179.
— (Rhipidura), 277.
— (Ruticilla), 385.
— (Saucerottea), 137, 1065.
erythronotum (Cyanoderma) 343.
*erythronotus* (Anthus), 446.
erythronotus (Brachypternus), 78.
— (Buteo), 857.
— (Cyanorhamphus), 26.
— (Lanius), 485.
— (Philydor), 194.
— (Phrygilus), 641.
erythropareia (Geotrygon), 771.
erythropeplus (Platycercus), 24.
*erythrophrys* (Arboricola), 814.
erythrophrys (Enodes), 548.
— (Poospiza), 628.
— (Turtur), 760.
erythrophthalma (Æthyia), 997.
— (Thripophaga), 195.
erythrophthalmus (Acomus), 798.
— (Coccyzus), 54.

Digitized by Google

erythrophthalmus (Pipilo), 636.
erythropleura (Ptilotis), 722.
*erythropleura* (Suya), 358.
erythropleura (Zosterops), 706.
erythropleurus (Turdus), 400.
erythrops (Geophlœus), 82.
erythropsis (Chloronerpes), 65.
erythrops (Cisticola), 363.
— (Climacteris), 685.
— (Leptopogon), 237.
— (Myiagra), 283.
— (Odontophorus), 822.
— (Porzana), 969.
— (Quelea), 571.
— (Siptornis), 199.
erythroptera (Cercotrichas), 413.
— (Cisticola), 363.
— (Mirafra), 456.
— (Myiozetetes), 241.
— (Ortalida), 793.
— (Phlogœnas), 773.
— (Phlogopsis), 172.
— (Terpsiphone), 281.
erythropterum (Cyanoderma), 342.
erythropterus (Philydor), 193.
— (Pterythrius), 487.
— (Ptistes), 20.
— (Telephonus), 488.
erythropus (Accipiter), 845.
— (Anser), 983.
— (Crypturus), 783.
erythropygia (Accentor), 381.
— (Dendrornis), 189.
— (Hirundo), 255.
— (Mirafra), 456.
erythropygium (Edoliisoma), 299.
erythropygius (Gecinus), 64.
— (Myiotheretes), 225.
— (Pericrocotus), 302.
— (Pteroglossus), 43.
— (Spodiopsar), 536.
erythropygus (Morococcyx), 61.
erythrorhyncha (Buphaga), 549.
— (Dafila), 994.
— (Irrisor), 98.
— (Microperdix), 813.
— (Urocissa), 507.
erythrorhynchum (Dicæum), 679.
erythrorhynchus (Alophius), 104.
— (Pelecanus), 1006.
erythrosticta (Pomarea), 291.
erythrothorax (Baza), 867.
*erythrothorax* (Coturnicops), 970.
erythrothorax (Dicæum), 678.
— (Gymnopelia), 763.
erythrothorax (Lorius), 29.
— (Rallina), 966.
— (Stiphrornis), 358.
— (Synallaxis), 199.
*erythrote* (*Malac.*), 334.
erythrotis (Cyanorhamphus), 26.
— (Grallaria), 170.
— (Merula), 396.
erythrura (Myrmotherula), 179.
erythrurus (Myiobius), 245.
esculenta (Collocalia) 130.
esslingi (Nestor), 27.
estellæ (Oreotrochilus), 147.
etorques (Urospizias), 842.
eucharis (Psalidoprymna), 158.
euchloris (Chlorostilbon), 142.
euchlorus (Passer), 599.
euchrysea (Hirundo), 255.
*euerythra* (Ceyx), 111.
eugenei (Myiophoneus), 408.
eugenia (Andropadus), 313.
eugeniæ (Ptilopus), 741.
euleri (Coccyzus), 1056.
eulophotes (Herodias), 912.
eumegethes (Phalacrocorax), 1009.
euophrys (Basileuterus), 439.
— (Philydor), 1072.
— (Thryothorus), 423.
euops (Conurus), 12.
eupatria (Palæornis), 18.
eupogon (Metallura), 156.
euptilosa (Pinarocichla), 307.
eurhina (Totanus), 948.
eurhythma (Ardetta), 914.
europæa (Miliaria), 623
— (Pyrrhula), 607.
— (Sitta), 680.
*europæus* (Anorthura), 427.
europæus (Caprimulgus), 122.
*europæus* (Lanius), 1102.
— (Scops), 882.
eurycricota (Zosterops), 710.
eurygnatha (Sterna), 1016.
eurynome (Phaethornis), 132.
euryptera (Opisthoprora), 156.
eurystomina (Pseudochelidon), 534.
euryura (Rhipidura), 278.
euryzona (Alcedo), 113.
— (Merula), 397.
*euryzona* (Rallina), 965.
euryzonoides (Rallina), 966,
euteles (Trichoglossus), 31.
*eutolmus* (Microhierax), 868.
eutreptorhyncha (Pelargopsis), 114.
eva (Helianthea), 151.

Digitized by Google

evelynæ (Philodice), 161.
everetti (Acanthopneuste), 377.
*everetti* (Androphilus), 335.
everetti (Arachnothera), 705.
— (Cettia), 372.
— (Dicæum), 679.
— (Edoliisoma), 299.
— (Eudynamis), 1057.
— (Geocichla), 405.
— (Gerygone), 268.
— (Iole), 312.
— (Mixornis), 340.
— (Monarcha), 289.
— (Ninox), 888.
— (Orthnocichla), 430.
— (Osmotreron), 733.
— (Pachycephala), 477.
*everetti* (Pitta), 207.
everetti (Phyllergates), 362.
— (Pnoepyga), 430.
— (Prionochilus), 675.
— (Pseudoxenicus), 1088.
— (Ptilopus), 735.
— (Rhytidoceros), 102.
*everetti* (Sasia), 85.
everetti (Scops), 885.
— (Siphia), 292.
— (Staphidia), 344.
— (Tanygnathus), 18.
— (Tiga), 78.
— (Turnix), 779.
— (Urolonchа), 586.
— (Zosterops), 707.
eversmanni (Columba), 749.
— (Lagopus), 827.
evura (Parus), 464.
*ewingii* (Acanthiza), 366.
ewingi (Ptilopus), 737.
examinata (Pachycephala), 480.
exaratus (Hydrocissa), 103.
*excellens* (Cyrtostomus), 703.
excellens (Tigrisoma), 919.
excelsa (Grallaria), 171.
excelsior (Upucerthia), 203.
— (Yungipicus), 75.
excubitor (Lanius) 483.
excubitorius (Lanius), 484.
excubitoroides (Lanius), 484, 1103.
exelsa (Parus), 1100.
exigua (Geothlypis), 1097.
*exile* (Calopteryx), 234.
exilipes (Cannabina), 590.
exilis (Ardetta), 914.
— (Cisticola), 364.
*exilis* (Creciscus), 971.
exilis (Indicator), 34.
— (Loriculus), 23.
— (Orthorhynchus), 164.
*exilis* (Picumnus), 84.
exilis (Psaltria), 466.
eximia (Æthopyga), 695.
— (Buthraupis), 663.
— (Diomedea), 1039.
— (Eupherusa), 144.
— (Rhodinocichla), 1095.
— (Xantholæma), 40.
eximium (Dicæum), 678.
eximius (Caprimulgus), 124.
— (Criniger), 311.
— (Platycercus), 24.
— (Pogonotriccus), 235.
— (Vireolanius), 475.
exortis (Heliangelus), 155.
explorator (Geoffroyus), 1054.
— (Monticola), 393.
— (Zosterops), 706.
exquisita (Coturnicops), 970.
*exquisita* (Psittacula), 15.
exsertus (Automolus), 1072.
exsul (Buteo), 857.
— (Chlorophanes), 689.
— (Gymnophaps), 1114.
— (Halodroma), 1037.
— (Hypotænidia), 961.
— (Myrmelastes), 181.
— (Nesopelia), 758.
— (Palæornis), 19.
— (Pericrocotus), 301.
— (Tiga), 1059.
— (Turdinulus), 332.
extensicauda (Prinia), 359.
externa (Œstrelata), 1035.
extoni (Barbatula), 37.
exulans (Diomedea), 1038.
exustus (Pteroclurus), 777.
eytoni (Dendrocygna), 988.
— (Dendrornis), 189.
— (Lamprotornis), 544.
*fabalis* (Anser), 983.
faber (Megalæma), 39.
faceta (Pyranga), 658.
facialis (Creciscus), 972.
— (Eudynamis), 1057.
*fagani* (Serinus), 601.
fairbanki (Trochalopteron), 322.
fairchildi (Pezoporus), 1054.
falcata (Eunetta), 991.
— (Pachycephala), 478.
— (Ptilocichla), 331.
falcifer (Pipilo), 1111.

Digitized by Google

falcinella (Picolaptes), 187.
falcinellus (Plegadis), 903.
falcirostris (Spermophilopsis), 614.
falcularius (Xiphorhynchus), 187.
falkensteini (Cinnyris), 698.
— (Criniger), 311.
— (Saxicola), 390.
falklandica (Ægialitis), 941.
— (Rhinogryphus), 828.
— (Trupialis), 555.
falklandicus (Turdus), 400.
fallax (Ceycopsis), 111, 1062.
*fallax* (Columba), 750.
fallax (Elainea), 240.
— (Glycychæra), 717.
— (Lanius), 484.
— (Leucippus), 135.
— (Melospiza), 633.
— (Rhipidura), 277, 1081.
familiare (Hapalopteron), 1084.
familiaris (Agrobates), 374.
— (Certhia), 683.
— (Prinia), 358.
famosa (Nectarinia), 694.
fannini (Ardea), 1117.
fannyæ (Myrtis), 161.
— (Thalurania), 143.
fannyi (Thalurania), 1066.
*fantensis* (Anthreptes), 704.
fantisiensis (Alseonax), 264.
farinosa (Chrysotis), 4.
farquhari (Carpophaga), 743.
— (Halcyon), 1062.
fasciata (Amadina), 579.
— (Atticora), 257.
— (Chamæa), 469.
— (Columba), 751.
— (Diucopis), 646.
— (Glycyphila), 717.
— (Melospiza), 632
— (Palæornis), 19.
— (Pipra), 221.
— (Rallina), 965.
— (Salpinctes), 427.
— (Turnix), 778.
fasciativentris (Pulsatrix), 892.
— (Thryothorus), 422.
fasciatum (Tigrisoma), 919.
fasciatus (Campylorhynchus), 421.
— (Eutolmaëtus), 850.
— (Harpactes), 88.
— (Harpagus), 868.
— (Lophoceros), 103.
— (Philortyx), 819.
— (Pterocles), 777.
fasciatus (Ptilopus), 737.
fasciinucha (Hypotriorchis), 872.
fasciipygialis (Centropus), 57.
fasciiventris (Parus), 462.
fascinans (Microeca), 263.
fasciogularis (Ptilotis), 721.
fasciolata (Crax), 789.
— (Locustella), 370.
fasciolatus (Calamonastes), 352.
— (Circaetus), 833.
*fasciolatus* (Huhua), 882.
fastuosa (Calliste), 665.
fatigata (Geospiza), 609.
feadensis (Lamprocorax), 542.
feæ (Indicator), 1055.
— (Merula), 398.
— (Œstrelata), 1034.
— (Scops), 1117.
— (Suthora), 471.
— (Zosterops), 1113.
featherstoni (Phalacrocorax), 1007.
fedoa (Limosa), 946.
feldeggii (Falco), 875.
feldeni (Thriponax), 82.
*feliciæ* (Picus), 70.
feliciæ (Saucerottea), 137.
*felivox* (Galeoscoptes), 415.
felix (Thryothorus), 423.
feminina (Myiagra), 1082.
*femoralis* (Hypotriorchis), 873.
— (Numenius), 945.
femoralis (Pholidauges), 541.
— (Scytalopus), 167
fenicheli (Arses), 288.
fergussonis (Melilestes), 718.
ferina (Æthyia), 996.
fernandensis (Eustephanus), 157.
fernandezianus (Anæretes), 236.
fernandinæ (Nesoceleus), 79.
— (Teretistris), 438.
ferox (Buteo), 855.
— (Glaucidium). 896.
— (Myiarchus), 250, 1078.
ferrago (Turtur), 759.
ferrea (Oreicola), 273.
ferreirostris (Chaunoproctus), 610.
ferrocyanea (Myiagra), 283, 1082.
*ferruginea* (Æthyia), 997.
ferruginea (Ammomanes), 459.
— (Cisticola), 363.
— (Erismatura), 1001.
— (Formicivora). 177.
*ferruginea* (Glaucidium), 896.
— (Gymnocichla), 175.
ferruginea (Hemichelidon), 262.

Digitized by Google

ferruginea (Hirundinea), 244.
— (Lophophaps), 768.
— (Phlogœnas), 773.
*ferrugineiceps* (Myiobius), 246.
ferrugineifrons (Brotogerys), 15.
— (Hylophilus), 474.
ferrugineipectus (Grallaricula), 169.
ferrugineiventre (Conirostrum), 687.
ferrugineus (Archibuteo), 854.
— (Coccyzus), 53.
— (Gallus), 803.
— (Laniarius), 491.
— (Microsittace), 13.
— (Rhectes), 495.
— (Scolecophagus), 559.
ferruginolentus (Automolus), 194.
ferruginosa (Munia), 588.
ferruginosus (Pomatorhinus), 325.
ferus (Anser), 982.
— (Cygnus), 986.
fervida (Accentor), 381.
fervidus (Caprimulgus), 123.
festæ (Rhamphocœlus), 660.
festatus (Pharomacrus), 1059.
festiva (Calliste), 665.
— (Chrysotis), 6.
festivus (Chrysocolaptes), 80.
*fiber* (Sula), 1011.
ficedulina (Zosterops), 711.
*fidelis* (Chauna), 979.
fidelis (Eleopicus), 76.
fieldi (Hyetornis), 57.
— (Tinnunculus), 870.
figlina (Pyranga), 658.
figulus (Furnarius), 203.
filamentosus (Phalacrocorax), 1007.
*filholi* (Catarrhactes), 1048.
filicauda (Cirrhipipra), 220.
*filicum* (Ellisia), 351
filifera (Hirundo), 254.
filigera (Ptilotis), 721.
fimbriata (Lalage), 303.
finlaysoni (Crocopsis), 306.
finschi (Butalis), 262.
— (Carpophaga), 746.
— (Cassinia), 295.
— (Chrysotis), 5.
— (Conurus), 12.
— (Criniger), 311.
— (Euphonia), 672.
— (Francolinus), 809.
*finschi* (Hæmatopus), 932.
finschi (Hyphantornis), 1107.
— (Nasiterna), 23.
— (Pachycephala), 477.
finschi (Palæornis), 19.
— (Paradisea), 518.
— (Pitta), 209.
— (Rhipidura), 279, 1081.
— (Trichostoma), 333.
— (Turacus), 1060.
— (Zosterops), 713.
*finschii* (Phalacrocorax), 1010
— (Scotornis), 120.
fischeri (Agapornis), 22.
— (Barbatula), 38.
*fischeri* (Calamonastes), 352.
fischeri (Centropus), 57.
— (Cisticola), 365.
— (Dioptrornis), 287.
— (Elæocerthia), 702.
— (Francolinus), 810
— (Geocichla), 1094.
— (Hyphantornis), 562.
— (Lampronetta), 1000.
— (Mirafra), 454.
— (Pholidauges), 541.
— (Phyllostrophus), 314.
— (Ptilopus), 735.
— (Sylvielia), 355.
— (Turacus), 89.
— (Vidua), 574.
fisheri (Ammodromus), 631.
— (Glaucidium), 896.
— (Œstrelata), 1035.
fissilis (Thalurania), 1066.
*fissipes* (Hydrochelidon), 1013.
*fistularis* (Mareca), 992.
fistulator (Pholidophalus), 101.
fitzgeraldi (Upocerthia), 1073.
flabellifera (Rhipidura), 276.
flabelliformis (Cacomantis), 52.
flagrans (Cyrtostomus), 703.
— (Harpactes), 88.
flammaxillaris (Cyrtostomus), 703.
flammea (Loxops), 594.
— (Pyranga), 659, 1111.
— (Setophaga), 441.
— (Strix), 898.
flammeola (Psiloscops), 887.
flammeum (Dicæum), 676.
flammeus (Pericrocotus), 301.
flammiceps (Ægithalus), 468.
— (Oxyrhamphus), 224.
— (Pyromelana), 571.
flammifer (Pericrocotus), 301.
flammifera (Arachnothera), 705.
flammigerus (Rhamphocœlus), 660.
flammula (Pinicola), 606.
— (Selasphorus), 162.

Digitized by Google

flammulata (Siptornis), 200.
flammulatus (Attila), 214.
— (Hemitriccus), 1075.
— (Megabias), 284.
— (Myiarchus), 251.
— (Thripadectes), 193.
flava (Calliste), 666.
— (Cyrtostomus), 1113.
— (Galerida), 458.
— (Motacilla), 444.
— (Ptilotis), 722.
— (Zosterops), 708.
flavala (Hemixus), 315.
flaveola (Capsiempis), 237.
— (Chiromachæris), 222.
— (Cœreba), 690.
— (Gerygone), 268.
*flaveola* (Motacilla). 444.
flaveola (Sycalis), 601.
flaveolus (Basileuterus), 438.
— (Criniger), 311.
— (Hylophilus). 475.
— (Passer), 598.
— (Platycercus), 24.
flavescens (Andropadus), 313.
— (Basileuterus), 1098.
— (Celeus), 79.
— (Empidonax), 248.
— (Hypocnemis), 173.
— (Panoplites), 153.
— (Phylloscopus), 1091.
— (Pseudocolaptes), 196.
— (Psittacula), 15.
— (Ptilotis), 722.
— (Smicrornis), 267.
— (Vireo), 473, 1102.
— (Xanthixus), 307.
flavibuccale (Tricholæma), 36.
flavicans (Foudia), 566.
— (Macrosphenus), 314.
— (Myiobius), 245.
— (Prinia), 358.
— (Prioniturus), 17.
— (Trichoglossus), 31.
flavicanthus (Acanthogenys), 724.
flavicapilla (Chloropipo), 219.
flavicapillum (Heteropelma), 223.
flavicaudata (Lafresnaya), 151.
flaviceps (Auriparus), 468.
— (Campochæra), 1084.
— (Dendroeca), 433.
— (Geothlypis), 437.
— (Rhodacanthis), 606.
— Zosterops), 712.
*flavicincta* (Pœcilodryas), 271.
flavicollis (Ardeiralla), 915.
— (Ixulus), 344.
— (Macronyx), 449.
— (Mixornis), 340.
— (Nemosia), 654.
— (Petronia), 597.
— (Pipra), 220.
— (Ptilopus), 737.
— (Xenocichla), 310.
flavicrissalis (Eremomela), 355.
flavicrissus (Cassicus), 550.
flavida (Dendroeca), 433, 1097.
— (Chlorodyta). 353, 1059.
— (Geothlypis), 1097.
*flavida* (Gerygone), 269.
flavidicollis (Saltator), 646.
flaviditentris (Sporæginthus), 581.
flavifrons (Ægithalus), 468.
— (Amblyornis), 525.
— (Euphonia), 672.
— (Megalæma), 39.
— (Melanerpes), 68.
— (Picumnus), 84.
— (Poicephalus), 9.
*flavifrons* (Tyranniscus), 239.
flavifrons (Vireo), 472.
— (Zosterops), 710.
flavigaster (Dendrornis), 1071.
— (Microeca), 264, 1080.
flavigastra (Arachnothera), 705.
— (Basileuterus), 439.
— (Emberiza), 621.
— (Eopsaltria), 482.
— (Hyliota), 272.
*flavigastra* (Stelgidopteryx), 260.
flavigula (Chloronerpes), 65.
— (Manorhina), 724.
— (Melanerpes), 68.
*flavigula* (Petronia), 597.
flavigula (Ptilotis), 721.
— (Serinus), 601.
— (Timeliopsis), 727.
— (Xenocichla), 310.
flavigularis (Apalis), 352.
— (Camaroptera), 357.
— (Chlorospingus), 650.
— (Cryptolopha), 286.
— (Chrysococcyx), 52.
— (Platyrhynchus), 231.
flavilateralis (Gerygone), 269.
— (Zosterops), 708.
flavinucha (Compsocoma), 663.
— (Chrysophlegma), 67.
— (Muscisaxicola), 230.
flavipectus (Æthopyga), 696.

Digitized by Google

flavipectus (Chlorospingus), 650.
— (Cyclorhis), 475.
— (Parus), 464.
flavipennis (Chloropsis), 318.
flavipes (Hylophilus), 474.
— (Ketupa), 879.
*flavipes* (Larus), 1024.
flavipes (Merula), 396, 1092.
— (Platalea), 905.
— (Totanus), 947.
flaviprymna (Munia), 587.
flavirícta (Ptilotis), 720.
flavirostris (Alophius), 104.
— (Anæretes), 236.
*flavirostris* (Ardea), 911.
flavirostris (Arremon), 646.
*flavirostris* (Bubulcus), 913.
flavirostris (Cannabina), 589.
— (Ceuthmochares), 59.
— (Chlorophonia), 671.
— (Columba), 750.
*flavirostris* (Gecinus), 64.
flavirostris (Grallaricula), 169.
*flavirostris* (Herodias), 912.
flavirostris (Humblotia), 284.
*flavirostris* (Hypopicus), 70.
flavirostris (Monasa), 48.
— (Myiophoneus), 407.
— (Paradoxornis), 470.
*flavirostris* (Phaeton), 1004.
flavirostris (Phibalura), 215.
— (Pteroglossus), 43.
*flavirostris* (Puffinus), 1031.
flavirostris (Querquedula), 993.
— (Rhynchops), 1020.
— (Syma), 110.
— (Turdus), 400.
— (Urocissa), 507.
flaviscapis (Pterythrius), 487.
*flavissima* (Telespiza), 606.
flavissima (Zosterops), 1113.
flavistriata (Xenocichla), 310.
*flavitincta* (Chiromachæris), 222.
flaviventer (Dicæum), 679.
— (Machærirhynchus), 285.
*flaviventre* (Ornithion), 238.
*flaviventris* (Arachnothera), 705.
flaviventris (Blacicus), 1078.
— (Brachypteryx), 342.
— (Burnesia), 359.
— (Calliste), 667.
— (Chlorocichla), 313.
— (Cyclorhis), 475.
— (Dacnis), 688.
— (Emberiza), 621.
flaviventris (Empidonax), 248.
— (Eremomela), 355.
*flaviventris* (Gerygone), 268.
flaviventris (Hapalocercus), 234.
— (Horornis), 373.
— (Hylophilus), 474.
— (Leptotriccus), 235.
— (Mesolophus), 308.
— (Motacilla), 443.
— (Platycercus), 24.
— (Porzana), 968.
— (Rhynchocyclus), 242.
— (Serinus), 600.
— (Sphecotheres), 528.
— (Sylviella). 355.
flavivertex (Elaïnea), 240.
— (Heterocercus), 224.
— (Serinus), 599.
— (Setophaga), 441.
flavo-aurita (Ptilotis), 720.
flavocincta (Chlorodyta), 353.
*flavocincta* (Chloropsis), 318.
flavocinctus (Oriolus), 526.
flavo-cinerea (Stigmatura), 235.
*flavocristatus* (Melanichlora), 460.
flavogrisea (Pachycare), 481.
flavolivacea (Cettia), 372.
flavo-olivacea (Rhynchocyclus), 1077.
*flavo-olivaceus* (Rhynchocyclus), 242.
flavopalliata (Lorius), 29.
flavostriata (Æthopyga), 696.
— (Ptilotis), 720.
flavotecta (Rhynchocyclus), 1077.
flavotincta (Glycyphila), 717.
— (Grallaria), 170.
— (Lalage), 303.
*flavotinctus* (Picumnus), 84.
*flavotorquata* (Eremomela), 356.
flavovelatus (Geothlypis), 437.
flavovirens (Chlorospingus), 651.
— (Leptopogon), 237.
flavovirescens (Microeca), 264.
flavoviridis (Trichoglossus), 31.
flavoviridis (Vireo), 472.
flavus (Celeus), 79.
— (Xanthosomus), 553.
flecki (Centropus), 56.
— (Sylviella), 355.
flegeli (Poliospiza) 599.
flemmingi (Dysithamnus), 1070.
floccosus (Pycnoptilus), 319.
florenciæ (Monarcha), 290.
florensis (Corvus), 504.
florentiæ (Ptilopachys), 817.
floresiana (Alcedo), 112.

Digitized by Google

floresiana (Geoffroyus), 16.
— (Pelargopsis), 114.
floresii (Selasphorus), 162.
floriceps (Anthocephala), 146.
florida (Calliste), 666.
floridana (Agelæus), 1106.
— (Ammodramus), 1110.
— (Aphelocoma), 512.
— (Cardinalis), 620.
— (Colinus), 820.
— (Corvus), 503.
— (Lophophanes), 465.
— (Monarcha), 1083.
— (Progne), 1079.
— (Scops), 886.
— (Speotyto), 895.
— (Zosterops), 1113.
florincola (Cyanocitta), 1105.
floris (Acanthopneuste), 377.
— (Brachypterus), 1087.
— (Cryptolopha), 286.
— (Graucalus), 297.
— (Osmotreron), 734.
— (Spizaëtus), 849.
— (Terpsiphone), 280.
florisuga (Chlorodyta), 1089.
flosculus (Loriculus), 22.
floweri (Sturnopastor), 536.
flumenicola (Ceyx), 112.
fluminea (Porzana), 967.
fluviatilis (Agyrtria), 136.
*fluviatilis* (Hydrochelidon), 1013.
fluviatilis (Locustella), 370.
— (Muscisaxicola), 230.
— (Podicipes), 1040.
— (Sterna), 1015.
fluvicola (Petrochelidon), 259.
*færoensis* (Sturnus), 535.
fœtidus (Gymnoderus), 219.
*fokiensis* (Heteromorpha), 470.
fokiensis (Micropternus), 78.
— (Scæorhynchus), 1101.
forbesi (Agelæus), 553.
— (Cyanorhamphus), 26.
— (Emberiza), 621.
— (Erythrura), 584.
— (Halcyon), 107.
— (Munia), 587.
— (Myzomela), 715.
— (Ninox), 890.
— (Oxyechus), 939.
— (Rallicula), 970.
forcipata (Macropsalis), 120.
forficata (Chlorostilbon), 1066.
forficatus (Dicrurus), 530.
*forficatus* (Chlorostilbon), 141.
forficatus (Milvulus), 253.
formicivora (Myrmecocichla), 391.
formicivorus (Melanerpes), 68.
formosa (Anorthura), 428.
— (Calocitta) 509.
— (Dendrophila), 682.
— (Megaloprepia), 742.
— (Oporornis), 436.
— (Pipreola), 216.
— (Pteroglossus), 43.
— (Querquedula), 992.
— (Stictospiza), 579.
formosæ (Dendrocitta), 508.
— (Lanius), 485.
— (Sphenocercus), 731.
formosana (Munia), 588.
— (Rallina), 966.
formosanus (Phasianus), 802.
formosum (Trochalopteron), 321.
formosus (Oriolus), 526.
— (Pezoporus), 27.
fornsi (Teretistris), 438.
forreri (Amazilia), 138.
— (Chrysomitris), 593.
— (Vireo), 473.
forsteni (Carpophaga), 745.
— (Halcyon), 109.
— (Megapodius), 787, 1115.
— (Meropogon), 97.
— (Oriolus), 526.
— (Pitta), 208.
— (Trichoglossus), 30.
forsteri (Aptenodytes), 1047.
— (Carpophaga), 744.
— (Sterna), 1014.
fortipes (Horornis), 372.
fortirostris (Dendrocolaptes), 185.
— (Quiscalus), 560.
fortis (Agelæus), 1106.
— (Geositta), 1073.
— (Geospiza), 608.
— (Graucalus), 297.
— (Halcyon), 107.
— (Pachycephalopsis), 481.
— (Percnostola (175).
— (Tityra), 211.
— (Trichoglossus), 30.
— (Xiphocolaptes), 188.
fortunæ (Aplonis), 541.
— (Colluricincla), 496.
fortunatus (Phylloscopus), 378, 1091.
forwoodi (Motacilla), 442.
fossii (Caprimulgus), 124.
frænata (Merganetta), 1002.



Digitized by Google

frænatus (Caprimulgus), 123.
fraithii (Himatione), 692.
francescæ (Granatellus), 438.
francesi (Astur), 840.
francica (Collocalia), 129.
franciæ (Agyrtria), 136.
franciscæ (Calliste), 668.
franciscana (Pyromelana), 572.
francisi (Erythrocercus), 275.
*frankii* (Amaurornis), 972.
franklini (Falcipennis), 825.
— (Larus), 1022.
— (Megalæma), 39.
frantzii (Catharus), 394.
— (Elaïnea), 240.
— (Nothocercus), 782.
— (Pteroglossus), 43.
— (Tetragonops), 42.
fraseri (Anthreptes), 704.
— (Basileuterus), 439.
— (Cassinia), 295.
— (Conirostrum), 687.
— (Oreomanes), 686.
— (Pelargopsis), 114.
— (Threnetes), 131.
frater (Amydrus), 545.
— (Criniger), 311.
— (Herpsilochmus), 178.
— (Monarcha), 289.
— (Oxyrhamphus), 224.
— (Troglodytes), 426.
*frater* (Yungipicus), 75.
fratercula (Alcippe), 1088.
— (Dendrornis), 189, 1071.
— (Geospiza), 608.
— (Thamnophilus), 1070.
*fratereulus* (Anthracoceros), 100.
fraterculus (Pericrocotus), 301, 1084.
frazari (Butorides), 916.
— (Hæmatopus), 932.
fremantlii (Alæmon), 451.
frenata (Cyrtostomus), 703.
*frenata* (Gallinago), 953.
frenata (Geotrygon), 771.
— (Melittophagus), 96.
— (Ptilotis), 720.
— (Siphia), 292.
— (Tephrodornis), 494.
frenatus (Chætops), 320.
*frenatus* (Garrulax), 328.
— (Graculus), 296.
fretorum (Pachycephala), 476.
freycineti (Megapodius), 787.
— (Myiagra), 1082.
friedrichseni (Pyromelana), 572.
frigida (Mixornis), 1087.
*fringillaceus* (Vini), 30.
fringillaria (Molothrus), 553.
fringillaris (Empidochanes), 247.
— (Mirafra), 455.
fringillarius (Microhierax), 868.
fringillinus (Ægithalus), 468.
fringillirostris (Cannabina), 590.
fringilloides (Accipiter), 845.
— (Amaurospiza), 619.
— (Spermestes), 577.
frobeni (Geositta), 204.
frontalis (Anarhynchus), 942.
— (Callene), 408.
— (Carpodacus), 603.
— (Centurus), 1058.
— (Chlorophonia), 671.
— (Chlorospingus), 651.
— (Cyanocitta), 511.
— (Dendrocitta), 508.
— (Dendrophila), 682.
— (Eleopicus), 76.
— (Geocichla), 1094.
— (Henicurus), 450.
— (Nonnula), 48.
— (Octhoeca), 1075.
— (Oreopsittacus), 1055.
— (Oriolus), 526.
— (Orthotomus), 361.
— (Phabotreron), 734.
— (Pipreola), 216.
— (Ruticilla), 386.
— (Sericornis), 367.
— (Spermophilopsis), 614.
— (Sporopipes), 570.
— (Sterna), 1016.
— (Sublegatus), 241.
— (Synallaxis), 197.
— (Tyranniscus), 239.
— (Xanthosomus), 554.
— (Zosterops), 711.
frontata (Gallinula), 973.
frontatum (Tricholæma), 36.
frontatus (Conurus), 11.
— (Falcunculus), 482.
*frontatus* (Hypotriorchis), 873.
frugilegus (Trypanocorax), 505.
frugivorus (Calyptophilus), 652.
fruticeti (Phrygilus), 640.
*fruticicola* (Synallaxis), 197.
fucata (Atticora), 258.
— (Emberiza), 621.
— (Fulvetta), 346.
*fucatus* (Cuculus), 51.
fuciphaga (Collocalia), 129.

Digitized by Google

fuertaventuræ (Houbara), 927.
fugax (Hierococcyx), 50.
fugensis (Hypsipetes), 316.
fulgens (Eugenes), 148.
fulgentissima (Chlorochrysa), 669.
*fulgida* (Campophaga), 300.
fulgidigula (Bourcieria), 151.
fulgidum (Dicæum), 677.
fulgidus (Monachalcyon), 105.
— (Onycognathus), 545.
fulica (Heliornis), 978.
fulicarius (Crymophilus), 956.
fulicata (Thamnobia), 410.
fulicula (Porzana), 967.
fuliginiceps (Leptasthenura), 201.
fuliginiventris (Lusciniola), 371.
fuliginosa (Acredula), 467.
— (Artomyias), 265.
— (Buteola), 858.
— (Chalcomitra), 701.
— (Dendragapus), 824.
— (Dendrocincla), 186.
— (Geospiza), 608.
— (Hemichelidon), 1079.
— (Malacoptila), 48.
— (Oceanodroma), 1029.
*fuliginosa* (Œstrelata), 1033.
fuliginosa (Oreostruthus), 584.
— (Passerella), 635.
— (Phœbetria), 1039.
— (Phonipara), 618.
— (Psalidoprogne), 1079.
— (Puffinus), 1032.
— (Rhipidura), 277.
— (Rhyacornis), 273.
— (Schizœaca), 201.
*fuliginosa* (Scops), 885.
fuliginosa (Sterna), 1017.
— (Strepera), 501.
— (Turdus), 1093.
fuliginosus (Calamanthus), 360.
— (Calorhamphus), 38.
*fuliginosus* (Hæmatopus), 932.
foliginosus (Hemilophus), 82.
— (Larus), 1023.
— (Phaethornis), 1064.
— (Pitylus), 643.
— (Thamnophilus), 184.
fuligula (Cotyle), 257.
fulleborni (Alethe), 411.
— (Butalis), 1079.
— (Campothera), 1057.
— (Caprimulgus), 1063.
— (Cinnyris), 699.
— (Hyphantornis), 563.
fulleborni (Laniarius), 492.
— (Macronyx), 449.
— (Melanoparus), 460.
— (Pseudogyps), 1116.
fulva (Argya), 324.
— (Bowdleria), 338.
— (Charadrius), 937.
— (Dendrocygna), 987.
— (Petrochelidon), 258.
fulvescens (Accentor), 381.
— (Aquila), 852.
— (Catharus), 394.
— (Chamæza), 171.
— (Gerygone), 268.
— (Gyps), 830.
— (Illadopsis), 336.
— (Junco), 629.
*fulvescens* (Phylloscopus), 378.
fulvescens (Syrnium), 891.
fulvicapilla (Dryodromas), 354.
*fulvicauda* (*Myiosobus*), 315.
fulvicauda (Suthora), 471.
fulviceps (Hapalocercus), 234.
— (Pipilopsis), 649.
— (Thlypopsis), 653.
fulvicervix (Calliste), 668.
fulvicollis (Osmotreron), 734.
fulvicrissa (Euphonia), 673.
fulvidus (Bucco), 47.
fulvifacies (Cryptolopha), 286.
fulvifasciatus (Yungipicus), 75.
fulvifrons (Cisticola), 365.
— (Empidonax), 247.
— (Glycyphila), 717.
— (Suthora), 471.
fulvigula (Anas), 990.
— (Timeliopsis), 727.
fulvigularis (Chlorospingus), 1111.
— (Malacoptila), 48.
— (Myiobius), 245.
*fulvipectoris* (Crateroscelis), 333.
fulvipectus (Lophortyx), 819, 1116.
— (Rhynchocyclus), 242.
*fulviventer* (Cryptolopha), 285.
fulviventris (Brachygalba), 46.
— (Caprimulgus), 124.
— (Grallaria), 170.
— (Leptoptila), 768.
— (Myiagra), 283.
— (Myrmotherula), 179.
— (Pachycephala), 477.
— (Phyllostrophus), 314.
— (Timeliopsis), 727.
— (Tylas), 317.
fulvocinerea (Ptilotis), 722.

Digitized by Google

*fulvolateralis* (Acrocephalus), 368.
fulvotincta (Pachycephala), 477.
*fulous* (Drymocataphus), 334.
fulvus (Gyps), 829.
— (Hemilophus), 81.
— (Phaeton), 1004.
fumicolor (Ochthœca), 226.
fumida (Merula), 398.
fumifrons (Euscarthmus), 232.
— (Perisoreus), 511.
fumigata (Anorthura), 427, 1096.
— (Uroloncha), 586.
fumigatus (Eleopicus), 75.
— (Melipotes), 728.
— (Nephœcetes), 129.
— (Ochthodiæta), 225.
— (Turdus), 401.
fumosa (Buteo), 856.
— (Catharus), 393.
— (Centurus), 1058.
— (Chætura), 128.
fumosus (Automolus), 195.
funebris (Laniarius), 492.
— (Halcyon), 110.
— (Hemilophus), 82.
— (Percnostola), 175.
— (Tridactylia), 73.
funerea (Drepanis), 691.
— (Hypochœra), 574, 1108.
— (Lanius), 483.
*funerea* (Surnia), 894.
fenereus (Calyptorhynchus), 2.
— (Melanoparus), 460.
— (Oryzoborus), 613.
furcata (Dicrocercus), 95.
— (Oceanodroma), 1029.
— (Progne), 259.
— (Siptornis), 199.
— (Strix), 899.
— (Thalurania), 144.
— (Xema), 1020.
furcatoides (Thalurania), 144.
furcatus (Anthus), 448.
— (Ceratotriccus), 233.
— (Elasas), 863.
furcifer (Heliomaster), 160.
furcifera (Hydropsalis), 120.
furvus (Troglodytes), 425.
*fusca* (Alcippe), 345.
fusca (Aplonis), 541.
— (Casiornis), 214.
*fusca* (Ciconia), 906.
fusca (Cercomela), 391.
— (Certhidea), 689.
— (Elæocerthia), 702.
fusca (Florisuga), 134.
— (Gerygone), 269.
— (Glycyphila), 717.
— (Iodopleura), 217.
— (Malacoptila), 47.
— (Mylochanes), 250.
— (Ninox), 888.
— (Oedemia), 999.
— (Ptilotis), 720.
— (Rallina), 966.
— (Rhinocrypta), 167.
— (Turdus), 1093.
*fusca* (*Zosterops*), 269.
fuscans (Uroloncha), 586.
fuscata (Eos), 29.
— (Lusciniola). 371.
— (Margarops), 414.
— (Merula), 397.
— (Padda), 588.
fuscater (Catharus), 393, 1092.
fuscatra (Merula), 395.
fuscatus (Empidochanes), 246.
*fuscatus* (Empidonax), 247.
fuscatus (Lanius), 485.
fuscescens (Leptasthenura), 201.
— (Monarcha), 290, 1083.
*fuscescens* (Turdus), 402.
fuscescens (Syrnium), 890.
fuscicapilla (Galbula), 45.
— (Nemosia), 653.
— (Scotocichla), 334.
— (Zosterops), 711.
*fuscicapillus* (Copurus), 229.
fuscicapillus (Corvus), 504.
— (Hylophilus), 474.
— (Philemon), 726.
— (Picolaptes), 188.
— (Poicephalus), 9.
fuscicauda (Phœnicothraupis), 657.
fuscicaudata (Amazilia), 1065.
— (Cercomela), 391.
— (Otocompsa), 304.
fusciceps (Thripophaga). 195.
— (Xenocichla), 310.
fuscicollis (Phalacrocorax), 1008.
— (Poicephalus), 9.
— (Tringa), 952.
fusciflavescens (Brachypodius), 308.
*fuscifrons* (Cyclopsitta), 34.
fuscifrons (Zosterops), 711.
fuscipennis (Ceophlœus), 82.
— (Dicrurus), 530.
— (Philydor), 194.
— (Tinamus), 781.
fuscirostris (Talegallus), 788.

Digitized by Google

fusciventris (Ptilotis), 721.
fusco-cærulescens (Hypotriorchis), 873.
fuscocinerea (Lathria), 213.
fuscoflava (Pachycephala), 478.
fusconota (Nigrita), 575.
fuscorufa (Rhipidura), 278.
fusco-rufa (Synallaxis), 198.
fusco-rufus (Ochthodiæta), 225.
fuscovirescens (Lamprocorax), 542.
fuscus (Accipiter), 845.
— (Acridotheres), 538.
— (Anabatoxenops), 192.
— (Anthus), 448.
— (Artamus), 534.
— (Cinclodes), 202, 1073.
— (Empidias), 251.
— (Larus), 1024.
*fuscus* (Megalestris), 1027.
fuscus (Melirrhophetes), 728.
*fuscus* (Ocydromus), 964.
fuscus (Pelecanus), 1006.
— (Picumnus), 83.
— (Pionus), 7.
— (Pipilo), 637.
— (Ptilopachys), 817.
— (Sclerurus), 1071.
— (Totanus), 916.
fytchii (Bambusicola), 817.
gabar (Melierax), 839.
gabbii (Pitangus), 243.
gabonensis (Cuculus), 51.
— (Dendropicus), 73.
— (Malaconotus), 489, 1103.
— (Pycnonotus), 305.
— (Stiphrornis), 358.
— (Tricholæma), 36, 1055.
gabonica (Anthreptes), 704.
gaikwari (Sylviella), 1089.
gaimardi (Elaïnea), 240, 1076.
— (Phalacrocorax), 1076.
gairdneri (Picus), 71.
galactodes (Agrobates), 374.
galactotes (Megalurus), 351.
galapagensis (Anous), 1019.
— (Dafila), 994.
— (Hæmatopus), 932.
galapagoensis (Asio), 878.
— (Buteo), 858.
— (Nesopelia), 758.
— (Porzana), 968.
galatea (Tanysiptera), 106.
galatheæ (Homorus), 195.
galbanus (Garrulax), 327.
galbina (Mionectes), 1075.
galbraithi (Thryophilus), 421.
*galbula* (Galbula), 45.
galbula (Hyphantornis), 563.
— (Oriolus), 525.
galeata (Basileornis), 538.
— (Gallinula), 974.
— (Metopia), 220.
— (Myiagra), 283.
— (Pauxis), 790.
— (Xanthoura), 514.
galeatum (Callocephalon), 2.
galeatus (Calopteryx), 234.
*galeatus* (Casuarius), 1050.
galeatus (Ceophloeus), 82.
*galeatus* (Lophotriccus), 233.
galeatus (Serresius), 743.
galericulata (Æx), 982.
*galericulata* (Sterna), 1016.
galericulatus (Platylophus), 509.
galerita (Cacatua), 2.
— (Corythornis), 113.
galeritus (Anorrhinus), 102.
— (Eustephanus), 157.
galgulus (Loriculus), 23.
galilegensis (Cypselus), 1064.
galinieri (Lioptilus), 1081.
*galliciensis* (Gecinus), 63.
gallicus (Circaetus), 833.
— (Cursorius), 930.
gallinaceus (Hydralector), 958.
*gallinago* (Gallinago), 953.
gallinaria (Gallinago), 953.
gallinula (Limnocryptes), 955.
*gallio* (Zosterops), 709.
gallopavo (Meleagris), 796.
galtoni (Saxicola), 390, 1092.
gambagæ (Alseonax), 1080.
— (Bessonornis), 410.
gambeli (Anser), 983.
— (Lanius), 484, 1103.
— (Lophortyx), 819, 1116.
— (Parus), 463.
— (Zonotrichia), 626.
gambensis (Dryoscopus), 492.
— (Plectropterus), 980.
gambiensis (Serpentarius), 827.
gambierana (Eopsaltria), 482.
gamblei (Pachycephala), 479, 1102.
ganeesa (Hypsipetes), 316.
*gardeni* (Nycticorax), 917.
gariepensis (Francolinus), 809.
gariepina (Motacilla), 443.
garleppi (Compsospiza), 628.
— (Crypturus), 783.
— (Merganetta), 1002.
*garleppi* (Phaethornis), 132.

Digitized by Google

garnoti (Halodroma), 1037.
*garnoti* (Priocella), 1033.
*garoensis* (Drymocataphus), 334.
*garretti* (Muscisaxicola), 1075.
garrula (Coracias), 92, 1060.
— (Manorhina), 724.
— (Ortalida), 793.
garrulus (Ampelis), 260.
— (Lorius), 29.
garzetta (Herodias), 912.
gaudichaudi (Dacelo), 104.
gaumeri (Attila), 214.
— (Chætura), 128.
— (Leptoptila), 770.
gavia (Puffinus), 1031.
gayi (Attagis), 780.
— (Chasiempis), 270.
— (Phrygilus), 640.
gedgei (Francolinus), 810.
geelvinkiana (Carpophaga), 744.
geelvinkianum (Dicæum), 678.
geelvinkianus (Megapodius), 787, 1115.
— (Monarcha), 290, 1083.
*geelvinkianus* (Ptilopus), 741.
*geelvinkiana* (Nasiterna), 24.
geisleri (Drepanornis), 520.
geislerorum (Ælurœdus), 523.
— (Eupetes), 319.
gelastes (Larus), 1023.
gemina (Ptilopus), 738.
genei (Formicivora), 178.
genestieri (Alcippe), 345, 1088.
genibarbis (Myiadectes), 407.
— (Thryothorus), 423.
— (Xenops), 192.
gentiana (Ceyx), 112.
geoffroyi (Charadrius), 937.
— (Claravis), 765.
— (Ithagenes), 797.
— (Neomorphus), 61.
— (Schistes), 159.
georgiana (Eopsaltria), 481.
— (Melospiza), 632.
georgica (Querquedula), 993.
geospizopsis (Passerculus), 631.
germaini (Dryonastes), 328.
— (Molpastes), 305.
— (Polyplectron), 796.
germana (Petasophora), 145.
— (Ptilotis), 722.
germani (Collocalia), 129.
— (Gallinula), 974.
*gerontodes* (Pionus), 7.
gestroi (Ptilopus), 739.
ghiesbreghti (Leucopternis), 860.
gibbericeps (Balearica), 923.
gibberifrons (Querquedula), 993.
gierowi (Pyromelana), 572.
*gierræ* (Chætura), 128.
giffardi (Cossypha), 409.
— (Galerida), 458.
gigantea (Chætura), 127.
— (Coracocichla), 1073.
— (Fulica), 977.
— (Gallinago), 954.
— (Grallaria), 171.
— (Ibis), 901.
— (Leguatia), 978.
— (Ossifraga), 1036.
— (Pelargopsis), 114.
*giganteus* (Argusianus), 795.
— (Bucco), 47.
giganteus (Lanius), 483.
gigantodes (Merula), 395.
gigantura (Diaphorillas), 1088.
*gigas* (Aramides), 964.
gigas (Collocalia), 1064.
— (Coua), 60.
— (Dacelo), 104, 1062.
— (Merula), 395, 1092.
— (Patagona), 135.
*gigliolii* (Emberiza), 623.
gigliolii (Montifringilla). 595.
gilberti (Pachycephala), 479.
gilletti (Mirafra), 455.
gilolensis (Melitograis), 726.
gilva (Nyctidromus), 1063.
gilvicollis (Micrastur), 838.
*gilvigaster* (Thamnophilus), 183.
gilviventris (Xenicus), 206.
gilvus (Mimus), 416, 1095.
— (Vireo), 472.
gindiana (Afrotis), 924.
gingalensis (Alophius), 103.
gingica (Arboricola), 814.
ginginiana (Neophron), 831.
ginginianus (Acridotheres), 538.
giraudi (Otocorys), 452.
— (Pendulinus), 558.
girrenera (Haliastur), 862.
githaginea (Erythrospiza), 596.
giu (Scops), 882, 1117.
giulianetti (Gerygone), 1080.
glaber (Sublegatus), 241, 1076.
glabricollis (Cephalopterus), 218.
glabripes (Scops), 884.
glabrirostris (Melanoptila), 414.
glacialis (Colymbus), 1039.
— (Fratercula), 1046.
— (Fulmarus), 1036.

Digitized by Google

glacialis (Harelda), 999.
glacialoides (Priocella), 1033.
gladiator (Malaconotus), 490.
glandarius (Coccystes), 49.
— (Garrulus), 510.
glareola (Totanus), 948.
*glauca* (Chenorhamphus), 275.
glauca (Diglossa), 686.
*glauca* (Erythrura), 583.
glaucescens (Larus), 1025.
— (Xanthoura), 515.
glaucion (Clangula), 998.
glaucocærulea (Guiraca), 612.
glaucocolpa (Tanagra), 662.
glaucodes (Larus), 1022.
glaucogaster (Branta), 985.
glaucogularis (Acredula), 467.
— (Capito), 42.
— (Dacnis), 687.
*glaucoides* (Larus), 1026.
glaucopis (Thalurania), 143.
glaucopoides (Eriocnemis), 154.
glaucops (Strix), 899.
glaucovirens (Lamprocolius), 547.
glaucura (Pachycephala), 477.
glaucurus (Eurystomus), 93.
glaucus (Anodorhynchus), 10.
— (Larus), 1026.
*glaucus* (Phalacrocorax), 1008.
glaucus (Thamnomanes), 180, 1070.
glaux (Athene), 894.
glitschi (Aquila), 852.
*globicera* (Carpophaga), 743.
globicera (Crax), 789.
globulosa (Crax), 790.
*glocitans* (Querquedula), 992.
gloriosa (Diglossa), 685.
glottis (Totanus), 947.
glupischa (Fulmarus), 1036.
glyceria (Zodalia), 158.
gnatho (Euphonia), 673.
gnathophila (Mino), 540.
gnoma (Glaucidium), 896.
godeffroyi (Halcyon), 108.
— (Monarcha), 289.
godini (Eriocnemis), 154.
*godlewskii* (Anthus), 447.
godlewskii (Emberiza), 623.
godmani (Basileuterus), 439.
— (Chloronerpes), 65.
— (Cœreba), 691.
— (Colinus), 821.
— (Euphonia), 673.
— (Leptopogon), 237.
*goensis* (Lobivanellus), 934.
gœringi (Brachygalba), 46.
*gœringi* (Campylopterus), 134.
gœringi (Chlorospingus), 652.
goertan (Mesopicus), 76.
goffini (Cacatua), 3.
— (Trachyphonus), 41.
goiavier (Lædorusa), 306.
goisagi (Gorsachius), 918.
*goldiei* (Cinclosoma), 319.
goldiei (Glossopsitta), 31.
— (Macropygia), 755, 1114.
*goldiei* (Ninox), 890.
goldmani (Antrostomus), 1063.
— (Crypturus), 784.
— (Dendroeca), 435, 1097.
— (Momotus), 1061.
— (Trogon), 1060.
goliath (Ardea), 909.
— (Centropus), 55.
— (Phænorhina), 747.
golzi (Chlorodyta), 353.
golzii (Aedon), 382.
gongonensis (Passer), 1109.
goodenoviensis (Ninox), 889.
goodenovii (Petroeca), 267.
goodfellowi (Thryothorus), 1095.
— (Turdus), 1093.
goodsoni (Columba), 1114.
goramensis (Myiagra), 283.
gordoni (Hirundo), 255.
gorii (Gecinus), 64.
*gossi* (Sula), 1012.
goudoti (Chamæpetes), 794.
— (Cyanophaia), 137.
gouldi (Acrocephalus), 369.
— (Anthus), 446.
— (Ardeiralla), 915.
— (Calliste), 665.
*gouldi* (Circus), 836.
gouldi (Euphonia), 673.
*gouldi* (Eupsychortyx), 819.
gouldi (Lophornis), 165.
*gouldi* (Malurus), 367.
— (Melospiza), 633.
gouldi (Merula), 397.
— (Monarcha), 289.
— (Pelargopsis), 114.
— (Phalacrocorax), 1010.
— (Phonygammus), 517.
— (Psalidoprymna), 158.
— (Zosterops), 706.
gouldiæ (Æthopyga), 696.
— (Poephila), 585.
gouldii (Selenidera), 44.
gounellei (Phaethornis), 132.

Digitized by Google

govinda (Milvus), 863.
goyderi (Amytes), 349.
grace-annæ (Pendulinus), 557.
graciæ (Dendroeca), 434, 1097.
gracilipes (Tyranniscus), 239.
gracilirostris (Catharus), 394.
— (Chlorocichla), 313.
*gracilirostris* (Drymornis), 187.
gracilirostris (Vireo), 473.
*gracilis* (Aphelocoma), 512.
— (Ægialitis), 941.
gracilis (Burnesia), 360.
— (Chlorocichla), 314.
— (Empidagra), 241.
— (Empidonax), 248, 1078.
— (Euphonia), 672.
— (Eutoxeres), 1065.
— (Geranospizias), 838.
— (Hypotriorchis), 872.
— (Leptosoma), 91.
— (Malacias), 325.
— (Mimus), 1095.
— (Oceanites), 1030.
— (Picolaptes), 188, 1071.
— (Prinia), 359.
— (Psalidoprymna), 158.
— (Ptilotis), 720.
— (Pyctorhis), 340, 1087.
*gracilis* (Rhinoptilus), 931.
gracilis (Rupornis), 858.
— (Sterna), 1015.
— (Tachornis), 126.
— (Tinnunculus), 871.
graculina (Sigmodus), 498.
— (Strepera), 501.
graculus (Fregilus), 516.
— (Phalacrocorax), 1008.
*græca* (Caccabis), 807.
græca (Parus), 1100.
graeffei (Pachycephala), 478.
grallaria (Fregetta), 1030.
*grallaria* (Speotyto), 895.
— (Stiltia), 929.
grallarius (Burhinus), 928.
graminea (Calliste), 666.
— (Melospiza), 633.
gramineus (Lampornis), 145.
— (Megalurus), 351.
— (Poocætes), 630.
— (Tanygnathus), 18.
grammica (Chondestes), 625.
grammiceps (Cryptolopha), 286.
— (Strachyrhis), 339.
grammicus (Celeus), 79.
— (Pseudoscops), 879.
grammithorax (Miglyptes), 77.
graminicola (Cistothorus), 425.
— (Siptornis), 200.
granadensis (Calliste), 668.
— (Capito), 41.
— (Dendroeca), 433.
— (Euscarthmus), 232.
— (Myiozetetes), 242.
— (Picumnus), 84.
— (Pyroderus), 218.
*granadensis* (Xiphorhynchus), 186.
granatina (Columbigallina), 763.
— (Pitta), 208, 1073.
granatinus (Uræginthus), 582.
grandidieri (Chætura), 128.
*grandidieri* (*Orthotomus*), 362.
grandior (Anthus), 447.
— (Monasa), 49.
— (Phonipara), 618.
— (Vireo), 472.
grandis (Acridotheres), 538.
— (Agelæus), 553.
— (Alcedo), 113.
— (Carpodacus), 603.
— (Cygnopsis), 984.
— (Hyphantornis), 563.
— (Jacamerops), 46, 1056.
— (Lamprocorax), 543.
— (Loxigilla), 614.
— (Melocichla), 363.
— (Motacilla), 443.
— (Munia), 587.
*grandis* (Myiozetetes), 241.
grandis (Niltava), 295.
— (Nyctibius), 118.
— (Oreopsittacus), 33.
— (Ruticilla), 385.
— (Saltator), 645.
— (Thryothorus), 1095.
— (Yungipicus), 75.
granti (Accipiter), 845.
— (Camaroptera), 1089.
— (Francolinus), 808.
— (Guttera), 805.
— (Lophoceros), 103.
— (Ninox), 889.
— (Phlogœnas), 773.
— (Sula), 1118.
— (Turdinulus), 1086.
grantia (Gecinulus), 67.
granulifrons (Ptilopus), 741.
*grata* (Elaïnea), 240.
grata (Malia), 342.
— (Sialia), 386.
gratiosa (Ochthoeca), 226.

Digitized by Google

gravis (Puffinus), 1031.
gravivox (Pomatorhinus), 326.
grawfurdi (Thriponax), 82.
grayi (Ammomanes), 459.
— (Ardeola), 913.
— (Argusianus), 795.
— (Chenorhamphus), 275.
— (Crax), 789.
— (Edoliisoma), 298.
— (Eucephala), 139.
*grayi* (Halcyon), 108, 109.
grayi (Leptocoma), 700.
— (Turdus), 401, 1093.
— (Zosterops), 708.
graysoni (Amazilia), 138.
— (Colinus), 820.
— (Harporhynchus), 417.
— (Icterus), 558.
— (Micropallas), 898.
— (Parula), 432.
— (Picus), 71.
— (Quiscalus), 560.
— (Turdus), 400.
— (Zenaidura), 757.
*grebnitskii* (Carpodacus), 602.
gregaria (Chætusia), 936.
gregorjewi (Turtur), 1114.
grenadensis (Loxigilla), 613.
— (Thryothorus), 422.
*greyi* (Ardea), 911.
— (Ocydromus), 964.
greyi (Pœoptera), 546.
— (Ptilopus), 736.
— (Stringops), 1.
grimmi (Lanius), 484.
grindæ (Psaltriparus), 466.
grinnelli (Regulus), 379.
grisea (Amphispiza), 627.
— (Aphelocoma), 512.
— (Cistothorus), 424.
— (Columba), 748.
— (Diuca), 641.
— (Formicivora), 177.
— (Muscisaxicola), 230.
— (Perisoreus), 1105.
— (Pyrrhulauda), 459.
— (Serphophaga), 236, 1075.
— (Spermophila), 615.
griseatus (Caprimulgus), 124.
*griseatus* (Lophostrix), 886.
griseicapilla (Carpophaga), 746.
griseicapillus (Dendrocopus), 185.
griseicauda (Osmotreron), 733.
*griseicauda* (Rhipidura), 277.
griseicauda (Rupornis), 858.
griseiceps (Apalis), 353.
— (Astur), 840.
— (Criniger), 311, 1085.
— (Basileuterus), 440.
— (Catharus), 393.
*griseiceps* (Furnarius), 204.
griseiceps (Glaucidium), 896.
— (Hylophilus), 475.
— (Microeca), 264.
— (Neositta), 682.
— (Pachycephala), 479.
— (Phyllomyias), 1076.
— (Piprites), 219.
— (Platyrhynchus), 231.
— (Saxicola), 389.
— (Tityra), 211.
— (Tyranniscus), 239, 1076.
griseicollis (Scytalopus), 166.
*griseifrons* (Canirallus), 965.
griseifrons (Nephœcetes), 1064.
griseigena (Podicipes), 1042.
griseigula (Camaroptera), 356.
— (Timeliopsis), 727.
griseigularis (Anthreptes), 704.
— (Attila), 214.
— (Columba), 752.
— (Pachyrhamphus), 212.
— (Pericrocotus), 302.
— (Phaethornis), 133.
*griseigularis* (Pyctorhis), 340.
griseigularis (Urospizias), 843, 1116.
*griseimentalis* (Sigmodus), 498.
griseinucha (Macropygia), 755.
— (Montifringilla), 595.
griseipectus (Carpophaga), 745.
*griseipectus* (Dendrortyx), 818.
griseipectus (Empidonax), 248.
— (Myrmeciza), 1069.
— (Pyrrhura), 1053.
— (Thryothorus), 423.
griseistriata (Erythropygia), 1094.
griseitincta (Reinwardtœnas), 756.
griseiventris (Crypturus), 782.
— (Hylophilus), 1102.
— (Parus), 461.
— (Pithys), 173.
— (Polyonomus), 157.
— (Pyrrhula), 607.
— (Synallaxis), 198.
— (Tetrastes), 823.
— (Zosterops), 707.
griseldis (Acrocephalus), 369.
griseobarbata (Vireo), 472.
griseocapilla (Phyllomyias), 238.
griseocephalus (Mesopicus), 77.



Digitized by Google

griseocristatus (Coryphospingus), 642.
griseoflava (Eremomela), 355.
*griseogularis* (Ammoperdix), 807.
griseogularis (Elaïnea), 240.
*griseogularis* (Eopsaltria), 481.
griseogularis (Sublegatus), 241.
griseolateralis (Cyphorhinus), 429.
griseo-murina (Schizœaca), 201.
griseonota (Pachycephala), 480.
griseonucha (Grallaria), 170.
griseopyga (Hirundo), 254.
griseosticta (Butalis), 262, 1079.
— (Hemichelidon), 1079.
griseostriatus (Francolinus), 809.
griseotincta (Zosterops), 709.
griseovirescens (Zosterops), 711.
griseoviridis (Camaroptera), 356.
*grisescens* (Belonopterus), 935.
grisescens (Clytorhynchus), 499.
griseus (Alophius), 103.
— (Bradyornis), 287.
— (Campylorhynchus), 419.
— (Crateropus), 330.
— (Empidonax), 1078.
— (Nycticorax), 917.
— (Puffinus), 1032.
— (Sittasomus), 191.
*griseus* (Tyrannus), 252.
grisola (Butalis), 262, 1079.
— (Pachycephala), 480.
grombczewskii (Tetraogallus), 806.
grossus (Pitylus), 643.
*gruberi* (*Onychotes*), 856.
grylle (Uria), 1043.
gryphus (Sarcorhamphus), 827.
guadeloupensis (Quiscalus), 560.
— (Speotyto), 895.
— (Thryothorus), 422.
guadelupensis (Salpinctes), 427.
— (Saltator), 646.
*guaiana* (Eucichla), 209.
gualanensis (Pendulinus), 558.
gualaquizæ (Pogonotriccus), 235.
*guarauna* (Aramus), 920.
guarauna (Plegadis), 903.
guarouba (Conurus), 11.
guarayanus (Thryophilus), 421.
guatemalæ (Chrysotis), 4.
— (Scops), 885.
— (Setophaga), 441.
— (Sialia), 386.
guatemalensis (Campophilus), 81, 1059.
— (Chlorophanes), 689.
— (Cyanomyia), 139.
— (Grallaria), 170.
*guatemalensis* (Porzana), 968.
guatemalensis (Sclerurus), 192, 1071.
— (Xanthoura), 515.
guatemozinus (Gymnostinops), 549.
guayabambæ (Myrmotherula), 1070.
guayaquilensis (Campophilus), 81.
gubernator (Agelæus), 553.
— (Enneoctonus), 487.
*guenbiensis* (Eos), 29.
guentheri (Alcedo), 113.
*guentheri* (Myzomela), 714.
guerilla (Micrastur), 837.
guerini (Gecinus), 64.
— (Oxypogon), 159.
guerrerensis (Automolus), 194.
— (Cyanomyia), 139.
*guglielmi* (Lorius), 29.
guglielmi III (Cyclopsitta), 33.
guianensis (Chætura), 128.
— (Cyclorhis), 476.
— (Hylocharis), 1066.
— (Leistes), 554.
— (Morphnus), 847.
— (Odontophorus), 822.
— (Phaethornis), 132.
— (Psittacula), 15.
— (Synallaxis), 198.
guildingi (Chrysotis), 4.
guilianettii (Gerygone), 268.
guilielmi (Paradisea), 518.
guillemardi (Dicrurus), 531.
— (Graucalus), 297.
— (Loxia), 1109.
guimarasensis (Iole), 312, 1085.
guimarensis (Leptocoma), 700.
guimeti (Klais), 164.
guinea (Columba), 749, 1114.
guineensis (Bucorvus), 99.
— (Dendropicus), 1058.
— (Irrisor), 1061.
*guinetta* (Actitis), 948.
*guira* (Guira), 62.
guira (Nemosia), 653.
guirahuro (Pseudoleistes), 554.
guisei (Ptilotis), 722.
gularis (Accipiter), 847.
— (Agapeta), 149.
— (Ardea), 911.
— (Argya), 324.
— (Aspatha), 95.
— (Campylorhynchus), 420.
— (Chloronerpes), 65.
— (Cichlopsis), 407.
— (Criniger), 311.
— (Cuculus), 51.

Digitized by Google

gularis (Eopsaltria), 482.
— (Eurystomus), 93.
— (Euscartlimus), 232.
— (Francolinus), 809.
— (Garrulax), 327.
— (Halcyon), 107.
— (Heteromorpha), 470.
— (Icterus), 558, 1107.
— (Illadopsis), 336.
— (Lamprocorax), 542.
— (Melittophagus), 96.
— (Melithreptus), 714.
— (Micropternus), 78.
— (Mixornis), 340.
— (Monticola), 393.
— (Myrmotherula), 179.
— (Nicator), 493.
— (Œstrelata), 1035.
— (Paroaria), 643.
— (Poliospiza), 599.
— (Ptilopus), 736.
— (Rhinomyias), 282.
— (Rhipidura), 279.
*gularis* (Rougetius), 965.
gularis (Rubigula), 308.
— (Sericornis), 367.
— (Suthora), 471, 1101.
— (Sylvia), 1090.
— (Synallaxis), 198.
— (Tephrodornis), 494.
— (Yuhina), 346, 1088.
gulgula (Alauda), 454.
gulielmi tertii (Diphyllodes), 519.
gulielmi (Poicephalus), 9.
gulliveri (Zosterops), 712.
*gundlachi* (Chordeiles), 118.
gundlachi (Colaptes), 63.
*gundlachi* (Conurus), 12.
gundlachi (Cooperastur), 844.
— (Dendroeca), 433.
*gundlachi* (Mimus), 415.
gundlachi (Quiscalus), 560.
— (Vireo), 473.
gurial (Pelargopsis), 114.
gurneyi (Anaplectes), 568.
— (Baza), 867.
— (Eucichla), 209.
— (Geocichla), 404, 1094.
— (Promerops), 727.
— (Pseudoptynx), 882.
— (Spizaëtus), 849.
gustavi (Anthus), 448.
— (Brotogerys), 16.
— (Malacothraupis), 1111.
guttacristatus (Chrysocolaptes), 80.
guttata (Æthomyias), 274.
— (Calliste), 666.
*guttata* (Ceryle), 114.
guttata (Cichladusa), 411, 1094.
— (Chlamydera), 523.
— (Chrysoptilus), 67.
*guttata* (Dendrocygna), 988.
guttata (Dendrornis), 189.
— (Geocichla), 404, 1094.
— (Henicurus), 450.
— (Laniarius), 491.
— (Margarornis), 191.
— (Myrmotherula), 179.
— (Ortalida), 793.
— (Salpinctes), 427.
— (Spermospiza), 571.
— (Staganopleura), 579.
— (Strachyrhis), 339.
guttaticollis (Fulvetta), 346.
— (Paradoxornis), 470.
— (Turdinulus), 332.
guttatoides (Dendrornis), 189.
guttatum (Todirostrum), 231.
guttatus (Campylorhynchus), 421.
— (Cooperastur), 844.
— (Ixonotus), 309.
*guttatus* (Myrmeciza), 175.
guttatus (Odontophorus), 822.
— (Psilorhamphus), 177.
— (Thamnophilus), 184.
— (Tinamus), 782.
guttifer (Picumnus), 84.
— (Tarsiger), 384, 1091.
— (Totanus), 947.
*guttula* (Monarcha), 289.
guttulata (Ceryle), 1062.
— (Dendrocygna), 988.
guttulatus (Anabazenops), 193.
— (Dysithamnus), 180.
— (Monarcha), 289.
gutturigera (Thripophaga), 195.
gutturalis (Anthus), 447.
— (Aramides), 963.
— (Buarremon), 648.
— (Chalcomitra), 701.
— (Cinclocerthia), 414.
— (Criniger), 311.
— (Francolinus), 808.
— (Helminthophaga), 1096.
— (Hirundo), 253.
— (Homorus), 195.
— (Irania), 383.
— (Myrmotherula), 179.
— (Neocichla), 412.
— (Pachycephala), 477.

Digitized by Google

gutturalis (Parula), 432.
— (Pelicinius), 491.
*gutturalis* (Phalacrocorax), 1007.
gutturalis (Phœnicothraupis), 657.
— (Pipra), 221.
— (Pterocles), 777.
— (Sericornis), 367.
— (Spermophila), 616.
gutturosa (Chiromachæris), 222.
guyi (Phaethornis), 132.
gymnocephala (Pityriasis), 501.
gymnocephalus (Picathartes), 516.
gymnocycla (Columba), 749.
gymnogenys (Æthocichla), 330.
gymnophthalma (Columba), 750.
gymnophthalmus (Turdus), 401.
*gymnophthalmus* (Verreauxia), 84.
gymnophthalmus (Yungipicus), 75.
gymnopis (Cacatua), 3.
*gymnopodus* (Scops), 883.
gymnops (Gymnopithys), 173.
— (Melipotes), 728.
gymnostoma (Parra), 958.
gyrfalco (Hierofalco), 876.
gyrola (Calliste), 667.
gyroloides (Calliste), 667.
haasti (Apteryx), 1049.
*haasti* (Sceloglaux), 887.
— (Xenicus), 206.
habeli (Geospiza), 609.
haberlini (Chlorostilbon), 141, 1066.
habroptilus (Stringops), 1.
hadramauticus (Amydrus), 1106.
hæmalea (Pyranga), 658.
*hæmastica* (Limosa), 916.
hæmatina (Spermospiza), 571.
hæmatocephala (Xantholæma), 40.
hæmatodes (Trichoglossus), 30.
hæmatogaster (Campophilus), 81.
hæmatonota (Myrmotherula), 179.
hæmatonotus (Psephotus), 25.
hæmatopus (Himantornis), 965.
hæmatopygius (Aulacorhamphus), 44.
hæmatorhynchus (Rhamphastos), 1056.
hæmatorrhous (Psephotus), 25.
hæmatostictum (Dicæum), 678.
hæmatostigma (Eleopicus), 76.
hæmatothorax (Malaconotus), 489, 1103.
hæmatotis (Pionopsitta), 7.
— (Pyrrhura), 14.
hæmatribon (Chrysocolaptes), 80.
hæmaturopygia (Cacatua), 3.
hæmorrhous (Cassicus), 551.
— (Conurus), 11.
— (Molpastes), 304.
hæsitanda (Astur), 841.
hæsitata (Cisticola), 364.
— (Œstrelata), 1033.
*hæsitata* (Priofinus), 1032.
*hagedash* (Hagedashia), 902.
hagenbecki (Phasianus), 1116.
hahni (Ara), 10.
hainana (Gracula), 539.
— (Siphia), 1083.
hainanus (Blythipicus), 1059.
— (Gecinus), 1057.
— (Pachycephalixus), 306.
— (Pyrotrogon), 1060.
haliaëtus (Pandion), 877.
halmaheræ (Semioptera), 519.
haloptila (Passerculus), 631.
halsueti (Spelæornis), 426.
hamadryas (Rhipidura), 278.
hamata (Dryoscopus), 493.
hamatus (Hosthramus), 865.
hambroecki (Scops), 883.
hamiltoni (Helianthea), 1067.
hammondi (Empidonax), 248.
hanapepe (Hemignathus), 693.
hancii (Oreocincla), 403.
hannahiæ (Calliste), 668.
hantu (Ninox), 890.
haplochrous (Urospizias), 842.
haplonota (Anorthura), 428.
— (Grallaria), 170.
— (Machlolophus), 464.
haplopteryx (Cænotriccus), 233.
hardwickii (Chloropsis), 317.
— (Yungipicus), 75.
hargitti (Melanerpes), 68.
*hargitti* (Pharomacrus), 86.
hargitti (Thriponax), 82.
harlani (Buteo), 856.
*harmandi* (Picus), 72.
harmani (Crossoptilon), 799.
harmonica (Colluricincla), 495.
harpyia (Thrasaëtus), 848.
harringtoni (Rhamphococcyx), 59.
harrisi (Gisella), 893.
— (Nannopterum), 1010.
— (Parabuteo), 858.
— (Picus), 71.
harrisoni (Pyrrhulauda), 459, 1100.
harterti (Batrachostomus), 116.
— (Certhia), 683.
— (Entomyza), 725.
— (Galerida), 457.
— (Geospiza), 1110.
— (Phlogophilus), 1067.
— (Polyxemus), 1068.

Digitized by Google

harterti (Schizœaca), 1072.
— (Turturœna), 753.
— (Upucerthia), 203.
— (Xenocichla), 310.
hartingi (Rhinoptilus), 931.
hartlaubi (Accipiter), 846.
— (Alophius), 103.
— (Campophaga), 300.
*hartlaubi* (Capito), 42.
— (Cisticola), 364.
hartlaubi (Crateropus), 330.
— (Cyanomitra), 702.
— (Dendropicus), 1058.
— (Erythropygia), 412.
— (Falcipennis), 825.
— (Francolinus), 810.
— (Larus), 1024.
— (Onycognathus), 545.
— (Otis), 926.
— (Penthetria), 573.
— (Pseudodacnis), 665.
— (Pteronetta), 981.
— (Turacus), 89.
harwoodi (Francolinus), 810.
hasselti (Leptocoma), 699.
hastata (Aquila), 852.
— (Scops), 886.
hatcheri (Muscisaxicola), 1075.
hattamensis (Pachycephalopsis), 481.
hausburgi (Campothera), 1057.
hauxwelli (Myrmotherula), 179.
— (Pendulinus), 557.
— (Porzana), 968.
— (Turdus), 401.
hawaii (Urospizias), 843.
hawaiiensis (Anous), 1019.
— (Corvus), 502.
hawkeri (Uræginthus), 583.
hayi (Calorhamphus), 38.
haynaldi (Iole), 312.
haynesii (Crateropus), 330.
hecki (Casuarius), 1051.
*hecki* (Chrysotis), 5.
hecki (Crax), 790.
— (Poephila), 584.
heckeli (Cyanocorax), 514.
*hectori* (Turnagra), 329.
hedwigæ (Chlorochrysa), 670.
*hedwigæ* (Metallura), 156.
heermanni (Larus), 1023.
— (Melospiza), 633.
heilprini (Cyanocorax), 514.
heinei (Colluricincla), 496.
— (Oreocincla), 403.
heinekeni (Sylvia), 375.
helenæ (Calypte), 163.
— (Hypothymis), 274.
— (Lophornis), 165.
— (Parotia), 522.
helenoræ (Eremomela), 355.
*heliaca* (Aquila), 851.
helianthea (Culicicapa), 282.
helias (Eurypyga), 921.
heliobates (Geospiza), 1110.
heliodori (Acestrura), 163.
helioeides (Pendulinus), 1107.
heliosylus (Zonerodius), 920.
helleri (Anorthura), 1096.
hellmayeri (Catharus), 1092.
heloisæ (Atthis), 163.
helveola (Syrnium), 890.
helvetica (Squatarola), 937.
helviventer (Hapalocercus), 234.
helviventris (Phlogœnas), 772.
— (Psaltriparus), 466, 1101.
*helvolus* (Turdus), 401.
hemichrysa (Myiodynastes), 244.
*hemidactylus* (Geranospizias), 838.
hemileuca (Cœligena), 148.
— (Hypocnemis), 174.
hemileucura (Lanius), 1102.
hemileucurus (Campylopterus), 134.
*hemileucurus* (Lagopus), 827.
hemileucurus (Phlogophilus), 154.
hemileucus (Passer), 598.
hemimelæna (Myrmeciza), 175.
hemiptilopus (Archibuteo), 854.
hemispila (Nucifraga), 506.
*hemixantha* (Eremomela), 356.
hemixantha (Microeca), 264.
hemprichii (Dendropicus), 73.
— (Larus), 1023.
— (Pratincola), 387.
*hendersoni* (Locustella), 370-71.
hendersoni (Podoces), 506.
— (Scops), 883.
henicogrammus (Urospizias), 843.
henicura (Doricha), 162.
henkei (Arses), 288.
— (Leptocoma), 699.
hennickei (Trochalopteron), 321.
henrici (Arboricola), 813.
— (Cœligena), 148.
— (Criniger), 311.
— (Dammeria), 1082.
— (Heliangelus), 155.
— (Leptopœcile), 379.
— (Tetraogallus), 806.
henricii (Megalæma), 39.
— (Trochalopteron), 321.

Digitized by Google

henryi (Chordeiles), 118.
— (Heliodoxa), 1067.
henshavi (Chamæa), 469.
*henshawi* (Selasphorus), 162.
henslowi (Ammodromus), 632.
hensoni (Hypsipetes), 316, 1086.
hensti (Astur), 839.
hepatica (Pyranga), 659.
heraldica (Estrelata), 1035.
herberti (Cryptolopha), 1082.
— (Thryothorus), 423.
herbicola (Tardivola), 639.
*herculis* (Pygoscelis), 1047.
herioti (Siphia), 292.
hermani (Pœcilodryas), 271.
herminieri (Cichlherminia), 403.
— (Melanerpes), 68.
hermonensis (Calandrella), 453.
hernsheimi (Ptilopus), 736.
herodias (Ardea), 910.
herraui (Chalcostigma), 156.
hesperia (Progne), 259.
hesperis (Corvus), 503.
hesperus (Helianthea), 151.
heterocerca (Cirrhipipra), 220.
— (Siptornis), 199.
heteroclitus (Geoffroyus), 17.
heteropogon (Chalcostigma), 156.
heterura (Ammomanes), 1100.
— (Euloxeres), 133.
— (Pyrocephalus), 246.
— (Siptornis), 1072.
heterurus (Monarcha), 290.
— (Xenops), 1071.
heudei (Paradoxornis), 470.
heuglini (Cossypha), 409.
*heuglini* (Cucullus), 51.
heuglini (Hyphantornis), 562.
— (Otis), 925.
heyi (Ammoperdix), 807.
hiaticula (Ægialitis), 939.
hiemalis (Anorthura), 427.
— (Junco), 629.
*hilarea* (Rhynchæa), 956.
hilaris (Henicorhina), 428.
hildebrandti (Francolinus), 810.
— (Hemixus), 315.
— (Notauges), 548.
— (Urobrachya), 573.
hildegardæ (Apalis), 353.
hillii (Mimus), 415.
himalayana (Certhia), 683.
— (Loxia), 605.
*himalayanus* (Cuculus), 51.
himalayensis (Dendrocitta), 508.
himalayensis (Gyps), 830.
— (Picus), 70.
— (Regulus), 379.
— (Sitta), 680.
— (Tetraogallus), 806.
hindei (Crateropus), 1066.
hindii (Cisticola), 364.
hiogaster (Urospizias), 842.
hippocrepis (Sturnella), 555.
hirsuta (Glaucis), 131.
*hirsuta* (Ninox), 887.
hirsuta (Tridactylia), 73, 1058.
hirsutum (Tricholæma), 36, 1055.
hirtensis (Anorthura), 427.
hirundinacea (Euphonia), 673.
*hirundinacea* (Hemipus), 497.
hirundinacea (Sterna), 1015.
hirundinaceum (Dicæum), 677.
hirundinea (Pholia), 1080.
hirundineus (Dicrocercus), 95.
hirundo (Eupetomena), 134.
*hirundo* (Sterna), 1015.
hispana (Corvus), 1104.
hispanica (Caccabis), 807.
hispaniensis (Perdix), 812.
hispaniolensis (Blacicus), 249.
*hispaniolensis* (Gyps), 830.
hispaniolensis (Passer), 597, 1109.
hispidus (Phaethornis, 132.
histrio (Eos), 28.
— (Pionopsitta), 7.
histrionica (Phaps), 767.
*histrionis* (Histrionicus), 999.
*hoamy* (Trochalopteron), 322.
hoazin (Opisthocomus), 794.
*hochstetteri* (Cyanorhamphus), 26.
hochstetteri (Notornis), 976.
hodgei (Thriponax), 82.
hodgsoni (Batrachostomus), 117.
— (Certhia), 684.
— (Columba), 750.
— (Cryptolopha), 286.
— (Motacilla), 443.
*hodgsoni* (Oreocincla), 404.
— (Palæornis), 19.
hodgsoni (Ruticilla), 385.
— (Siphia), 292.
— (Tarsiger), 384.
— (Thriponax), 82.
hodgsoniæ (Perdix), 812.
hoedti (Alopecœnas), 773.
— (Rhipidura), 279, 1081.
hoffmanni (Centurus), 69.
— (Formicarius), 172.
— (Pyrrhura), 14.

Digitized by Google

holboelli (Cannabina), 590.
— (Hierofalco), 876.
— (Podicipes), 1042.
holdereri (Archibuteo), 854.
— (Phasianus), 802.
holerythra (Rhectes), 495.
— (Scops), 1117.
holerythrus (Lipaugus), 213.
hollandi (Hapalocercus), 234.
*hollandi* (Thamnophilus), 184.
holochlora (Chloropipo), 219.
holochlorus (Conurus), 12.
— (Erythrocercus), 1081.
*holomelæna* (Psalidoprocne), 260.
holopolius (Edoliisoma), 1084.
— (Graucalus), 295, 1084.
holosericea (Drepanoptila), 741.
holosericeus (Amblycercus), 551.
— (Amblyrhamphus), 554.
— (Eulampis), 146.
holospilus (Spilornis), 834.
holospodia (Tænioptera), 225.
holostictus (Automolus), 194.
holoxanthus (Hyphantornis), 564.
holroydi (Micropternus), 78.
holsti (Machlolophus), 464.
holti (Iole), 312.
hombroni (Halcyon), 110.
homeyeri (Lanius), 483.
— (Pachycephala), 480.
— (Phylloscopus), 378.
homochlamys (Hæmophila), 634.
homochroa (Catamenia), 617.
— (Dendrocincla), 186.
— (Oceanodroma), 1029.
homochrous (Hadrostomus), 211.
*hondoensis* (Locustella), 370.
honorata (Eudynamus), 54.
hoopesi (Sturnella), 555.
hooveri (Dendroeca), 435, 1097.
hopkei (Carpodectes), 217.
hornbyi (Oceanodroma), 1029.
hornemanni (Cannabina), 590.
hornensis (Troglodytes), 425.
*horreorum* (Hirundo), 253.
horsfieldi (Æthopyga), 696.
— (Gennæus), 800.
— (Mirafra), 456.
— (Myiophoneus), 408.
*horsfieldi* (Oreocincla), 403.
horsfieldi (Pomatorhinus), 325.
hortensis (Sylvia), 374.
hortulana (Emberiza), 622.
hortulanus (Serinus), 601.
hortulorum (Merula), 397.
horus (Cypselus), 126.
hosei (Calyptomena), 205.
— (Dicæum), 676.
— (Oriolus), 527.
— (Siphia), 1083.
hoskinsi (Glaucidium), 896.
*hottentotta* (Querquedula), 993.
hottentotta (Turnix), 778.
hottentottus (Dicrurus), 530.
*houbara* (Houbara), 927.
hova (Mirafra), 455.
hovarum (Zosterops), 713.
hoyti (Otocorys), 452.
hubbardi (Francolinus), 808.
hudsoni (Cnipolegus), 229.
— (Siptornis), 200.
hudsonica (Limosa), 946.
hudsonicus (Numenius), 945.
— (Parus), 463.
hudsonius (Circus), 836.
huegeli (Gallinago), 955.
hueti (Alcippe), 345.
— (Urochroma), 8.
huhula (Ciccaba), 893.
huillensis (Serinus), 600.
hulli (Nesomimus), 416.
humberti (Paroaria), 1111.
humbloti (Ardea), 910.
— (Circus), 837.
— (Cyanomitra), 702.
humboldti (Eucephala), 139.
— (Pternistes), 811.
— (Pteroglossus), 43.
— (Spheniscus), 1049.
humei (Chrysophlegma), 67.
— (Coccothraustes), 611.
— (Halcyon), 109.
— (Molpastes), 305.
— (Phyllobasileus), 378.
— (Pyrrhospiza), 604.
— (Sphenocichla), 428.
— (Turdinulus), 1086.
humeralis (Agelæus), 553.
— (Bessonornis), 410.
— (Diglossa), 686.
— (Geopelia), 762.
— (Hæmophila), 634.
— (Lanius), 485.
— (Ninox), 889.
— (Penthetria), 1108.
— (Pitylus), 643.
— (Plegadis), 904.
— (Ptilopus), 739.
— (Terenura), 177.
humiæ (Phasianus), 803.

Digitized by Google

humicola (Siptornis), 200.
*humii* (Sturnus), 535.
— (Suthora), 471.
humilis (Campylorhynchus), 420.
— (Heterotetrax), 925.
— (Ixulus), 344.
— (Podoces), 506.
— (Polioaetus), 877.
— (Rallus), 1118.
— (Sericornis), 367.
— (Siptornis), 200.
— (Turtur), 761.
*humivagans* (Cistothorus), 425.
humivagans (Corythopis), 168, 1068.
*hunsteini* (Diphyllodes), 519.
hunsteini (Munia), 587.
— (Phonygammus), 517.
hunteri (Chalcomitra), 701.
— (Cisticola), 365.
huonensis (Goura), 775.
— (Ptilopus), 738.
hutchinsi (Branta), 984.
huttoni (Argya), 323.
*huttoni* (Phalacrocorax), 1010.
huttoni (Ptilopus), 738.
— (Vireo), 473.
hyacinthina (Halcyon), 1062.
— (Siphia), 292.
hyacinthinus (Anodorhynchus), 9.
*hyacinthus* (Porphyrio), 975.
hyalinus (Phaetornis), 1064.
hybrida (Chloëphaga), 985.
— (Hydrochelidon), 1013.
— (Laniarius), 491.
— (Turacus), 1060.
*hybridus* (Colaptes), 63.
— (Tetrao), 825.
hydrocharis (Tanysiptera), 106.
*hydrocorax* (Hydrocorax), 100.
hylophila (Ciccaba), 1117.
hyloscopa (Picus), 1058.
*hyogastra* (Ptilopus), 741.
hyperboreus (Chen), 982.
— (Lagopus), 827.
— (Phalaropus), 957.
— (Plectrophanes), 624.
hypermelæna (Parus), 643.
hypermetrus (Spilocorydon), 457.
hyperrhynchus (Bucco), 47.
hyperythra (Arboricola), 814.
— (Argya), 323.
— (Brachypteryx), 342.
— (Chlorura), 584.
— (Dumetia), 340.
— (Hirundo), 255.
hyperythra (Muscicapa), 263.
— (Muscicapula), 294.
— (Pachycephala), 479.
— (Rhipidura), 277.
hyperythrus (Campylopterus), 134.
— (Hypopicus), 70.
— (Odontophorus), 822.
— (Tarsiger), 384.
— (Thryothorus), 423.
hypocherina (Vidua), 574.
hypochlora (Thaluriana), 143, 1066.
hypochondriaca (Poospiza), 628.
— (Siptornis), 200.
hypochondriacus (Macrosphenus), 314.
— (Todus), 95.
hypochrysæa (Dendroeca), 435.
hypochryseus (Vireo), 473.
hypocyaneus (Chlorestes), 140.
hypodila (Anthreptes), 704.
hypœnochroa (Columba), 752.
hypœnochrous (Lorius), 29.
hypogæa (Speotyto), 895.
hypoglaucus (Andigena), 43.
— (Oxyrhamphus), 224.
hypogramma (Ninox), 889.
hypogrammica (Anthreptes), 703.
— (Pytelia), 578.
hypolais (Zosterops), 708.
hypoleuca (Actitis), 948.
— (Alethe), 410.
— (Aphelocoma), 512.
— (Circaetus), 833.
— (Cissa), 509.
— (Crateropus), 330.
— (Grallaria), 170.
— (Gymnorhina), 500.
— (Haliaëtus), 853.
— (Haplopelia), 1115.
— (Heterocnemis), 175, 1069.
— (Œstrelata), 1034.
— (Pœcilodryas), 271.
— (Serphophaga), 236.
— (Spermophila), 615.
— (Thryophilus), 1095.
hypoleucum (Dicæum), 679.
hypoleucus (Artamus), 534.
— (Basileuterus), 439.
— (Capito), 41.
— (Elanus), 864.
— (Endomychura), 1044.
— (Eupsychortyx), 820.
— (Falco), 875.
— (Graucalus), 296.
*hypoleucus* (Malurus), 368.
hypoleucus (Melanotis), 417.

Digitized by Google

hypoleucus (Myrmochanes), 176.
— (Phalacrocorax), 1010.
— (Pomathorinus), 326.
— (Sphecotheres), 528.
hypomelæna (Cercomacra), 176.
*hypomelæna* (Parra), 958.
hypomelas (Pendulinus), 557.
hypophæa (Hadrostomus), 211.
hypophæus (Chlorospingus), 651.
hypophonius (Aprosmictus), 21.
hypopinaria (Coccystes), 49.
hypopolius (Centurus), 69.
hypopyrrha (Aulia), 213.
*hypopyrrhus* (Malaconotus), 489.
hypospodia (Elaïnea), 240.
— (Pinarochroa), 388.
— (Synallaxis), 197.
hypospodius (Buteo), 857.
— (Dendrortyx), 818.
— (Thryothorus), 423.
hyposticta (Siptornis), 199.
hypostictus (Campylorhynchus), 420.
— (Crateropus), 329.
— (Talaphorus), 135.
*hypoxantha* (Burnesia), 359.
hypoxantha (Chelidorhynx), 274.
*hypoxantha* (Cisticola), 363.
hypoxantha (Eremomela), 356.
— (Euphonia), 673.
— (Gerygone), 268.
— (Hypocnemis), 173.
— (Pachycephala), 480.
— (Prinia), 358.
— (Pyrrhura), 1053.
— (Spermophila), 615.
— (Zosterops), 711.
*hypoxanthus* (Andropadus), 313.
hypoxanthus (Attila), 214.
*hypoxanthus* (Pœcilodryas), 272.
hyrcana (Erithacus), 382.
hyrcanus (Garrulus), 510.
*hysginus* (Pyrrhulopsis), 21.
ianthinogaster (Uraeginthus), 583.
ibidis (Chasiempis), 270, 1080.
ibis (Pseudotantalus), 905.
ichthyaëtus (Larus), 1021.
— (Polioaëtus), 877.
icterica (Chrysomitris), 592.
ictericus (Criniger), 311.
icterina (Chloropeta), 274.
— (Hypolais), 373.
icterocephala (Calliste), 666.
— (Chloropsis), 318.
*icterocephalus* (Calypte), 163.
icterocephalus (Xanthosomus), 553.
icteroides (Pachycephala), 478.
— (Pycnorhamphus), 611.
icteromelas (Chrysoptilus), 66.
icteronotus (Rhamphocœlus), 660.
*icterophrys* (Myiozetetes), 241.
icterophrys (Sisopygis), 228.
icteropygialis (Chlorodyta), 354.
icteropygus (Saltator), 645.
icterorhyncha (Scops), 885.
icterorhynchus (Francolinus), 810.
icterotis (Conurus), 11.
— (Geothlypis), 437, 1089.
— (Platycercus), 24.
ictinus (Milvus), 862.
idæ (Ardeola), 913.
idahoensis (Scops), 885.
idaliæ (Phaethornis), 132.
idia (Anthreptes), 704.
igata (Gerygone), 268.
*ignatii* (Campophaga), 300.
ignavus (Bubo), 880.
ignea (Cardinalis), 619.
— (Pendulinus), 557.
— (Terpsiphone), 1081.
igneus (Pericrocotus), 301.
*igneus* (Plegadis), 903.
igneiventris (Cinnyris), 698.
ignicapilla (Prionochilus), 675.
ignicapillus (Regulus), 379.
ignicauda (Æthopyga), 696.
igniceps (Heteropelma), 223.
ignicolle (Dicæum), 677.
ignicrissa (Pœcilothraupis), 664.
ignifera (Pipra), 1074.
igniferum (Dicæum), 677.
*ignipalliatus* (Phœnicopterus), 908.
ignipectus (Dicæum), 679.
ignita (Lophura), 798.
ignitus (Lamprocolius), 546.
— (Platycercus), 24.
igniventris (Pœcilothraupis), 664.
ignobilis (Automolus), 194.
— (Chlorospingus), 651.
— (Momotus), 94.
— (Turdus), 401.
ignota (Geothlypis), 437.
— (Xiphocolaptes), 188.
ignotincta (Minla), 343.
ignotus (Drymocataphus), 334.
— (Seleucides), 520.
iheringi (Picumnus), 84.
ijiima (Emberiza), 623.
ijimæ (Acanthopneuste), 377.
illex (Terpsiphone), 1081.
iliaca (Passerella), 635.



Digitized by Google

iliacus (Turdus), 399.
*iliceti* (Garrulus), 510.
iliolophus (Melilestes), 718.
imberbe (Ornithion), 238, 1076.
imberbis (Pomatorhinus), 326.
— (Serinus), 600.
imbricata (Oreocincla), 403.
imbricatum (Trochalopteron), 322.
imerina (Neocossyphus), 410.
immaculata (Celeus), 79.
*immaculata* (Herodias), 912.
— (Porzana), 968.
immaculatus (Accentor), 381.
— (Anabazenops), 192.
*immaculatus* (Brachypodius), 308.
immaculatus (Henicurus), 449.
— (Myrmelastes), 181.
— (Saltator), 646.
immanis (Aphelocoma), 1105.
immodestus (Pericrocotus), 302, 1084.
immundus (Lipaugus), 213.
immutabilis (Diomedea), 1038.
impennis (Alca), 1043.
imperator (Grallaria), 170.
imperatrix (Eugenia), 150.
imperialis (Amazona), 1053.
*imperialis* (Aquila), 851.
imperialis (Campophilus), 80.
— (Gallinago), 955.
*imperialis* (Phalacrocorax), 1009.
impetuani (Fringillaria), 624.
impeyanus (Lophophorus), 798.
impiger (Euscarthmus), 233.
importunus (Andropadus), 313.
improbus (Tyranniscus), 239.
imthurmi (Agelæus), 553.
inauris (Anthochæra), 724.
inca (Bourcieria), 151.
*inca* (Empidonomus), 252.
inca (Nænia), 1018.
— (Rhamphastos), 42.
— (Scardafella), 762.
incana (Cisticola), 363.
— (Eminia), 353.
— (Estrelda), 582.
— (Glycyphila), 717.
incanescens (Phyllomyias), 1076.
incanus (Totanus), 947.
*incarnata* (Erythrospiza), 596.
incasta (Leptopogon), 1076.
incei (Terpsiphone), 280.
incerta (Geospiza), 609.
*incerta* (Lusciniola), 371.
incerta (Œstrelata), 1034.
— (Turturœna), 753.
incerta (Zosterops), 711.
incertum (Edoliisoma), 299.
incertus (Eupetes), 319.
— (Psittinus), 21.
— (Thamnophilus), 184.
incognita (Megalæma), 39.
incognitus (Spodiopsar), 535.
*incommoda* (Crax), 789.
incomta (Eafnea), 240, 1076.
incompta (Geothlypis), 1097.
— (Merula), 395.
— (Phæomyias), 1076.
*incondita* (Eos), 29.
inconspicua (Gerygone), 1080.
inda (Ceryle), 115.
*indica* (Athene), 895.
indica (Chætura), 127.
— (Chalcophaps), 766.
— (Coracias), 92.
— (Hypotriorchis), 873.
— (Lusciniola), 371.
— (Passer), 597.
— (Rallus), 960.
— (Sypheotis), 926.
— (Upupa), 99.
indicator (Xenocichla), 309.
*indicus* (Ægialitis), 939.
— (Anastomus), 906.
indicus (Anser), 983.
— (Butastur), 859.
— (Caprimulgus), 124.
*indicus* (Cuculus), 51.
indicus (Gyps), 830.
— (Limonidromus), 445.
— (Lobivanellus), 934.
— (Loriculus), 23.
— (Metopidius), 957.
— (Oriolus), 525.
— (Phaeton), 1005.
*indicus* (Porphyrio), 975.
indicus (Sturnus), 535.
— (Tarsiger), 384.
indigo (Stoparola), 291.
indigotica (Diglossa), 686.
— (Guiraca), 612.
indigoticus (Scytalopus), 166.
indoburmanica (Palæornis), 19.
*indranee* (Syrnium), 892.
indrani (Syrnium), 892.
indus (Haliastur), 862.
inepta (Megacrex), 964.
inerme (Ornithion), 238.
inexpectata (Collocalia), 129.
— (Cyanocorax), 514.
— (Strix), 900.

Digitized by Google

inexpectata (Sturnella), 556.
inexpectatus (Acrocephalus), 1090.
— (Chlorostilbon), 141.
— (Copsychus), 411.
— (Podargus), 1063.
— (Prionochilus), 675.
— (Rhamphocœlus), 661.
infaustus (Perisoreus), 511.
infelix (Monarcha), 290.
inflexirostris (Quiscalus), 560.
infortunata (Ploceus), 1107.
infrenata (Cyrtostomus), 1113.
infulata (Alseonax), 264.
— (Butalis), 1079.
infumata (Tachornis), 127.
infuscata (Acropternis), 168.
— (Agricola), 288.
*infuscata* (Glaucidium), 897.
infuscata (Henicopernis), 866.
— (Merula), 395.
*infuscata* (*Muscicapa*), 1081.
infuscata (Myzomela), 715.
infuscatus (Anthus), 446, 1098.
— (Cacomantis), 52.
— (Lanius), 483.
— (Miglyptes), 78.
— (Phimosus), 902.
*infuscatus* (Podicipes), 1041.
infuscatus (Pternistes), 811.
ingens (Dendropicus), 1059.
— (Scops), 886.
inglisi (Pomatorhinus), 326.
ingoufi (Tinamotis), 786.
*innexa* (Muscicapula), 294.
*innominata* (Campophaga), 301, 1084.
innominata (Ceyx), 111.
— (Collocalia), 129.
— (Pachycephala), 478.
— (Sterna), 1017.
— (Zosterops), 710.
*innominatus* (Caprimulgus), 124.
innominatus (Chrysococcyx), 1056.
— (Picumnus), 84.
innotata (Æthyia), 997.
— (Geocichla), 405.
— (Polioptila), 1091.
inocellatus (Chalcurus), 795.
inopinatus (Chalcurus), 1115.
inornata (Acanthiza), 366.
— (Adelomyia), 155.
*inornata* (Aplonis), 542.
— (Arachnothera), 705.
inornata (Calliste), 667.
— (Calopteryx), 234.
— (Catamenia), 617.
*inornata* (Charadrius), 938.
inornata (Chloëphaga), 985.
— (Chrysotis), 4.
— (Columba), 750.
— (Conopias), 242.
— (Crypturus), 784.
— (Gerygone), 268.
— (Haplopelia), 768.
— (Lamprocorax), 542.
— (Malacoptila), 48.
*inornata* (Megalæma), 39.
— (Myrmotherula), 179.
inornata (Parula), 432.
— (Phacelodomus), 196.
— (Pinaroloxias), 594.
— (Prinia), 359.
— (Serphophaga), 235.
— (Thlypopsis), 653.
— (Zosterops), 712.
inornatum (Dicæum), 679.
inornatus (Acomus), 798.
— (Amblyornis), 525.
— (Buarremon), 648.
— (Caprimulgus), 124.
*inornatus* (Cuculus), 51.
inornatus (Euscarthmus), 233.
— (Lophophanes), 465.
— (Monarcha), 289.
*inornatus* (Œdicnemus), 928.
inornatus (Philemon), 726.
— (Rhabdornis), 685.
— (Stephanibyx), 936.
— (Thamnophilus), 183.
inquieta (Scotocerca), 360.
— (Sisura), 288.
inquietus (Myiarchus), 250.
*inquietus* (Troglodytes), 425.
inquisitor (Tityra), 211.
inscriptus (Pteroglossus), 43.
insectivora (Bourcieria), 151.
inseparabilis (Cyclopsitta), 33.
insignibarbis (Lophornis), 165.
insignis (Aegotheles), 116.
— (Ardea), 909.
— (Artamus), 533.
— (Carpophaga), 746.
— (Chalcopsitta), 28.
— (Chalcostetha), 695.
— (Clytomyias), 275.
— (Colinus), 821.
— (Euphonia), 672.
— (Heterhyphantes), 565.
— (Hypotænidia), 962.
— (Melanoparus), 460.
— (Nemosia), 654.

Digitized by Google

insignis (Panterpe), 142.
*insignis* (Phasianus), 802.
insignis (Picolaptes), 188.
— (Poliohierax), 869.
— (Pratincola), 387.
— (Prodotiscus), 35.
— (Rhinomyias), 282.
— (Thamnophilus), 183.
insignita (Helianthea), 151.
insolens (Agriornis), 224.
— (Corvus), 503.
— (Myiodynastes), 1077.
insolitus (Ptilopus), 739.
inspeculata (Pitta), 209.
insperata (Gerygone), 268.
— (Lalage), 303.
insperatus (Cacomantis), 52.
*insperatus* (Parus), 461.
insularis (Amaurornis), 973.
*insularis* (Andropadus), 313.
insularis (Aphelocoma), 512.
— (Arses), 288.
— (Carpophaga), 744.
— (Centropus), 56.
— (Corvus), 1105.
— (Cyclorhis), 475.
— (Dicrurus), 530.
— (Eos), 29.
— (Fringillaria), 624.
— (Gerygone), 1080.
— (Gymnoscops), 887.
*insularis* (Hadrostomus), 211.
insularis (Junco), 629.
— (Leptoptila), 769.
— (Myiadectes), 1094.
— (Myiophoneus), 408.
— (Nyctidromus), 1063.
— (Oriolus), 526.
— (Ostinops), 550.
— (Otidiphaps), 774.
— (Otocorys), 1099.
— (Parula), 432.
— (Passer), 598.
— (Passerella), 635.
— (Phœnicothraupis), 657.
— (Picus), 72.
— (Platypsaris), 1073.
— (Platyrhynchus), 1075.
*insularis* (Prinia), 359.
insularis (Psittacula), 1053.
— (Quiscalus), 560.
— (Sarothrura), 969.
— (Strix), 899.
— (Tæniopygia), 580.
— (Terpsiphone), 280.
insularis (Thalassiornis), 1001.
— (Thryomanes), 424.
*insularis* (Traversia), 206.
insularis (Vireo), 473, 1101.
— (Zonotrichia), 626.
insulicola (Empidonax), 248, 1078.
intacta (Pachycephala), 477.
*intactus* (Gymnocrex), 963.
*intenus* (Casuarius), 1050.
intensus (Tarsiger), 1091.
*intercedens* (Gossypha), 409.
intercedens (Grallaria), 170.
— (Mirafra), 456.
— (Nothocercus), 782.
— (Ptilorhis), 521.
— (Pyromelana), 1108.
— (Rhynchops), 1020.
— (Tachyphonus), 656.
*interfringillacea* (Vini), 30.
intermedia (Arboricola), 813.
— (Bolbopsittacus), 22.
— (Buthraupis), 663.
— (Campophaga), 300.
— (Capito), 1056.
— (Carpophaga), 744.
— (Chalybura), 144.
— (Chamæa), 1101.
— (Chlorura), 584.
— (Chrysuronia), 1066.
— (Cœreba), 690.
— (Columba), 749.
— (Conirostrum), 686.
— (Cryptolopha), 285.
— (Cyanocorax), 514.
— (Cyanorhamphus), 26.
— (Dacelo), 104.
— (Formicivora), 177.
— (Geospiza), 609.
— (Gracula), 539.
— (Grallaria), 170.
— (Haliastur), 862.
— (Herodias), 912.
*intermedia* (Lusciniola), 371.
intermedia (Meleagris), 796.
— (Merula), 395.
*intermedia* (Microglossus), 1.
intermedia (Minla), 1088.
— (Molpastes), 304.
— (Monachalcyon), 105.
— (Myiagra), 283.
— (Numida), 804.
— (Pachycephala), 478.
— (Palæornis), 19.
— (Paradisea), 518.
*intermedia* (Parra), 958.

Digitized by Google

intermedia (Parus), 461.
— (Pelargopsis), 114.
— (Petronia), 1109.
— (Picus), 1058.
— (Pipilo), 637.
*intermedia* (Pipreola), 216.
— (Platalea), 904.
intermedia (Podargus), 117.
— (Quelea), 571.
— (Sigmodus), 498.
— (Sphenœacus), 337.
— (Strepera), 501.
— (Sturnus), 535.
— (Textor), 569.
— (Tiga), 1059.
— (Trichoglossus), 1054.
— (Upupa). 1061.
— (Urosticte), 154.
— (Xantholæma), 40.
— (Zonotrichia), 626.
— (Zosterops), 709.
intermedium (Dicæum), 678.
*intermedium* (Pellorneum), 336.
intermedius (Dendrocolaptes), 185.
*intermedius* (Elanus), 864.
— (Ceuthmochares), 60.
— (Cuculus), 51.
intermedius (Hemipus), 497.
— (Hyphantornis), 562.
— (Myrmelastes), 181.
*intermedius* (Onycognathus), 545.
— (Pachyrhamphus), 212.
— (Polyplectron), 796.
— (Porzana), 967.
intermedius (Prionops), 1104.
— (Pterythrius), 487.
*intermedius* (Tetrao), 825.
— (Tiga), 78.
— (*Trachypelmus*), 781.
intermedius (Troglodytes), 425.
interpres (Arenaria), 949.
— (Geocichla), 405.
interscapularis (Megalurus), 351, 1088.
— (Melanopteryx), 567.
involucris (Ardetta), 914.
iolæma (Cossypha), 409.
— (Ptochoptera), 142.
iolata (Petasophora), 145.
ionogaster (Ptilopus), 741.
*iora* (*Phœnicomanes*), 341.
iozonus (Ptilopus), 739.
iracunda (Ceratopipra), 220.
*iranica* (Otocorys), 1098.
irbii (Acredula), 467.
irena (Pitta), 207.
iridescens (Lampornis), 145.
— (Smaragdochrysis), 142.
iridina (Tanagrella), 670.
iriditorques (Turturœna), 753.
iris (Coccycolius), 547.
— (Helianthea), 151, 1067.
— (Neopsittacus), 33.
— (Pitta), 208.
irrorata (Diomedea), 1038.
— (Pogonorhynchus), 36.
irroratus (Dromæus), 1050.
— (Halcyon), 107.
irupero (Tænioptera), 225.
isaacsoni (Eugenia), 150.
isabella (Stiltia), 929.
isabellæ (Callene), 408.
— (Iodopleura), 217.
— (Oriolus), 527.
isabellina (Amaurornis), 973.
— (Galerida), 458.
— (Geositta), 204.
— (Saxicola), 390.
— (Sylviella), 355.
isabellinus (Calamanthus), 360.
— (Enneoctonus), 486.
— (Tinnunculus), 871.
— (Turtur), 759.
isauræ (Chalybura), 144.
isidorei (Lophotriorchis), 849.
isidori (Jacamerops), 46.
— (Pipra), 221.
isidorii (Pomatorhinus), 326.
islandica (Clangula), 998.
*islandicus* (Larus), 1026.
islandus (Hierofalco), 876.
ispida (Alcedo), 112.
ispidoides (Alcedo), 112.
isthmica (Rhamphocœlus), 1111.
isura (Rhipidura), 279.
isurus (Milvus), 863.
itala (Calandrella), 453.
italiæ (Passer), 597.
*italicus* (Parus), 1100.
itzensis (Pachyrhamphus), 1073.
iula (Psaltriparus), 466.
ixoides (Ptilotis), 722.
*jaburu* (Euxenura), 906.
jacana (Parra), 958.
jacapa (Rhamphocœlus), 660.
jacarini (Volatinia), 619
jacksoni (Alophius), 103.
— (Apalis), 353.
— (Barbatula), 37.
— (Bathmocercus), 1086.
— (Calamocichla), 1089.

Digitized by Google

jacksoni (Cryptospiza), 1108.
— (Cuculus), 1056.
— (Dryoscopus), 1104.
— (Francolinus), 810.
— (Hyphantornis), 562.
— (Illadopsis), 1087.
— (Irrisor), 98.
*jacksoni* (Nectarinia), 694.
jacksoni (Parisoma), 1081.
— (Penthetria), 574.
— (Platystira), 266.
— (Sylviella), 355.
— (Zosterops), 710.
jacobinus (Coccystes), 49.
jacquinoti (Ninox), 890.
— (Pachycephala), 478.
jacucaca (Penelope), 792.
jacula (Heliodoxa), 150, 1067.
jacunda (Amazilia), 1065.
— (Pipreola), 216.
jacupeba (Penelope), 791.
jacutinga (Cumana), 794.
jagoensis (Estrelda), 581.
— (Passer), 598.
jagori (Munia), 588.
jakal (Buteo), 856.
jala (Philepitta), 210.
jaliscensis (Elaïnea), 1076.
— (Sittasomus), 1071.
jalla (Sturnopastor), 536.
jamacaii (Icterus), 558.
jamaica (Pyrrhuphonia), 671.
jamaicæ (Sycalis), 601.
jamaicensis (Corvus), 504.
— (Crecisous), 971.
— (Erismatura), 1001.
— (Leptoptila), 769.
*jamaicensis* (Nyctanassa), 918.
jamaicensis (Nyctibius), 118.
— (Estrelata), 1034.
— (Pitangus), 243.
— (Turdus), 402.
jambu (Ptilopus), 736.
jamesi (Phœnicoparrus), 908.
— (Telephonus), 488.
jamesii (Phonygammus), 517.
jamesoni (Diaphorophyia), 265.
— (Gallinago), 954.
— (Heliodoxa), 150, 1067.
— (Hyphantornis), 564.
— (Lagonosticta), 577.
*jamesoni* (Larus), 1023.
jamesoni (Rhodornis), 357.
jani (Thamnophilus), 184, 1070.
jankowskii (Emberiza), 623.
janthina (Columba), 752.
japonensis (Corvus), 504.
— (Grus), 922.
japonica (Anthus), 447.
— (Certhia), 683.
— (Coccothraustes), 611.
— (Coturnix), 815.
*japonica* (Fulica), 977.
japonica (Gallinago), 954.
— (Hirundo), 255.
— (Loxia), 605.
*japonica* (Motacilla), 443.
japonica (Ninox), 887.
— (Nucifraga), 506.
— (Parus), 462.
— (Pericrocotus), 302.
— (Picus), 70.
*japonica* (Platalea), 904.
japonica (Regulus), 379.
— (Tinnunculus), 870.
*japonica* (Yunx), 85.
japonica (Zosterops), 706.
japonicus (Ampelis), 260.
— (Garrulus), 510.
*japonicus* (Scops), 883.
*jardinei* (Cinnyris), 697.
jardinei (Crateropus), 329.
— (Glaucidium), 897.
— (Panoplites), 152.
— (Picus), 71.
— (Spodiornis), 641.
— (Urospizias), 842.
*jardinii* (Circus), 837.
— (Sarothrura), 969.
javanensis (Batrachostomus), 117.
— (Gracula), 539.
— (Ketupa), 879.
— (Ploceela), 567.
— (Tiga), 78, 1059.
*javanica* (Acanthopneuste), 376.
javanica (Arboricola), 814.
— (Butorides), 916.
— (Dendrocygna), 988.
— (Hirundo), 253.
*javanica* (Hydrochelidon), 1013.
— (Loriculus), 22.
javanica (Merula), 398.
— (Mirafra), 456.
— (Mixornis), 340.
— (Rhipidura), 279.
— (Strix), 899.
— (Zosterops), 711.
javanicus (Acridotheres), 538.
— (Centropus), 56.
— (Eurylæmus), 205.

Digitized by Google

javanicus (Leptoptilus), 907.
*javanicus* (Palæornis), 19.
— (Pelecanus), 1005.
javanicus (Phalacrocorax), 1010.
— (Zanclostomus), 58.
*javensis* (Chloropsis), 318.
javensis (Graucalus), 296.
— (Megalæma), 38.
— (Thriponax), 82.
*jaxartica* (Ægithalus), 467.
jefferyi (Æthopyga), 696.
— (Chlamydochæra), 299.
— (Cissa), 508.
— (Pithecophaga), 834.
jelskii (Iridornis), 665.
— (Metallura), 155.
— (Ochthœca), 226.
— (Picumnus), 83.
— (Spodiornis), 641.
— (Thalurania), 143.
— (Upucerthia), 203.
jendaya (Conurus), 11.
jentinki (Dicrurus), 531.
— (Hypotænidia), 962.
jerdoni (Accentor), 381.
— (Ægialitis), 940.
— (Anthus), 446.
— (Baza), 867.
— (Chloropsis), 318.
— (Cryptolopha), 286, 1082.
— (Minla), 343.
— (Oreicola), 273.
*jerdoni* (Scops), 884.
— (Siphia), 293.
jerdoni (Sylvia), 374.
— (Timalia), 340, 1087.
— (Trochalopteron), 322.
jessieæ (Zenaida), 758.
*jessoensis* (Gecinus), 64.
jesupi (Octhoeca), 1075.
jheringi (Gisella), 893.
*jobiensis* (Dicæum), 678.
— (Diphyllodes), 519.
jobiensis (Geoffroyus), 17.
— (Lorius), 29.
— (Manucodia), 518.
— (Melidora), 105.
— (Pachycephala), 479.
— (Paradisea), 518.
— (Phlogœnas), 773.
— (Ptilopus), 739.
— (Rhectes), 495.
— (Talegallus), 788.
— (Tropidorhynchus), 725.
jocosus (Campylorhynchus), 420.
*jocosus* (Otocompsa), 304.
johannæ (Calospiza), 1112.
— (Cinnyris), 697.
— (Hemistephania), 130.
— (Phlogœnas), 773.
— (Prionochilus), 675.
johannis (Ptilopus), 740.
johni (Dissemurus), 1105.
— (Pachycephala), 1102.
johnsoni (Alethe), 411.
*johnstoni* (Dioptrornis), 287.
johnstoni (Francolinus), 810.
— (Gallirex), 1060.
— (Haplopelia), 768.
— (Mesopicus), 77.
— (Nectarinia), 694.
— (Tarsiger), 384.
jolyæa (Cyanolyca), 513.
jonesi (Caprimulgus), 1063.
— (Gennæus), 1115.
jonquillaceus (Ptistes), 20.
josephæ (Vireo), 472.
josephinæ (Charmosyna), 32.
— (Chrysuronia), 1066.
jotaka (Caprimulgus), 124.
*joudera* (Turnix), 779.
jourdani (Chætocercus), 163.
jouschistos (Acredula), 466.
jouyi (Basileuterus), 439.
— (Chrysomitris), 592.
— (Columba), 752.
*jouyi* (Hypotænidia), 961.
jouyi (Merula), 398.
jubaensis (Zosterops), 708.
jubata (Alopochen), 988.
— (Chenonetta), 986.
jubatus (Rhinochetus), 921.
juddi (Melospiza), 633.
juggur (Falco), 875.
*jugularis* (Ardea), 911.
jugularis (Brotogerys), 15.
— (Cyrtostomus), 703.
— (Eulampis), 146.
— (Francolinus), 809.
— (Micrastur), 838.
— (Miglyptes), 78.
— (Myzomela), 715.
juliæ (Arachnothera), 705.
— (Damophila), 140.
— (Halcyon), 108-109.
— (Leptocoma), 700.
— (Psalidoprymna), 158.
julius (Nothocercus), 782.
jumana (Celeus), 79.
*juninensis* (Geositta), 204.

Digitized by Google

juninensis (Muscisaxicola), 230.
— (Podicipes), 1041.
kadiaka (Montifringilla), 1109.
kædingi (Oceanodroma), 1029.
kaffensis (Campothera), 1057.
— (Zosterops), 710.
kakamegæ (Xenocichla), 1085.
kalaoensis (Siphia), 293.
kalckreuthi (Chalcomitra), 701.
kaleensis (Yungipicus), 74.
*kaleniczenkii* (Motacilla), 445.
kalidupæ (Scops), 1117.
kalinowskii (Dives), 559.
— (Macropsalis), 120.
— (Nothoprocta), 1115.
*kalinowskii* (Thriponax), 82.
kalulongæ (Malacopteron), 337.
kamtschatica (Corvus), 502.
*kamtschatica* (Motacilla), 443.
kamtschatica (Pyrrhula), 607.
*kamtschatica* (Simorhynchus), 1045.
kamtschatica (Tetrao), 825.
*kamtschaticus* (Picus), 70.
kamtschatkensis (Nucifraga), 506.
— (Parus), 463.
*kamtschatkensis* (Picus), 71.
kamtschatkensis (Pinicola), 606.
kandavensis (Pachycephala), 477.
kandti (Barbatula), 1056.
— (Estrelda), 1108.
kangeanensis (Centropus), 56.
— (Rhopodytes), 59.
— (Uroloncha), 585.
kannegietri (Graucalus), 297.
karelini (Enneoctonus), 486, 1103.
karu (Lalage), 303.
kasumba (Harpactes), 88.
kaupi (Arses), 288.
*kaupi* (Casuarius), 1051.
kaupi (Leucopternis), 860.
kaurensis (Dryonastes), 1086.
kavirondensis (Empidornis), 1082.
kawarahiba (Ligurinus), 610.
kearlandi (Ptilotis), 721.
keayi (Phlogœnas), 772.
keaysi (Ochthoeca), 1075.
*kebirensis* (Stigmatops), 719.
keiense (Dicæum), 677.
keiensis (Nasiterna), 24.
kelaarti (Spizaëtus), 849.
— (Uroloncha), 585.
*kelleni* (Neocichla), 412.
*kelungensis* (Cuculus), 51.
kemoensis (Dybowskia), 359.
*kenaiensis* (Melospiza), 633.
kennicotti (Scops), 886.
kenricki (Pœoptera), 546.
kenya (Chloropeta), 1081.
keraudreni (Phonygammus), 517.
kerberti (Crypturus), 783.
kerri (Celeus), 79.
kersteni (Sycobrotus), 566.
kerstingi (Macropygia), 755.
kessleri (Merula), 397.
kethullei (Pholidophalus), 1061.
kettlewelli (Macronus), 341.
keyensis (Geoffroyus), 16.
— (Gerygone), 269.
— (Macropygia), 755.
khasiana (Suya), 358.
*kiangsinensis* (Anthus), 446.
*kidderi* (Œstrelata), 1034.
kieneri (Lophotriorchis), 849.
— (Pyrgisoma), 636.
kienerii (Dendrornis), 190.
kikuyuensis (Francolinus), 809.
— (Xenocichla), 310.
— (Zosterops), 710.
kilimense (Glaucidium), 897.
kilimensis (Alcippe), 345, 1080.
— (Coccopygia), 580.
— (Geocichla), 1094.
— (Haplopelia), 768.
— (Nectarinia), 695.
— (Pyrrhospiza), 1109.
— (Smilorhis), 37.
kinabaluensis (Chloropsis), 318.
— (Cryptolopha), 1082.
kingi (Cyanolesbia), 157.
kinnisi (Merula), 396.
kintampoensis (Poicephalus), 1053.
kioloides (Canirallus), 965.
kirchoffi (Strix), 899.
kirki (Crateropus), 329.
— (Francolinus), 308.
— (Zosterops), 709.
kirkii (Chalcomitra), 701.
— (Eleopicus), 76.
kirtlandi (Dendroeca), 435.
— (Eleopicus), 76.
kismayensis (Laniarius), 1104.
kisserensis (Gerygone), 268.
— (Monarcha), 289, 1083.
— (Philemon), 726.
kisuki (Yungipicus), 74.
*kittlitzi* (Brachyrhamphus), 1044.
kittlitzi (Gygis), 1020.
— (Lamprocorax), 542.
*kittlitzi* (Larus), 1022.
kittlitzi (Ligurinus), 610.

Digitized by Google

*kittlitzi* (Tænioptera), 225.
klaasi (Chrysococcyx), 52.
*klæsii* (Chætura), 127.
klagesi (Lophornis), 1068.
klarki (Ixulus), 344.
*klecho* (Macropteryx), 130.
*kleei* (Tinamus), 781.
kleinschmidti (Erythrura), 584.
— (Galerida), 457.
*kleinschmidti* (Parus), 1100.
— (Petroeca), 267.
*klossowskii* (Phasianus), 802.
knudseni (Himantopus), 943.
*knudseni* (Puffinus), 1031.
kochi (Graucalus), 297.
— (Pitta), 209.
kœnigi (Caccabis), 807.
— (Cypselus), 126.
— (Fringilla), 589.
— (Gecinus), 64.
kolbi (Gyps), 830.
kollari (Synallaxis), 198.
komadori (Erithacus), 382.
*komarowi* (Phasianus), 802.
kona (Chloridops), 606.
kordensis (Monarcha), 290.
— (Rhipidura), 279.
kordoana (Hypocharmosyna), 32.
*korejewi* (Podicipes), 1041.
korejewi (Parus), 1100.
*korejewi* (Passer), 1109.
kori (Eupodotis), 927.
koroensis (Pyrrhulopsis), 21.
*korschun* (Milvus), 863.
korthalsi (Sphenocercus), 731.
koslowi (Accentor), 381.
— (Tetraogallus), 806.
kowaldi (Todopsis), 275.
kreffti (Mino), 540.
*kreffti* (Pitta), 208.
*kretschmeri* (Nigrita), 575.
kretschmeri (Phyllostrophus), 314.
krideri (Buteo), 856.
krueperi (Sitta), 681.
*krugi* (Gymnasio), 896.
*krynicki* (Garrulus), 510.
kuanzæ (Cinnyris), 698.
kubaryi (Corvus), 504.
*kubaryi* (Dacelo), 105.
kubaryi (Phlogœnas), 773.
— (Rhipidura), 277.
kuehni (Hypotænidia), 1118.
— (Myzomela), 1113.
— (Pachycephala), 480.
— (Pitta), 1073.
kubli (Puffinus), 1031.
— (Vini), 30.
kühni (Dicæum), 1112.
— (Dicrurus), 1105.
*kühni* (Eos), 28.
kühni (Gerygone), 1080.
kulambangræ (Monarcha), 1083.
— (Zosterops), 1113.
kumlieni (Larus), 1026.
kundoo (Oriolus), 525.
kurilensis (Anorthura), 427, 1096.
— (Pyrrhula), 607.
*kutteri* (Gorsachius), 918.
*labradora* (Hierofalco), 876.
labradoria (Falcipennis), 825.
*labradoria* (Lunda), 1046.
labradoria (Tridactylia), 1058.
labradorides (Calliste), 668.
labradorius (Camptolæmus), 1000.
lacera (Pionus), 7, 1053.
lacernulata (Carpophaga), 746.
— (Leucopternis), 860.
lacrymiger (Picolaptes), 187.
lacrymosa (Dendrornis), 189.
— (Pœcilothraupis), 664.
lacrymosum (Tricholæma), 36.
lacrymosus (Euthlypis), 442.
lactea (Agyrtria), 136.
— (Glareola), 930.
— (Polioptila), 380.
lacteifrons (Colius), 91.
lacteus (Bubo), 881.
*lacteus* (Pseudotantalus), 905.
lacuum (Dendropicus), 74, 1059.
ladoensis (Cisticola), 364.
— (Pyromelana), 572.
læmosticta (Myrmeciza), 174.
— (Synallaxis), 198.
lamostictus (Dicrurus), 531.
læta (Agyrtria), 1065.
— (Alcyone), 113.
— (Ceyx), 1062.
— (Cryptolopha), 1082.
— (Hæmophila), 634.
— (Microeca), 1080.
— (Zosterops), 709.
lætiscapa (Rhipidura), 280.
lætissimus (Andropadus), 313.
lætitior (Eurystomus), 93.
lætior (Melithreptus), 714.
— (Oriolus), 528.
lætus (Thryothorus), 423.
lævigastra (Gerygone), 269.
— (Sericornis), 367.
lafargei (Myzomela), 715.



Digitized by Google

lafayettei (Gallus), 803.
lafresnayana (Myrmotherula), 179.
lafresnayanus (Eulabeornis), 963.
— (Xiphorhynchus), 187.
lafresnayei (Dendrocincla), 186.
— (Picumnus), 84.
lafresnayi (Aëthorhynchus), 341.
— (Dendropicus), 73.
— (Diglossa), 686.
— (Melittophagus), 96.
— (Xenopirostris), 499.
lagdeni (Malaconotus), 489.
*laglaizei* (Casuarius), 1051.
— (*Chloromyias*), 674.
lagopoda (Chelidon), 256.
*lagopoides* (Lyrurus), 826.
lagopus (Archibuteo), 854.
lagrandieri (Megalæma), 39.
lagunæ (Sitta), 681.
lahtora (Lanius), 484, 1103.
lamberti (Malurus), 368.
lamelligerus (Anastomus), 907.
lamellipennis (Xipholena), 217.
laminirostris (Andigena), 43.
*lamperti* (Chalcomitra), 701.
lamprocephala (Auriparus), 468.
lanaiensis (Hemignathus), 693.
— (Phæornis), 284.
*lanarius* (Falco), 875.
lanceolata (Chiroxiphia), 222.
— (Locustella), 371.
— (Micromonacha), 48.
— (Rhinocrypta), 167.
lanceolatus (Babax), 320.
— (Garrulus), 511.
— (Plectrorhynchus), 714.
— (Spizaëtus), 849.
landanæ (Cisticola), 364.
— (Ixonotus), 309.
— (Lagonosticta), 577.
langsdorffi (Prymnacantha), 165.
— (Selenidera), 44.
languida (Hypolais), 373.
laniirostris (Euphonia), 673.
lanioides (Pachycephala), 481.
lansbergi (Coccyzus), 53.
— (Geoffroyus), 1054.
lansbergei (Pericrocotus), 302.
lantzi (Ellisia), 351.
laperousii (Megapodius), 787.
lapponica (Limosa), 945.
— (Scotiaptex), 892.
lapponicus (Calcarius), 625.
largipennis (Campylopterus), 133.
larutensis (Graucalus), 297.
larvata (Calliste), 667.
— (Haplopelia), 768.
— (Lagonosticta), 578.
*larrata* (Paroaria), 642.
larvata (Strachyrhis), 339.
larvatus (Crateropus), 330.
— (Graucalus), 297.
— (Oriolus), 527.
latebricola (Scytalopus), 1068.
lateralis (Cisticola), 363.
— (Lobivanellus), 934.
— (Poospiza), 628.
— (Psophodes), 320.
— (Zosterops), 712.
*lathami* (Æthopyga), 695.
lathami (Catheturus), 788.
— (Francolinus), 808.
*lathami* (Gisella), 893.
laticauda (Penthetria), 573.
*laticlavius* (Heliangelus), 155.
— (Saltator), 645.
latifasciata (Pyranga), 659, 1111.
latifrons (Microhierax), 868.
— (Sarciophorus), 933.
— (Tinamus), 781.
latimeri (Vireo), 473.
latinucha (Pipilopsis), 648.
latirostris (Alseonax), 264.
— (Andropadus), 313.
— (Blacicus), 249.
— (Corvus), 504.
— (Euscarthmus), 232.
— (Myiagra), 283, 1082.
— (Ocyalus), 549.
— (Phæoptila), 139.
*latirostris* (Sayornis), 227.
*latissimus* (Buteo), 857.
latistriatus (Anthus), 416.
latouchei (Æthopyga), 696.
— (Scops), 885.
latrans (Carpophaga), 745.
laudabilis (Pendulinus), 557.
laurinæ (Liothrix), 348.
laurivora (Columba), 751.
lauterbachi (Arses), 288.
— (Chlamydera), 523.
lautus (Aulacorhamphus), 1056.
lavendulæ (Cisticola), 1089.
lavinia (Calliste), 667.
lawesi (Parotia), 522.
lawrencei (Chætura), 128.
— (Empidonax), 1077.
— (Geotrygon), 771.
— (Gymnasio), 896.
— (Hæmophila), 633.

Digitized by Google

lawrencei (Icterus), 559.
— (Lanio), 657.
— (Myiarchus), 251, 1078.
— (Myrmelastes), 1070.
— (Phæoptila), 139.
— (Saucerottea), 137.
— (Sclerurus), 1071.
lawrencii (Chrysomitris), 593.
— (Cichlherminia), 403.
— (Corvus), 502, 1104.
— (Cyphorhinus), 429.
— (Helminthophaga), 431.
— (Mimus), 416.
*lawrencii* (Myrmelastes), 181, 1070.
— (Picumnus), 84.
lawrencii (Pseudocolaptes), 196.
— (Thryothorus), 423.
lawryi (Apteryx), 1049.
layardi (Diomedea), 1038.
— (Graucalus), 296.
— (Megapodius), 787.
— (Merula), 398.
— (Parisoma), 273.
— (Picolaptes), 188.
— (Pycnonotus), 305.
— (Rhipidura), 277.
— (Saxicola), 390.
layardorum (Dicæum), 678.
laysanensis (Anas), 990.
lazula (Guiraca), 612.
lazuli (Halcyon), 108.
lazulina (Chloropsis), 317.
lazulus (Campylopterus), 134.
leachii (Dacelo), 104.
*leachii* (Oceanodroma), 1029.
leachii (Thamnophilus), 184.
leadbeateri (Cacatua), 2.
— (Heliodoxa), 150.
leari (Anodorhynchus), 10.
lebruni (Pseudochloris), 640.
lecauchen (Turdus), 401.
leclancheri (Cyanospiza), 626.
— (Ptilopus), 736.
ledouci (Parus), 462.
*leei* (Centurus), 69.
leggii (Petroeca), 266.
leilavalensis (Ptilotis), 720.
leiopa (Alauda), 454.
lembeyei (Empidias), 252.
lembeyi (Polioptila), 380.
lempiji (Scops), 885.
*lemprieri* (Anthracoceros), 101.
lemprieri (Platylophus), 510.
— (Siphia), 293.
lentiginosus (Botaurus), 919.
lenzi (Rhipidura), 279.
— (Todirostrum), 232.
leocadiæ (Anthoscenus), 1068.
leopoldi (Columba), 752.
— (Gymnoschizorhis), 90.
leotaudi (Chlorospingus), 651.
lepida (Burnesia), 360.
— (Ceyx), 112.
— (Eminia), 353.
— (Excalfactoria), 816.
— (Gallinula), 974.
— (Phonipara), 618.
— (Pnoepyga), 430.
— (Pyrrhura), 14.
— (Rhipidura), 278.
— (Tachycineta), 1079.
lepidocephala (Malacopteron), 337.
lepidonota (Hypocnemis), 173.
lepidopleurus (Turdinus), 331.
lepidotus (Picumnus), 84.
lepidus (Dendropicus), 73, 1058.
— (Uragus), 608.
*leptodetus* (Cuculus), 51.
leptogrammica (Macropygia), 754.
leptogrammicum (Syrnium), 891.
leptonyx (Corvus), 502, 1104.
leptorhynchus (Calamocichla), 352.
— (Henicognathus), 13.
*leptorhynchus* (Nucifraga), 506.
— (Picus), 70.
leptosomus (Brachypteracias), 92.
lepturus (Phaeton), 1004.
lepurana (Turnix), 778.
leschenaulti (Henicurus), 449.
— (Melittophagus), 96.
lessoni (Alcyone), 113.
— (Chlorostilbon), 1066.
— (Lamprocolius), 546.
— (Momotus), 94.
— (Muscylva), 270.
— (Ochthœca), 226.
— (Œstrelata), 1033.
— (Philemon), 726.
— (Sphenoproctus), 153.
letitiæ (Prymnacantha), 165.
lettia (Scops), 884.
lettiensis (Graucalus), 296, 1084.
— (Ptilopus), 735.
lettii (Bubo), 880.
leucansiptila (Otocorys), 1099.
leucaspis (Gymnopithys), 173.
— (Oreopyra), 148.
leucauchen (Grus), 922.
leucerodia (Platalea), 904.
leucoblepharus (Basileuterus), 440.

Digitized by Google

leucobronchialis (Helminthophaga), 431.
*leucocapilla* (Pipra), 221.
leucocapillus (Anous), 1019.
leucocephala (Artamia), 498.
— (Arundinicola), 228.
— (Chimarrhornis), 386.
— (Chrysotis), 6.
— (Columba), 750.
*leucocephala* (Dissoura), 906.
leucocephala (Emberiza), 623.
— (Erismatura), 1001.
— (Neositta), 682.
— (Pandion), 877.
— (Pelargopsis), 114.
leucocephalus (Buteo), 855.
— (Cinclus), 419.
— (Cladorhynchus), 943.
— (Colius), 91.
— (Cranorrhinus), 100.
— (Crateropus), 330.
*leucocephalus* (Hagedashia), 902.
leucocephalus (Haliaëtus), 853.
— (Himantopus), 942.
— (Hypsipetes), 316.
— (Pogonorhynchus), 35.
— (Pseudotantalus), 905.
*leucocephalus* (Spodiopsar), 535.
leucocephalus (Stephanophorus), 664.
— (Synallaxis), 199.
leucocilla (Pipra), 221.
leucogaster (Agyrtria), 136.
*leucogaster* (Ardea), 911.
leucogaster (Centropus), 56.
— (Chlorospingus), 651.
— (Cinnyris), 698.
*leucogaster* (Fregetta), 1030.
— (Garrulax), 327.
leucogaster (Haliaëtus), 854.
— (Lophophaps), 768.
*leucogaster* (Phalacrocorax), 1010.
leucogaster (Pholidauges), 541.
— (Picolaptes), 187.
— (Picumnus), 83.
— (Pogonorhynchus), 36.
*leucogaster* (Pomatorhinus), 325.
leucogaster (Schizorhis), 90.
— (Turnix), 779.
leucogastra (Caica), 8.
— (Cinclus), 418.
*leucogastra* (Crecisous), 972.
leucogastra (Dendrocitta), 508.
*leucogastra* (Eopsaltria), 482.
leucogastra (Galbula), 45.
— (Ispidina), 111.
— (Melizophilus), 1090.
leucogastra (Ortalida), 793.
— (Pachycephala), 480.
— (Polioptila), 380.
— (Sula), 1012.
*leucogastra* (Trichostoma), 333.
leucogastra (Urolonchа), 586.
— (Uropsila), 428.
leucogastroides (Urolonchа), 586.
leucogenys (Acredula), 466.
— (Bostrychophus), 304.
— (Cichlopsis), 407.
— (Dacnis), 688.
— (Dicrurus), 530.
— (Lybius), 1055.
— (Merganetta), 1002.
— (Pyrrhula), 607.
leucogeranus (Grus), 922.
leucognaphalus (Corvus), 505.
leucogonys (Tyranniscus), 239.
leucogrammica (Ptilopyga), 332.
leucogrammicus (Alcurus), 307.
— (Laniellus), 483.
leucolæma (Barbatula), 38.
— (Geocichla), 405.
— (Otocorys), 452.
*leucolæma* (Thamnolæa), 392.
leucolæma (Xenocichla), 1085.
leucolæmus (Chloronerpes), 65.
— (Odontophorus), 822.
leucolopha (Anorrhinus), 102.
leucolophum (Tigrisoma), 919.
leucolophus (Calliechthrus), 50.
— (Garrulax), 327.
— (Turacus), 89.
leucomela (Columba), 753.
— (Lalage), 303.
— (Saxicola), 389.
leucomelæna (Saxicola), 389.
leucomelan (Tricholæma), 36.
leucomelanura (Siphia), 292.
leucomelanus (Gennæus), 800.
leucomelas (Alophius), 104.
— (Certhionix), 719.
— (Melanoparus), 460.
— (Puffinus), 1030.
*leucomelas* (Tricholæma), 36.
leucomelas (Turdus), 401.
leucometopa (Ochthœca), 226.
leucomystax (Stactolæma), 38, 1055.
leuconota (Columba), 749.
— (Gymnorhina), 500.
— (Thalassiornis), 1001.
leuconotus (Cinclus), 419.
— (Copurus), 229.
— (Malurus), 368.

Digitized by Google

leuconotus (Melanoparus), 460.
— (Myrmelastes), 181.
— (Nycticorax), 917.
— (Picus), 72.
leconteí (Ammodromus), 632.
— (Harporhynchus), 417.
— (Myiocetx), 111.
leuconucha (Sitta), 681.
leuconyx (Cypselus), 125.
leucopais (Baza), 867.
leucoparæa (Pternistes), 811.
— (Pyrrhulauda), 459.
leucopareia (Eutrygon), 774.
*leucopareia* (Hydrochelidon), 1013.
*leucopareius* (Branta), 984.
leucophæa (Amazilia), 138.
— (Calandrella), 454.
— (Climacteris), 684, 1112.
— (Collocalia), 129.
— (Mimus), 416.
— (Zosterops), 712.
leucophæus (Dicrurus), 530.
*leucophæus* (Larus), 1025.
leucophrys (Basileuterus), 440.
— (Brachypteryx), 342.
— (Dendrortyx), 818.
— (Erythropygia), 412.
— (Henicorhina), 429.
— (Hypocnemis), 173.
— (Mecocerculus), 227.
— (Ochthœca), 226.
*leucophrys* (Œstrelata), 1035.
— (Porzana), 968.
leucophrys (Sylviella), 355.
— (Thryomanes), 424.
— (Zonotrichia), 626.
leucophthalma (Formicivora), 178.
— (Pomarea), 291.
*leucophthalmus* (Æthyia), 997.
leucophthalmus (Automolus), 195.
— (Conurus), 12.
*leucophthalmus* (Larus), 1022.
leucopis (Buarremon), 648.
leucopleura (Xenocichla), 309.
leucopleurus (Oreotrochilus), 147.
leucopogon (Burnesia), 360.
— (Campophilus), 80.
— (Eupsychortyx), 819.
— (Thryophilus), 422.
*leucoproctum* (*Trichostoma*), 292.
leucoprosopon (Lophortyx), 819.
leucops (Anthipes), 1083.
— (Dicrurus), 531.
— (Lædorusa), 306.
— (Merula), 395.
*leucops* (*Oreoctistes*), 306.
leucops (Pœcilodryas), 272.
— (Siphia), 293.
leucopsis (Branta), 984.
— (Motacilla), 443.
— (Scops), 883.
— (Sitta), 681.
— (Spermophila), 616.
— (Sylviella), 355.
— (Xerophila), 468.
*leucoptera* (Afrotis), 925.
— (Ardeola), 913.
leucoptera (Asarcornis), 981.
— (Chætura), 936.
— (Erythropygia), 412.
— (Fulica), 978.
— (Hydrochelidon), 1012.
— (Lalage), 303.
— (Lanius), 483.
— (Loxia), 605.
*leucoptera* (Melanocorypha), 452.
leucoptera (Melopelia), 758.
— (Neositta), 682.
— (Œstrelata), 1035.
— (Phegornis), 956.
— (Pica), 507.
— (Picus), 70.
*leucoptera* (Pitta), 208.
leucoptera (Psophia), 924.
— (Pyriglena), 175.
— (Tanagra), 661.
leucopterus (Cracticus), 500.
— (Larus), 1026.
— (Malurus), 367.
*leucopterus* (Melanoparus), 460.
leucopterus (Nyctibius), 118.
— (Pipilopsis), 649.
— (Platysmurus), 509.
— (Serinus), 600.
leucopteryx (Icterus), 559.
leucopus (Furnarius), 203.
— (Hæmatopus), 932.
*leucopyga* (Fulica), 977.
leucopyga (Tachycineta), 236.
leucopygia (Collocalia), 130.
— (Iodopleura), 217.
— (Nyctiprogne), 118.
— (Saxicola), 389.
leucopygialis (Chætura), 129.
— (Diaphorophyia), 265.
— (Dicrurus), 530.
— (Lalage), 303.
leucopygius (Basileuterus), 440.
— (Bycanistes), 101.
— (Crateropus), 330.

Digitized by Google

eucopygius (Graucalus), 296.
— (Halcyon), 108.
— (Serinus), 600.
— (Symmorphus), 303.
*leucopygus* (Rosthramus), 865.
— (Lanius), 484.
leucopyrrhus (Creciscus), 972.
leucorhamphus (Cassicus), 551.
leucorhynchus (Artamus), 533.
— (Laniarius), 492.
— (Rhectes), 495.
*leucorrhoa* (Cryptolopha), 286.
leucorrhoa (Oceanodroma), 1028.
— (Pipra), 221.
— (Rupornis), 859.
— (Saxicola), 1092.
— (Tachycineta), 255.
leucorrhous (Polytmus), 147.
leucoryphus (Haliaëtus), 854.
leucoscepus (Pternistes), 811.
leucoschista (Muscicapula), 294.
leucosoma (Hirundo), 254.
leucosomus (Leucospizias), 841.
leucospila (Rallicula), 970.
— (Scops), 884.
leucospodia (Elaïnea), 240.
leucostephes (Melirrhophetes), 728.
leucosterna (Cheramœca), 258.
*leucosternus* (Haliastur), 862.
leucosticta (Erythropygia), 412.
— (Henicorhina), 428.
— (Huhua), 882.
— (Uroloncha), 586.
leucostictus (Dysithamnus), 180.
— (Eupetes), 319.
— (Turdinulus), 332.
*leucostigma* (Aceros), 102.
— (Anas), 991.
leucostigma (Heterocnemis), 175.
— (Pachycephala), 481.
leucote (Pyrgisoma), 636.
leucothorax (Lanio), 656.
— (Rhipidura), 278.
leucothrix (Penelope), 791.
leucotis (Basilinna), 139.
— (Colius), 91.
— (Gabalcyorhynchus), 46.
— (Garrulus), 510.
— (Molpastes), 305.
— (Monarcha), 290.
— (Myiadectes), 407.
— (Phaboïreron), 734.
*leucotis* (Podicipes), 1041.
leucotis (Poephila), 584.
— (Ptilotis), 721.
leucotis (Pyrrhulauda), 459, 1100.
— (Pyrrhura), 13.
— (Scops), 885.
— (Smilorhis), 37.
— (Strachyrhis), 339.
— (Thryophilus), 421.
— (Turacus), 88.
— (Vireolanius), 475.
leucura (Agriornis), 1074.
— (Chætusia), 936.
*leucura* (*Niltava*), 292.
leucura (Notodela), 384.
— (Pratincola), 387.
— (Saxicola), 389.
— (Tityra), 211.
— (Urochroa), 148.
*leucuropyga* (Centropus), 56.
leucurum (Crossoptilon), 799.
leucurus (Elanus), 864.
— (Lagopus), 827.
— (Monarcha), 290.
— (Threnetes), 131.
levaillanti (Corvus), 504.
— (Chrysotis), 5, 1053.
— (Francolinus), 809.
— (Pogonorhynchus), 35.
*levaillantii* (Cisticola), 365.
— (Plotus), 1011.
— (Pycnonotus), 305.
— (Thamnolæa), 392.
leveriana (Cissopis), 644.
levipes (Rallus), 959.
levraudi (Creciscus), 972.
*lewini* (Hypotænidia), 961.
lewini (Ptilotis), 720.
lewisii (Ptilopus), 741.
leyboldi (Eustephanus), 157.
leylandi (Eupsychortyx), 820.
leytensis (Pericrocotus), 301.
— (Yungipicus), 75.
lhuysii (Lophophorus), 798.
*liberiæ* (Glareola), 930.
liberianus (Cosmophoneus), 490.
liberiensis (Chlorocichla), 313.
libonyanus (Turdus), 399.
lichtensteini (Hemignathus), 693.
— (Pterocles), 777.
lictor (Pitangus), 243.
lidthi (Garrulus), 511.
lidthii (Gracula), 539.
lifuensis (Graucalus), 297.
— (Myzomela), 715.
lignarius (Picus), 72.
lilacea (Dendrophila), 682.
lilacina (Chrysotis), 5.

Digitized by Google

lilfordi (Grus), 921.
— (Picus), 72.
liliana (Agapornis), 22.
limata (Rhamphocœlus), 1111.
*limbata* (*Ptilotis*), 718.
limbatus (Euscarthmus), 232.
limnaëtus (Spizaëtus), 849.
*limnophilax* (Gorsachius), 918.
linaria (Cannabina), 590.
linchi (Collocalia), 130.
lincolni (Melospiza), 632.
lindeni (Oxypogon), 158.
lindsayi (Halcyon), 110.
linearis (Chiroxiphia), 222.
— (Geotrygon), 771.
lineata (Acanthiza), 366.
— (Conopophaga), 169.
— (Excalfactoria), 816.
— (Megalæma), 39.
— (Numenius), 944.
— (Pelagodroma), 1030.
— (Pytelia), 578.
— (Sarothrura), 969.
— (Spermophila), 616.
*lineata* (Tigrisoma), 919.
*lineaticeps* (Ancistrops), 193.
lineaticeps (Picolaptes), 1071.
lineatocapilla (Dendrornis), 190.
lineatocephala (Xiphocolaptes), 188.
*lineatum* (Ciccaba), 893.
lineatum (Trochalopteron), 322.
lineatus (Buteo), 856.
— (Geophlœus), 82.
*lineatus* (Cuculus), 51.
lineatus (Cymbilanius), 185.
— (Gennæus), 800.
— (Graucalus), 296.
lineiventris (Anthus), 445.
*lineola* (Bolborhynchus), 14.
lineola (Spermophila), 617.
lineolata (Pachycephala), 480.
lineolatus (Bolborhynchus), 14.
linota (Cannabina), 590.
linteatus (Heterocercus), 224.
litæ (Chloronerpes), 1057.
— (Myiobius), 1077.
litsitsirupa (Psophocichla), 406.
littayei (Pachycephala), 478.
littoralis (Conirostrum), 687.
— (Cotyle), 257.
— (Montifringilla), 595.
— (Ochthornis), 227.
— (Phœnicothraupis), 657.
liventer (Butastur), 859.
livia (Columba), 749.
livida (Agriornis), 224.
lividus (Mimus), 415.
livingstoni (Turacus), 89.
livingstonii (Erythrocercus), 275.
— (Saxicola), 390, 1092.
lizanoi (Grallaria), 170.
lloydi (Psaltriparus), 466, 1101.
lobata (Biziura), 1002.
*lobata* (Phalaropus), 957.
lobatus (Lobivanellus), 934.
lobatus (Lobotus), 300.
locustelloides (Chætornis), 352.
loculator (Tantalus), 905.
loddigesi (Cephalolepis), 164.
*lodoisiæ* (Coturnix), 815.
lomitensis (Thryothorus), 422.
lomvia (Uria), 1043.
longa (Dicrurus), 529.
longicauda (Bartramia), 949.
— (Dendrocincla), 186.
— (Discura), 166.
— (Elminia), 281.
— (Graucalus), 296.
— (Henicopernis), 866.
— (Icteria), 438.
— (Motacilla), 443.
— (Myrmotherula), 179.
— (Palæornis), 20.
*longicauda* (Stercorarius), 1028.
— (Suthora), 471.
longicauda (Sutoria), 361.
— (Talegallus), 788.
— (Urocharis), 675.
longicaudata (Ellisia), 351.
— (Lanius), 1103.
— (Urocichla), 426.
longicaudatus (Dicrurus), 530.
— (Mimus), 415.
— (Nyctibius), 118.
longicaudus (Malurus), 367.
longicornis (Scops), 885.
*longimembris* (Pseudotantalus), 905.
longipennis (Chlorophonia), 671.
— (Cinclodes), 1073.
— (Columba), 1114.
— (Furnarius), 204.
— (Macrodipteryx), 120.
— (Macropteryx), 130.
— (Myrmotherula), 179.
— (Pitta), 1073.
— (Sterna), 1015.
*longipes* (Miro), 270.
longipes (Myrmeciza), 174, 1069.
— (Xanthocephalus), 554.
— (Xenicus), 206.

Digitized by Google

longirostris (Acrocephalus), 369.
— (Arachnothera), 705.
— (Arbelorhina), 690.
— (Chalcophaps), 766.
— (Chrysomitris), 592.
— (Chrysuronia), 140, 1066.
— (Dendroplex), 189.
— (Dicrurus), 531.
— (Floricola), 160, 1068.
*longirostris* (Furnarius), 204.
— (Grus), 922.
longirostris (Hæmatopus), 932.
— (Harporhynchus), 417.
— (Herpsilochmus), 178.
— (Iole), 312.
— (Melanotis), 417.
— (Meliornis), 723.
— (Nasica), 187.
— (Numenius), 944.
— (Œstrelata), 1035.
— (Otocorys), 451.
*longirostris* (Parus), 462.
longirostris (Phaethornis), 132.
— (Pyrrhospiza), 604.
— (Rallus), 959.
— (Rhizothera), 811.
— (Sphenura), 349.
— (Stenopsis), 121.
*longirostris* (*Tatare*), 369.
longirostris (Thryophilus), 421.
— (Timelia), 340.
— (Zosterops), 709.
longuemareus (Phaethornis), 132.
longuemarii (Anthreptes), 704.
lopezi (Apalis), 1089.
— (Astur), 1116.
— (Cryptillas), 1088.
— (Halcyon), 1062.
*lophorhinus* (Dissemuropsis), 532.
lophotes (Baza), 866.
— (Homorus), 195.
— (Ocyphaps), 768.
loquax (Coracias), 1060.
loralis (Pœcilodryas), 271.
lorata (Sterna), 1018.
lorealis (Arses), 288.
lorenzi (Hierofalco), 876.
— (Phylloscopus), 378.
loreto-yacuensis (Thamnophilus), 183.
*loriæ* (Aegotheles), 116.
loriæ (Casuarius), 1051.
— (Eupetes), 319.
— (Loria), 524.
— (Pitta), 209.
loricata (Grallaricula), 169.
loricata (Myrmeciza), 174.
loricatus (Celeus), 79.
— (Lamprotes), 652.
— (Monarcha), 290.
— (Turdinus), 331.
lorti (Coracias), 92.
— (Francolinus), 809.
lory (Lorius), 29.
lotenius (Cinnyris), 699.
louisiadensis (Cracticus), 501.
— (Graucalus), 296.
— (Myzomela), 716.
— (Rhipidura), 278.
louisæ (Rhynchostruthus), 596.
lovati (Cisticola), 365.
— (Indicator), 1055.
— (Otis), 920.
lowi (Collocalia), 129.
lowii (Sarcops), 539.
lûbberti (Hyphantornis), 1107.
— (Lanius), 1103.
— (Saxicola), 1092.
lubomirskii (Pipreola), 216.
lucani (Lophotriorchis), 850.
lucasana (Buteo), 856, 1116.
— (Picus), 71.
— (Vireo), 472.
lucayseinsis (Myiarchus), 251.
luchsi (Myiopsitta), 14.
luciæ (Agyrtria), 136.
— (Helminthophaga), 432.
— (Heteroscops), 887.
luciani (Eriocnemis), 154.
— (Picus), 1058.
— (Pyrrhura), 13.
— (Rhamphocœlus), 660.
lucida (Amazilia), 138.
— (Arbelorhina), 690.
— (Hirundo), 254.
— (Psittacula), 15.
lucidus (Bubulcus), 913.
— (Chrysocolaptes), 80.
— (Chrysococcyx), 53.
— (Hemignathus), 693.
— (Phalacrocorax), 1007.
lucieni (Nigrita), 575.
lucifer (Calothorax), 160.
lucionensis (Enneoctonus), 486.
luconensis (Prioniturus), 17.
— (Tanygnathus), 18.
luctuosa (Myristicivora), 747.
— (Spermophila), 617.
luctuosus (Tachyphonus), 655.
— (Thamnophilus), 183.
ludovicensis (Cinnyris), 699.

Digitized by Google

ludoviciæ (Hemistephania), 131.
— (Merula), 396.
*ludoviciana* (Ardea), 911.
ludoviciana (Pyranga), 659.
ludovicianus (Hedymeles), 612.
— (Lanius), 484, 1103.
*ludovicianus* (Sturnella), 555.
ludovicianus (Thryothorus), 422.
ludwigi (Otis), 925.
ludwigii (Dicrurus), 529.
luehderi (Cinnyris), 699.
— (Laniarius), 491.
lugens (Butalis), 262.
— (Conirostrum), 1112.
— (Dryonastes), 328.
— (Eriocnemis), 154.
— (Motacilla), 443.
— (Parisoma), 1081.
— (Sarothrura), 970.
— (Saxicola), 388.
— (Turtur), 759.
lugentoides (Saxicola), 388.
*luggeri* (Myiozetetes), 242.
lugubris (Acanthopneuste), 377.
— (Brachygalba), 45.
— (Campophaga), 300.
— (Celeus), 79.
— (Ceryle), 114, 1062.
— (Cisticola), 365.
— (Contopus), 248.
— (Coracocichla), 210.
— (Dendropicus), 74.
— (Hypocnemis), 174.
— (Melanocichla), 327.
— (Motacilla), 442.
— (Ninox), 887.
— (Ochthodiæta), 225.
— (Parus), 463.
— (Pœoptera), 546.
— (Quiscalus), 560.
— (Saxicola), 388.
— (Surniculus), 501.
— (Zosterops), 711.
luguieri (Myiagra), 283.
lulu (Strix), 899.
lumachellus (Augastes), 159.
luminosa (Cyanophaia), 137.
— (Iolæma), 150.
— (Quiscalus), 560.
lunata (Sterna), 1016.
lunatus (Serilophus), 205.
*lunifrons* (Petrochelidon), 258.
lunigera (Calliste), 668.
lunulata (Anellobia), 724.
— (Galloperdix), 817.
II. — 1904
lunulata (Ianthocincla), 323.
— (Oreocincla), 403.
— (Pithys), 173.
— (Pœcilothraupis), 664.
lunulatus (Bolbopsittacus), 22.
— (Hypotriorchis), 873.
— (Melithreptus), 714.
lurida (Turdus), 1093.
luscinia (Acrocephalus), 369.
— (Aedon), 382.
— (Microcerculus), 430.
luscinia (Upucerthia), 203.
luscinoides (Locustella), 370.
lusitanica (Certhilauda), 450.
lutea (Colaptes), 1057.
— (Liothrix), 347.
— (Manorhina), 724.
— (Pseudochloris), 639.
— (Zosterops), 709.
luteicapilla (Euphonia), 672.
luteifrons (Hylophilus), 474.
— (Nigrita), 575.
*luteiventris* (Lophotriccus), 233.
luteiventris (Lusciniola), 371.
— (Myiodynastes), 244.
— (Myiozetetes), 242.
— (Sycalis), 602.
luteocephala (Pseudochloris), 639.
*luteocristatus* (Cacatua), 2.
luteola (Certhidea), 689.
— (Cœreba), 691.
— (Emberiza), 622.
— (Lædorusa), 306.
— (Muscicapa), 263.
— (Sitagra), 564.
luteovirens (Chrysœnas), 741.
luteoviridis (Basileuterus), 438.
lutescens (Eremomela), 355.
— (Helminthophaga), 431.
lutetiæ (Helianthea), 150.
*luteus* (Colaptes), 62.
luteus (Passer), 599.
lutosus (Polyborus), 832.
luxuosa (Xanthoura), 514.
luzonica (Anas), 990.
— (Phlogœnas), 772.
— (Zosterops), 710.
luzoniense (Dicæum), 679.
luzoniensis (Cittocincla), 413.
— (Loxia), 605.
*luzoniensis* (Motacilla), 443.
— (Muscicapa), 263.
luzoniensis (Muscicapula), 294.
lyalli (Traversia), 206.
lyogyrus (Cicinnurus), 1105.



Digitized by Google

lyra (Macropsalis), 120.
lyrura (Philodice), 161.
*maackii* (Acrocephalus), 370.
macao (Ara), 10.
*macartneyi* (Lophura), 799.
macassariensis (Macropygia), 754, 1114.
macavuanna (Ara), 10.
maccalli (Erythrocercus), 275.
— (Ortalida), 793.
macclellandi (Iole), 312.
— (Pomathorinus), 326.
macclounii (Pogonorhynchus), 35.
maccoa (Erismatura), 1001.
macconnelli (Picumnus), 1059.
— (Zonotrichia), 1110.
maccormicki (Megalestris), 1027.
maccowni (Plectrophanes), 624.
maccoyi (Cyclopsitta), 33.
macedonica (Acredula), 467.
macei (Graucalus), 296.
— (Picus), 72.
macfarlanei (Scops), 886.
macgregorii (Cnemophilus), 524.
machiki (Geocichla), 404.
macilvainii (Elaïnea), 240, 1076.
macilwraithi (Cyclopsitta), 34.
macleannani (Phlogopsis), 172.
*macleayæ* (Falcinellus), 520.
*macleayana* (Cyclopsitta), 33.
macleayana (Ptilotis), 720.
macleayi (Halcyon), 108.
macleodi (Otophanes), 121.
macloviani (Muscisaxicola), 230.
macdonaldi (Nesomimus), 416.
macgillivrayi (Bulweria), 1036.
— (Geothlypis), 438.
— (Megapodius), 787, 1115.
— (Oporornis), 1097.
— (Platycercus), 1054.
*macgillivrayi* (Rhipidura), 276.
macgillivrayi (Zosterops), 710.
macgrigoriæ (Niltava), 295.
mackenziana (Cryptolopha), 286.
mackinderi (Bubo), 880.
mackinlayi (Macropygia), 756.
mackinnoni (Lanius), 484.
mackloti (Dicæum), 677.
— (Hapalarpactes), 88.
— (Pitta), 209.
macquariensis (Hypotænidia), 962.
macquenii (Houbara), 926.
macrocephala (Petroeca), 267.
macrocerca (Hylonympha), 150.
— (Penthetria), 574.
macrocercus (Eupeles), 319.
macrodactyla (Gallinago), 953.
— (Oceanodroma), 1029.
macrodactylus (Bucco), 47.
— (Turdinus), 331.
macrolopha (Pucrasia), 801.
macromystax (Antrostomus), 122.
macronychus (Buteo), 857.
*macronyx* (Acrocephalus), 369.
macronyx (Ægithalus), 468.
— (Pipilo), 637.
*macroptera* (Microeca), 363.
— (Ninox), 888.
macroptera (Œstrelata), 1033.
*macroptera* (Trichostoma), 333.
macropterus (Lyncornis), 119.
macropteryx (Thlypopsis), 653.
macropus (Scytalopus), 167, 1068.
macrorhina (Melidora), 105.
*macrorhyncha* (Bubo), 881.
— (Butorides), 916.
macrorhyncha (Calyptorhynchus), 2.
— (Cinclocerthia), 414.
— (Colluricincla), 496.
— (Dendrocincla), 186.
— (Nucifraga), 506.
— (Oreocincla), 403.
— (Pachycephala), 476.
— (Rhea), 1052.
*macrorhyncha* (Stenopsis), 121.
macrorhynchus (Bucco), 46.
— (Corvus), 503.
— (Cymborhynchus), 206, 1073.
— (Turacus), 89.
macrosceles (Circus), 836.
*macroscelides* (Astur), 841.
macrotis (Lyncornis), 119.
*macroura* (Muscicapa), 263.
macroura (Troglodytes), 1096.
*macroura* (Zenaidura), 757.
macrourus (Amytis), 349.
— (Caprimulgus), 123, 1063.
— (Colius), 91.
— (Dendrortyx), 818.
— (Oriolus), 526.
macrura (Eupetomena), 134.
— (Penthetria), 573.
*macrura* (Sterna), 1015.
macrura (Tardivola), 639.
— (Thalassoætus), 853.
macrurus (Asio), 879.
— (Circus), 836.
— (Cittocincla), 413, 1094.
— (Megalurus), 351.
— (Quiscalus), 560.
— (Trogon), 87.

Digitized by Google

macrurus (Urotriorchis), 838.
macularia (Acanthiza), 366.
— (Actitis), 948.
— (Grallaria), 170.
maculata (Adelomyia), 1067.
— (Anthus), 445.
— (Aquila), 852.
— (Calœnas), 775.
— (Casuarius), 1052.
— (Chlamydera), 523.
*maculata* (Colinus), 820.
maculata (Harporhynchus), 1095.
— (Melipotes), 728.
— (Ninox), 888.
— (Oreomyza), 692.
— (Oriolus), 526.
— (Ptilotis), 720.
— (Sericornis), 367.
— (Strachyrhis), 339.
— (Strix), 899.
— (Tachycineta), 256.
— (Terenura), 177.
— (Thamnophilus), 183.
— (Tringa), 952.
— (Zenaida), 757.
maculatum (Todirostrum), 231.
maculatus (Bucco), 47.
— (Chrysococcyx), 53.
— (Dendrocopus), 185.
— (Henicurus), 450.
— (Indicator), 34.
— (Pipilo), 636.
— (Prionochilus), 675.
— (Rallus), 961.
*maculatus* (Tetrao), 825.
maculatus (Yungipicus), 75.
maculi-alatus (Pendulinus), 557.
maculicauda (Agyrtria), 1065.
— (Hypocnemis), 174.
— (Siptornis), 1072.
*maculicaudis* (Cercomacra), 176.
maculicaudus (Antrostomus), 122.
*maculiceps* (Chrysocolaptes), 80.
maculiceps (Sarganura), 722.
*maculicollis* (Indicator), 34.
maculicollis (Rhynchotus), 784.
— (Serinus), 601.
— (Sutoria), 361.
maculicoronatus (Capito), 41.
maculifrons (Eleopicus), 76.
maculipectus (Phabotreron), 734.
*maculipectus* (Phacelodomus), 196.
maculipectus (Rhipidura), 278.
— (Thryothorus), 423.
maculipennis (Larus), 1022.
maculipennis (Otis), 926.
— (Phyllobasileus), 378.
— (Pygoptila), 181.
maculirostris (Muscisaxicola), 230.
*maculirostris* (Querquedula), 992.
maculirostris (Selenidera), 44.
— (Turdus), 401.
maculosa (Anas), 990.
— (Campothera), 66.
*maculosa* (Cercomacra), 176.
maculosa (Columba), 750.
— (Dendroeca), 434.
— (Nothura), 785.
— (Prinia), 358.
— (Turnix), 779.
maculosus (Ælurœdus), 523.
— (Bubo), 880.
— (Circus), 836.
*maculosus* (Œdicnemus), 928.
mada (Columba), 750.
— (Prioniturus), 1054.
madagascariensis (Accipiter), 845.
— (Agapornis), 22.
— (Alectrœnas), 742.
— (Anastomus), 907.
— (Asio), 878.
— (Baza), 867.
— (Bernieria), 314.
— (Calicalicus), 487.
— (Caprimulgus), 123.
— (Centropus), 56.
— (Foudia), 566.
— (Hartlaubius), 510.
— (Ispidina), 111.
— (Ixocincla), 316.
— (Margaroperdix), 812.
*madagascariensis* (Mascarinus), 18.
— (Muscicapa), 263.
— (Nettopus), 981.
madagascariensis (Oxylabes), 338.
— (Phedina), 259.
— (Porphyrio), 975.
*madagascariensis* (Querquedula), 994.
madagascariensis (Rallus), 960.
— (Tylas), 317.
*madagascariensis* (Zosterops), 707.
madaraszi (Colluricincla), 1104.
— (Psittacella), 21.
— (Pyrrhulauda), 1100.
— (Serinus), 1109.
madeirensis (Petronia), 596.
maderaspatana (Zosterops), 707.
maderaspatensis (Motacilla), 443.
maderensis (Fringilla), 589.
— (Regulus), 379.

Digitized by Google

madrensis (Columba), 751.
maësi (Ampelis), 260.
mæsi (Dryonastes), 328.
mafoorana (Pitta), 208.
maforensis (Dicæum), 678.
— (Gerygone), 269.
— (Graucalus), 296.
— (Hermotimia), 700.
— (Macropygia), 755.
— (Nasiterna), 24.
magdalenæ (Thryothorus), 423.
magellanica (Chloëphaga), 985.
— (Gallinago), 954.
— (Turdus), 400.
magellanicus (Bubo), 881.
— (Campophilus), 81.
— (Phalacrocorax), 1009.
*magellanicus* (Sarcorhamphus), 828.
magellanicus (Scytalopus), 166.
— (Spheniscus), 1049.
magentæ (Œstrelata), 1034.
magica (Scops), 884.
magister (Myiarchus), 250.
— (Vireo), 472.
magna (Acanthornis), 367.
— (Arachnothera), 706.
— (Caccabis), 807.
— (Galerida), 458.
— (Macropygia), 754, 1114.
— (Sitta), 681.
— (Sturnella), 555.
magnifica (Æthopyga), 696.
*magnifica* (Ketupa), 879.
magnifica (Megaloprepia), 742.
— (Ptilorhis), 521.
magnificus (Diphyllodes), 519.
— (Lophornis), 165.
— (Nycticorax), 917.
magnirostre (Malacopteron), 337.
magnirostris (Acanthopneuste), 376.
*magnirostris* (Acrocephalus), 368.
— (Alcippe), 345.
magnirostris (Baza), 867.
— (Capsiempis), 237.
*magnirostris* (Charadrius), 937.
magnirostris (Cyanorhamphus), 26.
— (Cœreba), 690.
*magnirostris* (Enneoctonus), 487.
magnirostris (Eophona), 610.
— (Eopsaltria), 481.
— (Esacus), 929.
— (Geospiza), 668.
— (Gerygone), 269.
— (Graucalus), 297.
— (Mimus), 416.
magnirostris (Myiarchus), 251.
— (Palæornis), 19.
— (Phaëthusa), 1013.
— (Pheucticus), 611.
— (Pipilo), 637.
— (Rhamphocœlus), 660.
— (Rupornis), 859.
— (Sasia), 1059.
— (Sericornis), 367.
— (Siphia), 293.
— (Tyrannus), 252.
— (Urocissa), 507.
magnoides (Saltator), 645.
magnum (Malacopteron), 337.
magnus (Macruropsar), 543.
— (Saltator), 645.
*magnus* (Tringa), 951.
maguari (Euxenura), 906.
mahali (Ploceipasser), 569.
mahrattensis (Acridotheres), 538.
— (Caprimulgus), 124.
— (Picus), 72.
maillardi (Circus), 836.
maingayi (Syrnium), 892.
maja (Munia), 588.
major (Acredula), 467.
— (Æchmophorus), 1042.
— (Aedon), 382.
— (Asio), 878.
— (Callene), 408.
— (Carduelis), 591.
— (Cettia), 372.
— (Cissopis), 644.
— (Cisticola), 363.
— (Crotophaga), 62.
*major* (Dendrocygna), 987.
major (Diglossa), 686.
— (Emberiza), 621.
— (Eurypyga), 921.
*major* (Gallinago), 953.
— (Graucalus), 296.
major (Indicator), 34, 1055.
— (Laniarius), 491.
— (Lanius), 483.
— (Leptopœcile), 379.
— (Lorius), 1054.
— (Lusciniola), 371.
— (Macropteryx), 130.
— (Oryzoborus), 613.
— (Pachycephala), 480.
— (Pachyrhamphus), 212.
— (Palæornis), 1054.
— (Parus), 461.
— (Picus), 70.
*major* (Ptatalea), 904.

Digitized by Google

*major* (Podicipes), 1042.
major (Polioaetus), 877.
— (Polioptila), 1091.
*major* (Puffinus), 1031.
major (Quiscalus), 560.
— (Schiffornis), 223.
— (Tanagra), 661.
— (Thamnophilus), 184.
— (Tinamus), 781.
— (Veniliornis), 1059.
— (Xiphocolaptes), 188.
majoroides (Picus), 70.
malabarica (Aidemosyne), 585.
— (Chloropsis), 317.
— (Crateropus), 330.
— (Galerida), 458.
— (Osmotreron), 733.
— (Pericrocotus), 301.
— (Tænioglaux), 897.
— (Xantholæma), 40.
malabaricus (Anthracoceros), 100.
— (Sarciophorus), 934.
*malabaricus* (Scops), 884.
malabaricus (Spodiopsar), 536.
malabaroides (Dissemurus), 533.
malacca (Munia), 588.
malaccensis (Anuropsis), 333.
— (Anthreptes), 704, 1113.
— (Chrysophlegma), 67.
— (Cymborhynchus), 206, 1073.
— (Hemixus), 315, 1086.
— (Passer), 597.
— (Pelargopsis), 114.
malachurus (Stipiturus), 348.
malacoptilus (Rimator), 332.
malacorhynchus (Hymenolæmus), 1002.
malagæ (Metallura), 156.
*malamaui* (Ceyx), 112.
malaris (Phaethornis), 1064.
malayana (Anthipes), 294.
— (Chrysococcyx), 53.
— (Oreocincla), 403.
— (Scops), 883.
— (Siva), 1088.
malayanus (Anthracoceros), 101.
*malayanus* (Indicator), 34.
malayensis (Chaptia), 532.
— (Ictinaëtus), 850.
malcolmi (Argya), 324.
maleo (Megacephalon), 789.
malherbei (Campophilus), 81.
— (Campothera), 1057.
— (Cyanorhamphus), 26.
— (Turturœna), 753.
malimbicus (Halcyon), 107.
malimbicus (Merops), 97.
malouinus (Attagis), 780.
maltæ (Passer), 1109.
malura (Formicivora), 178.
maluroides (Siptornis), 200.
malzacii (Dryoscopus), 492.
manacus (Chiromachæris), 222.
*manadensis* (Monarcha), 290.
*mandarina* (Rallina), 966.
*mandarinus* (Merula), 395.
mandellii (Arboricola), 814.
— (Lusciniola), 371.
— (Minla), 344.
— (Montifringilla), 594.
*mandellii* (*Siphia*), 264.
mandibularis (Nycticorax), 918.
mandti (Uria), 1044.
maneaoensis (Rhipidura), 280.
mangle (Aramides), 963.
mango (Lampornis), 145.
mangoliensis (Ptilopus), 736.
manillæ (Penelopides), 102.
manillensis (Accipiter), 847.
— (Ardea), 910.
— (Caprimulgus), 123.
*manillensis* (Muscicapa), 263.
manillensis (Nycticorax), 918.
*manillensis* (Pelecanus), 1005.
manimbe (Ammodromus), 632.
manningi (Cosmopholoneus), 490.
manipurensis (Microperdix), 813.
mansuetus (Cygnus), 987.
mantananensis (Scops), 885.
mantchuricum (Crossoptilon), 799.
mantelli (Apteryx), 1049.
— (Notornis), 976.
*mantis* (Scops), 885.
mantoui (Lophophorus), 797.
— (Ptilorhis), 521.
manyar (Ploceus), 567.
*marabou* (Leptoptilus), 907.
maracana (Ara), 10.
marail (Penelope), 791.
maraisi (Chlorophoneus), 491.
maranonica (Synallaxis), 198.
maranonicus (Turdus), 400.
marayniocensis (Siptornis), 200.
marchei (Chlorocichla), 1085.
— (Cleptornis), 722.
— (Glareola), 930.
*marchei* (Hypotænidia), 961.
marchei (Numida), 804.
— (Ptilopus), 735.
*marchei* (Xenocichla), 310.
marchesæ (Pericrocotus), 301.

Digitized by Google

marchii (Anthracoceros), 101.
— (Phonipara), 618.
mareensis (Merula), 396.
margaretæ (Ceyx), 112.
margarethæ (Coeligena), 148.
— (Cyanolesbia), 157.
— (Tanysiptera), 106.
margaritaceiventer (Euscarthmus), 232.
margaritæ (Calliste), 667.
— (Certhilauda), 450.
— (Charmosyna), 32.
*margaritæ* (Phlogœnas), 773.
margaritæ (Sporæginthus), 581, 1108.
margaritata (Pygoptila), 181.
margaritatus (Hypargus), 579.
— (Trachyphonus), 40.
margaritifera (Hypocnemis), 1069.
margelanica (Sylvia), 375.
marginalis (Amadina), 579.
— (Cisticola), 364.
— (Hyliota), 272, 1080.
— (Pendulinus), 558.
— (Rallina), 966.
marginata (Ægialitis), 940.
*marginata* (Aplonis), 541.
marginata (Cinclosoma), 319.
— (Collocalia), 130.
*marginata* (Edoliisoma), 298.
marginata (Mirafra), 455, 1099.
*marginata* (Myrmeciza), 1069.
marginata (Rhynchocyclus), 1077.
— (Upupa), 99.
— (Zoothera), 404.
marginatus (Microcerculus), 430.
*marginatus* (Myiozetetes), 241.
— (Pachyrhamphus), 212.
maria (Paradisea), 518.
— (Pitta), 208.
mariæ (Cardinalis), 620.
— (Chrysoptilus), 67.
— (Megalurulus), 324.
— (Puffinus), 1031.
— (Urolais), 1089.
marianæ (Cistothorus), 424.
— (Troglodytes), 425, 1096.
*mariannæ* (Acrocephalus), 369.
marila (Cinclus), 419.
— (Fuligula), 997.
marina (Pelagodroma), 1030.
marinus (Larus), 1024.
mariquensis (Bradyornis), 287.
— (Cinnyris), 698.
maritima (Agriornis), 224.
— (Geositta), 204.
— (Tringa), 951.
maritimus (Ammodromus), 631.
markhami (Oceanodroma), 1029.
*marmorata* (Marmaronetta), 995.
marmorata (Nothura), 785.
— (Odontophorus), 822.
— (Podargus), 117.
— (Ptilotis), 722.
marmoratum (Tigrisoma), 919.
marmoratus (Brachyrhamphus), 1044.
*marmoratus* (Scops), 885.
— (Turdinus), 331.
marshallorum (Megalæma), 38.
marstersi (Acanthiza), 1090.
martensi (Prionops), 1104.
martii (Urospatha), 93.
martinica (Elaïnea), 239.
— (Geotrygon), 770.
— (Porphyriola), 975.
martinicana (Cœreba), 691.
— (Zenaida), 757.
martinicensis (Blacicus), 249.
— (Quiscalus), 1107.
— (Thryothorus), 422.
martius (Dryocopus), 83.
*maruetta* (Porzana), 967.
marungensis (Numida), 804.
marwitzi (Andropadus), 313.
— (Estrelda), 582.
— (Lanius), 1103.
masafueræ (Oxyurus), 202.
masoni (Pyroderus), 218.
massaica (Dendropicus), 1058.
— (Chloropeta), 274.
— (Poicephalus), 9.
— (Struthio), 1052.
massaicum (Tricholæma), 36.
massaicus (Lamprocolius), 1106.
massena (Trichoglossus), 30.
massenæ (Trogon), 87.
*mastersi* (Gerygone), 269.
mastersianus (Platycercus), 24.
masukuensis (Andropadus), 313.
— (Parus), 461.
matschiei (Poicephalus), 9.
matthewsi (Panoplites), 153.
matthiæ (Halcyon), 1062.
— (Rhipidura), 1081.
mattui (Alseonax), 264.
*mauduyti* (Spizaëtus), 848.
maugæi (Sporadinus), 142.
maugei (Conurus), 12.
— (Geopelia), 762.
*maugei* (Ninox), 888.
maura (Pratincola), 387.
mauri (Ereunetes), 949.

Digitized by Google

mauritana (Picus), 70.
mauritanica (Clivicola), 1079.
— (Merula), 1092.
— (Pica), 507.
mauritiana (Zosterops), 713.
maurus (Circus), 836.
mavors (Heliangelus), 155.
*mawensis* (Cossypha), 1094.
maxillaris (Molothrus), 552.
— (Sphecotheres), 528.
maxillosus (Saltator), 645.
*maxima* (Apteryx), 1049.
maxima (Ceryle), 114.
— (Colluricincla), 496.
— (Ianthocincla), 322.
— (Melanocorypha), 452.
— (Merula), 395.
— (Numida), 804.
— (Pitta), 207.
— (Sterna), 1016.
maximiliani (Oryzoborus), 613.
— (Pionus), 7.
— (Pitangus), 243.
— (Pulsatrix), 592.
— (Synallaxis), 199.
maximus (Artamus), 533.
*maximus* (Bubo), 880.
maximus (Macruropsar), 543.
maxwelli (Aplonis), 1105.
— (Hylocharis), 140.
— (Melanopteryx), 1107.
— (Philentoma), 281.
maxwelliæ (Scops), 886.
mayensis (Bubo), 881.
mayeri (Nesœnas), 753.
maynana (Cotinga), 216.
— (Myrmeciza), 174.
maynardi (Coccyzus), 54.
— (Geothlypis), 1097.
— (Picus), 71.
— (Vireo), 473.
mayottensis (Zosterops), 709.
mcgregori (Carpodacus), 604.
mcleodi (Hæmophila), 634.
meadewaldoi (Cannabina), 1109.
*mearnsi* (Cyrtonyx), 821.
mearnsi (Harporhynchus), 417.
— (Junco), 629.
mechowi (Ægialitis), 940.
— (Cercococcyx), 51.
— (Melierax), 839.
media (Calospiza), 1112.
— (Chloropsis), 318.
— (Gallinago), 953.
— (Nothura), 785.
media (Sterna), 1016.
— (Urobrachya), 1108.
mediana (Alophius), 104.
— (Picus), 1058.
— (Saltator), 1111.
mediocris (Cinnyris), 699.
— (Halcyon), 108.
medioximus (Sphenocercus), 1114.
medius (Monarcha), 289.
— (Picus), 72.
*medius* (Tetrao), 825.
meeki (Anthreptes), 704.
— (Cacomantis), 1056.
— (Ceyx), 1062.
— (Dicrurus), 1105.
— (Hypocharmosyna), 1055.
— (Loriculus), 23.
— (Pachycephala), 481.
— (Pitta), 209.
— (Podargus), 117.
— (Syma), 1062.
— (Zosterops), 711.
meiffreni (Ortyxelus), 930.
*megacephalum* (Calopteryx), 234.
megacephalus (Rhynchocyclus), 242.
megala (Gallinago), 953.
megalonyx (Pipilo), 637.
megalopterus (Campylorhynchus), 420.
— (Ibycter), 832.
*megalorhynchus* (Squatarola), 937.
— (Melilestes), 718.
megalorhynchus (Tanygnathus), 18.
megalornis (Dicrurus), 531.
megalotis (Scops), 883.
megalura (Leptoptila), 769.
megapodius (Hylactes), 168.
megarhyncha (Colluricincla), 496.
— (Dendrornis), 1071.
— (Hæmophila), 635.
— (Passerella), 635.
— (Ploceus), 1107.
— (Pitta), 207.
— (Psittacus), 3.
— (Syma), 110.
megarhynchus (Dicranostreptus), 532.
— (Leptodon), 866.
— (Melilestes), 718.
— (Rhamphomantis), 55.
megistus (Aphobus), 561.
melæna (Ardeiralla), 915.
— (Munia), 587.
— (Myrmotherula), 179.
— (Pentholæa), 392.
melaleucus (Tachyphonus), 655.
melamprosopus (Cosmophoneus), 490.

Digitized by Google

melananthera (Spathura), 153.
melanaria (Cercomacra), 176.
— (Merula), 396.
melanauchen (Pyrrhulauda), 459.
— (Sterna), 1018.
*melancholicus* (Baryphthengus), 95.
melancholicus (Tyrannus), 252.
melania (Oceanodroma), 1029.
melanictera (Ixidia), 308.
melanicterus (Cassiculus), 551.
— (Gymnomystax), 556.
— (Melophus), 624.
melanisticus (Oriolus), 526.
melanocephala (Ælurœdus), 523.
— (Anthornis), 723.
— (Ardea), 910.
— (Arenaria), 949.
— (Burnesia), 360.
— (Caccabis), 807.
— (Caica), 8.
— (Emberiza), 622.
— (Heteronetta), 996.
— (Ibis), 901.
— (Motacilla), 444.
— (Setophaga), 441.
— (Spermophila), 616.
— (Zosterops), 712.
melanocephalum (Malacopteron), 337.
— (Tricholæma), 36.
melanocephalus (Ampelion), 215.
— (Brachypodius), 308.
— (Buarremon), 648.
— (Conurus), 11.
— (Cyrtostomus), 703.
*melanocephalus* (Garrulus), 510.
melanocephalus (Graucalus), 296.
— (Hedymeles), 612.
— (Hyphantornis), 562.
— (Larus), 1021.
— (Malurus), 368.
— (Melithreptus), 714.
— (Melizophilus), 375.
*melanocephalus* (Monarcha), 289.
melanocephalus (Oriolus), 527.
— (Pardalotus), 674.
— (Pendulinus), 557.
*melanocephalus* (Pluvianus), 930.
melanocephalus (Ptilopus), 740.
— (Sarciophorus), 934.
— (Tragopan), 797.
— (Trogon), 87.
melanoceps (Dendrocolaptes), 185.
melanocervix (Motacilla), 445.
melanochlamys (Irena), 317.
— (Urospizias), 843.
melanochlorus (Chrysoptilus), 66.
melanochroa (Carpophaga), 747.
melanochrous (Serinus), 600.
— (Thamnophilus), 183.
melanocoryphus (Coccyzus), 54.
— (Cygnus), 987.
melanocrissa (Hirundo), 255.
melanocrissus (Thamnophilus), 184.
melanocyanea (Cyanolyca), 513.
melanoderus (Phrygilus), 640.
melanogaster (Fregetta), 1030.
— (Heterhyphantes), 565.
— (Lamprocolius), 547.
melanogaster (Oreotrochilus), 147.
— (Otis), 926.
— (Plotus), 1011.
— (Spermophila), 616.
— (Sterna), 1014.
— (Thryothorus), 423.
— (Turnix), 779.
melanogastra (Cinclus), 418.
— (Conopophaga), 169.
— (Formicivora), 177.
— (Myrmotherula), 179.
— (Nectarinia), 694.
— (Piaya), 58.
— (Pternistes), 811.
melanogenia (Galbula), 45.
melanogenys (Adelomyia), 154.
*melanogenys* (Anous), 1019.
melanogenys (Basileuterus), 440.
— (Cyclopsitta), 34.
— (Falco), 874.
— (Pœcilodryas), 271.
— (Pœcilothraupis), 664.
melanolæma (Chrysoptilus), 66.
— (Pipreola), 216.
— (Rhipidura), 277.
melanolæmus (Pipilopsis), 648.
*melanoleuca* (Anseranas), 979.
melanoleuca (Atticora), 258.
— (Lalage), 302.
— (Lamprospiza), 644.
— (Malacias), 324.
— (Muscicapula), 294.
— (Oreicola), 273.
— (Poospiza), 628.
— (Rhipidura), 279.
— (Saxicola), 389.
— (Terenura), 177.
melanoleucus (Accipiter), 847.
— (Aëronautes), 126.
— (Artamus), 533.
— (Campophilus), 81.
— (Circus), 836.

Digitized by Google

melanoleucus (Geranoaëtus), 860.
— (Lophoceros), 103.
— (Micrastur), 837.
— (Microhierax), 868.
— (Microtarsus), 309.
— (Phalacrocorax), 1010.
— (Spiziastur), 850.
— (Totanus), 947.
— (Urolestes), 482.
melanolophus (Gorsachius), 918.
— (Lophophanes), 465.
*melanolorus* (Graucalus), 296.
melanonota (Amblyospiza), 570.
— (Calliste), 667.
— (Climacteris), 684.
— (Cossypha), 409.
— (Pipridea), 669.
— (Pulsatrix), 892.
— (Sarcidiornis), 980.
— (Urochroma), 8.
melanonotus (Gennæus), 800.
— (Monarcha), 290.
— (Odontophorus), 822.
— (Porphyrio), 976.
— (Thamnophilus), 183.
*melanope* (Motacilla), 444.
melanopezus (Automolus), 195.
melanophæus (Creciscus), 971.
melanophrys (Diomedea), 1038.
— (Manorhina), 723.
melanopis (Theristicus), 902.
melanopleura (Merula), 396.
*melanopogon* (Caprimulgus), 124.
melanopogon (Hypocnemis), 174.
— (Lusciniola), 371.
— (Melanerpes), 68.
melanops (Ægialitis), 941.
*melanops* (Anous), 1019.
melanops (Artamus), 534.
— (Burnesia), 360.
— (Carcineutes), 110.
— (Centropus), 57.
— (Chrysomitris), 593.
— (Conopophaga), 169.
— (Crateropus), 329.
— (Geothlypis), 437, 1097.
— (Graucalus), 296.
— (Leucopternis), 860.
— (Myiadectes), 407.
— (Phleocryptes), 201.
— (Pipilopsis), 648.
— (Pœcilothraupis), 664.
— (Porphyriops), 974.
— (Spermophila), 616.
— (Stoparola), 291.
melanops (Zosterops), 711.
melanopsis (Monarcha), 289.
*melanopsis* (Theristicus), 902.
melanoptera (Campophaga), 300.
— (Cercotrichas), 413.
— (Chloëphaga), 985.
— (Dendroeca), 433.
— (Glareola), 929.
— (Graculipica), 537.
— (Metriopelia), 765.
— (Mimus), 1095.
*melanoptera* (Platystira), 266.
melanoptera (Strepera), 501.
— (Tanagra), 662.
melanopterus (Monarcha), 289.
— (Pogonorhynchus), 35.
— (Prionops), 1104.
— (Stephanibyx), 936.
melanopygia (Lanio), 656.
— (Parra), 958.
melanorhamphus (Corcorax), 517.
melanorhyncha (Collurricincla), 496.
— (Eudynamis), 54.
— (Lusciniola), 371.
— (Pelargopsis), 114.
*melanorhyncha* (Sterna), 1016.
melanorhynchus (Chlorostilbon), 141.
— (Irrisor), 1061.
— (Ploceipasser), 569.
melanorrhoa (Chalybura), 144.
melanoschista (Accipiter), 845.
melanospila (Ptilopus), 740.
melanosterna (Acridotheres), 538.
— (Brachygalba), 46.
melanosternon (Gypoictinia), 863.
— (Prymnacantha), 165.
melanostethus (Buteo), 857.
melanosticta (Gymnopithys), 173.
*melanosticta* (Hypocnemis), 174.
melanostigma (Trochalopteron), 321.
melanostoma (Harporhynchus), 417.
melanothorax (Cyanoderma), 343.
*melanothorax* (Gerygone), 270.
melanothorax (Sylvia), 375.
— (Thamnophilus), 184.
melanotis (Ælurœdus), 523.
— (Anaplectes), 568.
— (Basileuterus), 439.
— (Calliste), 668.
— (Chlorospingus), 652.
— (Coryphospiza), 639.
— (Milvus), 862.
— (Nesomimus), 416.
— (Odontophorus), 822.
— (Pionopsitta), 7.



Digitized by Google

melanotis (Psaltriparus), 466, 1101.
— (Pterythrius), 487.
*melanotis* (Spilornis), 834.
melanotus (Malurus), 367.
*melanotus* (Monticola), 393.
melanoxantha (Phainoptila), 261.
melanoxanthus (Heterhyphantes), 565.
— (Mycerobas), 611.
— (Prionochilus), 675.
melanura (Anthornis), 723.
— (Cercomela), 391.
— (Ceyx), 111.
— (Cittocincla), 413.
— (Climacteris), 684.
— (Dryodromas), 354.
— (Eophona), 610.
— (Euphonia), 673.
— (Henicornis), 202.
— (Hypocnemis), 174.
*melanura* (Limosa), 945.
melanura (Myiagra), 283.
— (Myristicivora), 747.
— (Pachycephala), 476.
— (Polytelis), 20.
— (Pyrrhura), 13
*melanura* (Rhipidura), 277.
melanura (Rhynchops), 1020.
*melanura* (Sula), 1011.
melanura (Terpsiphone), 1081.
melanuroides (Limosa), 945.
*melanurus* (Himantopus), 942.
— (Larus), 1023.
melanurus (Myiophoneus), 408.
— (Pomatorhinus), 325.
— (Rhamphocœnus), 176.
— (Thamnophilus), 184.
— (Trogon), 87.
*melas* (Ardeiralla), 915.
melas (Edoliisoma), 298.
— (Himantopus), 943.
melba (Cypselus), 125.
— (Pytelia), 578.
meleagrides (Agelastes), 804.
meleagris (Numida), 804.
meligera (Anorthura), 427, 1096.
melindæ (Anthus), 446.
melinus (Sericulus), 525.
melitophrys (Vireolanius), 475.
melleri (Anas), 990.
mellivora (Anellobia), 724.
— (Florisuga), 134.
meloda (Ægialitis), 941.
— (Melopelia), 758.
*melodia* (Melospiza), 633.
melophila (Erithacus), 1091.
meloryphus (Hapalocercus), 234.
melpoda (Sporæginthus), 581.
melpomene (Catharus), 394.
membranaceus (Malacorhynchus), 995.
menadensis (Scops), 884.
— (Turacœna), 754.
menagei (Batrachostomus), 117.
— (Dicrurus), 531.
— (Phlogœnas), 772.
— (Yungipicus), 75.
menckei (Monarcha), 1083.
mendanæ (Acrocephalus), 369
mendiculus (Spheniscus), 1049.
*mendozæ* (Pomarea), 291.
mendozæ (Pseudochloris), 639.
menebiki (Centropus), 55.
meneliki (Oriolus), 527, 1105.
menetriesi (Buteo), 855.
— (Myrmotherula), 179.
meninting (Alcedo), 113.
*meninting* (Ceyx), 112.
menstruus (Pionus), 6.
mentale (Chrysophlegma), 67.
*mentalis* (Anabazenops), 193.
mentalis (Anser), 983.
— (Argya), 323.
— (Artamus), 533.
— (Catharus), 393, 1092.
— (Certhidea), 689.
— (Craelicus), 501.
— (Dysithamnus), 180.
— (Eremomela), 356.
— (Graucalus), 296.
*mentalis* (Icterus), 558.
mentalis (Melocichla), 362.
*mentalis* (Monarcha), 289.
mentalis (Pachycephala), 477.
— (Pipra), 221.
— (Platystira), 266.
— (Rhodospingus), 642.
— (Sigmodus), 498.
— (Sitagra), 564.
menzbieri (Sturnus), 535.
mercenaria (Chrysotis), 5.
mercieri (Ptilopus), 738.
*merganser* (Merganser), 1003.
meriani (Turacus), 89.
meridæ (Pipilopsis), 649.
meridana (Cyanolyca), 513.
meridanus (Basileuterus), 439.
meridionale (Trochalopteron), 322.
*meridionalis* (Acrocephalus), 368.
meridionalis (Asturinula), 839.
*meridionalis* (Athene), 894.
meridionalis (Caprimulgus), 123.

Digitized by Google

*meridionalis* (Conurus), 11.
meridionalis (Eurypyga), 1117.
— (Heterospizias), 861.
— (Lanius), 483.
— (Melilestes), 718.
— (Melittophagus), 96, 1061.
— (Microhierax), 868.
— (Myiodioctes), 442.
— (Nestor), 27.
— (Oriolus), 526.
— (Pachycephala), 480.
*meridionalis* (Parus), 463.
meridionalis (Picus), 71, 1058.
— (Ptilopus), 735.
— (Rhamphococcyx), 1057.
— (Rhectes), 494.
— (Stoparola), 292.
*meridionalis* (Struthio), 1052.
meridionalis (Sturnella), 556.
— (Trogon), 87.
— (Zenaida), 757.
merionis (Merops), 1061.
merlini (Saurothera), 57.
*merriami* (Cyrtonyx), 821.
merriami (Meleagris), 796.
merrilli (Melospiza), 633.
— (Nyctidromus), 121.
— (Otocorys), 452, 1099.
merula (Dendrocincla), 186.
*merula* (*Turdus*), 394.
merulinus (Cacomantis), 52.
— (Garrulax), 328.
meruloides (Dendrocincla), 186.
— (Geocichla), 1094.
*meserythrus* (Crypturus), 783.
mesochrysa (Basileuterus), 440.
— (Euphonia), 673.
mesoleuca (Dendrophila), 682.
— (Elaïnea), 240.
— (Pipilo), 637.
— (Ruticilla), 385, 1091.
mesoleucus (Basileuterus), 440.
— (Thryothorus), 422.
mesomelas (Pendulinus), 557.
mesoxantha (Zosterops), 707.
metabates (Melierax), 839.
metallica (Columba), 752.
— (Hedydipna), 694.
metallicus (Lamprocorax), 542.
*metallicus* (Myiophoneus), 407.
metcalfei (Zosterops), 708.
mevesi (Lamprotornis), 544.
mexicana (Ajaja), 905.
*mexicana* (Asio), 878.
— (Calliste), 667.
mexicana (Cassidix), 1106.
— (Chrysomitris), 592.
— (Cœreba), 690.
— (Cooperastur), 844.
— (Grallaria), 171.
— (Grus), 921.
— (Henicorhina), 429.
— (Hesperiphona), 610.
— (Loxia), 605.
*mexicana* (Meleagris), 796.
mexicana (Muscivora), 244.
*mexicana* (Myiarchus), 250.
mexicana (Nyctibius), 1063.
— (Piaya), 58.
— (Poliioptila), 1091.
— (Pyrocephalus), 246.
— (Sialia), 386.
— (Sitta), 681.
— (Spizella), 630.
— (Sturnella), 555.
— (Zarhynchus), 1106.
mexicanoides (Colaptes), 63.
mexicanus (Attila), 1074.
— (Carpodacus), 604.
— (Catharus), 393.
— (Catherpes), 428.
— (Cinclus), 419.
— (Colaptes), 63, 1057.
— (Corvus), 503.
— (Crypturus), 784.
— (Geococcyx), 61.
— (Hierofalco), 876.
— (Himantopus), 943.
— (Momotus), 94.
— (Myiarchus), 1078.
*mexicanus* (Pendulinus), 1106.
mexicanus (Phaethornis), 132.
— (Phalacrocorax), 1008.
*mexicanus* (Plegadis), 903.
mexicanus (Psilorhinus), 515.
— (Quiscalus), 560.
— (Sclerurus), 191.
— (Trogon), 86.
meyeni (Zosterops), 708.
meyeri (Chrysococcyx), 53.
— (Edoliisoma), 299.
— (Falcinellus), 520.
— (Halcyon), 110.
— (Pachycephala), 478.
— (Philemon), 726.
— (Poicephalus), 9.
— (Ptilotis), 721.
— (Pucrasia), 801.
— (Rhectes), 1104.
— (Rhipidura), 278, 1081.

Digitized by Google

meyeri (Tanysiptera), 106.
— (Timeliopsis), 727.
— (Trichoglossus), 31.
meyerianus (Urospizias), 842.
miamensis (Thryothorus), 422.
micans (Chlorostilbon), 142.
*michalowskii* (Parus), 462.
michleri (Pittasoma), 171.
micra (Vireo), 473.
micrastur (Heliangelus), 155.
microcephalus (Myiodioctes), 1098.
microcyaneus (Halcyon), 108.
micromegas (Picumnus), 84.
*microptera* (Agriornis), 224.
microptera (Mirafra), 457.
micropterus (Cuculus), 51.
— (Podicipes), 1041.
microrhinus (Rhamphococcyx), 59.
microrhyncha (Agyrtria), 136.
— (Arbelorhina), 690, 1112.
— (Bradyornis), 287.
— (Cassicus), 551.
— (Cinnyris), 697.
— (Geothlypis), 1098.
— (Gygis), 1020.
— (Hedimeles), 1110.
*microrhyncha* (Tanysiptera), 106.
microrhynchum (Rhamphomicron), 158.
*microrhynchus* (Ægialitis), 939.
microrhynchus (Batrachostomus), 116.
microsoma (Halocyptena), 1028.
microstephanus (Momotus), 94.
micrura (Myrmia), 161.
— (Sylviella), 355.
midas (Asio), 878.
middendorffi (Anser), 983.
migrans (Lanius), 484, 1103.
— (Milvus), 863.
migratorius (Ectopistes), 756.
— (Turdus), 400.
*mikani* (Crax), 790.
mikettæ (Vireolanius), 475.
milanjensis (Criniger), 311.
— (Turdus), 399.
miles (Lobivanellus), 934.
milesi (Bubo), 880.
militaris (Ara), 10.
— (Chiroxiphia), 222.
*militaris* (Crocopus), 732.
militaris (Hæmatoderus), 218.
— (Trupialis), 555.
milleri (Agyrtria), 136.
*millsi* (Pennula), 969.
milni (Trochalopteron), 322.
milo (Centropus), 55.
milvipes (Hierofalco), 876.
minahasa (Rallina), 966.
*minahassæ* (Nycticorax), 918.
mindanaensis (Macronus), 341.
mindanense (Dicæum), 679.
— (Edoliisoma), 299.
mindanensis (Bolbopsittacus), 22.
— (Ceyx), 112.
— (Copsychus), 411.
— (Eudynamis), 54.
*mindanensis* (Graucalus), 297.
mindanensis (Hydrocorax), 100.
— (Lyncornis), 119.
— (Muscicapula), 294.
— (Ptilocichla), 331.
*mindanensis* (*Volvocivora*), 299.
mindorensis (Carpophaga), 746.
— (Centropus), 55.
— (Graucalus), 297.
— (Iole), 312.
— (Loriculus), 23.
— (Merula), 398.
— (Ninox), 888.
— (Pachycephala), 480.
— (Penelopides), 102.
— (Prioniturus), 17.
— (Scops), 885.
— (Thriponax), 82.
miniata (Setophaga), 441.
— (Cettia), 372.
miniatum (Chrysophlegma), 67.
miniatus (Dendrocolaptes), 185.
— (Pericrocotus), 301.
minima (Alseonax), 264.
— (Batis), 265.
— (Branta), 984.
— (Elaïnea), 1076.
— (Lagonosticta), 577.
— (Leptocoma), 700.
— (Mellisuga), 164.
— (Molothrus), 552.
— (Sylviella), 355.
*minimum* (Dicæum), 679.
*minimus* (Chthonicola), 366.
minimus (Empidonax), 248.
— (Psaltriparus), 466.
— (Spilornis), 834.
minlosi (Thryophilus), 422.
— (Xenerpestes), 200.
minor (Alectrœnas), 742.
— (Andropadus), 313.
— (Artamus), 534.
— (Batis), 1080.
*minor* (Botaurus), 919.
minor (Bradyornis), 287.

Digitized by Google

minor (Calandrella), 453.
*minor* (*Campophaga*), 303.
minor (Campylorhynchus), 419.
— (Carpodacus), 604.
— (Chionarchus), 780.
— (Chordeiles), 118.
— (Cinclodes), 202.
— (Cissa), 508.
— (Cittocincla), 1095.
— (Cnipodectes), 245, 1077.
— (Coccyzus), 53.
— (Colinus), 820.
— (Cotyle), 257.
*minor* (Cygnus), 986.
— (Dacelo), 1062.
minor (Dendrocincla), 186.
— (Dicrurus), 529.
— (Diuca), 641.
— (Estrelda), 581.
— (Eudyptula), 1048.
— (Euphonia), 673.
— (Falco), 875.
*minor* (Fregata), 1012.
minor (Furnarius), 203.
— (Garrulus), 510.
— (Geospiza), 608.
— (Hadrostomus), 211.
— (Halcyon), 108.
— (Huhua), 882.
— (Hylophilus), 474.
— (Indicator), 34.
— (Ketupa), 879.
— (Lalage), 302.
— (Lamprocorax), 542.
— (Lamprolia), 392.
*minor* (Lampropsar), 559.
minor (Lanius), 483.
— (Leptopogon), 237.
*minor* (Locustella), 370.
minor (Lophorhina), 522.
— (Lophotriccus), 233.
— (Macropygia), 754.
— (Malacocincla), 333.
*minor* (Myiodynastes), 244.
minor (Nilaus), 488.
*minor* (Numenius), 945.
minor (Odontorhynchus), 1095.
— (Paradisea), 518.
— (Parus), 461.
*minor* (Pelecanus), 1005.
minor (Pellorneum), 336.
— (Peltops), 1083.
— (Pentholæa), 392.
— (Percnostola), 175.
— (Philohela), 955.
minor (Phœnicopterus), 908.
— (Picus), 71.
— (Pipra), 221.
— (Platalea), 904.
*minor* (Podicipes), 1040.
minor (Pœcilodryas), 272.
— (Pycnonotus), 1084.
— (Pyrenestes), 576.
— (Pyromelana), 572.
— (Reinwardtœnas), 75
— (Rhabdornis), 685.
— (Rhinopomastus), 98.
— (Spermestes), 1108.
— (Sturnus), 535.
— (Sycalis), 602.
— (Tanysiptera), 106.
— (Telephonus), 488.
— (Thryophilus), 421.
— (Turdus), 402.
— (Zosterops), 708.
minulla (Batis), 265.
minullum (Dicæum), 679.
minullus (Accipiter), 845.
— (Cinnyris), 699.
*minus* (Drymocataphus), 334.
minuscula (Sylvia) 374.
— (Turdus), 402.
*minuta* (Æthopyga), 696.
minuta (Ardetta), 914.
*minuta* (Atticora), 258.
minuta (Barbatula), 37.
— (Cettia), 372.
— (Columbigallina), 764.
— (Euphonia), 673.
— (Munia), 588.
— (Piaya), 58.
*minuta* (Porzana), 967.
minuta (Ptilocichla), 331.
— (Scops), 883.
*minuta* (Siphia), 292.
minuta (Spermophila), 615.
— (Sterna), 1017.
— (Tringa), 951.
— (Zosterops), 710.
*minutilla* (Glaucidium), 897.
minutilla (Tringa), 952.
minutissimus (Picumnus), 83
minutus (Antichromus), 489.
— (Colæus), 505.
— (Dendropicus), 73.
— (Histrionicus), 999.
— (Larus), 1021.
— (Numenius), 945.
— (Picumnus), 84.
miosnomensis (Pachycephala), 479

Digitized by Google

miqueli (Ptilopus), 740.
mirabilis (Dicrurus), 529.
mirabilis (Loddigesia), 166.
*mirabilis* (Palmeria), 692.
mirabilis (Paradisea), 1105.
— (Poephila), 585.
miramaræ (Galerida), 457.
miranda (Daphœnositta), 682.
mirandollei (Micrastur), 837.
misoriensis (Chrysococcyx), 53.
— (Nasiterna), 24.
— (Urospizias), 842.
mississipiensis (Ictinia), 864.
*missouriensis* (Lophophanes), 465.
mitchelli (Phegornis), 956.
— (Philodice), 161.
— (Trichoglossus), 31.
mitrata (Numida), 804.
— (Rhinocichla), 327.
mitratus (Conurus), 11.
— (Myiodioctes), 442.
*mitratus* (Pelecanus), 1005.
— (Pionopsitta), 7.
*mitu* (Mitua), 790.
mixta (Batis), 265.
mixtus (Batrachostomus), 117.
— (Picus), 72.
mlokosiewiczi (Lyrurus), 826.
moabiticus (Passer), 598.
mocinno (Pharomacrus), 85.
mocoa (Cyanolesbia), 157.
mocquerysi (Eupsychortyx), 820.
modesta (Aidemosyne), 585.
*modesta* (Ara), 10.
modesta (Arachnothera), 705.
— (Bessonornis), 410.
— (Butalis), 262.
— (Cisticola), 365.
— (Cosmophoneus), 490.
— (Erythrura), 584.
— (Galerida), 458.
— (Geothlypis), 1097.
— (Gerygone), 268.
— (Glycyphila), 717.
— (Grallaria), 170.
*modesta* (Herodias), 912.
modesta (Myiagra), 283.
— (Palæornis), 19.
— (Pœcilodryas), 271.
— (Psittacella), 21.
— (Pyrrhulauda), 460.
— (Siptornis), 200.
— (Turacœna), 754.
— (Zosterops), 713.
modestus (Bradyornis), 287.
modestus (Cabalus), 962.
*modestus* (Corvus), 504.
modestus (Dicrurus), 529.
— (Eudromias), 938.
— (Larus), 1023.
*modestus* (Merops), 97.
modestus (Prionochilus), 675.
— (Sylviparus), 465.
— (Thryophilus), 421.
*modestus* (Tragopan), 797.
modestus (Vireo), 473.
modiglianii (Gerygone), 268.
— (Macropygia), 755.
— (Pericrocotus), 301.
modularis (Accentor), 381.
modulator (Cyphorhinus), 429.
— (Mimus), 416.
*moebiusi* (Nothoprocta), 785.
moesta (Lalage), 302.
— (Saxicola), 389.
— (Synallaxis), 197.
moestissima (Fregetta), 1030.
mogilnik (Aquila), 851.
molessoni (Emberiza), 622.
molinæ (Pelecanus), 1006.
— (Pyrrhura), 14.
molitor (Batis), 265.
— (Cinclodes), 1073.
molleri (Prinia), 359.
mollessoni (Hypolais), 373.
mollis (Lanius), 483.
— (Œstrelata), 1034.
mollissima (Chamæza), 171.
— (Oreocincla), 404.
*mollissima* (Phlexis), 349.
mollissima (Somateria), 1000.
moloneyanus (Illadopsis), 336.
moltchanovi (Parus), 1100.
molucca (Ibis), 901.
— (Urolonchа), 585.
moluccana (Amaurornis), 972.
moluccensis (Cacatua), 3.
— (Philemon), 726.
— (Tinnunculus), 870.
molybdophanes (Ptilogonys), 261
— (Struthio), 1052.
moma (Sylvia), 375.
mombasæ (Chlorocichla), 313.
mombassica (Campothera), 66.
*momota* (Momotus), 94
momotula (Hylomanes), 95.
monacha (Crateroscelis), 333.
— (Lalage), 303.
— (Myiopsitta), 14.
— (Pachycephala), 480.

Digitized by Google

monacha (Saxicola), 388.
— (Sitagra), 564.
*monachus* (Ægialitis), 941.
monachus (Artamus), 533.
— (Centropus), 57.
— (Dryonastes), 328.
— (Grus), 922.
— (Illadopsis), 336.
— (Monachalcyon), 105.
— (Neophron), 831.
— (Oriolus), 527.
— (Ptilopus), 738.
*monachus* (Tropidorhynchus), 725.
monachus (Vultur), 829.
monasa (Pennula), 969.
mondetoura (Claravis), 765.
monedula (Colæus), 505.
moneduloides (Corvus), 505.
mongolica (Erythrospiza), 596.
— (Melanocorypha), 453.
mongolicus (Charadrius), 938.
— (Phasianus), 802, 1115.
moniliger (Anthipes), 294.
— (Batrachostomus), 117.
— (Formicarius), 172.
— (Garrulax), 327.
monocerata (Ceratorhyncha), 1046.
monogrammica (Asturinula), 839.
monorhis (Oceanodroma), 1029.
*monosyllabicus* (Cuculus), 51.
monotonus (Graucalus), 295.
montagnii (Penelope), 791.
montana (Agriornis), 224.
— (Brachypteryx), 342.
— (Buthraupis), 663.
— (Certhia), 683.
— (Cettia), 372.
— (Crateroscelis), 333.
— (Dendroeca), 434.
— (Geotrygon), 770.
— (Hesperiphona), 610.
— (Junco), 629.
— (Margarops), 414.
— (Melospiza), 633.
— (Mixornis), 341.
— (Nestor), 27.
— (Oreomyza), 692.
— (Parus), 462.
— (Perdix), 812.
— (Pinicola), 606.
*montana* (Ptilotis), 720.
montana (Saxicola), 389.
— (Zosterops), 706.
montanellus (Accentor), 381.
montani (Anthracoceros), 101.
montanum (Edoliisoma), 298.
montanus (Anabazenops), 193.
— (Andropadus), 313.
*montanus* (Anthus), 446.
montanus (Charadrius), 938.
— (Myiadectes), 406.
— (Oreoscoptes), 415.
— (Passer), 597.
— (Pericrocotus), 301, 1084.
— (Pomatorhinus), 325.
— (Prioniturus), 17.
monteiri (Alophius), 104.
— (Clytospiza), 570.
— (Hirundo), 255.
— (Malaconotus), 489, 1103.
montensis (Phæomyias), 1076.
montezumæ (Cyrtonyx), 821.
— (Gymnostinops), 549.
monticola (Grallaria), 170.
— (Iole), 312.
— (Megalæma), 39.
— (Picus), 71.
— (Saxicola), 389.
— (Spizella), 630.
— (Troglodytes), 426.
— (Zoothera), 404.
monticolum (Dicæum), 677.
monticolus (Caprimulgus), 124.
— (Parus), 461.
montifringilla (Fringilla), 589.
montis (Cryptolopha), 286.
— (Mesolophus), 308.
— (Stasiasticus), 335.
montium (Notodela), 384.
— (Paramythia), 261.
— (Sitta), 680.
montivagus (Cypselus), 126.
moori (Alethe), 1094.
*moguini* (Hæmatopus), 933.
morcomi (Atthis), 163.
— (Dendroeca), 433.
moreleti (Fringilla), 589.
morelleti (Spermophila), 616.
morenoi (Gymnopelia), 1114.
moretoni (Malurus), 367.
morinellus (Eudromias), 938.
morio (Amydrus), 545.
— (Edoliisoma), 299.
— (Psilorhinus), 515.
*morio* (Saxicola), 388.
morokæ (Pachycephala), 1102.
morotensis (Lycocorax), 517.
— (Monarcha), 289, 1083.
*morotensis* (Tanygnathus), 18.
morotensis (Scops), 884.

Digitized by Google

morpheus (Monasa), 49.
morphnoides (Eutolmaëtus), 851.
morrisonia (Alcippe), 345.
mortieri (Tribonyx), 973.
mortoni (Chalcophaps), 766.
— (Dissoura), 1117.
mosambica (Coracias), 93.
*mosambica* (Podica), 978.
moschata (Cairina), 980.
maseleyi (Halcyon), 110.
mosquera (Eriocnemis), 154.
mosquitus (Chrysolampis), 146.
*mossambicus* (Laniarius), 491.
motacilla (Henicocichla), 436.
motacilloides (Herpsilochmus), 178.
*motacilloides* (Rhipidura), 279.
motitensis (Passer), 598.
motmot (Ortalida), 792.
mouhoti (Garrulax), 327.
mouroniensis (Zosterops), 709.
moussieri (Pinarochroa), 388.
muelleri (Cisticola), 365.
— (Erythromyias), 267.
— (Hedydipna), 694, 1112.
— (Hypotænidia), 961.
— (Merops), 96.
— (Pitta), 208.
*muelleri* (Rhipidura), 277.
— (Urospizias), 843.
muelleriana (Monachella), 271.
*mugimaki* (Muscicapa), 263.
mulleri (Carpophaga), 746.
— (Edoliisoma), 298.
— (Pseudozosterops), 713.
— (Tanygnathus), 18.
mulsanti (Acestrura), 163.
multicolor (Cosmophoneus), 490.
— (Petroeca), 266.
— (Psephotus), 25.
— (Pyrrhurus), 1085.
— (Saltatricula), 636.
*multicolor* (Setophaga), 441.
multicolor (Spindalis), 661.
— (Todus), 95.
*multicolor* (Trichoglossus), 31.
multicolor (Xenocichla), 310.
multiguttata (Dendrornis), 190.
multipunctata (Nucifraga), 506.
multistriata (Accentor), 381.
multistriatus (Thamnophilus), 182.
*multistrigatus* (Dendrocolaptes), 185.
*multostriata* (Siptornis), 200.
munda (Erythropygia), 412.
— (Puffinus), 1032.
— (Serphophaga), 235.
mundus (Heteranax), 1083.
— (Monarcha), 289.
*munipurensis* (Cisticola), 364.
— (Suthora), 470.
*munroii* (Branta), 984.
muraria (Tichodroma), 684.
murina (Alseonax), 264.
— (Aquila), 852.
— (Atticora), 257.
— (Crateroscelis), 333.
— (Cypselus), 125, 1064.
— (Gerygone), 269.
*murina* (Ochthornis), 227.
murina (Pyrrhula), 607.
— (Tænioptera), 225.
— (Thryomanes), 424.
*murina* (Turdinulus), 332.
murina (Turdus), 401.
murinus (Bathmocercus), 331.
— (Bradyornis), 287.
— (Eleopicus), 76.
— (Laniarius), 1104.
*murinus* (Myiopsitta), 14.
— (Sublegatus), 241.
murinus (Thamnophilus), 183.
*musæ* (*Tatare*), 369.
muscatensis (Merops), 97.
*muschenbroeki* (Artamus), 533.
muschenbroeki (Neopsittacus), 33.
— (Ptilopus), 741.
— (Surniculus), 50.
muscicapinus (Bradyornis), 287.
— (Hylophilus), 474.
musculus (Ægithalus), 468.
— (Troglodytes), 426.
*musgravianus* (Amblyornis), 525.
musica (Copsychus), 411.
— (Euphonia), 671.
musicus (Bias), 265.
*musicus* (Cygnus), 986.
musicus (Cyphorhinus), 429.
*musicus* (Melierax), 838.
musicus (Nuttallornis), 1078.
— (Pomatorhinus), 326.
— (Thryothorus), 422.
— (Turdus), 399.
mussoti (Zosterops), 707.
mustelina (Synallaxis), 198.
mustelinus (Turdus), 402.
mutata (Terpsiphone), 280.
*muthura* (Gennæus), 800.
muticus (Pavo), 795.
mutus (Lagopus), 826.
myadestina (Phæornis), 284.
myiotherina (Hypocnemis), 173.

Digitized by Google

*myochrous* (Tachornis), 126.
myoptilus (Cypselus), 126.
myristicivora (Carpophaga), 743.
myrtha (Syrnium), 891.
mysorensis (Geoffroyus), 17.
*mysorensis* (Hermotimia), 700.
— (Lorius), 29.
mysorensis (Zosterops), 708.
mysoriensis (Dicæum), 678.
— (Todopsis), 275.
mystacale (Chrysophlegma), 67.
mystacalis (Æthopyga), 696.
— (Apalis), 353.
— (Cyanocorax), 514.
— (Diglossa), 685.
— (Hæmophila), 634.
— (Iole), 318.
— (Malacoptila), 48.
— (Meliornis), 723.
*mystacalis* (Pyrgisoma), 636.
mystacalis (Rhabdornis), 685.
— (Thryothorus), 423.
mystacea (Geotrygon), 771.
— (Macropteryx), 130.
— (Prinia), 359.
— (Sylvia), 375.
mystaceus (Platyrhynchus), 231.
mystacophanes (Megalæma), 39.
nacunda (Podager), 118.
*nævia* (Aquila), 852.
nævia (Coracias), 93.
— (Geocichla), 405.
— (Henicocichla), 436, 1097.
— (Heterocnemis), 175.
— (Hypocnemis), 174.
— (Locustella), 370.
— (Mirafra), 456.
*nævioides* (Aquila), 852.
nævioides (Hypocnemis), 174.
nævius (Diplopterus), 61.
— (Myiobius), 246.
— (Rhamphodon), 131.
— (Symmorphus), 304.
— (Thamnophilus), 183, 1070.
nævosa (Stictonetta), 989.
*nagaensis* (Drymocataphus), 334.
nagaensis (Sitta), 680.
*nais* (Tanysiptera), 106.
namaqua (Pteroclurus), 776.
namaquus (Dendropicus), 74.
namiyei (Erithacus), 382.
— (Hirundo), 254.
— (Picus), 72.
nana (Acanthiza), 366.
— (Aphelocoma), 512.
nana (Cannabina), 1109.
— (Chlorostilbon), 1066.
— (Cisticola), 365.
— (Dendrornis), 189.
— (Grallricula), 169.
— (Lawrencia), 248.
— (Oreomyza), 692.
— (Pœcilodryas), 272.
— (Sisura), 288.
— (Spermestes), 577.
— (Sylvia), 375.
— (Turnix), 778.
nandensis (Dendropicus), 1058.
— (Dryoscopus), 492.
— (Sycobrotus), 565.
*nandu* (Rhea), 1052.
nanina (Nasiterna), 24.
nanum (Glaucidium), 896.
nanus (Conurus), 12.
*nanus* (Cyclopsitta), 34.
nanus (Hierococcyx), 50.
— (Ptilopus), 741.
— (Pyrocephalus), 246, 1077.
— (Taoniscus), 785.
— (Vireo), 473.
— (Yungipicus), 75.
napæa (Dacnis), 688.
— (Ornithion), 238.
napensis (Cercomacra), 176.
— (Psophia), 923.
— (Tachyphonus), 656.
napoleonis (Polyplectron), 796.
narcissina (Xanthopygia), 272.
narcondami (Rhytidoceros), 102.
narina (Hapaloderma), 87.
nasalis (Pyctorhis), 340.
nasesus (Neorhynchus), 614.
nasica (Licmetis), 3.
— (Treron), 733.
nasicus (Corvus), 505.
*naso* (Calyptorhynchus), 2.
nasuta (Lanius), 1103.
nasutus (Lophoceros), 103.
natalensis (Caprimulgus), 124.
— (Chloropeta), 274.
— (Cisticola), 365.
— (Cossypha), 409.
— (Francolinus), 810.
— (Ispidina), 111.
— (Sphenœacus), 337.
natalis (Chalcophaps), 766.
— (Collocalia), 130.
— (Ninox), 890.
— (Urospizias), 843.
— (Zosterops), 708.



Digitized by Google

nationi (Æthyia), 997.
*nationi* (Myiobius), 245.
nationi (Pyrgisoma), 636.
nativitatis (Puffinus), 1032.
nattereri (Anthus), 448.
— (Chrysotis), 5.
— (Cotinga), 216.
— (Lurocalis), 118.
— (Momotus), 94.
— (Phaethornis), 132.
*nattereri* (Phylloscopus), 377.
nattereri (Pipra), 221.
— (Rupornis), 859.
— (Selenidera), 44.
— (Tachyphonus), 656.
natunensis (Strachyrhis), 339.
naumanni (Merula), 397.
— (Tinnunculus), 871.
*nearctica* (Fuligula), 997.
nebouxi (Sula), 1012.
nebulosa (Rhipidura), 276.
nebulosum (Syrnium), 890.
nebulosus (Picumnus), 83.
nectarinioides (Cinnyris), 697.
neera (Chrysuronia), 140, 1066.
neglecta (Anorthura), 428, 1096.
— (Campophaga), 301.
— (Carpophaga), 745.
— (Centurus), 1058.
— (Chlorodyta), 353.
— (Collocalia), 130.
— (Columba), 749.
— (Cyanomitra), 702.
— (Gerygone), 269.
— (Lamprocorax), 543.
— (Lusciniola), 371.
— (Œstrelata), 1035.
— (Pachycephala), 478.
— (Parus), 462, 1101.
— (Polyerata), 136.
— (Salpinctes), 427.
— (Sitta), 680.
— (Sturnella), 555.
— (Tinnunculus), 870.
— (Zosterops), 707.
neglectum (Dicæum), 677.
— (Edoliisoma), 299.
neglectus (Anser), 983.
— (Colæus), 505.
— (Pericrocotus), 301.
— (Phalacrocorax), 1008.
— (Pyrotrogon), 1060.
— (Trichoglossus), 31.
— (Tropidorhynchus), 725.
— (Veniliornis), 1059.
nehrkorni (Dicæum), 677.
— (Edoliisoma), 299.
— (Hyliota), 272.
— (Neolesbia), 143.
— (Zosterops), 710.
*nelicourvi* (Nelicurvius), 567.
nelsoni (Ammodromus), 632.
— (Geothlypis), 1098.
— (Lagopus), 827.
— (Larus), 1025.
— (Pendulinus), 557.
— (Phœnicothraupis), 1111.
— (Picus), 71.
— (Quiscalus), 1107.
— (Sitta), 1112.
nematura (Lochmias), 202.
nemoricola (Gallinago), 954.
— (Montifringilla), 595.
— (Spodiopsar), 536.
*nenday* (Conurus), 11.
nengeta (Tænioptera), 225.
neobritannica (Porphyrio), 976.
neohanoveranus (Eurystomus), 1061.
neoxena (Ardetta), 914.
— (Hirundo), 254.
— (Leptoptila), 770.
neoxenus (Euptilotis), 86.
nepalensis (Aceros), 102.
— (Palæornis), 18.
nereis (Oceanites), 1030.
— (Sterna), 1017.
nesiotes (Sula), 1012.
nesiotis (Edoliisoma), 299.
— (Porphyriornis), 973.
— (Synallaxis), 1072.
*nesiotis* (Yungipicus), 74.
nesophila (Ardeiralla), 915.
— (Cinnyris), 697.
— (Thryomanes), 424.
*nestor* (Merula), 397.
neumanni (Campothera), 65.
— (Cisticola), 1090.
— (Hirundo), 1079.
— (Lophoceros), 103.
neumayeri (Sitta), 680.
neutralis (Agelæus), 1106.
nevadensis (Amphispiza), 627.
newarense (Syrnium), 891.
newelli (Puffinus), 1031.
newtoni (Calamocichla), 352.
— (Cœreba), 690.
— (Cyanomitra), 702.
*newtoni* (Gymnasio), 896
newtoni (Lalage), 303.
— (Lanius), 485.

Digitized by Google

newtoni (Oreomyza), 692.
— (Terpsiphone), 281.
— (Tinnunculus), 871.
— (Zosterops), 713.
newtoniana (Prionodura), 524.
niansæ (Cypselus), 125.
niasense (Syrnium), 891.
niasensis (Æthopyga), 696.
— (Chrysophlegma), 67.
niassæ (Cinnyris), 698.
nicaraguensis (Quiscalus), 560.
nicobarica (Æthopyga), 696.
— (Calœnas), 774.
— (Palæornis), 20.
— (Scops), 883.
— (Terpsiphone), 280.
— (Zosterops), 707.
nicobariensis (Iole), 1085.
— (Megapodius), 786.
nicholsoni (Anthus), 446.
*nidifica* (Collocalia), 129.
nidipendulus (Euscarthmus), 232.
nieuwenhuisi (Chrysococcyx), 1056.
— (Euptilosus), 1085.
nigellicauda (Psarophonus), 528.
*niger* (Capito), 41.
niger (Copsychus), 411.
— (Geranospizias), 838.
— (Hadrostomus), 211.
— (Hæmatopus), 933.
— (Limnocorax), 972.
— (Melanoparus), 460.
— (Melierax), 839.
*niger* (Milvus), 863.
niger (Neoctantes), 181.
— (Nephœcetes), 129.
— (Pachyrhamphus), 212.
— (Phasidus), 804.
— (Plectropterus), 980.
— (Quiscalus), 560.
— (Textor), 569.
nigerrima (Hypochæra), 575, 1108.
— (Melanopteryx), 567.
— (Munia), 587.
nigerrimus (Cnipolegus), 228.
— (Hypsipetes), 316.
— (Laniarius), 492.
— (Nesopsar), 555.
nigra (Astrapia), 519.
— (Campophaga), 300.
— (Campothera), 1057.
— (Ciconia), 906.
— (Cittocincla), 413.
— (Coracopsis), 4.
— (Crypsirhina), 508.
nigra (Hydrochelidon), 1013.
— (Lessonia), 230.
— (Melanocharis), 676.
— (Melanoperdix), 815.
— (Melopyrrha), 618.
— (Merula), 394, 1092.
— (Monasa), 48.
*nigra* (Muscicapa), 263.
nigra (Myzomela), 716.
— (Oedemia), 999.
— (Parra), 958.
— (Penelopina), 792.
— (Pomarea), 291.
— (Rhynchops), 1020.
— (Thamnolæa), 391.
— (Tijuca), 215.
nigrescens (Ammodromus), 631.
— (Antrostomus), 122.
— (Bubo), 881.
— (Chamæospiza), 635.
— (Dendroeca), 434.
— (Dicrurus), 529.
— (Melanorhectes), 495.
— (Merula), 395.
— (Mirafra), 456.
— (Myiochanes), 250.
— (Platycercus), 24.
— (Rheinardtius), 1115.
— (Strix), 899.
— (Thamnophilus), 183, 1070.
— (Yungipicus), 74.
nigricans (Branta), 985.
— (Centropus), 56.
— (Cercomacra), 176.
— (Mirafra), 456.
*nigricans* (Ocydromus), 964.
nigricans (Petrochelidon), 258.
— (Pycnonotus), 305.
— (Rallus), 961.
— (Sayornis), 227, 1075.
— (Scotornis), 120, 1063.
— (Serphophaga), 236.
— (Sigmodus), 498.
nigricantium (Syrnium), 891.
nigricapilla (Formicarius), 172.
— (Myiarchus), 1078.
— (Perisoreus), 511.
*nigricapillus* (Basileuterus), 439.
nigricapillus (Lioptilus), 273.
— (Nothocercus), 782.
— (Thryophilus), 422.
— (Tyranniscus), 239.
nigricapitatus (Drymocataphus), 334.
nigricauda (Agyrtria), 136.
— (Automolus), 195.

Digitized by Google

nigricauda (Cittocincla), 413.
— (Myrmeciza), 174.
nigricaudata (Campylorhynchus), 420.
nigricephala (Spindalis), 661.
nigriceps (Apalis), 353.
— (Arremon), 647.
— (Chrysomitris), 593.
— (Eleopicus), 76.
— (Hyphantornis), 563.
— (Lanius), 485, 1103.
— (Mecocerculus), 1075.
— (Merula), 396.
— (Myiarchus), 251.
— (Munia), 587.
— (Orthotomus), 361.
— (Polioptila), 380, 1091.
— (Pyrrhulauda), 460.
— (Spermestes), 576.
— (Strachyrhis), 339.
— (Tanysiptera), 105.
— (Terpsiphone), 281.
— (Thamnophilus), 183.
— (Tityra), 211.
— (Todirostrum), 231.
— (Xenocichla), 310.
nigricincta (Phaethornis), 133.
— (Xerophila), 468.
*nigricinereus* (Melanoparus), 460.
nigricollis (Busarellus), 862.
*nigricollis* (Chauna), 979.
nigricollis (Chloropsis), 318.
— (Colius), 91.
*nigricollis* (Cygnus), 987.
nigricollis (Euphonia), 672.
— (Graculipica), 537.
— (Grus), 922.
— (Heterhyphantes), 564.
*nigricollis* (Himantopus), 942.
nigricollis (Lagonosticta), 578.
— (Lampornis), 145.
— (Phœnicocercus), 215.
— (Podicipes), 1041.
— (Strachyrhis), 339.
— (Turnix), 779.
nigricotis (Motacilla), 443.
nigricrissus (Eupetes), 319.
nigricristatus (Basileuterus), 439.
— (Thamnophilus), 182.
*nigrifrons* (Ægialitis), 941.
nigrifrons (Alcippe), 345.
— (Chlorospingus), 651.
— (Cosmophoneus), 490.
— (Cyclopsitta), 34.
— (Dendroeca), 435, 1097.
— (Formicarius), 172, 1069.
nigrifrons (Graucalus), 295.
— (Leptopogon), 237.
— (Monasa), 49.
— (Muscisaxicola), 230.
— (Pyromelana), 572.
— (Rhipidura), 277.
— (Tricholæma), 1055.
nigrifumosa (Synallaxis), 198.
nigrigenis (Gecinus), 64.
nigrigenys (Conopophaga), 169.
nigrilora (Parula), 432.
nigriloris (Cisticola), 363.
— (Mimus), 415.
— (Parus), 1100.
nigrilorum (Turdus), 400.
nigrimentalis (Stoparola), 292.
nigrimentum (Dicæum), 676.
— (Estrelda), 582.
— (Monarcha), 289.
*nigrimentum* (Pachycephala), 477.
nigrimentum (Yuhina), 346.
nigripectus (Colinus), 820.
— (Machærirhynchus), 285.
— (Symmorphus), 304.
nigripennis (Eurostopus), 119.
— (Gallinago), 953.
— (Œstrelata), 1034.
— (Oriolus), 528.
— (Pavo), 795.
nigripes (Dacnis), 688.
— (Diomedea), 1038.
— (Herodias), 912.
nigripileus (Molpastes), 305.
nigriplumbea (Accipiter), 846.
nigrirostris (Andigena), 43.
— (Arremon), 647.
— (Ceyx), 112.
— (Columba), 753.
— (Cyclorhis), 476.
— (Macropygia), 756.
— (Turdus), 401.
nigriscapalis (Colius), 91.
nigriscapularis (Caprimulgus), 124.
— (Hermotimia), 700.
nigrita (Hirundo), 254.
— (Myzomela), 716.
— (Ochthoeca), 226.
nigritemporalis (Nilaus), 488.
nigrithorax (Cosmophoneus), 490.
nigritorquis (Munia), 587.
— (Rhipidura), 279.
nigriventris (Eupherusa), 144.
— (Myzomela), 715.
— (Pyromelana), 571.
nigrivertex (Basileuterus), 439.

Digitized by Google

nigrivestis (Eriocnemis), 153.
nigroauantia (Spermophila), 615.
nigrocapitatus (Zosterornis), 339.
nigrocincta (Calliste), 668.
— (Corythopis), 168.
nigro-cinereus (Thamnophilus), 183.
nigrocristatus (Anæretes), 236.
*nigrocyanea* (Halcyon), 108.
nigrogularis (Colinus), 821.
— (Collnricincla), 496.
— (Cracticus), 500.
— (Phalacrocorax), 1007.
— (Psophodes), 320.
— (Rhamphocœlus), 660.
— (Siphia), 293.
— (Trichoglossus), 31.
nigrofasciata (Thalurania), 143.
nigrofumosus (Cinclodes), 202.
nigrogenys (Paroaria), 642.
nigroguttata (Nothura), 785.
nigrolineata (Ciccaba), 893.
— (Grallaria), 170.
nigrolutea (Ægithina), 341.
nigromaculata (Phlogopsis), 172.
nigromentalis (Rhipidura), 279.
nigromitrata (Trochocercus), 276.
nigronotata (Urobrachya), 573.
nigropectus (Biatas), 181.
nigropileus (Merula), 396.
nigrorufa (Hirundo), 254.
— (Sericornis), 367.
— (Siphia), 293.
— (Spermophila), 615.
nigrorufus (Centropus), 56.
nigrorum (Carpophaga), 745.
— (Cittocincla), 413.
— (Cryptolopha), 285.
— (Merula), 396.
— (Muscicapula), 294.
— (Phabotreron), 734.
— (Zosterops), 710.
nigrosquamatus (Francolinus), 810.
nigrostellatus (Pomatorhinus), 326.
*nigrostriatus* (Oriolus), 527.
nigrotecta (Poephila), 584.
nigroviridis (Calliste), 667.
*nigrum* (Edoliisoma), 298.
nilghiriensis (Anthus), 446.
nilgiriensis (Oreocincla), 403.
ningpoense (Trochalopteron), 321.
nipalense (Pellorneum), 336.
nipalensis (Acanthoptila), 322.
— (Actinodura), 331.
— (Accentor), 382.
— (Æthopyga), 696.
nipalensis (Alcippe), 345.
— (Anorthura), 427, 1096.
— (Brachypteryx), 342.
— (Caprimulgus), 123.
— (Certhia), 684.
— (Chelidon), 256.
— (Cutia), 348.
— (Hirundo), 255.
— (Huhua), 882.
— (Hydrornis), 207.
*nipalensis* (Phodilus), 898.
nipalensis (Procarduelis), 590.
— (Pucrasia), 801.
— (Pyrrhula), 607.
— (Spizaëtus), 848.
— (Suthora), 471.
— (Treron), 733.
nippon (Ibis), 901.
nisbetti (Gennæus), 1115.
nisicolor (Hierococcyx), 1056.
nisoria (Glycyphila), 717.
— (Munia), 587.
— (Sylvia), 374.
nisorius (Thryophilus), 422.
nisus (Accipiter), 844.
nitens (Columba), 752.
— (Hypochæra), 574.
*nitens* (Lamprocolius), 547.
nitens (Malimbus), 568.
— (Phainopepla), 261.
— (Psalidoprocne), 260.
— (Trochocercus), 276.
nitida (Acanthopneuste), 376.
— (Arbelorhina), 690.
— (Asturina), 859.
— (Myiagra), 283.
*nitida* (Phæoptila), 139.
nitida (Phalænoptilus), 121.
— (Pœcilodryas), 272.
nitidicauda (Agyrtria), 136.
nitidifrons (Agyrtria), 136.
nitidissima (Alectrœnas), 742.
— (Chlorochrysa), 670.
*nitidissima* (Chlorostilbon), 141.
nitidissimus (Tachyphonus), 656.
nitidula (Lagonosticta), 578.
nitidulus (Hypargus), 579.
nitidum (Dicæum), 677.
nitidus (Carpodectes), 217.
— (Monarcha), 290.
nivalis (Chen), 982.
— (Montifringilla), 594.
— (Plectrophanes), 624.
nivaria (Haplospiza), 627.
*nivea* (Herodias), 912.

Digitized by Google

nivea (Pagodroma), 1035.
*nivea* (Rissa), 1027.
*niveifrons* (Ægialitis), 940.
niveigularis (Tyrannus), 252.
niveiguttatis (Hypargus), 579.
niveipectus (Agyrtria), 136.
*niveiventris* (Dendroeca), 434.
niveiventris (Saucerottea), 137.
niveogularis (Acredula), 466.
niveus (Chasmorhynchus), 219.
nivicola (Lerwa), 805.
— (Syrnium), 890.
nivosa (Ægialitis), 940.
— (Alæmon), 451.
— (Campothera), 66.
nobilis (Ara), 10.
*nobilis* (Ardea), 909.
nobilis (Corvus), 502.
— (Chamæza), 171.
*nobilis* (Eurostopus), 119.
nobilis (Gallinago), 954.
— (Lophura), 798.
— (Moho), 727.
— (Myiodynastes), 244, 1077.
— (Oreonympha), 159.
— (Otidiphaps), 774.
nocticolor (Diglossa), 686.
noctis (Loxigilla), 613.
noctivagus (Crypturus), 784.
noctua (Athene), 894.
*noctula* (Scops), 885.
noguchii (Blythipicus), 77.
nonnula (Estrelda), 582.
norfolcensis (Nestor), 27.
*norfolkensis* (Halcyon), 109.
normani (Graucalus), 296.
notabilis (Compsocoma), 663.
*notabilis* (Erythrura), 583.
notabilis (Glycyphila), 717.
— (Henicocichla), 1097.
— (Nestor), 27.
— (Stigmatops), 719.
northicotti (Merops), 1061.
northropi (Pendulinus), 557.
notata (Campothera), 65.
— (Chrysomitris), 593.
— (Gerygone), 269.
— (Phlogopsis), 172, 1069.
— (Ptilotis), 720.
— (Xenocichla), 309.
— (Coturnicops), 970.
— (Scoptelus), 98.
notatum (Malacopteron), 1087
*notatus* (Brotogerys), 16.
notatus (Cinnyris), 697.
*notatus* (Conurus), 12.
notatus (Oriolus), 525.
notius (Pachyrhamphus), 1073.
notosticta (Hæmophila), 634.
*novæ britanniæ* (Ninox), 889.
novæ-caledoniæ (Turnix), 779.
novæ-guineæ (Chætura), 128.
— (Harpyopsis), 848.
— (Hieracidea), 870.
— (Hydralector), 958.
— (Melilestes), 718.
— (Orthonyx), 729.
— (Paradisea), 518.
— (Pitta), 208.
— (Tropidorhynchus), 725.
— (Zosterops), 707.
novæ-hiberniæ (Pitta), 209.
novæ-hollandiæ (Aegotheles), 116.
— (Ardea), 911.
— (Calopsitta), 3.
— (Cereopsis), 980.
— (Dromæus), 1050.
*novæ-hollandiæ* (Hydralector), 958.
novæ-hollandiæ (Larus), 1023.
— (Leucospizias), 841.
— (Meliornis), 723.
— (Phalacrocorax), 1007.
— (Podicipes), 1040.
— (Plotus), 1011.
— (Recurvirostra), 943.
— (Scythrops), 55.
— (Strix), 900.
— (Trichoglossus), 31.
novæ-pomeranæ (Myiagra), 283, 1082.
novæ-zealandiæ (Anthus), 448.
— (Certhiparus), 469.
— (Coturnix), 816.
— (Cyanorhamphus), 26.
— (Fulica), 977.
— (Fuligula), 998.
*novæ-zealandiæ* (Himantopus), 943.
novæ-zealandiæ (Nesihierax), 869.
— (Ninox), 888.
— (Thinornis), 941.
novæ-zealandiæ (Prosthemadera), 723.
— (Scops), 883.
novæ-zelandiæ (Hemiphaga), 748.
noveboracensis (Coturnicops), 970.
— (Vireo), 472.
novus (Pericrocotus), 301.
nuba (Otis), 925.
nubica (Campothera), 65.
nubicoides (Merops), 97.
nubicus (Caprimulgus), 124.
— (Enneoctonus), 486.

Digitized by Google

nubicus (Merops), 97.
nuchale (Syrnium), 891.
nuchalis (Campylorhynchus), 421.
— (Carpophaga), 744.
— (Chlamydera), 523.
— (Cisticola), 365.
— (Dolospingus), 617.
— (Dryonastes), 328.
— (Dulus), 261.
— (Glareola), 930.
— (Grallaria), 170.
— (Megalæma), 39.
— (Melanoparus), 460.
— (Pomatorhinus), 325.
— (Sphyropicus), 69.
nudiceps (Gymnocichla), 175.
nudicollis (Chasmorhynchus), 219.
— (Pternistes), 810.
nudigula (Pachycephala), 481.
nudipes (Chætura), 127.
— (Gymnasio), 895.
— (Psiloscops), 887.
nudirostris (Vinago), 732.
numidicus (Picus), 70.
nuna (Psalidoprymna), 158.
*nunezi* (Saucerottea), 137.
nupta (Myiagra), 283, 1082.
nusæ (Halcyon), 1062.
nuttalli (Phalænoptilus), 121.
— (Pica), 507.
— (Picus), 71.
nuttingi (Myiarchus), 250.
— (Oryzoborus), 613.
nyansæ (Astur), 1116.
— (Campothera), 1057.
— (Dryoscopus), 492.
nyasæ (Amydrus), 545.
— (Hyphantornis, 562.
nyassæ (Bradypterus), 350.
nycthemerus (Gennæus), 800.
*nycticorax* (Nycticorax), 917.
nyeanus (Centurus), 69.
nyikensis (Butalis), 262.
nympha (Pitta), 207.
— (Tanysiptera), 105.
nyroca (Æthyia), 997.
oatesi (Bradyornis), 288, 1082.
— (Garrulus), 510.
— (Gennæus), 800.
— (Hydrornis), 207.
— (Niltava), 294.
oaxacæ (Antrostomus), 1063.
— (Dendrortyx), 818.
— (Otocorys), 452.
oberi (Myiarchus), 250.
oberi (Pendulinus), 557.
obiense (Edoliisoma), 299.
obiensis (Carpophaga), 746.
— (Eos), 1054.
— (Geoffroyus), 17.
— (Lycocorax), 517.
— (Pachycephala), 477.
— (Reinwardtœnas), 756.
— (Rhipidura), 279.
— (Tanysiptera), 106.
— (Urospizias), 1116.
obscura (Alseonax), 264.
— (Ammodromus), 632.
— (Anas), 990.
— (Anthus), 448.
— (Aphelocoma), 512.
— (Campylopterus), 133.
— (Campylorhynchus), 420.
— (Chrysolophus), 803.
— (Colluricincla), 496.
— (Cyanomitra), 702.
— (Elaïnea), 240.
— (Grallaria), 170.
— (Hadrostomus), 211.
— (Helminthophaga), 431, 1096.
*obscura* (Hypolais), 373.
obscura (Lampropygia), 1067.
— (Larvivora), 383.
— (Leptopœcile), 379.
— (Lophophorus), 797.
*obscura* (Lusciniola), 371.
obscura (Manorhina), 724.
— (Merula), 398.
— (Molothrus), 552.
— (Myzomela), 716.
— (Ninox), 889.
— (Penelope), 791.
— (Phæornis), 284.
— (Polioptila), 1091.
— (Pomatorhinus), 325.
— (Porzana), 967.
— (Psalidoprocne), 260.
— (Psophia), 924.
— (Ptilotis), 722.
— (Quiscalus), 1107.
— (Siphia), 293.
— (Spermophila), 615.
*obscura* (Sylvia), 1090.
obscura (Vireo), 473.
obscurata (Lochmias), 202.
obscurior (Cyrtostomus), 703.
— (Hypotænidia), 961.
— (Pachycephala), 477.
— (Sclerurus), 1071.
obscurum (Dicæum), 679.

Digitized by Google

obscurus (Charadrius), 937.
— (Dendragapus), 824.
— (Empidonax), 248.
— (Hemignathus), 693.
— (Hemipus), 497.
— (Lamprocorax), 543.
— (Myiadectes), 407.
*obscurus* (Nycticorax), 917.
obscurus (Perisoreus), 511.
— (Puffinus), 1031.
*obscurus* (Pycnonotus), 305
obscurus (Pyrocephalus), 246.
— (Regulus), 1091.
— (Scytalopus), 166.
— (Tetraophasis), 806.
observanda (Gecinus), 64.
obsoleta (Cotyle), 257.
— (Dendrocolaptes), 1070.
— (Dendrornis), 1071.
— (Erythrospiza), 596.
— (Hierofalco), 876.
— (Hypolais), 373.
— (Rallus), 960.
obsoletum (Ornithion), 238.
*obsoletus* (Buteo), 857.
— (Buteola), 858.
obsoletus (Crypturus), 782.
— (Dendrocolaptes), 185.
— (Dendropicus), 74.
— (Picumnus), 84.
— (Prionochilus), 675.
— (Salpinctes), 426.
*obsoletus* (Scops), 883.
obsoletus (Turdus), 401.
obstinata (Zosterops), 709.
obtecta (Parus), 463.
obtectus (Picolaptes), 1070.
ocai (Saucerottea), 138.
occidentale (Syrnium), 891.
occidentalis (Æchmophorus), 1042.
— (Ægialitis), 940.
— (Ammodromus), 632.
— (Apteryx), 1049.
— (Ardea), 910.
— (Barnardius), 1054.
— (Branta), 984.
— (Cacatua), 2.
— (Catharus), 394.
— (Celeus), 79.
— (Certhia), 683.
*occidentalis* (Chætura), 128.
occidentalis (Chlorocichla), 313.
— (Coccyzus), 54.
— (Crypturus), 784.
*occidentalis* (Cuculus), 51.
occidentalis (Cyclopsitta), 33.
— (Dendroeca), 434.
— (Dryoscopus), 492.
— (Empidonax), 248, 1078.
*occidentalis* (Ereunetes), 949.
occidentalis (Geopsittacus), 27.
— (Geothlypis), 437.
— (Larus), 1024.
— (Leucopternis), 860.
*occidentalis* (Meleagris), 796.
occidentalis (Molothrus), 552.
— (Muscivora), 244.
— (Myiadectes), 1094.
— (Myrmelastes), 181.
— (Nestor), 27.
— (Ninox), 888.
— (Oryzoborus), 613.
— (Otocorys), 1099.
— (Pachycephala), 477.
— (Parus), 463.
— (Philemon), 726.
— (Platycercus), 25.
— (Procnias), 670.
— (Sialia), 386.
— (Tinnunculus), 870.
occipitale (Pyrgisoma), 636.
occipitalis (Acanthopneuste), 377.
— (Casuarius), 1051.
— (Chlorophonia), 671.
— (Dendrocitta), 508.
— (Eremomela), 356.
— (Gecinus), 64.
*occipitalis* (Glaucidium), 897.
occipitalis (Halcyon), 109.
— (Hypothymis), 274.
— (Ixulus), 344.
— (Lophoætus), 850.
— (Lophogyps), 829.
— (Lorlculus), 23.
— (Muscisaxicola), 1075.
— (Phabotreron), 734.
— (Ptilopus), 735.
— (Urocissa), 507.
— (Yuhina), 346.
oceanica (Carpophaga), 743.
— (Myiagra), 283.
oceanicus (Oceanites), 1029.
ocellata (Dendrornis), 190.
— (Ianthocincla), 322.
— (Lipoa), 788.
— (Meleagris), 796.
— (Ninox), 888.
— (Spermophila), 617.
— (Turnix), 779.
ocellatum (Syrnium), 891.

Digitized by Google

ocellatus (Antrostomus), 122.
— (Cyrtonyx), 821.
— (Harporhynchus), 417.
— (Podargus), 117.
— (Rheinardtius), 795.
ochotensis (Locustella), 370.
ochra (Thamnophilus), 1070.
ochracea (Loxops), 594.
— (Ninox), 888.
— (Sasia), 85.
— (Spizella), 639.
— (Syma), 1062.
ochraceiceps (Hylophilus), 474.
— (Pomatorhinus), 325.
ochraceiventris (Grallaria), 170.
— (Mitrephanes), 247.
ochraceus (Celeus), 79.
— (Chlorospingus), 652.
— (Contopus), 249.
— (Troglodytes), 426.
— (Vireo), 473.
ochreata (Fraseria), 497.
ochrocephala (Chrysotis), 5.
— (Clitonyx), 469.
— (Cyclorhis), 476.
ochrocephalus (Trachyconius), 315.
ochrogaster (Estrelda), 582.
— (Penelope), 792.
ochrolæmus (Automolus), 195.
ochroleuca (Grallaria), 170.
ochromelas (Eurylæmus), 205.
— (Melirrhopletes), 728.
ochropus (Totanus), 947.
ochroptera (Chrysotis), 5.
— (Leptoptila), 769.
— (Psophia), 924.
ochropterus (Euscarthmus), 1075.
ochrura (Ruticilla), 385.
ocularia (Sitagra), 564.
— (Spiloptila), 362.
ocularis (Conurus), 12.
— (Cryptospiza), 1108.
*ocularis* (Euscarthmus), 233.
ocularis (Glareola), 930.
*ocularis* (Melittophagus), 1061.
ocularis (Motacilla), 443.
— (Phrygilus), 641.
— (Rhinomyias), 282.
— (Stigmatops), 718.
oculatus (Zonæginthus), 580.
oculea (Caloperdix), 814.
oculeus (Canirallus), 965.
odiosa (Ninox), 889.
œdica (Turdus), 1094.
œnanthe (Saxicola), 390.
œnanthoides (Ochthoeca), 226.
œnas (Columba), 749.
œnochlamys (Dendrophila), 682.
œnone (Chrysuronia), 140.
œnops (Columba), 751.
— (Garrulus), 510.
œnothorax (Carpophaga), 744.
oglei (Actinodura), 331.
olax (Osmotreron), 734.
oleaginea (Anabazenops), 192.
— (Eucometis), 655.
— (Zosterops), 708.
oleagineus (Andropadus), 313.
— (Mionectes), 237.
— (Ostinops), 550.
— (Eleopicus), 75.
olivacea (Alcippe), 345.
— (Amaurornis), 972.
— (Apalis), 853.
— (Camaroptera), 356.
— (Certhidea), 688.
— (Chalcostigma), 156.
— (Chamæza), 171.
— (Chlorothraupis), 658.
— (Chrysomitris), 592.
— (Cryptolopha), 285.
— (Cyanomitra), 702.
— (Dendrocincla), 186.
— (Dysithamnus), 180.
— (Iole), 312.
— (Ixocincla), 316.
— (Lophotibis), 903.
— (Mionectes), 236.
*olivacea* (Newtonia), 266.
olivacea (Ochthoeca), 1075.
— (Ornithion), 238.
— (Pachycephala), 479.
*olivacea* (Phonipara), 618.
olivacea (Pomatorhinus), 325.
— (Pyrrhospiza), 604.
— (Regulus), 1091.
— (Sericornis), 367.
— (Siphia), 293.
— (Xenocichla), 310.
— (Zosterops), 711.
olivaceiceps (Chlorospingus), 650.
*olivaceiceps* (Coracias), 93.
olivaceiceps (Coua), 60.
— (Criniger), 311, 1085.
— (Sitagra), 564.
*olivaceocauda* (Aglæactis), 152.
olivaceofuscus (Turdus), 400.
olivaceum (Oncostoma), 232.
— (Stactolæma), 38.
olivaceus (Chlorophoneus), 490.



Digitized by Google

olivaceus (Chlorospingus), 650.
— (Geocolaptes), 62.
— (Hemignathus), 693.
— (Hylophilus), 475.
— (Malaconotus), 489.
— (Mitrephanes), 247.
— (Peucedramus), 436.
— (Picumnus), 84.
— (Prionochilus), 675.
— (Rhynchocyclus), 242.
— (Tarsiger), 384.
— (Turdus), 399.
— (Vireo), 472.
olivascens (Basileuterus), 439.
— (Catharus), 394.
— (Cinnicerthia), 419.
— (Embernagra), 638.
— (Gymnopithys), 173.
— (Lioptilus), 273.
— (Myiarchus), 1078.
— (Regulus), 379.
— (Saltator), 645.
— (Sclerurus), 1071.
olivatra (Merula), 398.
olivei (Turnix), 779.
olivetorum (Hypolais), 373.
olivicyanea (Tanagra), 662.
olivina (Elainea), 240.
olivinus (Eleopicus), 76.
olivus (Empidonax), 247.
*olor* (Cygnus), 987.
olympica (Cinclus), 1095.
ombriosa (Parus), 464.
omissa (Gittocincla), 1095.
— (Phonipara), 618.
— (Siphia), 293.
— (Synallaxis), 1072.
omoensis (Cossypha), 1094.
onerosa (Gerygone), 269.
onocrotalus (Pelecanus), 1005.
onslowi (Phalacrocorax), 1009.
oorti (Megalæma), 39.
opaca (Hypolais), 373.
opalizans (Pipra), 221.
ophryophanes (Hypotriorchis), 873.
ophthalmica (Cacatua), 3.
— (Spermophila), 616.
ophthalmicus (Chlorospingus), 650.
— (Pogonotriccus), 235.
opistholeuca (Saxicola), 389.
opistherythra (Rhipidura), 277.
opisthomelas (Puffinus), 1031.
*optatus* (Cuculus), 51.
oratrix (Amazona), 1053.
*oratrix* (Chrysotis), 5.
orbignesia (Bolborhynchus), 14.
orbignii (Arremon), 646.
orbignyana (Dendrornis), 190.
orbignyanus (Picumnus), 83.
— (Thinocorus), 780.
orbignyi (Siptornis), 200.
orbitalis (Capsiempis), 237.
orbitatus (Euscarthmus), 232.
ordi (Bucco), 47.
*ordi* (Plegadis), 903.
oreas (Lessonia), 230.
— (Picathartes), 516.
*oreas* (Pitta), 207.
oreas (Rhipidura), 278.
oregona (Pipilo), 637.
oregonus (Junco), 629.
orenocensis (Pyroderus), 218.
— (Saltator), 645.
— (Serphophaga), 1075.
— (Veniliornis), 1059.
— (Xiphocolaptes), 1071.
orenocensus (Cnipolegus), 229.
oreobates (Cinclodes), 1073.
— (Melittophagus), 96.
oreoeca (Picus), 1058.
oreodrama (Otocorys), 1098.
oreophila (Cettia), 372.
*oreophila* (Saxicola), 1092.
oreskios (Harpactes), 88.
orientale (Parisoma), 273.
orientalis (Accentor), 381.
— (Acrocephalus), 368.
*orientalis* (Aidemosyne), 1108.
orientalis (Anthreptes), 704.
— (Aquila), 852.
— (Arboricola), 814.
— (Arses), 288.
— (Batis), 265.
*orientalis* (Carduelis), 591.
orientalis (Carpophaga), 745.
— (Chelidonaria), 1079.
— (Chlamydera), 523.
— (Dryoscopus), 493.
— (Emberiza), 621.
— (Eudynamis), 54.
— (Eurystomus), 93.
— (Gallinula), 974.
— (Geoffroyus), 17.
— (Glareola), 929.
— (Glaucidium), 896.
— (Halcyon), 107.
— (Hieracidea), 870.
— (Huhua), 881.
— (Hypochæra), 574.
— (Macropygia), 756.

Digitized by Google

orientalis (Melanopyrrhus), 540.
— (Melocichla), 362.
*orientalis* (Merganser), 1003.
orientalis (Merula), 396.
— (Nasiterna), 1054.
— (Pernis), 865.
— (Paalidoprocne), 260.
— (Pteroclurus), 777.
— (Ptilopus), 740.
*orientalis* (Pyrrhula), 607.
orientalis (Pyrrhurus), 1085.
— (Tarsiger), 384.
— (Tinnunculus), 870.
— (Turtur), 759.
— (Xenocichla), 310.
oritis (Cyanomitra), 702.
orix (Pyromelana), 572.
orizabæ (Pipilo), 637.
ornata (Cissa), 509.
— (Cyanolyca), 513.
— (Myrmotherula), 179.
— (Nothoprocta), 785.
— (Poospiza), 628.
— (Ptilotis), 722.
— (Setophaga), 441.
— (Tanagra), 662.
— (Thlypopsis), 653.
— (Tiaris), 642.
*ornatum* (Auriparus), 468.
*ornatus* (Antrostomus), 122.
ornatus (Calcarius), 625.
— (Cephalopterus), 218.
— (Lophornis), 165.
— (Merops), 97.
— (Myiobius), 245.
— (Orthorhynchus), 164.
— (Pachyrhamphus), 212.
— (Pardalotus), 674.
— (Ptilopus), 739.
— (Spizaëtus), 848.
— (Trichoglossus), 31.
orphea (Microcerculus), 429.
— (Sylvia), 374.
orpheus (Mimus), 415.
— (Pachycephala), 479.
orphnocephalus (Hyphantornis), 1107.
orphogastra (Cinnyris), 699.
orrhophæus (Harpactes), 88.
orru (Corvus), 504.
orthonyx (Acropternis), 168.
orthura (Catharma), 161.
ortoni (Penelope), 791.
— (Zodalia), 158.
oryzivora (Cassidix), 551, 1106.
— (Padda), 588.
oryzivorus (Dolichonyx), 552.
osberti (Chlorostilbon), 141.
osburni (Laletes), 475.
osceola (Meleagris), 796.
oscillans (Microeca), 264.
— (Oriolus), 1105.
oscitans (Anastomus), 906.
osculans (Hæmatopus), 932.
— (Helianthea), 151.
— (Rhamphastos), 42.
— (Sericornis), 367.
osea (Cinnyris), 698.
oseryi (Clypeicterus), 549.
osiris (Cinnyris), 698.
ossifraga (Gypaëtus), 831.
ossifragus (Colæus), 505.
ostralegus (Hæmatopus), 932.
ostrinus (Pyrenestes), 576.
otoleuca (Pyrrhulauda), 1100.
ottonis (Pogonotriccus), 1075.
— (Siptornis), 1072.
otus (Asio), 877.
*ouratensis* (Acredula) 467.
oustaleti (Anas), 990.
— (Cinclodes), 1073.
— (Cinnyris), 698.
— (Leptopogon), 237.
— (Nothoprocta), 1115.
— (Scotopelia), 879.
*oustaleti* (Strix), 900.
oustaleti (Temnurus), 509.
ovampensis (Accipiter), 845.
oweni (Apteryx), 1049.
owstoni (Hypotænidia), 961.
— (Parus), 461.
— (Xanthopygia), 1080.
— (Zosterops), 710.
oxycerca (Cercibis), 903.
oxyptera (Querquedula), 993.
*oxyura* (Chætura), 128.
oxyurus (Sphenocercus), 731.
pachycephaloides (Clytorhynchus), 499.
pachydemas (Pœcilodryas), 1080.
pachyrhyncha (Cassicus), 551.
— (Geospiza), 608, 1110.
— (Halcyon), 109, 1062.
— (Rhynchopsitta), 11.
pachyrhynchus (Catarrhactes), 1048.
*pachyrhynchus* (Nucifraga), 506.
pachyrhynchus (Pachyphantes), 567.
*pachyrhynchus* (Poicephalus), 9.
pacifica (Amphispiza), 1110.
— (Anorthura), 427.
— (Ardea), 911.
— (Bubo), 881.


Digitized by Google

pacifica (Carpophaga), 743.
— (Colymbus), 1039.
— (Drepanis), 691.
— (Eurystomus), 93.
— (Hypotænidia), 961.
— (Lalage), 303.
— (Parula), 432.
— (Tringa), 951.
*pacificus* (Cyanorhamphus), 26.
pacificus (Cypselus), 125.
— (Gabianus), 1026.
— (Pareudiastes), 973.
pæna (Erythropygia), 412.
pagana (Elaïnea), 239.
*pagodarum* (Syrnium), 891.
pagodarum (Temenuchus), 537.
palawanense (Malacopteron), 337.
*palawanensis* (*Buchanga*), 530.
palawanensis (Carpophaga), 744.
— (Chloropsis), 318.
— (Criniger), 311.
— (Dicrurus), 529.
— (Gracula), 539.
— (Oriolus), 526.
pallasi (Cinclus), 419.
— (Turdus), 402.
pallatangæ (Elaïnea), 240.
pallens (Accipiter), 844.
— (Butalis), 262, 1079.
— (Galbula), 1056.
— (Hemichelidon), 1079.
*pallens* (Merula), 398.
pallens (Vireo), 473.
pallescens (Anorthura), 427, 1096.
— (Bubo), 881.
— (Campylorhynchus), 420.
— (Columbigallina), 763.
— (Dendrocolaptes), 185.
— (Gyps), 830.
— (Monasa), 49.
*pallescens* (Parus), 1101.
pallescens (Psephotus), 25.
palliata (Dendrornis), 189.
— (Falculia), 728.
— (Junco), 629.
— (Leucopternis), 860.
— (Porphyrio), 976.
palliatus (Cinclodes), 202.
— (Garrulax), 328.
— (Hæmatopus), 932.
— (Thamnophilus), 182.
palliceps (Pitta), 209.
pallida (Ægialitis), 940.
— (Anorthura), 427.
— (Caica), 8.
pallida (Chrysomitris), 591.
— (Colius), 91.
— (Columba), 749.
— (Diglossopis), 686.
— (Drymoedus), 319.
— (Eucometis), 655.
— (Eupsychortyx), 820.
— (Formicarius), 172.
— (Galerida), 1100.
— (Geospiza), 609.
— (Gerygone), 268.
— (Hæmophila), 634.
— (Hypolais), 373.
— (Hypotriorchis), 873.
— (Leptoptila), 770.
— (Leucippus), 135.
— (Malacias), 324.
— (Merula), 398.
— (Munia), 587.
— (Myiagra), 283, 1082.
— (Otocorys), 451-52.
— (Pachycephala), 478.
— (Perdix), 812.
— (Petrochelidon), 1079.
— (Polyborus), 832.
— (Psittacella), 21.
— (Psittacula), 1053.
— (Pterythrius), 487.
— (Siptornis), 199.
*pallida* (Spizella), 630.
pallida (Sylviella), 355.
— (Thryothorus), 423.
— (Upucerthia), 203.
— (Upupa), 1061.
— (Yuhina), 346.
— (Zosterops), 706.
pallidiceps (Buarremon), 1111.
— (Columba), 752.
— (Floricola), 160.
— (Platycercus), 24.
— (Schizorhis), 1060.
— (Urospizias), 842.
pallidicincta (Tympanuchus), 824.
pallidifrons (Chætura), 127.
— (Hylophilus), 475.
pallidigula (Pratincola), 387.
— (Xenocichla), 310.
pallidigularis (Automolus), 195.
pallidinucha (Pipilopsis), 649.
pallidior (Dicæum), 678.
— (Myzomela), 716.
— (Osmotreron), 733.
— (Poliospiza), 599.
— (Synœcus), 816.
pallidipes (Phylloscopus), 378.

Digitized by Google

pallidipes (Zosterops), 709.
pallidirostris (Colluricincla), 496.
— (Lanius), 1103.
— (Lophoceros), 103.
*pallidirostris* (Schizorhis), 90.
pallidiventris (Anthus), 446.
— (Contopus), 248.
— (Merula), 1092.
— (Ortalida), 793.
— (Parus), 461.
— (Psalidoprymna), 1067.
— (Setophaga), 441.
pallidus (Accentor), 382.
— (Blacicus), 249.
— (Bradyornis), 287.
*pallidus* (Caprimulgus), 122.
pallidus (Criniger), 311.
— (Cuculus), 51, 1056.
*pallidus* (Cypselus), 125.
pallidus (Horornis), 373.
— (Spilornis), 834.
palliolatus (Misocalius), 52.
pallipes (Siphia), 292.
palliseri (Elaphrornis), 335.
palmæ (Fringilla), 589.
palmarum (Dendroeca), 435.
— (Glaucidinm), 896.
— (Hypocharmosyna), 32.
— (Phœnicophilus), 652.
— (Tanagra), 662.
palmensis (Parus), 464.
palmeri (Harporhynchus), 417.
— (Phæornis), 284.
— (Porzanula), 971.
— (Rhodacanthis), 606.
palpebralis (Geothlypis), 437, 1098.
— (Schizœaca), 201.
palpebrosa (Gerygone), 270.
— (Pœcilothraupis), 664.
— (Zosterops), 707.
paludicola (Cistothorus), 424.
— (Cotyle), 257.
— (Estrelda), 582.
palumbarius (Astur), 839.
palumboides (Columba), 752.
palumbus (Columba), 751.
palustre (Pellorneum), 336.
palustris (Acrocephalus), 369.
— (Cistothorus), 424.
*palustris* (Cotyle), 257.
palustris (Emberiza), 620.
— (Ligea), 436.
— (Megalurus), 351.
— (Parus), 462.
— (Porzana), 967.
palustris (Spermophila), 615.
pamela (Aglæactis), 152.
*pamirensis* (Charadrius), 938.
— (Montifringilla), 595.
pammelæna (Melænornis), 287.
— (Myzomela), 716.
pamprepta (Aithurus), 1066.
panamensis (Chrysotis), 5.
— (Crax), 789.
— (Damophila), 140.
— (Malacoptila), 47.
— (Myiarchus), 250, 1078.
*panaya* (Sterna), 1017.
panayensis (Culicicapa), 282, 1082.
— (Edoliisoma), 299.
— (Graucalus), 298.
— (Lamprocorax), 543.
— (Ortothomus), 361.
— (Spilornis), 834.
*panayensis* (Sterna), 1017.
panayensis (Stoparola), 292.
panderi (Podoces), 506.
panerythrus (Philydor), 194.
panini (Penelopides), 102.
panychlorus (Bolborhynchus), 14.
papa (Cathartes), 828.
*papa* (Chaunoproctus), 610.
papillosa (Ibis), 901.
— (Numida), 804.
papua (Pygoscelis), 1047.
papuana (Erythrura), 584.
— (Hypotriorchis), 873.
— (Microeca), 1080.
— (Pœcilodryas), 272, 1080.
papuanus (Casuarius), 1051.
papuensis (Acanthiza), 366.
— (Chætorhynchus), 531.
— (Charmosyna), 32.
— (Graucalus), 296.
— (Lyncornis), 119.
— (Merula), 397.
— (Neositta), 682.
— (Oreocincla), 403.
— (Podargus), 117.
paradisea (Ptilorhis), 521.
— (Sterna), 1015.
— (Tetrapteryx), 923.
— (Urogalba), 45.
— (Vidua), 574.
paradiseus (Dissemurus), 532.
— (Platycercus), 1054.
paradisi (Terpsiphone), 280.
paradoxa (Cholornis), 470.
— (Enneoctonus), 486.
— (Motacilla), 445.

Digitized by Google

paradoxus (Syrrhaptes), 776.
— (Triptorhinus), 168.
paraensis (Automolus), 1072.
— (Dendrexetastes), 189.
paraguayæ (Gallinago), 953.
paralios (Sturnella), 1106.
parambæ (Attila), 1074.
— (Grallaria), 1069.
— (Ojontophorus), 822.
parasiticus (Stercorarius), 1028.
parca (Mionectes), 1075.
pardalotum (Glaucidium), 897.
pardalotus (Dendrornis), 189.
pardus (Campylorhynchus), 421.
parellina (Guiraca), 612.
parensis (Momotus), 94.
pareola (Chiroxiphia), 222.
parina (Xenodacnis), 687.
parisorum (Pendulinus), 557.
parkeri (Notornis), 976.
parkinsoni (Majaqueus), 1033.
parkmanni (Troglodytes), 425.
paroticalis (Ixidia), 308, 1085.
parulus (Anæretes), 236.
*parumstriata* (Suya), 358.
parva (Cannabina), 1109.
— (Chlorodrepanis), 692.
— (Microdynamis), 55.
— (Mirafra), 456.
— (Muscicapa), 263.
— (Phyllostrophus), 314.
— (Porphyriola), 975.
— (Porzana), 968.
— (Spermophila), 616.
— (Tachornis), 126.
— (Thriponax), 1059.
— (Tyranniscus), 239.
parvicristatus (Eupsychortyx), 820.
*parvirostris* (Artamus), 533.
parvirostris (Attila), 1074.
— (Chloropsis), 318.
— (Chlorospingus), 651.
— (Crypturus), 783.
— (Elaïnea), 240, 1076.
— (Graucalus), 296.
— (Ixocincla), 316.
— (Microchera), 164.
— (Estrelata), 1034.
*parvirostris* (Phegornis), 956.
parvirostris (Picolaptes), 187.
— (Polioptila), 380, 1091.
— (Serphophaga), 236.
— (Tetrao), 825.
*parvissima* (Scops), 883.
parvula (Aglæactis), 152.
parvula (Cacatua), 2.
— (Colluricincla), 496.
*parvula* (Geospiza), 608.
parvula (Heliodoxa), 1067.
— (Nesomimus), 416.
— (Zosterops), 709.
parvulus (Ægithalus), 468.
*parvulus* (Anorthura), 427.
parvulus (Antrostomus), 122.
— (Graucalus), 297.
parvus (Pitangus), 243.
parzudakii (Calliste), 668.
pasadenensis (Harporhynchus), 417.
*passerina* (Athene), 894.
passerina (Columbigallina), 763.
— (Emberiza), 621.
*passerina* (Nyctala), 894.
passerina (Psittacula), 15.
passerinii (Rhamphocœlus), 660.
passerinum (Glaucidium), 896.
passerinus (Cacomantis), 52.
— (Eleopicus), 76.
pastazæ (Galbula), 45.
pastinator (Licmetis), 3.
— (Trypanocorax), 505.
patagonica (Aptenodytes), 1047.
— (Siptornis), 200.
patagonicus (Cinclodes), 202.
— (Mimus), 416.
patagonus (Conurus), 11.
paucalensis (Synallaxis), 199.
paucimaculatus (Thryothorus), 423.
paulina (Carpophaga), 744.
paulus (Hapalocercus), 1075.
pauper (Nyctanassa), 918.
— (Phyllostrophus), 314.
— (Spermophila), 615.
paupera (Geospiza), 609.
*pauxi* (Pauxis), 790.
pavonina (Balearica), 923.
pavoninus (Dromococcyx), 62.
— (Lophornis), 165.
— (Pharomacrus), 86.
payesi (Ardetta), 914.
paykulli (Rallina), 966.
pealei (Falco), 874.
— (Halcyon), 109.
pealii (Erythrura), 583.
peasei (Prodotiscus), 1055.
*pecilei* (Mesopicus), 77.
pecilei (Neocossyphus), 410.
pecoris (Molothrus), 552.
*pectinicaudus* (Sittasomus), 191.
pectorale (Dicæum), 678.
pectoralis (Automolus), 194.

Digitized by Google

pectoralis (Bucco), 47.
— (Calliope), 383.
— (Caprimulgus), 123.
*pectoralis* (Cladorhynchus), 943.
pectoralis (Colinus), 820.
— (Cooperastur), 844.
— (Coturnix), 816.
pectoralis (Craterosceli), 1087.
— (Cyrtostomus), 703.
— (Dicrurus), 531.
— (Diglossa), 685.
— (Eclectus), 16.
— (Euphonia), 673.
— (Garrulax), 327.
*pectoralis* (Gerygone), 268.
pectoralis (Graucalus), 296.
— (Gymnogenys), 1116.
— (Habrura), 234.
— (Herpsilochmus), 178.
— (Hylophilus), 474, 1102.
*pectoralis* (Hypotænidia), 962.
pectoralis (Icterus), 558.
— (Microcerculus), 1096.
— (Munia), 586.
— (Myzomela), 716.
— (Oreopyra), 149.
*pectoralis* (Pachycephala), 479.
— (Pellorneum), 336.
pectoralis (Phlogœnas), 773.
— (Ploceipasser), 569.
— (Ptilopus), 741.
— (Rhinomyias), 282, 1081.
— (Rhipidura), 279.
*pectoralis* (Ruticilla), 385.
— (Sarciophorus), 933.
pectoralis (Serinus), 601.
— (Thlypopsis), 653.
— (Thriponax), 82.
— (Uroloncha), 585.
— (Xerophila), 468.
— (Yunx), 85.
pecuaria (Ægialitis), 941.
pekinensis (Cypselus), 125, 1064.
— (Parus), 462.
— (Tinnunculus), 871.
— (Rhopophilus), 350.
pelagica (Chætura), 128.
— (Procellaria), 1028.
pelagicus (Phalacrocorax), 1007.
— (Thalassoætus), 853.
*pelecanoides* (Sterna), 1016.
pelewensis (Anas), 990.
— (Artamus), 533.
— (Calœnas), 775.
— (Halcyon), 108.
pelewensis (Porphyrio), 976.
— (Ptilopus), 736.
peli (Gymnobucco), 37, 1055.
— (Scotopelia), 879.
pelingensis (Ptilopus), 740.
pelios (Turdus), 400.
pella (Topaza), 147.
pelvicus (Tephrodornis), 494.
*pelzelni* (Agyrtria), 136.
pelzelni (Aplonis), 542.
— (Euscarthmus), 232.
— (Granatellus), 438.
*pelzelni* (Micrastur), 838.
pelzelni (Myiarchus), 251, 1078.
— (Myrmeciza), 175.
— (Podicipes), 1040.
— (Pseudotriccus), 233.
— (Rhipidura), 276.
— (Sitagra), 564.
— (Sycalis), 601.
— (Tityra), 211.
peltata (Platystira), 266.
pembertoni (Clivicola), 1079.
penduliger (Cephalopterus), 218.
pendulinus (Ægithalus), 467.
penelope (Mareca), 991.
penicillata (Eucometis), 654.
— (Kelaartia), 307.
— (Otocorys), 451.
— (Ptilotis), 722.
penicillatus (Phalacrocorax), 1008.
*peninsula* (Cuculus), 51.
peninsula (Pyrrhuloxia), 619.
peninsulæ (Ammodromus), 631.
— (Contopus), 249.
— (Pachycephala), 480.
— (Trochalopteron), 321.
peninsularis (Lagopus), 1116.
— (Melanocichla), 1086.
— (Ninox), 888.
— (Phœnicothraupis), 1111.
— (Tinnunculus), 871.
— (Troglodytes), 1096.
— (Yungipicus), 75.
*pennata* (Rhea), 1052.
pennata (Scops), 883.
pennatus (Eutolmaëtus), 851.
pennsylvanica (Anthus), 447.
— (Dendroeca), 434.
pennsylvanicus (Buteo), 857.
pensilis (Nelicurvius), 567.
pentlandi (Nothoprocta), 785.
— (Tinamotis), 786.
peposaca (Metopiana), 996.
peracensis (Alcippe), 345.

Digitized by Google

peracensis (Iole), 312.
percivali (Psalidoprocne), 260.
— (Rhynchostruthus), 1109.
— (Telephonus), 488.
percna (Thryomanes), 424.
percnopterus (Neophron), 830.
percussus (Prionochilus), 674.
— (Xiphidiopicus), 77.
perdicaria (Nothoprocta), 784.
perdix (Brachyrhamphus), 1044.
peregrina (Helminthophaga), 431.
— (Otocorys), 452.
peregrinator (Falco), 874.
*peregrinoides* (Falco), 875.
peregrinus (Falco), 874.
— (Pericrocotus), 301.
periculosa (Cossypha), 409.
periophthalmica (Callæops), 288.
— (Grallaria), 1068.
periophthalmicus (Dicrurus), 530.
— (Monarcha), 290.
perissa (Otocorys), 1099.
perkinsi (Oreomyza), 692.
perlata (Margaroornis), 191.
— (Rhipidura), 278.
— (Strix), 899.
perlatum (Glaucidium), 897.
perlatus (Ptilopus), 739.
permagnus (Sphenocercus), 731.
permista (Campothera), 66.
perniger (Hypsipetes), 316.
pernigra (Rhinogryphus), 828.
pernix (Ochthodiæta), 1074.
pernyi (Picus), 70.
peroni (Ægialitis), 940.
peronii (Geocichla), 404, 1094.
perousei (Ptilopus), 736.
perpallida (Ammodromus), 632.
— (Columbigallina), 764.
*perpallidus* (Gecinus), 64.
perplexa (Empidonax), 1078.
perquisitor (Vireo), 1102.
perreini (Estrelda), 582.
perroti (Dendrexetastes), 189.
persa (Turacus), 89.
persica (Calandrella), 453.
— (Motacilla), 443.
— (Parus), 464.
— (Saxicola), 388.
persicus (Cassicus), 550.
— (Merops), 97.
— (Phasianus), 892.
— (Puffinus), 1032.
personata (Aëthocorys), 1099.
— (Agapornis), 22.
*personata* (Arboricola), 814.
personata (Chlorodyta), 1089.
— (Diglossa), 686.
— (Emberiza), 622.
— (Eophona), 610.
— (Gerygone), 269.
— (Gymnoschizorhis), 90.
personata (Heliopais), 978.
— (Hæmophila), 634.
— (Motacilla), 443.
— (Nesomimus), 416.
— (Poephila), 584.
— (Poospiza), 628.
— (Pyrrhulopsis), 21.
— (Rhipidura), 277.
— (Spizocorys), 454.
*personata* (Strix), 900.
— (Sula), 1011.
personatus (Artamus), 534.
— (Geoffroyus), 16.
— (Graucalus), 297.
*personatus* (Lobivanellus), 934.
personatus (Pipilopsis), 649.
— (Pterocles), 777.
*personatus* (Sitagra), 564.
personatus (Trogon), 86.
perspicillata (Carpophaga), 745.
— (Grallaria), 169.
— (Lichenops), 229, 1075.
— (Malacocincla), 333.
— (Myiagra), 1082.
— (Œdemia), 999.
— (Pulsatrix), 892.
— (Sericornis), 367.
— (Terpsiphone), 281.
perspicillatus (Artamus), 534.
— (Chloronerpes), 65.
— (Dryonastes), 328.
*perspicillatus* (Malaconotus), 489.
perspicillatus (Phalacrocorax), 1007.
— (Turtur), 760.
perstriata (Ptilotis), 720.
pertinax (Contopus), 248.
— (Conurus), 12.
peruana (Chrysomitris), 592.
— (Cinnicerthia), 419.
— (Empidochanes), 247.
— (Monasa), 49.
— (Nemosia), 654.
— (Spathura), 153.
peruanus (Ammodromus), 632.
— (Chlorostilbon), 142.
peruviana (Conopophaga), 169.
— (Eleopicus), 75, 1059.
— (Geositta), 204.

Digitized by Google

peruviana (Hypocnemis), 173.
— (Leptopogon), 237.
— (Nothoprocta), 785.
— (Pithys), 173.
— (Quiscalus), 560.
— (Rhynchocyclus), 242.
— (Rupicola), 215.
— (Zonotrichia), 626.
peruvianus (Anthus), 448.
*peruvianus* (Picolaptes), 187.
peruvianus (Rallus), 960.
— (Rhynchocyclus), 1077.
*peruvianus* (Steatornis), 115.
peruvianus (Tinamus), 781.
pesqueti (Dasyptilus), 4.
petechia (Dendroeca), 433.
petenicus (Ammodromus), 632.
*petenicus* (Thryothorus), 422.
petersi (Podica), 978.
petiti (Campophaga), 300.
*petiti* (*Psammocrex*), 965.
petiti (Psalidoprocne), 260.
petronella (Petronia), 597.
petrophila (Euphema), 26.
petrosa (Caccabis), 807.
*petzii* (Conurus), 12.
phæa (Chamæa), 469.
*phæocephala* (Alcippe), 345.
phæocephalus (Chlorospingus), 650.
— (Criniger), 310.
— (Cyphorhinus), 429.
— (Myiarchus), 251.
— (Rhectes), 495.
phæoceps (Micropternus), 78.
phæocercus (Mitrephanes), 247.
phæochroa (Dendrocincla), 1070.
phæochromus (Oriolus), 527.
phæonota (Columba), 750.
— (Parus), 462.
phæonotus (Myiarchus), 251.
— (Pachycephala), 479.
phæopleurus (Buarremon), 647.
— (Catharus), 394.
phæopus (Numenius), 944.
phæopyga (Rallina), 966.
phæopygia (Œstrelata), 1034.
phæopygoides (Turdus), 402, 1093.
phæopygus (Turdus), 401.
— (Xiphocolaptes), 188.
phæostriata (Megalæma), 39.
*phaethon* (Zonerodius), 920.
phaethon (Neochmia), 583.
phainopeplus (Campylopterus), 134.
phalæna (Caprimulgus), 124.
phalænoides (Glaucidium), 897.
phalænoides (Podargus), 117.
phalerata (Helianthea), 1067.
phaon (Lesbia), 158.
pharetra (Dendroeca), 435.
phasianella (Macropygia), 755.
— (Pteropodocys), 300.
phasianellus (Dromococcyx), 62.
— (Pediœcetes), 823.
phasianus (Centropus), 56.
phayrei (Osmotreron), 733.
phayrii (Alcippe), 345.
— (Anthocincla), 206.
— (Pomatorhinus), 325.
phelpsi (Sittasomus), 191.
philadelphia (Geothlypis), 438.
— (Larus), 1021.
— (Oporornis), 1097.
philadelphicus (Vireo), 472.
philipi (Ægithina), 341.
— (Casuarius), 1051.
philippana (Columba), 752.
philippii (Phaethornis), 132.
phillipsi (Saxicola), 389.
*philippensis* (Centropus), 56.
philippensis (Hypotænidia), 961.
— (Iole), 312.
— (Loriculus), 23.
*philippensis* (Muscicapa), 263.
philippensis (Ninox), 888.
— (Oriolus), 527.
— (Pelecanus), 1005.
*philippensis* (Pitta), 208.
philippensis (Podicipes), 1040.
— (Pseudoptynx), 882.
— (Spizaëtus), 849.
— (Thriponax), 82.
philippina (Phyllergates), 362.
*philippinarum* (Cacatua), 3.
philippinensis (Ceyx), 112.
— (Circus), 836.
— (Mirafra), 456.
— (Pachycephala), 480.
— (Philemon), 726.
— (Siphia), 293, 1083.
*philippinus* (Ægialitis), 939.
philippinus (Corvus), 504.
— (Merops), 97.
*philomela* (Aedon), 382.
philomela (Microcerculus), 429.
phœbe (Metallura), 155.
phœnicea (Campophaga), 300.
— (Petroeca), 266.
— (Urobrachya), 573.
phœniceum (Trochalopteron), 321.
phœniceus (Agelæus), 553.



Digitized by Google

phœniceus (Cardinalis), 620.
— (Tachyphonus), 655.
phœnicobia (Tachornis), 127.
phœnicomera (Pyromelana), 572.
phœnicomitra (Myiobius), 245.
*phœnicoptera* (Ampelis), 260.
phœnicoptera (Pytelia), 578.
phœnicopterus (Crocopus), 732.
— (Lamprocolius), 547.
*phœnicotis* (Anthreptes), 704.
phœnicotis (Chlorochrysa), 670.
— (Uræginthus), 582.
phœnicura (Amaurornis), 973.
— (Ammomanes), 458.
— (Henicornis), 202.
— (Rhipidura), 277.
— (Ituticilla), 385.
phœnicuroides (Ammomanes), 459.
— (Enneoctonus), 486.
— (Hodgsonius), 384.
phœnicurus (Attila), 214, 1074.
*phœnicurus* (Enneoctonus), 485.
phœnicurus (Myiobius), 245.
*phœnicurus* (Phaeton), 1004.
*phragmitis* (Acrocephalus), 370.
phryganophila (Synallaxis), 199.
phrygia (Meliphaga), 719.
plaggiæ (Geocichla), 401.
pica (Copsychus), 411.
— (Fluvicola), 227.
picaoides (Sibia), 324.
*picata* (Ardea), 911.
— (Certhionix), 719.
picata (Cracticus), 500.
— (Grallina), 500.
— (Himantopus), 942.
— (Laniarius), 491.
— (Leucosarcia), 774.
— (Petroeca), 267.
— (Saxicola), 388.
picatum (Todirostrum), 232.
picatus (Bucco), 47.
— (Hemipus), 497.
— (Yungipicus), 74.
picazuro (Columba), 750.
picea (Pyriglena), 176.
pichincha (Oreotrochilus), 147.
picina (Chætura), 128.
picirostris (Dendroplex), 189.
pickeringi (Carpophaga), 745.
picta (Ispidina), 111.
— (Emblema), 580.
— (Entomophila), 719.
— (Psittacella), 21.
— (Pyrrhura), 13.
picta (Setophaga), 441.
picticollis (Casuarius), 1051.
— (Garrulax), 327.
pictifrons (Suthora), 471.
pictum (Todirostrum), 231.
picturatus (Turtur), 759.
pictus (Aramus), 920.
— (Buteo), 858.
— (Calcarius), 625.
— (Chrysolophus), 803.
— (Francolinus), 808.
— (Oreortyx), 818.
picui (Columbula), 763.
picumnus (Climacteris), 1112.
— (Dendrocolaptes), 185.
picus (Dendroplex), 189.
pierrei (Chrysophlegma), 67.
pilaris (Calopteryx), 234.
— (Turdus), 399.
pilcomayensis (Picumnus), 83.
pileata (Anous), 1018.
— (Atticora), 258.
— (Camaroptera), 356.
— (Leptasthenura), 201.
— (Leptopogon), 237.
— (Nemosia), 653.
— (Neophron), 831.
— (Neositta), 682.
— (Penelope), 791.
— (Pionopsitta), 7.
— (Saxicola), 390.
— (Spermophila), 616.
— (Timelia), 339, 1087.
— (Zonotrichia), 626.
pileatus (Atlapetes), 636.
— (Chlorospingus), 650.
— (Contopus), 249.
— (Cooperastur), 844.
*pileatus* (Crypturus), 782.
pileatus (Dryocopus), 83.
— (Furnarius), 204.
— (Halcyon), 107.
— (Herpsilochmus), 178.
— (Monarcha), 290.
— (Piprites), 219.
*pileatus* (Sarciophorus), 933.
pileolata (Myiodioctes), 442.
*pinaronota* (Nigrita), 575.
pinetorum (Spizella), 630.
pinicola (Geocichla), 405.
pinima (Crax), 789.
pinnatus (Botaurus), 919.
pinon (Carpophaga), 747.
pinosa (Junco), 629.
— (Scops), 886.

Digitized by Google

pinus (Chrysomitris), 593.
— (Dendroeca), 435.
— (Helminthophaga), 431.
pinwilli (Pomatorhinus), 325.
piperata (Ptilotis), 720.
piperivora (Selenidera), 44.
pipile (Cumana), 793.
pipra (Iodopleura), 217.
— (Picus), 71.
piririgua (Guira), 62.
*piscator* (Sula), 1011.
piscatrix (Sula), 1011.
pispoletta (Calandrella), 453.
pistacina (Chrysomitris), 591.
pistor (Acrocephalus), 369.
pistrinaria (Carpophaga), 745.
pitangua (Megarhynchus), 244.
*pithecops* (Strix), 900.
pitiayumi (Parula), 432.
pitius (Colaptes), 63.
pittieri (Henicorhina), 428.
pittoides (Atelornis), 92.
pityophila (Dendroeca), 435.
placens (Climacteris), 684.
*placens* (Elaïnea), 240.
placens (Hypocharmosyna), 32.
— (Pœcilodryas), 271.
*placens* (Sterna), 1017.
placida (Ægialitis), 939.
— (Geopelia), 762.
— (Gerygone), 268, 1080.
— (Phyllostrophus), 1086.
— (Xenocichla), 309.
plagiata (Asturina), 859.
plagosa (Chrysococcyx), 53.
— (Dendrocolaptes), 185.
planicornis (Hydrocorax), 100.
platalea (Spatula), 995.
platei (Diomedea), 1038.
*platenæ* (Ceyx), 112.
platenæ (Iole), 312.
— (Phlogœnas), 772.
— (Prioniturus), 17.
*platenæ* (Siphia), 293.
plateni (Aramidopsis), 963.
— (Cyrtostomus), 703.
— (Ninox), 889.
— (Pachycephala), 480.
*plateni* (Prionochilus), 675.
plateni (Zosterornis), 339.
platensis (Cistothorus), 425.
— (Embernagra), 638.
— (Leptasthenura), 201.
platura (Dissemurus), 533.
*platura* (Stenopsis), 121.
platurus (Prioniturus), 17.
platycercus (Crateropus), 329.
— (Selasphorus), 162.
platyrhyncha (Geospiza), 1110.
— (Limicola), 952.
— (Myiarchus), 1078.
platyrhynchus (Prionirhynchus), 94.
— (Sublegatus), 241.
platyura (Hedydipna), 694.
— (Schœnicola), 349.
*platyura* (Scotocerca), 360.
plebeia (Mirafra), 456.
plebeius (Contopus), 249.
— (Crateropus), 329.
— (Phrygilus), 641.
— (Turdus), 401.
plebeja (Calamocichla), 352.
*pleschanka* (Saxicola), 389.
plesia (Cistothorus), 424.
pleskei (Locustella), 370.
— (Podoces), 506.
— (Ruticilla), 1091.
pleskii (Parus), 464.
pleurostictus (Thryophilus), 422.
plicatus (Rhytidoceros), 101.
plinii (Himantopus), 912.
plumatus (Prionops), 497.
plumbea (Butorides), 916.
*plumbea* (Columba), 753.
plumbea (Dacnis), 688.
— (Dendroeca), 435.
— (Diglossa), 686.
*plumbea* (Edoliisoma), 298.
plumbea (Euphonia), 674.
*plumbea* (Harpiprion), 902.
— (Hydrochelidon), 1013.
plumbea (Ictinia), 864.
— (Lathria), 213.
— (Leucopternis), 860.
— (Mimocichla), 394.
— (Myiagra), 282.
— (Polioptila), 380.
— (Porzana), 968.
— (Psaltriparus), 466, 1101.
— (Ptilotis), 722.
— (Rosthramus), 865.
— (Spermophila), 615.
— (Strepera), 501.
— (Vireo), 472.
plumbeiceps (Leptoptila), 769.
— (Pogonotriccus), 235.
— (Saltator), 645.
— (Spermophila), 615.
— (Terpsiphone), 281.
plumbeicollis (Aramides), 964.

Digitized by Google

plumbeicollis (Ptilopus), 739.
*plumbeigularis* (Anous), 1018.
plumbeitarsa (Acanthopneuste), 376.
plumbeiventris (Gymnocrex), 963.
plumbeum (Parisoma), 273.
*plumbeum* (Todirostrum), 231.
plumbeus (Dysithamnus), 180.
— (Myrmelastes), 181.
*plumbeus* (Polioaetus), 877.
plumbeus (Synœcus), 816.
*plumbiceps* (Larus), 1021.
plumbiceps (Polioptila), 1091.
plumifera (Ægotheles), 116.
— (Guttera), 805.
— (Lophophaps), 767.
— (Oreortyx), 818.
*plumiferus* (Herodias), 912.
plumigenis (Philemon), 726.
*plumipes* (Athene), 894.
plumipes (Buteo), 855.
— (Caprimulgus), 123.
— (Scops), 884.
plumosa (Lædorusa), 306.
— (Penelope), 1115.
plumosus (Pinarornis), 324.
plumula (Ptilotis), 722.
pluricinctus (Pteroglossus), 43.
pluto (Myiagra), 283.
pluvialis (Charadrius), 937.
— (Hyetornis), 57.
podargina (Scops), 883.
podiceps (Ardetta), 914.
— (Podilymbus), 1042.
*podobe* (Cercotrichas), 413.
pœcilocercus (Empidochanes), 247.
— (Mecocerculus), 227.
pœcilochrous (Buteo), 857.
pœcilogaster (Buteo), 857.
pœcilolæmus (Dendropicus), 73.
pœcilonota (Hypocnemis), 173.
*pœcilonota* (Pithys), 173.
— (Copurus), 229.
pœcilopsis (Lophophanes), 1101.
pœcilopterus (Eulabeornis), 962.
— (Geobates), 204.
pœcilioptilus (Botaurus), 919.
pœcilorhyncha (Anas), 990.
pœcilorhynchus (Dryonastes), 328.
pœcilorrhoa (Carpophaga), 746.
pœcilosterna (Mirafra), 456.
*pœcilosternus* (Ptilotis), 721.
pœcilotis (Hylophilus), 474.
— (Leptopogon), 237.
— (Moupinia), 346.
pœcilura (Chrysococcyx), 53.
pœciluroides (Chrysococcyx), 53.
pœcilurus (Empidochanes), 247.
poelzami (Picus), 70.
poensis (Batis), 1080.
— (Calamocichla), 1089.
— (Callene), 1094.
— (Campothera), 1057.
— (Chlorocichla), 1085.
— (Cyanomitra), 1112.
— (Gypselus), 1064.
— (Haplopelia), 1115.
— (Huhua), 882.
— (Hylia), 1089.
— (Indicator), 1055.
— (Laniarius), 1104.
— (Neocossyphus), 410.
— (Phyllostrophus), 1086.
— (Psalidoprogne), 1079.
— (Spermestes), 576.
— (Strix), 899.
— (Sycobrotus), 1107.
— (Turdus), 1093.
poiocephala (Alcippe), 345.
poiocephalus (Brachypodius), 309.
poliocephala (Alethe), 411.
— (Carpophaga), 745.
— (Chloëphaga), 986.
— (Geothlypis), 437.
— (Gerygone), 269.
— (Glycychæra), 717.
— (Merula), 396.
— (Mesopicus), 77, 1059.
— (Ortalida), 793.
— (Prinia), 359.
— (Rhynchocyclus), 242.
— (Stachyrhis), 339.
— (Xenocichla), 309.
poliocephalum (Todirostrum), 231.
— (Caprimulgus), 124.
— (Cuculus), 51.
*poliocephalus* (Garrulax), 328.
— (Larus), 1022.
poliocephalus (Leucospizias), 841.
— (Malaconotus), 489.
— (Phœnicophilus), 652.
— (Podicipes), 1041.
*poliocephalus* (Porphyrio), 975.
poliocephalus (Prionops), 497.
*poliocerca* (Sterna), 1016.
*poliochlamys* (Malaconotus), 489.
poliogaster (Cooperastur), 844.
— (Cyanoderma), 343.
— (Pitylus), 643.
poliogastra (Estrelda), 582.
— (Ochthœca), 226.

Digitized by Google

poliogastra (Zosterops), 706.
poliogenys (Cryptolopha), 286.
— (Siphia), 293.
poliogyna (Brachypteryx), 342.
— (Loxia), 605.
poliolophus (Batrachostomus), 117.
— (Prionops), 497.
polionota (Lagonosticta), 577.
— (Merula), 396, 1092.
— (Ochthœca), 226.
— (Spermophila), 616.
polionotus (Arremon), 647.
*polionotus* (Leucopternis), 860.
polionotus (Thamnophilus), 184.
— (Urospizias), 843.
poliopareia (Estrelda), 1108.
poliophrys (Alethe), 1094.
— (Buarremon), 647.
— (Synallaxis), 197.
poliopleura (Emberiza), 621.
— (Thryophilus), 421.
poliopse (Edoliisoma), 299.
poliopsis (Astur), 840.
— (Hypopicus), 70.
*polioptera* (Campophaga), 301.
polioptera (Cichladusa), 412.
poliopterus (Melierax), 838.
— (Melilestes), 718.
polioptila (Catherpes), 1096.
poliosoma (Agriornis), 1074.
— (Pachycephalopsis), 481.
poliosomus (Buteo), 858.
poliothorax (Alethe), 411.
poliothrix (Basileuterus), 440.
poliotis (Glycyphila), 717.
— (Suthora), 470.
polioxantha (Eremomela), 355.
poliura (Chætura), 128.
— (Megaloprepia), 742.
— (Chrysococcyx), 53.
polleni (Columba), 753.
— (Xenopirostris), 499.
pollens (Agriornis), 224.
— (Campophilus), 81.
— (Graucalus), 297.
pollux (Emarginata), 391.
poltoratzkii (Sturnus), 535.
polychroa (Prinia), 359.
*polychlorus* (Eclectus), 16.
polychropterus (Pachyrhamphus), 212.
polyglotta (Hypolais), 373.
polyglottus (Cistothorus), 425.
— (Mimus), 415.
polygramma (Ptilotis), 721.
polyocerca (Euphierusa), 144.
polysticta (Dendrornis), 190.
polytmus (Aithurus), 147.
polyzona (Ortygospiza), 577.
polyzonoides (Astur), 840.
polyzonus (Melierax), 838.
*pomare* (Larus), 1023.
pomarina (Aquila), 852.
pomarinus (Stercorarius), 1027.
*pomatorhinus* (Stercorarius), 1027.
pompadora (Osmotreron), 733.
— (Xipholena), 217.
ponapensis (Ptilopus), 736.
— (Zosterops), 713.
pondicerianus (Francolinus), 808.
*pondicerianus* (Haliastur), 862.
pondicerianus (Tephrodornis), 493.
poortmani (Chlorostilbon), 142.
popelairei (Prymnacantha), 165.
porphyraceus (Ptilopus), 737.
*porphyrea* (Ptilopus), 735.
porphyreolophus (Gallirex), 89.
porphyrocephala (Glossopsitta), 31.
— (Iridornis), 665.
porphyrolæma (Apalis), 353.
— (Cotinga), 217.
— (Hermotimia), 700.
porphyromelas (Blythipicus), 77.
porphyronota (Sturnus), 535.
portoricensis (Asio), 878.
— (Cœreba), 691.
— (Loxigilla), 614.
— (Melanerpes), 68.
— (Mimus), 415.
— (Pendulinus), 557.
— (Spindalis), 661.
postocularis (Chlorospingus), 650.
*potosina* (Aphelocoma), 512.
potosina (Pipilo), 637.
potteri (Antichromus), 1103.
powelli (Colluricincla), 496.
— (Turnix), 778.
præcipua (Ptilotis), 722.
*præcognitus* (Cyanoderma), 343.
*prælatus* (Diardigallus), 799.
prætermissa (Alauda), 455.
— (Ardeiralla), 915.
prasina (Erythrura), 583.
— (Eupetomena), 134.
— (Hylia), 357.
— (Neneba), 719.
prasinorrhous (Ptilopus), 740.
*prasinoscelis* (Ardeola), 913.
prasinus (Aulacorhamphus), 44.
— (Chlorostilbon), 141.
pratensis (Anthus), 447.

Digitized by Google

pratensis (Crex), 966.
— (Pseudochloris), 640.
praticola (Otocorys), 452.
pratincola (Glareola), 929.
— (Strix), 899.
preissi (Rhipidura), 276.
presbytis (Acanthopneuste), 377.
pretiosa (Calliste), 667.
*pretiosa* (Claravis), 764.
pretrei (Chlorophonia), 671.
— (Chrysotis), 6.
— (Phaethornis), 132.
— (Spindalis), 661.
preussi (Campophaga), 300.
— (Cinnyris), 699.
— (Cosmophoneus), 490.
— (Graucalus), 295.
— (Heterhyphantes), 565.
— (Lecythoplastes), 258.
— (Onycognathus), 545.
prevosti (Euryceros), 498.
— (Lampornis), 145.
prillwitzi (Arachnothera), 1113.
— (Lædurosa), 1084.
— (Mixornis), 1087.
primolina (Metallura), 156.
princei (Geocichla), 404.
princeps (Grallaria), 171.
— (Hyphantornis), 564.
— (Leucopternis), 860.
— (Passerculus), 631.
— (Terpsiphone), 281.
princetonianus (Phrygilus), 640.
principalis (Campophilus), 80.
— (Corvus), 502.
— (Haplopelia), 768.
— (Phasianus), 802.
— (Vidua), 574.
pringlei (Cœligena), 148.
pringlii (Dryoscopus), 492.
prinioides (Cisticola), 1090.
pririt (Batis), 265.
pristina (Amazilia), 138.
pristoptera (Psalidoprocne), 260.
pritchardi (Megapodius), 788.
pritzbueri (Merula), 396.
prjevalskii (Trochalopteron), 321.
*problematicus* (Copsychus), 411.
procerior (Ptilotis), 720.
procerus (Hemignathus), 693.
procne (Diatropura), 573.
procurvoides (Xiphorhynchus), 186.
*procurvus* (Xiphorhynchus), 186.
productus (Nestor), 27.
*promaucanus* (Phalacrocorax), 1010.
promeropirhynchus (Xiphocolaptes), 188.
propinqua (Dicrurus), 531.
— (Geospiza), 608.
*propinqua* (Ibis), 901.
propinqua (Loxigilla), 614.
— (Pitta), 208.
— (Sclerurus), 1071.
— (Synallaxis), 198.
— (Turdus), 401.
— (Upucerthia), 203.
— (Urolonchа), 585.
propinquata (Ploceipasser), 569.
proregulus (Phyllobasileus), 378.
proserpinæ (Hermotimia), 700.
prosphora (Fraseria), 497.
prostheleuca (Henicorhina), 428.
prosthemelas (Geospiza), 609.
— (Pendulinus), 557.
protomomelæna (Merula), 397.
*protomomelas* (Merula), 397.
*provincialis* (Melizophilus), 375.
provocator (Ptilotis), 720.
proxima (Ptilotis), 722.
pruinosa (Chordeiles), 119.
prunelli (Lampropygia), 152.
pryeri (Dicæum), 677.
— (Hypsipetes), 316, 1086.
— (Megalurus), 351.
— (Scops), 884.
przewalskii (Grallaria), 170.
— (Sitta), 681.
— (Suthora), 471.
psaltria (Chrysomitris), 591.
*psalurus* (Hydropsalis), 120.
psammacromia (Penthetria), 573.
psammochroa (Agrobates), 374.
psaroides (Hypsipetes), 315.
pseudo-borealis (Acanthopneuste), 376.
*pseudourogallus* (Tetrao), 825.
psittacea (Erythrura), 583.
— (Osmotreron), 734.
— (Psittirostra), 605.
psittacina (Parisomus), 205.
psittacula (Geospiza), 609.
— (Phaleris), 1046.
ptilocnemis (Tringa), 951.
ptilogenys (Gracula), 539.
ptilonorhynchus (Pernis), 865.
ptilorhyncha (Numida), 805.
ptilosus (Macronus), 341.
pubescens (Picus), 71, 1058.
pucherani (Centurus), 69.
— (Chlorostilbon), 141, 1066.
— (Geoffroyus), 117.
— (Guttera), 805.

Digitized by Google

pucherani (Neomorphus), 61.
— (Rupornis), 858.
— (Xiphorhynchus), 187.
*puerasia* (Pucrasia), 801.
pudibunda (Siptornis), 200.
*pudica* (Elaïnea), 240.
pudica (Synallaxis), 197.
puella (Batis), 265.
— (Chalcopelia), 766.
— (Hirundo), 254.
— (Hypothymis), 274.
— (Irena), 317.
— (Megaloprepia), 742.
— (Trogon), 86.
pugnax (Pavoncella), 948.
— (Turnix), 778.
pulchella (Acredula), 1101.
— (Carpophaga), 744.
— (Charmosyna), 32.
— (Euphema), 26.
— (Malacias), 325.
— (Nectarinia), 694.
— (Ochthœca), 226.
— (Phyllolais), 354.
pulchellum (Todirostrum), 231.
pulchellus (Caprimulgus), 124.
— (Carcineutes), 110.
— (Nettopus), 981.
— (Ptilopus), 738.
— (Thamnophilus), 182.
— (Urospizias), 842.
— (Vireolanius), 475.
pulcher (Aegotheles), 116.
— (Melanerpes), 68.
— (Myiobius), 246.
— (Notauges), 548.
— (Phyllobasileus), 378.
pulcherrima (Æthopyga), 696.
— (Alectrœnas), 742.
— (Dacnis), 688.
— (Megalæma), 39.
— (Myzomela), 715.
pulcherrimus (Carpodacus), 604.
— (Malurus), 368.
*pulcherrimus* (Pericrocotus), 301.
pulcherrimus (Psephotus), 25.
— (Todus), 93.
pulchra (Alcyone), 113.
— (Apalis), 353.
*pulchra* (Ardetta), 914.
pulchra (Athene), 895.
— (Calliste), 666.
— (Calothorax), 161.
— (Colius), 1060.
— (Cyanolyca), 513.
pulchra (Cyanospiza), 627.
— (Eremomela), 356.
— (Eupetes), 1086.
— (Hæmophila), 634.
— (Macgregoria), 524.
— (Parula), 432.
— (Pionopsitta), 7.
— (Porphyrospiza), 627.
— (Sarothrura), 969.
pulchria (Dicæum), 677.
pulchricollis (Columba), 752.
— (Yuux), 85.
*pulchrirostris* (Alophius), 104.
pullaria (Agapornis), 22.
pullicauda (Neopsittacus), 33.
pullus (Anous), 1019.
pulmentum (Bucco), 47.
*pulsatrix* (Pulsatrix), 892.
pulveria (Empidonax), 248.
— (Salpinctes), 427.
pulveruleuta (Eopsaltria), 482.
— (Pœcilodryas), 271.
pulverulentus (Hemilophus), 81.
— (Porphyrio), 976.
*pulverulentus* (Totanus), 947.
pumila (Alseonax), 264.
— (Bradyornis), 287.
pumilo (Cyanolyca), 513.
pumilum (Glaucidium), 896.
pumilus (Chlorostilbon), 141.
— (Coccyzus), 54.
*pumilus* (Loriculus), 23.
pumilus (Yungipicus), 74.
— (Zebrilus), 915.
puna (Colaptes), 63.
— (Querquedula), 992.
— (Troglodytes), 426.
punctata (Bowdleria), 337.
— (Calliste), 666.
— (Campothera), 65.
*punctata* (Dendrocygna), 988.
punctata (Microeca), 264.
— (Querquedula), 993.
— (Spermestes), 576.
punctatissima (Strix), 899.
punctatum (Cinclosoma), 318.
*punctatus* (Anorthura), 428.
punctatus (Batrachostomus), 117.
— (Capito), 41.
*punctatus* (Eudynamis), 54.
punctatus (Megalurus), 351, 1089.
— (Pardalotus), 674.
— (Phalacrocorax), 1007.
— (Thamnophilus), 183.
— (Tinnunculus), 871.

Digitized by Google

puncticeps (Dysithamnus), 180.
*puncticeps* (Herpsilochmus), 178.
puncticeps (Picolaptes), 187.
puncticollis (Brachypternus), 78.
— (Dendrocolaptes), 185.
punctifrons (Ægithalus), 468.
— (Picumnus), 84.
punctigula (Chrysoptilus), 67.
— (Dendrornis), 189, 1071.
— (Serinus), 600.
punctiliger (Thamnophilus), 184.
punctulata (Calliste), 666.
— (Catherpes), 1096.
— (Munia), 586.
— (Ninox), 889.
punctulatus (Chlorospingus), 650.
punensis (Nuttallornis), 1078.
— (Phrygilus), 640.
— (Siptornis), 1072.
punica (Accipiter), 845.
— (Falco), 875.
punicea (Columba), 752.
— (Pyrrhospiza), 604.
puniceus (Gecinus), 64.
pura (Manacus), 1074.
purpurascens (Chlorophanes), 689.
— (Euphonia), 1112.
— (Hypochæra), 574.
— (Molothrus), 552.
— (Penelope), 791.
*purpurascens* (Phalacrocorax), 1009.
purpurascens (Sturnus), 535.
purpurata (Urochroma), 8.
purpuratus (Ptilopus), 737.
— (Trachyphonus), 41.
purpurea (Ardea), 910.
— (Cochoa), 284.
— (Columbigallina), 763.
— (Lampropygia), 152.
— (Osculatia), 770.
— (Progne), 259.
purpureicauda (Chalcostigma), 156.
purpureiceps (Lamprocolius), 547.
— (Lamprocorax), 542.
purpureicollis (Catheturus), 788.
purpureiventris (Cinnyris), 697, 1112.
purpureotincta (Columba), 1114.
purpureus (Carpodacus), 603.
— (Centropus), 56.
— (Lamprocolius), 547.
— (Lamprotornis), 544.
purpuropterus (Lamprotornis), 544.
purus (Graucalus), 295, 1083.
*purus* (Picus), 70.
pusilla (Acanthiza), 366.
pusilla (Alcyone), 113.
— (Ardetta), 914.
— (Astur), 840.
— (Barbatula), 37.
— (Emberiza), 621.
— (Eremomela), 355.
— (Gallinago), 955.
*pusilla* (Glaucidium), 896.
pusilla (Glossopsitta), 32.
— (Lædorusa), 306.
— (Petroeca), 267.
— (Pnoepyga), 430.
— (Phonipara), 618.
— (Porzana), 967.
— (Pyromelana), 1108.
— (Sitta), 681.
— (Spizella), 630.
*pusilla* (Tyranniscus), 239.
pusillum (Ornithion), 238.
pusillus (Cnipolegus), 229.
— (Corvus), 504.
— (Coryphospingus), 642.
— (Empidonax), 248.
— (Ereunetes), 949.
— (Graucalus), 295, 1084.
— (Loriculus), 22.
— (Melittophagus), 96.
— (Myiodioctes), 442.
— (Nannochordeiles), 119.
— (Serinus), 601.
— (Simorhynchus), 1045.
— (Vireo), 473.
— (Xiphorhynchus), 186.
pusio (Nasiterna), 24.
— (Spizella), 630.
pustulatus (Icterus), 558.
puteicola (Petronia), 596.
puveli (Illadopsis), 1087.
*pyca* (Malacocincla), 333.
pycnopygius (Chætops), 320.
pygæus (Molpastes), 304.
*pygargus* (Circus), 836.
pygmæa (Empidonax), 1077.
— (Cannabina), 1108.
— (Hypocharmosyna), 32.
— (Myrmotherula), 178.
— (Nasiterna), 23.
*pygmæa* (Porzana), 967.
pygmæa (Sitta), 681.
pygmæum (Dicæum), 679.
— (Œdistoma), 718.
*pygmæus* (Centurus), 69.
pygmæus (Eurhynorhynchus), 950.
— (Indicator), 34.
— (Phaethornis), 133, 1065.

Digitized by Google

pygmæus (Phalacrocorax), 1010.
— (Picumnus), 84.
— (Simorhynchus), 1045.
— (Yungipicus), 74.
— (Zosterornis), 339.
pylzowi (Urocynchramus), 620.
pyra (Topaza), 147.
pyrenaica (Pteroclurus), 776.
pyrgita (Petronia), 597.
pyrilia (Pionopsitta), 8.
pyrocephalus (Machæropterus), 222.
*pyrohypogaster* (Hypopyrrhus), 561.
pyrolophus (Psilopogon), 40.
pyronotus (Acomus), 798.
pyrope (Tænioptera), 225.
pyropyga (Coua), 60.
*pyropygia* (Chlorestes), 140.
pyrrhocephalus (Phœnicophaës), 59.
*pyrrhocorax* (Fregilus), 516.
pyrrhodes (Philydor), 194.
pyrrhogaster (Mesopicus), 77.
pyrrhogenys (Trichostoma), 334.
*pyrrhonota* (Alæmon), 451.
pyrrhonota (Climacteris), 685.
— (Erythromylas), 267.
— (Myrmotherula), 179.
— (Petrochelidon), 258.
pyrrhonotus (Anthus), 446.
— (Passer), 597.
pyrrhophius (Dendrocopus), 185.
*pyrrhops* (Bucorvus), 99.
pyrrhops (Cyanoderma), 343.
— (Dicrurus), 530.
— (Euscarthmus), 233.
— (Pionopsitta), 7.
pyrrhoptera (Alcippe), 345.
— (Brotogerys), 15.
— (Callene), 408.
*pyrrhoptera* (Cyanoderma), 343.
pyrrhopterum (Philentoma), 282.
pyrrhopterus (Lycocorax), 517.
— (Pendulinus), 556.
pyrrhopygia (Acanthiza), 366.
*pyrrhopygia* (Cittocincla), 413.
pyrrhopygia (Hylacola), 320.
pyrrhopygius (Halcyon), 108.
pyrrhopygus (Trichixus), 409.
pyrrhorhoa (Gallinula), 974.
pyrrhothorax (Charadrius), 938.
— (Picus), 70.
— (Turnix), 779.
pyrrhotis (Blythipicus), 77.
pyrrhulina (Emberiza), 620.
pyrrhuloides (Emberiza), 620.
pyrrhura (Myzornis), 347.
pyrypogaster (Hypopyrrhus), 561.
pytiopsittacus (Loxia), 604.
quadribrachys (Alcedo), 113.
quadricinctus (Pterocles), 777.
quadricolor (Cosmophoneus), 490.
— (Halcyon), 108.
— (Loriculus), 23.
— (Prionochilus), 675.
— (Trichothraupis), 654.
quadrifasciata (Picus), 72.
quadrigemina (Ptilopus), 738.
quadrigintus (Pardalotus), 674.
quadrivirgata (Erythropygia), 412.
quanzæ (Urobrachya), 1108.
quartinia (Coccopygia), 580.
querula (Zonotrichia), 625.
quindiuna (Cyanolyca), 513.
*quinquelineata* (Emberiza), 623.
quinquestriata (Amphispiza), 627.
quinticolor (Capito), 41.
— (Munia), 587.
quiscalina (Campophaga), 300.
quitensis (Metallura), 156.
quixensis (Formicivora), 178.
quoyi (Cracticus), 500.
raalteni (Synœcus), 816.
rabieri (Gecinus), 1057.
racheliæ (Malimbus), 568.
*radama* (Hypotriorchis), 872.
*radcliffii* (Indicator), 34.
raddei (Enneoctonus), 487, 1103.
radiata (Carpophaga), 746.
— (Tænioglaux), 897.
radiatus (Bucco), 47.
— (Carpococcyx), 61.
— (Erythrotriorchis), 847.
— (Gymnogenys), 835.
— (Thamnophilus), 182.
*radiatus* (Urospizias), 844.
radiolatus (Centurus), 69.
— (Dendrocolaptes), 185.
radiolosus (Neomorphus), 61.
radjah (Tadorna), 989.
rafflesi (Mesospilus), 67.
*rafflesii* (Querquedula), 992.
raggiana (Paradisea), 518.
ragazzii (Cyanomitra), 702.
raimondi (Gnathospiza), 602.
*raimondi* (Sycalis), 602.
raimondii (Phytotoma), 210.
raja (Spilornis), 834.
ralloides (Ardeola), 913.
— (Myiadectes), 407.
rama (Hypolais), 373.
ramalinæ (Parula), 1096.



Digitized by Google

ramonianus (Trogon), 87.
ramsayi (Actinodura), 331.
— (Megalæma), 39.
— (Myzomela), 716.
— (Petroeca), 267.
*ramsayi* (Siphia), 293.
ramsayi (Yungipicus), 75.
— (Zosterops), 712.
ramuensis (Gerygone), 268, 1080.
randonii (Galerida), 457.
ranivorus (Circus), 837.
rapax (Aquila), 852.
rara (Lagonosticta), 577.
— (Lampribis), 903.
— (Phytotoma), 210.
rarotongensis (Ptilopus), 737.
ravida (Mimocichla), 394.
*rayi* (Motacilla), 444.
raylai (Calandrella), 453.
razæ (Spizocorys), 454.
recondita (Malia), 342.
rectirostris (Anthreptes), 704.
— (Colluricincla), 495.
— (Furnarius), 204.
— (Hemistephania), 131.
— (Lafresnaya), 1067.
— (Limnornis), 196.
rectunguis (Centropus), 56.
recurvirostris (Avocettula), 145.
— (Esacus), 928.
— (Todirhamphus), 110.
redivivus (Harporhynchus), 417.
reevesi (Phasianus), 893.
reevii (Merula), 396.
refulgens (Lophophorus), 797.
— (Thalurania), 144.
*regalis* (Milvus), 862.
— (Otidiphaps), 774.
regia (Diomedea), 1038.
— (Erythrura), 583.
— (Muscivora), 244.
— (Platalea), 904.
— (Vidua), 574.
regina (Chiroxiphia), 222.
regius (Cicinnurus), 519.
— (Cinnyris), 699.
— (Cosmopsarus), 544.
reguloides (Acanthiza), 366.
— (Acanthopneuste), 377.
— (Tyrannulus), 238.
regulorum (Balearica), 923.
regulus (Ammomanes), 459.
— (Grallaria), 171.
*regulus* (Hypotriorchis), 873.
regulus (Lophornis), 165.
regulus (Loriculus), 23.
— (Macheropterus), 221.
— (Prodotiscus), 35.
rehsei (Acrocephalus), 369.
reichardi (Hyphantornis), 562.
— (Poliospiza), 599.
reichenbachi (Celeus), 79.
— (Cyanomitra), 702.
— (Eleopicus), 75.
— (Halcyon), 108.
— (Leptoptila), 769.
reichenowi (Antichromus), 489.
— (Bradyornis), 1082.
— (Burnesia), 360.
— (Cinnyris), 699.
— (Cosmophoneus), 490.
— (Cryptospiza), 576.
— (Dendropicus), 74.
— (Enneoctonus), 486, 1103.
— (Galerida), 458.
— (Heterhyphantes), 565.
— (Hyphantornis), 563.
— (Monarcha), 290.
— (Nectarinia), 695.
— (Numida), 804.
— (Pionus), 6.
— (Pitta), 1073.
— (Poicephalus), 9.
— (Pycnonotus), 1084.
— (Rhipidura), 1081.
— (Sarothrura), 969.
— (Serinus), 601.
— (Tinnunculus), 871.
— (Turacus), 89.
— (Turtur), 760.
reinhardti (Iridornis), 665.
— (Lagopus), 827.
reini (Polyerata), 137.
reinwardti (Baza), 867.
— (Crateropus), 330.
— (Hapalarpactes), 88.
— (Reinwardtœnas), 756.
— (Selenidera), 44.
reischeki (Hæmatopus), 932.
reiseri (Accentor), 1091.
relicta (Nucifraga), 506.
religiosa (Gracula), 539.
*religiosa* (Ibis), 901.
religiosus (Hypotriorchis), 873.
remifer (Rhringa), 532.
remigialis (Telephonus), 488.
remotum (Edoliisoma), 299.
renauldi (Carpococcyx), 61.
rendalli (Anomalospiza), 1107.
— (Serinus), 600, 1109.

Digitized by Google

rendallii (Lagonosticta), 578.
rendovæ (Zosterops), 709.
resplendens (Phalacrocorax), 1007.
*resplendens* (Pharomacrus), 85.
resplendens (Ptiloscelis), 935.
*respublica* (Schlegelia), 519.
restricta (Campylorhynchus), 1095.
— (Polioptila), 380.
reticulata (Eos), 28.
— (Ptilotis), 721.
retrocinctum (Dicæum), 678.
retzii (Sigmodus), 498.
revoili (Machærhamphus), 865.
rex (Clytoceyx), 104.
*rex* (Grallaria), 170.
rex (Machlolophus), 465.
— (Troglodytes), 425.
rex-pineti (Graucalus), 296.
reyi (Chlorospingus), 651.
— (Ninox), 881.
reynaudii (Coua), 60.
*rhaad* (Otis), 926.
rhami (Lamprolæma), 149.
rhamphastinus (Tetragonops), 42.
*rhenana* (Certhia), 1112.
rhinoceros (Buceros), 100.
rhinolophus (Merulaxis), 167.
rhizophoræ (Cyrtostomus), 703.
rhodeogaster (Mesopicus), 1059.
rhodinogastra (Petroeca), 267.
rhodinolæma (Carpophaga), 745.
— (Phœnicothraupis), 657.
rhodocephala (Pyrrhura), 14.
rhodochlamys (Carpodacus), 603.
rhodochrous (Carpodacus), 603.
rhodocolpa (Carpodacus), 604.
rhodocorytha (Chrysotis), 5.
rhodogaster (Accipiter), 846.
rhodogastra (Pyrrhura), 14.
rhodolæma (Anthreptes), 704, 1113.
*rhodometopus* (Carpodacus), 603.
rhodoparia (Lagonosticta), 577.
rhodopeplus (Carpodacus), 603.
*rhodoptera* (Cisticola), 363.
rhodops (Geoffroyus), 16.
rhodopyga (Estrelda), 581.
rhodorhynchus (Anser), 983.
rhynchotis (Spatula), 995.
ribbei (Pomarea), 291.
richardi (Anthus), 446.
richardsi (Alcyone), 113.
— (Monarcha), 289.
— (Ptilopus), 736.
— (Thriponax), 82.
richardsoni (Capito), 41.
richardsoni (Contopus), 249.
— (Cyphorhinus), 429.
— (Dendragapus), 824.
— (Hypotriorchis), 874.
— (Nyctala), 893.
— (Spermophila), 615.
richmondi (Agelæus), 553.
— (Embernagra), 638.
riciniata (Eos), 29, 1054.
ricketti (Arboricola), 814.
— (Chrysophlegma), 67.
— (Cryptolophia), 285.
ricordi (Sporadinus), 142.
ridgwayi (Anous), 1019.
— (Antrostomus), 122.
— (Certhidea), 689.
— (Chasiempis), 270, 1080.
— (Colinus), 821.
— (Cotinga), 216.
— (Empidonax), 248.
— (Glaucidium), 897.
— (Icterus), 1107.
— (Lagopus), 827.
— (Lophophanes), 1101.
— (Loxigilla), 614.
— (Myiobius), 245.
— (Nesotrichus), 251.
— (Ornithion), 238, 1076.
— (Plegadis), 904.
— (Rupornis), 859.
— (Scardafella), 762.
— (Scops), 886.
— (Stelgidopteryx), 1079.
— (Thalurania), 1066.
— (Thryothorus), 423.
— (Urubitinga), 861.
ridibundus (Larus), 1022.
ridleyana (Elaïnea), 239.
riedeli (Eclectus), 16.
— (Erythromyias), 1080.
*riedeli* (Lalage), 302.
riedeli (Phyllergates), 362.
— (Tanysiptera), 106.
riefferi (Amazilia), 138, 1065.
— (Pipreola), 216.
— (Psittospiza), 646.
riisii (Butalis), 262.
— (Elaïnea), 239.
rikeri (Berlepschia), 196.
*ringeri* (Ardea), 911.
*ringvia* (Uria), 1043.
riocouri (Nauclerus), 863.
riojæ (Phaethornis), 133.
riparia (Cotyle), 256.
ripponi (Carpodacus), 1109.

Digitized by Google

ripponi (Cryptolopha), 1082.
— (Trochalopteron), 1086.
risorius (Alectrurus), 228.
— (Turtur), 759.
rivoilii (Melittophagus), 96.
rivolii (Hypoxanthus), 63.
— (Ptilopus), 740.
rivularia (Melospiza), 633.
rivularis (Cinclus), 419.
rixosa (Machetornis), 229.
roberti (Aphantochroa), 134.
— (Callene), 1094.
*roberti* (Sphenocichla), 428.
roberti (Turdinulus), 332.
robinsoni (Butorides), 916.
— (Cardinalis), 620.
roborowskii (Montifringilla), 595.
robusta (Arachnothera), 705.
— (Cisticola), 365.
— (Gerygone), 270.
— (Gracula), 539.
— (Lanius), 484.
— (Molothrus), 1106.
— (Perdix), 812.
— (Phalacrocorax), 1007.
— (Pratincola), 387.
robustirostris (Megalæma), 39.
— (Xantholäema), 1056.
robustus (Campophilus), 81.
— (Poicephalus), 8.
— (Tinamus), 781.
rochii (Cuculus), 51.
rochusseni (Scolopax), 955.
rodericanus (Bebrornis), 349.
rodgeri (Gecinus), 64.
rodgersi (Fulmarus), 1036.
rohdei (Thamnophilus), 184
rollandi (Podicipes), 1041.
rolleti (Pogonorhynchus), 35.
romanovi (Enneoctonus), 486, 1103.
roraimæ (Basileuterus), 439.
— (Chlorophonia), 671.
— (Merula), 398.
— (Myiobius), 246.
— (Scops), 886.
roratus (Eclectus), 16.
*rosa-alba* (Cracticus), 501.
rosacea (Carpophaga), 745.
— (Pyrrhula), 607.
rosaceus (Anthus), 447.
rosæ (Chætocercus), 163.
roscoe (Geothlypis), 437.
rosea (Acredula), 467.
— (Loxops), 594.
— (Pelecanus), 1005.
rosea (Petroeca), 267.
— (Phœnicothraupis), 657.
— (Rhodinocichla), 418.
— (Rhodostethia), 1021.
— (Xantholäema), 40.
roseicapilla (Cacatua), 3.
roseicapillus (Ptilopus), 737.
roseicollis (Agapornis), 22.
*roseicollis* (Hadrostomus), 211.
roseicollis (Ptilopus), 735.
roseicrissa (Estrelda), 582.
roseigaster (Temnotrogon), 86.
roseigularis (Pyranga), 659.
roseilia (Sitta), 680.
roseipectus (Carpodacus), 604.
rosenbergi (Antrostomus), 122.
— (Cercomacra), 176.
— (Gymnocrex), 963.
— (Heteropelma), 223.
— (Myzomela), 715.
— (Nemosia), 654.
— (Pitta), 208.
— (Polyerata), 136.
— (Rhipidura), 278.
*rosenbergi* (Scolopax), 955.
rosenbergi (Strix), 899.
*rosenbergi* (Tanysiptera), 106.
— (Trichoglossus), 31.
roseogriseus (Turtur), 760.
roseus (Carpodacus), 603.
— (Pastor), 537.
— (Pericrocotus), 301.
— (Phœnicopterus), 908.
rosilæ (Cyanospiza), 626.
rossæ (Musophaga), 90.
rosseliana (Gerygone), 269.
— (Ninox), 888.
— (Pachycephala), 477.
— (Tanysiptera), 106.
rossi (Chen), 982.
— (Thinornis), 942.
rostrata (Calliste), 666.
— (Cannabina), 590.
— (Geothlypis), 437.
— (Hylocharis), 1066.
— (Ixocincla), 316.
— (Mimus), 416.
— (Estrelata), 1034.
— (Siptornis), 1072.
— (Speotyto), 895.
— (Tyrannus), 252.
rostratum (Edoliisoma), 299.
— (Trichostoma), 333.
rostratus (Passerculus), 631.
— (Platyrhynchus), 231.

Digitized by Google

rostratus (Turtur), 759.
rostripallens (Dendrornis), 189.
rothschildi (Buthraupis), 663.
— (Casuarius), 1051.
— (Chrysotis), 5.
— (Geospiza), 1110.
— (Guiraca), 612.
— (Heliangelus), 155.
— (Melizophilus), 1090.
*rothschildi* (Phalacrocorax), 1009.
rothschildi (Serilophus), 205.
— (Serinus), 1109.
*rougeti* (Rougetius), 965.
roulroul (Rollulus), 815.
rourei (Nemosia), 653.
*rousseaui* (Anous), 1018.
rouxi (Ixulus), 344.
rovumæ (Parus), 462.
*rowleyi* (Cyanorhamphus), 26.
rowleyi (Hypothymis), 274.
rubea (Otocorys), 452.
rubecula (Erithacus), 382.
— (Geocichla), 405.
*rubecula* (Monarcha), 289.
— (Myiagra), 282.
rubecula (Nonnula), 48.
— (Poospiza), 628.
— (Pteroptochus), 167.
rubeculoides (Accentor), 381.
— (Siphia), 292.
*rubeculus* (Cuculus), 51.
rubeculus (Pomatorhinus), 325.
ruber (Cardinalis), 619.
— (Crecisous), 972.
— (Eudocimus), 904.
— (Ergaticus), 440.
— (Phacelodomus), 196.
— (Phœnicopterus), 908.
— (Sphyropicus), 70.
ruberrima (Lagonosticta), 1108.
rubescens (Megalæma), 39.
— (Phlogœnas), 773.
rubetra (Pratincola), 387.
— (Tænioptera), 225.
rubetraoides (Pratincola), 387.
rubica (Phœnicothraupis), 657.
rubicilla (Carpodacus), 602.
— (Pyrrhula), 607.
rubicilloides (Carpodacus), 603.
rubicoides (Phœnicothraupis), 657.
rubicola (Pratincola), 387.
*rubicunda* (Cassinia), 295.
rubicunda (Empidonax), 1077.
*rubicunda* (Neopipo), 221.
*rubicundus* (Empidonax), 247.
rubidiceps (Chloëphaga), 985.
rubidiventris (Lophophanes), 465.
rubidus (Accentor), 381.
— (Automolus), 195.
rubiensis (Carpophaga), 747.
— (Lorius), 29.
— (Manucodia), 518.
— (Monarcha), 289.
— (Ptilotis), 721.
— (Rhectes), 495.
— (Tanysiptera), 106.
rubiginosa (Argya), 323.
— (Cinnamopteryx), 561.
— (Dendroeca), 433.
— (Eos), 29.
— (Margarornis), 191.
— (Ortygocichla), 335.
rubiginosus (Automolus), 194.
— (Calamanthus), 1089.
— (Chloronerpes), 65.
— (Chlorophoneus), 490.
— (Drymocataphus), 334.
*rubiginosus* (Rallina), 966.
— (Timelia), 340.
rubinea (Clytolæma), 149.
rubineus (Pyrocephalus), 246.
rubinoides (Phæolæma), 149.
rubra (Casiornis), 214.
— (Eos), 28.
— (Foudia), 566.
— (Gerygone), 269.
*rubra* (Hæmatoderus), 218.
rubra (Loriculus), 23.
— (Paradisea), 518.
*rubra* (Pauxis), 790.
rubra (Phœnicothraupis), 657.
— (Pyranga), 659.
— (Rallicula), 970.
rubratra (Myzomela), 714.
rubricapilla (Mixornis), 340.
— (Muscisaxicola), 230.
— (Pipra), 221.
— (Spermospiza), 571.
— (Xantholæma), 40.
rubricapillus (Poicephalus), 9.
rubricata (Lagonosticta), 577.
— (Origma), 352.
rubricatum (Pyrgisoma), 635.
rubricatus (Pardalotus), 674.
rubricauda (Phaeton), 1004.
rubricaudatus (Dendrocopus), 185.
rubriceps (Anaplectes), 568.
— (Pyranga), 659.
rubricera (Carpophaga), 743.
*rubricollis* (Accipiter), 845.

Digitized by Google

rubricollis (Campophilus), 80.
— (Malimbus), 568.
*rubricollis* (Podicipes), 1042.
— (Pternistes), 811.
— (Querula), 218.
— (Recurvirostra), 943.
rubrifacies (Pogonorhynchus), 36.
rubrifrons (Cardellina), 440.
— (Hylophilus), 474.
*rubrifrons* (Megapodius), 787.
rubrifrons (Melanerpes), 68.
— (Rhodornis), 357.
rubrigastra (Cyanotis), 236.
rubrigena (Ara), 10.
rubrigulare (Dicæum), 677.
rubrigularis (Hypocharmosyna), 32.
*rubrigularis* (Petasophora), 145.
rubrigularis (Pionus), 6.
rubrinucha (Pitta), 209.
rubripersonata (Neophron), 1116.
rubripes (Anas), 990.
— (Crypturus), 783.
— (Mimocichla), 394.
rubripileum (Neopsittacus), 33.
rubripileus (Chloronerpes), 1057.
rubrirostris (Anser), 982.
— (Arboricola), 814.
— (Bolborhynchus), 14.
— (Chlorospingus), 651.
rubritorques (Trichoglossus), 31.
rubritorquis (Conurus), 12.
rubriventre (Dicæum), 678.
rubriventris (Centurus), 69.
— (Estrelda), 581.
rubrobrunnea (Myzomela), 716.
rubrocoronatum (Dicæum), 677.
rubrocrista (Heliochera), 217.
rubrocucullata (Myzomela), 715.
rubrofrontata (Rhipidura), 277.
*rubrogenis* (Ara), 10.
*rubro-limbatus* (Pericrocotus), 302.
*rubromitratus* (Selasphorus), 162.
rubronigra (Munia), 588.
rubronotata (Hypocharmosyna), 32.
rubropygius (Serilophus), 205.
rubrotincta (Myzomela), 716.
ruckeri (Threnetes), 131.
ruecki (Siphia), 1083.
rudis (Ceryle), 114.
rudolfi (Ninox), 889.
rudolphi (Paradisea), 518.
rueppelli (Amydrus), 545.
— (Eurocephalus), 494.
rufa (Ardea), 911.
— (Ægotheles), 1063.
rufa (Baza), 868.
— (Caccabis), 807.
— (Campylorhynchus), 420.
— (Cisticola), 363.
— (Climacteris), 684.
— (Dendrocitta), 508.
— (Formicivora), 1070.
— (Halcyon), 106.
*rufa* (Limosa), 945.
— (Lophura), 799.
rufa (Loxops), 594.
— (Macropygia), 756.
— (Malacoptila), 47.
*rufa* (Ninox), 889.
rufa (Pnoepyga), 430.
— (Sarothrura), 970.
— (Saxicola), 390.
— (Schiffornis), 223.
— (Trichocichla), 335.
— (Vanga), 499.
rufalbus (Thryophilus), 421.
rufatra (Formicivora), 177, 1070.
rufaxilla (Heliochera), 217.
— (Leptoptila), 769.
rufescens (Ægotheles), 116.
— (Argya), 323.
— (Atrichia), 729.
— (Aulia), 213.
— (Bowdleria), 338.
— (Calandrella), 1099.
— (Cannabina), 590.
— (Centropus), 57.
— (Cinclorhamphus), 361.
— (Cracticus), 501.
— (Cryptillas), 1088.
*rufescens* (Euryptila), 350.
rufescens (Garrulus), 510.
— (Gerygone), 269.
— (Hæmophila), 634.
— (Illadopsis), 336.
— (Muscisaxicola), 230.
— (Myiobius), 245.
— (Parus), 464.
— (Pelecanus), 1005.
— (Phyllostrophus), 314.
— (Procarduelis), 591.
— (Rhynchotus), 784.
— (Scops), 885.
— (Sylviella), 355.
*rufescens* (Syrnium), 890.
rufescens (Thamnistes), 181.
— (Thryothorus), 422.
*rufescens* (Tryngites), 950.
rufescens (Turnix), 779.
rufibarba (Estrelda), 581.

Digitized by Google

ruficapilla (Cisticola), 363.
— (Cryptolopha), 286.
— (Dendroeca), 433, 1096.
— (Fulvetta), 346.
— (Grallaria), 170.
— (Helmintophaga), 431.
— (Nemosia), 653.
— (Nonnula), 48.
— (Sylviella), 355.
— (Synallaxis), 197.
*ruficapilla* (*Vitia*), 334.
ruficapillum (Trochalopteron), 321.
ruficapillus (Baryphthengus), 95.
— (Henicurus), 450.
— (Thamnophilus), 182.
— (Xanthosomus), 554.
ruficauda (Bathilda), 585.
— (Cichladusa), 411.
— (Cinclocerthia), 414.
— (Erythropygia), 412.
— (Formicivora), 178.
— (Galbula), 45.
— (Hæmophila), 633.
— (Histurgops), 569.
— (Myrmeciza), 174, 1069.
— (Ortalida), 792.
— (Rhinomyias), 282.
— (Rhynchocyclus), 242.
— (Rupornis), 858.
— (Siphia), 293.
— (Upucerthia), 203.
— (Zenaida), 757.
ruficaudatus (Philydor), 194.
— (Thryothorus), 423.
*ruficeps* (Aramides), 963.
ruficeps (Cænotriccus), 233.
— (Chalcostigma), 156.
— (Cisticola), 365.
— (Coua), 60.
— (Cyanoderma), 343.
— (Dendrocincla), 186.
— (Elaïnea), 240.
— (Eleopicus), 76.
— (Euphonia), 672.
— (Formicarius), 1069.
— (Garrulax), 327.
— (Grallaria), 170.
— (Gymnopithys), 173.
— (Hæmophila), 634.
— (Heteromorpha), 470, 1101.
— (Laniarius), 491.
— (Macropygia), 756.
— (Megalurus), 351.
— (Myioceyx), 111.
— (Ortalida), 792.
ruficeps (Orthotomus), 361.
— (Pellorneum), 336.
— (Pomatorhinus), 325.
— (Pyrrhocoma), 654.
— (Stipiturus), 348.
— (Sulhora), 471.
— (Tephrocorys), 454.
*ruficeps* (Thamnophilus), 184.
ruficeps (Thlypopsis), 653.
*ruficeps* (Tinamus), 781.
ruficeps (Todirostrum), 232.
ruficervix (Calliste), 668.
— (Stenopsis), 121.
ruficollaris (Petrochelidon), 258.
ruficollis (Anabazenops), 193.
*ruficollis* (Aramides), 963.
ruficollis (Ardea), 911.
— (Branta), 985.
— (Bucco), 47.
— (Caprimulgus), 123.
— (Corvus), 502, 1104.
— (Chrysococcyx), 53.
— (Cypsnagra), 651.
— (Dryonastes), 328.
— (Gerygone), 269.
— (Glossiptila), 689.
— (Hylocharis), 139.
— (Hypotriorchis), 873.
— (Merula), 397.
— (Micrastur), 838.
— (Montifringilla), 595.
— (Myiagra), 283, 1082.
— (Oreophilus), 933.
— (Pomatorhinus), 326.
— (Spermophila), 615.
— (Stelgidopteryx), 260.
*ruficollis* (Thamnophilus), 183.
ruficollis (Tringa), 951.
ruficolor (Galerida), 457.
ruficoronata (Setophaga), 441.
*ruficrissa* (Amaurornis), 972.
ruficrissa (Rhinomyias), 282.
— (Stoparola), 291.
— (Urosticte), 154.
ruficrissus (Criniger), 311.
ruficrista (Afrotis), 924.
rufidorsa (Ceyx), 111.
— (Rhipidura), 278.
rufidorsalis (Dryodromas), 354.
— (Henicurus), 450.
— (Passer), 1109.
rufifrons (Basileuterus), 439.
— (Cyanoderma), 343.
— (Dryodromas), 354.
— (Fulica), 977.

Digitized by Google

rufifrons (Garrulax), 328.
— (Malacopteron), 337.
— (Phacelodomus), 196.
— (Rhipidura), 278.
— (Siphia), 293, 1083.
rufigaster (Phaethornis), 133, 1065.
*rufigastra* (Alcedo), 113.
rufigastra (Carpophaga), 746.
— (Siphia), 1083.
rufigena (Anaplectes), 1107.
— (Caprimulgus), 123.
rufigenè (Todirostrum), 232.
rufigenis (Calliste), 668.
— (Eremomela), 356.
— (Pipilopsis), 649.
— (Siptornis), 199.
— (Staphidia), 344.
rufigula (Carpophaga), 743.
— (Cotyle), 257.
— (Dendroeca), 433.
— (Gymnopithys), 173.
— (Myiagra), 283.
— (Petrochelidon), 258.
— (Phlogœnas), 772.
— (Siphia), 293.
rufigulare (Trochalopteron), 321.
rufigularis (Acanthogenys), 724.
— (Apalis), 353.
— (Attila), 214.
— (Calliste), 666.
*rufigularis* (Dromococcyx), 62.
rufigularis (Entomophila), 719.
— (Euscarthmus), 232.
*rufigularis* (Gymnocichla), 175.
rufigularis (Halcyon), 108.
— (Hypotriorchis), 873.
— (Iole), 312.
— (Minla), 344.
*rufigularis* (Sclerurus), 191.
rufigularis (Siphia), 293.
rufilata (Accentor), 381.
— (Accipiter), 845.
— (Cisticola), 365.
— (Turnix), 778.
— (Zosterops), 713.
rufilatus (Tarsiger), 384.
rufilateralis (Rhipidura), 277.
rufiloris (Rhamphococcyx), 1057.
rufimarginata (Ochthœca), 226.
rufimarginatus (Herpsilochmus), 178.
rufina (Columba), 751.
— (Melospiza), 633.
— (Netta), 996.
rufinucha (Campylorhynchus), 420.
— (Leptoptila), 770.
rufinucha (Pachycephala), 479.
— (Pipilopsis), 648.
rufinuchalis (Laniarius), 491, 1104.
*rufinuchus* (Charadrius), 937.
rufipectoralis (Ochthœca), 226.
rufipectus (Attila), 1074.
— (Automolus), 194.
— (Formicarius), 172.
— (Leptopogon), 237.
— (Parus), 462.
— (Podicipes), 1041.
— (Spilornis), 834.
— (Turdinus), 331.
rufipennis (Aplonis), 512.
— (Butastur), 859.
— (Cichladusa), 1094.
— (Columbigallina), 764.
— (Geositta), 204.
*rufipennis* (Illadopsis), 336.
rufipennis (Macropygia), 754.
— (Muscisaxicola), 230.
*rufipennis* (Myiozetetes), 241.
rufipennis (Neomorphus), 61.
— (Pachycephala), 480.
— (Petrophassa), 767.
— (Phacelodomus), 196.
— (Pitangus), 213.
— (Scops), 883.
— (Siptornis), 200.
rufipes (Euscarthmus), 232.
— (Gennæus), 800.
— (Syrnium), 891.
rufipilea (Mirafra), 455.
rufipileata (Philydor), 1072.
rufipileus (Colaptes), 1057.
rufistrigata (Ninox), 889.
rufitincta (Astur), 840.
*rufitorques* (Fuligula), 998.
rufitorques (Merula), 396.
— (Urospizias), 843.
rufiventer (Eudynamis), 54.
*rufiventer* (Formicivora), 178.
rufiventer (Lalage), 303.
— (Pterythrius), 487.
— (Tachyphonus), 656.
— (Turdus), 400.
rufiventre (Hapalodema), 87.
rufiventris (Accipiter), 846.
— (Ardeola), 913.
*rufiventris* (Carpophaga), 746.
rufiventris (Colluricincla), 496.
*rufiventris* (Erythrogonys), 933.
rufiventris (Euphonia), 673.
*rufiventris* (Geotrygon), 771.
rufiventris (Halcyon), 1062.

Digitized by Google

rufiventris (Illadopsis), 336.
*rufiventris* (Laniarius), 491.
rufiventris (Lurocalis), 118.
— (Malacocincla), 333.
— (Mionectes), 237.
*rufiventris* (Myiagra), 283.
rufiventris (Myiotheretes), 225.
— (Pachycephala), 479.
— (Parus), 461.
*rufiventris* (Phaethornis), 1065.
rufiventris (Picumnus), 83.
— (Pitta), 209.
— (Poicephalus), 9.
— (Rhamphocænus), 176.
— (Rhipidura), 279.
— (Ruticilla), 385.
— (Saltator), 645.
— (Sigmodus), 498.
— (Synallaxis), 199.
— (Terpsiphone), 281.
— (Thryophilus), 421.
rufivertex (Dendroeca), 1097.
— (Muscisaxicola), 230.
rufivirgata (Embernagra), 638.
rufo-axillaris (Molothrus), 552.
rufobrunnea (Crateroscelis), 1087.
— (Poliospiza), 599.
rufo-brunneus (Automolus), 194.
rufobuccalis (Eurystomus), 93.
*rufocaligatus* (Spathura), 153.
rufocapilla (Ægialitis), 940.
rufocastanea (Macropygia), 756.
— (Pomarea), 1083.
rufociliata (Troglodytes), 426.
rufocincta (Ægialitis), 940.
— (Passer), 598.
rufo-cinerea (Grallaria), 170.
rufocinerea (Monticola), 393.
rufocinnamomea (Mirafra), 455.
rufodorsalis (Xiphorhynchus), 187.
rufoflavidus (Bradypterus), 350.
rufogastra (Colluricincla), 496, 1104.
rufogularis (Arboricola), 814.
— (Pachycephala), 479.
*rufolateralis* (Monarcha), 290.
rufolateralis (Smithornis), 285.
*rufomaculatus* (Antrostomus), 122.
rufomarginatus (Hapalocercus), 234.
rufomerus (Chrysococcyx), 1056.
rufoniger (Melanopteryx), 567.
rufonuchalis (Lophophanes), 465.
rufo-olivacea (Dendrocincla), 1070.
rufopicta (Lagonosticta), 578.
rufopictus (Pternistes), 811.
rufopileata (Cisticola), 363.
rufopileata (Dendroeca), 433, 1097.
rufopileatum (Pittasoma), 1069.
rufopunctatus (Chrysocolaptes), 80.
rufoscapulatus (Ploceipasser), 569.
rufoschistaceus (Urospizias), 1116.
rufo-superciliatus (Anabazenops), 192.
rufotibialis (Accipiter), 847.
rufotincta (Casuarius), 1051.
rufoviridis (Galbula), 45.
rufula (Argya), 323.
— (Grallaria), 170.
— (Hirundo), 254.
*rufula* (Prinia), 359.
rufulus (Anthus), 447.
— (Thryothorus), 422.
*rufulus* (Troglodytes), 425.
rufulus (Gampsorhynchus), 323.
rufum (Bathmisyrma), 291.
— (Conirostrum), 687.
rufus (Anthus), 448.
— (Antrostomus), 122.
*rufus* (Batara), 184.
rufus (Bathmocercus), 331.
— (Campylopterus), 134.
— (Celeus), 79.
— (Cursorius), 931.
— (Dendrocopus), 185.
— (Enneoctonus), 486.
— (Furnarius), 203.
— (Harporhynchus), 417.
*rufus* (Margarops), 414.
rufus (Neocossyphus), 410.
— (Pachyrhamphus), 212.
— (Philydor), 193.
— (Phylloscopus), 377.
— (Plotus), 1010.
— (Selasphorus), 162.
— (Zeocephus), 280.
rugensis (Metabolus), 271.
*rugillatus* (Dryonastes), 328.
ruki (Zosterops), 713.
rumicivorus (Thinocorus), 780.
rupestris (Chordeiles), 119.
— (Columba), 749.
— (Cotyle), 257.
*rupestris* (Hirundinea), 245.
rupestris (Lagopus), 826.
— (Monticola), 393.
rupicola (Colaptes), 63.
— (Pyrrhura), 13.
*rupicola* (Sitta), 681.
— (Turtur), 759.
rupicoloides (Tinnunculus), 870.
rupicolus (Tinnunculus), 870.
*ruppelli* (Francolinus), 810.



Digitized by Google

ruppelli (Galerida), 457.
— (Gyps), 830.
— (Heterotetrax), 925.
— (Leptoptilus), 907.
— (Plectropterus), 980.
— (Poicephalus), 9.
— (Sylvia), 374.
rupurumi (Phaethornis), 132.
rusbyi (Conopophaga), 1068.
rushiæ (Pholidornis), 357.
rushyi (Conopophaga), 169, 1068.
ruspolii (Dinemellia), 570.
— (Turacus), 89.
*russata* (Bubulcus), 913.
russata (Eriocnemis), 1067.
— (Rhipidura), 278.
russatus (Chlorostilbon), 142.
— (Euscarthmus), 232.
russi (Quelea), 571.
russula (Lusciniola), 371.
*rustica* (Elainea), 240.
rustica (Emberiza), 621.
— (Hirundo), 253.
rusticola (Scolopax), 955.
rusticolus (Hierofalco), 876.
rutenbergi (Butorides), 916.
rutherfordi (Spilornis), 834.
ruticilla (Setophaga), 441.
— (Siptornis), 199.
rutila (Casarca), 989.
— (Emberiza), 622.
— (Phylotoma), 210.
— (Scops), 884.
rutilans (Enneoctonus), 486, 1103.
— (Passer), 598.
— (Synallaxis), 199.
rutilus (Nephœcetes), 129.
*rutilus* (Piaya), 58.
rutilus (Pipilo), 637.
— (Thryothorus), 423.
— (Xenops), 192.
rutledgii (Ploceus), 567, 1107.
ruwensorii (Mesopicus), 1059.
rytirhynchus (Rallus), 961.
sabinei (Bonasa), 823.
— (Chætura), 128.
— (Chaunonotus), 493.
— (Xema), 1020.
sabota (Mirafra), 456.
sabrina (Tanysiptera), 106.
saccharina (Cœreba), 690.
sacer (Halcyon), 108.
— (Hierofalco), 875.
sacerdotis (Ceyx), 112, 1069.
sacra (Ardea), 911.
*sacra* (Todirhamphus), 110.
sagittata (Chthonicola), 366.
— (Scops), 885.
sagittatus (Picumnus), 83.
sagittirostris (Viridonia), 693.
sagræ (Myiarchus), 251.
saharæ (Caprimulgus), 1063.
— (Fringillaria), 624.
— (Œdicnemus), 927.
— (Passer), 598.
— (Scotocerca), 360.
saipanensis (Rhipidura), 277.
saira (Pyranga), 658.
saisseli (Cyanorhamphus), 26.
sajamæ (Siptornis), 1072.
sakalava (Ploceus), 567.
*saker* (Hierofalco), 876.
sala (Alauda), 455.
salaccensis (Brachypteryx), 342.
salangæ (Criniger), 1085.
salangensis (Dicrurus), 530.
salax (Pratincola), 387.
saleyerensis (Cyrtostomus), 703.
salicamans (Chrysomitris), 591.
*salicaria* (Sylvia), 374.
salicicola (Turdus), 402.
salimæ (Dryoscopus), 493.
salinazi (Crecisculus), 971.
*salinazi* (Porzana), 968.
*sallæi* (Chrysotis), 6.
sallæi (Cyrtonyx), 821.
— (Granatellus), 438.
sallei (Florisuga), 134, 1065.
salmoni (Brachygalba), 46.
— (Dacnis), 688.
— (Ostinops), 550.
— (Tigrisoma), 919.
*salomonensis* (Nasiterna), 24.
salomonensis (Ptilopus), 740.
— (Zosterops), 712.
salomonis (Halcyon), 109.
— (Edoliisoma), 299.
— (Phlogœnas), 773.
saltuensis (Amazona), 1053.
salvadoriana (Tanysiptera), 105.
*salvadorii* (Æchmophorus), 1042.
salvadorii (Ægotheles), 116.
*salvadorii* (Argya), 323.
salvadorii (Bradypterus), 1088.
*salvadorii* (Caprimulgus), 123.
salvadorii (Carpophaga), 747.
— (Casuarius), 1050.
— (Cryptospiza), 576.
— (Cyclopsitta), 33.
— (Dicæum), 677.

Digitized by Google

salvadorii (Edoliisoma), 299.
— (Eremomela), 355.
— (Eudynamis), 1057.
— (Gerygone), 268.
— (Galeopsar), 546.
— (Hermotimia), 700.
— (Lorius), 29.
— (Merops), 97.
— (Microglossus), 1, 1053.
— (Nasiterna), 1054.
— (Pachycephala), 479, 1102.
— (Palæornis), 19.
— (Phyllomyias), 238.
— (Pœcilodryas), 272.
— (Ptilopus), 741.
— (Ptilotis), 730.
— (Querquedula), 993.
— (Salpornis), 684.
*salvadorii* (*Sericornis*), 1087.
salvadorii (Sericornis), 1090.
— (Sphecotheres), 528.
— (Spilornis), 534.
— (Stigmatops), 719.
— (Tanygnathus), 18.
*salvadorii* (Vinago), 732.
salvadorii (Zosterops), 707.
salvini (Accipiter), 846.
— (Agyrtria), 1136.
— (Amazilia), 1065.
— (Antrostomus), 122.
— (Basileuterus), 440.
— (Capito), 42.
*salvini* (Certhidea), 689.
salvini (Chlorostilbon), 141.
— (Chrysotis), 5.
— (Colinus), 821.
— (Crypturus), 783.
— (Cyphorhinus), 429.
— (Diomedea), 1039.
— (Empidochanes), 247.
— (Empidonax), 248.
— (Eutoxeres), 133, 1065.
— (Geospiza), 609.
*salvini* (Heliodoxa), 149.
salvini (Mitua), 790.
— (Neomorphus), 61.
— (Ochthœca), 226.
— (Pachyrhamphus), 212, 1073.
— (Pendulinus), 1106.
— (Phœnicothraupis), 657, 1111.
— (Picumnus), 84.
— (Pithys), 1069.
— (Sclerurus), 192.
— (Spindalis), 661.
— (Tinamus), 781.
samarensis (Ceyx), 111, 1062.
— (Chrysocolaptes), 80.
— (Corvus), 504.
— (Hypothymis), 274.
— (Muscicapula), 294.
— (Oriolus), 527.
— (Orthotomus), 361.
— (Penelopides), 102.
— (Prionochilus), 675.
— (Rhinomyias), 282.
— (Sarcophanops), 205.
samoensis (Leptornis), 724.
— (Merula), 395.
— (Phlogœnus), 773.
— (Porphyrio), 976.
samuelis (Melospiza), 633.
sanaka (Melospiza), 1111.
sanblasiana (Cyanolyca), 513.
sancta (Rhipidura), 276.
sanctæ-catharinæ (Scops), 886.
sanctæ-crucis (Zosterops), 712.
sanctæ-helenæ (Ægialitis), 941.
sanctæ-luciæ (Cichlherminia), 403.
— (Myiadectes), 407.
— (Rhamphocinclus), 414.
sanctæ-martæ (Centurus), 1058.
— (Guiraca), 612.
— (Myrmotherula), 1070.
sanctæ-marthæ (Rhamphocœnus), 176, 1069.
sanctihieronymi (Panyptila), 126.
sancti-johannis (Archibuteo), 854.
— (Picus), 72.
sancti-thomæ (Anaplectes), 569.
— (Cœreba), 691.
— (Dendrocolaptes), 185.
sanctorum (Picus), 71.
sanctus (Halcyon), 109.
sandvicensis (Branta), 985.
sandwichensis (Chasiempis), 270.
— (Gallinula), 974.
*sandwichensis* (Œstrelata), 1034.
sandwichensis (Passerculus), 631.
— (Pennula), 969.
sanghirana (Pitta), 208.
sanghirense (Dicæum), 677.
sanghirensis (Ceycopsis), 1062.
— (Chalcophaps), 766.
— (Cittura), 105.
— (Hermotimia), 700.
— (Lamprocorax), 543.
— (Macropygia), 755.
— (Megapodius), 786.
— (Oriolus), 526.
— (Osmotreron), 733.
— (Prionochilus), 675.

Digitized by Google

sanghirensis (Tanygnathus), 18.
sanguinea (Cacatua), 3.
*sanguinea* (Cannabina), 590.
sanguinea (Himatione), 692.
— (Pteroglossus), 43.
— (Rhodopechys), 596.
sanguineus (Eleopicus), 76.
sanguiniceps (Hæmatortyx), 814.
sanguinipectus (Æthopyga), 696.
sanguinirostris (Quelea), 571.
sanguinolenta (Myzomela), 715.
— (Philogothraupis), 659.
— (Pyranga), 659.
— (Rallus), 961.
— (Rupicola), 215.
— (Uragus), 608.
sanguinolentum (Dicæum), 677.
sanguinolentus (Analcipus), 528.
— (Eleopicus), 75.
sannio (Dryonastes), 328.
santacruzi (Centurus), 69.
santæcrucis (Melospiza), 1110.
santaritæ (Psaltriparus), 466, 1101.
sapphira (Muscicapula), 294.
sapphirina (Hylocharis), 140.
— (Osculatia), 770.
sapphiropygia (Eriocnemis), 154.
*sappho* (Lesbia), 158.
saracura (Aramides), 964.
sarasinorum (Acanthopneuste), 377.
— (Myza), 724.
— (Zosterops), 707.
saravacensis (Philentoma), 281.
sarawacensis (Parus), 461.
sardus (Melizophilus), 375.
sartorii (Hæmophila), 634.
— (Syrnium), 891.
*sasak* (Pelargopsis), 1062.
sasakensis (Carpophaga), 746.
satelles (Glycyphila), 717.
satrapa (Regulus), 379.
satscheunensis (Phasianus), 802.
saturala (Æthopyga), 695.
— (Amazilia), 1066.
— (Ammomanes), 459.
— (Argya), 323.
— (Arremon), 647.
— (Brachypteryx), 342.
— (Bubo), 881.
— (Butorides), 916.
— (Campophaga), 300.
— (Euphonia), 673.
— (Formicarius), 172.
— (Heterocnemis), 175.
— (Hypotænidia), 962.
saturata (Leptoptila), 769.
— (Lioptila), 413.
— (Momotus), 94.
— (Nuttallornis), 1078.
— (Passer), 597.
— (Phlogopsis), 172.
— (Phrygilus), 640.
— (Pyrocephalus), 1077.
— (Rallus), 960.
— (Rupornis), 859.
— (Scolopax), 955.
— (Tinnunculus), 870.
— (Turdus), 400.
— (Turnix), 779.
— (Turtur), 759.
— (Xiphocolaptes), 188.
saturatia (Edoliisoma), 1084.
saturatior (Aphantochroa), 1065.
— (Chalcomitra), 701.
— (Colaptes), 1057.
— (Gampsorhynchus), 1086.
— (Halcyon), 107.
— (Nigrita), 1108.
— (Picolaptes), 188.
— (Pterocles), 777.
— (Upocerthia), 1073.
saturatus (Antrostomus), 122.
— (Cuculus), 51.
— (Platyrhynchus), 231.
— (Poicephalus), 1053.
*saturatus* (Scops), 886.
saturninus (Mimus), 416.
— (Thamnophilus), 184.
satyra (Tragopan), 797.
*saucerottii* (Saucerottea), 137.
saulæ (Lafresnaya), 151.
saularis (Copsychus), 411.
sauli (Rhipidura), 280.
saundersi (Larus), 1021.
— (Sterna), 1017.
saurophaga (Halcyon), 108.
savanna (Passerculus), 631.
savannarum (Ammodromus), 632.
savatieri (Coccopygia), 580.
savesi (Aegotheles), 116.
savignii (Hirundo), 253.
*savignii* (Merops), 97.
*savorgnani* (Centropus), 56.
saxatilis (Caccabis), 806.
— (Monticola), 392.
saxicolina (Geositta), 204.
*saxicolina* (Monachella), 271.
saya (Sayornis), 227.
sayaca (Tanagra), 662.
saypani (Zosterops), 711.

Digitized by Google

scalaris (Œstrelata), 1035.
— (Picus), 71.
scandens (Climacteris), 684.
— (Geospiza), 609.
— (Xenocichla), 309, 1085.
scandiaca (Nyctea), 894.
scandulaca (Certhia), 683.
scapularis (Ægithina), 341.
*scapularis* (Butorides), 916.
scapularis (Geophlœus), 82.
— (Pitylus), 643.
scapulata (Hermotimia), 700.
— (Scops), 883.
— (Thalurania), 143.
*scapulatus* (Chalcomitra), 701.
scapulatus (Corvus), 503.
schach (Lanius), 485.
schalowi (Lanius), 484, 1103.
— (Rhinopomastus), 1061.
— (Saxicola), 388.
— (Turacus), 89.
— (Vinago), 732.
scheepmakeri (Goura), 775, 1115.
schillingsi (Hyphantornis), 1107.
— (Pseudogyps), 1116.
schimperi (Columba), 749.
schistacea (Apalis), 353.
*schistacea* (Ardea), 911.
schistacea (Geocichla), 405.
— (Hypocnemis), 173.
— (Leucopternis), 860.
— (Melænornis), 287.
— (Melanorhectes), 495.
— (Meliornis), 723.
— (Mimocichla), 394.
— (Nigrita), 575.
— (Passerella), 635.
— (Rhodinocichla), 418.
schistaceiceps (Dicæum), 678.
— (Todirostrum), 232.
schistaceigula (Polioptila), 380.
schistaceigularis (Cacomantis), 1056.
schistaceus (Dysithamnus), 180.
— (Graucalus), 297.
— (Henicurus), 449.
— (Pipilopsis), 649.
— (Spermophilopsis), 614.
schisticeps (Cryptolopha), 286.
— (Edoliisoma), 299.
— (Palæornis), 19.
— (Pomatorhinus), 325.
— (Ruticilla), 386.
schistisaga (Larus), 1024.
schlegeli (Arremon), 647.
— (Caprimulgus), 123, 1063.
schlegeli (Catarrhactes), 1048.
— (Francolinus), 808.
— (Hypargus), 579.
— (Merula), 398.
— (Pachycephala), 477.
— (Philepitta), 210.
— (Platysmurus), 509.
schleiermacheri (Polyplectron), 796.
*schliephacki* (Docimastes), 152.
schmackeri (Garrulax), 327.
*schmackeri* (Iole), 312.
schmidti (Amazona), 1053.
schmitzi (Motacilla), 1098.
— (Strix), 899.
schoana (Malaconotus), 1104.
schœniclus (Emberiza), 621.
*schœnicola* (Cisticola), 364.
schœnobænus (Acrocephalus), 369.
— (Phleocryptes), 201.
schoensis (Dendropicus), 74.
schomburgki (Hydropsalis), 120.
— (Thyrorhina), 970.
schranki (Calliste), 665.
schreibersi (Iolæma), 150.
*schrenkii* (Butorides), 916.
schuetti (Francolinus), 810.
— (Turacus), 89.
schulzi (Cinclus), 419.
— (Dryocopus), 83.
schwaneri (Cryptolopha), 286.
— (Eucichla), 209.
schwarzi (Lusciniola), 371.
schwebischi (Elminia), 281.
scintillans (Phasianus), 802.
scintilla (Selasphorus), 162.
scintillatus (Chalcopsitta), 28.
scintilliceps (Yungipicus), 74.
scioana (Plectropterus), 980.
— (Pyromelana), 572.
— (Textor), 569.
scirpicola (Geothlypis), 1097.
scita (Stenostira), 273.
scitilus (Aithurus), 1066.
scitula (Basileuterus), 1098.
sclateri (Agelæus), 553.
— (Anæretes), 236.
— (Apalis), 1089.
— (Attila), 214.
— (Automolus), 195.
— (Calliste), 666.
— (Casuarius), 1050.
— (Catarrhactes), 1048.
— (Chætura), 128.
— (Chasiempis), 270.
— (Chrysomitris), 591.

Digitized by Google

*sclateri* (Crax), 789.
sclateri (Cyanocorax), 514.
— (Doliornis), 217.
— (Euphonia), 672.
— (Goura), 775, 1115.
— (Graucalus), 296.
— (Guttera), 805.
— (Hirundinea), 244.
— (Hirundo), 255.
— (Hylophilus), 474.
— (Icterus), 558.
— (Lophophorus), 798.
— (Loriculus), 23.
— (Loxigilla), 613.
— (Myiarchus), 251.
— (Myzomela), 716.
— (Ornithion), 238, 1076.
— (Parus), 463.
— (Penelope), 791.
— (Philemon), 726.
— (Phyllomyias), 1076.
— (Picumnus), 83.
— (Pipreola), 216.
*sclateri* (Plectropterus), 980.
sclateri (Polioptila), 380, 1091.
— (Psittacula), 15.
— (Tanagra), 661.
— (Thryothorus), 423.
— (Thripophaga), 195.
— (Todirostrum), 231.
— (Xiphocolaptes), 188, 1071.
sclateriana (Amatocichla), 406.
scolopacea (Barbatula), 38.
*scolopacea* (Heterotetrax), 925.
scolopaceus (Aramus), 920.
scolopax (Crypturus), 783.
— (Œdicnemus), 927.
scopifrons (Sigmodus), 498.
scopulinus (Larus), 1023.
scoresbyi (Leucophæus), 1026.
scotæa (Nyctala), 1117.
scoticus (Lagopus), 826.
scotops (Eremomela), 356.
— (Serinus), 600.
scotti (Hæmophila), 635.
— (Rallus), 960.
— (Zosterops), 710.
scouleri (Henicurus), 450.
scratchleyana (Munia), 587.
scripta (Geophaps), 767.
scriptoricauda (Campothera), 66.
scriptus (Elanus), 864.
scrutator (Thripadectes), 193.
scullii (Hirundo), 254.
*scutata* (Rhinoplax), 99.
scutata (Spermestes), 576.
— (Synallaxis), 198.
scutatus (Malimbus), 568.
— (Pyroderus), 218.
scutopartita (Malimbus), 568.
scutulata (Asarcornis), 981.
— (Ninox), 887.
secretarius (Serpentarius), 827.
secunda (Mirafra), 456.
seducta (Centurus), 1058.
seebohmi (Calandrella), 453.
— (Cettia), 372.
— (Dromæocercus), 348.
— (Lanius), 483.
— (Luscinioia), 371.
— (Merula), 397.
— (Pipilopsis), 649.
— (Rhinoptilus), 931.
— (Saxicola), 389.
— (Yungipicus), 74.
*seena* (Seena), 1014.
seflata (Parotia), 522.
*segetum* (Anser), 983.
segmentata (Macropsalis), 120.
seheriæ (Æthopyga), 695.
sejuncta (Culicicapa), 282.
seloputo (Syrnium), 891.
*selysii* (Eleopicus), 76.
semenowi (Saxicola), 1092.
— (Scops), 1117.
semiatra (Pomareopsis), 291, 1083.
— (Sayornis), 1075.
semibadius (Thryophilus), 422.
semibrunneus (Hylophilus), 474.
semicæruleus (Halcyon), 107, 1062.
semicervinus (Basileuterus), 440.
semicinerea (Dysithamnus), 180.
— (Synallaxis), 198.
semicinereus (Hylophilus), 474.
semicinnamomeus (Celeus), 80.
semicollaris (Chætura), 127.
— (Rhipidura), 278.
— (Rhynchæa), 956.
semicoronatus (Yungipicus), 74.
semifasciata (Lophoceros), 103.
— (Tityra), 211.
*semiflava* (Capsiempis), 237.
semiflava (Elainea), 240.
— (Geothlypis), 437.
— (Zosterops), 709.
semiflavus (Tyrannulus), 239.
semifusca (Myiopatis), 233, 1076.
*semifusca* (Sublegatus), 241.
semifuscus (Chlorospingus), 651.
semigaleatus (Hydrocorax), 100.

Digitized by Google

semilarvata (Eos), 28.
semilarvatus (Melanoparus), 460.
*semipagana* (Elaïnea), 239.
semipalmata (Anseranas), 979.
semipalmatus (Ægialeus), 939.
semipartitus (Bradyornis), 287.
— (Empidornis), 1082.
semiplumbea (Leucopternis), 860.
semiplumbeus (Rallus), 960.
semirubra (Rhipidura), 277.
*semirufa* (Ardeola), 913.
semirufa (Cossypha), 409.
— (Hirundo), 255.
— (Ruticilla), 385.
— (Thamnolæa), 392.
semirufus (Myiarchus), 251.
— (Pipilopsis), 649.
semischistaceus (Mionectes), 237.
semistriata (Uroloncha), 586.
semitorquata (Alcedo), 112.
— (Alæmon), 451.
— (Garrulax), 327.
— (Phasianus), 802.
— (Rhamphocænus), 176.
semitorquatus (Arremon), 647.
— (Barnardius), 25.
— (Lurocalis), 118.
— (Poliohierax), 868.
— (Turtur), 760.
semitorques (Scops), 884.
— (Spizixus), 304.
*semperi* (Cichlherminia), 403.
semperi (Leucopeza), 430.
— (Zosterops), 710.
senegala (Lagonosticta), 577.
senegalensis (Batis), 265.
— (Bradyornis), 287.
— (Centropus), 57.
— (Chalcomitra), 701.
— (Coracias), 1060.
— (Ephippiorhynchus), 907.
— (Galerida), 458.
— (Halcyon), 107.
— (Hirundo), 255.
— (Œdienemus), 928.
— (Otis), 926.
— (Podica), 978.
*senegalensis* (Scops), 882.
— (Sterna), 1015.
senegalensis (Terpsiphone), 280.
— (Textor), 569.
— (Turtur), 761.
— (Zosterops), 708.
senegalus (Lobivanellus), 934.
— (Phyllostrophus), 314.
senegalus (Poicephalus), 9.
— (Pteroclurus), 777.
— (Telephonus), 488.
senex (Acredula), 467.
— (Euscarthmus), 233.
— (Gymnocorax), 505.
— (Megapodius), 787.
— (Nephœcetes), 129.
— (Platyrhynchus), 231.
— (Pogonorhynchus), 36.
— (Sturnornis), 536.
senicula (Pipilo), 637.
senilis (Pionus), 7.
— (Scytalopus), 166.
seniloides (Pionus), 7.
sennaarensis (Saxicola), 390.
sennetti (Ammodromus), 631.
— (Buteo), 857.
— (Harporhynchus), 417.
— (Pendulinus), 1106.
separata (Carpophaga), 744.
sephæna (Francolinus), 808.
sepiaria (Malacocincla), 333.
— (Rallina), 966.
sepium (Orthotomus), 362.
septemstriata (Fringillaria), 624.
septentrionalis (Ceryle), 115.
— (Colymbus), 1039.
— (Edoliisoma), 299.
— (Geospiza), 609.
— (Megaloprepia), 742.
— (Metallura), 156.
— (Nestor), 1054.
— (Parus), 463.
— (Phasianus), 801.
— (Stoparola), 291.
— (Tetrastes), 823.
— (Trichoglossus), 1055.
septimus (Batrachostomus), 116.
serena (Erythrura), 583.
— (Pipra), 221.
sericea (Loboparadisea), 524.
— (Meliornis), 723.
sericeocaudatus (Antrostomus), 122.
sericeus (Monarcha), 290.
— (Spodiopsar), 535.
serina (Xenocichla), 310, 1085.
serrana (Merula), 395.
*serrana* (Upucerthia), 203.
serranus (Larus), 1022.
serrator (Merganser), 1003.
— (Sula), 1011.
serratus (Coccystes), 50.
*serresiana* (Catarrhactes), 1048.
serriana (Coua), 60.

Digitized by Google

serripennis (Stelgidopteryx), 260.
serrirostris (Anser), 983.
— (Euphonia), 672.
— (Petasophora), 144.
serva (Pyriglena), 176.
setaria (Leptasthenura), 201.
*setarius* (Pteroclurus), 776.
— (Prioniturus), 17.
setosa (Rhipidura), 279.
severa (Ara), 10.
severus (Hypotriorchis), 873.
— (Thamnophilus), 184.
severtzovi (Carpodacus), 603.
severtzowi (Tetrastes), 823.
*sexpennis* (Parotia), 522.
seychellarum (Copsychus), 411.
— (Foudia), 566.
seychellensis (Bebrornis), 349.
sgansini (Alectrœnas), 742.
sharpei (Accipiter), 1116.
— (Apalis), 353.
— (Argya), 1086.
— (Bradyornis), 288.
— (Caprimulgus), 1063.
— (Ceryle), 115.
— (Cœreba), 1112.
— (Coracias), 1061.
— (Corvus), 502, 1105.
— (Creciscus), 971.
— (Crateropus), 329.
— (Dendropicus), 73.
— (Dicrurus), 530.
— (Francolinus), 810.
— (Gecinus), 63.
— (Gennæus), 800.
— (Grus), 922.
— (Lalage), 303.
— (Melittophagus), 1061.
— (Munia), 587.
— (Myopornis), 1083.
— (Myzomela), 716.
— (Pachycephala), 478.
— (Pelecanus), 1005.
— (Pholidauges), 541.
— (Pholidophalus), 101.
— (Phonipara), 618.
— (Pseudochloris), 639.
— (Pseudocossyphus), 410.
— (Pulsatrix), 1117.
*sharpei* (Rhipidura), 276.
sharpei (Serinus), 1109.
— (Sitagra), 564.
— (Smithornis), 1082.
— (Stictolimnas), 967.
— (Terenura), 1069.
sharpei (Trochalopteron), 1086.
— (Turacus), 89.
— (Turturœna), 753.
— (Urospizias), 843.
— (Zosterops), 710.
*sharpii* (Ceyx), 111.
— (Phyllostrophus), 314.
shawi (Phasianus), 802.
*shebæ* (Urospizias), 842.
shelleyi (Æthopyga), 696.
— (Capito), 1056.
*shelleyi* (Caprimulgus), 123.
shelleyi (Cinnyris), 698.
*shelleyi* (Cotyle), 257.
shelleyi (Cryptospiza), 1108.
— (Cypselus), 1064.
— (Francolinus), 809.
— (Huhua), 882.
— (Hyphantornis), 562.
— (Nesocharis), 1108.
— (Notauges), 548.
— (Passer), 598.
*shelleyi* (Thamnolæa), 392.
shelleyi (Trachyphonus), 40.
— (Turtur), 760.
— (Xenocichla), 1085.
shorii (Tiga), 78.
sialis (Sialia), 386.
siamensis (Zosterops), 708.
siaoensis (Scops), 884.
sibbensis (Alophius), 103, 1062.
sibila (Colluricincla), 496
sibilans (Aedon), 382.
— (Coracopsis), 4.
— (Myiadectes), 407.
sibilator (Sirystes), 243.
sibilatrix (Mareca), 992.
— (Phacelodomus), 196.
— (Phylloscopus), 377.
— (Syrigma), 917.
sibirica (Bubo), 880.
— (Butalis), 1079.
— (Geocichla), 405.
— (Hemichelidon), 262, 1079.
— (Lanius), 483.
— (Melanocorypha), 452.
— (Otocorys), 451.
*sibiricus* (Lanius), 1102.
sibiricus (Uragus), 608.
sibisibina (Ptilotis), 721.
sibutuense (Dicæum), 679.
sibutuensis (Scops), 884.
sibuyanicum (Dicæum), 678.
sicula (Acredula), 1101.
sieboldi (Sphenocercus), 731.

Digitized by Google

siemiradzkii (Chrysomitris), 592.
sifanica (Perdix), 812.
sigillata (Pœcilodryas), 272.
sigillifer (Lobospingus), 584.
signata (Aëdonopsis), 412.
— (Pyrrhulauda), 460.
signatum (Todirostrum), 231.
signatus (Chlorospingus), 650.
— (Ochthodiæta), 225.
siju (Glaucidium), 896.
silens (Arremon), 646.
— (Bradyornis), 287.
silvestris (Buceros), 100.
simalurensis (Macropygia), 1114.
simensis (Psophocichla), 406.
similis (Chloropeta), 274.
— (Cosmophoneus), 490.
— (Myiozetetes), 241.
— (Pachyrhamphus), 212.
— (Petroeca), 267.
*similis* (Ptilotis), 720.
similis (Saltator), 645.
— (Trochalopteron), 321.
simillima (Merula), 396.
— (Pitta), 208.
— (Sibia), 324.
*simoni* (Dendropicus), 1058.
— (Heliangelus), 155.
simonsi (Buarremon), 1111.
*simplex* (Adelomyia), 154.
simplex (Anthreptes), 704.
— (Cænotriccus), 1075.
— (Calamonastes), 352.
— (Cisticola), 365.
— (Chloronerpes), 65.
— (Crypturus), 783.
— (Geoffroyus), 17.
— (Gerygone), 268.
— (Grallaria), 170.
— (Haplopelia), 768.
*simplex* (Heterocnemis), 175.
simplex (Lædorusa), 306.
— (Lipaugus), 213.
— (Myzomela), 716.
— (Pachycephala), 480.
— (Passer), 598.
— (Pipilopsis), 649.
*simplex* (Poicephalus), 9.
simplex (Serinus), 1109.
— (Spermophila), 615.
— (Stactolæma), 38.
— (Thamnophilus), 183.
— (Xenocichla), 310.
— (Zosterops), 707.
simpliciceps (Xhiphocolaptes), 188.
simus (Cacomantis), 52.
sinaiticus (Carpodacus), 603.
sinaloa (Hæmophila), 634.
— (Thryophilus), 422.
sinaloæ (Embernagra), 638.
— (Progne), 259.
sincipitalis (Ostinops), 550.
sindianus (Phylloscopus), 378.
sinensis (Ardetta), 914.
— (Blythipicus), 77.
— (Brachypteryx), 342.
*sinensis* (Bubo), 881.
sinensis (Centropus), 56.
— (Cissa), 508.
— (Cotyle), 257.
— (Cryptolopha), 286.
— (Dendrocitta), 508.
— (Garrulus), 510.
— (Gracula), 539.
— (Henicurus), 449.
— (Horornis), 372.
— (Ibis), 901.
— (Ithagenes), 797.
— (Merula), 395.
*sinensis* (Munia), 588.
sinensis (Pachycephalixus), 306.
*sinensis* (Phalacrocorax), 1008.
sinensis (Pyctorhis), 340.
— (Sterna), 1017.
— (Sturnia), 537.
*sinensis* (Syrnium), 891.
sinensis (Sitta), 680.
singalensis (Anthreptes), 704.
singularis (Siptornis), 200, 1072.
— (Xenerpestes), 1072.
sinicus (Ligurinus), 610.
sinuata (Emarginata), 391.
— (Pyrrhuloxia), 619.
sinuosa (Geothlypis), 1097.
sipahi (Carpodacus), 602.
siparaja (Æthopyga), 696.
siquijorensis (Iole), 312.
— (Loriculus), 23.
— (Zosterops), 707.
sirkee (Taccocua), 58.
sitticolor (Conirostrum), 686.
sittoides (Diglossa), 685.
*sivalensis* (Palæornis), 18.
sjœstedti (Columba), 750.
— (Glaucidium), 897.
*skorniakovi* (Anser), 983.
skua (Megalestris), 1027.
*sladeni* (Phasianus), 802.
slevini (Turdus), 1094.
sloetii (Campochæra), 299.



Digitized by Google

smaragdina (Cyanolesbia), 157.
smaragdinea (Timolia), 143.
smaragdineus (Chrysococcyx), 52.
*smaragdinicauda* (Cyanolesbia), 157.
smaragdinicollis (Metallura), 156.
smaragdinipectus (Eriocnemis), 153.
*smaragdinus* (Coriphilus), 30.
— (Microsittace), 13.
smaragdinus (Porphyrio), 976.
*smaragnotus* (Porphyrio), 975.
smithi (Dryodromas), 354.
— (Geophaps), 767.
— (Pyrrhulauda), 460.
— (Zosterops), 1113.
smithii (Campothera), 66.
— (Crateropus), 330.
— (Hirundo), 254.
— (Lanius), 485.
*smithii* (Spatula), 995.
smithii (Terpsiphone), 1081.
smithsoniana (Larus), 1095.
smithsonianus (Ptilopus), 737.
smyrnensis (Halcyon), 107.
snowi (Uria), 1044.
sociabilis (Pluvianellus), 941.
— (Rosthramus), 864.
socialis (Burnesia), 360.
— (Spizella), 630.
socius (Philæterus), 575.
socorroensis (Buteo), 856.
— (Columbigallina), 764.
*socorroensis* (Micropallas), 898.
socorroensis (Oceanodroma), 1029.
socotrana (Fringillaria), 624.
— (Scops), 882.
socotranus (Rhynchostruthus), 596.
soderstromi (Heliangelus), 1067.
soemmeringi (Phasianus), 802.
*sogdianensis* (Hypolais), 373.
solanderi (Œstrelata), 1034.
*solandri* (Calyptorhynchus), 2.
solaris (Cyrtostomus), 703.
— (Pericrocotus), 301.
solitaria (Agriornis), 225.
— (Anthipes), 294.
— (Ceyx), 112.
— (Gallinago), 954.
— (Harpyhaliaëtus), 861.
— (Myiodynastes), 243.
— (Monticola), 393.
solitarius (Amblycercus), 551.
— (Buteo), 856.
— (Corvus), 504.
— (Cuculus), 51.
— (Myiadectes), 406.
solitarius (Phigys), 30.
— (Tinamus), 781.
— (Totanus), 947.
— (Vireo), 472.
sollicitans (Dicæum), 1112.
soloensis (Astur), 841.
solokensis (Scops), 885.
solomonensis (Eclectus), 1054.
— (Eurystomus), 93.
*solomonensis* (Lamprocorax), 542.
solomonensis (Pseudoptynx), 1116.
solomonis (Ninox), 889.
solstitialis (Conurus), 11.
— (Spathura), 153.
— (Troglodytes), 426.
somalensis (Cursorius), 931.
— (Upupa), 99.
somalica (Burnesia), 360.
— (Calandrella), 453.
— (Cisticola), 364.
— (Pteroclurus), 777.
— (Saxicola), 389, 1099.
somaliensis (Alophius), 104.
— (Irrisor), 1061.
— (Lagonosticta), 578.
— (Numida), 805.
somersii (Cardinalis), 1110.
somervillei (Crateropus), 330.
songarus (Parus), 463.
sonitans (Burnesia), 359.
sonnerati (Cuculus), 51.
— (Gallus), 803.
*sonnerati* (Ninox), 889.
sonnini (Eupsychortyx), 820.
sonora (Ptilotis), 721.
sonorana (Dendroeca), 433.
sonoriensis (Agelæus), 553.
sonorivox (Bambusicola), 817.
sophiæ (Calospiza), 1119.
— (Leptopœcile), 379.
— (Saucerottea), 137, 1065.
*sordida* (*Erythrosterna*), 292.
sordida (Helminthophaga), 431.
— (Phæoptila), 139.
— (Philemon), 726.
— (Pinarochroa), 388.
— (Siptornis), 200.
— (Siva), 347.
— (Stoparola), 292.
— (Thlypopsis), 653.
— (Vireo), 473.
sordidior (Siva), 1088.
sordidus (Anthus), 446.
— (Artamus), 534.
— (Cinclus), 419.

Digitized by Google

sordidus (Criniger), 1095.
— (Halcyon), 109.
— (Hemicercus), 81.
*sordidus* (Pericrocotus), 302.
sordidus (Pionus), 6.
sorgophilus (Acrocephalus), 370.
soror (Hydrornis), 207.
— (Minla), 344.
— (Pachycephala), 477.
— (Penthetria), 574.
sororcula (Pachycephala), 478.
— (Strix), 900.
sororia (Dendrornis), 1071.
— (Elaïnea), 241.
— (Grallaria), 1069.
— (Hæmophila), 635.
*sororia* (Lochmias), 202.
sororia (Myrmotherula), 179.
sororius (Sphenocercus), 731.
souancei (Pyrrhura), 13.
soudanensis (Pytelia), 578.
soui (Crypturus), 782.
souimanga (Cinnyris), 698.
souleyeti (Picolaptes), 187.
souliei (Actinodura), 331.
— (Spelæornis), 426.
soulliei (Cinclus), 419.
soumagnei (Heliodilus), 898.
souzæ (Lanius), 484.
sowerbyi (Stactolæma), 38.
spadicea (Galloperdix), 817.
— (Hemiphaga), 748.
— (Zenaida), 757.
spadiceus (Attila), 214.
spaldingi (Orthonyx), 729.
sparganura (Lesbia), 158.
sparmanni (Indicator), 34.
sparsa (Anas), 991.
sparsimfasciata (Astur), 841.
sparsimguttata (Nigrita), 575.
sparverioides (Hierococcyx), 50.
— (Tinnunculus), 872.
sparverius (Tinnunculus), 871.
spatiator (Grallaria), 170.
spatulata (Coracias), 92.
*spatzi* (Alcedo), 1062.
spatzi (Caccabis), 807.
— (Pratincola), 1092.
speciosa (Ardeola), 913.
— (Columba), 750.
— (Dacnis), 688.
— (Dasycrotopha), 338.
— (Formicivora), 177, 1070.
— (Geothlypis), 437.
— (Parula), 1096.
speciosa (Xanthoura), 1105.
speciosus (Falcinellus), 520.
— (Heliangelus), 155.
— (Hoplopterus), 935.
— (Odontophorus), 842.
— (Pericrocotus), 301.
— (Ptilopus), 740.
spectabilis (Arremon), 647.
— (Celeus), 79.
— (Dryotriorchis), 835.
— (Elaïnea), 239.
— (Eugenes), 148.
— (Munia), 587.
— (Selenidera), 44.
— (Somateria), 1000.
specularis (Anas), 991.
speculifera (Diuca), 642.
speculiferus (Nesospingus), 647.
speculigera (Conothraupis), 646.
— (Enneoctonus), 486, 1103.
— (Muscicapa), 1079.
spekii (Hyphantornis), 562.
spelunceæ (Scytalopus), 166.
spencei (Heliangelus), 155.
spengeli (Psittacula), 15.
sperata (Leptocoma), 700.
*sperlingi* (Macrodipteryx), 120.
sphenocercus (Lanius), 483.
sphenura (Astur), 840.
*sphenura* (Tardivola), 639.
sphenura (Vidua), 574.
sphenurus (Haliastur), 862.
*sphenurus* (Puffinus), 1031.
sphenurus (Sphenocercus), 731.
sphinx (Spizaëtus), 849.
spicifer (Lophotriccus), 233.
*spiciferus* (Pavo), 795.
spilocephala (Ninox), 888.
— (Scops), 883.
*spilocephalus* (Scops), 885.
spilodera (Æthomyias), 274.
— (Petrochelidon), 258.
— (Rhipidura), 276.
spilogaster (Eleopicus), 76.
— (Eutolmaëtus), 850.
spilogastra (Athene), 895.
— (Francolinus), 808.
— (Ptilolis), 721.
spilolæmus (Francolinus), 808.
spilonota (Ciccaba), 893.
— (Machlolophus), 464.
— (Ninox), 888.
— (Salpornis), 684.
spilonotus (Circus), 837.
— (Creciscus), 971.

Digitized by Google

spilonotus (Hyphantornis), 562.
spilopterа (Geocichla), 404.
— (Porzana), 968.
— (Saroglossa), 540.
spilopterus (Centropus), 55.
spilorhyncha (Andigena), 43.
spilorrhoa (Myristicivora), 747.
spilothorax (Circus), 837.
spilura (Thryomanes), 424.
spinescens (Chrysomitris), 591.
spinicauda (Chætura), 128.
— (Dafila), 994.
— (Orthonyx), 729.
— (Oxyurus), 201.
— (Pachycephala), 481.
spinicollis (Ibis), 901.
spinoletta (Anthus), 447.
spinoides (Chrysomitris), 591.
spinosus (Hoplopterus), 935.
spinus (Chrysomitris), 592.
spixi (Anodorhynchus), 10.
— (Dendrornis), 190.
— (Synallaxis), 197.
spiza (Chlorophanes), 689.
splendens (Campophilus), 81.
— (Corvus), 503.
— (Heliodoxa), 150.
— (Malurus), 367.
— (Pyrrhulopsis), 21.
*splendens* (Vidua), 574.
splendens (Volatinia), 619.
splendida (Euphema), 26.
— (Myzomela), 715.
splendidissima (Astrapia), 519.
splendidum (Dicæum), 677.
*splendidus* (Chloroctilbon), 141.
splendidus (Cinnyris), 697.
— (Lamprocolius), 546.
— (Platycercus), 24.
spleniata (Tephrocorys), 454.
spodocephalus (Mesopicus), 77.
spodiogastra (Butorides), 916.
— (Myrmeciza), 175.
spodiogenys (Fringilla), 589.
spodiolæma (Turdus), 402.
spodionota (Myrmotherula), 179.
— (Ochthœca), 226.
spodionotus (Dysithamnus), 180.
— (Pipilopsis), 649.
spodiops (Euscarthmus), 1075.
spodioptila (Terenura), 177.
*spodiopygia* (Collocalia), 129.
spodiostetha (Attila), 214.
spodiostethus (Odontophorus), 822.
spodiurus (Pachyrhamphus), 212.
spodocephala (Eucometis), 655.
— (Emberiza), 622.
spodocephalus (Mesopicus), 77, 1059.
sponsa (Æx), 982.
spraguei (Neocorys), 448.
spurius (Pendulinus), 556.
— (Porphyrocephalus), 25.
*squalida* (Pachycephala), 479.
squalidus (Phaethornis), 132.
— (Prionochilus), 675.
squamata (Acanthiza), 366.
— (Callipepla), 818.
— (Claudia), 127.
— (Formicivora), 178.
— (Ixidia), 308.
— (Ortalida), 792.
— (Ptilochloris), 223.
— (Rhipidura), 277.
— (Stigmatops), 719.
squamatum (Trochalopteron), 321.
squamatus (Capito), 41.
— (Francolinus), 810.
— (Gecinus), 64.
— (Merganser), 1003.
— (Picolaptes), 187.
— (Turdinulus), 1087.
squamiceps (Argya), 323.
— (Horornis), 373.
— (Hypsipetes), 316.
— (Pseudozosterops), 713.
squamicollis (Urolonchа), 586.
squamicristatus (Lophotriccus), 233.
squamifrons (Sporopipes), 570.
— (Zosterops), 712.
squamigera (Geobiastes), 92.
— (Grallaria), 171.
— (Margarornis), 191.
squamipila (Ninox), 889.
squamosa (Columba), 750.
— (Myrmeciza), 174.
— (Scardafella), 762.
squamosus (Heliomaster), 160.
squamulata (Ciccaba), 893.
squamulatus (Crateropus), 330.
— (Microcerculus), 430.
— (Monarcha), 290.
— (Picumnus), 84.
stagnatilis (Butorides), 916.
— (Totanus), 947.
stairi (Phlogœnas), 773.
stampflii (Sylviella), 355.
stanleyi (Chalcostigma), 156.
stapazina (Saxicola), 390.
starki (Malaconotus), 489.
stavorini (Chalcopsitta), 28.

Digitized by Google

steerei (Ceyx), 112.
— (Oriolus), 527.
— (Pitta), 208.
steerii (Capito), 41.
— (Centropus), 55.
— (Liocichla), 347.
— (Sarcophanops), 205.
steindachneri (Anthus), 448.
— (Picumnus), 83.
stejnegeri (Anthus), 447.
— (Chlorodrepanis), 692.
— (Chrysomitris), 592.
*stejnegeri* (Hemignathus), 693.
stejnegeri (Oedemia), 999.
— (Parus), 1100.
— (Spindalis), 661, 1111.
— (Zosterops), 707.
stellæ (Charmosyna), 32.
— (Picumnus), 1059.
stellaris (Botaurus), 918.
— (Cistothorus), 425.
— (Thamnophilus), 183.
stellata (Brachypteryx), 342.
— (Calyptorhynchus), 2.
— (Ceryle), 115.
— (Hypocnemis), 174.
— (Margarornis), 191.
stellatus (Batrachostomus), 117.
— (Caprimulgus), 1063.
— (Myiobius), 245.
— (Odontophorus), 822.
— (Tarsiger), 384.
stelleri (Cyanocitta), 511.
— (Somateria), 1000.
stenocricota (Zosterops), 710.
*stenopterus* (Chordeiles), 119.
stenorhynchum (Heteropelma), 223.
stenorhynchus (Pomatorhinus), 326.
stenozona (Baza), 867.
stentoreus (Acrocephalus), 368.
stenura (Culicivora), 235.
— (Gallinago), 952.
— (Zenaida), 758.
stenurus (Chlorostilbon), 142.
stephani (Chalcophaps), 766.
— (Graucalus), 295.
stephaniæ (Astrapia), 520.
stephanophorus (Heterhyphantes), 565.
*stephensi* (Passerella), 635.
stephensi (Vireo), 473.
sterea (Guiraca), 1110.
*stevensoni* (Accipiter), 847.
stewartæ (Anthoscenus), 1068.
stewarti (Emberiza), 623.
— (Phalacrocorax), 1009.
stictifrons (Sycobrotus), 565.
stictilæma (Chætura), 128.
— (Crateropus), 1086.
— (Tricholæma), 36, 1055.
stictipennis (Ceryle), 115.
stictithorax (Indicator), 34.
stictocephala (Dubusia), 663.
stictocephalus (Pycnopygius), 728.
— (Thamnophilus), 1070.
stictocorypha (Formicivora), 178.
stictolæmus (Halcyon), 108.
— (Sittasomus), 191.
stictolophus (Lophornis), 165.
stictonota (Margarornis), 1071.
— (Scops), 883.
stictoptera (Ceryle), 115.
— (Myrmeciza), 174.
— (Rhopoterpe), 172.
— (Urochroma), 8.
stictopterus (Mecocerculus), 227.
*stictoptilus* (Automolus), 194.
stictothorax (Eucometis), 655.
— (Synallaxis), 198.
stictura (Herpsilochmus), 178.
— (Laniarius), 491.
sticturus (Thamnophilus), 183.
stierlingi (Calamonastes), 1089.
— (Cinnyris), 698.
— (Dendropicus), 1058.
— (Illadopsis), 336.
— (Psophocichla), 406.
— (Zosterops), 710.
stigmatophorus (Spermestes), 576.
stigmatops (Dicrurus), 530.
stigmatothorax (Tricholæma), 36.
stigmatura (Dacnis), 688.
stigmatus (Loriculus), 23.
stoliczkæ (Ægithalus), 467.
— (Carpodacus), 603.
— (Certhia), 684.
*stoliczkæ* (Passer), 598.
stoliczkæ (Turtur), 761.
stolidus (Anous), 1018.
— (Myiarchus), 251.
stolzmanni (Chlorothraupis), 658.
*stolzmanni* (Colaptes), 63.
stolzmanni (Hæmophila), 634.
*stolzmanni* (Oreotrochilus), 147.
stolzmanni (Urothraupis), 650.
stonei (Ælurœdus), 523.
stoneyi (Parus), 464.
stormi (Dissoura), 906.
stormsi (Cuculus), 51.
— (Turdus), 400.
stracheyi (Emberiza), 623.

Digitized by Google

stragulatus (Basileuterus), 440.
straminea (Locustella), 370.
*straminea* (Serphophaga), 235.
*stramineicollis* (Gallus), 803.
strangei (Cisticola), 365.
strauchi (Phasianus), 802.
strenua (Geospiza), 608.
— (Ninox), 889.
— (Pachycephala), 478.
*strenua* (Pitta), 209.
strenua (Vireo), 1102.
— (Zosterops), 712.
*strenuus* (Attila), 214.
— (Graucalus), 295.
— (Hierococcyx), 50.
strepera (Elaïnea), 240.
streperus (Acrocephalus), 369.
— (Chaulelasmus), 991.
strepitans (Dryonastes), 328.
— (Phyllostrophus), 314.
— (Pitta), 208.
streptophora (Lathria), 213.
streptophorus (Francolinus), 808.
streubeli (Cypselus), 126.
striata (Agriornis), 224.
— (Aplonis), 541.
— (Butorides), 916.
— (Dendroeca), 435.
— (Formicivora), 177.
— (Geopelia), 762.
— (Graminicola), 362.
— (Henicornis), 202.
— (Hypotænidia), 961.
— (Kenopia), 338.
— (Melospiza), 632.
— (Neositta), 682.
— (Siptornis), 200.
— (Staphidia), 344.
— (Tanagra), 662.
— (Urolonchа), 586.
striaticeps (Automolus), 194.
— (Dysithamnus), 180.
— (Embernagra), 638.
— (Hapalocercus), 234.
— (Iole), 312.
— (Macronus), 341.
— (Muscisaxicola), 230.
— (Phacelodomus), 196.
— (Siptornis), 199.
striaticollis (Alethe), 411.
— (Anabazenops), 193.
*striaticollis* (Campylorhynchus), 420.
striaticollis (Euscarthmus), 233.
— (Fulvetta), 346.
— (Mionectes), 236.
striaticollis (Myiotheretes), 225.
— (Phacelodomus), 196.
— (Siptornis), 199.
striatigula (Eroessa), 354.
striatigularis (Dendrornis), 1071.
striatipectus (Bucco), 47.
*striatipectus* (Melanerpes), 68.
striatipectus (Poliospiza), 599.
— (Synallaxis), 198.
striativentris (Melanocharis), 676.
striatula (Astur), 839.
striatulus (Troglodytes), 425.
striatus (Alcurus), 307.
— (Amytis), 349.
— (Centurus), 69.
— (Colius), 90.
— (Crateropus), 330.
*striatus* (Cuculus), 51.
— (Dendrortyx), 818.
striatus (Dicrurus), 529.
— (Grammatoptila), 329.
— (Graucalus), 297.
— (Oriolus), 526.
— (Turdinulus), 332.
— (Zosternornis), 339.
stricklandi (Chrysocolaptes), 80.
— (Cittocincla), 413.
— (Gallinago), 954.
— (Lophostrix), 886.
— (Picus), 71.
*strictipennis* (Ibis), 901.
*strictothorax* (Dysithamnus), 180.
strictus (Chrysocolaptes), 80.
*stridula* (Syrnium), 890.
stridulus (Campylorhynchus), 420.
— (Pomatorhinus), 326.
strigata (Otocorys), 452.
strigiceps (Zonotrichia), 626.
strigilata (Formicivora), 177.
strigilatus (Ancistrops), 193.
strigirostris (Didunculus), 775.
strigoides (Podargus), 117.
strigula (Siva), 347.
strigulosus (Crypturus), 783.
striifacies (Xenocichla), 309.
striigularis (Phaethornis), 133.
striolata (Fringillaria), 624.
— (Hirundo), 255.
— (Leptasthenura), 201.
— (Ptilotis), 721.
— (Strachyrhis), 339.
— (Thripophaga), 195.
striolatus (Anthus), 446.
— (Bucco), 47.
— (Gecinus), 64.

Digitized by Google

striolatus (Hemixus), 1086.
— (Machæropterus), 222.
— (Serinus), 600.
strophianus (Heliangelus), 155.
strophiata (Siphia), 293.
— (Tylas), 317.
strophiatus (Accentor), 381.
*strophiatus* (Archibuteo), 854.
strophium (Odontophorus), 822.
— (Ptilopus), 739.
struthersi (Ibidorhynchus), 944.
struthopus (Ortalida), 793.
stuartæ (Floricola), 160.
stuarti (Phaethornis), 133.
stubeli (Chlorostilbon), 142.
— (Oxypogon), 159.
stuhlmani (Cinnyris), 699.
*stuhlmanni* (Francolinus), 808.
stuhlmanni (Pedilorhynchus), 266.
— (Sitagra), 564.
— (Stilbopsar), 546.
— (Zosterops), 710.
stulta (Petronia), 596.
sturmi (Ardeiralla), 915.
— (Pteroglossus), 43.
sturnina (Sturnia), 537.
styani (Chrysophlegma), 1057.
— (Pomatorhinus), 326.
— (Siphia), 293.
— (Suthora), 1101.
— (Trochalopteron), 321.
stygius (Asio), 878.
*suahelensis* (Rallina), 966.
suahelica (Cosmophoneus), 490.
— (Poicephalus), 9.
— (Syrnium), 891.
— (Terpsiphone), 281.
*suahelicus* (Dryoscopus), 493.
suahelicus (Trachyphonus), 40.
suavis (Cittocincla), 413, 1095.
suavissima (Cyclopsitta), 34.
— (Pipra), 221.
subadusta (Alseonax), 264.
subaffinis (Phylloscopus), 378.
— (Tanygnathus), 18.
subalaris (Amblyornis), 525.
— (Anabazenops), 193.
*subalaris* (Bradyornis), 287.
subalaris (Cinnyris), 699.
— (Graucalus), 295.
— (Lathria), 213.
— (Macragelæus), 561.
— (Merula), 396.
— (Puffinus), 1032.
— (Xenopipo), 1074.
*subalbifrons* (Anser), 982.
subalpina (Sylvia), 375.
*subandinus* (Thamnophilus), 183.
*subarcticus* (Bubo), 881.
subarquata (Tringa), 950.
subaureus (Hyphantornis), 564.
subbrunneus (Cnipodectes), 245.
subbuteo (Hypotriorchis), 872.
subcærulata (Dryonastes), 329.
subcærulea (Chlorestes), 140, 1066.
subcæruleum (Parisoma), 273.
subcastanea (Munia), 587.
subcaudalis (Ælurœdus), 523.
subcinerea (Tanagra), 662.
subcinnamomea (Euryptila), 350.
subcirris (Picus), 72.
subcorniculatus (Philemon), 726.
subcoronatus (Lanius), 485.
subcristata (Baza), 867.
— (Lophotriccus), 233.
— (Lophozosterops), 713.
— (Serphophaga), 235.
— (Siptornis), 199.
subcristatus (Tinamus), 781.
subcyanea (Pœcilodryas), 271.
subcylindricus (Bycanistes), 101.
subelegans (Centurus), 1058.
*subfasciata* (Glycyphila), 717.
subfasciatus (Thamnophilus), 182.
subflava (Hypocnemis), 173.
— (Ornithion), 238.
— (Serphophaga), 236.
subflavescens (Cyanorhamphus), 26.
— (Cyclorhis), 475.
— (Myristicivora), 747.
— (Philydor), 194.
subflavus (Sporœginthus), 581.
subfrenata (Ptilotis), 720.
subfulvus (Philydor), 194.
subfurcata (Chlorostilbon), 141.
subfurcatus (Cypselus), 126.
subgularis (Ptilopus), 736.
subhimalayensis (Propyrrhula), 607.
sublacteus (Laniarius), 492.
sublineata (Graucalus), 296.
submaculata (Pipilo), 637.
subminuta (Tringa), 951.
submoniliger (Anthipes), 294.
subniger (Falco), 875.
*subniger* (Hypsipetes), 316.
subobscura (Merula), 398.
subochraceum (Pellorneum), 336.
subochraceus (Myiobius), 246.
subocularis (Stigmatops), 718.
*subpagana* (Elaïnea), 239.

Digitized by Google

subpersonata (Motacilla), 1098.
— (Sitagra), 564.
subplacens (Elaïnea), 240.
— (Hypocharmosyna), 32.
subplumbeus (Dysithamnus), 180.
subpudica (Synallaxis), 197.
*subquadratus* (Bycanistes), 101.
subradiata (Thamnophilus), 182.
subrosea (Zosterops), 707.
subrufa (Argya), 323.
subrufescens (Cossypha), 409.
— (Creciscus), 1118.
— (Momotus), 94.
subruficapilla (Cisticola), 365.
subruficollis (Rhytidoceros), 102.
— (Tryngites), 950.
subrufipennis (Thamnolæa), 392.
subspeciosa (Formicivora), 177, 1070.
substriata (Burnesia), 360.
— (Malacoptila), 48.
subsulphurea (Barbatula), 38.
subtectus (Bucco), 47.
subtuberosa (Tropidorhynchus), 725.
subulata (Orthnocichla), 430.
subulatus (Automolus), 194.
— (Todus), 95.
subundulata (Munia), 586.
subunicolor (Trochalopteron), 321.
subvinacea (Columba), 753.
subvirgata (Ammodromus), 632.
subviridis (Phyllobasileus), 378.
*subviridis* (Phyllomyias), 238.
suckleyi (Hypotriorchis), 874.
sudestiensis (Geoffroyus), 117.
*suecica* (Cyanecula), 383.
suffusa (Suthora), 471.
suinda (Ciccaba), 893.
suiriri (Empidagra), 241.
sukatschewi (Trochalopteron), 322.
*sula* (Sula), 1012.
sulaense (Dicæum), 677.
sulaensis (Accipiter), 846.
— (Aprosmictus), 21.
— (Lamprocorax), 543.
— (Scops), 884.
— (Spilornis), 834.
— (Turaccena), 754.
sulcatus (Aulacorhamphus), 44.
sulcirostris (Crax), 789, 1115.
— (Crotophaga), 62.
— (Hypotænidia), 962.
— (Phalacrocorax), 1008.
*sulphurascens* (Automolus), 195.
sulphurata (Emberiza), 622.
sulphuratus (Pitangus), 243.
sulphuratus (Serinus), 600.
sulphurea (Cacatua), 2.
— (Cyanoderma), 1088.
— (Gerygone), 268.
sulphureipygia (Myiobius), 245, 1077.
sulphureopectus (Cosmophoneus), 490.
sulphurescens (Rhynchocyclus), 242.
sulphureus (Graucalus), 296.
— (Myiozetetes), 242.
sulphurifera (Siptornis), 200.
sulphuriventer (Pachycephala), 480.
sultanea (Melanichlora), 460.
suluensis (Ceyx), 112.
— (Dicrurus), 1105.
— (Oriolus), 526.
— (Prioniturus), 17.
— (Thriponax), 82.
sumatrana (Arboricola), 814.
— (Ardea), 909.
— (Caloperdix), 814.
— (Lophura), 798.
— (Merops), 96.
— (Niltava), 294.
sumatranum (Dicæum), 677.
sumatranus (Corydon), 205.
— (Criniger), 311.
— (Dicrurus), 531.
— (Hemixus), 315.
— (Phyllergates), 362.
— (Rhopodytes), 59.
*sumatrensis* (Baza), 867.
sumatrensis (Graucalus), 297.
— (Siphia), 293.
sumbaensis (Merops), 1061.
— (Strix), 899.
— (Terpsiphone), 280.
— (Urospizias), 843.
sumbavensis (Geoffroyus), 16.
sumbawensis (Rhipidura), 278.
— (Zosterops), 709.
sumbensis (Graucalus), 296.
— (Rhipidura), 278.
— (Tanygnathus), 18.
sumichrasti (Aphelocoma), 512.
— (Catherpes), 428.
— (Chlorospingus), 1111.
— (Dives), 559.
— (Hadrostomus), 211.
— (Hæmophila), 634.
— (Saucerottea), 138.
sumptuosa (Compsocoma), 663.
sundara (Niltava), 294.
sundevalli (Butorides), 916.
— (Camaroptera), 356.
— (Cœreba), 691.

Digitized by Google

sundevalli (Pyromelana), 572.
sunia (Scops), 883.
superba (Cardinalis), 619.
— (Erithacus), 382.
— (Lophorhina), 522.
— (Menura), 729.
— (Nestor), 27.
superbus (Anthoscenus), 1068.
— (Augastes), 159.
— (Cinnyris), 697.
— (Notauges), 548.
— (Ptilopus), 738.
superciliaris (Burnesia), 359.
— (Camaroptera), 357.
— (Centurus), 69.
— (Chlorospingus), 651.
— (Ciccaba), 893.
— (Cittocincla), 413.
— (Cryptolopha), 286.
— (Drymoedus), 319.
— (Eumomota), 94.
— (Hypothymis), 274.
*superciliaris* (*Ixulus*), 345.
superciliaris (Leistes), 554.
— (Leptopogon), 237.
— (Leptotriccus), 235.
— (Muscicapula), 294.
*superciliaris* (Myiodynastes), 244.
superciliaris (Ninox), 889.
— (Œdicnemus), 928.
— (Oligura), 343.
— (Ortalida), 793.
— (Penelope), 791.
*superciliaris* (Philydor), 193.
superciliaris (Platyrhynchus), 231.
— (Pseudoxenicus), 1068.
— (Rallina), 966.
— (Saltator), 645.
— (Scytalopus), 167.
— (Spermophilopsis), 614.
— (Sterna), 1018.
— (Sturnopastor), 536.
— (Suya), 358.
— (Thryophilus), 421.
*superciliaris* (Todirostrum), 232.
superciliaris (Vireo), 473.
— (Xiphorhamphus), 326.
— (Zosterops), 710.
*superciliosa* (Acanthopneuste), 377.
superciliosa (Anas), 990.
— (Ceryle), 115.
— (Climacteris), 685.
— (Embernagra), 638.
— (Hæmophila), 633.
— (Myiobius), 246.
superciliosa (Ochthœca), 226.
— (Ophrysia), 818.
— (Parula), 432.
— (Pœcilodryas), 271.
— (Synallaxis), 197.
*superciliosa* (Vidua), 574.
superciliosa (Zosterops), 709.
superciliosus (Acanthorhynchus), 717.
— (Artamus), 534.
— (Centropus), 57.
— (Dasyloplus), 60.
— (Dendrocolaptes), 185.
— (Enneoctonus), 486.
— (Heliobletus), 193.
— (Merops), 97.
— (Pachyphantes), 567.
— (Parus), 463.
— (Phaethornis), 132, 1064.
— (Phyllobasileus), 378.
— (Ploceipasser), 569.
— (Pomatorhinus), 325.
— (Sarciophorus), 934.
superflua (Galerida), 457.
— (Rhipidura), 278.
suratensis (Turtur), 761.
surda (Urochroma), 8.
*surinamensis* (Heliornis), 978.
surinamensis (Hydrochelidon), 1013.
— (Myrmotherula), 178.
surinamus (Pachyrhamphus), 212.
— (Tachyphonus), 656.
surucura (Trogon), 87.
susurrans (Phaethornis), 1064.
susurrans (Dendrornis), 189.
*sutoria* (Sutoria), 361.
suvensis (Halcyon), 109.
swainsoni (Bueco), 47.
— (Buteo), 857.
*swainsoni* (Circus), 836.
swainsoni (Gampsonyx), 864.
*swainsoni* (Graucalus), 296.
swainsoni (Halcyon), 107.
— (Helmitherus), 431.
— (Momotus), 94.
— (Muscivora), 244.
— (Myiarchus), 250, 1078.
— (Myrmeciza), 174, 1069.
— (Passer), 598, 1109.
— (Petrochelidon), 258.
— (Pternistes), 811.
— (Ptilopus), 736.
— (Turdus), 402.
— (Vireo), 472.
*swanzii* (Cisticola), 363.
swindereniana (Agapornis), 22.



Digitized by Google

swinhoei (Alcippe), 345.
— (Gennæus), 800.
*swinhoei* (Macropygia), 754.
swinhoei (Melittophagus), 96.
— (Pomatorhinus), 326.
sybilla (Pratincola), 387.
sybillæ (Coeligena), 148.
sycobius (Lamprocolius), 547.
sykesi (Lalage), 302.
*sykesi* (Megalæma), 39.
sylvanus (Oreocorys), 449.
sylvatica (Carpophaga), 744.
— (Chætura), 128.
— (Prinia), 359.
— (Turnix), 778.
sylvaticum (Glaucidium), 897.
sylvaticus (Bradypterus), 350.
sylvestris (Anser), 983.
— (Cabalus), 962.
— (Scytalopus), 166.
— (Urospizias), 843.
*sylvia* (Pœcilodryas), 271.
sylvia (Sericornis), 367.
— (Tanysiptera), 105.
*sylvicola* (Phylloscopus), 377.
sylvicola (Scops), 884.
— (Tephrodornis), 494.
sylvioides (Sittasomus), 191.
sylviola (Leptotriccus), 235.
syndactyla (Xenocichla), 309.
syriaca (Serinus), 601.
— (Merula), 1092.
— (Sitta), 680.
syriacus (Picus), 70.
syrinx (Acrocephalus), 369.
*syrmatophorus* (Herodias), 912.
syrmatophorus (Phaethornis), 132.
szalayi (Oriolus), 1105.
szechenyii (Tetraophasis), 806.
tabuensis (Aplonis), 541.
— (Porzana), 968.
— (Pyrrhulopsis), 21.
tacazze (Nectarinia), 694.
tachiro (Astur), 841.
taczanowskii (Cinclodes), 202.
— (Columba), 749.
— (Elaïnea), 240.
— (Euphonia), 672.
*taczanowskii* (Gnathospiza), 602.
— (Montifringilla), 594.
taczanowskii (Nothoprocta), 784.
— (Pendulinus), 1106.
— (Pipilopsis), 649.
— (Podicipes), 1041.
— (Siptornis), 200.
taczanowskii (Talaphorus), 135.
tadornoides (Casarca), 989.
tæniata (Dubusia), 663.
*tæniata* (Ninox), 890.
tæniatus (Microcerculus), 430.
— (Morphnus), 847.
tæniolæma (Campothera), 66.
tæniolata (Burnesia), 360.
tænionotus (Eleopicus), 76.
tænioptera (Thryophilus), 1095.
tænioptera (Hyphantornis), 562.
tæninra (Certhia), 683.
— (Rosthramus), 865.
tagulana (Edoliisoma), 298.
taha (Pyromelana), 572.
tahanensis (Pterythrins), 1103.
tahapisi (Fringillaria), 623.
tahitica (Hirundo), 253.
tahitiensis (Numenius), 945.
— (Porzana), 968.
taigoor (Turnix), 778.
taitianus (Coriphilus), 30.
taitiensis (Urodynamis), 54.
taivana (Motacilla), 444.
taivanum (Trochalopteron), 322.
taivanus (Garrulus), 510.
— (Pachycephalixus), 306.
talacoma (Prionops), 497.
*talatala* (Cinnyris), 698.
talautense (Dicæum), 677.
talantensis (Edoliisoma), 298.
— (Eos), 28.
— (Ermotimia), 701.
— (Prioniturus), 17.
— (Ptilopus), 1114.
— (Tanygnathus), 18.
— (Zeocephus), 280.
talifuensis (Anorthura), 1096.
talischensis (Phasianus), 801.
talpacoti (Columbigallina), 764.
tambillana (Dysithamnus), 180.
*tamariceti* (Hypolais), 373.
tamatia (Bucco), 47.
tamaulipensis (Icterus), 1107.
— (Turdus), 401, 1093.
tanagra (Turnagra), 329.
tanagrinus (Lampropsar), 559.
tanganjicæ (Craterops), 329.
tanki (Turnix), 779.
*tannaensis* (Cyanorhamphus), 26.
tannaensis (Myiagra), 283.
tannensis (Halcyon), 109.
— (Ptilopus), 739.
tanneri (Geothlypis), 437.
— (Troglodytes), 425.

Digitized by Google

tanyptera (Falco), 875.
tao (Tinamus), 781.
tapera (Progne), 259.
tappenbecki (Colluricincla), 496, 1104.
— (Musciparus), 267.
taprobona (Alcedo), 112.
taranta (Agapornis), 22.
tarda (Otis), 925.
tarimensis (Phasianus), 802.
tarnii (Hylactes), 168.
*tarnowskii* (Phasianus), 802.
*tasmanica* (Fulica), 977.
tatao (Calliste), 665.
*tatarica* (Melanocorypha), 453.
tataupa (Crypturus), 783.
taurica (Acredula), 1101.
*taurica* (Tetraogallus), 806.
taviunensis (Ptilotis), 720.
— (Pyrrhulopsis), 21.
tayazuguira (Nycticorax), 917.
*taylori* (Aithurus), 147.
taylori (Calliste), 668.
— (Melopyrrha), 618.
— (Pitangus), 243.
*tchagra* (Telephonus), 488.
tectus (Bucco), 47.
— (Sarciophorus), 933.
teesa (Butastur), 859.
tegimæ (Pericrocotus), 302.
teitensis (Indicator), 1055.
telasco (Spermophila), 615.
telescophthalmus (Arses), 288.
temmincki (Æthopyga), 695.
*temmincki* (Anser), 983.
temmincki (Coracias), 93.
— (Cursorius), 931.
— (Dendrexetastes), 188.
*temmincki* (Gallus), 803.
temmincki (Graucalus), 297.
*temmincki* (Lobotus), 300.
temmincki (Lyncornis), 119.
— (Myiophoneus), 408.
— (Picumnus), 83.
— (Pterophanes), 152.
— (Ptilopus), 738.
*temmincki* (Synthliborhamphus), 1015.
temmincki (Tragopan), 797.
— (Tringa), 951.
— (Yungipicus), 75.
temnurus (Prionotelus), 86.
tempesti (Merula), 397.
temporalis (Ægintha), 583.
— (Anabazenops), 192.
— (Heterhyphantes), 565.
— (Pomatorhinus), 325.
tenebricosa (Strix), 900.
tenebrosa (Agyrtria), 1065.
— (Chelidoptera), 49.
— (Colluricincla), 496.
— (Gallinula), 973.
— (Gerygone), 1080.
— (Rhipidura), 278.
tenebrosus (Crateropus), 329.
*tenebrosus* (Puffinus), 1032.
tenella (Eroessa), 354.
— (Trogon), 87.
tenellipes (Acanthopneuste), 376.
*tenellus* (Ægialitis), 940.
tenellus (Tmetothylacus), 448.
tener (Loriculus), 23.
teneriffæ (Parus), 464.
— (Regulus), 379.
*tenerrima* (Estrelda), 582.
tengmalmi (Nyctala), 893.
tenimberensis (Megapodius), 786.
tenkatei (Acanthiza), 366.
— (Gerygone), 1080.
— (Rhipidura), 279.
tentelare (Syma), 110.
*tenuifasciatus* (Thamnophilus), 182.
tenuipunctatus (Thamnophilus), 182.
tenuirostre (Edoliisoma), 298.
tenuirostris (Acanthiza), 1090.
— (Acanthorhynchus), 716.
*tenuirostris* (Ægialitis), 940.
tenuirostris (Anous), 1019.
— (Cinnamopterus), 545.
*tenuirostris* (Cuculus), 51.
tenuirostris (Geositta), 204.
*tenuirostris* (Larus), 1023.
tenuirostris (Macropygia), 754, 1114.
— (Mitrephanes), 247.
— (Neositta), 682.
— (Numenius), 944.
— (Oriolus), 526.
*tenuirostris* (Phalacrocorax), 1007.
tenuirostris (Picolaptes), 187.
— (Platalea), 904.
— (Puffinus), 1032.
— (Quiscalus), 560.
— (Rallus), 959.
— (Tridactylia), 1058.
— (Xenocichla), 309.
— (Xenops), 1072.
— (Zosterops), 712.
*tenuis* (*Leptotodus*), 269.
tephrocephala (Agyrtria), 135.
— (Cryptolopha), 285.
tephrocotis (Montifringilla), 595.
tephrogenys (Criniger), 310, 1085.

Digitized by Google

tephrolæma (Anthreptes), 704.
— (Xenocichla), 310.
tephronota (Acredula), 467.
— (Sitta), 681.
tephronotum (Glaucidium), 897.
tephronotus (Lanius), 485.
— (Sycobrotus), 565.
— (Turdus), 399.
tephropleura (Zosterops), 712.
*tephrops* (Malacocincla), 333.
terat (Lalage), 302.
teresita (Elminia), 281.
*teretirostris* (Anous), 1019.
terpna (Agyrtria), 136, 1065.
terræ-reginæ (Arses), 288, 1083.
terrestris (Cisticola), 364.
— (Eutrygon), 774.
*terrestris* (Phyllostrophus), 1085.
terrestris (Synallaxis), 198.
terricolor (Centurus), 69.
— (Ninox), 890.
tersa (Procnias), 670.
tertia (Aulia), 1074.
— (Graculipica), 537.
tessellatus (Troglodytes), 426.
testacea (Pyranga), 658.
tethys (Procellaria), 1028.
tetraoninus (Francolinus), 810.
tetrax (Otis), 925.
tetrix (Lyrurus), 826.
texana (Aphelocoma), 1105.
— (Colinus), 820.
— (Pyrrhuloxia), 619.
texensis (Chordeiles), 119.
— (Lophophanes), 465.
— (Myiozetetes), 241.
textilis (Amytis), 349.
textrix (Cisticola), 364.
teydea (Fringilla), 589.
teysmanni (Cyrtostomus), 703.
— (Osmotreron), 734.
— (Pachycephala), 479.
— (Rhipidura), 278.
*thagus* (Pelecanus), 1006.
*thalassina* (Butorides), 915.
thalassina (Cissa), 509.
— (Petasophora), 145.
*thalassina* (Plegadis), 903.
— (Stoparola), 291.
thalassina (Tachycineta), 256.
thalassinoides (Stoparola), 292.
thalloni (Thamnolæa), 392.
thamnophiloides (Attila), 214.
thamnophilus (Dryoscopus), 493.
tharus (Polyborus), 832.
thaumantias (Polytmus), 146.
thaumasta (Zodalia), 1068.
thayeri (Parus), 1100.
thecklæ (Galerida), 457.
thenca (Mimus), 415.
*theoides* (Criniger), 311.
theomacha (Ninox), 889.
theresæ (Hermotimia), 701.
— (Hypocnemis), 174.
theresiæ (Metallura), 1067.
— (Polytmus), 1066.
thibetana (Calandrella), 453.
— (Chrysomitris), 593.
— (Corvus), 502.
thierryi (Centropus), 1057.
— (Passer), 598.
thilius (Agelæus), 553.
thiogaster (Lybius), 1055.
thomassoni (Merula), 397.
thomensis (Chætura), 1064.
— (Columba), 750.
— (Corythornis), 1062.
— (Elæocerthia), 702.
— (Estrelda), 582.
— (Nectarinia), 694.
— (Strix), 900.
thompsoni (Cerasophila), 1086.
thomsoni (Erythrocercus), 275.
*thomsoni* (*Manucodia*), 517.
thoracica (Apalis), 352.
— (Ægialitis), 941.
— (Bambusicola), 817.
— (Calliste), 665.
— (Lusciniola), 371.
— (Ochthoeca), 226.
— (Poospiza), 628.
— (Strachyrhis), 339.
thoracicus (Cyphorhinus), 429.
— (Dactylortyx), 821.
— (Formicarius), 172.
— (Hylophilus), 474, 1102.
— (Liosceles), 167.
— (Prionochilus), 675.
— (Thryophilus), 422.
— (Xiphorhynchus), 187.
thornei (Francolinus), 1116.
thorpii (Gerygone), 268.
threnothorax (Rhipidura), 278.
thruppi (Parus), 461.
thura (Carpodacus), 604.
thyroideus (Sphyropicus), 70.
tianduana (Pachycephala), 1102.
tibetana (Sterna), 1015.
tibetanum (Crossoptilon), 799.
tibetanus (Myiophoneus), 408.

Digitized by Google

tibetanus (Syrrhaptes), 776.
— (Tetraogallus), 806.
tibialis (Astur), 840.
— (Atticora), 258.
— (Buarremon), 648.
— (Lorius), 29.
— (Pendulinus), 556.
— (Pheucticus), 611.
*tibialis* (Rhectes), 494.
tibicen (Gymnorhina), 500.
tickelli (Anorrhinus), 102.
— (Drymocataphus), 334.
— (Iole), 312.
tickelliæ (Siphia), 293.
tickelii (Pomatorhinus), 326.
*tiga* (Tiga), 78.
tigrina (Mirafra), 456.
— (Perissoglossa), 435.
*tigrina* (Tigrisoma), 919.
tigrinus (Enneoctonus), 487.
— (Turtur), 761.
timida (Empidonax), 1077.
— (Passer), 598.
timneh (Psittacus), 3.
timoriensis (Edoliisoma), 299.
— (Herodias), 912.
— (Lalage), 302.
— (Megalurus), 351.
— (Petrochelidon), 258.
*timoriensis* (Sphecotheres), 528.
timoriensis (Tropidorhynchus), 725.
timorlaoensis (Baza), 867.
— (Geoffroyus), 17.
— (Graucalus), 296, 1084.
— (Macropygia), 754, 1114.
— (Philemon), 726.
tincta (Camaroptera), 356, 1089.
*tingitanus* (Corvus), 502.
tinniens (Cisticola), 364.
tinnunculus (Celeus), 79.
*tinnunculus* (Tinnunculus), 870.
tinochlora (Panoplites), 1067.
tinus (Accipiter), 845.
tiphia (Ægithina), 341.
tirica (Brotogerys), 15.
tithys (Synallaxis), 199.
titys (Ruticilla), 385.
tjindanæ (Geoffroyus), 117.
tobaci (Agyrtria), 135, 1065.
*tobaci* (Saucerottea), 137.
tobagensis (Formicivora), 1070.
— (Mimus), 1095.
— (Troglodytes), 425.
tocard (Rhamphastos), 42.
toco (Rhamphastos), 42.
togata (Bonasa), 823.
togoensis (Hirundo), 254, 1079.
togoënsis (Trachyphonus), 41.
toitoi (Petroeca), 267.
tolimæ (Speotyto), 895.
tombacea (Galbula), 45.
tomentosa (Mitua), 790.
topela (Munia), 587.
torda (Alca), 1043.
torotoro (Syma), 110.
torquata (Bourcieria), 151.
— (Ceryle), 115.
— (Chamæospiza), 635.
*torquata* (Columba), 751.
torquata (Gampsorhynchus), 323.
*torquata* (Glareola), 929.
torquata (Halcyon), 107.
— (Hydropsalis), 120.
— (Hypotænidia), 962.
— (Malacoptila), 47.
— (Merula), 395.
— (Pachycephala), 478.
— (Palæornis), 19.
— (Poospiza), 628.
— (Pratincola), 387.
*torquata* (Pulsatrix), 892.
torquata (Querquedula), 994.
— (Rhopoterpe), 172.
— (Setophaga), 441.
— (Streptocitta), 544.
— (Synallaxis), 199.
torquatus (Acridotheres), 538.
*torquatus* (Ægialitis), 939.
torquatus (Asyndesmus), 68.
— (Buarremon), 647.
— (Celeus), 79.
— (Corvus), 503.
— (Cracticus), 501.
— (Laniotturdus), 270.
— (Melidectes), 727.
— (Neolestes), 488.
— (Pedionomus), 779.
— (Phasianus), 802, 1115.
— (Pogonorhynchus), 36.
— (Pteroglossus), 43.
— (Thamnophilus), 182.
— (Urospizias), 843.
torqueola (Arboricola), 813.
— (Spermophila), 616.
— (Staphidia), 344.
torquilla (Yunx), 85.
torrejoni (Chlorophonia), 671.
*torrida* (Mirafra), 455.
torrida (Rhipidura), 1081.
torridus (Attila), 214.

Digitized by Google

torridus (Caprimulgus), 124.
— (Furnarius), 203.
— (Oryzoborus), 613.
— (Selasphorus), 162.
torringtoniæ (Columba), 751.
toruensis (Butalis), 1079.
totta (Chrysomitris), 593.
toulsoni (Cypselus), 126.
toussenelii (Astur), 841.
*tovi* (Brotogerys), 15.
*townsendi* (Brachyrhamphus), 1044.
townsendi (Dendroeca), 434.
— (Geospiza), 609.
— (Junco), 629.
— (Lagopus), 827.
— (Myiadectes), 407.
— (Plectrophanes), 624.
— (Spindalis), 661.
— (Spiza), 639.
— (Thalurania), 143.
trachelopyrus (Campophilus), 81.
*trachyrhynchus* (Pelecanus), 1006.
trailli (Empidonax), 248, 1077.
— (Psaropholus), 528.
tranquebarica (Turtur), 761.
*tranquilla* (Geopelia), 762.
transandeanus (Thamnophilus), 184.
transandina (Leptopogon), 237.
*transcaspica* (Otocorys), 1098.
transcaspica (Passer), 1109.
transcaspius (Parus), 461.
transfasciatus (Crypturus), 784.
transfluvialis (Scœorhynchus), 1101.
transvaalensis (Mirafra), 456.
— (Numida), 804.
— (Poicephalus), 9.
traversi (Bradyornis), 1082.
— (Miro), 270.
— (Phalacrocorax), 1009.
traversii (Urobrachya), 573.
traviesi (Helianthea), 151.
treacheri (Rhinocichla), 327.
trepidus (Empidonax), 1078.
triangularis (Dendrornis), 189.
tricarunculatus (Chasmorhynchus), 219.
trichas (Geothlypis), 437, 1097.
tricholopha (Popelairea), 1068.
*tricholopha* (Prymnacantha), 165.
trichopsis (Scops), 886.
trichroa (Erythrura), 583.
tricollaris (Oxyechus), 939.
tricolor (Agelæus), 553.
— (Alectrurus), 228.
— (Ara), 10.
— (Ardea), 911.
tricolor (Calliste), 665.
— (Centurus), 69, 1058.
— (Cinnamopteryx), 561.
— (Cittocincla), 1094.
— (Cœreba), 690.
— (Criniger), 311.
— (Dryoscopus), 493.
— (Ephthianura), 376.
— (Erythrura), 584.
— (Furnarius), 203.
— (Lalage), 302.
*tricolor* (Lobivanellus), 934.
tricolor (Myiarchus), 251.
— (Phalaropus), 957.
— (Pipilopsis), 649.
— (Podicipes), 1040.
— (Pycnonotus), 305.
— (Pyrrhurus), 1085.
— (Rallina), 966.
*tricolor* (Sarcidiornis), 980.
tricolor (Sarciophorus), 933.
— (Sigmodus), 498.
— (Terpsiphone), 281.
— (Xanthopygia), 272.
tridactyla (Ceyx), 111.
— (Jacamaralcyon), 46.
— (Rissa), 1027.
— (Tridactylia), 72, 1058.
trifasciatus (Basileuterus), 439.
— (Carpodacus), 603.
— (Microspingus), 650.
— (Nesomimus), 416.
trigemina (Ptilopus), 738.
trigonostigma (Dicæum), 679.
trimaculatus (Caprimulgus), 1063.
trinitatis (Euphonia), 672.
— (Œstrelata), 1035.
— (Rhamphocœnus), 177.
— (Spermophila), 617.
— (Thamnophilus), 182.
trinotatus (Astur), 841.
tristigma (Caprimulgus), 123, 1063.
tristigmata (Phlogœnas), 772.
tristis (Acridotheres), 537.
— (Chrysomitris), 591.
— (Leptopogon), 237.
— (Miglyptes), 77.
— (Phylloscopus), 378.
— (Regulus), 379.
— (Rhopodytes), 58.
— (Thamnophilus), 183.
— (Turdus), 401.
tristissima (Urolonchа), 586.
tristrami (Amydrus), 545.
— (Dicæum), 678.

Digitized by Google

tristrami (Edoliisoma), 1084.
— (Emberiza), 623.
*tristrami* (Gallinago), 954.
tristrami (Halcyon), 109.
— (Myzomela), 716.
— (Nasiterna), 1054.
— (Oceanodroma), 1029.
— (Ptilopus), 738.
tristriata (Poliospiza), 599.
tristriatus (Basileuterus), 439.
triton (Cacatua), 2.
triurus (Mimus), 415.
trivialis (Anthus), 445.
trivirgata (Acredula), 466.
— (Conopias), 242.
— (Cryptolopha), 235.
trivirgatus (Astur), 840.
— (Monarcha), 289.
trivittata (Phlogopsis), 172.
trobriandi (Cacatua), 2.
— (Pachycephalopsis), 481.
trocaz (Columba), 751.
trochilirostris (Xiphorhynchus), 186.
*trochiloides* (Acanthopneuste), 377.
trochiloides (Gerygone), 269.
trochilus (Phylloscopus), 377.
troglodytes (Anorthura), 427.
— (Collocalia), 130.
*troglodytes* (Cisticola), 363.
troglodytoides (Spelæornis), 426.
— (Synallaxis), 199.
troile (Uria), 1043.
tropica (Turtur), 1114.
tropicalis (Accipiter), 845.
— (Melænornis), 287.
— (Mirafra), 456.
— (Turdus), 399.
trothæ (Dioptrornis), 1082.
trudeaui (Sterna), 1018.
truncatus (Temnurus), 509.
tschebaiewi (Calliope), 383.
*tschudii* (Capito), 42.
tschudii (Piprites), 219.
— (Pyrauga), 658.
— (Thalurania), 143.
— (Thamnophilus), 183.
tschusii (Lyrurus), 826.
*tschusii* (Parus), 1100.
tuberosa (Mitua), 790.
tucanus (Rhamphastos), 42.
tucumana (Chrysotis), 6.
— (Columba), 751.
— (Cyanocorax), 514.
tucuyensis (Dysithamnus), 180.
tui (Brotogerys), 16.
tuipara (Brotogerys), 16.
tukki (Miglyptes), 77.
tullbergi (Campothera), 66.
tumbezana (Myiopatis), 238.
tumulus (Megapodius), 787.
tumultuosus (Pionus), 7.
turatii (Laniarius), 492.
turcestanica (Phasianus), 802.
turcomana (Bubo), 880.
— (Perdix), 812.
turcosa (Irena), 317.
— (Cyanolyca), 513.
— (Siphia), 293, 1083.
turdina (Automolus), 195.
— (Dendrocincla), 186.
turdinum (Heteropelma), 223.
*turdinus* (Harporhynchus), 417.
turdinus (Ptyrticus), 408.
— (Pyrrhurus), 1085.
*turdoides* (Acrocephalus), 368.
turdoides (Cataponera), 328.
*turneri* (Gennæus), 1115.
turneri (Mergauetta), 1002.
— (Parus), 463.
turricola (Columba), 749.
*turtur* (Macropygia), 755.
— (Prion), 1037.
tusalia (Macropygia), 754.
tutuilæ (Halcyon), 109.
tutus (Todirhamphus), 110.
tweeddalei (Pernis), 866.
tweeddali (Irena), 317.
tygus (Bonapartia), 307.
*typhon* (Ardea), 909.
typica (Abeillia), 164.
— (Deconychura), 190.
— (Ellisia), 351.
— (Saucerottea), 137.
typicus (Corvus), 501.
— (Gymnogenys), 835.
typus (Trichophoropsis), 315.
tyrannina (Cercomacra), 176.
— (Dendrocincla), 186.
tyrannula (Herpornis), 347.
tyrannulus (Myiarchus), 250.
tyrannus (Milvulus), 252.
— (Spizaëtus), 848.
*tyrannus* (Tyrannus), 252.
tyrianthina (Metallura), 156.
tyro (Dacelo), 105.
tytleri (Hirundo), 253.
— (Hypothymis), 274.
— (Lamprocorax), 543.
*tytleri* (Muscicapa), 263.
tytleri (Palæornis), 20.

Digitized by Google

tytleri (Phylloscopus), 378.
ugandæ (Barbatula), 37.
— (Burnesia), 360.
— (Passer), 598.
— (Scops), 883.
ugiensis (Pomarea), 291.
uhehensis (Columba), 749.
— (Numida), 804.
ukambensis (Erythropygia), 1094.
ulietanus (Cyanorhamphus), 26.
ulletensis (Aplonis), 542.
— (Merula), 398.
ultramarina (Aphelocoma), 512.
— (Dacnis), 687.
— (Hypochæra), 574.
— (Parus), 464, 1101.
ultramarinus (Coriphilus), 30.
uluensis (Francolinus), 809.
— (Hyphantornis), 1107.
ulula (Surnia), 894.
umbelloides (Bonasa), 823.
umbellus (Bonasa), 823.
umbratilis (Scops), 885.
umbretta (Sclerurus), 191.
— (Scopus), 909.
umbrina (Automolus), 194.
— (Buteo), 1116.
— (Syrnium), 891.
— (Thryothorus), 423.
umbriniceps (Chloropeta), 1081.
umbrinus (Corvus), 502, 1104.
umbrosa (Formicarius), 172.
umbrovirens (Cryptolopha), 286.
unalaschensis (Passerella), 635.
unalaschkensis (Hirundo), 1078.
unappendiculatus (Casuarius), 1051.
uncinata (Lanius), 484.
uncinatus (Leptodon), 866.
undatus (Celeus), 79.
— (Melizophilus), 375.
— (Pogonorhynchus), 36.
underwoodi (Selasphorus), 162.
— (Spathura), 153.
*undina* (Eudyptula), 1048.
undosus (Calamonastes), 352.
undulata (Alseonax), 264.
— (Anas), 990.
*undulata* (Coturnicops), 970.
undulata (Gallinago), 954.
— (Glycyphila), 717.
— (Houbara), 927.
*undulata* (Muscicapa), 263.
undulata (Picumnus), 84.
*undulata* (Zebrilus), 915.
undulatus (Crypturus), 783.
undulatus (Melopsittacus), 27.
— (Rhytidoceros), 102.
unduliger (Thamnophilus), 184.
unduliventer (Astur), 841.
ungava (Parus), 463.
unibrunnea (Cinnicerthia), 419.
unicincta (Columba), 749.
unicinctus (Parabuteo), 858.
unicolor (Amblyospiza), 570.
— (Aphelocoma), 512.
— (Buteo), 857.
— (Campylorhynchus), 420.
— (Chamæpetes), 794.
*unicolor* (Chloropipo), 219.
unicolor (Circus), 837.
— (Cnipolegus), 229.
— (Corvus), 1105.
— (Cosmopsarus), 544.
— (Cyanorhamphus), 26.
— (Cypselus), 125.
— (Dysithamnus), 180.
— (Hæmatopus), 932.
— (Haplospiza), 627.
— (Heteromorpha), 470.
— (Melanocharis), 676.
— (Merula), 398.
— (Myiadectes), 407.
— (Myrmotherula), 179.
— (Phrygilus), 641.
— (Ptilotis), 722.
— (Scytalopus), 166.
— (Siphia), 292.
— (Sturnus), 535.
unimodus (Graucalus), 297.
uniformis (Chloropipo), 219.
— (Haplospiza), 627.
— (Porzana), 969.
unirufa (Cinnicerthia), 419.
— (Lathria), 213.
— (Synallaxis), 198.
unirufus (Centropus), 57.
*unirufus* (Homorus), 195.
*unitorques* (Malacoptila), 47.
unwini (Caprimulgus), 122.
*upcheri* (Hypolais), 373.
uralense (Syrnium), 890.
*uralensis* (Sitta), 680.
uralensis (Tetrao), 825.
uraniæ (Rhipidura), 277.
urbica (Chelidon), 256.
urichi (Mecocerculus), 1075.
urinatrix (Halodroma), 1037.
urochrysea (Chalybura), 144.
*urogallides* (Tetrao), 825.
*urogalloides* (Tetrao), 825.

Digitized by Google

urogallus (Tetrao), 825.
urophasianus (Centrocercus), 824.
*urophasianus* (Dafila), 994.
uropygialis (Acanthiza), 366.
— (Arachnothera), 1113.
— (Attila), 214.
— (Barbatula), 37.
— (Basileuterus), 440.
— (Cassicus), 551.
— (Centurus), 60.
— (Chirocylla), 213.
— (Chrysomitris), 592.
— (Cœreba), 691.
— (Collocalia), 130.
*uropygialis* (Garrulax), 327.
— (Limosa), 945.
uropygialis (Mecocerculus), 227.
— (Nigrita), 575.
*uropygialis* (Numenius), 944.
uropygialis (Pachyrhamphus), 212.
— (Pardalotus), 674.
— (Pheucticus), 611.
— (Pseudochloris), 639.
— (Rhamphocœlus), 660.
— (Rhectes), 494.
— (Stelgidopteryx), 260.
— (Trachyphonus), 41.
— (Zosterops), 711.
urosticta (Myrmotherula), 179.
urostictus (Poliolophus), 307.
ursulæ (Cyanomitra), 1112.
*urubitinga* (Rhinogryphus), 828.
— (Urubitinga), 861.
urumutum (Nothocrax), 790.
usneæ (Parula), 432.
ussheri (Artomyias), 265.
— (Butalis), 262, 1079.
— (Chætura), 128.
— (Indicator), 1035.
— (Pitta), 208.
— (Scotopelia), 879.
— (Telephonus), 489.
ussurianus (Horornis), 373.
usta (Scops), 885.
usticollis (Eremomela), 355.
ustulata (Turdus), 402.
ustulatus (Microcerculus), 430.
uvæensis (Nymphicus), 27.
vaalensis (Anthus), 446.
vagans (Creciscus), 971.
— (Halcyon), 109.
— (Hierococcyx), 1056.
vaillanti (Gecinus), 64.
valdizani (Eleopicus), 76.
validirostris (Lanius), 485.
— (Melithreptus), 714.
— (Upucerthia), 203.
— (Yungipicus), 75.
validissimus (Corvus), 504.
validus (Attila), 214.
— (Chrysocolaptes), 80.
— (Corvus), 504.
— (Dendrocolaptes), 185.
*validus* (Hadrostomus), 211.
validus (Myiarchus), 250.
— (Pachycoccyx), 50.
vallicola (Lophortyx), 819.
vallisneria (Æthyia), 997.
vandepolli (Carpophaga), 744.
— (Pachycephala), 480.
*vanikorensis* (Merula), 395-96.
vanikorensis (Myiagra), 283.
vanwycki (Carpophaga), 745.
varia (Ceryle), 114.
— (Enneoctonus), 486.
— (Grallaria), 170.
— (Mniotilta), 432.
— (Oreocincla), 403.
— (Turnix), 779.
variabilis (Fringillaria), 624.
*variabilis* (Parra), 958.
— (Tringa), 951.
varians (Crypsirhina), 508.
variegata (Casarca), 989.
— (Dendrocolaptes), 185.
— (Eos), 1054.
*variegata* (Formicivora), 177.
variegata (Legatus), 241.
— (Mescœnas), 959.
— (Ninox), 889.
— (Numenius), 944.
*variegata* (Spatula), 995.
variegata (Sula), 1012.
variegaticeps (Anabazenops), 192.
— (Thamnophilus), 182.
variegatum (Trochalopteron), 321.
variegatus (Alcippe), 345, 1088.
— (Campylorhynchus), 420.
— (Chasmorhynchus), 219.
— (Crypturus), 783.
— (Cuculus), 1056.
*variegatus* (Geospiza), 609.
variegatus (Indicator), 34.
— (Melittophagus), 96.
— (Pterocles), 777.
— (Trogon), 87.
variolosus (Cacomantis), 52.
varius (Empidonomus), 252.



Digitized by Google

varius (Enneoctonus), 1103.
— (Fregilupus), 548.
— (Gallus), 803.
— (Hierococcyx), 50.
*varius* (Oporornis), 436.
varius (Parus), 461.
— (Phalacrocorax), 1010.
— (Sphyropicus), 69.
vasa (Coracopsis), 4.
vassori (Procnopis), 669.
vatensis (Clytorhynchus), 499.
vaughani (Acrocephalus), 1090.
*vaughani* (*Tatare*), 1090.
vauxi (Chætura), 128.
vegæ (Larus), 1025.
vegeta (Zosterops), 712.
vegetus (Corvus), 504.
velata (Geothlypis), 437.
— (Tænioptera), 225.
velatum (Philentoma), 251.
velatus (Henicurus), 450.
— (Hyphantornis), 562.
velia (Tanagrella), 670.
velox (Psalidoprocne), 259.
*veloz* (Sterna), 1016.
velox (Turnix), 779.
velutina (Pipra), 221.
velutinus (Surniculus), 50.
*velvetina* (Oedemia), 999.
*venatica* (Ninox), 888.
*venatoria* (Cissa), 508.
venerata (Gracula), 539.
veneratus (Todirhamphus), 110.
venezuelæ (Momotus), 94.
venezuelana (Chlorospingus), 650.
venezuelensis (Embernagra), 638.
— (Geotrygon), 771.
— (Merula), 396.
— (Molothrus), 552.
*venezuelensis* (Myiadectes), 407.
venezuelensis (Phyllomyias), 1076.
— (Pipridea), 669.
— (Xiphorhynchus), 1070.
ventralis (Accipiter), 846.
— (Buteo), 856.
— (Chrysotis), 6.
— (Eriocnemis), 153.
— (Hoplopterus), 935.
— (Phylloscartes), 234.
— (Tribonyx), 973.
venusta (Ægialitis), 940.
— (Calliste), 668.
— (Chloropsis), 318.
— (Dacnis), 688.
venusta (Euphema), 25.
— (Pitta), 208.
— (Thalurania), 143.
venustulus (Parus), 461.
venustus (Artamus), 534.
— (Cinnyris), 698.
— (Granatellus), 438.
veræcrucis (Centurus), 1057.
veræpacis (Automolus), 194.
veræ-pacis (Heteropelma), 223.
*veræ-pacis* (Malacoptila), 48.
veraguensis (Basileuterus), 440.
— (Geotrygon), 771.
— (Hemistephania), 131.
— (Lampornis), 145.
— (Odontophorus), 822.
veredus (Charadrius), 938.
*verecunda* (Turdus), 1094.
vermiculatus (Œdicnemus), 928.
*vermiculatus* (Scops), 885.
vermivorus (Basileuterus), 439.
— (Helmitherus), 431.
vernalis (Loriculus), 22.
vernans (Osmotreron), 734.
verreauxi (Aquila), 851.
— (Baza), 867.
— (Bubo), 881.
— (Carpodacus), 603.
— (Coua), 60.
— (Criniger), 310.
— (Dryoscopus), 493.
— (Elæocerthia), 702.
— (Leptoptila), 769.
— (Lophornis), 165.
— (Pholidauges), 541.
— (Rhipidura), 276.
*verreauxi* (Suthora), 471.
verreauxi (Turdus), 399.
verreauxius (Trichoglossus), 31.
verrucosa (Phalacrocorax), 1009.
versicolor (Calliste), 666.
— (Capito), 41.
— (Columba), 752.
— (Chrysotis), 4.
— (Cyanospiza), 627.
— (Ergaticus), 440.
— (Lanio), 656.
— (Megalæma), 38.
— (Pachyrhamphus), 212.
— (Phasianus), 803.
— (Ptilotis), 721.
— (Querquedula), 992.
— (Quiscalus), 559.
— (Rhipidura), 277.


Digitized by Google

versicolor (Trachyphonus), 40.
— (Trichoglossus), 31.
— (Urospizias), 842.
versteri (Poicephalus), 9.
— (Pristorhamphus), 676.
verticalis (Chlorospingus), 651.
— (Cossypha), 409.
— (Creurgops), 655.
— (Cyanomitra), 702.
— (Cyanomyia), 139.
— (Embernagra), 638.
— (Monarcha), 290.
— (Prioniturus), 17.
— (Pyrrhulauda), 459.
— (Setophaga), 441.
— (Tyrannus), 252.
— (Vireolanius), 475.
*verticata* (Serphophaga), 235.
verticeps (Thalurania), 143, 1066.
vesper (Rhodopis), 160.
vespertina (Hesperiphona), 610.
vespertinus (Erythropus), 872.
vestita (Eriocnemis), 153.
veterum (Porphyrio), 975.
vetula (Muscipipra), 229.
— (Ortalida), 793.
— (Saurothera), 57.
vexator (Tyrannus), 252.
vexillarius (Macrodipteryx), 120.
vicaria (Pœcilodryas), 272.
vicina (Ptilopus), 741.
vicinia (Contopus), 249.
vicinior (Vireo), 472.
victa (Rallina), 966.
victor (Chrysœnas), 741.
victoria (Goura), 775, 1115.
victoriæ (Lamprolia), 392.
— (Menura), 729.
— (Psalidoprymna), 158, 1067.
— (Ptilorhis), 521.
victorini (Compsocoma), 663.
— (Phlexis), 349.
vidali (Halcyon), 109.
vidua (Campophaga), 301.
— (Harpactes), 88.
— (Monarcha), 289.
— (Motacilla), 443.
— (Rhipidura), 279.
viduata (Dendrocygna), 987.
— (Myrmotherula), 179.
vieilloti (Calliste), 667.
— (Dendroeca), 433, 1097.
— (Lophura), 799.
— (Pogonorhynchus), 36.
vieilloti (Saurothera), 57.
vieillotides (Myiobius), 245.
vigil (Rhinoplax), 99.
vigilantis (Rallus), 961.
vigorsi (Æthopyga), 695.
— (Heterotetrax), 925.
— (Pitta), 207.
vigua (Phalacrocorax), 1008.
viguieri (Dacnis), 688.
vilissimus (Tyranniscus), 239.
villavicensio (Campylopterus), 134.
villosa (Myiobius), 245.
— (Sitta), 681.
villosus (Picus), 71.
vina (Columba), 751.
vinacea (Acredula), 467.
— (Chrysotis), 4.
— (Columba), 753.
— (Lagonosticta), 578.
— (Phœnicothraupis), 657.
— (Scops), 886.
vinaceigula (Ardea), 910.
vinaceigularis (Prionops), 497.
vinaceiventris (Leptoptila), 770.
vinaceo-rufa (Zenaida), 758.
vinaceus (Carpodacus), 603.
— (Turtur), 760.
vincens (Prionochilus), 675.
vindhiana (Aquila), 852.
vinipectus (Alcippe), 345.
vinitincta (Merula), 398.
viola (Heliangelus), 155.
violacea (Euphonia), 673.
— (Geotrygon), 770.
— (Loxigilla), 613.
— (Musophaga), 90.
— (Nyctanassa), 918.
— (Sturnia), 537.
violaceicollis (Euphonia), 672.
violaceus (Anthobaphes), 695.
— (Centropus), 55.
— (Corvus), 504.
— (Cyanocorax), 514.
*violaceus* (Gallus), 803.
— (Phalacrocorax), 1007.
violaceus (Ptilonorhynchus), 522.
violajugulum (Trochilus), 162.
violea (Cassidix), 1106.
violiceps (Cyanomyia), 139.
violicollis (Casuarius), 1051.
— (Heliangelus), 155.
violifera (Helianthea), 151.
*violilavata* (Tanagra), 662.
vioscæ (Columba), 751.

Digitized by Google

virago (Cyclopsitta), 33.
virens (Andropadus), 313.
— (Chlorodrepanis), 692.
— (Contopus), 249.
— (Dendroeca), 434.
— (Icteria), 438.
— (Megalæma), 38.
— (Sylviella), 354.
— (Zosterops), 710.
virenticeps (Buarremon), 648.
— (Chrysotis), 4.
— (Cyclorhis), 476.
vireo (Nicator), 493.
vireoninus (Empidochanes), 1077.
virescens (Brotogerys), 15.
— (Butorides), 916.
— (Cacomantis), 52.
— (Dicæum), 679.
— (Empidonax), 1078.
— (Gerygone), 269.
— (Hemixus), 315.
— (Heteropelma), 223.
— (Hypsipetes), 316.
— (Myiozetetes), 1077.
— (Pendulinus), 557.
*virescens* (Phyllomyias), 237.
virescens (Pipilo), 637.
— (Pipra), 221.
— (Pseudoleistes), 554.
— (Ptilotis), 722.
virgata (Aphriza), 949.
— (Ciccaba), 893.
— (Formicivora), 178.
— (Siptornis), 200.
— (Sterna), 1014.
— (Xiphocolaptes), 188.
virgaticeps (Thripadectes), 193.
virgatum (Trochalopteron), 322.
virgatus (Accipiter), 846.
— (Philydor), 194.
— (Tephrodornis), 494.
— (Thamnophilus), 1070.
virginalis (Lampornis), 146.
— (Pitta), 208.
— (Trogon), 1060.
virginiæ (Helminthophaga), 431.
virginianus (Bubo), 881.
*virginianus* (Cardinalis), 619.
virginianus (Chordeiles), 118.
— (Colinus), 820.
— (Rallus), 960.
*virginicus* (Charadrius), 937.
*virgo* (Phlogœnas), 773.
virgo (Tetrapteryx), 923.
virgo (Tympanistria), 765.
viridana (Acanthopneuste), 376.
— (Gecinulus), 67.
— (Lyrurus), 826.
viridanus (Gecinus), 64.
viridescens (Attila), 214.
— (Iole), 312.
viridicata (Elainea), 240.
viridicauda (Talaphorus), 135.
viridicaudatus (Phaethornis), 1064.
viridiceps (Agyrtria), 136.
— (Chlorodyta), 353.
— (Euscarthmus), 232.
*viridiceps* (Neopsittacus), 33.
viridiceps (Rhynchocyclus), 242.
viridicollis (Calliste), 669.
viridicyanea (Cyanolyca), 513.
viridiflava (Eremomela), 355.
— (Hylophilus), 474.
*viridiflava* (Microeca), 1080.
viridiflavus (Tyranniscus), 239.
viridifrons (Crocopus), 732.
— (Cyanomyia), 139.
— (Nasiterna), 1054.
viridifuscus (Oriolus), 526.
*viridigaster* (Oreopsittacus), 33.
viridigaster (Saucerottea), 137.
*viridigena* (Chrysotis), 5.
viridigenalis (Chrysotis), 5.
viridinitens (Dicrurus), 531.
— (Myiagra), 1082.
viridinucha (Chloropsis), 318.
viridipallens (Coeligena), 148.
viridipectus (Lamprotornis), 544.
*viridipennis* (Acanthopneuste), 377.
viridipennis (Tanygnathus), 1054.
*viridirostris* (Grus), 922.
viridirostris (Rhopodytes), 58.
viridis (Ægithina), 341.
— (Ælurœdus), 522.
— (Calyptomena), 204.
— (Calyptorhynchus), 2.
— (Carpococcyx), 61.
— (Centropus), 56.
— (Chlorophonia), 670.
— (Chloropsis), 318.
— (Chrysœnas), 741.
— (Cochoa), 284.
— (Cosmophoneus), 490.
— (Creciscus), 1118.
— (Cyclorhis), 476.
*viridis* (Embernagra), 638.
viridis (Eroessa), 354.
— (Estrelda), 582.

Digitized by Google

viridis (Galbula), 45.
— (Gecinulus), 67.
— (Gecinus), 63.
— (Irrisor), 98.
— (Lampornis), 146.
— (Leptornis), 725.
— (Megalæma), 39.
— (Merops), 97.
— (Monachella), 271.
*viridis* (Motacilla), 444.
viridis (Oriolus), 527.
— (Orthogonys), 658.
— (Ostinops), 550.
— (Pachyrhamphus), 212.
— (Pipreola), 216.
— (Pitylus), 643.
— (Psophia), 924.
— (Pteroglossus), 43.
— (Ptilopus), 741.
— (Sphecotheres), 528.
*viridis* (Terpsiphone), 281.
viridis (Todus), 95.
— (Trogon), 87.
*viridisplendens* (Cyanomitra), 702.
viridissima (Ægithina), 341.
— (Agyrtria), 1065.
— (Oriolus), 526.
*viridissimus* (Brotogeerys), 15.
viridissimus (Merops), 97.
*viridissimus* (Pachynus), 6.
viridissimus (Polytmus), 147, 1066.
*viridissimus* (Tyranniscus), 239.
viriditecta (Chloropsis), 1086.
viridiventris (Hylocharis), 140, 1066.
virussu (Lathria), 213.
viscivorus (Turdus), 399.
visi (Ptilotis), 721.
vitellina (Chiromachæris), 222.
— (Dendroeca), 434.
vitellinus (Hyphantornis), 561.
— (Rhamphastos), 42.
vitiensis (Aplonis), 541.
— (Colluricincla), 496.
— (Columba), 752.
— (Merula), 398.
— (Pachycephala), 477.
*vitiensis* (Phlogœnas), 773.
— (Porphyrio), 976.
vittata (Catarrhactes), 1018.
— (Chrysotis), 6.
— (Erismatura), 1001.
— (Euphonia), 673.
— (Petroeca), 267.
— (Pyrrhura), 13.
vittata (Saxicola), 390.
— (Sterna), 1014.
vittatum (Hapaloderma), 87.
vittatus (Enneoctonus), 486.
— (Gecinus), 64.
— (Prion), 1037.
*vittatus* (Rhinocichla), 327.
vitriolina (Calliste), 666.
vivida (Niltava), 294.
*vivida* (Psittacula), 15.
vivida (Siphia), 1083.
— (Xanthoura), 515.
vlangali (Phasianus), 802.
v-nigra (Somateria), 1000.
vocifer (Haliaëtus), 854.
vociferans (Tyrannus), 252.
vociferoides (Haliaëtus), 854.
vociferus (Antrostomus), 122.
— (Oxyechus), 939.
volitans (Cisticola), 364.
volkmanni (Chalcopelia), 1114.
vordermani (Cryptolopha), 286.
— (Graucalus), 1084.
— (Osmotreron), 733.
— (Siphia), 293, 1083.
*vrayi* (Pericrocotus), 301.
vulcani (Chalcostigma), 156.
— (Zonotrichia), 626.
vulgaris (Buteo), 855.
— (Coccothraustes), 610.
— (Francolinus), 807.
— (Icterus), 558.
— (Sturnus), 534.
*vulgaris* (Turtur), 758.
— (Vanellus), 936.
vulnerata (Analcipus), 528.
— (Myzomela), 715.
vulneratum (Dicæum), 678.
*vulpecula* (Synallaxis), 198.
vulpina (Erythropygia), 412.
— (Synallaxis), 198.
— (Terpsiphone), 280.
vulpinus (Bathmocercus), 331.
vulturina (Gypopsitta), 8.
vulturinum (Acryllium), 805.
*vulturinus* (Philemon), 726.
waalia (Vinago), 731.
waddelli (Garrulax), 327.
wagæ (Myiapatis), 238.
wagleri (Aulacorhamphus), 44.
— (Centurus), 1058.
— (Conurus), 12.
— (Ortalida), 792.
— (Pendulinus), 557.

Digitized by Google

*wagleri* (Pygoscelis), 1047.
wagleri (Zarhynchus), 549.
wahlbergi (Aquila), 852.
wahnesi (Gerygone), 270.
*waigiouensis* (Eurystomus), 93.
waigiuensis (Salvadorina), 1002.
wakefieldi (Vinago), 732.
wakoloensis (Myzomela), 716.
wallacei (Aegotheles), 116.
— (Ceyx), 112.
— (Eos), 28.
— (Habroptila), 964.
— (Hemilophus), 82.
— (Heteropelma), 223.
— (Macropteryx), 130.
— (Megapodius), 788.
— (Munia), 587.
— (Osmotreron), 733.
— (Picumnus), 84.
— (Ptilopus), 739.
— (Semioptera), 519.
— (Todopsis), 275.
— (Urospizias), 843.
— (Zosterops), 708.
waldeni (Actinodura), 331.
— (Cranorrhinus), 100.
— (Dicrurus), 530.
*waldeni* (Tanysiptera), 106.
walleri (Amydrus), 545.
wallichii (Catreus), 801.
wallisi (Henicornis), 1072.
warcewiezi (Dives), 559.
— (Picolaptes), 187.
wardi (Ardea), 910.
— (Geocichla), 405.
— (Palæornis), 19.
— (Pseudobias), 284.
warscewiczi (Saucerottea), 1065.
watersi (Sarothrura), 969.
waterstradti (Acanthopneuste), 1091.
— (Pyrrhula), 1109.
— (Suya), 1089.
watertoni (Thalurania), 143.
wattersi (Alauda), 455.
— (Yungipicus), 74.
waynei (Rallus), 959.
webberi (Ixidia), 308.
weberi (Trichoglossus), 31.
webbiana (Suthora), 471.
websteri (Alcyone), 113.
— (Cacomantis), 1056.
— (Sula), 1012.
weddelli (Conurus), 11.
weigalli (Coracias), 92.
weiskei (Cacomantis), 1056.
— (Climacteris), 685.
— (Eutolmaëtus), 851.
*weiskei* (Syma), 1062.
welchi (Lagopus), 827.
welchmani (Graucalus), 297.
wellsi (Cœreba), 691.
— (Leptoptila), 770.
— (Saucerottea), 1065.
*welwitschii* (Caprimulgus), 124.
wertheri (Pyromelana), 572.
westermani (Carpophaga), 747.
*westermanni* (Casuarius), 1051.
westermanni (Eclectus), 16.
*westermanni* (Muscicapula), 294.
*westernensis* (Zosterops), 712.
wetterensis (Gerygone), 268.
— (Ptistes), 20.
weynsi (Melanopteryx), 567.
whartoni (Carpophaga), 744.
whiteheadi (Calyptomena), 205.
— (Collocalia), 129.
— (Dicrurus), 530.
— (Gennæus), 800.
— (Harpactes), 88.
*whiteheadi* (Leptocoma), 699.
witheheadi (Merula), 398.
— (Orthnocichla), 430.
*whiteheadi* (Pachycephala), 480.
whiteheadi (Scops), 885.
— (Siita), 681.
— (Syrnium), 891.
— (Turnix), 778.
— (Urocissa), 507.
— (Zosterornis), 339.
*whitei* (Glycychæra), 717.
whitei (Zonotrichia), 626.
whiteleyana (Spermophila), 615.
whitelyana (Iolæma), 150.
whitelyanus (Aulacorhamphus), 44.
whitelyi (Agyrtria), 136.
— (Antrostomus), 122.
— (Calliste), 669.
— (Pipreola), 216.
— (Tæniogiaux), 898.
whithei (Poospiza), 628.
whitii (Synallaxis), 198.
whitmeei (Lalage), 303.
whitneyi (Micropallas), 898.
whytei (Smilorhis), 37.
— (Sylviella), 355.
whytii (Serinus), 600.
*wickenburgii* (*Crateropus*), 548.
wickhami (Gennæus), 800.

Digitized by Google

wiedi (Cyclorhis), 476.
— (Pteroglossus), 43.
— (Troglodytes), 425.
*wiedi* (Urochroma), 8.
*wiepkeni* (Syrnium), 891.
wiglesworthi (Anthreptes), 1113.
wilhelminæ (Dicæum), 677.
— (Hypocharmosyna), 32.
— (Lamprothorax), 521.
wilkesi (Carpophaga), 744.
willcocksi (Indicator), 1055.
williami (Carpophaga), 746.
— (Metallura), 156.
williamsi (Gennæus), 800.
*williamsoni* (Turdinulus), 332.
willkonskii (Syrnium), 890.
willsi (Cypselus), 125.
— (Sancerottea), 137.
wilsoni (Charadrius), 937.
— (Glaucopis), 516.
— (Hemignathus), 693.
— (Hypochæra), 1108.
— (Lampropygia), 152.
— (Leptodon), 866.
*wilsoni* (Oceanites), 1029.
wilsoni (Œstrelata), 1035.
— (Oreomyza), 692.
*wilsoni* (Pennula), 969.
— (Phalaropus), 957.
wilsoni (Schlegelia), 519.
wilsoniana (Asio), 878.
winchelli (Halcyon), 108.
— (Pachycephala), 480.
wingatei (Siva), 347.
wintoni (Macronyx), 449.
wolfi (Aramides), 963.
— (Circus), 836.
— (Cyanecula), 383.
wollweberi (Lophophanes), 465.
*wolstenholmei* (Loxops), 594.
wolterstorffi (Accipiter), 845.
woodi (Mixornis), 340.
woodfordi (Ardeiralla), 915.
— (Corvus), 504.
— (Erythrura), 584.
— (Eulabeornis), 963.
— (Syrnium), 891.
— (Urospizias), 842, 1116.
woodfordiana (Macropteryx), 130.
woodhousei (Aphelocoma), 512.
woodhousii (Parmoptila), 357.
woodwardi (Bradyornis), 287, 1082.
— (Mirafra), 1099.
— (Stactolæma), 38.
*worcesteri* (Loriculus), 23.
wortheni (Œstrelata), 1034.
— (Spizella), 630.
*wrangelii* (Brachyrhamphus), 1044.
wrayi (Æthopyga), 696.
— (Chrysophlegma), 67.
— (Pericrocotus), 1084.
— (Pomatorhinus), 326.
wuchereri (Arremon), 647.
*wuchereri* (Enscarthmus), 232.
wumizusume (Synthliborhamphus), 1045.
wurdemanni (Ardea), 910.
wyatti (Siptornis), 200.
wyvilliana (Anas), 990.
*xalapensis* (Trogon), 86.
xantherythræa (Pachycephala), 478.
xanthocephala (Calliste), 668.
xanthocephalus (Chrysocolaptes), 80.
*xanthocheilus* (Charadrius), 937.
xanthochlamys (Pyromelana), 1108.
*xanthochlora* (Herpornis), 347.
xanthochloris (Pterythrius), 487.
xanthochlorus (Chloronerpes), 65.
xanthochroa (Zosterops), 706.
xanthodryas (Acanthopneuste), 376.
xanthogaster (Pericrocotus), 301.
— (Ptilopus), 736.
*xanthogaster* (Xanthomelus), 524.
xanthogastra (Calliste), 666.
— (Chrysomitris), 592.
— (Euphonia), 672.
— (Pharomacrus), 86.
xanthogenys (Machærirhynchus), 285.
— (Machlolophus), 464.
— (Pachyrhamphus), 212.
— (Platycercus), 25.
xanthogonys (Heliodoxa), 149.
xanthogrammus (Phrygilus), 640.
xantholäma (Lædorusa), 306.
xantholarynx (Melanerpes), 68.
xantholeuca (Herpornis), 347.
*xanthoplhus* (Mesopicus), 77.
xantholora (Chrysotis), 6.
xanthomelas (Pyromelana), 572.
xanthomera (Caica), 8.
xanthomus (Agelæus), 553.
xanthonota (Calyptorhynchus), 2.
— (Terenura), 1069.
xanthonotus (Indicator), 34.
— (Oriolus), 527.
xanthonura (Philogænas), 773.
xanthophrys (Crossleyia), 338.
— (Motacilla), 445.
— (Passerculus), 1110.

Digitized by Google

xanthophrys (Pseudonestor), 606.
xanthophthalmus (Chlorospingus), 651.
xanthoprocta (Pachycephala), 479.
xanthoprymna (Saxicola), 389.
xanthops (Chrysotis), 5.
— (Hyphantornis), 564.
— (Psittacula), 15.
xanthoptera (Brotogerys), 15.
*xanthoptera* (Diphyllodes), 519.
xanthopterus (Dysithamnus), 180.
— (Hyphantornis), 563.
*xanthopterus* (Poicephalus), 9.
xanthopteryx (Chrysotis), 5.
xanthopus (Merula), 398.
xanthopygia (Cryptolopha), 286.
— (Myiobius), 245.
xanthopygium (Dicæum), 679.
xanthopygius (Pardalotus), 674.
— (Prionochilus), 675.
xanthopygius (Serinus), 601.
— (Tachyphonus), 655.
xanthopygus (Pycnonotus), 305.
*xanthorhyncha* (Anas), 991.
xanthorhyncha (Turdus), 1093.
xanthorhynchus (Chrysococcyx), 53.
xanthornoides (Campophaga), 300.
xanthornus (Pendulinus), 558.
xanthorrhoa (Ptilopus), 740.
xanthorrhous (Pachycephalixus), 306.
— (Psephotus), 25.
xanthosceles (Merula), 395.
xanthoschista (Cryptolopha), 285.
xanthospila (Pucrasia), 801.
xanthosticta (Barbatula), 1055.
xanthostomus (Melanoparus), 460.
xanthotis (Æthorhynchus), 341.
xanthusi (Basilinna), 139.
xavieri (Xenocichla), 309.
yamakanensis (Pyrotrogon), 1060.
yamdenæ (Alcyone), 1062.
yangpiensis (Yuhina), 1088.
yapensis (Phlogœnas), 772.
yarrelli (Chrysomitris), 591.
*yarrelli* (Motacilla), 442.
yarrelli (Myrtis), 161.
*yarrellii* (Myrmeciza), 174.
yaruqui (Phaethornis), 132.
yatei (Passer), 598.
yelkouana (Puffinus), 1031.
yeltoniensis (Melanocorypha), 453.
yeni (Calliste), 665.
yerburyi (Cercomela), 391.
yessoensis (Emberiza), 621.
yetapa (Cybernetes), 228,
yncas (Xanthoura), 514.
youngi (Todirhamphus), 110.
ypacaha (Aramides), 964.
*ypanemæ* (Macropsalis), 120.
yucatanensis (Amazilia), 138.
— (Chloronerpes), 65.
— (Cyclorhis), 475.
*yucatanensis* (Eumomota), 94.
yucatanensis (Icterus), 558.
— (Myiarchus), 251.
— (Nyctidromus), 1063.
— (Zenaida), 757.
— (Zenaidura), 757.
yucatanica (Cardinalis), 620.
— (Cyanolyca), 513.
yucatanicus (Antrostomus), 122.
yucatensis (Elainea), 1076.
yukonensis (Sayornis), 1075.
yunnanensis (Certhia), 1112.
— (Emberiza), 1110.
*yunnanensis* (Hypsipetes), 316
yunnanensis (Sitta), 680.
yuracarium (Gymnostinops), 550.
zambesiæ (Chlorocichla), 313.
— (Prodotiscus), 35.
zambesiana (Erythropygia), 412.
*zambeziana* (Anthreptes), 704.
zanzibari (Dendropicus), 73.
zanzibarica (Syrnium), 891.
*zanzibarica* (Urobrachya), 573.
zaphiroi (Heterhyphantes), 1107.
*zarudnoi* (Gecinus), 64.
zarudnyi (Ammomanes), 1100.
— (Passer), 599.
*zebra* (Centurus), 69.
zechi (Pseudogyps), 1116.
zeledoni (Cochlearius), 920.
— (Cyanocorax), 514.
— (Lophotriccus), 1075.
— (Pittasoma), 171.
— (Pogonotriccus), 235.
— (Thryophilus), 421.
zelotes (Certhia), 1112.
*zena* (Phonipara), 618.
zena (Spindalis), 661.
*zenkeri* (Accipiter), 845.
zenkeri (Agapornis), 22.
— (Cassinia), 295.
— (Macrosphenus), 1086.
— (Melignomon), 35.
*zenkeri* (*Rectirostrum*), 314.
zenkeri (Smithornis), 1082.
— (Turacus), 89.
zenobia (Cyrtostomus), 703.

Digitized by Google

zerafshanica (Phasianus), 802.
zeylonica (Leptocoma), 700.
— (Megalæma), 39.
zimmermannæ (Buteo), 855.
zoeæ (Carpophaga), 745.
zombæ (Pogonorhynchus), 36.
zombensis (Andropadus), 313.
zonaris (Chætura), 127.
zonarius (Barnardius), 25.
zonatus (Campylorhynchus), 420.
zoniventris (Dissodectes), 869.
*zonocercum* (Ciccaba), 893.
zononota (Myrmotherula), 179.
zonorhyncha (Anas), 966.
*zonorhynchus* (Larus), 1025.
zonothorax (Micrastur), 838.
zonura (Ptilopus), 739.
— (Schizorhis), 90.
— (Urubitinga), 861.
*zorca* (Scops), 882.
zosterops (Bernieria), 314.
— (Chloropsis), 318, 1086.
— (Cosmophoneus), 490.
— (Euscarthmus), 232.



Digitized by Google

# Publications de M. le Dr Alph. DUBOIS

Conservateur au Musée Royal d'Histoire naturelle de Belgique,
Officier de l'Ordre de Léopold.

---

**Synopsis avium. — Nouveau Manuel d'Ornithologie.** — 2 vol. in-4°, avec 16 planches coloriées. — Bruxelles, 1899-1904.

**Faune illustrée des Vertébrés de la Belgique,** *Oiseaux.* — 4 vol. in-4° avec 427 planches coloriées à la main et cartes (1876-1893).

**Les Lépidoptères de la Belgique,** leurs chenilles et leurs chrysalides, décrits et figurés d'après nature sur l'une des plantes nourricières. — 3 vol. in-4° avec 431 planches coloriées à la main (1861-1884).

**Les Animaux nuisibles de la Belgique** *(Vertébrés).* — 1 vol. in-12, illustré. *Avec la liste de tous les Vertébrés observés en Belgique.* — Bruxelles, 1893.

**Revue des derniers systèmes ornithologiques et nouvelle Classification proposée pour les Oiseaux.** — Broch. in-8°. — Paris, 1891.

**Histoire populaire des animaux utiles de la Belgique.** Nouvelle édition illustrée, revue et augmentée. — 1 vol. in-12. — Bruxelles, 1889.

**Tableau synoptique des oiseaux insectivores** qu'il est défendu de prendre en tout temps. — Nouveau tirage en chromo.

**Revue critique des oiseaux de la famille des Bucérotidés.** — Broch. in-8°, avec 2 planches coloriées. — Bruxelles, 1884.

**Manuel de zoologie,** *conforme aux progrès de la science.* — 1 vol. in-12, avec 177 gravures intercalées dans le texte. — Bruxelles, 1882.

**Aperçu du Règne animal** ou premières notions de zoologie, 1 vol. in-12, avec 166 gravures. (Ouvrage adopté pour l'Enseiguement moyen.) — Bruxelles, 1882.

**Conspectus systematicus et geographicus avium Europæarum.** — Broch. in-8°. — Bruxelles, 1871.

**Archives cosmologiques.** *Revue des sciences naturelles.* 1 vol. in-8°, avec 13 planches. — Bruxelles, 1867.

**Traité d'Entomologie horticole, agricole et forestière.** — 1 vol. in-8° avec 4 planches coloriées. *(Ouvrage couronné.)* — Gand, 1865.

---

Pour paraître prochainement dans les *Annales du Musée du Congo :*

# MATÉRIAUX POUR LA FAUNE DU CONGO

**1re PARTIE : MAMMIFÈRES**

PAR

Alph. DUBOIS
Conservateur au Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique.

ET LE

Prof. P. MATSCHIE
Conservateur au Musée royal de Zoologie de Berlin.

**2e PARTIE : OISEAUX**

PAR

Alph. DUBOIS

---

Bruxelles. — Polleunis & Ceuterick, imprimeurs, rue des Ursulines, 37.

Digitized by Google

Digitized by Google

## Publications de M. Alph. DUBOIS

**en vente à la librairie de Henri LAMERTIN, 20, rue du Marché-au-Bois, à Bruxelles.**

---

**Faune illustrée des Vertébrés de la Belgique.** *Oiseaux.* — 4 vol. in-4° avec 427 pl. coloriées à la main et cartes (1876-1893). — *Il ne reste plus qu'un exemplaire, dont les 3 planches manquantes sont remplacées par des aquarelles peintes par l'auteur* . . . fr. 400

**Le même ouvrage**, avec cartes mais sans atlas, 2 vol. in-4° . . 75

**Les Lépidoptères de la Belgique**, leurs chenilles et leurs chrysalides, décrits et figurés d'après nature sur l'une des plantes nourricières. 3 vol. in-4° avec 451 pl. coloriées à la main (1861-1884) . 275

**Revue des derniers systèmes ornithologiques et nouvelle Classification proposée pour les Oiseaux.** Broch. in-8°, Paris, 1891 . . . . . 1 25

**Histoire populaire des animaux utiles de la Belgique.** Nouvelle édition illustrée, revue et augmentée, — 1 vol. in-12, Bruxelles, 1889 . . . . . 1 75

**Les Animaux nuisibles de la Belgique** *(Vertébrés).* — 1 vol. in-12, illustré. *Avec la liste de tous les Vertébrés observés en Belgique.* Bruxelles 1895 . . . . . 2

**Tableau synoptique des oiseaux insectivores** qu'il est défendu de prendre en tout temps. — Nouveau tirage en chromo . . 2 50

**Revue critique des oiseaux de la famille des Bucérotidés.** broch. in-8°, avec 2 pl. col., Bruxelles, 1884 . . . . 2

**Manuel de zoologie**, *conforme aux progrès de la science*, 1 vol. in-12, avec 177 gravures intercalées dans le texte. Bruxelles 1882 . . 6

**Aperçu du Règne animal** ou premières notions de zoologie, 1 vol. in-12, avec 166 gravures. Ouvrage adopté pour l'Enseignement moyen. — Bruxelles 1882 . . . . . 5

**Conspectus systematicus et geographicus avium Europæarum**, broch. in-8°, Bruxelles 1871 . . . . . 2

**Archives cosmologiques.** *Revue des sciences naturelles.* 1 vol. in-8°, avec 15 pl. — Bruxelles 1867 . . . . . 8

**Traité d'Entomologie horticole, agricole et forestière.** 1 vol. in-8°, avec 4 pl. col. *(Ouvrage couronné.)* — Gand, 1866 *(Épuisé.)*

---

Aug. Lameere, **Manuel de la Faune de Belgique** (Animaux non insectes). Tome I, in-18 avec figures dans le texte. Bruxelles, 1895. fr. 50
Tome II (Insectes inférieurs), in-18, 858 pages et 721 figures dans le texte, 1900. Cart., toile anglaise . . . . . 7 00

---

Bruxelles. — Polleunis & Ceuterick, imprimeurs, rue des 3 couleurs, 37

Digitized by Google

Digitized by Google